

171115102439806

Фенистил Гель средство при аллергии и для облегчения зуда, раздражения и ожогов легкой степени, диметинден 0,1%, 30 г

Наименование на русском языке: Фенистил Гель средство при аллергии и для облегчения зуда, раздражения и ожогов легкой степени, диметинден 0,1%, 30 г

Модель: Гель от зуда и раздражения кожи, гель 0,1%, 30г

Штрих-код: 7680387629006

Наименование на английском языке: FENISTIL 0.1% GEL 30G RU

Описание товара: Гель для наружного применения гомогенный, бесцветный, прозрачный или слабо опалесцирующий, практически без запаха.

Производитель: GlaxoSmithKline

Артикул: Fenistil Гель от зуда и раздражения кожи, гель 0,1%, 30г

Бренд: Fenistil

Показания к применению: Кожный зуд различного происхождения (кроме связанного с холестазом) при:

— зудящих дерматозах;

— экземе;

— крапивнице;

— укусах насекомых.

Солнечные ожоги, бытовые и производственные ожоги (легкой степени).

Фармакологическое действие: Блокатор гистаминовых H1-рецепторов. Оказывает противоаллергическое и противозудное действие. Снижает повышенную проницаемость капилляров, связанную с аллергическими реакциями. При нанесении на кожу уменьшает зуд и раздражение, вызванные кожно-аллергическими реакциями.

Препарат обладает также выраженным местноанестезирующим действием.

Блокирует действие кининов, оказывает слабое антихолинергическое действие.

При наружном применении благодаря гелевой основе действие с легким охлаждающим эффектом начинается через несколько минут и достигает максимума через 1-4 ч.

Состав: На 100 г:

Активное вещество: диметиндена малеат 100 мг.

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат - 50 мг, карбомер - около 900 мг, натрия гидроксид (раствор 30%) - около 1 г, бензалкония хлорид - 5 мг, пропиленгликоль - 15 г, вода очищенная - около 82.9 г.

С осторожностью (Меры предосторожности): С осторожностью следует назначать Фенистил® в I триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Фармакокинетика: При наружном применении хорошо проникает в кожу. Системная биодоступность активного вещества составляет 10%.

Способ применения и дозы: Применяют наружно. Препарат следует наносить на пораженные участки кожи 2-4 раза/сут. В случаях сильного зуда или распространенных поражений кожи рекомендуется одновременное применение пероральных форм.

Противопоказания: — закрытоугольная глаукома;

— гиперплазия предстательной железы;

— детский возраст до 1 мес (особенно недоношенные);

— повышенная чувствительность к диметиндену и другим компонентам, входящим в состав препарата.

Применение у детей

Противопоказан в детском возрасте до 1 мес (особенно у недоношенных).

У младенцев и детей младшего возраста не следует применять препарат на обширных участках кожи, особенно при наличии явлений воспаления или кровоточивости.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Лекарственное взаимодействие препарата Фенистил® не описано.

Применение при беременности и в период лактации: Применение препарата Фенистил® в I триместре беременности возможно только после консультации врача.

Во II и III триместрах беременности и в период лактации гель не следует применять на обширных участках кожи, особенно при наличии явлений воспаления и кровоточивости.

Кормящим матерям не следует наносить препарат на соски молочных желез.

Условия хранения: Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, гель при температуре не выше 25°C.

Побочное действие: Определение частоты побочных эффектов: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$ и $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$ и $< 1/100$), редко ($\geq 1/10\ 000$ и $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10\ 000$), включая отдельные сообщения и реакции с неизвестной частотой (невозможно оценить на основании имеющихся данных).

Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто - сухость кожи, чувство жжения кожи.

Аллергические реакции: очень редко (пострегистрационные данные) - аллергический дерматит, включая кожную сыпь, зуд.

Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются, или появились любые другие побочные эффекты, пациент должен сообщить об этом врачу.

Передозировка: Симптомы: при случайном проглатывании большого количества препарата могут возникать симптомы, характерные для блокаторов гистаминовых H1-рецепторов - угнетение ЦНС и сонливость (в основном у взрослых), стимуляция ЦНС и м-холиноблокирующие эффекты (особенно у детей), в т.ч. возбуждение, атаксия, тахикардия, галлюцинации, тонические или клонические судороги, мидриаз, сухость во рту, приливы крови к лицу, задержка мочи, лихорадка. За этим может последовать снижение АД.

Лечение: специфический антидот неизвестен. Следует назначить активированный уголь, солевое слабительное; провести мероприятия по поддержанию функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для лечения артериальной гипотензии можно применять сосудосуживающие средства.

При случайной передозировке пациент должен обратиться к врачу.

Особые указания: При выраженном зуде или при поражении обширных участков кожи препарат можно применять только после консультации врача.

При применении препарата Фенистил® на обширных участках кожи следует избегать воздействия солнечных лучей.

Если в период применения препарата Фенистил® выраженность симптомов заболевания не уменьшается или усиливается, необходима консультация врача.

Препарат неэффективен при зуде, связанном с холестазом.

Препарат содержит пропиленгликоль и бензалкония хлорид. Эмульсия также содержит бутилгидрокситолуол. Перечисленные вспомогательные вещества могут вызвать местные аллергические реакции (контактный дерматит). Бутилгидрокситолуол также может вызвать раздражение глаз и слизистых оболочек.

Использование в педиатрии

У детей в возрасте от 1 месяца до 2 лет препарат следует применять только после консультации врача.

У младенцев и детей младшего возраста не следует применять препарат на обширных участках кожи, особенно при наличии явлений воспаления или кровоточивости.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Маркетинговое описание (GSK): Фенистил Гель уменьшает зуд и раздражение, вызванные кожно-аллергическими реакциями.* Он применяется при кожных реакциях, вызванных укусами насекомых, поверхностными ожогами легкой степени, солнечными ожогами, дерматозами, крапивницей.* Начинает действовать через несколько минут и обладает легким охлаждающим эффектом.* Подходит для применения с 1 месяца жизни.

* Инструкция по медицинскому применению, РУ No П N011663/02 от 01.04.2011

Форма выпуска: 30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Международное непатентованное название на латинице: Dimetindene

Срок годности: 3 года.

Бренд кириллица: Фенистил

Производитель кириллица: ГлаксоСмитКляйн

Торговое название на кириллице: Фенистил

Страна происхождения производителя: Великобритания

Торговое название на латинице: Fenistil

Страна производства: Швейцария

Международное непатентованное название на кириллице: Диметинден

Условия отпуска из аптек: Без рецепта

Фармакологическая группа ATX (ATC) код: D04AA13

Завод: NCH-NYON

Тип товара: Лекарственное средство

Вид лекарственной формы: Гель для наружного применения

Нозологическая классификация (МКБ-10): L20.8 Другие атопические дерматиты;L23 Аллергический контактный дерматит;L24 Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит;L28.0 Простой хронический лишай;L29 Зуд;L30.0 Монетовидная экзема;L50 Крапивница;L55 Солнечный ожог;T14.0 Поверхностная травма неуточненной области тела;T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации

Фармакологическая группа ATX (ATC) название: Диметинден

Способ введения лекарственного средства: Наружный

Вид упаковки: Пачка картонная

Терапевтическое действие: Противоаллергическое средство - H1-гистаминовых рецепторов блокатор

Заболевания: Крапивница, Экзема, Зуд, Зудящие дерматозы

Минимальный возраст от: 1

Пол: Мужской, Женский

Целевой возраст: Детский, Подростковый, Взрослый, Пожилой

Действующие вещества кириллица: Диметиндена малеат

Количество в упаковке: 1

Ширина брутто: 27

Вес препарата: 30

Максимальная допустимая температура хранения: 25

Срок годности базовый: 24

Длина брутто: 126

Высота брутто: 42

Концентрация действующего вещества: 0.1%

Вес брутто: 44

Видео (промо): <https://www.youtube.com/watch?v=O17-IV2hWOI>

ОТС (without MM): ОТС (without MM)

ОТС (All): ОТС (All)

All: All