

897-10-11000016

Ново-Пассит® таблетки покрытые пленочной оболочкой 60 ШТ

Тип первичной упаковки: Пластиковая банка

Бренд: Ново-Пассит

Торговое название: Ново-Пассит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 шт.

МНН: Комбинированный препарат

Наименование товара (ENG): NOVO-PASSIT tab. N. 60

Назначение продукта: Препараты безрецептурного отпуска

Категория / область применения: Препараты безрецептурного отпуска

Лекарственная форма (форма выпуска): Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Показания к применению: — Неврастения и невротические реакции, сопровождающиеся раздражительностью, тревогой, страхом, усталостью, рассеянностью.

— “Синдром менеджера” (состояние постоянного психического напряжения).

— Бессонница (легкие формы).

— Головные боли, обусловленные нервным напряжением.

— Мигрень.

— Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта (диспептический синдром, синдром “раздраженного кишечника”).

— В качестве симптоматического средства при нейроциркуляторной дистонии и климактерическом синдроме.

— Зудящие дерматозы (экзема атопическая и себорейная, крапивница), обусловленные психологической нагрузкой.

Регистрационный номер: ЛП-№(000120)-(РГ-RU)

Код АТХ: N05CM

Производитель: Тева Чешские Предприятия с.р.о.

Страна производства: Чешская Республика

Форма выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

По 30, 60 или 100 таблеток во флаконе из полиэтилена высокой плотности с прокладкой и навинчивающейся крышкой или по 10 таблеток в блистере (Al/PVC(PVDC)). Каждый флакон, 1 или 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещены в картонную пачку, на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки.

Описание лекарственной формы: Таблетки овальной формы, двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой бледно-зеленого цвета, с разделяющей риской на обеих сторонах.

На поперечном разрезе - ядро неоднородной структуры светло-коричневого или светло-коричневого цвета с сероватым оттенком.

Действующие вещества: Ново-Пассита экстракт сухой (1:6,5) (получаемый из валерианы лекарственной корневищ с корнями (5 ч), Melissa лекарственной травы (2 ч), зверобоя продырявленного травы (5 ч), боярышника листьев и цветков (5 ч), пассифлоры инкарнатной травы (1 ч), хмеля обыкновенного соплодий (5 ч), бузины черной цветков (2 ч)) 157,5 мг; гвайфенезин 200,0 мг

Вспомогательные вещества: Кремния диоксид 2,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 96,0 мг, глицерил трибегенат 10,0 мг, магния стеарат 10,0 мг, лактозы моногидрат до 800,0 мг

Оболочка:

опадрай «AMB 80W31115» зеленый (поливиниловый спирт 45,52 %, титана диоксид 26,5 %, тальк 20,0 %, лецитин соевый 2,0 %, камедь ксантановая 0,48 %, краситель хинолиновый желтый 2,5 %, краситель железа оксид желтый 2,0 %, краситель индигокармин 1,0 %) 24,0 мг.

Фармакологическая группа: седативное средство растительного происхождения

Фармакологическое действие: Комбинированный препарат, фармакологическая активность которого обусловлена входящими в его состав компонентами экстракта на основе лекарственного растительного сырья с преимущественно седативным (успокаивающим) действием и гвайфенезином, обладающим анксиолитическим (противотревожным) эффектом.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в особенности к гвайфенезину, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, миастения, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период кормления грудью: В период беременности препарат назначают только по абсолютным показаниям, если ожидаемый эффект для матери превышает возможный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания грудное вскармливание следует прекратить.

С осторожностью: Острые заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, алкоголизм, заболевания или травмы головного мозга, эпилепсия, детский возраст старше 12 лет.

Способ применения: Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет:

При отсутствии других рекомендаций врача препарат следует принимать по 1 таблетке 3 раза в день до еды. После консультации с врачом возможно увеличение дозы до 2 таблеток 3 раза в день. При появлении сильной усталости или подавленности необходимо уменьшить утреннюю и дневную дозу до 1/2 таблетки на прием утром и днем, вечером принимать 1 таблетку. Интервал между приемами должен составлять 4-6 часов.

В случае появления тошноты препарат следует принимать во время еды.

Побочное действие: Пациенты обычно хорошо переносят препарат. Однако в редких случаях могут появиться аллергические реакции, экзантема, головокружение, усталость, сонливость, легкая мышечная слабость, расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, спазмы, изжога, диарея, запор), снижение концентрации внимания, которые быстро проходят после отмены препарата.

Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка: Передозировка вначале проявляется чувством подавленности и сонливостью. Позднее эти симптомы могут сопровождаться тошнотой, легкой мышечной слабостью, болями в суставах, ощущением тяжести в желудке. При появлении симптомов передозировки прием препарата следует прекратить.

Доврачебная помощь: промывание желудка. Лечение симптоматическое. Необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность вождения транспорта: В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Взаимодействие с другими препаратами: При одновременном приеме препарата Ново-Пассит и других лекарственных средств их действие может быть усилено или ослаблено. Перед началом приема препарата одновременно с другими лекарственными средствами необходимо проконсультироваться с врачом.

Препарат усиливает действие алкоголя и других веществ, угнетающих центральную нервную систему.

Лекарственные средства, применяемые для расслабления скелетных мышц (центральная миорелаксация), могут повышать риск появления побочных действий препарата, в первую очередь - мышечной слабости. Экстракт зверобоя, содержащийся в препарате, снижает эффективность гормональной контрацепции, а также лекарственных средств, применяемых преимущественно после трансплантации для снижения риска отторжения трансплантированного органа или ткани (иммунодепрессивные препараты), лекарственных средств, предназначенных для лечения СПИДа, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний бронхов и предупреждения тромбоэмболии. Поэтому перед началом приема Ново-Пассита на фоне указанных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Дата регистрации препарата: 2021-01-20

Высота упаковки (мм): 95

Ширина упаковки (мм): 50

Длина упаковки (мм): 50

Вес нетто, г: 53

Вес брутто, г: 84

Температура хранения: Не выше 25 °С

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке).

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности в годах: 3

Бизнес подразделение: ОТС

Состав: Активные компоненты:

Ново-Пассита экстракт сухой (1:6,5) (получаемый из валерианы лекарственной корневищ с корнями (5 ч), Melissa лекарственной травы (2 ч), зверобоя продырявленного травы (5 ч), боярышника листьев и цветков (5 ч), пассифлоры инкарнатной травы (1 ч), хмеля обыкновенного соплодий (5 ч), бузины черной цветков (2 ч)) 157,5 мг; гвайфенезин 200,0 мг

Вспомогательные вещества:

кремния диоксид 2,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 96,0 мг, глицерил трибегенат 10,0 мг, магния стеарат 10,0 мг, лактозы моногидрат до 800,0 мг

Оболочка:

опадрай «AMB 80W31115» зеленый (поливиниловый спирт 45,52 %, титана диоксид 26,5 %, тальк 20,0 %, лецитин соевый 2,0 %, камедь ксантановая 0,48 %, краситель хинолиновый желтый 2,5 %, краситель железа оксид желтый 2,0 %, краситель индигокармин 1,0 %) 24,0 мг.

Особые указания: Во время лечения препаратом не следует употреблять алкогольные напитки.

Во время приема Ново-Пассита, особенно пациентам со светлой кожей, следует избегать воздействия ультрафиолетового облучения (длительное воздействие прямых солнечных лучей, посещение солярия).

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.

Код Здравсити: 39359

Количество в упаковке: 60 шт.

Код Магнит: 7000000136

Код 36.6: 28436

Код Ozon: 147369614

Код Асна: 119491

Код Столичники: 7907

Код eApteka: 210253

Код Аптека: {9D502BD9-D540-47E2-A5D3-E8A46173F102}

Ставка НДС, %: 10

Условия отпуска: Без рецепта

Владелец регистрационного удостоверения: Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль

Дата прекращения действия регистрации: Не ограничен

Страна фирмы регистратора: Израиль

Код Миницен: IP012932

Код Диалог: 921285

Код Мегаптека: 39451

Код Планета Здоровья: 22894703

Код Ютека: 336412

Организация-поставщик: ООО «Тева», 115054, Москва, ул. Валовая, 35

тел.: +7 (495) 644 22 34, факс: +7 (495) 644 22 35

Адрес в интернете: www.teva.ru

Teva-Code: 897-10-11000016

Наименование товара (RUS): Ново-Пассит® таблетки покрытые пленочной оболочкой 60 шт

Тип вторичной упаковки: Картонная упаковка

ЖНВЛП: Нет

Код ОКПД: 2423612

ШК: 8594737233012, 8594737253515

Побочное действие_ HTML: <p>Пациенты обычно хорошо переносят препарат. Однако в редких случаях могут появиться аллергические реакции, экзантема, головокружение, усталость, сонливость, легкая мышечная слабость, расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, спазмы, изжога, диарея, запор), снижение концентрации внимания, которые быстро проходят после отмены препарата.</p>

<p>Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.</p>

Передозировка_ HTML: <p>Передозировка вначале проявляется чувством подавленности и сонливостью. Позднее эти симптомы могут сопровождаться тошнотой, легкой мышечной слабостью, болями в суставах, ощущением тяжести в желудке. При появлении симптомов передозировки прием препарата следует прекратить. Доврачебная помощь: промывание желудка. Лечение симптоматическое. Необходимо обратиться к врачу.</p>

Взаимодействие с другими препаратами_ HTML: <p>При одновременном приеме препарата Ново-Пассит и других лекарственных средств их действие может быть усилено или ослаблено. Перед началом приема препарата одновременно с другими лекарственными средствами необходимо проконсультироваться с врачом.</p>

<p>Препарат усиливает действие алкоголя и других веществ, угнетающих центральную нервную систему.</p>

<p>Лекарственные средства, применяемые для расслабления скелетных мышц (центральная миорелаксация), могут повышать риск появления побочных действий препарата, в первую очередь - мышечной слабости.</p>

<p>Экстракт зверобоя, содержащийся в препарате, снижает эффективность гормональной контрацепции, а также лекарственных средств, применяемых преимущественно после трансплантации для снижения риска отторжения трансплантированного органа или ткани (иммунодепрессивные препараты), лекарственных средств, предназначенных для лечения СПИДа, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний бронхов и предупреждения тромбоэмболии. Поэтому перед началом приема Ново-Пассита на фоне указанных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.</p>

Состав_HTML: <p>Активные компоненты:</p>

<p>Ново-Пассита экстракт сухой (1:6,5) (получаемый из валерианы лекарственной корневищ с корнями (5 ч), Melissa лекарственной травы (2 ч), зверобоя продырявленного травы (5 ч), боярышника листьев и цветков (5 ч), пассифлоры инкарнатной травы (1 ч), хмеля обыкновенного соплодий (5 ч), бузины черной цветков (2 ч)) 157,5 мг; гвайфенезин 200,0 мг</p>

<p>Вспомогательные вещества:</p>

<p>кремния диоксид 2,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 96,0 мг, глицерил трибегенат 10,0 мг, магния стеарат 10,0 мг, лактозы моногидрат до 800,0 мг</p>

<p>Оболочка:</p>

<p>опадрай «AMB 80W31115» зеленый (поливиниловый спирт 45,52 %, титана диоксид 26,5 %, тальк 20,0 %, лецитин соевый 2,0 %, камедь ксантановая 0,48 %, краситель хинолиновый желтый 2,5 %, краситель железа оксид желтый 2,0 %, краситель индигокармин 1,0 %) 24,0 мг.</p>

Показания к применению_HTML:

Неврастения и невротические реакции, сопровождающиеся раздражительностью, тревогой, страхом, усталостью, рассеянностью.

“Синдром менеджера” (состояние постоянного психического напряжения).

Бессонница (легкие формы).

Головные боли, обусловленные нервным напряжением.

Мигрень.

Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта (диспептический синдром, синдром “раздраженного кишечника”).

В качестве симптоматического средства при нейроциркуляторной дистонии и климактерическом синдроме.

Зудящие дерматозы (экзема атопическая и себорейная, крапивница), обусловленные психологической нагрузкой.

Форма выпуска_HTML: <p>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.</p>

<p>По 30, 60 или 100 таблеток во флаконе из полиэтилена высокой плотности с прокладкой и навинчивающейся крышкой или по 10 таблеток в блистере (Al/PVC(PVDC)). Каждый флакон, 1 или 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещены в картонную пачку, на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки.</p>

Описание лекарственной формы_HTML: <p>Таблетки овальной формы, двояковыпуклые, покрытые

пленочной оболочкой бледно-зеленого цвета, с разделяющей риской на обеих сторонах.</p>

<p>На поперечном разрезе - ядро неоднородной структуры светло-коричневого или светло-коричневого цвета с сероватым оттенком.</p>

Способ применения_HTML: <p>Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет:</p>

<p>При отсутствии других рекомендаций врача препарат следует принимать по 1 таблетке 3 раза в день до еды. После консультации с врачом возможно увеличение дозы до 2 таблеток 3 раза в день. При появлении сильной усталости или подавленности необходимо уменьшить утреннюю и дневную дозу до 1/2 таблетки на прием утром и днем, вечером принимать 1 таблетку. Интервал между приемами должен составлять 4-6 часов.</p>

<p>В случае появления тошноты препарат следует принимать во время еды.</p>

Противопоказания_HTML: <p>Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в особенности к гвайфенезину, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, миастения, детский возраст до 12 лет.</p>

С осторожностью_HTML: <p>Острые заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, алкоголизм, заболевания или травмы головного мозга, эпилепсия, детский возраст старше 12 лет.</p>

Применение при беременности и в период кормления грудью_HTML: <p>В период беременности препарат назначают только по абсолютным показаниям, если ожидаемый эффект для матери превышает возможный риск для плода. </p>

<p>При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания грудное вскармливание следует прекратить.</p>

Фармакологическое действие_HTML: <p>Комбинированный препарат, фармакологическая активность которого обусловлена входящими в его состав компонентами экстракта на основе лекарственного растительного сырья с преимущественно седативным (успокаивающим) действием и гвайфенезином, обладающим анксиолитическим (противотревожным) эффектом.</p>

Код Ригла: 19718

Код Яндекс Маркет: 186854012

BU: 1_ОТС

Basket: ОТС

Код Сбермаркет: 16303530

Product Name ECI_1: Ново-Пассит® таблетки покрытые пленочной оболочкой 60 шт тева

Product Name ECI_2: Ново-Пассит® таблетки покрытые пленочной оболочкой 60 шт teva

a2005_1: 358693

a2005_2: 60022

Производитель для DSA: Тева