

北京大学数学学院期中试题

2021—2022 学年第一学期

考试科目 高等代数 I 考试时间 2021 年 11 月 16 日

姓 名 _____ 学 号 _____


一. (24 分). 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & a \end{bmatrix}$, 列向量 $\beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ a-2 \end{bmatrix}$.

- 1) 当 a 取哪些值时, A 的列向量组能唯一地线性表出 β ;
- 2) 当 a 取何值时, $AX = \beta$ 有无穷多解, 将此时的解集合用向量表示;
- 3) 将矩阵 A 写成 BC 的形式, 其中 B 是对角元都为 1 的下三角矩阵, C 是上三角矩阵;
- 4) 求 A 第 1 行上 4 个元素的余子式的和.

二. (12 分) 已知向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 能线性表出向量组 β_1, \dots, β_m , 且两向量组的秩相等. 证明: β_1, \dots, β_m 也能线性表出 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. (每一步要有依据)

三. (12 分) 计算 n 阶行列式 $A_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{vmatrix}$.

四. (12 分) 现有若干有理数排成一个圆圈. 规定一次操作为: 将任意相邻的两个有理数都加上同一个有理数, 其余各数不变. 下图是两次操作的示意图, 将圆圈上的三个数变为了相同的数.



试用线性代数的理论解决以下问题：能否将 1, 2, 3, 5 这 4 个有理数以某种方式排列在圆圈上，使得通过若干次操作将这 4 个数变为相同的数？若可以，请画出最初的排列方式与具体的操作步骤；若不能，请说明理由。

五. (20 分) 已知列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5 \in \mathbb{R}^4$ 的秩为 3, 且

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_5 = -\alpha_3 + \alpha_4.$$

- 1) 写出矩阵 $A = [\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_5]$ 的行简化阶梯型;
- 2) 写出 A 的一个列极大无关组;
- 3) 求 A 行空间的一组基; 若已知向量 $\beta = [1 \ 1 \ a \ a \ b]$ 属于 A 的行空间, 写出 β 在此基下的坐标及 a, b 的值;
- 4) 求线性方程组 $AX = \alpha_4 + \alpha_5$ 的通解 (写成向量形式);
- 5) 求所有矩阵 B , 使得 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_4] B$.

六. (12 分) 已知线性方程组 I:
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

有解, 但在方程组 I 里添加方程 $c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = 0$

后又变得无解. 证明: 方程组 I 导出组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

的解都是方程 $c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = 0$ 的解.

七. (8 分) 设 A 是 n 级实矩阵且满足 $A^2 = 0$. 记 A 的列空间为 V_1 ,

A^T 的列空间为 V_2 , $AA^T + A^TA$ 的列空间为 V . 证明:

- 1) $V_1 \cap V_2 = \{0\}$;
- 2) $V_1 + V_2 = V$. (注: $V_1 + V_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$)