

同等学力申硕计算机综合真题重点拆解

目录

【离散数学-等价关系和偏序关系】-----	1
【离散数学-二元关系的运算与性质】-----	6
【离散数学-集合基础】-----	11
【离散数学-逻辑符号表达】-----	15
【离散数学-树】(树的性质、生成树)-----	20
【离散数学-图论】-----	27
【组合数学-鸽巢原理】-----	34
【组合数学-可重复组合】-----	39
【组合数学-母函数和广义牛顿二项式定理】-----	46
【组合数学-牛顿二项式定理】-----	54
【组合数学-排列与组合】-----	59
【组合数学-容斥原理和错排问题】-----	65
【组合数学-线性常系数递推关系】-----	70
【组合数学-指数型母函数】-----	75

【离散数学-等价关系和偏序关系】

一、知识框架：等价关系与偏序关系

1. 等价关系 (Equivalence Relation)

- 定义：集合 A 上的关系 R 满足：自反性 ($\forall x, \langle x, x \rangle \in R$)、**对称性** ($\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$)、**传递性** ($\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$)。
- 与划分的对应：等价关系与集合的划分一一对应。若 R 是 A 上的等价关系，则等价类 $[x]_R = \{y \mid \langle x, y \rangle \in R\}$ 构成 A 的划分；反之，任一划分 $\pi = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ 可诱导等价关系 $R = \bigcup_{i=1}^k S_i \times S_i$ 。

2. 偏序关系 (Partial Order)

- 定义：集合 A 上的关系 R 满足：自反性、**反对称性** ($\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow x = y$)、**传递性**。记为 $\leq$ ，称 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集。
- 哈斯图 (Hasse Diagram)：简化的关系图，省略自环和可由传递性推出的边，用顶点位置表示序（下方元素 $\leq$ 上方元素）。
- 特殊元素：
 - 极大元 / 极小元：不存在比其更大 / 小的元素；
 - 最大元 / 最小元：大于等于 / 小于等于所有元素（若存在则唯一）；
 - 最长链：偏序集中元素按 $\leq$ 排列的最长序列，长度为元素个数减 1。

二、真题详解：典型例题

【2023 年真题 · 等价关系证明】

题目:

设 R 是非空集合 A 上的二元关系, 满足:

(1) R 自反性; (2) 若 $\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle \in R$, 则 $\langle b, c \rangle \in R$ 。
证明 R 是等价关系。

解析:

- 只需再证明 R 满足对称和传递性, 就可以证明 R 是等价关系:
- 对称性: 对任意 $\langle a, b \rangle \in R$, 由自反性知 $\langle a, a \rangle \in R$ 。根据条件 (2), $\langle a, b \rangle, \langle a, a \rangle \in R \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$, 故 R 有对称性。
- 传递性: 对任意 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \in R$, 由对称性得 $\langle b, a \rangle \in R$ 。结合 $\langle b, c \rangle \in R$, 根据条件 (2), $\langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle \in R \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$, 故 R 有传递性。
- 综上, R 是等价关系。

【2022 年真题 · 幂集上的等价关系】

题目:

设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, $P(A)$ 上的关系 R 定义为: $\langle S, T \rangle \in R \Leftrightarrow S \cup B = T \cup B$ 。

判断 R 是否为等价关系, 并求商集 $P(A)/R$ 。

解析:

(1) 等价性判定:

- 自反性: $S \cup B = S \cup B \Rightarrow \langle S, S \rangle \in R$;
- 对称性: $S \cup B = T \cup B \Rightarrow T \cup B = S \cup B \Rightarrow \langle T, S \rangle \in R$;
- 传递性: 若 $S \cup B = T \cup B$ 且 $T \cup B = W \cup B$, 则 $S \cup B = W \cup B \Rightarrow \langle S, W \rangle \in R$ 。
- 故 R 是等价关系。

(2) 商集计算: 等价类由 $S \cup B$ 划分:

- $S \cup B = \{1, 2\}$ 时, $S \in \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$;
- $S \cup B = \{1, 2, 3\}$ 时, $S \in \{\{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ 。
- 商集: $P(A)/R = \{\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}, \{\{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}\}$ 。

【2019 年真题 · 划分与等价关系】

题目:

集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 的划分 $R = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, \{6, 7\}\}$, 求对应的等价关系含有的有序对个数。

解析:

- 等价关系由划分中每个子集的笛卡尔积并集构成:
- $\{1, 2\} \times \{1, 2\}$ 含 $2 \times 2 = 4$ 个有序对;
- $\{3, 4, 5\} \times \{3, 4, 5\}$ 含 $3 \times 3 = 9$ 个有序对;
- $\{6, 7\} \times \{6, 7\}$ 含 $2 \times 2 = 4$ 个有序对。
- 总计: $4 + 9 + 4 = 17$ 个。

【2021 年真题 · 既是等价又是偏序的关系】

题目:

给出 A 上既是等价关系又是偏序关系的例子, 并说明特点。

解析:

- 例子: 恒等关系 $R = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$ 。
- 特点:
- 等价性: 满足自反 ($\langle x, x \rangle \in R$)、对称 ($\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow x = y \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$)、传递 ($\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow x = y = z \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$);
- 偏序性: 满足自反、反对称 ($\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow x = y$)、传递。
- 本质: 仅含自环, 无任何不同元素间的关系。

三、避坑指南: 高频易错点

1. 等价关系与划分的对应误区

- 错误: 认为 “任意关系的等价类都构成划分”, 实际只有等价关系的等价类才满足互斥且覆盖全集。
- 示例: 若 $A = \{1, 2, 3\}$, 关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$ 不是等价关系 (不对称), 其 “等价类” $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$ 虽为划分, 但 R 不对应此划分。

2. 偏序与等价的互斥性误解

- 错误：认为“一个关系不能既是等价又是偏序”，实际 **恒等关系** 是唯一例外（对称与反对称同时成立仅当无不同元素关系）。

3. 哈斯图绘制错误

- 错误：保留自环或传递推出的边（如 $a \leq b$ 且 $b \leq c$ 时画 $a \leq c$ ），正确做法是省略自环和冗余边，仅保留直接序关系。

四、 计算机中的应用场景

1. 数据库中的等价类划分

- 聚类算法（如 K-Means）将相似数据划分为等价类，本质是构建等价关系（相似性满足自反、对称、传递）。

2. 任务调度中的偏序关系

- 任务间的依赖关系（如“任务 A 完成后才能执行任务 B”）构成偏序，哈斯图可直观展示执行顺序，最长链长度对应最短完成时间。

3. 编译原理中的语法分析

- 语法规则的优先级关系是偏序，通过哈斯图可确定运算符的结合性和优先级，避免二义性。

五、 备考策略

1. 核心考点清单

- 等价关系的证明（自反、对称、传递性验证）；
- 划分与等价关系的转换（计算有序对个数、商集）；
- 偏序集的哈斯图绘制与最长链分析；

- 特殊关系（恒等关系的双重性质）。

2. 解题技巧

- 等价关系有序对个数：对划分 $\{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ ，总个数为 $\sum_{i=1}^k |S_i|^2$ ；
- 最长链长度：哈斯图中从最小元到最大元的最长路径上的元素个数减1。

等价关系与偏序关系是集合论的核心工具，从数据聚类到任务调度均有广泛应用。掌握其定义与转换规律，不仅能高效突破考试，更能提升对复杂关系的建模能力。

【离散数学-二元关系的运算与性质】

一、知识框架：二元关系的运算与性质

1. 二元关系的基本运算

- **复合运算**：设 R 是 $A \rightarrow B$ 的关系， S 是 $B \rightarrow C$ 的关系，则 $S \circ R = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in B, \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S\}$ 。
➤ 例： $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}$ ， $S = \{\langle b, d \rangle, \langle c, e \rangle\}$ ，则 $S \circ R = \{\langle a, d \rangle, \langle b, e \rangle\}$ 。
- **幂运算**： $R^0 = I_A$ （恒等关系）， $R^{n+1} = R^n \circ R$ 。
- **逆关系**： $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}$ ，对称关系满足 $R = R^{-1}$ 。

2. 关系的四大性质判定

性质	定义核心	关系矩阵特征	关系图特征
自反性	$\forall x, \langle x, x \rangle \in R$	主对角线全为 1	每个顶点有自环
反自反性	$\forall x, \langle x, x \rangle \notin R$	主对角线全为 0	每个顶点无自环
对称性	若 $\langle x, y \rangle \in R$ ， 则 $\langle y, x \rangle \in R$	矩阵对称 $M = M^T$	若有 $(x \rightarrow y)$ ， 则有 $(y \rightarrow x)$
反对称性	若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $x \neq y$ ，则 $\langle y, x \rangle \notin R$	非主对角线 $r_{ij} \cdot r_{ji} = 0$	若有 $x \rightarrow y$ ($x \neq y$)，则无 $y \rightarrow x$
传递性	若 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ ， 则 $\langle x, z \rangle \in R$	若 M^2 有 1， 则 M 对应位置必为 1	若有 $(x \rightarrow y \rightarrow z)$ ，则有 $(x \rightarrow z)$

二、真题详解：典型例题

【2019 年真题】

题目：

设 $A=\{a, b, c, d\}$, $R_1=\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}$, $R_2=\{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, b \rangle\}$, 求 R_2^2 和 $R_2 \circ R_1$ 。

解析：

● 幂运算 $R_2^2 = R_2 \circ R_2$ ：

- 找中间元素 y 使得 $\langle x, y \rangle \in R_2$ 且 $\langle y, z \rangle \in R_2$ ：
- $\langle a, b \rangle \in R_2$ 且 $\langle b, c \rangle \in R_2 \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R_2^2$ ；
- $\langle b, c \rangle \in R_2$ 且 $\langle c, d \rangle \in R_2 \Rightarrow \langle b, d \rangle \in R_2^2$ ；
- $\langle c, d \rangle \in R_2$ 且 $\langle d, b \rangle \in R_2 \Rightarrow \langle c, b \rangle \in R_2^2$ ；
- $\langle d, b \rangle \in R_2$ 且 $\langle b, c \rangle \in R_2 \Rightarrow \langle d, c \rangle \in R_2^2$ ；
- 故 $R_2^2 = \{\langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle\}$ 。

● 复合运算 $R_2 \circ R_1$ (注意顺序：先 R_1 后 R_2)：

- 找中间元素 y 使得 $\langle x, y \rangle \in R_1$ 且 $\langle y, z \rangle \in R_2$ ：
- $\langle a, b \rangle \in R_1$ 且 $\langle b, c \rangle \in R_2 \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R_2 \circ R_1$ ；
- $\langle a, a \rangle \in R_1$ 且 $\langle a, b \rangle \in R_2 \Rightarrow \langle a, b \rangle \in R_2 \circ R_1$ ；
- $\langle b, c \rangle \in R_1$ 且 $\langle c, d \rangle \in R_2 \Rightarrow \langle b, d \rangle \in R_2 \circ R_1$ ；
- 故 $R_2 \circ R_1 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle\}$ 。

【2018 年真题】

题目：

对非空集合 A 上的关系 R ，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。

解析：

- 反证法：假设 R 不是反对称的，则存在 $a \neq b$ 使得 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, a \rangle \in R$ 。
- 由传递性： $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, a \rangle \in R \Rightarrow \langle a, a \rangle \in R$ ，与 R 非自反 ($\langle a, a \rangle \notin R$) 矛盾。
- 故假设不成立， R 必为反对称。

【2021 年真题】

题目：

设 P 是所有人的集合， R 和 S 是集合 P 上的关系， $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \text{ 是 } y \text{ 的父亲}\}$ ， $S = \{\langle x, y \rangle \mid x \text{ 是 } y \text{ 的母亲}\}$ ， $(\forall x, \forall y \in P)$ ，当关系 Q 为_____时， xQy 表示 x 是 y 的妻子。注：用 $R_1 \circ R_2$ 表示关系 R_1 与 R_2 的复合。

解析：

- 设 z 是 x 的子女，记作 $R^{-1} = \{\langle z, y \rangle \mid z \text{ 是 } y \text{ 的子女}\}$ ， $S = \{\langle x, z \rangle \mid x \text{ 是 } z \text{ 的母亲}\}$ 。
- 根据复合关系： $x \rightarrow z \rightarrow y$ 得 $Q = S \circ R^{-1}$ ，即为所求。

三、避坑指南：三大典型错误

1. 复合运算顺序混淆

- 错误：将 $R_2 \circ R_1$ 理解为“先 R_2 后 R_1 ”，实际应为“先 R_1 后 R_2 ”（对应

关系矩阵乘法 $M_{R_1} \times M_{R_2}$ 。

- 口诀：“右复合左，矩阵左乘右”。

2. 传递性判定遗漏

- 错误：认为“没有 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$ 时传递性不成立”，实际传递性是“若有则必满足”，空关系也传递。

3. 对称与反对称互斥误解

- 错误：认为一个关系不能同时对称和反对称，实际 恒等关系 I_A 既对称 ($\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$) 又反对称 ($\langle x, y \rangle \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow x = y$)。

四、计算机中的关系应用

1. 数据库中的关系模型

- 表之间的外键关联本质是二元关系，复合运算对应多表连接查询：

-- 查询“学生→课程→教师”的关联（复合关系）

SELECT 学生.姓名, 教师.姓名

FROM 学生

JOIN 选课 ON 学生.学号 = 选课.学号

JOIN 课程 ON 选课.课程号 = 课程.课程号

JOIN 教师 ON 课程.教师号 = 教师.教师号;

2. 图论中的路径表示

- 关系 R 表示图的边，则 R^n 表示“长度为 n 的路径”，如社交网络中“好友的

好友 ” 对应 R^2 。

3. 算法中的等价类划分

- 并查集 (Union-Find) 通过传递闭包维护等价关系, 用于连通分量查询, 时间复杂度接近 $O(1)$ 。

五、备考策略

1. 高频考点清单

- 关系复合与幂运算 (结合矩阵乘法);
- 四大性质的判定与证明 (反证法常用);
- 闭包计算 (自反闭包 $r(R) = R \cup I_A$, 对称闭包 $s(R) = R \cup R^{-1}$)。

2. 记忆技巧

- 性质判定口诀: “自反对角全 1, 对称矩阵对称, 传递若有 $x \rightarrow y \rightarrow z$ 则 $x \rightarrow z$ ”。

二元关系是离散数学的核心工具, 从集合论到数据库设计均有广泛应用。掌握其运算规律与性质, 不仅能轻松应对考试, 更能提升对复杂关联问题的建模能力。

【离散数学-集合基础】

引言

在同等学力申硕-计算机科学与技术考试中，离散数学是核心科目之一，而集合论作为其基础模块，几乎每年都会以直接或间接的形式出现在真题中。

集合基础的核心考点包括子集数量计算、集合运算、幂集性质等。

一、知识框架：集合基础的核心体系

集合论是研究“对象集合”及其关系的数学分支，其核心知识点可归纳为以下三部分：

模块	核心内容
集合定义	集合的无序性、互异性、确定性；元素与集合的关系 ($\in/\notin$)；空集 ($\emptyset$) 的特殊性。
子集与幂集	子集数量公式 (2^n)；奇数子集数量 (2^{n-1})；幂集 ($P(A)$) 的定义与性质。
集合运算	并集 ($\cup$)、交集 ($\cap$)、差集 ($-$)、对称差集 ($\oplus$)；运算律（交换律、结合律）。

二、真题详解：典型例题

【2020 年真题】

题目：

设集合 A 有 50 个元素，则 A 的子集总数为_____个，其中奇数个元素的子集有_____个。

解析：

- 子集总数公式：
对于 n 个元素的集合 A ，其子集总数为 2^n 。因此， A 的子集总数为 2^{50} 。
- 奇数子集数量：
所有子集中，奇数元素的子集数量等于偶数元素的子集数量，即 $\frac{2^{50}}{2} = 2^{49}$ 。
- 公式：
子集总数： $|P(A)| = 2^{|A|}$
奇数子集数量： $\sum_{k=0}^n \binom{n}{2k+1} = 2^{n-1}$

【2013 年真题】

题目：

设集合 A 有 100 个元素，则 A 有 _____ 个子集。其中有 _____ 个子集其元素个数为奇数。

解析：

- 子集总数： 2^{100} 。
- 奇数子集数量：同上题，结果为 2^{99} 。
- 易错点提示：
子集数量计算时需注意指数的基数（元素个数），而非集合本身。 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$
奇数子集数量： $\sum_{k=0}^n \binom{n}{2k+1} = 2^{n-1}$

【2018 年真题】

题目：

设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ，计算以下集合运算：

1. $\emptyset - A = ?$
2. $A - P(\emptyset) = ?$
3. $P(A) - \{\emptyset\} = ?$
4. $P(A) \oplus A = ?$

解析：

- 差集运算：
 - $\emptyset - A = \emptyset$ （差集为空集）。
 - $A - P(\emptyset)$ ： $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ ，因此 $A - P(\emptyset) = \{\{\emptyset\}\}$ 。
- 幂集运算：

- $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$
- $P(A) - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$
- 对称差集运算：
 - $P(A) \oplus A = (P(A) - A) \cup (A - P(A)) = \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$
- 公式：
 - 差集： $A - B = \{x \in A \mid x \notin B\}$
 - 对称差集： $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$

三、易错点分析：常见陷阱与避坑指南

1. 子集数量计算误区：
 - 错误示例：认为集合 A 的子集数量为 $n!$ 。
 - 正确公式：子集数量为 2^n ，与排列无关。
2. 幂集与集合的混淆：
 - 错误示例：将幂集 $P(A)$ 误认为是集合 A 的元素。
 - 正确理解： $P(A)$ 是 A 的所有子集组成的集合，其元素是集合而非单个对象。
3. 差集与对称差集的混淆：
 - 差集： $A - B$ 是 A 中不在 B 中的元素。
 - 对称差集： $A \oplus B$ 是 A 和 B 中不共享的元素。

四、扩展应用：集合论的现实价值

集合论不仅是数学工具，更是计算机科学的核心基础：

1. 数据库设计：
 - SQL 中的 UNION（并集）、INTERSECT（交集）、EXCEPT（差集）直接对应集合运算。
 - 例如：例如： `SELECT * FROM A UNION SELECT * FROM B` 等价于 $A \cup B$ 。
2. 编程中的集合处理：
 - Python 的 `set` 类型支持集合运算：

```
A = {1, 2, 3}
B = {2, 3, 4}

print(A.union(B)) # 并集: {1, 2, 3, 4}
```

```
print(A.difference(B)) # 差集: {1}
```

3. 算法设计:

- 集合的并查集 (Union-Find) 结构用于动态连通性问题, 如社交网络好友推荐。

五、备考建议：从真题到实战的进阶策略

1. 真题训练:

- 分类整理: 将历年真题按模块 (子集、幂集、运算) 分类, 总结高频考点。
- 限时模拟: 每套真题限时 50 分钟完成, 强化解题速度与准确率。

2. 模拟题设计:

- 结合 2025 年热点 (如 AI 数据处理) 设计新题:

例题: 某 AI 模型需要从 1000 个特征中选择 500 个奇数特征的组合, 有多少种可能?

答案: 2^{999} (奇数特征的子集数量为 2^{1000-1})。

结语

集合论是离散数学的基石, 是同等学力申硕计算机统考-数学基础部分重点知识点, 掌握其核心规则不仅能应对考试, 更能提升逻辑思维与问题解决能力。

【离散数学-逻辑符号表达】

一、知识框架：逻辑符号的核心体系

逻辑符号是将自然语言转化为数学精确性的桥梁，其核心在于量词与谓词的组合。以下是关键知识点：

1. 命题联结词

联结词	符号	复合命题	命题符号化	命题符号读法
否定	$\neg$	P 的否定	$\neg P$	非 P
合取	$\wedge$	P 并且 Q	$P \wedge Q$	P 合取 Q
析取	$\vee$	P 或者 Q	$P \vee Q$	P 析取 Q
蕴含	$\rightarrow$	若 P，则 Q	$P \rightarrow Q$	P 蕴含 Q
等价	$\leftrightarrow$	P 当且仅当 Q	$P \leftrightarrow Q$	P 等价 Q

2. 量词系统

- **全称量词 ($\forall$)**：表示“所有”“任意”，如 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 表示“所有满足 P 的 x 都满足 Q”。
- **存在量词 ($\exists$)**：表示“存在至少一个”，如 $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$ 表示“存在某个 x 同时满足 P 和 Q”。
- **唯一性量词 ($\exists!$)**：表示“存在唯一”，如 $\exists! x (P(x))$ 可分解为 $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y=x))$ 。

3. 谓词与论域

- **谓词**是描述对象性质的函数，如 $P(x)$ 表示“x 是偶数”。
- **论域 (个体域)** 决定了变量的取值范围，常用 D 表示，例如自然数集、实数集等。

4. 逻辑符号化示例

- 没有人登上过火星；
 - 令 $H(x)$: x 是人, $M(x)$: x 登上过火星.
 - 则命题符号化为 $\neg(\exists x)(H(x) \wedge M(x))$ 或 $(\forall x)(H(x) \rightarrow \neg M(x))$
- 在中国留学的学生未必都是非洲人；
 - 令 $A(x)$: x 是非洲人, $H(x)$: x 是在中国留学的学生.
 - 则命题符号化为 $\neg(\forall x)(H(x) \rightarrow A(x))$ 或 $(\exists x)(H(x) \wedge \neg A(x))$
- 尽管有人很聪明, 但未必所有人都聪明；
 - 令 $M(x)$: x 是人; $C(x)$: x 很聪明.
 - 则命题符号化为 $(\exists x)(M(x) \wedge C(x)) \wedge \neg(\forall x)(M(x) \rightarrow C(x))$

二、真题详解：典型例题

以下是近五年真题中逻辑符号表达的典型题目及解析：

【2019 年真题】

(1) 过平面上的两个点, 有且只有一条直线通过。

解析：

- 设 $P(x)$ 表示 “ x 是平面上的点”, $L(y)$ 表示 “ y 是直线”, $T(y, x)$ 表示 “直线 y 通过点 x ”。
- 命题可分解为：对于任意两个不同的点 x 和 z , 存在唯一的直线 y , 使得 y 同时通过 x 和 z 。
- 符号化: $(\forall x)(\forall z)((P(x) \wedge P(z) \wedge (x \neq z)) \rightarrow (\exists! y)(L(y) \wedge T(y, x) \wedge T(y, z)))$

(2) 并不是所有的士兵都想当将军, 而且不想当将军的士兵未必不是好士兵。

解析：

- 设 $S(x)$ 表示 “ x 是士兵”, $G(x)$ 表示 “ x 想当将军”, $B(x)$ 表示 “ x 是好士兵”。
- 第一部分 “并非所有士兵都想当将军” 即存在士兵不想当将军: $\exists x(S(x) \wedge \neg G(x))$
- 第二部分 “不想当将军的士兵未必不是好士兵” 即存在不想当将军的士兵是好士兵: $\exists x(S(x) \wedge \neg G(x) \wedge B(x))$
- 符号化: $\exists x(S(x) \wedge \neg G(x)) \wedge \exists x(S(x) \wedge \neg G(x) \wedge B(x))$

【2023 年真题】

(1) 每个人的指纹都不相似。

解析：

- 设 $H(x)$ 表示“ x 是人”， $F(x, y)$ 表示“ x 的指纹与 y 的指纹相似”。
- 命题等价于“对于任意两个人 x 和 y ，若 $x \neq y$ ，则 x 和 y 的指纹不相似”：
- 符号化： $(\forall x)(\forall y)((H(x) \wedge H(y) \wedge (x \neq y)) \rightarrow \neg F(x, y))$

(2) 自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

解析：

- 设 x 是自然数， $F(x)$: x 是奇数， $G(x)$: x 是偶数， $H(x)$: x 能被 2 整除。
- 命题等价于“任意自然数 x ， x 要么是奇数，要么是偶数；并且如果 x 是奇数，则 x 不能被 2 整除。”：
- 符号化： $(\forall x)((F(x) \vee G(x)) \wedge (F(x) \rightarrow \neg H(x)))$

【2018 年真题】

(1) 集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素。

解析：

- 设 $F(x)$: x 是集合 A 中的， $G(x)$: x 是 A 的元素。
- 命题等价于“所有的元素 x ，如果它是集合 A 中的，那么它都是 A 的元素”：
- 符号化： $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$

(2) 天下没有长相完全一样的两个人。

解析：

- 设 $F(x, y)$: $x \neq y$ ， $G(x, y)$: x 跟 y 长相完全一样
- 命题等价于“对于所有的个体 x 和个体 y ，如果 x 不等于 y ，那么 x 和 y 的长相不是完全一样的。”：
- 符号化： $\neg (\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow \neg G(x, y))$

三、易错点分析：常见陷阱与避坑指南

1. 量词顺序的重要性

- 错误示例: $(\exists x)(\forall y) (F(x, y))$ 表示“存在某个 x , 对所有 y 都有 $F(x, y)$ ”, 而 $(\forall y)(\exists x) (F(x, y))$ 表示“对每个 y , 存在某个 x 有 $F(x, y)$ ”。两者含义完全不同。
 - 真题陷阱: 2021 年真题“任何计算设备都可以求解某个问题”需正确表达为 $(\forall x)(\exists y) (R(x) \rightarrow T(x, y))$, 而非 $(\exists y)(\forall x) (R(x) \rightarrow T(x, y))$ 。
2. 否定的转换规则
- 全称命题的否定是存在命题: $\neg(\forall x) (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv (\exists x) (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 。
 - 存在命题的否定是全称命题: $\neg(\exists x) (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x) (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ 。
 - 真题应用: 2020 年“确诊者并不都有症状”即 $\neg(\forall x) (P(x) \rightarrow Q(x))$, 等价于 $(\exists x) (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 。
3. 唯一性的表达
- 错误示例: 直接使用 $\exists x (P(x))$ 无法体现唯一性, 需结合全称量词: $(\exists x)(P(x) \wedge \forall y(P(y) \rightarrow (y=x)))$

四、扩展应用：逻辑符号的现实价值

1. 计算机科学中的应用
- 数据库查询: SQL 语句中的 WHERE 子句本质是逻辑表达式, 如 “SELECT * FROM users WHERE age > 18 AND gender = 'female'” 对应 $(\exists x) (User(x) \wedge Age(x) > 18 \wedge Gender(x) = female)$ 。
 - 程序逻辑: 条件语句 “if (A && B) {C;}” 等价于 $(A \wedge B) \rightarrow C$, 而循环条件 “while (A || B)” 对应 $A \vee B$ 的持续判断。
2. 数学证明中的应用
- 定理符号化: “素数有无穷多个” 可表示为 $(\forall x)(\exists y) (Prime(y) \wedge y > x)$, 其中 $Prime(y)$ 表示 “ y 是素数”。
 - 反证法结构: 假设 $\neg P$, 推导出矛盾 $Q \wedge \neg Q$, 从而证明 P , 符号化为 $\neg P \rightarrow (Q \wedge \neg Q) \vdash P$ 。
3. 法律与医疗领域的形式化
- 合同条款: “甲方应于收到货物后 30 日内付款” 可写作 $(\forall x) (Receive(x) \wedge Days(x) \leq 30 \rightarrow Obligation(x))$ 。
 - 医疗诊断: “发热且白细胞升高可能是感染” 可表示为 $(\exists x) (Fever(x) \wedge WBC(x) \rightarrow Infection(x))$, 结合概率逻辑可进一步量化。

五、备考建议：从真题到实战的进阶策略

1. 真题训练

- 分类整理历年真题，重点掌握量词嵌套、否定转换、唯一性表达等高频考点。例如：

- 2019 年“有且只有一条直线”需结合 $\exists!$ 与 $\forall$ 的组合。
- 2023 年“指纹不相似”需正确使用 $\forall$ 与 $\neg$ 的嵌套。

2. 模拟题设计

- 结合 2025 年热门事件（如人工智能伦理、量子计算）设计新题，例如：

- “所有自动驾驶汽车必须通过至少一项安全认证”符号化为： $(\forall x) (Car(x) \rightarrow (\exists y) (Certification(y) \wedge Pass(x, y)))$ 。
- “存在量子算法能在多项式时间内解决 NP 难问题”符号化为： $(\exists x) (Algorithm(x) \wedge Quantum(x) \wedge Solve(x, NP-hard) \wedge Time(x) = poly(n))$ 。

3. 工具辅助学习

- 使用逻辑验证工具（如 Logika、Tarski's World）验证表达式的正确性。
- 参与在线逻辑挑战赛（如 TopCoder 逻辑部分）提升实战能力。

逻辑符号表达是同等学力申硕计算机统考-数学基础部分必考知识点，掌握其核心规则不仅能应对考试，更能提升逻辑思维与问题解决能力。

【离散数学-树】

（树的性质、生成树）

在同等学力申硕计算机专业的离散数学考试中，树是离散数学图论中的重要结构。本文聚焦树的性质和生成树两大核心模块，结合真题解析考点、提炼解题方法，帮助考生快速掌握树的高频考点。

一、树的性质

树的性质是图论的基础考点，核心围绕顶点数、边数、度数之间的关系展开，掌握这些性质可快速解决与树的结构相关的计算问题。

1.1 核心性质与公式

定义：树是无回路的连通无向图，满足以下核心性质：

- 边数与顶点数关系：若树有 n 个顶点，则边数 $m=n-1$ （最基础公式，几乎所有树的题目都会用到）。
- 握手定理结合：树的所有顶点度数之和为 $2m=2(n-1)$ （因无向图总度数为边数的 2 倍）。
- 叶子节点特性：树中度数为 1 的顶点（叶子）至少有 2 个。

1.2 真题解析：从度数计算到叶子节点数量

题型 1：用顶点数和平均度求树的顶点数

例题（2019 年真题）：

设树 T 的顶点集合为 $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, \dots, v_n\}$, T 的平均度为 $D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i$,

请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n 。

解析：

(1) 由平均度定义，总度数 $\sum d(v) = n \cdot D$ 。

(2) 树的边数 $m = n - 1$ ，结合握手定理：总度数 $= 2m = 2(n - 1)$ 。

(3) 联立得： $n \cdot D = 2(n - 1) \Rightarrow n = \frac{2}{2-D}$ 。

答案： 树 T 的顶点个数 $n = \frac{2}{2-D}$ 。

题型 2：已知顶点度数求叶子节点数量

例题（2023 年真题）：

一棵有 13 个顶点的树，顶点度数只能是 1、2、5，且有 3 个度为 2 的顶点，求叶子节点个数。

解析：

(1) 设叶子节点（度为 1）有 x 个，则度为 5 的顶点数为 $13 - 3 - x = 10 - x$ 。

(2) 总度数 $= 1 \cdot x + 2 \cdot 3 + 5 \cdot (10 - x) = x + 6 + 50 - 5x = 56 - 4x$ 。

(3) 树的边数 $m = 13 - 1 = 12$ ，总度数 $= 2m = 24$ 。

(4) 联立得 $56 - 4x = 24 \Rightarrow x = 8$ 。

答案： 叶子节点个数为 8 。

例题（网上题）：

树 T 有 2 个 2 度顶点，1 个 3 度顶点，3 个 4 度顶点，求 1 度顶点（叶子）数。

解析：

- (1) 设叶子数为 x ，总顶点数 $n = 2 + 1 + 3 + x = x + 6$ 。
- (2) 总度数 $= 1 \cdot x + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 = x + 4 + 3 + 12 = x + 19$ 。
- (3) 边数 $m = n - 1 = x + 5$ ，总度数 $= 2m = 2x + 10$ 。
- (4) 联立得 $x + 19 = 2x + 10 \Rightarrow x = 9$ 。

答案：叶子节点个数为 9 。

1.3 解题技巧总结

1. **总度数必为偶数**：树的总度数 $2(n - 1)$ 是偶数，若计算结果为奇数，说明顶点度数统计错误。
2. **通用叶子节点数量公式**：设非叶子节点度数分别为 $d_1, d_2, \dots, d_k$ ，则叶子数 $x = \sum(d_i - 2) + 2$ （推导自总度数公式）。
3. **边数与顶点数绑定**：看到“树”立即想到 $m = n - 1$ ，这是解题的“万能钥匙”。

二、生成树：连通图的极小连通子图

生成树是连通图的极小连通子图（含所有顶点，无回路），考点集中在生成树的计数和构造，核心方法是“破圈法”和“避圈法”。

2.1 核心概念与计数方法

- **生成树定义**：含图中所有顶点且边数为 $n - 1$ 的无回路子图（ n 为顶点数）。
- **计数方法**：

- **破圈法**：每次删除回路中的一条边，直到无回路，删除的边数为 $m - (n - 1)$ (m 为原图边数)。
- **避圈法**：每次添加不形成回路的边，直到边数为 $n - 1$ 。

2.2 真题解析：生成树数量计算


题型 1：含单一回路的图的生成树计数

例题（2012 年真题）：

设图 G 的顶点集合 $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ ，边集合为 $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_5v_6\}$ ，求不同生成树的棵数。

解析：

- (1) 顶点数 $n = 6$ ，生成树需 $6 - 1 = 5$ 条边。
- (2) 原图边数 $m = 6$ ，需删除 $6 - 5 = 1$ 条边。
- (3) 观察图形，回路为 $v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ （含 5 条边），删除回路中任意 1 条边均可形成生成树，共 5 种。



答案：不同生成树的棵数为 5。

题型 2：含多个回路的图的生成树计数

例题（2023 年真题）：

设图 G 的顶点集合 $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，边集合为 $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, v_1v_3\}$ ，求 G 的不同生成树的棵数。


解析：

(1) 顶点数 $n = 4$ ，生成树需 $4 - 1 = 3$ 条边，需删除 $5 - 3 = 2$ 条边。


(2) 观察图形，分两种情况：

➤ 删除对角线 v_1v_3 ：剩余回路为 $v_1v_2v_3v_4v_1$ (4 条边)，需再删除 1 条，共 4 种。

➤ 保留对角线 v_1v_3 ：需删除回路中 2 条边 (如 v_1v_2 和 v_3v_4)，共 2 种。



删除 $V1-V3$ 边时



保留 $V1-V3$ 边时

(3) 总生成树数 $= 4 + 2 = 6$ 。

答案：不同生成树的棵数为 6。

题型 3：完全图的生成树计数

例题（网上题）：

设 G 是 5 个顶点的完全图 K_5 ，求删除多少条边可以得到生成树。

解析：

(1) 完全图 K_5 的边数 $m = \binom{5}{2} = 10$ 。

(2) 生成树需要 $5 - 1 = 4$ 条边，需要删除 $10 - 4 = 6$ 条边。

答案：需要删除 6 条边得到生成树。

2.3 解题技巧总结

1. **生成树边数固定：**无论原图多复杂，生成树边数必为 $n - 1$ ，以此确定需删除或添加的边数。
2. **回路分析是关键：**若图中含 c 个回路，需删除的边数为 $m - (n - 1)$ ，每条回路至少删除 1 条边。
3. **对称图形用对称法：**如完全图、对称回路，利用对称性简化计数（如 2023 年真题中对角线的有无分类）。

三、高频考点对比与综合应用

模块	核心公式/性质	典型题型	易错点
树的性质	$m = n - 1$ ；总度数 $= 2(n - 1)$	叶子节点数计算、顶点数求解	忽略总度数为偶数的隐含条件
生成树	边数 $= n - 1$ ；删除边数 $= m - (n - 1)$	生成树计数、完全图生成树边数计算	漏算回路或重复计数

综合例题：一棵有 n 个顶点的树，其中度为 k 的顶点有 2 个，其余顶点度数均为 1，求 n 与 k 的关系。

解析：

- (1) 叶子节点数 $= n - 2$ ，总度数 $= 2k + 1 \cdot (n - 2)$ 。
- (2) 总度数 $= 2(n - 1)$ ，联立得 $2k + n - 2 = 2n - 2 \Rightarrow n = 2k$ 。

答案： $n = 2k$ 。

四、备考建议

1. **公式记忆：**牢牢掌握“树的边数= $n - 1$ ”和“总度数= $2(n - 1)$ ”，这是解决树的问题的基础。
2. **分类练习：**针对“叶子节点计算”、“生成树计数”等题型专项练习，熟练运用破圈法和度数关系。
3. **图形分析：**复杂图形先简化（如标记回路、对称结构），再按步骤计算，避免遗漏或重复。

通过以上拆解，相信考生能快速掌握树的核心考点，在考试中高效解题。建议结合真题多做练习，强化对性质和方法的应用能力！

【离散数学-图论】

（握手定理、欧拉公式）

在同等学力申硕计算机专业的离散数学考试中，图论也是高频考点，而握手定理和欧拉公式更是贯穿图论题型的核心工具。

本文将结合真题，系统拆解这两个定理的考点、解题技巧及常见陷阱，帮助考生快速掌握解题思路。

一、握手定理：图论的 "基本算术"

握手定理是图论中最基础的定理，几乎所有与顶点度数相关的题目都需要用到它。其核心思想源于 "无向图中边与顶点度数的守恒关系"，掌握它能快速解决度数计算、奇偶性判断等问题。

1.1 核心考点与公式

- **基本定理：**对任意无向图 $G = (V, E)$ ，所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍，即： $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$ （其中 $d(v)$ 表示顶点 v 的度数， $|E|$ 为边数）。
- **重要推论：**度数为奇数的顶点个数必为偶数（因左侧和为偶数，奇数个奇数相加为奇数，矛盾）。

1.2 真题解析：从基础计算到性质证明

题型 1：直接应用定理计算边数或度数

例题（2013 年真题）：

设 $G = (V, E)$ 是顶点集为 V 、边集为 E 的图，令 $D(G) = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} d(v)$ ，则用 $D(G)$ 和 $|V|$ 表示 $|E|$ 的表达式为_____。

解析： 根据握手定理，总度数 $\sum d(v) = 2|E|$ ，而 $D(G)$ 是平均度数，即 $\sum d(v) = |V| \cdot D(G)$ 。

联立得： $|V| \cdot D(G) = 2|E| \Rightarrow |E| = \frac{|V| \cdot D(G)}{2}$

答案： $|E| = \frac{|V| \cdot D(G)}{2}$

题型 2：利用推论判断顶点奇偶性

例题（2013 年真题）：

任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是_____。

解析：

直接应用推论，奇数度顶点个数必为偶数。

答案： 偶数

题型 3：结合树的性质证明

例题（2020 年真题）：

设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。

解析： 采用反证法：

1. 假设最长路长度 $l \leq k-1$ ，设这条路的起点为 v_0 ，则 v_0 的度数 $d(v_0) \geq k$ （因 k 是最小度数）。
2. 由于路长为 l ， v_0 最多与路上的 l 个顶点相邻，即最多连接 $l \leq k-1$ 个顶点。
3. 但 $d(v_0) \geq k$ ，故必存在一个与 v_0 相邻的顶点不在最长路上，可延长路长，与假设矛盾。因此最长路长度至少为 k 。

1.3 解题技巧总结

1. **总度数必为偶数**：若计算总度数为奇数，说明步骤有误（如漏算顶点或度数）。
2. **奇偶性优先判断**：遇到 "奇数度顶点个数" 类问题，直接用推论秒杀。
3. **结合其他性质**：树（边数 $m = n-1$ ）、正则图（各顶点度数相等）等场景中，需联立握手定理与图形特有性质。

二、欧拉公式：平面图 "守恒定律"

欧拉公式是平面图的核心定理，描述了顶点数、边数和面数的关系，常用于求解平面图的边数、面数，或证明图形非平面图。

2.1 核心考点与公式

- **基本公式：**对连通平面图 $G = (V, E)$ ，有： $v - e + f = 2$ （其中 $v = |V|$ 为顶点数， $e = |E|$ 为边数， f 为面数，包括外部无限面）。
- **扩展应用：**结合握手定理（面的度数之和为 $2e$ ，因每条边属于两个面），可推导边数上限：若每个面度数至少为 k （简单平面图 $k \geq 3$ ），则 $2e \geq kf \Rightarrow f \leq \frac{2e}{k}$ ，代入欧拉公式得 $e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$ 。

2.2 真题解析：从公式变形到综合应用

题型 1：直接求边数或面数

例题（2014/2022 年真题）：顶点 $n \geq 3$ 的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则此图的边数为_____。

解析：

1. 已知 $v = n$ ，每个面度数为 3，故面的总度数为 $3f = 2e \Rightarrow f = \frac{2e}{3}$ 。
2. 代入欧拉公式 $v - e + f = 2$ ： $n - e + \frac{2e}{3} = 2 \Rightarrow n - \frac{e}{3} = 2 \Rightarrow e = 3(n-2)$ 。

答案： $3n - 6$ 。

题型 2：结合对偶图性质

例题（2018 年真题）：若平面图 G 是自对偶的（与对偶图同构），则顶点数 n 与边数 m 满足的关系为_____。

解析：

1. 自对偶图中，顶点数 n 等于对偶图的面数，而对偶图的面数等于原图的顶点数 n ，故 $f = n$ 。
2. 代入欧拉公式 $n - m + n = 2 \Rightarrow m = 2n - 2$ 。

答案： $m = 2n - 2$

题型 3：证明非平面图

例题（拓展题）：证明 K_5 （5 个顶点的完全图）不是平面图。

解析：

1. K_5 中 $v = 5$ ， $e = 10$ （每对顶点连边）。
2. 若为平面图，每个面度数至少为 3，由 $e \leq 3(v-2) = 9$ （见 2.1 扩展公式）。
3. 但 $10 > 9$ ，矛盾，故非平面图。

2.3 解题技巧总结

1. **面数计算必含外部面**：平面图的面数包括最外侧的无限面，忽略会导致结果错误。
2. **公式变形记熟**：常用 $f = e - v + 2$ 和 $e = v + f - 2$ ，根据已知量选择合适形式。
3. **非平面图判定**：若边数超过 $3(v-2)$ （简单平面图上限），则必为非平面图。

三、高频考点对比与综合应用

定理	核心公式	适用场景	易错点
握手定理	$\sum d(v) = 2e$	所有图（无向）	忽略度数总和为偶数的隐含条件
欧拉公式	$v - e + f = 2$	连通平面图	忘记计算外部面

综合例题： 设连通平面图有 6 个顶点，每个顶点度数均为 3，求该图的面数。

解析：

- 1. 由握手定理：总度数 $6 \times 3 = 18 = 2e \Rightarrow e = 9$ 。
- 2. 代入欧拉公式： $6 - 9 + f = 2 \Rightarrow f = 5$ 。

答案： 5

四、备考建议

- 1. 定理本质理解：握手定理体现 "边与度数的守恒"，欧拉公式体现 "平面图的拓扑不变性"，不要死记公式。
- 2. 真题分类练习：按 "度数计算"" 奇偶性判断 ""边数 / 面数求解"" 非平面图证明 " 分类刷题，总结套路。

3. 综合题拆解：复杂题目可拆分为 "用握手定理求边数"→"用欧拉公式求面数" 等步骤，分步突破。

通过以上拆解，相信考生能快速掌握握手定理与欧拉公式的核心考点，在考试中应对自如。最后，建议结合真题反复练习，强化公式应用的熟练度！

【组合数学-鸽巢原理】

一、鸽巢原理核心知识点

鸽巢原理是组合数学中最基础且应用广泛的计数原理之一，核心思想是“若将更多的鸽子放入更少的鸽巢，则至少有一个鸽巢包含至少两只鸽子”。该原理看似简单，却能高效解决“存在性”问题，如“证明至少有两人生日相同”“确保某种排列或组合必然出现”等。在同等学力申硕计算机专业组合数学真题中，鸽巢原理的考察集中在“图论着色”“序列计数”“棋盘涂色”三类场景，解题逻辑高度统一。本文结合 2018-2023 年真题，从核心知识点、真题解析、解题思路总结三部分，系统拆解鸽巢原理的应用方法。

1. 基本定义与分类

鸽巢原理的本质是“数量关系的必然性”，根据鸽子与鸽巢的数量关系，可分为**基本形式**和**加强形式**，真题中以基本形式为主，加强形式偶有涉及。

(1) 基本形式（高频考点）

若将 $n+1$ 个元素（鸽子）放入 n 个集合（鸽巢）中，则至少存在一个集合，该集合中包含至少 2 个元素。

关键特征：仅需判断“存在性”，无需确定具体是哪个集合或包含多少个元素。

(2) 加强形式（低频考点）

若将 $kn+1$ 个元素放入 n 个集合中，则至少存在一个集合，该集合中包含至少 $k+1$ 个元素（ k 为正整数）。

示例：将 $3 \times 2 + 1 = 7$ 个元素放入 2 个集合，至少有一个集合含 4 个元素。

2. 核心解题步骤

真题中鸽巢原理的应用均遵循“三步法”，步骤固定且可复用：

- (1) 定义“鸽子”与“鸽巢”：明确待分配的“元素”（鸽子）和“分类标准”（鸽巢），这是解题的关键。例如：
 - 场景 1（棋盘涂色）：“鸽子”是棋盘的行数，“鸽巢”是每行的涂色方案数；
 - 场景 2（序列计数）：“鸽子”是序列的前缀和，“鸽巢”是前缀和的取值范围；

- 场景3（图论着色）：“鸽子”是顶点关联的边，“鸽巢”是边的颜色类别。
- (2) 计算鸽子与鸽巢的数量：分别统计“鸽子总数”和“鸽巢总数”，验证“鸽子数 > 鸽巢数”（基本形式）或“鸽子数 > $k \times$ 鸽巢数”（加强形式）；
- (3) 推导结论：根据鸽巢原理的形式，得出“至少存在一个鸽巢包含对应数量元素”的结论，若需证明具体数值（如“总和为39”），需进一步结合“补集”“等式变形”等辅助推导。

3. 高频应用场景

真题中鸽巢原理的考察场景高度集中，主要分为三类：

场景类型	鸽子定义	鸽巢定义	核心目标
图论着色	顶点关联的边数	边的颜色种类（如红、蓝）	证明存在顶点关联特定颜色边数
棋盘涂色	棋盘的行数	每行的涂色方案数	证明存在两行涂色方案相同
序列计数	序列的前缀和（或变形）	前缀和的可能取值范围	证明存在连续子序列总和为定值

二、真题详解：典型例题

【2018年真题】——完全图边着色问题

题目：设 K_9 是9个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给 K_9 的边任意着色。

- (1) 证明 K_9 中至少存在一个顶点 v ，使得 v 关联红边的个数不是3；
- (2) 证明必有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 。

解析：

- (1) 证明“存在顶点关联红边数 $\neq 3$ ”

步骤1：定义鸽子与鸽巢

- 完全图 K_9 的每个顶点关联 $9-1=8$ 条边（与其他8个顶点相连），即每个顶点的边数（鸽子）=8；
- 边的颜色分为红、蓝两类（鸽巢），设顶点 v 关联红边数为 r ，则蓝边数为 $8-r$ 。

步骤2：反证法结合鸽巢原理

假设所有顶点关联红边数均为3，则每个顶点的蓝边数为 $8-3=5$ 。

- 统计所有顶点关联的红边总数：9个顶点 $\times$ 3条红边=27，但每条红边被2个顶点共享，实际红边总数应为 $27/2=13.5$ ，这与“边数为整数”矛盾。
- 因此假设所有顶点关联红边数均为3不成立，证明至少存在一个顶点 v ，其关联红边数 $\neq 3$ 。

- (2) 证明“存在蓝色 K_4 或红色 K_3 ”

步骤 1: 定义鸽子与鸽巢

- 任取 K_9 的一个顶点 v , v 关联 8 条边 (鸽子);
- 边的颜色为红、蓝两类 (鸽巢), 根据鸽巢原理基本形式, 8 条边放入 2 个颜色类别, 至少有一类颜色的边数 $\geq [8/2]=4$ (即红边 ≥ 4 或蓝边 ≥ 4)。

步骤 2: 分情况讨论

● 情况 1: v 关联红边 ≥ 4

设这 4 条红边连接的顶点为 v_1, v_2, v_3, v_4 。若这 4 个顶点间存在一条红边 (如 v_1v_2), 则 v, v_1, v_2 构成红色 K_3 (3 个顶点间边均为红色); 若这 4 个顶点间无红边, 则所有边均为蓝色, 构成蓝色 K_4 (4 个顶点间边均为蓝色)。

● 情况 2: v 关联蓝边 ≥ 4

设这 4 条蓝边连接的顶点为 u_1, u_2, u_3, u_4 。若这 4 个顶点间存在一条蓝边 (如 u_1u_2), 则 v, u_1, u_2 构成蓝色 K_3 , 进一步可扩展为蓝色 K_4 ; 若这 4 个顶点间无蓝边, 则所有边均为红色, 构成红色 K_4 , 必然包含红色 K_3 。

综上, 无论哪种情况, 都必有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 。

【2023 年真题】——棋盘涂色问题

题目: 随意地把一种 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色, 求证: 必有两行方格的涂色是一样的。

解析:

步骤 1: 定义鸽子与鸽巢

- 鸽子: 9×3 棋盘的行数, 共 9 行, 即鸽子总数=9;
- 鸽巢: 每行 (1×3 方格) 的涂色方案数。由于每个方格有红、蓝 2 种选择, 3 个方格的涂色方案数为 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 种 (即鸽巢总数=8)。

步骤 2: 验证鸽子与鸽巢数量关系

鸽子数 (9) > 鸽巢数 (8), 满足鸽巢原理基本形式 ($n+1=9$ 个鸽子放入 $n=8$ 个鸽巢)。

步骤 3: 推导结论

根据鸽巢原理, 至少存在一个鸽巢 (即某一种涂色方案) 包含至少 2 个鸽子 (即至少 2 行), 因此必有两行方格的涂色是一样的。

【2020 年真题】——关系幂次问题

题目: 设 A 是包含 n 个元素的有限集, R 是 A 上的关系, 则必存在 s, t 使得 $R^s = R^t$ 并且 $0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$ 。

解析:

关联知识点-关系的幂次与数量限制:

- 恒等关系: $R = I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$, 称 R 为 A 上的恒等关系。
- 关系的幂运算: $R^0 = I_A$; $R^1 = R$; $R^{n+1} = R \circ R^n = R^{n+1} \circ R$

- **二元关系数量：**集合 A, B 有限时， A 与 B 的笛卡儿积， $A \times B$ 共有 $|A| \times |B|$ 个不同的元素，这些元素会产生 $2^{|A| \times |B|}$ 个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有 $2^{|A| \times |B|}$ 个。

步骤 1：定义鸽子与鸽巢

- **鸽子：**考虑关系的幂次序列 $R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}$ ，共 $2^{n^2} + 1$ 个元素（鸽子总数）。
- **鸽巢：** A 上的所有可能关系构成的集合（即 $A \times A$ 的所有子集），共 2^{n^2} 个（鸽巢总数）。

步骤 2：验证鸽子与鸽巢数量关系

鸽子数 $(2^{n^2} + 1) >$ 鸽巢数 (2^{n^2}) ，满足鸽巢原理基本形式 $(n+1)$ 个元素放入 n 个集合）。

步骤 3：推导结论

根据鸽巢原理，至少存在两个不同的幂次 s, t ($0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$)，使得这两个幂次对应的关系相等，即 $R^s = R^t$ 。

三、解题思路总结与高频考点

1. 核心规律提炼

从真题解析可发现，鸽巢原理的解题关键在于“鸽子与鸽巢的精准定义”，核心规律如下：

- **鸽子定义技巧：**若问题涉及“行数”“次数”“序列元素”，优先将其定义为“鸽子”（如棋盘的行数、前缀和序列）；
- **鸽巢定义技巧：**若问题涉及“分类”“方案”“取值范围”，优先将其定义为“鸽巢”（如涂色方案、颜色类别、整数取值范围）；
- **数量验证核心：**必须确保“鸽子数 $>$ 鸽巢数”，若直接验证不满足，可通过“构造扩展序列”（如前缀和+定值）增加鸽子数，或通过“细分分类标准”增加鸽巢数。

2. 高频考点与易错点提醒

- **反证法的应用：**在图论着色问题中（如 2018 年真题），常通过“假设结论不成立”推导矛盾（如边数非整数），需注意逻辑闭环；
- **前缀和的构造：**序列计数问题（如集训次数、做题数）必用“前缀和”，且需结合“单调性”（ S_i 严格递增）排除重复元素；

- **扩展序列的目的：**构造 $T_i = S_i + k$ (k 为目标总和) 是为了将“连续子序列总和= k ”转化为“ $S_k = S_j + k$ ”，本质是通过鸽巢原理找相等元素；
- **圆排列与鸽巢结合：**若问题涉及圆排列（如围桌就座），需先固定一个位置消除旋转重复，再定义鸽子与鸽巢（如 2021 年夫妻围桌真题的延伸）。

通过以上拆解可见，鸽巢原理的真题解法“场景化”明显，只要掌握“**鸽子-鸽巢定义→数量验证→结论推导**”的核心流程，结合三类高频场景的应对技巧，即可高效解决此类问题。

【组合数学-可重复组合】

一、知识框架：可重复组合的核心逻辑

可重复组合是组合数学中“元素选取与分配”的重要分支，核心解决“元素可重复选取”、“相同元素分配到不同容器”、“带限制条件的整数解”三类问题，需重点区分元素与容器的“相同/相异”属性，掌握固定模型与公式转换方法。

1. 可重复组合定义

- 从 k 种不同类型的元素中（每种元素可无限重复选取），选取 r 个元素的组合数，记为 $C(r+k-1, r)$ （或 $\binom{r+k-1}{r}$ ），也可等价表示为 $C(r+k-1, k-1)$ （组合数性质 $C(n, m)=C(n, n-m)$ ）。
- **适用场景：**相同元素分配到不同容器（如相同的球放入不同盒子）、无限制的元素选取（如选不同类型钢笔）、不定方程非负/整数解计数。

2. 关键模型分类

模型类型	核心特征	公式/方法	典型场景
相同元素→不同容器（允许空）	元素相同、容器不同，允许部分容器无元素	$C(r+k-1, r)$ （ r 为元素数， k 为容器数）	6 个相同球分给 3 个同学（允许没分到）
相同元素→不同容器（不允许空）	元素相同、容器不同，每个容器至少 1 个元素	先给每个容器分 1 个元素，转化为“允许空”模型，公式为 $C((r-k)+k-1, r-k)=C(r-1, k-1)$	4 个相同球分给 3 个盒子（每个盒子至少 1 个）
不同元素→不同容器（不允许空）	元素不同、容器不同，每个容器至少 1 个元素	先分组（按元素数分配模式，如 $(2, 1, 1)$ ），再排列（分配到不同容器），总方法数=分组数×容器排列数	4 个相异球放入 3 个相异盒子（无空盒）

不同元素→相同容器（不允许空）	元素不同、容器相同，每个容器至少 1 个元素	仅需分组（无需排列），按元素数分配模式计算组合数	6 个不同口罩放入 5 个相同盒子（无空盒）
不定方程非负/整数解	求 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r$ 的非负/正整数解	非负整数解： $C(r+k-1, r)$ ；正整数解： $C(r-1, k-1)$ （变量替换 $x_i' = x_i - 1$ ）	$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ ($x_1 \geq 3, x_2 \geq 1$ 等限制)

3. 特殊场景延伸

当问题涉及“独立选择”（如每本书选 2 位专家审阅），需用“分步乘法计数原理”，即每一步的选择数相乘，无需套用可重复组合公式，本质是“多独立事件的组合计数”。

二、真题详解：典型例题

【2012 年真题】——不同元素→不同容器（无空盒）

题目：把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？

解析：

- **题干分析：**元素（球）相异、容器（盒子）相异，要求“无空盒”，需先确定元素分配模式，再计算分组与排列数。
 - **关键判断：**4 个相异球分 3 个盒子（无空盒），仅有一种分配模式——(2, 1, 1)（一个盒子 2 个球，其余两个盒子各 1 个球），因球不同，分组需计算组合数；盒子不同，分组后需排列。。

● 解题步骤：

(1). 第一步：按 (2, 1, 1) 模式分组

从 4 个相异球中选 2 个组成一组，剩余 2 个球各为一组，分组数为 $C(4, 2)$

（选 2 个球的组合数）： $C(4, 2) = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$ 。

（无需额外除以 2!：因剩余 2 个球各为 1 个，无重复分组，若分配模式为 (3, 1) 或 (2, 2) 才需考虑重复分组的除法修正）

(2). 第二步：将分组分配到 3 个相异盒子

3 个不同的组分配到 3 个不同盒子，为全排列问题，排列数为 $3! = 6$ 。

(3). 第三步：计算总放法数

总方法数=分组数×排列数： $6 \times 6 = 36$ 。

【2013 年真题】——相同元素→不同容器（允许空）

题目：把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有____种不同的分法。

解析：

- 题干分析：元素（球）相同、容器（同学）不同，允许“空容器”，直接匹配“相同元素→不同容器（允许空）”模型，对应可重复组合公式 $C(r+k-1, r)$ 。
 - 模型转换：将“6 个相同球”视为 $r=6$ ，“3 个同学”视为 $k=3$ ，问题等价于“从 3 种容器中可重复选取 6 次，每次选 1 个容器放 1 个球”，即可重复组合计数。
- 解题步骤：
 - (1). 确定公式参数： $r=6$ （元素数）， $k=3$ （容器数），代入可重复组合公式 $C(r+k-1, r)$ ： $C(6+3-1, 6)=C(8, 6)$ 。
 - (2). 计算组合数：利用组合数性质 $C(n, m)=C(n, n-m)$ 简化计算
($C(8, 6)=C(8, 2)$)： $C(8, 2)=\frac{8!}{2!(8-2)!}=\frac{8 \times 7}{2 \times 1}=28$ 。

【2014 年真题】——带限制的不定方程整数解

题目：求满足条件 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20$ 整数解的个数，其中 $t_1 \geq 3$ ， $t_2 \geq 1$ ， $t_3 \geq 0$ ， $t_4 \geq 5$ 。

解析：

- 题干分析：求不定方程的“带下限限制”整数解，核心是通过“变量替换”将限制条件转化为“非负整数解”，再套用可重复组合公式。
 - 关键逻辑：若变量 $t_i \geq a_i$ （ a_i 为常数），令 $t_i' = t_i - a_i$ ，则 $t_i' \geq 0$ ，方程转化为 $t_1' + t_2' + t_3' + t_4' = 20 - (a_1 + a_2 + a_3 + a_4)$ ，此时可按“非负整数解”计数。
- 解题步骤：
 - (1). 变量替换消除下限
 - 令 $t_1' = t_1 - 3$ （因 $t_1 \geq 3$ ，故 $t_1' \geq 0$ ）；
 - 令 $t_2' = t_2 - 1$ （因 $t_2 \geq 1$ ，故 $t_2' \geq 0$ ）；
 - 令 $t_3' = t_3$ （因 $t_3 \geq 0$ ，无需替换）；
 - 令 $t_4' = t_4 - 5$ （因 $t_4 \geq 5$ ，故 $t_4' \geq 0$ ）。
 - (2). 转化为非负整数解方程
 - 原方程变为： $(t_1' + 3) + (t_2' + 1) + t_3' + (t_4' + 5) = 20$ ；
 - 化简得： $t_1' + t_2' + t_3' + t_4' = 20 - 9 = 11$ 。
 - (3). 套用可重复组合公式
 - 方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r$ 的非负整数解个数为 $C(r+k-1, r)$ ，此处 $r=11$ （右边常数）， $k=4$ （变量数）： $C(11+4-1, 11)=C(14, 11)=C(14, 3)$ ；
 - 计算得： $C(14, 3)=\frac{14!}{3!(14-3)!}=\frac{14 \times 13 \times 12}{3 \times 2 \times 1}=364$ 。

【2019 年真题】——无限制元素选取

题目：一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支。则小王选 5 支钢笔的方式有_____种。

解析：

- **题干分析：**“3 种不同钢笔”为 $k=3$ 种元素，“选 5 支”为 $r=5$ 个元素，每种钢笔数量足够（可视为无限重复），属于“无限制的可重复选取”，直接套用可重复组合公式。

● **解题步骤：**

(1). **确定公式参数：** $k=3$ （钢笔类型数）， $r=5$ （选取数量），公式为 $C(r+k-1, r)$ 。

(2). **计算组合数：** $C(5+3-1, 5)=C(7, 5)=C(7, 2)=\frac{7!}{2!(7-2)!}=\frac{7 \times 6}{2 \times 1}=21$ 。

【2021 年真题】——不同元素→相同容器（无空盒）

题目：把 6 个不同的口罩放到 5 个相同的盒子里，使得不出现空盒，有多少种不同的方法？

解析：

- **题干分析：**元素（口罩）相异、容器（盒子）相同，要求“无空盒”，核心是“分组”（无需排列，因盒子相同），分配模式唯一——(2, 1, 1, 1, 1)（5 个盒子无空盒，6 个口罩需有 1 个盒子放 2 个，其余 4 个盒子各放 1 个）。

● **解题步骤：**

(1). **确定分组模式：**6 个不同口罩分 5 个相同盒子（无空盒），仅有一种模式：1 组 2 个口罩，4 组 1 个口罩。

(2). **计算分组数：**从 6 个不同口罩中选 2 个组成一组，剩余 4 个口罩各为一组，组合数为 $C(6, 2)$ ：

$$C(6, 2)=\frac{6!}{2!(6-2)!}=\frac{6 \times 5}{2 \times 1}=15。$$

（无需乘以 5!：因盒子相同，分组后无需分配到不同盒子，若盒子相异则需乘 5!）

【2022 年真题】——独立选择的组合计数

题目：某出版公司聘请五位专家审阅 5 本不同的书，这五位专家都有资格审阅这 5 本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案？

解析：

- **题干分析：**每本书的审阅专家选择是“独立事件”，需分步计算每本书的选择数，再用“分步乘法计数原理”相乘，本质是“多独立组合事件的叠加”，无需套用可重复组合公式，需注意“每本书选择独立”的核心特征。
- **解题步骤：**
 - (1). **计算单本书的专家选择数：**从 5 位专家中选 2 位审阅 1 本书，组合数为 $C(5, 2) = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$ 。
 - (2). **计算 5 本书的总分配方案：**5 本书的选择相互独立，总方案数为每本书选择数的乘积： $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^5 = 100000$ 。

三、易错点分析：避开计数陷阱

1. 元素与容器“相同/相异”判断错误

- **错误示例：**2021 年真题“6 个不同口罩放 5 个相同盒子”，误将盒子视为相异，计算为 $C(6, 2) \times 5!$ （分组后乘排列数），得到 $15 \times 120 = 1800$ 的错误结果，忽略“盒子相同无需排列”的关键条件。
- **避坑指南：**解题第一步先明确“元素属性（相同/相异）”和“容器属性（相同/相异）”，对照表 1 确定模型：
 - 元素相同→容器不同：用可重复组合公式；
 - 元素不同→容器相同：仅分组（无排列）；
 - 元素不同→容器不同：分组+排列。

2. 不定方程限制条件转化错误

- **错误示例：**2014 年真题“ $t_1 \geq 3$ ”误替换为 $t_1' = t_1 - 2$ ，导致方程右边变为 $20 - 8 = 12$ ，最终计算 $C(12 + 4 - 1, 12) = C(15, 12) = 455$ 的错误结果。
- **避坑指南：**变量替换需严格遵循“ $t_i' = t_i - a_i$ ”（ a_i 为 t_i 的下限），确保 $t_i' \geq 0$ ，替换后重新整理方程，检查右边常数是否正确（如 2014 年 $3 + 1 + 0 + 5 = 9$ ， $20 - 9 = 11$ ，而非其他值）。

3. 可重复组合与独立选择混淆

- **错误示例：**2022 年真题“5 本书选 2 位专家”，误套用可重复组合公式 $C(5 + 5 - 1, 5)$ ，得到 $C(9, 5) = 126$ 的错误结果，忽略“每本书选择独立”的本质（并非“从 5 位专家中选 5 次 2 人组”）。

- **避坑指南：**若问题中“每个对象的选择相互独立”（如每本书选专家、每个球选盒子），用“分步乘法”；若“从一类元素中选多个元素”（如选钢笔、分相同球），用可重复组合公式，核心区分“独立事件”与“组合选取”。

四、扩展应用：从真题到实际场景

1. 计算机领域应用

- **资源分配：**服务器集群分配任务，若 10 个相同任务分配到 4 个不同服务器（允许某服务器无任务），方案数为 $C(10+4-1, 10)=C(13, 10)=286$ ；若要求每个服务器至少 1 个任务，方案数为 $C(10-1, 4-1)=C(9, 3)=84$ 。
- **密码学：**由 0-9 组成的 6 位密码（数字可重复），本质是“10 种元素选 6 个的可重复排列”，但若仅统计“包含 3 种数字的密码组合数”，需结合可重复组合与排列：先选 3 种数字（ $C(10, 3)$ ），再用可重复组合计算 6 位密码中 3 种数字的分配数（ $C(6+3-1, 3-1)=C(8, 2)$ ），最后乘排列数修正，总方案数为 $C(10, 3) \times C(8, 2) \times 3!$ （需根据实际限制调整）。

2. 生活场景应用

- **购物选择：**超市有 4 种零食，买 7 包零食（每种零食不限购），选择方式为 $C(7+4-1, 7)=C(10, 7)=120$ 种；若要求每种零食至少买 1 包，选择方式为 $C(7-1, 4-1)=C(6, 3)=20$ 种。
- **奖项分配：**15 个相同的奖品分给 6 个班级，若每个班级至少 2 个奖品，先给每个班级分 1 个（共 6 个），剩余 9 个奖品按“允许空”分配，方案数为 $C(9+6-1, 9)=C(14, 9)=2002$ 种。

五、备考建议：高效突破可重复组合

1. 真题分类训练：按模型刷题

模型类型	对应真题	解题关键
相同元素→不同容器 (允许空)	2013 年（6 球分 3 同学）、2019 年（选钢笔）	直接套用 $C(r+k-1, r)$

相同元素→不同容器 (不允许空)	$x_1 + x_2 + x_3 = 7$ 正整数解)	变量替换后套用 $C(r-1, k-1)$
不同元素→不同容器 (不允许空)	2012 年 (4 球分 3 盒子)	先分组 (算组合数), 再排列 (乘 $k!$)
不同元素→相同容器 (不允许空)	2021 年 (6 口罩分 5 盒子)	仅分组 (无排列), 确定唯一分配模式
不定方程非负/整数解	2014 年 ($t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20$)	变量替换消除下限, 转化为非负整数解
独立选择计数	2022 年 (5 本书选专家)	分步乘法, 每步计算独立组合数

2. 公式记忆技巧：联想“隔板法”

可重复组合公式 $C(r+k-1, r)$ 的本质是“隔板法”：将 r 个相同元素排成一列，需插入 $k-1$ 个隔板分成 k 组（允许空组），总共有 $r+(k-1)$ 个位置（ r 个元素+ $k-1$ 个隔板），选择 $k-1$ 个位置放隔板，即 $C(r+k-1, k-1)=C(r+k-1, r)$ ，通过“元素+隔板”的具象化联想，避免公式记忆混淆。

3. 模拟题实战：强化场景迁移

- **模拟题 1：**求方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ 的整数解个数，其中 $x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 3$, $x_3 \geq 1$, $x_4 \geq 0$ 。
- **解析：**变量替换为 $x_1' = x_1 - 2$, $x_2' = x_2 - 3$, $x_3' = x_3 - 1$ ，方程变为 $x_1' + x_2' + x_3' + x_4 = 15-6=9$ ，解数为 $C(9+4-1, 9)=C(12, 9)=220$ 。
- **模拟题 2：**把 5 个不同的文件放入 3 个相同的文件夹，要求无空文件夹，有多少种方法？
- **解析：**分配模式为 (3, 1, 1) 和 (2, 2, 1)，总方法数=两种模式的组合数之和：
 - (3, 1, 1)： $C(5, 3)=10$ ；
 - (2, 2, 1)： $\frac{C(5,2) \times C(3,2)}{2!} = 15$ （除以 $2!$ 是因两个“2 个文件”的组重复）；
 - 总方法数=10+15=25。

【组合数学-母函数和广义牛顿二项式定理】

一、知识框架：母函数与广义牛顿二项式定理的核心逻辑

母函数是连接“离散序列”与“多项式展开”的桥梁，而广义牛顿二项式定理是解决“分式型母函数展开”的关键工具，核心用于计算无穷级数展开中特定项的系数，覆盖“简单分式展开”、“复杂函数化简”两类核心场景。需重点掌握函数转换技巧与系数计算步骤，明确与标准牛顿二项式定理的区别与联系。

1. 母函数的定义

- 设序列 $\{a_n\}$ ($n=0, 1, 2, \dots$)，则称多项式 $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为该序列的普通母函数（简称母函数）。
- 核心作用：通过多项式展开，将序列的“计数问题”转化为“多项式系数计算问题”，尤其适用于无穷序列或带限制条件的计数场景。

2. 广义牛顿二项式定理（核心公式）

- 对任意实数 α 和 $|x|<1$ ，有： $\frac{1}{(1-x)^{\alpha}} = \sum_{n=0}^{\infty} C(\alpha+n-1, n)x^n$ 。
- 其中， $C(\alpha+n-1, n) = \frac{(\alpha+n-1)(\alpha+n-2)\cdots\alpha}{n!}$ 为广义组合数。
- 特殊情况：当 α 为正整数时，广义组合数退化为普通组合数，即 $C(n+k-1, k)$ （与可重复组合公式一致），这是连接“母函数”与“可重复组合”的关键纽带。

3. 常用母函数展开式（高频工具）

- 几何级数展开（泰勒展开式）： $\frac{1}{(1-x)} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$
（对应 $\alpha=1$ 的广义二项式展开）；

- 平方分式展开: $\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$ (对应 $\alpha=2$, 广义组合数 $C(n+1, n)=n+1$) ;
- 幂次替换展开: 若母函数为 $\frac{1}{(1-bx)^\alpha}$ (b 为常数), 可通过变量替换 $y=bx$ 转化为标准形式, 展开式为 $\frac{1}{(1-bx)^\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} C(\alpha+n-1, n)b^n x^n$.

4. 核心应用场景分类

应用类型	解题关键	公式/方法	典型场景
简单分式母函数展开	识别 α 和常数因子 b , 套用广义二项式定理	1. 确定母函数形式 $\frac{1}{(1-bx)^\alpha}$; 2. 计算广义组合数 $C(\alpha+n-1, n)$; 3. 乘以 b^n 得 x^n 系数	求 $\frac{1}{(1-2x)^2}$ 中 x^k 的系数
复杂函数化简展开	先通过代数变形 (因式分解、幂次合并) 将函数转化为“标准分式 $\times$ 单项式”形式, 再展开	1. 用泰勒展开化简多项式 (如 $1+x+x^2+x^3 = \frac{1-x^4}{1-x}$) ; 2. 合并同类项 (如 $(1-x)^{-m}(1-x)^{-n} = (1-x)^{-(m+n)}$) ; 3. 套用广义二项式定理	求 $(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+\cdots)^3$ 中 x^{14} 的系数
序列母函数反推	已知母函数表达式, 通过展开式系数确定序列 $\{a_n\}$	1. 将母函数化简为标准形式 (如 $\frac{1+x+x^2+x^3}{(1-x)}$) ; 2. 展开并合并同类项; 3. 提取 x^n 的系数即为 a_n 。	已知 $G(x) = \frac{1+x+x^2+x^3}{(1-x)}$, 求 a_3 及序列 $\{a_n\}$

二、真题详解：典型例题

【2014 年真题】——简单分式母函数展开（基础型）

题目: $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 $a_k =$ _____。

题干分析: 本题直接考查广义牛顿二项式定理的基础应用, 母函数为“平方分式+常数因子”形式, 需确定 $\alpha=2$ 和 $b=2$, 套用展开式计算系数。

解题步骤:

1. 识别标准形式:

母函数 $\frac{1}{(1-2x)^2}$ 对应 $\frac{1}{(1-bx)^\alpha}$, 其中 $\alpha=2$, $b=2$ 。

2. 套用广义二项式定理:

根据公式 $\frac{1}{(1-bx)^\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} C(\alpha+k-1, k)b^k x^k$, 代入 $\alpha=2$ 得:

$C(2+k-1, k) = C(k+1, k) = k+1$ (广义组合数退化为普通组合数, 因 $\alpha=2$ 是正整数)。

3. 计算系数 a_k :

系数为广义组合数乘以 b^k , 即 $a_k = C(k+1, k) \cdot 2^k = (k+1) \cdot 2^k$ 。

答案: $(k+1) \cdot 2^k$ 。

【2018 年真题】——复杂函数化简展开 (综合型)

题目: 将函数 $(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+x^4+\dots)^3$ 展开后 x^{14} 的系数是 _____。

题干分析: 本题需先通过代数变形将复杂函数化简为“标准分式 $\times$ 单项式”形式, 再结合广义二项式定理计算系数, 核心是“因式分解+幂次合并”的技巧应用。

解题步骤:

1. 化简多项式部分:

利用几何级数展开, $1+x+x^2+x^3 = \frac{1-x^4}{(1-x)}$ (因 $1-x^4 = (1-x)(1+x+x^2+x^3)$), 因此: $(1+x+x^2+x^3)^2 = \left(\frac{1-x^4}{(1-x)}\right)^2 = \frac{(1-x^4)^2}{(1-x)^2} = (1-2x^4 +$

$x^8)(1-x)^{-2}$ (注: 因最终求 x^{14} 的系数, x^8 及更高次项与后续展开式相乘后次数会超过 14, 可暂忽略, 简化为 $(1-x)^{-2}$ 。

2. 化简无穷级数部分:

$x^2+x^3+x^4+\dots = x^2(1+x+x^2+\dots) = x^2 \cdot \frac{1}{1-x}$ (提取公因子 x^2 , 剩余为几何级数), 因此: $(x^2+x^3+x^4+\dots)^3 = (x^2 \cdot \frac{1}{1-x})^3 = x^6 \cdot (1-x)^{-3}$ 。

3. 合并函数形式:

原函数化简为: $f(x) = (1-x)^{-2} \cdot x^6 \cdot (1-x)^{-3} = x^6 \cdot (1-x)^{-5}$ 。

4. 计算 x^{14} 的系数:

● 步骤 1: $x^6 \cdot (1-x)^{-5}$ 展开后, x^{14} 对应 $(1-x)^{-5}$ 中 $x^{14-6} = x^8$ 的系数;

● 步骤 2: 对 $(1-x)^{-5}$ 套用广义二项式定理: $\frac{1}{(1-x)^\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} C(\alpha+n-1, n)x^n$, $\alpha=5$ 和 $n=8$, x^8 的系数为 $C(5+8-1, 8) = C(12, 8)$;

● 步骤 3: 利用组合数性质 $C(n, k) = C(n, n-k)$, $C(12, 8) = C(12, 4) =$

$$\frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 495。$$

● 答案：495。

【2020 年真题】——幂次替换与系数计算（高频型）

题目：如果 $f(x) = \frac{1}{(1-3x)^2}$ ，求 x^4 的系数_____。

题干分析：本题为“平方分式+常数因子 3”的基础场景，需通过变量替换转化为标准形式，再结合广义二项式定理计算特定项系数。

解题步骤：

1. 确定标准形式参数：根据公式 $\frac{1}{(1-bx)^\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} C(\alpha+k-1, k)b^k x^k$

母函数 $\frac{1}{(1-3x)^2}$ 中， $\alpha=2$ ， $b=3$ ，目标项为 $k=4$ 。

2. 计算广义组合数：

对 $\alpha=2$ ， x^4 对应的广义组合数为 $C(2+4-1, 4)=C(5, 4)=5$ （或直接用 $k+1=5$ ，因 $\alpha=2$ 时 $C(k+1, k)=k+1$ ）。

3. 计算系数：

系数为广义组合数乘以 b^k ，即 $5 \cdot 3^4 = 5 \times 81 = 405$ 。

答案：405。

【2022 年真题】——母函数反推序列（拓展型）

题目：设序列 $\{a_n\}$ 的母函数是 $G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{(1-x)}$ ，求：(1) a_3 ；

(2) 序列 $\{a_n\}$ 。

题干分析：本题考查“已知母函数求序列”，需先将母函数化简为可展开的形式，再通过多项式乘法展开，提取对应项的系数。

解题步骤：

1. 化简母函数：

利用几何级数展开式 $\frac{1}{(1-x)} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$ ，原函数可写为：

$G(x) = (1 + x + x^2 + x^3) \cdot (1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots)$ 。

2. 多项式乘法展开：

按次数合并同类项，计算前几项系数：

- x^0 : $1 \times 1 = 1 \rightarrow a_0 = 1$;
- x^1 : $1 \times x + x \times 1 = 2x \rightarrow a_1 = 2$;
- x^2 : $1 \times x^2 + x \times x + x^2 \times 1 = 3x^2 \rightarrow a_2 = 3$;
- x^3 : $1 \times x^3 + x \times x^2 + x^2 \times x + x^3 \times 1 = 4x^3 \rightarrow a_3 = 4$;
- x^n ($n \geq 3$): $1 \times x^n + x \times x^{n-1} + x^2 \times x^{n-2} + x^3 \times x^{n-3} = 4x^n \rightarrow a_n = 4$
(因 $n \geq 3$ 时，更高次项无贡献，合并后系数恒为 4)。

3. 总结答案:

(1) $a_3=4$; (2) 序列 $\{a_n\}=\{1, 2, 3, 4, 4, \cdots, 4\}$ ($n \geq 3$ 时均为 4)。

三、易错点分析：避开母函数展开的常见陷阱

1. 广义组合数计算错误

- **错误示例：**计算 $\frac{1}{(1-x)^5}$ 中 x^8 的系数时，误将广义组合数算为 $C(5+8, 8)=C(13, 8)=1287$ ，忽略公式中“ $\alpha+n-1$ ”的“-1”，正确应为 $C(5+8-1, 8)=C(12, 8)=495$ 。
- **避坑指南：**牢记广义二项式定理 ($\frac{1}{(1-x)^\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} C(\alpha+n-1, n)x^n$) 中组合数的公式结构—— $C(\alpha+n-1, n)$ ，其中 α 是分母的幂次（如 $\frac{1}{(1-x)^\alpha}$ 中的 α ）， n 是目标项的次数，计算时需先确认 α 和 n ，再代入公式。

2. 复杂函数化简不彻底

- **错误示例：**处理 $(1+x+x^2+x^3)^2$ 时，未用几何级数展开（泰勒展开式）化简方法，直接展开为 $1+2x+3x^2+4x^3+3x^4+2x^5+x^6$ ，后续与 $(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 相乘时导致计算量激增，易漏项或算错次数。
- **避坑指南：**遇到“有限项多项式+无穷级数”的组合，优先用泰勒展开式化简有限项（如 $1+x+x^2+\cdots+x^m = \frac{1-x^{m+1}}{(1-x)}$ ），再合并分式的幂次（如 $(1-x)^{-a} \cdot (1-x)^{-b} = (1-x)^{-(a+b)}$ ），减少计算步骤。

3. 常数因子与幂次匹配错误

- **错误示例：**求 $\frac{1}{(1-2x)^2}$ 中 x^3 的系数时，误将“ 2^3 ”算为“ $2 \times 3=6$ ”，得到 $(3+1) \times 6=24$ 的错误结果，正确应为 $(3+1) \times 2^3=4 \times 8=32$ 。

- **避坑指南：**对 $\frac{1}{(1-bx)^a}$ 形式的母函数，系数计算需分两步：
 - 计算广义组合数 $C(a+n-1, n)$ ；
 - 乘以 b^n （而非 $b \times n$ ），确保常数因子的幂次与目标项次数一致。

四、扩展应用：从真题到实际场景

1. 计算机科学中的应用

- **递推关系求解：**已知序列的递推关系（如 $a_n = 2a_{n-1} + (n+1)$ ），可通过母函数法转化为分式方程，展开后提取系数得序列表达式。例如，设 $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，代入递推关系化简为 $G(x) = \frac{1}{(1-2x)^2}$ ，展开后得 $a_n = (n+1)2^n$ 。
- **生成函数计数：**在算法设计中，计数“长度为 n 的二进制串中含 k 个 1”的方案数，母函数为 $(1+x)^n$ ，展开后 x^k 的系数即为 $C(n, k)$ ；若允许重复计数（如可无限延长的串），母函数为 $\frac{1}{1-2x}$ ，展开后 x^n 的系数为 2^n 。

2. 数学计算中的应用

- **无穷级数求和：**计算 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$ 的和，可识别其为 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 的展开式，因此和为 $\frac{1}{(1-x)^2}$ （ $|x| < 1$ ）；若计算 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)2^n$ ，可令 $x=2$ （需注意收敛性，实际应用中需结合场景判断）。
- **近似计算：**当 $|x|$ 较小时，可利用母函数展开的前几项近似计算分式值，如 $\frac{1}{(1-0.1)^2} \approx 1+2 \times 0.1+3 \times 0.1^2=1.23$ （实际值为 $\frac{1}{0.81} \approx 1.2346$ ），误差较小。

五、备考建议：高效掌握母函数与广义二项式定理

1. 真题分类训练：聚焦核心场景

题型类型	对应真题/例题	解题模板
简单分式系数计算	2014 年 $(\frac{1}{(1-2x)^2})$ 、 2020 年 $(\frac{1}{(1-3x)^2})$	1. 确定 a 、 b 、 n ; 2. 算广义组合数 $C(a+n-1, n)$; 3. 乘 b^n 得系数
复杂函数化简计算	2018 年 $((1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+x^4+\dots)^3)$	1. 泰勒展开化简多项式; 2. 合并分式幂次; 3. 找目标项对应次数; 4. 算组合数与系数
母函数反推序列	2022 年 $(\frac{1+x+x^2+x^3}{(1-x)})$	1. 化简母函数为“多项式 $\times$ 无穷级数”; 2. 逐项展开合并同类项; 3. 提取各次项系数

2. 公式记忆技巧：联想场景具象化

- 对 $\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$ ，可联想“排列计数”场景： x^n 的系数 $n+1$ 对应“从 $n+1$ 个元素中选 1 个作为末尾元素”的组合数，帮助记忆系数与次数的关系。
- 对广义二项式定理，可通过“特殊值验证”强化记忆：令 $a=1$ ，则 $C(1+n-1, n)=C(n, n)=1$ ，对应几何级数展开 $\frac{1}{(1-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ，验证公式正确性。

3. 模拟题实战：强化场景迁移

- 模拟题 1：求 $\frac{1}{(1-4x)^3}$ 中 x^5 的系数。
 - 解析：套用公式： $\frac{1}{(1-bx)^a} = \sum_{k=0}^{\infty} C(a+k-1, k)b^k x^k$ ， $a=3$ ， $b=4$ ， $n=5$ ，广义组合数 $C(3+5-1, 5)=C(7, 5)=21$ ，系数为 $21 \times 4^5 = 21 \times 1024 = 21504$ 。
- 模拟题 2：求 $f(x) = \frac{x^3}{(1-2x)^2}$ 中 x^7 的系数。

- 解析：原函数化简为 $x^3 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)2^n x^n$ ， x^7 对应 $n=4$ 的系数，即 $(4+1) \times 2^4 = 5 \times 16 = 80$ 。

【组合数学-牛顿二项式定理】

一、知识框架：牛顿二项式定理的核心体系

牛顿二项式定理是组合数学中连接“多项式展开”与“组合计数”的核心工具，本质是解决“二项式幂展开后特定项系数”的计算问题，同时可延伸至二项式系数和的求解。其核心逻辑围绕标准定理、系数计算规则及应用场景展开。

1. 标准牛顿二项式定理

- 对任意正整数 n 和实数 x ，有： $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k) x^k$ 其中， $C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 称为二项式系数，表示从 n 个元素中选取 k 个元素的组合数。
- 几何意义：展开式中 x^k 的系数对应“从 n 个 $(1+x)$ 因式中选择 k 个取 x 、其余取 1 ”的组合数。

2. 广义二项式展开（单项式系数）

- 若二项式为 $(1+ax)^n$ (a 为常数)，展开式中 x^k 的系数可通过“变量替换”推导：
- 令 $y = ax$ ，则 $(1+ax)^n = (1+y)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k) y^k = \sum_{k=0}^n C(n,k) a^k x^k$ ，故 x^k 的系数为 $C(n,k) \cdot a^k$ 。

3. 二项式系数和的特殊结论

通过代入特定值 x 可快速计算系数和：

- 令 $x=1$ ，得 $\sum_{k=0}^n C(n,k) = 2^n$ （所有二项式系数和为 2^n ）；
- 令 $x=-1$ ，得 $\sum_{k=0}^n (-1)^k C(n,k) = 0$ （奇数项系数和等于偶数项系数和）；
- 部分和计算：如 $\sum_{k=1}^n C(n,k) = 2^n - 1$ （排除 $k=0$ 项的系数和）。

4. 核心应用场景分类

应用类型	解题关键	公式/方法	典型场景
特定项系数计算	确定二项式形式 $(1 + ax)^n$ ，提取常数因子 a ，套用系数公式	x^k 系数 = $C(n, k) \cdot a^k$	求 $(1 + 2x)^n$ 中 x^k 的系数
二项式系数和计算	代入特殊值 $x=1$ 或 $x=-1$ ，结合需求筛选项	全系数和 = 2^n ； 部分和 = 全系数和 - 排除项系数	求 $C(n, 1) + C(n, 2) + \dots + C(n, n)$
多项式展开验证	利用定理展开式验证多项式恒等式	对比展开式两端同类项系数	证明组合恒等式（如 $\sum_{k=0}^n C(n, k)^2 = C(2n, n)$ ）

二、真题详解：典型例题

【2012 年真题】——特定项系数计算（基础型）

题目：在 $(1 + 2x)^n$ 的展开式中 x^k 的系数是____，其中 $1 \leq k \leq n$ 。

题干分析：本题直接考查广义二项式展开的系数计算，属于定理的基本应用。核心是识别二项式中的常数因子 $a=2$ ，套用“系数 = 二项式系数 $\times$ 常数因子的 k 次幂”规则。

解题步骤：

- 拆解二项式结构： $(1 + 2x)^n$ 是 $(1 + ax)^n$ 的标准形式，其中 $a=2$ 。
- 套用广义展开公式：根据定理，展开式中 x^k 的系数为 $C(n, k) \cdot a^k$ 。
- 代入常数因子计算：将 $a=2$ 代入，得 x^k 的系数为 $C(n, k) \cdot 2^k$ 。

【练习题】——特定项系数计算（符号处理）

题目：设 $G(x) = (1 - 2x)^3$ ，则 x^3 的系数是多少？

题干分析：本题在基础系数计算的基础上增加“负常数因子”，需注意符号的处理，核心仍是套用广义二项式系数公式。

解题步骤：

- 识别参数：二项式为 $(1 + ax)^n$ ，其中 $a=-2$ ， $n=3$ ，目标项为 $k=3$ 。
- 计算二项式系数： $C(3, 3) = 1$ 。

- 计算常数因子幂： $a^k = (-2)^3 = -8$ 。
- 求乘积得系数： $1 \times (-8) = -8$ 。

【2020 年真题】——二项式系数和（部分和计算）

题目：任意的正整数 $n \geq 2$ ，求 $C(n, 1) + C(n, 2) + C(n, 3) + \cdots + C(n, n-1) + C(n, n)$ 的最简易表达式？

题干分析：本题考查二项式系数的部分和，需利用“全系数和减去排除项”求解，核心是回忆 $x=1$ 时的系数和结论。

解题步骤：

- 明确全系数和：由牛顿二项式定理，令 $x=1$ ，得 $\sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n$ 。
- 识别排除项：题干所求为从 $k=1$ 到 $k=n$ 的系数和，需排除 $k=0$ 项（系数为 $C(n, 0)=1$ ）。
- 计算部分和： $\sum_{k=1}^n C(n, k) = 2^n - 1$ 。

三、易错点分析：避开系数计算的常见陷阱

1. 常数因子遗漏或符号错误

- 错误示例：计算 $(1 - 2x)^3$ 中 x^3 的系数时，误将 $(-2)^3$ 算为 8，得到 $1 \times 8 = 8$ 的错误结果，忽略负号影响。
- 避坑指南：展开 $(1 + ax)^n$ 时，先明确 a 的符号（正或负），再计算 a^k ；可分步拆解：先算 $|a|^k$ 再根据 k 的奇偶性确定符号（ a 为负时， k 奇则负， k 偶则正）。

2. 二项式系数与项的系数混淆

- 错误示例：将“二项式系数”与“项的系数”等同，认为 $(1 + 2x)^n$ 中 x^k 的系数是 $C(n, k)$ ，遗漏常数因子 2^k 。
- 避坑指南：明确二者区别：
 - 二项式系数：仅指 $C(n, k)$ ，与 x 的系数无关；

- **项的系数：**指展开式中 x^k 前的全部常数，即 $C(n,k) \cdot a^k$ （ a 为二项式中 x 的系数）。

3. 系数和计算时代入值错误

- **错误示例：**求 $\sum_{k=1}^n C(n,k)$ 时，误代入 $x=0$ ，得到0的错误结果，混淆“系数和”与“常数项”。
- **避坑指南：**牢记系数和的核心是“代入 $x=1$ ”：
 - **全系数和：** $x=1$ 时的展开式值（ 2^n ）；
 - **部分和：**全系数和减去目标范围外的项（如排除 $k=0$ 则减1）。

四、扩展应用：从真题到实际场景

1. 计算机科学中的应用

- **算法复杂度分析：**在分析某些递归算法（如快速排序）的平均复杂度时，需计算二项式系数和，利用 $\sum_{k=0}^n C(n,k) = 2^n$ 简化计算。
- **编码理论：**汉明码的校验位设计中，需通过二项式系数计算“不同位数错误的校验组合数”，如 $C(n,k)$ 表示 n 位编码中发生 k 位错误的情况数。

2. 数学计算中的应用

- **多项式展开验证：**验证 $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k) a^{n-k}b^k$ 时，可令 $a=1$ 、 $b=x$ 转化为标准二项式，通过定理快速验证。
- **近似计算：**当 $|x|$ 较小时，可利用二项式展开的前几项近似计算 $(1 + x)^n$ ，如 $(1 + 0.01)^5 \approx 1 + 5 \times 0.01 + 10 \times 0.01^2 = 1.051$ 。

五、备考建议：高效掌握定理应用

1. 真题分类训练：聚焦核心场景

题型类型	对应真题/例题	解题模板
------	---------	------

特定项系数计算	2012 年 $(1+2x)^n$ 、 练习题 $(1-2x)^3$	1. 确定二项式形式 $(1+ax)^n$; 2. 提取 a 、 n 、 k ; 3. 计算 $C(n,k) \cdot a^k$
二项式系数和计算	2020 年 $\sum_{k=1}^n C(n,k)$	1. 求全系数和 (代入 $x=1$ 得 2^n); 2. 减去排除项系数 (如 $k=0$ 项为 1); 3. 得部分和

2. 公式记忆技巧：联想组合意义

- 二项式系数 $C(n,k)$ 的组合意义是“选择 k 个因式取 x ”，可通过具象化场景记忆：如 $(1+2x)^5$ 中 x^2 的系数，对应“从 5 个因式中选 2 个取 $2x$ （每个贡献 2）、其余 3 个取 1”，即 $C(5,2) \times 2^2 = 10 \times 4 = 40$ 。

3. 模拟题实战：强化场景迁移

- **模拟题 1：**求 $(2-x)^4$ 展开式中 x^3 的系数。

➤ 解析：先转化为 $(1-\frac{x}{2})^4 \times 2^4$ ， x^3 的系数为 $C(4,3) \times (-\frac{1}{2})^3 \times 16 = 4 \times (-\frac{1}{8}) \times 16 = -8$ 。

- **模拟题 2：**求 $C(5,0)+C(5,2)+C(5,4)$ 的值。

➤ 解析：利用 $x=-1$ 时的系数和： $\sum_{k=0}^5 (-1)^k C(5,k) = 0$ ，即 $[C(5,0)+C(5,2)+C(5,4)] - [C(5,1)+C(5,3)+C(5,5)] = 0$ （奇数项系数和等于偶数项系数和），结合 $x=1$ 时的全系数和： $\sum_{k=0}^5 C(5,k) = 2^5 = 32$ ，得所求 $C(5,0)+C(5,2)+C(5,4)$ 值为 16。

【组合数学-排列与组合】

一、知识框架：排列与组合的核心体系

排列与组合是组合数学的基础，核心在于解决“计数”问题，需明确区分元素是否有序、是否可重复，以及特殊限制条件（如相邻、不相邻、环形排列等）。以下是关键知识点：

1. 基础概念与公式

- **全排列**：n 个不同元素的无限制线性排列数，公式为 $n!$ （n 的阶乘， $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$ ），适用于“所有元素无差别排序”场景，如“5 个文科生和 5 个理科生无限制排成一排”。
- **圆排列**：n 个不同元素围成一圈的排列数，公式为 $(n-1)!$ 。因环形排列中“旋转后相同的排列视为同一方案”，需固定一个元素位置消除旋转重复，如“四对夫妻围圆桌无限制就座”。
- **组合数与排列数**：
 - **组合数** $C(n, k)$ 或 C_n^k 或 $\binom{n}{k}$ ：从 n 个不同元素中选 k 个不考虑顺序的选法数，公式为 $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ ，适用于“选元素不排序”场景，如“从 4 个球中选 2 个组成一组”。
 - **排列数** $P(n, k)$ 或 A_n^k ：从 n 个不同元素中选 k 个并排序的选法数，公式为 $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ ，适用于“选元素后需排序”场景，如“将 3 个女生插入 5 个男生的 6 个间隙中选 3 个排序”。
- **元素重复的排列**：含相同元素的 n 个元素排列数，公式为 $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_m!}$ （其中 $n_1, n_2, \cdots, n_m$ 分别为各相同元素的个数），适用于“存在重复元素”场景，如“由 3 个 a、1 个 b、2 个 c 组成的排列”。

2. 特殊限制场景

- **交替排列**：两类元素（如文科生与理科生、男生与女生）交替排成一排，需先对其中一类元素全排列，再将另一类元素插入固定间隙（仅前 n 个或后 n 个间隙，避免同类相邻），总排列数为 $2 \times n! \times m!$ （n、m 分别为两类

元素个数，且 $n=m$ ），如“5 个中国籍学生和 5 个英国籍学生交叉排列”。

- **不相邻排列**：某类元素（如女生、学生）不能相邻，采用“先排无限制元素，再插有限制元素”的策略：先对无限制元素全排列，再将有限制元素插入其产生的间隙（ n 个元素产生 $n+1$ 个间隙），总排列数为“无限制元素排列数 $\times$ 有限制元素的排列数”，如“5 个男同学和 3 个女同学站成一排且女生不相邻”。
- **分组排列（含固定分组）**：将 n 个元素按固定数量分成多组（部分组可能为空），需依次从剩余元素中选对应数量的元素分配到各组，总方法数为“多步组合数的乘积”，如“11 名同学分 4 组，第一组 4 人、第二组 3 人、第三组 0 人、第四组 4 人”，计算为 $C_{11}^4 \times C_7^3 \times C_4^4$ 。

二、真题详解：典型例题

以下是 2012-2023 年真题中“排列与组合”的典型题目及解析，覆盖核心考点与解题思路：

【2012 年真题 1】

题目：如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有____种不同的排法。

解析：

- **无限制排列（第一空）**：10 个不同的人无限制排成一排，属于全排列问题，排法数为 $10!$ ，计算得 $10! = 3628800$ 。
- **交替排列（第二空）**：两类元素（5 个文科生、5 个理科生）交替排列，需分三步：
 - 第一步：将 5 个文科生全排列，排法数为 $5! = 120$ ；
 - 第二步：将 5 个理科生全排列，排法数为 $5! = 120$ ；
 - 第三步：将理科生插入文科生产生的间隙，文科生全排列后产生 6 个间隙（如“文_文_文_文_文”），但为保证交替，只能选前 5 个或后 5 个间隙，共 2 种选择；
 - 总排法数为： $2 \times 5! \times 5! = 2 \times 120 \times 120 = 28800$ 。

【2012 年真题 2】

题目：由 3 个 a ，1 个 b ，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是____。

解析：

本题为“含重复元素的排列”问题，六个元素中 3 个 a、1 个 b、2 个 c 分别重复，需用“重复元素排列公式”：总排列数为 $\frac{6!}{3! \times 1! \times 2!}$ 。

- 计算分子： $6! = 720$ ；
- 计算分母： $3! \times 1! \times 2! = 6 \times 1 \times 2 = 12$ ；
- 总排列数为 $720/12 = 60$ 。

【2013 年真题】

题目：如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有__种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有__种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有__种。

解析：

- 无限制圆排列（第一空）：8 人围圆桌无限制就座，属于圆排列问题，排法数为 $(8-1)! = 7!$ ，计算得 $7! = 5040$ 。
- 男女交替线排列（第二空）：4 男 4 女交替排成一排，步骤与“2012 年真题 1”类似：
 - 先排 4 个男士，排法数为 $4! = 24$ ；
 - 再排 4 个女士，排法数为 $4! = 24$ ；
 - 女士插入男士间隙（仅前 4 个或后 4 个间隙），共 2 种选择；
 - 总排法数为 $2 \times 4! \times 4! = 2 \times 24 \times 24 = 1152$ 。
- 夫妻相邻圆排列（第三空）：将每对夫妻视为一个“整体”，先解决整体的圆排列，再考虑夫妻内部排序：
 - 第一步：4 个夫妻整体围圆桌排列，圆排列数为 $(4-1)! = 3! = 6$ ；
 - 第二步：每对夫妻内部可互换位置，4 对夫妻共 $2^4 = 16$ 种排法；
 - 总座法数为 $3! \times 2^4 = 6 \times 16 = 96$ 。

【2023 年真题 1】

题目：已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，假如规定学生两两不相邻，则有__种就座方案。

解析：

本题为“圆排列 + 不相邻排列”结合问题，需先排无限制的老师（避免学生相邻），再插学生：

- 第一步：5 位老师围圆桌就座，圆排列数为 $(5-1)! = 4! = 24$ ；
- 第二步：老师围坐后产生 5 个间隙（圆排列中 n 个元素产生 n 个间隙），需从 5 个间隙中选 3 个插入 3 位学生，且学生需排序，属于排列数问题，排法数为 $P(5,3) = \frac{5!}{(5-3)!} = 5 \times 4 \times 3 = 60$ ；
- 总就座方案数为 $4! \times P(5,3) = 24 \times 60 = 1440$ 。

【2023 年真题 2】

题目：整除 2310 的正奇数有_____个。

解析：

本题需先对 2310 进行质因数分解，再筛选正奇数因数并计算其组合数：

- 第一步：质因数分解 2310，得 $2310 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$ ；
- 第二步：筛选正奇数因数，排除质因数 2，剩余奇数质因数为 3、5、7、11；
- 第三步：正奇数因数的形式为 $3^a \times 5^b \times 7^c \times 11^d$ （其中 a、b、c、d 均为 0 或 1，“0”表示不选该质因数，“1”表示选），每个指数有 2 种选择；
- 总正奇数个数为 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ 。

三、易错点分析：常见陷阱与避坑指南

1. 圆排列与线排列的混淆

- **错误示例：**将“n 人围圆桌就座”误算为 $n!$ （线排列数），忽略“旋转重复”的特性，正确应为 $(n-1)!$ 。
- **真题陷阱：**2013 年“四对夫妻围圆桌无限制就座”，若误按线排列计算 $8!$ ，会得到 40320 的错误结果，实际应为 $7! = 5040$ 。
- **避坑指南：**判断是否为“环形场景”（如圆桌、环形手链），若是则优先用圆排列公式 $(n-1)!$ ；若为“线性场景”（如一排、一列），则用线排列公式 $n!$ 或排列数 $P(n, k)$ 。

2. 交替排列的间隙选择错误

- **错误示例：**计算“5 文 5 理交替排列”时，误将理科生插入所有 6 个间隙（如“文_文_文_文_文”），导致出现“文 - 理 - 文 - 理 - 文 - 理 - 文 - 理 - 文 - 理”和“理 - 文 - 理 - 文 - 理 - 文 - 理 - 文 - 理 - 文”之外的方案，忽略“交替”需固定间隙（仅前 5 个或后 5 个）。
- **真题陷阱：**2020 年“5 中国籍 5 英国籍学生交叉排列”，若误算为 $5! \times 5! \times 6$ （6 个间隙选 5 个），会得到 $120 \times 120 \times 6 = 86400$ 的错误结果，实际应为 $2 \times 5! \times 5! = 28800$ 。
- **避坑指南：**交替排列需保证“两类元素数量相等”（ $n=m$ ），且插入时仅能选择“前 n 个间隙”或“后 n 个间隙”，共 2 种选择，而非所有间隙的组合。

3. 重复元素排列的分母遗漏

- **错误示例：**计算“3 个 a、1 个 b、2 个 c 的排列数”时，误写为 $6!$ （未除重复元素的阶乘），得到 720 的错误结果，实际应为 $\frac{6!}{3! \times 1! \times 2!} = 60$ 。
- **避坑指南：**遇到“相同元素”（如多个 a、多个相同球），需在全排列数的分母中，补充各相同元素个数的阶乘，公式记忆为“总元素阶乘 $\div$ 各相同元素阶乘的乘积”。

四、扩展应用：排列与组合的现实价值

1. 计算机科学中的应用

- **算法设计：**排序算法的时间复杂度分析需用到排列（如 n 个元素的全排列数为 $n!$ ，对应冒泡排序的最坏情况比较次数）；组合优化问题（如“从 n 个节点中选 k 个构建最小生成树”）需用组合数计算候选方案数。
- **密码学：**密码的复杂度计算依赖排列，如“6 位数字密码”的总可能数为 10^6 （可重复排列），“由 26 个字母组成的 8 位无重复密码”的总可能数为 $P(26,8)$ 。

2. 生活与工作中的应用

- **资源分配：**如“10 个项目分配给 5 个团队，每个团队 2 个项目”，需用组合数计算：先选 2 个项目给第一团队（ C_{10}^2 ），再选 2 个给第二团队（ C_8^2 ），直至分配完，总方法数为 $C_{10}^2 \times C_8^2 \times C_6^2 \times C_4^2 \times C_2^2$ 。
- **活动安排：**活动安排：如“6 个节目排成节目单，要求 2 个舞蹈节目不相邻”，采用“先排 4 个非舞蹈节目（ $4!$ ），再插 2 个舞蹈节目（ $P(5,2)$ ）”，总排法数为 $4! \times P(5,2) = 24 \times 20 = 480$ 。

五、备考建议：从真题到实战的进阶策略

1. 真题训练：分类突破高频考点

- **按场景分类：**将历年真题按“无限制排列 / 组合”“圆排列”“交替排列”“不相邻排列”“重复元素排列”分类，如：

- **无限制类：**2012 年 “5 文 5 理无限制排列”、2013 年 “四对夫妻无限制圆排列”；
- **限制类：**2021 年 “5 男 3 女女生不相邻”、2023 年 “5 师 3 生学生不相邻圆排列”。
- **总结解题模板：**针对每类场景提炼固定步骤，如 “不相邻排列” 模板：
①排无限制元素（算排列数）→②算间隙数（n 个元素产生 n+1 个间隙，圆排列为 n 个）→③插有限制元素（算排列数）→④总方案数 =①×③。

2. 模拟题设计：结合热点拓展练习

结合计算机领域热点（如 AI、大数据）设计模拟题，强化知识点应用：

- **题目 1：**“8 个不同的 AI 模型（4 个图像模型、4 个语言模型）排成展示队列，要求图像模型和语言模型交替排列，共有多少种排法？”
➤ **解析：**交替排列，总排法数为 $2 \times 4! \times 4! = 2 \times 24 \times 24 = 1152$ 。
- **题目 2：**“6 个不同的数据集（3 个结构化数据、3 个非结构化数据）围圆桌展示，要求同类数据不相邻，共有多少种展示方案？”
➤ **解析：**先排 3 个结构化数据（圆排列， $(3-1)! = 2$ ），再插 3 个非结构化数据（3 个间隙选 3 个，排列数 $3! = 6$ ），总方案数为 $2 \times 6 = 12$ 。

【组合数学-容斥原理和错排问题】

一、容斥原理与错排问题核心知识点

容斥原理是组合数学中解决“有限集合交并补计数”的核心工具，尤其适用于“不允许出现特定元素组合”、“至少满足某类条件”的计数场景；而错排问题是容斥原理的典型应用，专门解决“元素不回到原有位置”的排列计数。在同等学力申硕计算机专业组合数学真题中，两者常结合出现，题型固定且解题逻辑可复用。本文结合 2013-2023 年真题，从核心知识点、真题解析、解题思路总结三部分，系统拆解容斥原理及错排问题的应用方法。

1. 容斥原理

(1) 基本定义与公式

容斥原理的本质是“通过包含特定条件的集合，排除重复计数的部分，最终得到目标集合的元素个数”。对于有限集合 S 中的 m 个事件 $A_1, A_2 \cdots A_m$ ，目标是计算“不满足所有事件”或“至少满足部分事件”的元素个数，核心公式如下：

● **补集公式（高频）**：计算“不满足任何 A_i ”的元素个数，即

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}| = |S| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|。$$

其中， $|S|$ 为全集元素个数，“+”、“-”交替出现，分别对应“包含”、“排除”的计数逻辑。

● **并集公式**：计算“至少满足一个 A_i ”的元素个数，即

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m| = \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|。$$

(2) 核心解题步骤

真题中容斥原理的应用均遵循“四步走”，步骤固定：

- ① **定义事件**：明确全集 S （所有可能的情况），并定义每个事件 A_i （如“ A_1 表示排列中出现‘ac’”“ A_2 表示排列中出现‘bd’”）；
- ② **计算各集合大小**：分别求出 $|S|$ 、单个事件大小 $|A_i|$ 、两个事件交集大小 $|A_i \cap A_j|$ 、…、所有事件交集大小 $|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|$ ；

- ③ 代入公式：根据目标（补集或并集）选择对应公式，按“+”、“-”交替规则代入计算；
- ④ 验证结果：检查计算过程中是否遗漏事件或交集，确保计数无重复、无遗漏。

2. 错排问题

（1）基本定义与公式

错排问题是“将 n 个元素重新排列，使得每个元素都不回到原来位置”的计数问题，是容斥原理的典型应用。例如“ n 个人拿错伞”、“ n 个字母装错信封”均属于错排问题。

- 错排数公式：通过容斥原理推导， n 个元素的错排数 D_n 为 $D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$ ，其中， $n!$ 为 n 个元素的全排列数，后续项通过容斥原理排除“至少一个元素在原位”的情况。
- 常用错排数：真题中常考小值 n 的错排数，需熟记： $D_1=0$ （1 个元素无法错排）、 $D_2=1$ （两个元素交换位置）、 $D_3=2$ 、 $D_4=9$ 、 $D_5=44$ 。

（2）核心解题场景

错排问题在真题中主要有两类场景：

- 纯错排：直接计算 n 个元素的错排数（如“5 个人全部拿错伞的排列数”）；
- 组合错排：错排与其他排列结合（如“先对 n 个元素全排列，再对另一组元素错排”）。

二、真题详解：典型例题

【2013 年真题】——容斥原理-全排列禁位问题

题目：设 a 、 b 、 c 、 d 这四个元素的全排列中，不允许出现“ ac ”和“ bd ”的排列数是多少？

解析：

步骤 1：定义事件与全集

- 全集 S ：4 个元素的全排列，故 $|S|=4! = 24$ ；
- 事件 A_1 ：排列中出现“ ac ”（将“ ac ”视为一个整体）；
- 事件 A_2 ：排列中出现“ bd ”（将“ bd ”视为一个整体）；

- 目标：计算“不出现‘ac’且不出现‘bd’”的排列数，即 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}|$ 。

步骤 2：计算各集合大小

- 单个事件大小：

- 对 A_1 ：将“ac”视为一个整体，此时共 3 个元素（[ac]、b、d），全排列数为 $3! = 6$ ，故 $|A_1| = 6$ ；
- 对 A_2 ：同理，将“bd”视为一个整体，共 3 个元素（a、[bd]、c），全排列数为 $3! = 6$ ，故 $|A_2| = 6$ ；

- 两事件交集大小：

- 对 $A_1 \cap A_2$ ：同时出现“ac”和“bd”，将两者均视为整体，此时共 2 个元素（[ac]、[bd]），全排列数为 $2! = 2$ ，故 $|A_1 \cap A_2| = 2$ 。

步骤 3：代入补集公式计算

根据容斥原理补集公式： $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| = |S| - (|A_1| + |A_2|) + |A_1 \cap A_2|$ ；

代入数据： $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| = 24 - (6 + 6) + 2 = 14$ 。

答案：14 种。

【2018 年真题】——容斥原理-多集合计数问题

题目：120 个学生参加考试，共有 A、B、C 三道题。已知：三道题都做对的有 12 个学生，做对 A 和 B 的有 20 个学生，做对 A 和 C 的有 16 个学生，做对 B 和 C 的有 28 个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没做对。试求仅做对 C 的学生有多少个？

解析：

步骤 1：定义事件与全集

- 全集 S：所有参加考试的学生， $|S| = 120$ ；
- 事件 A：做对 A 题的学生， $|A| = 48$ ；
- 事件 B：做对 B 题的学生， $|B| = 56$ ；
- 事件 C：做对 C 题的学生，待求 $|C|$ ；
- 已知条件： $|A \cap B| = 20$ （做对 A 和 B）、 $|A \cap C| = 16$ （做对 A 和 C）、 $|B \cap C| = 28$ （做对 B 和 C）、 $|A \cap B \cap C| = 12$ （三道题都做对）、 $|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = 16$ （一道题都没做对）；
- 目标：先求 $|C|$ ，再求“仅做对 C”的学生数（排除同时做对 A 或 B 的情况）。

步骤 2：用容斥原理求 $|C|$

根据容斥原理补集公式（“一道题都没做对”是“至少做对一道题”的补集）： $|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$ ；

代入已知数据： $16 = 120 - (48 + 56 + |C|) + (20 + 16 + 28) - 12$ ；

化简计算： $16 = 120 - 104 - |C| + 64 - 12 \Rightarrow 16 = 68 - |C| \Rightarrow |C| = 52$ 。

步骤 3：求“仅做对 C”的学生数

“仅做对 C”的学生数 = 做对 C 的学生数 - (做对 A 和 C 的学生数 + 做对 B 和 C 的学生数) + 三道题都做对的学生数 (因“做对 A 和 C”与“做对 B 和 C”的交集被重复减去, 需加回):

仅做对 C = $|C| - (|A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C|$;

代入数据: 仅做对 C = $52 - (16 + 28) + 12 = 20$;

答案: 20 个。

【2014 年真题】——错排问题

题目: n 个男同学和 n 个女同学参加舞会, 当第一首舞曲响起时, 每个男同学要找一位女同学跳舞, n 个男同学一共有____种方法选择女同学; 当第二首舞曲响起时, 要求每个人都要更换舞伴, 这时 n 个男同学选择女同学的方法有____种。

解析:

(1) 第一空: 无限制选择舞伴

第一首舞曲无“更换”要求, 即对 n 个女同学进行全排列, 每个男同学对应一个女同学, 故方法数为 $n!$ 。

(2) 第二空: 更换舞伴 (错排问题)

第二首舞曲要求“每个人更换舞伴”, 即每个男同学不能选择第一首舞曲对应的女同学, 属于 n 个元素的错排问题, 方法数为错排数 D_n , 代入错排公式:

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)。$$

【2018 年真题】——错排问题

题目: 4 名学生同时参加英语和德语面试, 要求每门科目只能同时面试 1 人, 2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的, 试问共有多少种不同的面试次序?

解析:

步骤 1: 拆解问题场景

本题可理解为“两步排列”:

- (1) 英语面试次序: 4 名学生任意排列, 方法数为 $4!$ (全排列);
- (2) 德语面试次序: 要求“不与英语面试次序相同” (即每个学生不能在同一时间参加德语面试, 对应错排问题), 方法数为 D_4 (4 个元素的错排数)。

步骤 2: 计算错排数 D_4

$$\text{代入错排公式: } D_4 = 4! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 24 * \frac{9}{24} = 9。$$

步骤 3: 计算总面试次序

总方法数 = 英语面试次序数 $\times$ 德语面试次序数: $4! \times D_4 = 24 \times 9 = 216$ 。

答案: 216 种。

三、解题思路总结与高频考点

1. 容斥原理解题关键

- **事件定义清晰**：需明确每个事件的“特定条件”（如“出现某组合”“在某位置”），避免事件重叠或遗漏；
- **交集计算准确**：当事件为“元素组合”（如“排列中出现‘ac’”）时，需将组合视为“整体”计算排列数；当事件为“位置限制”（如“A不能周一值班”）时，需固定限制位置后计算剩余元素的排列数；
- **公式选择合理**：若目标是“不满足所有事件”，用补集公式；若目标是“至少满足一个事件”，用并集公式，两者可通过“补集关系”互相转换（如“至少1对夫妻不相邻” = “全集 - 所有夫妻都相邻”）。

2. 错排问题解题关键

- **识别错排场景**：当题目中出现“更换”“不回到原位”“拿错”等关键词时，优先考虑错排问题；
- **熟记常用错排数**：真题中 $n=4, 5$ 的错排数（ $D_4=9, D_5=44$ ）出现频率极高，可直接记忆以节省计算时间；
- **组合场景拆分**：当错排与其他排列结合时（如“面试次序”、“舞伴选择”），需拆分为“无限制排列 + 错排”两步，再用乘法原理计算总方法数。

3. 高频考点提醒

- **圆排列与容斥结合**：圆桌排列需注意“旋转视为相同”，故全排列数为 $(n-1)!$ ，如2021年“夫妻围圆桌”真题；
- **“仅满足某条件”的计算**：需通过“总满足数 - 多条件满足数 + 重叠数”修正，如2018年“仅做对C题”真题；
- **错排与概率结合**：需先计算错排数，再通过“补集”求“至少一个正确”的组合数，最后计算概率，如2020年“拿错伞”真题。。

通过以上拆解可见，容斥原理与错排问题的真题解法逻辑清晰，只要掌握“事件定义→集合计算→公式代入”的核心流程，结合错排数的快速应用，即可高效应对此类问题。

【组合数学-线性常系数递推关系】

一、线性常系数递推关系核心知识点

线性常系数递推关系是组合数学中求解“序列规律”问题的核心工具，广泛应用于计数、概率、算法复杂度分析等场景。在同等学力申硕计算机专业组合数学真题中，该考点主要围绕“齐次递推关系”与“非齐次递推关系”的求解展开，题型固定且解题逻辑统一。本文结合 2012-2023 年真题，从核心知识点、真题解析、解题思路总结三部分，系统拆解线性常系数递推关系的应用方法。

1. 基本定义与分类

线性常系数递推关系的一般形式为：

对于序列 $\{a_n\}$ ，满足 $a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \cdots + c_k a_{n-k} = f(n)$ ，其中 $c_1, c_2 \cdots c_k$ 为常数 ($c_k \neq 0$)， $f(n)$ 为非齐次项。

根据非齐次项 $f(n)$ 是否为 0，分为两类：

- **齐次递推关系：** $f(n) = 0$ ，即 $a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \cdots + c_k a_{n-k} = 0$ ；
- **非齐次递推关系：** $f(n) \neq 0$ ，如 $f(n) = 2$ （常数）、 $f(n) = 3^n$ （指数函数）等。

2. 齐次递推关系求解步骤

齐次递推关系的解由“特征方程”决定，核心是通过特征根的类型（无重根、有重根）确定通解形式，再结合初始条件求系数。

（1）无重根情况（高频考点）

以二阶齐次递推关系 $a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = 0$ 为例：

- **写特征方程：**将 a_n 替换为 r^n ，得 $r^2 + c_1 r + c_2 = 0$ ；
- **求特征根：**解特征方程，若得到两个不同的实根 r_1 和 r_2 ；
- **写通解：**通解形式为 $a_n = A \cdot r_1^n + B \cdot r_2^n$ （ A, B 为待定系数）；
- **定系数：**代入初始条件（如 a_0, a_1 ），解方程组求出 A, B 。

（2）有重根情况（低频考点）

若特征方程有二重根 r ，则通解形式为 $a_n = (A + Bn) \cdot r^n$ ，后续步骤与无重根一致。

3. 非齐次递推关系求解步骤

非齐次递推关系的解 = 对应的齐次递推关系的通解 + 非齐次递推关系的一个特解，即 $a_n = \overline{a_n} + a_n^*$ ，其中：

- $\overline{a_n}$ ：齐次递推关系的通解（求解方法同上）；
- a_n^* ：非齐次递推关系的特解（需根据非齐次项 $f(n)$ 的形式假设，常见形式如下表）。

常见非齐次项与特解假设

非齐次项 $f(n)$ 形式	特解 a_n^* 假设（需结合特征根判断）
常数（如 $f(n) = C$ ）	若 1 不是特征根，设 $a_n^* = A$ （常数）； 若 1 是特征根，设 $a_n^* = An$
一次多项式（如 $f(n) = Cn$ ）	若 1 不是特征根，设 $a_n^* = An + B$ ； 若 1 是特征根，设 $a_n^* = An^2 + Bn$
指数函数（如 $f(n) = C \cdot k^n$ ）	若 k 不是特征根，设 $a_n^* = A \cdot k^n$ ； 若 k 是特征根，设 $a_n^* = An \cdot k^n$

4. 核心解题逻辑

无论是齐次还是非齐次递推关系，求解均遵循“三步法”：

- (1) 判断类型：确定递推关系是齐次还是非齐次，明确特征方程形式与特解假设；
- (2) 求通解：齐次递推关系通过特征根求通解，非齐次递推关系需额外求特解并与齐次通解相加；
- (3) 定系数：代入初始条件（如 a_0, a_1, a_2 ），解方程组求出通解中的待定系数，得到最终解。

二、真题详解：典型例题

【2012 年真题】——一阶非齐次递推关系

题目：设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系 $a_n = a_{n-1} + 2$ ，且初始条件 $a_1 = 1$ ，求 a_n 的表达式。

解析：

步骤 1：判断类型与转化：

递推关系可改写为 $a_n - a_{n-1} = 2$ ，属于一阶非齐次递推关系：

- 齐次部分： $a_n - a_{n-1} = 0$ ；
- 非齐次项： $f(n) = 2$ （常数）。

步骤 2：求齐次通解 $\overline{a_n}$ ：

- (1). 齐次递推关系的特征方程： $r - 1 = 0$ ，解得特征根 $r = 1$ ；
- (2). 齐次通解形式：因特征根为单根，通解为 $\overline{a_n} = A \cdot 1^n = A$ （ A 为待定系数）。

步骤 3：求非齐次特解 a_n^* ：

非齐次项 $f(n) = 2$ (常数), 且 1 是特征根 (需避免特解与齐次通解重复), 故设特解为 $a_n^* = An$ (一次多项式)。

将 $a_n^* = An$ 代入原递推关系 $a_n = a_{n-1} + 2$:

得 $An = A(n-1) + 2$, 解得 $A = 2$ 。

因此, 特解为 $a_n^* = 2n$ 。

步骤 4: 求非齐次通解并定系数:

非齐次通解为 $a_n = \overline{a_n} + a_n^* = A + 2n$ 。

代入初始条件 $a_1 = 1$: $1 = A + 2 \times 1$, 解得 $A = -1$ 。

答案: $a_n = 2n - 1$ 。

【2014 年真题】——一阶非齐次递推关系

题目: 设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系 $a_n = 3a_{n-1} + 1$, 且初始条件 $a_1 = 2$, 求 a_n 的精确表达式。

解析:

步骤 1: 判断类型与转化:

递推关系为 $a_n - 3a_{n-1} = 1$, 属于一阶非齐次递推关系:

- 齐次部分: $a_n - 3a_{n-1} = 0$;
- 非齐次项: $f(n) = 1$ (常数)。

步骤 2: 求齐次通解 $\overline{a_n}$:

(1). 特征方程: $r - 3 = 0$, 解得特征根 $r = 3$;

(2). 齐次通解: $\overline{a_n} = A \cdot 3^n$ (A 为待定系数)。

步骤 3: 求非齐次特解 a_n^* :

非齐次项 $f(n) = 1$ (常数), 且 1 不是特征根 (特征根为 3), 故设特解为 $a_n^* = B$ (常数)。

将 $a_n^* = B$ 代入原递推关系 $a_n = 3a_{n-1} + 1$:

得 $B = 3B + 1$, 解得 $B = -\frac{1}{2}$ 。

因此, 特解为 $a_n^* = -\frac{1}{2}$ 。

步骤 4: 定系数求最终解:

非齐次通解为 $a_n = \overline{a_n} + a_n^* = A \cdot 3^n - \frac{1}{2}$ 。

代入初始条件 $a_1 = 2$: $2 = A \cdot 3^1 - \frac{1}{2}$, 解得 $A = \frac{5}{6}$ 。

答案: $a_n = \frac{5}{6} \cdot 3^n - \frac{1}{2}$ 。

【2018 年真题】——二阶齐次递推关系

题目：求满足递推关系 $h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}$ 的序列 $\{h_n\}$ 表达式，初始条件为 $h_0 = 1, h_1 = -2$ 。

解析：

步骤 1：判断类型与写特征方程：

递推关系可改写为 $h_n - 5h_{n-1} + 6h_{n-2} = 0$ ，属于二阶齐次递推关系（无重根）。

特征方程： $r^2 - 5r + 6 = 0$ 。

步骤 2：求特征根：

解特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$ ，因式分解得 $(r-2)(r-3) = 0$ ，故特征根 $r_1 = 2, r_2 = 3$ （无重根）。

步骤 3：写齐次通解并定系数：

齐次通解形式为 $h_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$ （A, B 为待定系数）。

代入初始条件：

- 当 $n=0$ 时， $h_0 = 1 = A \cdot 2^0 + B \cdot 3^0$ ，即 $A + B = 1$ ；
- 当 $n=1$ 时， $h_1 = -2 = A \cdot 2^1 + B \cdot 3^1$ ，即 $2A + 3B = -2$ 。

解方程组：
$$\begin{cases} A + B = 1 \\ 2A + 3B = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 5 \\ B = -4 \end{cases}$$

答案： $h_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$ 。

三、解题思路总结与高频考点

1. 核心规律提炼

从真题解析可发现，线性常系数递推关系的求解具有“模板化”特点，核心规律如下：

- **齐次递推关系**：重点是“特征方程→特征根→通解→定系数”，无重根情况占真题 90%以上，需熟练掌握二阶、三阶递推关系的特征方程求解；
- **非齐次递推关系**：关键是“齐次通解 + 特解”，特解的假设需严格匹配非齐次项形式（如常数项对应常数特解，指数项对应指数特解），且需判断“特解是否与齐次通解重复”（如特征根为 1 时，常数特解需升级为一次多项式）；
- **初始条件应用**：无论齐次还是非齐次，最终均需通过初始条件（如 a_0, a_1 ）解方程组求待定系数，需注意初始条件的个数与递推关系的阶数一致（如二阶递推关系需 2 个初始条件）。

2. 高频考点与易错点提醒

- **特征方程符号问题**：写特征方程时需注意递推关系的移项符号，如 $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ 需先移项为 $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$ ，再写特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$ ，遗漏负号会导致特征根错误；

- **特解假设升级：**当非齐次项对应的形式与齐次通解重复时，需对特解进行“升级”（如常数特解升级为一次多项式，一次多项式升级为二次多项式），例如 2012 年真题中，特征根为 1，非齐次项为常数 2，故特解设为 A_n 而非 A ；
- **高阶递推关系简化：**三阶及以上齐次递推关系的特征方程可通过因式分解（如提取公因式、分组分解）求解，无需使用求根公式，例如 2018 年三阶真题通过分组分解快速得到特征根。

通过以上拆解可见，线性常系数递推关系的真题解法逻辑清晰，只要掌握“类型判断→通解求解→系数确定”的三步法，结合特征方程与特解假设的核心规则，即可高效应对此类问题。

【组合数学-指数型母函数】

一、知识框架：指数型母函数核心知识点

指数型母函数是组合数学中解决“有重复元素排列”问题的核心工具，尤其适用于“元素出现次数有特定限制（如奇数个、偶数个、至少 1 个）”的排列计数场景。本文结合同等学力申硕计算机专业组合数学真题，从核心知识点、真题解析、解题思路总结三部分，系统拆解指数型母函数的应用逻辑。

1. 指数型母函数的定义与本质

- **指数型母函数**（Exponential Generating Function, EGF）针对“排列问题”设计，其形式为：
- 对于序列 $\{a_n\}$ （ a_n 表示 n 个元素的符合条件排列数），对应的指数型母函数为： $G_e(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 。
- **本质**：通过将“元素出现次数限制”转化为对应的幂级数项，利用指数函数的展开式（如 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ）简化计算，最终通过幂级数系数反推排列数 a_n 。

2. 常见元素限制对应的指数型母函数项

解决真题时，需先根据“元素出现次数要求”写出单个元素的指数型母函数项，再将所有元素的指数型母函数项相乘，得到整体的指数型母函数。以下是真题中高频出现的限制及对应指数型母函数项：

元素出现次数限制	对应的指数型母函数项	推导依据（指数函数展开）
无限制（可出现 0 次、1 次、2 次...）	$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \cdots = e^x$	指数函数的泰勒展开式
至少出现 1 次	$\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \cdots = e^x - 1$	无限制项减去“出现 0 次”的项（即 1）
出现偶数次（0 次、2 次、4 次...）	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	利用 $e^x + e^{-x}$ 的展开式消去奇次项
出现奇数次（1 次、3 次、5 次...）	$\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	利用 $e^x - e^{-x}$ 的展开式消去偶次项

3. 核心解题步骤

真题中指数型母函数的应用均遵循“三步法”，步骤固定且可复用：

- (1). 拆解元素限制：明确每个元素的出现次数要求（如“2 出现偶数次、4 出现奇数次”）；
- (2). 构建指数型母函数表达式：根据上述表格，写出每个元素的指数型母函数项，再将所有项相乘得到整体 $G_e(x)$ ；
- (3). 化简并提取系数：利用指数函数运算（如 $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$ ）化简 $G_e(x)$ ，

展开为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 形式，其中 $\frac{a_n}{n!}$ 的系数乘以 $n!$ 即为排列数 a_n 。

二、真题详解：典型例题

【2012 年真题】——数字排列限制问题

题目：用数字 2、4、6、8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个 2、偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数（ $n \geq 2$ ）。(1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $G_e(x)$ ；(2) 求出 a_n 的表达式。

解题步骤：

步骤 1：拆解元素限制

本题涉及 4 个数字（2、4、6、8），需分别明确每个数字的出现次数要求：

- 数字 2：奇数个（1 次、3 次...）；
- 数字 6：偶数个（0 次、2 次...）；
- 数字 8：至少 1 个（1 次、2 次...）；
- 数字 4：无限制（0 次、1 次、2 次...）。

步骤 2：构建指数型母函数表达式

根据“常见指数型母函数项表格”，逐一写出每个数字的指数型母函数项，再相乘：

- 数字 2 的指数型母函数项： $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$ （奇数次）；
- 数字 6 的指数型母函数项： $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ （偶数次）；
- 数字 8 的指数型母函数项： $e^x - 1$ （至少 1 次）；
- 数字 4 的指数型母函数项： e^x （无限制）。

因此，整体指数型母函数为： $G_e(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \cdot (e^x - 1) \cdot (e^x)$ 。

步骤 3：化简并提取系数

- 化简前两项（平方差公式）： $\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) = \frac{(e^{2x} - e^{-2x})}{4}$ ；

- 与后两项相乘： $G_e(x) = \frac{(e^{2x}-e^{-2x})}{4} \cdot (e^x - 1)(e^x) = \frac{(e^{2x}-e^{-2x})}{4} \cdot (e^{2x} - e^x) ;$

- 展开并整理指数项： $G_e(x) = \frac{1}{4}(e^{4x} - e^{3x} + e^{-x} - 1) ;$

- 提取 $\frac{a_n}{n!}$ 的系数：

将 e^{4x} 、 e^{3x} 、 e^{-x} 分别展开为泰勒级数：

➤ $e^{4x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{n!} x^n ;$

➤ $e^{3x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} x^n ;$

➤ $e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n ;$

➤ 常数项“-1”对应 $n=0$ 时的项，不影响 $n \geq 2$ 的排列数。

因此， $G_e(x)$ 中 $\frac{x^n}{n!}$ 的系数为 $\frac{1}{4}[4^n - 3^n + (-1)^n]$ ，乘以 $n!$ 得： $a_n = \frac{1}{4}[4^n - 3^n + (-1)^n] .$

答案：

(1) $G_e(x) = \frac{1}{4}(e^{4x} - e^{3x} + e^{-x} - 1) ;$

(2) $a_n = \frac{1}{4}[4^n - 3^n + (-1)^n] .$

【2023 年真题】——数字排列限制问题

题目：求 1、4、5、8、9 这五个数字构成的 n 位数的个数，规定 4、8 出现的次数均为偶数，而 1、5、9 出现的次数不加限制。

解题步骤：

步骤 1：拆解元素限制

5 个数字分为两类：

- 限制类：4（偶数次）、8（偶数次）；
- 无限制类：1、5、9（无限制）。

步骤 2：构建指数型母函数表达式

- 4、8 的指数型母函数项： $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ （偶数次）；
- 1、5、9 的指数型母函数项：各为 e^x （无限制），共 $e^x \cdot e^x \cdot e^x = e^{3x}$ 。

整体指数型母函数表达式： $G_e(x) = e^{3x} \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 .$

步骤 3：化简并提取系数

- 展开平方项: $(\frac{e^x+e^{-x}}{2})^2 = \frac{e^{2x}+2+e^{-2x}}{4}$;
- 与 e^{3x} 相乘: $G_e(x) = e^{3x} \cdot \frac{e^{2x}+2+e^{-2x}}{4} = \frac{1}{4}(e^{5x} + 2e^{3x} + e^x)$;
- 提取 $\frac{a_n}{n!}$ 的系数: 展开后 $\frac{x^n}{n!}$ 的系数为 $\frac{1}{4}(5^n + 2 \cdot 3^n + 1)$, 乘以 $n!$ 得排列数:

$$a_n = \frac{1}{4}(5^n + 2 \cdot 3^n + 1) .$$

答案: 可组成 $a_n = \frac{1}{4}(5^n + 2 \cdot 3^n + 1)$ 个不同的 n 位数。

【2013 年真题】——涂色问题

题目: 用红、黄、蓝色对 $1 \times n$ 的棋盘方格涂色, 设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h_n (n 是正整数)。(1) 确定 h_n 的指数型生成函数; (2) 求 h_n 。

解题步骤:

步骤 1: 拆解颜色限制

3 种颜色的限制的:

- 红色: 偶数个 (0 次、2 次...);
- 黄色: 至少 1 个 (1 次、2 次...);
- 蓝色: 无限制 (0 次、1 次...).

步骤 2: 构建指数型母函数表达式

- 红色的指数型母函数项: $\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ (偶数次);
- 黄色的指数型母函数项: $e^x - 1$ (至少 1 次);
- 蓝色的指数型母函数项: e^x (无限制)。

整体指数型母函数表达式: $G_e(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2} \cdot (e^x - 1) \cdot e^x$ 。

步骤 3: 化简并提取系数

- 先计算后两项: $(e^x - 1) \cdot e^x = e^{2x} - e^x$;
- 与红色指数型母函数项相乘: $G_e(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2} \cdot (e^{2x} - e^x) = \frac{1}{2}(e^{3x} - e^{2x} + e^x - 1)$;
- 提取系数:
- $\frac{x^n}{n!}$ 的系数为 $\frac{1}{2}(3^n - 2^n + 1)$, 乘以 $n!$ 得: $h_n = \frac{1}{2}(3^n - 2^n + 1)$ 。

答案:

(1) $G_e(x) = \frac{1}{2}(e^{3x} - e^{2x} + e^x - 1)$;

(2) $h_n = \frac{1}{2}(3^n - 2^n + 1)$ 。

三、解题思路总结与高频考点

1. 核心规律提炼

从上述真题可发现，指数型母函数的考察具有极强的“重复性”，核心规律如下：

- **限制类型固定**：90%的真题仅涉及“偶数次、奇数次、至少1次、无限制”4种限制，对应指数型母函数项可直接套用表格；
- **化简逻辑统一**：均需通过“指数函数乘法→合并同类项→泰勒展开”三步化简，无需复杂运算；
- **结果形式一致**：最终排列数 a_n 均为“ $k_1 \cdot m_1^n + k_2 \cdot m_2^n + \cdots + k_t \cdot m_t^n$ ”的线性组合（如 $\frac{1}{4}[4^n - 3^n + (-1)^n]$ ），系数 k_i 由指数型母函数项的化简结果决定。

2. 高频考点提醒

- **“至少1次”的处理**：需注意“至少1次”的指数型母函数项是 $e^x - 1$ ，而非 e^x ，遗漏“-1”会导致结果错误（如2012年真题中8的限制）；
- **指数运算细节**：化简时需熟练掌握 $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$ 、 $(e^x)^k = e^{kx}$ 等公式，避免指数计算错误；
- **n 的取值范围**：部分真题会限定 $n \geq 2$ 或 $n \geq 1$ ，但最终表达式通常对所有 $n \geq 0$ 成立（常数项不影响有效排列数）。

通过以上拆解可见，指数型母函数的真题解法“套路化”明显，只要掌握“限制→指数型母函数项→化简”的三步法，结合高频限制对应的指数型母函数项表格，即可高效求解此类问题。