
Compte rendu

Détermination de la formule

Au précédent cours, on avait simplifié l'équation de la chaleur par : $\frac{d^2T}{dx^2} = 0$

On sait que $\frac{dT}{dx} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{T(x+a) - T(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{T(x) - T(a)}{\Delta x}$

On en déduit donc : $\frac{d^2T}{dx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{T_{j+1} - T_j}{\Delta x} \right) \frac{T_j - T_{j-1}}{\Delta x}$

Ainsi : $\frac{d^2T}{dx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{T_{j-1} - 2T_j + T_{j+1}}{(\Delta x)^2} = 0$

Détermination de la matrice


Avec la formule précédente : $\frac{d^2T}{dx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{T_{j-1} - 2T_j + T_{j+1}}{(\Delta x)^2} = 0$,

On peut déduire que sous forme matriciel cela s'écrit :

$$\begin{pmatrix} 296 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \vdots & \ddots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_0 \\ \vdots \\ T_n \end{pmatrix}$$

Il ne nous reste plus qu'à résoudre le système matriciel à l'aide de python.

On peut également simplement choisir la précision de notre résolution en choisissant la valeur de n.



On obtient donc la courbe :

Conditions limites :

On obtient bien $T_0 = 296.0$ (température initiale)

et $T_n = 0$

Les conditions aux limites sont donc bien respectées