

Grupo	Espécie (Nome Científico e Nome Comum)	Tipo de Informação	Resumo da Informação	Fonte	Link Direto
		Estado de Conservação	Classificado como Vulnerável (VU) no Brasil. A espécie enfrenta ameaças severas no estuário da Lagoa dos Patos devido à captura acidental em redes de pesca "emalhadas" e à poluição por efluentes. A população local é residente e geneticamente distinta, o que exige estratégias de manejo específicas para evitar o declínio demográfico e manter a interação cultural da pesca cooperativa.	ICMBio (2023). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada.	Livro Vermelho (Boto-pescador ainda era classificado como <i>Tursiops truncatus</i> - nº 120) Monitoramento da biodiversidade : Fruet et al (2015) ; Estrutura genética e social
		Nicho Trófico	Alta como predador de tipo de cadeia (glicocívoro). Sua dieta no estuário da Lagoa dos Patos é composta majoritariamente por teleosteos, com preferência pela Tainha (Mugil tzu). A interação com a pesca artesanal facilita o acesso ao alimento, o que demonstra uma plasticidade comportamental única onde o animal utiliza a atividade humana para otimizar seu forrageio.	Simões-Lopes, P. C. et al. (2016)	Fruet et al. (2015) - Clues of cultural
		<i>Tursiops geyrhynus</i> (Boto-pescador / de-Lahille)			
		Ambiente Preferencial	Habita preferencialmente águas costeiras rasas e áreas estuarinas. Em Rio Grande, utiliza intensamente o canal principal do estuário da Lagoa dos Patos, especialmente as áreas próximas aos Molhes da Barra e ao Porto, onde as correntes favorecem a concentração de cardumes.	Lodi e Monteiro-Neto (2012)	Tamarão e Comoposição
		Estratégia Reprodutiva	Possui baixa taxa reprodutiva, com gestação de aproximadamente 12 meses e longos períodos de cuidado parental (2 a 3 anos). Os nascimentos ocorrem principalmente nas estações quentes (primavera/verão). A maturidade sexual é tardia, o que torna a espécie sensível a perdas populacionais.	Fruet et al. (2015)	Fruet et al. (2015)
		Longevidade Média (param. biológicos)	Podem viver até os 40-50 anos de idade. Apresentam corpo robusto com coloração cinza-escuro no dorso, careando em direção ao ventre. Em Rio Grande, o tamanho médio dos adultos varia entre 3,0 e 3,5 metros, sendo ligeiramente maiores que as populações de mar aberto.	Fruet et al. (2015)	Fruet et al. (2015)
Mamíferos Aquáticos	Leão-Marinho-do-Sul (<i>Otaria flavescens</i>)	Estado de Conservação	Classificado como "Pouco Preocupante" (LC) globalmente, mas no Brasil é protegido por Unidades de Conservação como o REVIS da Ilha dos Lobos. As principais ameaças locais incluem a interação negativa com a pesca de emalhe e a ingestão de resíduos sólidos (lixo marinho) descartados no oceano.	IUCN Red List / ICMBio	Livro Vermelho Volume II (Mamíferos)
		Nicho Trófico	Predador de tipo oportunista, dieta generalista, composta por peixes, cefalópodes e crustáceos. Em Rio Grande, é comum observar indivíduos se alimentando de descartes da pesca industrial e artesanal próximos aos Molhes da Barra.	Programa de Monitoramento e Conservação dos Pinnípedes	Monitoramento e Conservação dos Pinnípedes
		Ambiente Preferencial	Águas costeiras e estuarinas. Utiliza áreas de substrato rochoso ou estruturas artificiais (como os Molhes da Barra e o Porto) como locais de repouso (descanso) fora do período reprodutivo.	Fundação Oswaldo Cruz	Fundação Oswaldo Cruz - Ilha dos Lobos e revis
		Estratégia Reprodutiva	Espécie polígama. Forma colônias reprodutivas (harens) principalmente no litoral de Argentina entre dezembro e fevereiro. Os indivíduos que visitam o litoral gaúcho são, em sua maioria, machos em período de dispersão.	Pinnípedes do Sul	Pinnípedes do Sul
		Longevidade Média (param. biológicos)	Dimorfismo sexual acentuado. Machos podem atingir até 2,8 metros e pesar cerca de 300kg, apresentando uma característica "juba" de pelos no pescoço. A longevidade média na natureza é de 18 a 25 anos.	Fundação Oswaldo Cruz (Biotem Informativo)	Fundação Oswaldo Cruz
		Estado de Conservação	Status de "Pouco Preocupante" (LC). No Rio Grande do Sul, a espécie é protegida por lei. O monitoramento de enclaves e estabilidade via GRAM-FURG) é essencial para mitigar impactos de doenças e interações antropológicas na costa sul.		Belgiques da Vida Silvestre
	Lobo-Marinho-Sul-Americano (<i>Arctoccephalus australis</i>)	Nicho Trófico	Carnívoro/Piscívoro. Alimenta-se de uma grande variedade de presas, incluindo peixes demersais e pelágicos, lulas e polvos. Diferencia-se do leão-marinho por realizar mergulhos mais profundos e frequentes para forrageio em mar aberto.	Espécies Prioritárias para a Conservação do Uruguai	Especies Prioritarias
		Ambiente Preferencial	Pelágico e costeiro. Diferente do leão-marinho, prefere áreas mais isoladas e rochosas. No litoral do RS, é encontrado descansando em praias arenosas durante o inverno, frequentemente após períodos de tempestades no Atlântico Sul.	Programa de Monitoramento e Conservação dos Pinnípedes	Monitoramento e Conservação dos Pinnípedes
		Estratégia Reprodutiva	Reprodução ocorre em colônias densas (rockeries) em ilhas no Uruguai (Ex: Ilha de Lobos). O período de nascimento dos filhotes ocorre no verão austral. A espécie exibe forte fidelidade aos sítios reprodutivos.	Espécies Prioritárias para a Conservação do Uruguai	Especies Prioritarias
		Longevidade Média (param. biológicos)	Corpo esguio com focinho pontiagudo e orelhas externas visíveis. Possuem densa camada de subpele. Machos adultos atingem cerca de 1,9 metros, sendo significativamente menores que os leões-marinhos.	Espécies Prioritárias para a Conservação do Uruguai	Especies Prioritarias
		Estado de Conservação	Vulnerável (VU) no Rio Grande do Sul. Ameaçada pela perda de habitat e perturbação em locais de nidificação (praias e bancos de areia).	Aves da Planície Costeira do RS	Ecologia e Conservação de Aves
		Nicho Trófico	Piscívoro especializado. Possui uma técnica única de voar retilineo à água "ortando-a" com a mandíbula inferior para capturar pequenos peixes por	Henrique Cardoso Deflino	Lista de Aves do Parque Nacional da Lagoa do Peixe
Aves Costeiras	Talha-mar (<i>Rynchops niger</i>)	Ambiente Preferencial	Estuários, lagoas e praias arenosas. Prefere águas calmas para facilitar o	Aves da Planície Costeira do RS	Ecologia e Conservação de Aves
		Estratégia Reprodutiva	Nidifica em colônias no solo (bancos de areia). O período reprodutivo ocorre no verão. Os ovos e filhotes são muito camuflados na areia.	Henrique Cardoso Deflino	Lista de Aves do Parque Nacional da Lagoa do Peixe
		Longevidade Média	Envergadura de até 110 cm. A característica mais marcante é a mandíbula inferior ser mais longa que a superior. Longevidade média de 15 anos.	Wiki Aves	wikiaves
		Estado de Conservação	Pouco Preocupante (LC). É uma espécie protegida e importante para o equilíbrio de banhados e áreas úmidas da planície costeira.	Henrique Cardoso Deflino	Lista de Aves Ecologia e Conservação das Aves
		Nicho Trófico	Carnívoro generalista. Alimenta-se de peixes, anfíbios, répteis e até pequenos mamíferos ou grandes insetos em áreas alagadas.	Livro Vermelho SP 2009	Ciconia Maguari
		Jóio Grande / Maguari (<i>Ciconia Maguari</i>)	Ambiente Preferencial	Aves da Planície Costeira do RS	Ecologia e Conservação de Aves
	Pernilongo-de-costas-brancas (<i>Himantopus melanurus</i>)	Estratégia Reprodutiva	Controla ninhos grandes e circulares feitos de gravetos, geralmente em cima de arbustos ou vegetação de banhado. Põe de 2 a 4 ovos.	Livro Vermelho SP 2009	Ciconia Maguari
		Longevidade Média	Uma das maiores aves da região, podendo atingir 1,20m de altura e 1,45m de envergadura. Plumagem branca com pontas das asas pretas.	Livro Vermelho SP 2009	Ciconia Maguari
		Estado de Conservação	Pouco Preocupante (LC). Muito comum em toda a região estuarina, sendo um bom indicador da saúde de áreas de marinha.	Aves da Planície Costeira do RS	Ecologia e Conservação das Aves
		Nicho Trófico	Invertebrado/Carnívoro. Alimenta-se de pequenos crustáceos, larvas de insetos e moluscos que encontra no lodo ou águas rasas.	Aves de áreas úmidas	Aves de Áreas úmidas
		Ambiente Preferencial	Nárficas, margens de lagoas e áreas de salina com águas muito rasas.	Aves de áreas úmidas	Aves de Áreas úmidas
		Estratégia Reprodutiva	nidifica em pequenas depressões no solo, perto da água. Defende o ninho com muita agressividade, fazendo voos rasantes contra intrusos.	Aves de áreas úmidas	Aves de Áreas úmidas
Camarão-Rosa (<i>Farfantepenaeus paulsenis</i>)		Longevidade Média	Possui pernas rostradas extremamente longas e finas em proporção ao corpo. Bico fino e reto, ideal para sondar o sedimento.	Wiki Aves	Wiki Aves
		Estado de Conservação	Não avaliado (NE) pela IUCN, mas sujeito a períodos de defeso rigorosos pelo IBAMA/ICMBio devido à pressão da pesca artesanal e industrial no estuário.	Ruas, V. M.; Dumont, L. F.; D'Incao, F. (FURG)	Laboratório de Crustáceos Decápodes da FURG
		Nicho Trófico	Omnívoro/Deitritívoro. Alimenta-se de detritos orgânicos, pequenos poliquetas e algas presentes no sedimento do estuário.	D'Incao, F. (FURG)	Produção do Camarão Rosa
		Ambiente Preferencial	Estuário e marinho. As larvas entram no Estuário da Lagoa dos Patos para crescer nas áreas de marinha (soto) antes de retornarem ao mar para reproduzir.	D'Incao, F. (FURG)	Produção do Camarão Rosa
		Estratégia Reprodutiva	Ciclo de vida dependente do estuário. A reprodução ocorre em mar aberto (águas profundas), e as pós-larvas migram para dentro da lagoa para se desenvolver.	D'Incao, F. (FURG)	Produção do Camarão Rosa
		Longevidade Média	Pensu carapaça lisa e coloração rosada. Pode atingir até 18-20 cm de comprimento total. A longevidade é curta, geralmente em torno de 2 anos.	D'Incao, F. (FURG)	Produção do Camarão Rosa
Siri-azul (<i>Callinectes sapidus</i>)		Estado de Conservação	Pouco Preocupante (LC). É uma espécie muito resiliente, mas sensível a picos de poluição e mudanças bruscas na salinidade da água.	Oliveira, A.; Pêto, T. K.; Santos, D. P. D.; D'Incao, F. (2006).	Dieta Natural do Siri Azul
		Nicho Trófico	Carnívoro/Neóctico. É um predador ativo de pequenos peixes e outros invertebrados, mas também atua na limpeza do sistema ao consumir matéria orgânica morta.	Ferreira, L. S.; Barros, A.; Barut, R. A.; & D'Incao, F. (2012).	Laboratório de Crustáceos
		Ambiente Preferencial	Águas estuarinas e costeiras. Prefere fundos lodosos ou arenosos, sendo muito comum em toda a extensão do Porto de Rio Grande.	Ferreira, L. S.; Barros, A.; Barut, R. A.; & D'Incao, F. (2012).	Laboratório de Crustáceos

Invertebrados Bentônicos		Estratégia Reprodutiva	As fêmeas (chamadas de "ovadas") migram para águas mais salinas (próximas aos Molhes) para liberar as larvas, que precisam de maior salinidade para sobreviver.	Olivera, A.; Pinto, T. K.; Santos, D. P. D., D'Incao, F. (2006).	Dieta Natural do Siri Azul
		Longevidade Média	Caracteriza-se pelos últimos pares de patas em formato de "remo" para natação e extremidades das pinças azuladas. Largura da carapaça chega a 20 cm.	Olivera, A.; Pinto, T. K.; Santos, D. P. D., D'Incao, F. (2006).	Dieta Natural do Siri Azul
	Caranguejo-chama-maré (Uca mordax)	Estado de Conservação	Não avaliado (NE). São fundamentais para a saúde dos manguezais e marismas, ajudando na aeração do solo através da construção de tocas.	Pinheiro, M. A. A. et al. (2016). Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil - Avaliação 2010-2014 e Livro Vermelho dos Invertebrados	Livro Vermelho dos Crustáceos ; Livro Vermelho, Volume VII - Invertebrados
		Nicho Trófico	Detritívoro. "Filtra" o sedimento lamoso para retirar nutrientes orgânicos e microalgas, formando pequenas bolinhas de areia/todo após a alimentação.	Pinheiro, M. A. A. et al. (2016). Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil- Avaliação 2010-2014	Livro Vermelho dos Crustáceos
		Ambiente Preferencial	Zonas entre-marés (intertidal) de marismas e margens de canais. É aquele caranguejo que vemos aos milhares nas margens fofosas perto da ilha dos Marinheiros.	Pinheiro, M. A. A. et al. (2016). Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil- Avaliação 2010-2014	Livro Vermelho dos Crustáceos
		Estratégia Reprodutiva	Durante o acasalamento, o macho acena com sua pinça maior (daí o nome chama-maré) para atrair a fêmea para sua toca.	Pinheiro, M. A. A. et al. (2016). Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil- Avaliação 2010-2014	Livro Vermelho dos Crustáceos
		Longevidade Média	Dimorfismo sexual marcante: o macho possui uma das pinças muito maior que a outra. Tamanho pequeno, com carapaça em torno de 2 a 3 cm.	Pinheiro, M. A. A. et al. (2016). Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil- Avaliação 2010-2014	Livro Vermelho dos Crustáceos