

Mamíferos Aquáticos

Conservação:
Vulnerável (VU)

Boto – Pescador *Tursiops gephyreus* (Boto-pescador / de-Lahille)

Sendo ameaçados pela captura acidental em redes de pesca e a poluição por efluentes e sonora do Estuário

Habitando águas costeiras rasas e áreas estuarinas, em RG usa muito o canal principal da Lagoa dos Patos, perto dos molhes da Barra e Porto.

É um predador de topo que no Estuário da Lagoa do Patos é onde se alimenta principalmente de Tainha. Em Rio Grande, faz a famosa pesca cooperativa com os pescadores artesanais, facilitando o acesso à tainha (*Mugil liza*).

Curiosidade: São animais longevos, vivem entre 40–50 ano, mas com uma baixa taxa reprodutiva, uma gestação de 12 meses com o filhote recebendo cuidados por até 3 anos.



Mamíferos Aquáticos

Conservação:
Pouco Preocupante (LC)

Leão-Marinho-do-Sul *Otaria flavescens* (Leão-Marinho-da-Patagônia)

Localmente é protegido por Unidades de Conservação, como o REVIS dos Lobos, devido a ameaças como a ingestão de lixo marinho e interações negativas com a pesca.

Vive em águas costeiras e estuarinas, utiliza frequentemente estruturas como os Molhes da Barra em Rio Grande para descansar fora do período reprodutivo.

É um predador de topo oportunista, com uma dieta variada (peixes, cefalópodes e crustáceos). Em Rg é comum observar indivíduos se alimentando de descartes de pesca industrial e artesanal.

Curiosidade: É uma espécie polígama que forma colônias reprodutivas (harens) no Uruguai e Argentina, Os que visitam o litoral gaúcho na maioria são machos em período de dispersão, que são muito maiores que as fêmeas, podem chegar até 350kg, e possuem uma “juba” no pescoço



Mamíferos Aquáticos

Lobo-Marinho-Sul-Americano

Arctocephalus australis

Conservação:
Pouco Preocupante (LC)

No RS, a espécie é protegida por Lei. O monitoramento de encalhes e reabilitação via CRAM-FURG é essencial para reduzir impactos de doenças e interações humanas negativas na costa Sul

Diferente do **Leão-Marinho** preferem ambientes pelágicos, longe do fundo (não dependem dos fundos marinhos), rochosos e isolados. É encontrado descansando em praias e costões rochosos do litoral gaúcho durante o inverno.

É um carnívoro que se alimenta de uma grande variedade de presas, peixes demersais (perto ou no fundo do mar) e pelágicos (mar aberto, entre a superfície e o fundo do oceano).

Se diferencia do leão por realizar mergulhos mais profundos e frequentes pra forrageio em mar aberto.

Curiosidade: Reprodução em colônias densas (Rookeries) no Uruguai (Isla de Lobos), sendo muito fiéis aos seus sítios reprodutivos. Também possuem uma densa camada de subpelo que os protege do frio extremo.



Aves Costeiras

Conservação:
Vulnerável (VU)


Vulnerável no Rio Grande do Sul. As principais ameaças são a perda de habitat e a perturbação nos locais de nidificação em praias e bancos de areia.

É um piscívoro especializado em uma técnica única: de voar rente à água com a mandíbula inferior submersa para capturar pequenos peixes por tato.

Prefere viver em estuários, lagunas e praias arenosas com águas calmas, que facilitam a técnica de caça. É comum observá-los em bandos descansando em bancos de areia no estuário da Lagoa dos Patos.

Curiosidade: Formam ninhos em colônias diretamente no solo arenoso durante o verão. Seus ovos e filhotes possuem uma camuflagem perfeita com a areia, que os protege de predadores, mas os torna vulneráveis ao pisoteio humano e de veículos.

Talha Mar *Rynchops niger*



Aves Costeiras

Conservação:
Pouco Preocupante (LC)

É considerada uma espécie protegida e fundamental para o equilíbrio ecológico das áreas úmidas da planície costeira do Rio Grande do Sul.

É um carnívoro generalista e importante controlador biológico nas áreas úmidas. Alimenta-se de uma grande variedade de presas, como peixes, anfíbios, répteis e grandes insetos em áreas alagadas.

Habita preferencialmente banhados, campos alagados e margens de lagunas. É uma presença constante na região da Laguna dos Patos, especialmente em áreas de restinga e banhados de Mostardas (Lagoa do Peixe) e Rio Grande

Curiosidade: Constrói ninhos volumosos feitos de gravetos, geralmente em cima de arbustos ou vegetação de banhado. É uma das maiores aves da nossa região, podendo atingir até 1,20m de altura e uma envergadura de quase 1,50m.

João Grande (Maguari) *Ciconia Maguari*



Aves Costeiras

Pernilongo de costas brancas

Himantopus Melanurus

Conservação:
Pouco Preocupante (LC)

Muito comum em toda a região estuarina, sendo um bom indicador da saúde de áreas de marisma. É uma espécie fundamental para programas de educação ambiental e observação de aves no Rio Grande do Sul.

Atua como um consumidor secundário, carnívoro, em áreas úmidas. Se alimenta de pequenos crustáceos, larvas de insetos e moluscos que encontra no lodo ou em águas rasas.

Habita marismas, margens de lagoas e áreas de salina com águas muito rasas. Comum também na Lagoa do Peixe.

Curiosidade: Constrói ninhos em pequenas depressões no solo, próximo à água. É conhecido por sua grande agressividade ao defender o ninho, realizando voos rasantes e emitindo gritos altos contra intruso.



Invertebrados Bentônicos

Camarão-Rosa *Farfantepenaeus paulensis*

Conservação:
Não avaliado (NE)

Não avaliado pela IUCN, mas sujeito a períodos de defeso rigorosos pelo IBAMA/ICMBio devido à intensa pressão da pesca artesanal e industrial no estuário

Um onívoro/detritívoro que se alimenta de detritos orgânicos, pequenos poliquetas e algas presentes no sedimento. Ele desempenha um papel vital na reciclagem de nutrientes e serve como base alimentar para diversas espécies de peixes e aves.

Vive em Estuarino e marinho. As larvas entram no estuário da Lagoa dos Patos e utilizam as áreas de marisma (berçários/rasos) para crescer antes de retornarem ao mar para se reproduzir.

Curiosidade: Apresenta um ciclo de vida complexo, em que nasce em no mar aberto, águas oceânicas profundas, e as pós-larvas migram para o estuário para se desenvolver, buscando abrigo e alimento abundante nas águas rasas e protegidas.



Invertebrados Bentônicos

Conservação:
Pouco Preocupante (LC)

No entanto, é uma espécie resiliente mas sensível a picos de poluição e mudanças bruscas na salinidade da água, com grande importância socioeconômica para a pesca artesanal de Rio Grande, exigindo gestão constante para evitar a sobrepesca.

Atua como um predador generalista e oportunista(carnívoro/Necrófago) de pequenos peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados, além de atuar na limpeza do ecossistema ao consumir matéria orgânica em decomposição.

Habita o fundo (bentos) de águas estuarinas e costeiras rasas. Prefere fundos lodosos ou arenosos. É extremamente adaptado à Laguna dos Patos, utilizando tanto as áreas de marisma quanto o canal principal para forrageio.

Curiosidade: É um nadador ágil graças ao seu último par de patas, que tem formato de remo. As fêmeas realizam migrações reprodutivas em direção a águas com maior salinidade para a eclosão das larvas.

Siri-Azul *Callinectes sapidus*



Invertebrados Bentônicos

Caranguejo-chama-maré

Uca mordax

Conservação:
Não Avaliado (NA)

Não avaliado na tabela de invertebrados marinhos. Apesar disso, sua sobrevivência está diretamente ligada à preservação dos habitats costeiros, que sofrem pressão pela urbanização e poluição.

Atua como um importante detritívoro, se alimenta filtrando a lama para retirar nutrientes orgânicos e microalgas presente no lodo. Ao escavar suas tocas, ele promove a bioturbação, oxigenando o solo e facilitando a ciclagem de nutrientes nas marismas.

Habita áreas de entremarés, de marismas e margens de canais. É fundamental para a saúde do solo através da construção de tocas. Em Rio Grande, é uma espécie chave para a saúde das zonas úmidas estuarinas.

Curiosidade: O nome "chama-maré" vem do movimento que o macho faz com sua pinça maior (quelípodo) para atrair fêmeas e defender território. Esse comportamento de "acenar" é uma forma complexa de comunicação visual.

