6.1 – LOAD AND GO

4. Necessidade de transporte imediato:Load and Go - ITO 23

i. Má impressão geral;
ii. Irresponsivo (não responde, não tosse, nem geme);
iii. Responsivo, mas não obedece a comando;
iv. Respiração difícil;
v. Pneumotórax hipertensivo;
vi. Eviscerações;
vii. Trauma combinado com:
    1. Antecedentes médicos relevantes;
    2. Idade maior que 55 anos;
    3. Hipotermia;
    4. Queimaduras;
    5. Gravidez.
viii. Estado de choque – hipoperfusão;
ix. TCE com ECG < 10;
x. Amputação acima do pulso ou tornozelo;
xi. Fratura de fêmur bilateral;
xii. Instabilidade pélvica;
xiii. Hipotensão mantida PAS <90 mmHg;
xiv. Obstrução que não pode ser removida de forma mecânica;
xv. Parto complicado;
xvi. Dor torácica, com PA sistólica menor que 100 mmHg;
xvii. Hemorragia descontrolada – exanguinante;
xviii. Dor severa em qualquer parte do corpo;
xix. Incapacidade para mover qualquer parte do corpo;
xx. Qualquer condição que impeça a vítima de respirar e o SAV não se faz presente;
xxi. Qualquer outro caso em que a vítima esteja instável ou com lesão grave.