

DORU PĂUNESCU  
LIVIU CĂDARIU  
MARIA JIVULESCU  
CAMELIA ARIEȘANU  
ANANIA GÎRBAN  
ADINA JURATONI  
CAMELIA PETRIȘOR  
NICOLAE LUPA

ROMEO NEGREA  
GHEORGHE MOZA  
TUDOR BÎNZAR  
CRISTIAN LĂZUREANU  
OLIVIA BUNDĂU  
CIPRIAN HEDREA  
ANDREI ECKSTEIN  
EMANUEL CISMAŞ

**CULEGERE DE PROBLEME  
DE MATEMATICĂ**  
**pentru examenul  
de admitere din anul 2023 la**  
**UNIVERSITATEA POLITEHNICA**  
**TIMIȘOARA**

**EDITURA POLITEHNICA  
2023**



## PREFATĂ

Prezenta culegere de probleme de matematică se adresează cu precădere elevilor de liceu care urmează o pregătire sistematică pentru examenul de admitere la o parte din Facultățile Universității Politehnica Timișoara. Cunoscut fiind faptul că una dintre disciplinele fundamentale în pregătirea unui viitor inginer este matematica, rezolvarea problemelor propuse conduce la dezvoltarea competențelor necesare viitorului student la Politehnica.

Problemele propuse acoperă în mare măsură conținuturile impuse prin programele analitice de Ministerul Educației Naționale. În același timp s-a ținut cont și de manualele alternative de matematică utilizate în circuitul liceal.

Deși problemele propuse sunt de tip grilă cu șase răspunsuri, doar unul fiind corect, o parte din ele urmăresc tipurile de probleme date la probele de matematică ale examenului de Bacalaureat din ultimii ani. Din acest motiv prezenta culegere poate fi utilizată și la pregătirea examenului de Bacalaureat dar și a unor concursuri școlare.

Ca structură, cartea are cinci părți: *Un rezumat al cunoștințelor dobândite la liceu*, *Probleme de algebră*, *Probleme de trigonometrie și geometrie plană*, *Probleme de analiză matematică*, respectiv în final *Subiectele date la admitere în anii 2014 – 2022 cu rezolvările integrale*.

Rezumatul cunoștințelor dobândite în liceu e necesar absolvenților care vin din diverse licee cu pregătire matematică inegală. Mai mult, acest rezumat se va dovedi util studenților din anul întâi care vor avea astfel un punct de referință pentru valoarea adăugată de cursurile universitare. Problemele propriu zise se regăsesc în părțile doi, trei și patru ale volumului.

Autorii



# Cuprins

<b>UN REZUMAT AL CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE LA LICEU</b>	<b>1</b>
<b>PROBLEME DE ALGEBRĂ (simbol AL)</b>	<b>85</b>
<b>PROBLEME DE TRIGONOMETRIE ȘI GEOMETRIE PLANĂ (simbol TG)</b>	<b>169</b>
<b>PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ (simbol AM)</b>	<b>187</b>
<b>ANEXE</b> Subiectele date la admitere în anii 2014 - 2022 cu rezolvările integrale	258
<b>BIBLIOGRAFIE</b>	<b>343</b>



**UN REZUMAT AL  
CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE  
LA LICEU**

# ALGEBRĂ

## Formule de calcul prescurtat

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a+b+c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \\ a^2 - b^2 &= (a-b)(a+b)\end{aligned}$$

$a^2 + b^2$  nu se poate descompune în  $\mathbb{R}$

$$a^2 + b^2 = (a - ib)(a + ib) \text{ în } \mathbb{C}$$

$$x^2 - (a+b)x + ab = (x-a)(x-b)$$

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2) \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2)\end{aligned}$$

$$x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc = (x-a)(x-b)(x-c)$$

$$a^n - b^n = (a-b) \underbrace{(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})}_{n \text{ termeni}}$$

$$a^{2p+1} + b^{2p+1} = (a+b) \underbrace{(a^{2p} - a^{2p-1}b + \dots - ab^{2p-1} + b^{2p})}_{2p+1 \text{ termeni}}$$

*Progresii aritmetice și progresii geometrice*

Progresia aritmetică

	$\bullet \quad a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$	$\bullet \bullet \quad a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$
Term. gen.	$a_n = a_1 + r \cdot (n-1) \quad (r \neq 0)$	$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \quad (q \neq 0; 1)$
Rația	$r = a_{k+1} - a_k$	$q = \frac{a_{k+1}}{a_k} \quad (a_k \neq 0)$
Suma	$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ $S_n = \frac{(a_n + a_1) \cdot n}{2} \quad (S_1 = a_1)$ $a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}$	$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ $S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad (S_1 = a_1)$ $a_k = \sqrt{a_{k-1} \cdot a_{k+1}} \quad (q > 0, \quad a_1 > 0)$

## Functii

Fie  $A$  și  $B$  două mulțimi nevide; se numește *funcție* definită pe  $A$  cu valori în  $B$  orice lege de corespondență (relație) care asociază fiecărui element  $x \in A$  un unic element  $y \in B$ .

Notația " $f : A \rightarrow B, y = f(x)$ " se citește "funcția  $f$  definită pe  $A$  cu valori în  $B$  de relația  $y = f(x)$ ".

Mulțimea  $A$  este domeniul de definiție al funcției  $f$  iar mulțimea  $B$  reprezintă domeniul de valori al acesteia.

Mulțimea  $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\}$  poartă numele de *grafic* al funcției.

### *Functii bijective*

Funcția  $f : A \rightarrow B$  este *injectivă* dacă și numai dacă este îndeplinită următoarea proprietate:

$$(\forall) x_1, x_2 \in A \text{ din } x_1 \neq x_2 \text{ rezultă } f(x_1) \neq f(x_2).$$

În practică, pentru dovedirea injectivității, această formă a definiției poate fi dificil de utilizat. Este preferată formularea (logic echivalentă)

$$(\forall) x_1, x_2 \in A \text{ din } f(x_1) = f(x_2) \text{ rezultă } x_1 = x_2.$$

Dacă există cel puțin o pereche de elemente  $x_1, x_2$  din domeniul de definiție  $A$  cu  $x_1 \neq x_2$  dar  $f(x_1) = f(x_2)$  atunci funcția  $f$  nu este injectivă.

*Interpretarea geometrică a injectivității* pentru funcții reale ( $B \subset \mathbb{R}$ ) de variabilă reală ( $A \subset \mathbb{R}$ ) este sugestivă:

$f : A \rightarrow B$  este injectivă d.d. orice dreaptă paralelă axei  $Ox$  prin punctele  $y \in B$ , întâlneste graficul funcției  $f$  în cel mult un punct.

*Imaginea* funcției  $f : A \rightarrow B$  este submulțimea domeniului de valori  $B$  alcătuită din toate elementele de forma  $y = f(x)$ :

$$\text{Im}(f) = \{y \in B \mid (\exists) x \in A \text{ a.î. } y = f(x)\}.$$

Funcția  $f : A \rightarrow B$  este *surjectivă* dacă și numai dacă  $\text{Im}(f) = B$  sau, altfel spus,

$$(\forall) y \in B \text{ ecuația } y = f(x) \text{ are cel puțin o soluție } x \in A.$$

*Interpretarea geometrică a surjectivității* pentru funcții reale ( $B \subset \mathbb{R}$ ) de variabilă reală ( $A \subset \mathbb{R}$ ):

$f : A \rightarrow B$  este surjectivă d.d. orice dreaptă paralelă axei  $Ox$  prin punctele  $y \in B$ , întâlneste graficul funcției  $f$  în cel puțin un punct.

Funcția  $f : A \rightarrow B$  este *bijectivă* dacă și numai dacă  $f$  este și injectivă și surjectivă.

*Interpretarea geometrică a bijectivității* pentru funcții reale ( $B \subset \mathbb{R}$ ) de variabilă reală ( $A \subset \mathbb{R}$ ):



$f : A \rightarrow B$  este bijectivă d.d. orice dreaptă paralelă axei  $Ox$  prin punctele  $y \in B$ , întâlneste graficul funcției  $f$  într-un singur punct.

### Componerea funcțiilor

Fie funcțiile  $f : A \rightarrow B$  și  $g : B \rightarrow C$  definite prin relațiile  $y = f(x)$ , respectiv  $z = g(y)$ . Funcția ce asociază fiecărui element  $x$  din mulțimea  $A$  elementul  $z = g(f(x))$  din mulțimea  $C$  se numește *funcție compusă* și se notează prin  $g \circ f$ . Mai precis,  $g \circ f : A \rightarrow C$  este definită prin

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Evident, ordinea în care se efectuează operația de compunere nu este aleatoare, ci este bine determinată: domeniul de definiție al funcției  $g$  (pe prima poziție în expresia  $g \circ f$ ) trebuie să coincidă cu domeniul de valori al funcției  $f$  (situată pe poziția secundă).



### Funcții inversabile

Funcția  $f : A \rightarrow B$  este *inversabilă* dacă și numai dacă există o funcție  $f^{-1} : B \rightarrow A$  ce verifică relațiile

$$(f \circ f^{-1})(y) = y \quad (y \in B) \quad \text{și} \quad (f^{-1} \circ f)(x) = x \quad (x \in A).$$

Funcția  $f^{-1} : B \rightarrow A$ ,  $x = f^{-1}(y)$  se numește *inversa* funcției  $f : A \rightarrow B$ ,  $y = f(x)$ .

#### *Teorema*

Funcția  $f : A \rightarrow B$  este inversabilă d.d. este bijectivă.

*Interpretarea geometrică a inversabilității* pentru funcții reale ( $B \subset \mathbb{R}$ ) de variabilă reală ( $A \subset \mathbb{R}$ ):

$f : A \rightarrow B$  este inversabilă d.d. orice dreaptă paralelă axei  $Ox$  prin punctele  $y \in B$ , întâlneste graficul funcției  $f$  într-un singur punct.

Grafcile funcției  $f$  și a funcției inverse  $f^{-1}$ , reprezentate în același sistem de axe, sunt simetrice față de prima bisectoare.

## **Principiul inducției matematice**

#### *Problemă*

Să se arate că propoziția  $\mathbf{P}(n)$  este adevărată pentru orice  $n \geq n_0$ , ( $n_0, n \in \mathbb{N}$ ).

*Etapa I VERIFICAREA* Se dovedește că  $\mathbf{P}(n_0)$  este adevărată .

#### *Etapa a-II-a PASUL INDUCTIV*

Presupunem că  $\mathbf{P}(k)$  este adevărată .

Demonstrăm, utilizând presupunerea, că  $\mathbf{P}(k + 1)$  este adevărată .

În final,  $\mathbf{P}(n_0)$  fiind adevărată (fapt verificat la etapa I), rezultă că  $\mathbf{P}(n_0 + 1)$  este de asemenea adevărată (consecință a pasului inductiv). Mai departe, conform pasului inductiv, și propoziția  $\mathbf{P}(n_0 + 2)$  este adevărată și aşa mai departe,  $\mathbf{P}(n)$  este adevărată pentru orice  $n = n_0 + m$ ,  $m \in \mathbb{N}$ .

## **Sume remarcabile (1)**

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + n &= \frac{n \cdot (n + 1)}{2} \\ 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 &= \frac{n \cdot (n + 1) \cdot (2n + 1)}{6} \\ 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 &= \left[ \frac{n \cdot (n + 1)}{2} \right]^2 \end{aligned}$$

## **Binomul lui Newton**

#### *Permutări*

$P_n$  = "numărul sistemelor ordonate ce se pot forma cu  $n$  elemente date"

$$\begin{aligned}
 P_n &= n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n \\
 n! &= (n-1)! \cdot n ; \quad n! = (n-2)! \cdot (n-1) \cdot n ; \\
 (n+1)! &= n! \cdot (n+1) ; \quad 0! = 1
 \end{aligned}$$

*Aranjamente*

$A_n^m$  = "numărul sistemelor ordonate de m elemente ce se pot forma cu n elemente date"

$$\begin{aligned}
 A_n^m &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-m+1) \\
 A_n^m &= \frac{n!}{(n-m)!} \\
 A_n^0 &= 1 ; \quad A_n^1 = n ; \quad A_n^n = n!
 \end{aligned}$$

*Combinări*

$C_n^m$  = "numărul submulțimilor de m elemente ce se pot forma cu n elemente date"

$$\begin{aligned}
 C_n^m &= \frac{A_n^m}{P_m} ; \quad C_n^m = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-m+1)}{m!} ; \\
 C_n^m &= \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} .
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_n^0 &= C_n^n = 1 ; \quad C_n^1 = C_n^{n-1} = n ; \\
 C_n^2 &= C_n^{n-2} = \frac{n \cdot (n-1)}{2} ; \quad C_n^k = C_n^{n-k} (\quad k \leq n \quad).
 \end{aligned}$$

(formula combinărilor complementare)

$$C_n^k = \frac{n}{k} \cdot C_{n-1}^{k-1} ; \quad C_n^k = \frac{k+1}{n-k} \cdot C_n^{k+1} ;$$

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k .$$

*Triunghiul lui Pascal* (calculul rapid al tuturor combinărilor  $C_n^r$ )

$n = 1$										$C_1^r$
$n = 2$		1 ↘		1 ↘	2 ↘	1 ↘				$C_2^r$
$n = 3$	1		3		3		1			$C_3^r$
$n = 4$	1	4		6		4	1			$C_4^r$
$n = 5$	1	5	10		10	5	1			$C_5^r$
$n = 6$	1	6	15	20		15	6	1	$C_6^r$	

*Binomul lui Newton*

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot y^k$$

$$(x - y)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot y^k$$

(suma conține  $n + 1$  termeni)

$$\begin{aligned} T_{k+1} &= C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot y^k \\ T_{k+1} &= (-1)^k C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot y^k \end{aligned}$$

(termenul general al dezvoltării , cel de-al  $k + 1$ -termen din dezvoltare)

$$\frac{T_{k+2}}{T_{k+1}} = \pm \frac{n - k}{k + 1} \cdot \frac{y}{x}$$

**Sume remarcabile (2)**

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n = 2^n$$

Numărul submulțimilor unei mulțimi finite cu  $n$  elemente este  $2^n$ .

$$C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + C_n^4 - C_n^5 + \dots = 0$$

$$C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = 2^{n-1}$$

$$C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots = 2^{n-1}$$

### *Functii cu domeniul si codomeniul multimi finite*

Fie  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$  si  $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$  două multimi cu  $m$  și respectiv  $n$  elemente (distincte), iar  $f : X \rightarrow Y$  o funcție arbitrară.

- a) Numărul funcțiilor  $f : X \rightarrow Y$  este  $n^m$ .
- b) Dacă  $m \leq n$  atunci numărul funcțiilor injective  $f : X \rightarrow Y$  este

$$A_n^m = n(n-1)\dots(n-m+1).$$

Dacă  $m > n$  atunci nu pot exista funcții injective  $f : X \rightarrow Y$ .

- c) Dacă  $f : X \rightarrow Y$  este bijectivă atunci  $m = n$ .

Dacă  $m = n$  și  $f : X \rightarrow Y$  este injectivă atunci  $f : X \rightarrow Y$  este bijectivă.

Dacă  $m = n$  și  $f : X \rightarrow Y$  este surjectivă atunci  $f : X \rightarrow Y$  este bijectivă.

- d) Numărul funcțiilor bijective  $f : X \rightarrow Y$  este  $P_n = n!$ .

### **Functia de gradul întâi**


$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b \quad (a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad b \in \mathbb{R})$$

Graficul funcției de gradul întâi este dreapta  $y = ax + b$  ce taie axele de coordonate în punctele  $\left(-\frac{b}{a}, 0\right)$  și  $(0, b)$ .

Soluția ecuației de gradul întâi  $ax + b = 0$  este abscisa punctului în care graficul funcției intersectează axa  $Ox$ :  $x = -\frac{b}{a}$ .

Numărul  $a$ , coeficientul director al funcției de gradul întâi, este panta dreptei  $y = ax + b$  și reprezintă tangenta unghiului  $\theta$  pe care dreapta îl face cu semiaxa pozitivă  $Ox$ , măsurat în sens direct trigonometric:  $a = \operatorname{tg} \theta$ .

Semnul coeficientului director  $a$  determină monotonia funcției.



Dacă  $a < 0$  funcția este strict descrescătoare:  $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ .

Dacă  $a > 0$  funcția este strict crescătoare:  $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ .

Semnul funcției de gradul întâi este constant pe intervalele  $\left(-\infty, -\frac{b}{a}\right)$  și  $\left(-\frac{b}{a}, +\infty\right)$ ; practic, semnul funcției este determinat de semnul coeficientului director  $a$ .

$x$	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	semn contrar lui $a$	0	semnul lui $a$

### Funcția de gradul al doilea

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b, c \in \mathbb{R})$$


Forma canonica a expresiei de gradul al doilea se obtine prin izolarea variabilei  $x$  într-un pătrat perfect:

$$ax^2 + bx + c = a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] \quad \text{unde } \Delta = b^2 - 4ac$$

Graficul funcției de gradul al doilea este o parabolă având vârful în punctul  $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$  și axa de simetrie  $x = -\frac{b}{2a}$ , paralelă cu  $Oy$ . Parabola intersectează axa  $Oy$  în punctul  $(0, c)$ .

Dacă  $a > 0$ , vârful  $V$  este punct de *minim al graficului funcției*, iar dacă  $a < 0$  atunci vârful  $V$  este punct de *maxim al graficului funcției*.

Intervalurile  $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right]$  și  $\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$  se numesc *intervale de monotonie* ale funcției de gradul doi.



Intersecția cu axa  $Ox$  depinde însă de natura rădăcinilor ecuației de gradul al doilea  $ax^2 + bx + c = 0$ :

i) Dacă  $\Delta < 0$  atunci  $ax^2 + bx + c$  este o sumă de pătrate și nu se poate descompune în  $\mathbb{R}$ ; ecuația *nu are rădăcini reale* iar parabola (graficul funcției de gradul al doilea) nu întâlnește axa  $Ox$ .

ii) Dacă  $\Delta = 0$  atunci  $ax^2 + bx + c$  se restrânge la un pătrat; ecuația *are o singură rădăcină reală* (dublă)  $x = -\frac{b}{2a}$  iar parabola este tangentă axei  $Ox$ .

iii) Dacă  $\Delta > 0$  atunci  $ax^2 + bx + c$  este diferență de pătrate și se descompune<sup>1</sup> după cum urmează:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad \text{unde} \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a};$$

<sup>1</sup> Formula de descompunere rămâne valabilă chiar dacă  $\Delta < 0$ ; în acest caz  $\sqrt{\Delta} = \sqrt{-(-\Delta)} = i\sqrt{-\Delta}$  iar rădăcinile  $x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$  sunt numere complexe.

ecuația are două rădăcini reale distincte  $x_1$  și  $x_2$ , abscisele punctelor în care parabola întâlnește axa  $Ox$ .

Semnul funcției de gradul al doilea este determinat de poziția graficului (a parbolei) față de axa  $Ox$ . Cele șase situații descrise mai sus evidențiază rolul coeficientului director  $a$  și al discriminantului  $\Delta$  în studiul semnului. Practic, funcția de gradul al doilea are semnul coeficientului director  $a$  cu o singură excepție: dacă discriminantul  $\Delta$  este strict pozitiv; în acest caz, *pe intervalul situat între rădăcini, funcția are semn contrar lui  $a$* .

**i)** Dacă  $\Delta < 0$  atunci funcția de gradul al doilea are același semn pe întreaga axă reală:

$x$		$-\infty$		$+\infty$
$ax^2 + bx + c$				semnul lui $a$

**ii)** Dacă  $\Delta = 0$  atunci funcția de gradul al doilea are același semn pe întreaga axă reală cu excepția unui singur punct, în care se anulează:

$x$		$-\infty$					$+\infty$
$ax^2 + bx + c$							semnul lui $a$ 0      semnul lui $a$

**iii)** Dacă  $\Delta > 0$  atunci funcția de gradul al doilea își schimbă semnul la trecerea prin rădăcini:

$x$		$-\infty$						$+\infty$
$ax^2 + bx + c$								semnul lui $a$ 0      semn contrar lui $a$ 0      semnul lui $a$

*Relațiile lui Viète* evidențiază legăturile ce există între coeficienții și rădăcinile ecuației, indiferent dacă acestea sunt reale sau complexe:

$$\begin{aligned} S &= x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ P &= x_1 x_2 = \frac{c}{a}. \end{aligned}$$


Cu ajutorul sumei  $S = x_1 + x_2$  și a produsului  $P = x_1 x_2$  putem construi întotdeauna ecuația de gradul al doilea cu rădăcini date  $x_1$  și  $x_2$ :

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

### Functiile modul și signum

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad f(x) = |x| = \begin{cases} x & , \quad x \geq 0 \\ -x & , \quad x < 0 \end{cases}$$

$$sgn : \mathbb{R} \rightarrow \{-1, 0, 1\}, \quad sgn(x) = \begin{cases} 1 & , \quad x > 0 \\ 0 & , \quad x = 0 \\ -1 & , \quad x < 0 \end{cases}$$



#### Proprietățile modulului

- i)  $|x| \geq 0$  și  $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$  (modulul este pozitiv definit)
- ii)  $\frac{|x|}{x} = sgn(x) \quad (x \neq 0)$
- iii)  $|\alpha \cdot x| = \alpha \cdot |x| \quad (\alpha \geq 0)$  (modulul este multiplicativ)
- iv)  $|x + y| \leq |x| + |y|$  (inegalitatea triunghiului)
- v)  $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$

Funcția modul este *continuă* în origine *fără a fi însă derivabilă* în acest punct:

$$f'_s(0) = -1, \quad f'_d(0) = 1.$$

Funcția semn este *discontinuă* în origine;  $x = 0$  este punct de discontinuitate de speță întâi:

$$f(0 - 0) = -1, \quad f(0) = 0, \quad f(0 + 0) = 1.$$

### Funcția parte întreagă

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = [x]$$

$[x]$  este cel mai mare număr întreg mai mic sau egal cu  $x$

*Proprietățile părții întregi*


- i)  $x - 1 < [x] \leq x < [x] + 1$
- ii)  $[x + n] = n + [x] \quad (n \in \mathbb{Z})$

Funcția parte întreagă este discontinuă în fiecare punct de abscisă întreagă:

$$f(n - 0) = n - 1 \quad \text{și} \quad f(n) = f(n + 0) = n$$

Punctele de abscisă întreagă sunt discontinuități de speță întâi.

Funcția parte întreagă este continuă la dreapta în fiecare punct de abscisă întreagă.



### Functia parte fractiōnara

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1), \quad f(x) = \{x\}$$

$\{x\} = x - [x]$  este partea fractiōnara a lui  $x$

Functia parte fractiōnara este periodică cu perioada principală  $T = 1$ :

$$f(x + k) = f(x) \quad (\forall) x \in \mathbb{R}, \quad (\forall) k \in \mathbb{Z}$$

Functia parte fractiōnara este discontinuă în fiecare punct de abscisă întreagă:

$$f(n - 0) = 1 \quad \text{și} \quad f(n) = f(n + 0) = 0$$

### Puteri și radicali

$$f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_k(x) = x^k \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

$$f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), \quad f(x) = \sqrt[2n]{x} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Rădăcina de ordinul  $k = 2n$  a numărului pozitiv  $a$  este unica soluție pozitivă a ecuației  $z^{2n} = a$  și se notează prin  $\sqrt[2n]{a}$ .

Conform acestei definiții, pentru numerele pozitive  $a$  și  $z$ , are loc echivalența

$$\sqrt[2n]{a} = z \iff z^{2n} = a.$$

Convenim să notăm rădăcina pătrată (rădăcina de ordinul al doilea) simplu prin  $\sqrt{\phantom{x}}$  în loc de  $\sqrt[2]{\phantom{x}}$ .

#### Observație

Rădăcina de ordinul doi a numărului 4 este 2 deoarece doar una din rădăcinile ecuației

$$z^2 = 4 \iff z_{1,2} = \pm 2$$


este pozitivă; prin urmare  $\sqrt{4} = +2$ . Exprimarea  $\sqrt{4} = \pm 2$  este greșită în contextul extragerii rădăcinii reale.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt[2n+1]{x} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Rădăcina de ordinul  $k = 2n + 1$  a numărului real  $a$  este unica soluție reală a ecuației  $z^k = a$  și se notează prin  $\sqrt[2n+1]{a}$ :

$$\sqrt[2n+1]{a} = z \iff z^{2n+1} = a.$$

Definiția rădăcinii de ordinul  $k$  poate fi extinsă și în cazul numerelor negative dacă indicele  $k$  este impar,  $k = 2n + 1$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ).



Dreapta  $x = 0$  (axa  $Oy$ ) este tangentă verticală la graficul funcției radical. Originea  $O(0,0)$  este punct de inflexiune cu tangentă verticală la graficul funcției radical de ordin impar.

#### Proprietățile puterilor și radicalilor

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{\text{de } "n"\text{ ori}} \quad (n \in \mathbb{N}^*, \quad a \in \mathbb{R})$$

$$a^0 = 1 \quad (a \in \mathbb{R}^*)$$

$$a^{-k} = \frac{1}{a^k} \quad (k \in \mathbb{Z}, \quad a \in \mathbb{R}^*)$$

$$a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p} \quad (p \in \mathbb{Z}^*, \quad q \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, \quad a \in \mathbb{R}_+^*)$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (b \neq 0)$$

$$\sqrt[n \cdot m]{a^{k \cdot m}} = \sqrt[n]{a^k}, \quad \sqrt[n]{a^{n \cdot m}} = a^m,$$

$$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m, \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}.$$

### Functia exponentiatală

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad f(x) = a^x \quad (a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} = (0, 1) \cup (1, \infty))$$

Functia exponentiatală cu baza supraunitară este strict crescătoare:

$$a \in (1, \infty) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}.$$

În plus, au loc relațiile:


$$\begin{array}{ll} x < 0 & 1 < a < b \Rightarrow a^x > b^x \\ x > 0 & 1 < a < b \Rightarrow a^x < b^x. \end{array}$$

Functia exponentiatală cu baza subunitară este strict descrescătoare:

$$a \in (0, 1) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} > a^{x_2}.$$

În plus, au loc relațiile:

$$\begin{array}{ll} x < 0 & 0 < a < b < 1 \Rightarrow a^x > b^x \\ x > 0 & 0 < a < b < 1 \Rightarrow a^x < b^x. \end{array}$$



### Proprietățile funcției exponentiale

(i) Proprietăți de calcul

$$\begin{aligned} a^x \cdot a^y &= a^{x+y} & \frac{a^x}{a^y} &= a^{x-y} ; \\ (a \cdot b)^x &= a^x \cdot b^x & \left(\frac{a}{b}\right)^x &= \frac{a^x}{b^x} ; \\ (a^x)^y &= a^{x \cdot y} & a^{-x} &= \frac{1}{a^x} . \end{aligned}$$

(ii) Funcția exponențială este *bijectivă* deoarece este injectivă

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow a^{x_1} \neq a^{x_2} \text{ (echivalent } a^{x_1} = a^{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2)$$

și surjectivă

$$(\forall) y \in (0, +\infty) \quad (\exists) x \in \mathbb{R} \text{ a.î. } y = a^x.$$

Prin urmare funcția exponențială este *inversabilă* iar *inversa* ei este funcția logaritmică cu aceeași bază (vezi paragraful ce urmează).

(iii) Dreapta  $y = 0$  (axa  $Ox$ ) este asimptotă orizontală la graficul funcției exponențiale. În cazul funcției exponențiale cu baza  $e = 2, 718 281 \dots$ , limitele la extremități sunt

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \text{și} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^x = +\infty.$$

### Funcția logaritmică

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \log_a x \quad (a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} = (0, 1) \cup (1, \infty))$$

*Logaritmul unui număr pozitiv  $x$  calculat în baza  $a$*  ( $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ ) se notează  $\log_a x$  și reprezintă puterea la care trebuie ridicată baza  $a$  pentru a obține  $x$ .

Conform acestei definiții, pentru numerele strict pozitive  $x$  și  $a$ ,  $a \neq 1$ , are loc echivalența

$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

Logaritmii cel mai des întâlniți în practică sunt *logaritmul zecimal* ( $\log_{10}$ ) pentru calcule numerice și *logaritmul natural* ( $\log_e$ ), cu baza  $e = 2, 718 281 \dots$ , la capitolul de Analiză matematică. Pentru simplitatea scrierii se utilizează notațiile

$$\log_{10} x = \lg x \quad \text{și} \quad \log_e x = \ln x.$$

Funcția logaritmică cu *baza supraunitară* este *strict crescătoare*:

$$a \in (1, \infty) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow \log_a x_1 < \log_a x_2.$$

În plus, au loc relațiile:


$$\begin{array}{ll} 0 < x < 1 & 1 < a < b \Rightarrow \log_a x < \log_b x \\ x > 1 & 1 < a < b \Rightarrow \log_a x > \log_b x. \end{array}$$

Funcția exponențială cu *baza subunitară* este *strict descrescătoare*:

$$a \in (0, 1) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow \log_a x_1 > \log_a x_2 .$$

În plus, au loc relațiile:

$$\begin{array}{ll} 0 < x < 1 & 0 < a < b < 1 \Rightarrow \log_a x < \log_b x \\ x > 1 & 0 < a < b < 1 \Rightarrow \log_a x > \log_b x . \end{array}$$



*Proprietățile funcției logaritmice*

(i) Proprietăți de calcul

$$\begin{aligned} \log_a xy &= \log_a x + \log_a y ; \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y ; \\ \log_a 1 &= 0 ; \quad \log_a a = 1 ; \\ \log_a x^r &= r \log_a x ; \quad \log_{a^r} x = \frac{1}{r} \log_a x ; \\ \log_a \sqrt[n]{x} &= \frac{1}{n} \log_a x ; \quad \log_a \frac{1}{x} = -\log_a x . \end{aligned}$$

(ii) Funcția logaritmică este *bijectivă* deoarece este injectivă

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow \log_a x_1 \neq \log_a x_2 \quad (\text{echivalent } \log_a x_1 = \log_a x_2 \Rightarrow x_1 = x_2)$$

și surjectivă

$$(\forall) y \in \mathbb{R} \quad (\exists) x \in (0, +\infty) \quad \text{a.î. } y = \log_a x .$$

Prin urmare funcția logaritmică este *inversabilă* iar *inversa ei* este funcția exponențială cu aceeași bază.

$$\begin{aligned} a^{\log_a x} &= x \quad (\forall) x \in (0, +\infty) \\ \log_a a^y &= y \quad (\forall) y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

La pagina 4, figura din partea dreaptă, funcțiile exponențială cu baza  $e$  și inversa ei, logaritmul natural, sunt reprezentate în același sistem de coordinate. Graficele celor două funcții sunt simetrice față de prima bisectoare.

(iii) Dreapta  $x = 0$  (axa  $Oy$ ) este asimptotă verticală la graficul funcției logaritmice. În cazul logaritmului natural, limitele la extremități sunt

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty \quad \text{și} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = +\infty.$$

(iv) Formulele de schimbare a bazei logaritmilor

$$\begin{aligned} \log_a A &= \log_b A \cdot \log_a b \quad ; \quad \log_a A = \frac{\log_b A}{\log_b a} \quad ; \\ \log_a b &= \frac{1}{\log_b a}. \end{aligned}$$

## Polinoame și ecuații algebrice

*Împărțirea polinoamelor. Divizibilitate.*

$f, g \in \mathbb{C}[X]$  polinoame având gradele  $n = \text{grad}(f)$  și respectiv  $m = \text{grad}(g)$

$$\begin{aligned} n \geq m \quad \Rightarrow \quad f : g &= c \text{ rest } r \quad \text{unde} \quad \text{grad}(r) < m \\ &\text{grad}(c) = n - m \end{aligned}$$

*Teorema împărțirii cu rest*

$$f : g = c \text{ rest } r \quad \text{d.d.} \quad f = g \cdot c + r \quad (\text{proba împărțirii})$$

Polinomul  $f$  este *divizibil* prin  $g$  dacă și numai dacă  $r \equiv 0$  (citește:  $r$  este polinomul identic nul sau, mai precis, coeficienții restului  $r$  sunt toti nuli).

Polinoamele  $f$  și  $g$  sunt *prime între ele* dacă cel mai mare divizor comun al lor este 1 (se notează:  $(f, g) = 1$ ).

*Teorema lui Bézout*

Restul împărțirii lui  $f$  prin  $(x - a)$  este  $r = f(a)$ .

*Consecințe*

- a)  $f$  este divizibil prin  $(x - a) \iff f(a) = 0$
- b)  $f$  este divizibil prin  $g \iff$  toate rădăcinile lui  $g$  sunt rădăcini (cu multiplicități identice) pentru  $f$ .

*Teorema fundamentală a algebrei*

Orice polinom cu coeficienți complecsi are cel puțin o rădăcină complexă.

*Consecință*

Orice polinom  $f = a_0X^n + a_1X^{n-1} + \dots + a_{n-1}X + a_n \in \mathbb{C}[X]$  are exact  $n$  rădăcini complexe  $x_1, x_2, \dots, x_n$  (distincte sau nu) și prin urmare se descompune în factori primi de gradul întâi:

$$f = a_0(X - x_1)^{n_1} \cdot (X - x_2)^{n_2} \cdot \dots \cdot (X - x_k)^{n_k}$$

unde  $n_1, n_2, \dots, n_k$  reprezintă multiplicitățile rădăcinilor distincte  $x_1, x_2, \dots, x_k$ .

*Relațiile lui Viète*

$$\text{gr}(f) = 2 \Rightarrow f = a_0X^2 + a_1X + a_2$$

$$f = a_0(X - x_1)(X - x_2) = a_0X^2 - a_0(x_1 + x_2)X + a_0x_1x_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 &= -\frac{a_1}{a_0} \\ x_1 x_2 &= \frac{a_2}{a_0} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
gr(f) = 3 &\Rightarrow f = a_0X^3 + a_1X^2 + a_2X + a_3 \\
f = a_0(X - x_1)(X - x_2)(X - x_3) &= \\
&= a_0X^3 - a_0(x_1 + x_2 + x_3)X^2 + a_0(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)X - a_0x_1x_2x_3
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= -\frac{a_1}{a_0} \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 &= \frac{a_2}{a_0} \\ x_1x_2x_3 &= -\frac{a_3}{a_0} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
gr(f) = 4 &\Rightarrow f = a_0X^4 + a_1X^3 + a_2X^2 + a_3X + a_4 \\
f = a_0(X - x_1)(X - x_2)(X - x_3)(X - x_4) &= \\
&= a_0X^4 - a_0(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)X^3 + a_0(x_1x_2 + x_2x_3 + \dots
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= -\frac{a_1}{a_0} \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_1 + x_2x_4 + x_1x_3 &= \frac{a_2}{a_0} \quad \heartsuit \\ x_1x_2x_3 + x_2x_3x_4 + x_3x_4x_1 + x_4x_1x_2 &= -\frac{a_3}{a_0} \quad \diamondsuit \\ x_1x_2x_3x_4 &= \frac{a_4}{a_0} \end{cases}$$

$\heartsuit$  se scrie mai convenabil:  $x_1x_2 + x_3x_4 + (x_1 + x_2)(x_3 + x_4) = \frac{a_2}{a_0}$

$\diamondsuit$  se scrie mai convenabil:  $x_1x_2(x_3 + x_4) + x_3x_4(x_1 + x_2) = -\frac{a_3}{a_0}$

*Tipuri speciale de ecuații de grad superior*

a) *Ecuații binome*

$$x^n - a = 0$$

- se scrie  $a$  sub formă trigonometrică:  $a = r(\cos t + i \sin t)$
- se extrage rădăcina complexă de ordinul  $n$ :

$$x_k \in \left\{ \sqrt[n]{r} \left( \cos \frac{t + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{t + 2k\pi}{n} \right) \mid k \in \{0, 1, 2, \dots, (n-1)\} \right\}$$

b) Ecuații bipătrate și tripătrate

$$x^4 + a x^2 + b = 0 \quad \text{substituția} \quad x^2 = y$$

$$x^6 + a x^3 + b = 0 \quad \text{substituția} \quad x^3 = y$$

c) Ecuații reciproce

- Ecuația reciprocă de gradul 3

$$a x^3 + b x^2 + b x + a = 0$$

admete rădăcina  $x_1 = -1$ .

Se aplică schema lui Horner și se obține o ecuație de gradul doi.

- Ecuația reciprocă de gradul 4

$$a x^4 + b x^3 + c x^2 + b x + a = 0$$

Prin împărțirea cu  $x^2$  rezultă  $a x^2 + b x + c + \frac{b}{x} + \frac{a}{x^2} = 0$ , echivalent, după gruparea termenilor

$$a \left( x^2 + \frac{1}{x^2} \right) + b \left( x + \frac{1}{x} \right) + c = 0.$$

Se face substituția  $t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow t^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2}$ .

Se rezolvă ecuația redusă:  $a(t^2 - 2) + bt + c = 0$ .

Se revine la variabila  $x$  rezolvând ecuațiile de gradul al doilea:  $x + \frac{1}{x} = t_1$   
și  $x + \frac{1}{x} = t_2$ .

- Ecuația reciprocă de gradul 5

$$a x^5 + b x^4 + c x^3 + c x^2 + b x + a = 0$$

admete rădăcina  $x = -1$ .

Se aplică schema lui Horner și se obține o ecuație reciprocă de gradul 4:

$$\begin{array}{r|cccccc} & a & b & c & c & b & a \\ \hline -1 & a & b-a & -b+a+c & b-a & a & 0 \end{array}$$

$$a x^4 + (b-a) x^3 + (a-b+c) x^2 + (b-a) x + a = 0$$

d) Ecuații cu coeficienți întregi

$$f = 0 \quad f \in \mathbb{Z}[X]$$

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

Rădăcinile întregi se află printre divizorii termenului liber  $a_n$

Rădăcinile raționale  $\frac{p}{q}$  se află printre fractiile  $\frac{p}{q}$  cu

$p$ , divizor al termenului liber  $a_n$

$q$ , divizor al coeficientului director  $a_0$

e) Ecuații cu coeficienți raționali

$$f = 0 \quad f \in \mathbb{Q}[X]$$

$$a + b\sqrt{q} \quad (a, b \in \mathbb{Q}, b \neq 0, q \text{ nu este pătrat perfect})$$

Dacă  $x_1 = a + b\sqrt{q}$  este rădăcină pentru  $f$  atunci  $x_2 = a - b\sqrt{q}$  este de asemenea rădăcină pentru  $f$ , caz în care  $f$  este divizibil prin

$$(X - a - b\sqrt{q})(X - a + b\sqrt{q}) = (X - a)^2 - b^2q.$$

f) Ecuații cu coeficienți reali

$$f = 0 \quad f \in \mathbb{R}[X]$$

$$a + i b \quad (a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0)$$

Dacă  $x_1 = a + i b$  este rădăcină pentru  $f$  atunci  $x_2 = a - i b$  este de asemenea rădăcină pentru  $f$ , caz în care  $f$  este divizibil prin

$$(X - a - i b)(X - a + i b) = (X - a)^2 + b^2.$$

## Matrici și determinanți

Matricea este un tabel de numere (reale sau complexe), numite elementele matricii, identificate prin poziția pe care acestea le ocupă: elementul notat  $a_{ij}$  se găsește la intersecția liniei  $i$  cu coloana  $j$ .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j-1} & a_{1j} & a_{1j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-11} & \dots & a_{i-1j-1} & a_{i-1j} & a_{i-1j+1} & \dots & a_{i-1n} \\ a_{i1} & \dots & a_{ij-1} & a_{ij} & a_{ij+1} & \dots & a_{in} \\ a_{i+11} & \dots & a_{i+1j-1} & a_{ij} & a_{i+1j+1} & \dots & a_{i+1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mj-1} & a_{mj} & a_{mj+1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Matricea  $A$  este o matrice dreptunghiulară de tipul  $m \times n$  deoarece are  $m$  linii și  $n$  coloane. Dacă numărul de linii coincide cu numărul de coloane ( $m = n$ ), spunem că  $A$  este o matrice pătrată de ordinul  $n$ .

### Operații cu matrici

- adunarea matricilor de același tip:  $[a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$ ;
- înmulțirea cu un scalar  $\alpha \in \mathbb{R}$  (sau  $\mathbb{C}$ ):  $\alpha \cdot [a_{ij}] = [\alpha a_{ij}]$ ;
- înmulțirea matricilor se realizează după regula "linie pe coloană" și este posibilă doar dacă numărul coloanelor primului termen  $[a_{ik}] \in \mathcal{M}_{m \times p}(\mathbb{R})$  este egal cu numărul liniilor celui de-al doilea termen  $[b_{kj}] \in \mathcal{M}_{p \times n}(\mathbb{R})$ :

$$[a_{ik}] \cdot [b_{kj}] = \left[ \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \right].$$

Spre exemplu, produsul matricii  $A$  având trei linii și două coloane ( $m = 3, p = 2$ ) cu matricea  $B$  formată din două linii și patru coloane ( $p = 2, n = 4$ ) este matricea  $C = A \cdot B$  cu trei linii și patru coloane ( $m = 3, n = 4$ ):

$$\begin{aligned} C = A \cdot B &= \begin{bmatrix} \boxed{a_{11}} & \boxed{a_{12}} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boxed{b_{11}} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ \boxed{b_{21}} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \boxed{a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} & a_{11}b_{14} + a_{12}b_{24} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} & a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} & a_{21}b_{14} + a_{22}b_{24} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} & a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} & a_{31}b_{14} + a_{32}b_{24} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Chiar dacă se poate calcula  $A \cdot B$ , în general  $B \cdot A$  nu are sens. Mai mult, în cazul matricilor pătrate, deși produsele  $A \cdot B$  și  $B \cdot A$  au ambele sens, în general  $A \cdot B \neq B \cdot A$ . Cu alte cuvinte, produsul matricelor pătrate nu este o operație comutativă.

Matricea nulă  $\mathbf{0}$ , matricea cu toate elementele egale cu 0, este element neutru la adunare.

Matricea pătrată de ordinul  $n$ , notată  $I_n$  și numită *matricea unitate* de ordinul  $n$ , având toate elementele nule cu excepția celor situate pe diagonala principală, care sunt egale cu 1, este element neutru la înmulțirea matricilor.

Determinantul unei matrici pătrate este numărul (real sau complex) calculat după regula:

$$\det A = \sum_{\sigma \in P_n} (-1)^{sgn(\sigma)} a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdot \dots \cdot a_{n\sigma(n)}$$

unde  $\sigma$  parcurge toate permutările mulțimii  $\{1, 2, 3, \dots, n\}$  iar  $sgn(\sigma)$  desemnează signatura permutării  $\sigma$  (adică numărul inversiunilor din  $\sigma$ ). Reamintim că numărul de permutări al unei mulțimi cu  $n$  elemente este egal cu  $n!$ , deci suma din definiție are  $n!$  termeni.

Calculul unui determinant cu formula din definiție este laborioasă, nepractică.

*Determinantul matricelor de ordinul 2*

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \stackrel{\text{not}}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

*Determinantul matricelor de ordinul 3*

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} &\stackrel{\text{not}}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}) \end{aligned}$$

În aplicații, pentru calculul determinantului de ordinul al treilea se utilizează regula triunghiurilor sau regula lui Sarrus, reguli ilustrate în figura ce urmează.



Se numește *complement algebric* al elementului  $a_{ij}$  din matricea  $A$ , numărul

$$\Gamma_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1j-1} & a_{1j+1} & a_{1n} \\ a_{i-11} & a_{i-1j-1} & a_{i-1j+1} & a_{i-1n} \\ a_{i+11} & a_{i+1j-1} & a_{i+1j+1} & a_{i+1n} \\ a_{n1} & a_{nj-1} & a_{nj+1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(ce rezultă multiplicând  $(-1)^{i+j}$  cu *minorul* corespunzător elementului  $a_{ij}$ , adică determinantul matricii obținute prin eliminarea liniei  $i$  și coloanei  $j$  din  $A$ ).

*Dezvoltarea determinantului după linia i :*

$$\det A = a_{i1}\Gamma_{i1} + a_{i2}\Gamma_{i2} + \cdots + a_{in}\Gamma_{in}.$$

*Dezvoltarea determinantului după coloana j :*

$$\det A = a_{1j}\Gamma_{1j} + a_{2j}\Gamma_{2j} + \cdots + a_{nj}\Gamma_{nj}.$$

*Proprietățile determinantilor*

1. Dacă într-o matrice  $A$  -toate elementele unei linii (coloane) sunt nule, sau -două linii (coloane) sunt egale, sau -două linii (coloane) sunt proporționale

atunci  $\det A = 0$ .

2. Dacă la o linie (coloană) a unui determinant se adună elementele corespunzătoare ale altrei linii (coloane) măritate cu un scalar, valoarea determinantului rămâne neschimbată.

Spre exemplu, în determinantul de ordinul trei ce urmează, la linia întâi este adunată linia a treia multiplicată cu  $\alpha$ :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} + \alpha a_{31} & a_{12} + \alpha a_{32} & a_{13} + \alpha a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

3. Dacă se înmulțesc elementele unei linii (sau coloane) din matricea  $A$  cu un scalar  $\alpha$  atunci determinantul noii matrici este  $\alpha \det A$ .

4. Determinantul produsului dintre un scalar  $\alpha$  și o matrice  $A$  de ordinul  $n$ :  $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$ .

5. Determinantul produsului a două matrici este egal cu produsul determinanților acestora:  $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$ .

6. O matrice de ordinul  $n$  se numește matrice triunghiulară dacă toate elementele situate dedesubtul (sau deasupra) unei diagonale sunt nule. Determinantul unei matrici triunghiulare este egal cu produsul elementelor de pe diagonala principală sau  $(-1)^n$  multiplicat cu produsul elementelor de pe diagonala secundară, după caz.

7. Descompunerea determinantului relativ la o linie (coloană) o ilustrăm în cazul particular al determinantului de ordinul trei, relativ la linia întâi:

$$\begin{vmatrix} a'_{11} + a''_{11} & a'_{12} + a''_{12} & a'_{13} + a''_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a''_{11} & a''_{12} & a''_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

(Trebuie subliniat că această proprietate este valabilă în cazul determinanților de orice ordin, indiferent de linia (sau coloana) luată în considerare.)

8. Matricile pătrate de ordinul al doilea  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$  verifică următoarea identitate remarcabilă (Cayley-Hamilton):

$$A^2 - (a_{11} + a_{22}) A + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) I_2 = \mathbf{0}.$$

### *Rangul unei matrici*

*Rangul* unei matrici arbitrară este *ordinul* celui mai mare (în sensul numărului de linii/coloane) determinant nenul ce se poate forma cu elementele matricii date (fără a modifica poziția lor din liniile/coloanele matricii). *Rangul matricii* este egal cu  $r$ , notat  $r = \text{rang } A$ , dacă matricea admite un minor nenul de ordin  $r$ , iar toți minorii de ordin  $r+1$ , dacă există, sunt nuli.

Matricea cu toate elementele nule are rangul 0.

Dacă cel puțin un element al matricii  $A$  (cu  $m$  linii și  $n$  coloane) este nenul atunci rangul verifică inegalitatea

$$1 \leq \text{rang } A \leq \min \{m, n\}.$$

### *Cum se calculează rangul unei matrici?*

Dacă  $A$  este o matrice pătrată de ordinul  $n$  și  $\det A \neq 0$  atunci  $\text{rang } A = n$ .

Dacă  $A$  este o matrice arbitrară sau una pătrată cu  $\det A = 0$ , se procedează în felul următor:

- se fixează un element nenul  $a_{ij}$  (dacă este posibil chiar  $a_{11}$ , elementul din colțul de NV);
- se bordează elementul  $a_{ij}$  cu o nouă linie și o nouă coloană astfel încât determinantul de ordinul al doilea rezultat să fie nenul și se trece la etapa următoare ( $\text{rang } A \geq 2$ ); dacă prin bordarea lui  $a_{ij}$  toți determinanții de ordinul doi rezultați sunt nuli atunci  $\text{rang } A = 1$  și calculul s-a încheiat;
- se repetă procedeul descris prin bordarea submatricii de ordinul 2 cu determinant nenul obținută la etapa precedentă: se caută acum un determinant nenul de ordinul 3; dacă a fost găsit un astfel de determinant, se trece la etapa următoare ( $\text{rang } A \geq 3$ ), iar dacă toți determinanții de ordinul 3 construiți sunt nuli,  $\text{rang } A = 2$  și calculul s-a încheiat;
- procedeul poate fi repetat cel mult până se atinge rangul  $\min \{m, n\}$  (respectiv  $n - 1$  în cazul matricilor pătrate).

*Inversabilitatea matricilor pătrate. Calculul inversei.*

O matrice pătrată  $A$  este *inversabilă* dacă și numai dacă există o matrice (de același ordin), notată  $A^{-1}$ , pentru care  $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$ .

Condiția necesară și suficientă ca matricea  $A$  să fie inversabilă este

$$\det A \neq 0.$$

*Cum se determină inversa unei matrici  $A$ ?*

- se calculează  $\det A$  :  $\det A = 0 \Rightarrow A$  nu este inversabilă;  
 $\det A \neq 0 \Rightarrow A$  este inversabilă.
- se calculează *transpusa* matricei  $A = [a_{ij}]$ , matricea  $A^t = [a_{ji}]$  formată cu elementele lui  $A$  prin schimbarea liniilor în coloane (păstrând ordinea lor). (Este de remarcat identitatea  $\det A = \det A^t$ .)
- se calculează reciproca (adjuncta) matricei  $A = [a_{ij}]$ , matricea  $A^* = [\Gamma_{ji}]$  formată din complementii algebrici ai elementelor transpușei  $A^t = [a_{ji}]$ .
- se determină matricea inversă  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$ .

### Sisteme de ecuații liniare

Un sistem liniar de  $m$  ecuații cu  $n$  necunoscute are forma

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1j}x_j + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{ij}x_j + \dots + a_{in}x_n = b_i \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mj}x_j + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

Echivalent, sistemul poate fi exprimat sub forma matricială  $A \cdot X = B$ , unde  $A = [a_{ij}]$  reprezintă matricea sistemului și

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \text{ respectiv } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Este posibilă numai una dintre următoarele situații:

- Sistemul are soluție unică și se numește *compatibil determinat*;
- Sistemul admite o infinitate de soluții și se numește *compatibil nedeterminat*;
- Sistemul nu are soluții și se numește *incompatibil*.

### *Cazuri particulare*

*Sistemul Cramer*: dacă  $A$  este o matrice pătrată ( $m = n$ , numărul necunoscutelor coincide cu cel al ecuațiilor) și  $\det A \neq 0$  atunci sistemul este compatibil determinat, unică sa soluție, exprimată matricial fiind  $X = A^{-1} \cdot B$ . Același rezultat se obține aplicând regula lui Cramer:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\det A}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\det A}, \dots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\det A},$$

unde determinanții  $\Delta_k$ ,  $k = \overline{1, n}$  rezultă din  $\Delta = \det A$  prin înlocuirea coloanei  $k$  cu cea a termenilor liberi  $B$ .

*Sistemul omogen*, sistemul în care toți termenii liberi sunt nuli  $b_i = 0$  ( $i = \overline{1, m}$ ). Sistemele omogene sunt compatibile deoarece admit cel puțin soluția  $(0, 0, \dots, 0)$ , numită soluția banală.

Matricea extinsă a sistemului este matricea obținută prin completarea matricii  $A$  cu termenii liberi:

$$\bar{A} = (A|B) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & |b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & |b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & | \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & |b_m \end{pmatrix}.$$

### *Teorema Kronecker-Capelli*

Un sistem algebric liniar este compatibil dacă și numai dacă rangul matricii sistemului coincide cu rangul matricii extinse a sistemului:  $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A}$ .

Odată calculat rangul matricii  $A$  se evidențiază *determinantul principal*  $\Delta_p$  adică "cel mai mare determinant" nenul ce se poate forma cu elementele matricii  $A$ . Liniile determinantului principal indică ecuațiile principale iar coloanele sale, necunoscutele principale; toate celelalte ecuații și necunoscute sunt secundare. Subsistemul format de ecuațiile principale este un sistem de tip Cramer iar soluțiile sale sunt chiar soluțiile sistemului inițial.

Determinantul principal poate fi bordat, pe linie, cu coeficienți situați în ecuațiile secundare și pe coloană, cu coeficienți ai necunoscutelor secundare

(evident, dacă există ecuații și necunoscute secundare). Determinanții obținuți prin bordare poartă numele de *determinanți (minorii) caracteristici*.

#### *Teorema lui Rouché*

Un sistem de ecuații liniare este compatibil dacă toți minorii caracteristici sunt nuli ( $\text{rang } A < m$ ) sau dacă nu există asemenea minori ( $\text{rang } A = m$ ).

Gradul de nedeterminare al unui sistem compatibil este dat de numărul de necunoscute secundare  $n - \text{rang } A > 0$ ; dacă  $\text{rang } A = n$  atunci sistemul este compatibil determinat (nu există necunoscute secundare).

Un *sistem omogen* admite soluții nebanale d.d. dacă rangul matricii sistemului este inferior numărului de necunoscute ( $\text{rang } A < n$ ).

Un *sistem omogen* în care numărul ecuațiilor coincide cu numărul necunoscitelor ( $m = n$ ) admite soluții nebanale dacă și numai dacă determinantul matricii sistemului este nul ( $\det A = 0$ ).

## Structuri algebrice

### *Definiție*

Fie  $M$  o mulțime nevidă; o lege de corespondență ce asociază oricărei perechi de elemente din  $M$ , în mod unic, un element din  $M$

$$(x, y) \mapsto x * y : M \times M \rightarrow M$$

se numește *lege de compoziție* pe  $M$ .

Simbolul  $*$  utilizat pentru a desemna elementul compus  $x * y$  este inspirat de cele două tipuri de legi de compoziție întâlnite din zorii educației matematice, adunarea  $(+)$  și înmulțirea  $(\cdot)$ . În notație aditivă, elementul compus se notează prin  $x + y$  și se numește sumă iar în notație multiplicativă, se notează  $x \cdot y$  (uneori scris pe scurt chiar  $xy$ ) și se numește produs.

Submulțimea  $M_0 \subset M$  este *partea stabilă a lui  $M$  la legea de compoziție*  $*$  dacă și numai dacă oricărei perechi de elemente  $(x_0, y_0)$  din  $M_0 \times M_0$  îi corespunde un element situat de asemenea în  $M_0$ :

$$(\forall) x_0, y_0 \in M_0 \Rightarrow x_0 * y_0 \in M_0.$$

Legea de compoziție  $*$  este *asociativă* d.d.

$$(\forall) x, y, z \in M \Rightarrow (x * y) * z = x * (y * z).$$

Legea de compoziție  $*$  este *comutativă* d.d.

$$(\forall) x, y \in M \Rightarrow x * y = y * x.$$

Elementul  $e \in M$  se numește *element neutru pentru legea \** dacă

$$(\forall) x \in M \Rightarrow x * e = e * x = x.$$

Elementul neutru pentru o lege de compozitie, dacă există, este unic.

Elementul neutru al unei legi de compozitie de tip aditiv este notat prin 0 și este numit *element de efect nul* (sau, mai simplu, *zero*).

Elementul neutru al unei legi de compozitie de tip multiplicativ este notat prin 1 și este numit *element unitate*.

Un element  $x$  se numește *simetrizabil în raport cu legea \** dacă

$$(\exists) x' \in M \text{ a.î. } x * x' = x' * x = e.$$

Elementul notat prin  $x'$  este *simetricul lui x*.

Dacă elementele  $x, y$  și  $z$  sunt simetrizabile atunci  $x * y$  și  $z'$  sunt și ele simetrizabile. În plus, sunt verificate identitățile

$$(x * y)' = y' * x' \quad \text{și} \quad (z')' = z.$$

Simetricul lui  $x$  în raport cu o lege de compozitie de tip aditiv este notat prin  $-x$  și este numit *opusul lui x*.

Simetricul lui  $x$  în raport cu o lege de compozitie de tip multiplicativ este notat prin  $x^{-1}$  și este numit *inversul lui x*.

#### *Definiție*

Mulțimea nevidă  $M$ , înzestrată cu legea de compozitie  $*$ , este *monoid* dacă și numai dacă legea  $*$  este asociativă și are element neutru:

$$\begin{aligned} & (\forall) x, y, z \in M \Rightarrow (x * y) * z = x * (y * z); \\ & (\exists) e \in M \text{ a.î. } (\forall) x \in M \Rightarrow x * e = e * x = x. \end{aligned}$$

Dacă legea de compozitie este comutativă atunci  $M$  este un *monoid comutativ*.

#### *Definiție*

Mulțimea nevidă  $G$ , înzestrată cu legea de compozitie  $*$ , este *grup* dacă legea  $*$  este asociativă, are element neutru și toate elementele din  $G$  sunt simetrizabile.

Așadar,  $(G, *)$  este grup d.d. sunt satisfăcute următoarele axiome:

$$\begin{aligned} & (\forall) x, y, z \in G \Rightarrow (x * y) * z = x * (y * z); \\ & (\exists) e \in G \text{ a.î. } (\forall) x \in G \Rightarrow x * e = e * x = x; \\ & (\forall) x \in G \text{ } (\exists) x' \in G \text{ a.î. } x * x' = x' * x = e. \end{aligned}$$

Dacă legea de compozitie este comutativă atunci  $(G, *)$  este un *grup comutativ* sau *abelian*.

*Teorema*

Fie  $(G, *)$  un grup și  $a, b \in G$  două elemente arbitrară în  $G$ . Ecuațiile  $a * x = b$  și  $y * a = b$  au soluții unice în  $G$ , mai precis

$$\begin{aligned} a * x = b &\iff x = a' * b \quad \text{respectiv} \\ y * a = b &\iff y = b * a'. \end{aligned}$$

Dacă  $(G, +)$  este un grup în care legea de compozitie este de tip aditiv atunci pentru orice  $a \in G$  și orice numere întregi  $m, n$ , au loc identitățile:

$$ma + na = (m + n)a, \quad m(na) = (mn)a, \quad - (na) = n(-a), \quad 0a = 0.$$

Dacă  $(G, \cdot)$  este un grup în care legea de compozitie este de tip multiplicativ atunci pentru orice  $a \in G$  și orice numere întregi  $m, n$ , au loc identitățile

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (a^n)^{-1} = a^{-n}, \quad a^0 = 1.$$

*Definiție*


O submulțime nevidă  $H \subset G$  a unui grup  $(G, *)$  se numește subgrup al lui  $G$  dacă sunt satisfăcute următoarele condiții

- ( $\forall$ )  $x, y \in H \Rightarrow x * y \in H;$
- ( $\forall$ )  $x \in H \Rightarrow x' \in H.$

*Definiție*

Fie  $(G_1, *)$  și  $(G_2, \circ)$  două grupuri; funcția bijectivă  $f : G_1 \rightarrow G_2$  se numește izomorfism de grupuri dacă

$$f(x * y) = f(x) \circ f(y) \quad (\forall) x, y \in G_1.$$



*Exemplu*

Funcția logaritm natural  $\ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  realizează un izomorfism între  $((0, +\infty), \cdot)$ , grupul multiplicativ al numerelor pozitive și  $(\mathbb{R}, +)$ , grupul aditiv al numerelor reale. Într-adevăr,  $\ln$  este bijectivă și satisfacă condiția

$$\ln(x \cdot y) = \ln x + \ln y.$$

*Definiție*

O mulțime nevidă  $A$  înzestrată cu două legi de compoziție, una aditivă și una multiplicativă, notate tradițional  $+$  și  $\cdot$ , se numește inel dacă sunt satisfăcute următoarele axiome:

$(A, +)$  este grup comutativ,

$(A, \cdot)$  este monoid,

înmulțirea  $(\cdot)$  este distributivă față de adunare  $(+)$ , mai precis

$$(\forall) x, y, z \in A \quad x(y+z) = xy + xz \quad \text{și} \quad (y+z)x = yx + zx.$$

Dacă înmulțirea elementelor din  $A$  este o lege de compoziție comutativă atunci inelul  $(A, +, \cdot)$  este un inel *comutativ*.

Inelul  $(A, +, \cdot)$  este un inel fără divizori ai lui zero dacă

$$x \neq 0 \quad \text{și} \quad y \neq 0 \quad \Rightarrow \quad xy \neq 0.$$

Un inel comutativ (format din cel puțin două elemente) fără divizori ai lui zero se numește *domeniu de integritate*.

Elementele nenele  $u, v \in A$  sunt divizori ai lui zero dacă  $uv = 0$ .

*Exemplu*

Inelul numerelor întregi  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  este domeniu de integritate. Singurele elemente inversabile (adică simetrizabile față de operația multiplicativă  $\cdot$ ) sunt 1 și  $-1$ .

*Definiție*

Fie  $(A_1, +, \cdot)$  și  $(A_2, +, \cdot)$  două inele (fiecare înzestrată cu propriile sale legi de compoziție, deși acestea sunt notate similar); funcția bijectivă  $f : A_1 \rightarrow A_2$  se numește *izomorfism* de inele dacă

$$\begin{aligned} f(x+y) &= f(x) + f(y) \\ f(x \cdot y) &= f(x) \cdot f(y) \end{aligned} \quad (\forall) x, y \in A_1.$$

*Definiție*

Un inel  $(K, +, \cdot)$  se numește corp dacă  $0 \neq 1$  și orice element nenul  $x$  este inversabil.

*Exemplu*

Mulțimile numerice  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  și  $\mathbb{C}$  sunt corpuri comutative.

$\mathbb{Z}_p$ , inelul claselor de resturi modulo  $p$

Fie  $n$  un număr întreg arbitrar și  $p$  un număr natural fixat; conform teoremei împărțirii cu rest, există doi întregi,  $q$  și  $r$  unic determinați, astfel încât

$$n = qp + r \quad \text{cu } 0 \leq r < p.$$

Numărul  $q$  se numește *cât* al împărțirii  $n : p$  iar  $r$  se numește *rest*. Resturile posibile la împărțirea  $n : p$  sunt  $0, 1, 2, \dots, p - 1$ . Astfel mulțimea numerelor întregi  $\mathbb{Z}$  se poate descompune în  $p$  submulțimi disjuncte:

$$\begin{aligned} \{\dots, -p, \boxed{0}, p, 2p, \dots\} &= \{kp \mid k \in \mathbb{Z}\} \stackrel{\text{not}}{=} \widehat{0}, \\ \{\dots, -p + 1, \boxed{1}, p + 1, 2p + 1, \dots\} &= \{kp + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} \stackrel{\text{not}}{=} \widehat{1}, \\ &\vdots \\ \{\dots, -p + r, \boxed{r}, p + r, 2p + r, \dots\} &= \{kp + r \mid k \in \mathbb{Z}\} \stackrel{\text{not}}{=} \widehat{r}, \\ &\vdots \\ \{\dots, -p + (p - 1), \boxed{p-1}, p + (p - 1), \dots\} &= \{kp + (p - 1) \mid k \in \mathbb{Z}\} \stackrel{\text{not}}{=} \widehat{p-1}, \end{aligned}$$

numite clase de resturi modulo  $p$ . Mulțimea tuturor claselor de resturi modulo  $p$  se notează  $\mathbb{Z}_p$ :

$$\mathbb{Z}_p = \{\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{2}, \dots, \widehat{p-1}\}.$$

Pe această mulțime se introduc două legi de compoziție după cum urmează:

$$\begin{aligned} \text{adunarea claselor modulo } p, \quad \widehat{a} + \widehat{b} &\stackrel{\text{def}}{=} \widehat{a+b} \quad \text{și} \\ \text{înmulțirea claselor modulo } p, \quad \widehat{a} \cdot \widehat{b} &\stackrel{\text{def}}{=} \widehat{a \cdot b}. \end{aligned}$$

Adunarea și înmulțirea sunt corect definite deoarece, conform definiției claselor de resturi, dacă întregul  $k \in \widehat{r}$  și  $0 \leq r < p$  atunci  $\widehat{k} = \widehat{r}$ .

$(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$  este inel comutativ în care elementul neutru la adunare este  $\widehat{0}$  iar elementul neutru la înmulțire este  $\widehat{1}$ .

Orice clasă de resturi  $\widehat{a} \in \mathbb{Z}_p$  are opus:  $-\widehat{a} = \widehat{p-a}$ .

Nu toate clasele de resturi din  $\mathbb{Z}_p$  sunt inversabile: elementul  $\widehat{a} \in \mathbb{Z}_p$  este inversabil d.d. singurul divizor comun al lui  $a$  și  $p$  este 1.

În consecință, dacă  $a$  este divizor propriu al lui  $p$  ( $a \neq 1$  și  $a \neq p$ ) atunci  $p = ab$  iar  $\widehat{a} \cdot \widehat{b} = \widehat{p} = \widehat{0}$  deci  $\widehat{a}$  este divizor al lui zero.

- i) Dacă  $p$  este neprim atunci  $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$  este inel cu divizori ai lui zero.
- ii) Dacă  $p$  este un număr prim atunci toate elementele din  $\mathbb{Z}_p \setminus \{\hat{0}\}$  sunt inversabile ceea ce conferă lui  $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$  o structură de *corp comutativ*.
- iii) Dacă  $p$  este un număr prim atunci  $\hat{a}^{p-1} = \hat{1}$  oricare ar fi  $\hat{a} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\hat{0}\}$ .

## TRIGONOMETRIE ȘI GEOMETRIE


### Functiile trigonometrice

$\mathcal{C}(O; 1) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$  - cercul trigonometric (centrat în originea axelor de coordonate cu raza 1).


$M(x, y)$  - punctul curent pe cercul trigonometric.

$t \in [0, 2\pi]$  - măsura în radiani a unghiului la centru format de semiaxa  $Ox_+$  cu raza vectoare  $OM$ .

Corespondența  $t \longleftrightarrow M(x, y)$  este bijectivă .



$\text{Definiții}$	$\cos t = x, \quad \sin t = y, \quad \operatorname{tg} t = \frac{y}{x} \quad \text{și} \quad \operatorname{ctg} t = \frac{x}{y}.$
--------------------	---



Definiția se poate extinde de la intervalul  $[0, 2\pi)$  la  $\mathbb{R}$  prin procedeul numit "reducerea la perioada principală":

$$(\forall) t \in \mathbb{R} \quad (\exists!) t^* \in [0, 2\pi) \quad \text{a.i.} \quad t = t^* + 2k\pi, \quad \text{unde} \quad k \in \mathbb{Z}, \quad k = \left[ \frac{t}{2\pi} \right]$$

$$t \in \mathbb{R} \Rightarrow \cos t = \cos t^* \quad \text{și} \quad \sin t = \sin t^*$$

### Proprietățile funcțiilor cos și sin

cos și sin sunt *mărginite*:  $|\cos t| \leq 1$  și  $|\sin t| \leq 1$   $(\forall) t \in \mathbb{R}$ .


cos și sin sunt *periodice cu perioada  $2\pi$* :  $\begin{cases} \cos(t + 2k\pi) = \cos t & (\forall) t \in \mathbb{R} \\ \sin(t + 2k\pi) = \sin t & (\forall) k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

$\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$  este o funcție *pară*, adică  $\cos(-t) = \cos t$ .

Funcția cos este *pozitivă* în cadranele I și IV, resp. *negativă* în II și III.

$\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$  este o funcție *impară*, adică  $\sin(-t) = -\sin t$ .


Funcția sin este *pozitivă* în cadranele I și II resp. *negativă* în III și IV.



Tabelul de valori al funcțiilor sin și cos

${}^o$	0	30	45	60	90	120	135	150	180
rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\pi$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

${}^o$	180	210	225	240	270	300	315	330	360
rad	$\pi$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	$2\pi$
sin	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
cos	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1



*Proprietățile funcțiilor tg și ctg*


$$\operatorname{tg}(t + k\pi) = \operatorname{tg} t \quad (\forall) t \in \mathbb{R} \setminus \left\{ (2k+1) \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\operatorname{ctg}(t + k\pi) = \operatorname{ctg} t \quad (\forall) t \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$\operatorname{tg} : \mathbb{R} \setminus \left\{ (2k+1) \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$  este o funcție impară:  $\operatorname{tg}(-t) = -\operatorname{tg} t$

$\operatorname{ctg} : \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$  este o funcție impară:  $\operatorname{ctg}(-t) = -\operatorname{ctg} t$ .

Funcțiile tg și ctg sunt pozitive în I și III resp. negative în II și IV.




Dreptele  $x = (2k+1) \frac{\pi}{2}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) sunt asimptote verticale la graficul funcției tangentă.

$$\lim_{\substack{t \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ t < \frac{\pi}{2}}} \operatorname{tg} t = +\infty, \quad \lim_{\substack{t \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ t > \frac{\pi}{2}}} \operatorname{tg} t = -\infty.$$


Dreptele  $x = k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) sunt asimptote verticale la graficul funcției cotangentă.

$$\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \operatorname{ctg} t = +\infty, \quad \lim_{\substack{t \rightarrow \pi \\ t < \pi}} \operatorname{ctg} t = -\infty.$$



Tabelul de valori al funcțiilor  $\operatorname{tg}$  și  $\operatorname{ctg}$

	0	0	30	45	60	90	120	135	150	180
rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\pi$	
$\operatorname{tg}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$+\infty   -\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	
$\operatorname{ctg}$	$-\infty   +\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	-1	$-\sqrt{3}$	$-\infty   +\infty$	



## Relații între funcțiile trigonometrice

*Formule fundamentale*

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1 ; \quad 1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t} ; \quad 1 + \operatorname{ctg}^2 t = \frac{1}{\sin^2 t} .$$

*Funcțiile trigonometrice ale complementului*

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) &= \cos t ; \quad \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{ctg} t ; \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) &= \sin t ; \quad \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{tg} t .\end{aligned}$$

*Funcțiile trigonometrice ale sumei și diferenței de arce*

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b; \quad \sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b;$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b; \quad \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b;$$

$$\operatorname{tg}(a+b) = \frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b}{1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}; \quad \operatorname{tg}(a-b) = \frac{\operatorname{tg} a - \operatorname{tg} b}{1 + \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}.$$

*Funcțiile trigonometrice ale dublului și triplului unui arc*

$$\sin 2t = 2 \cos t \sin t;$$

$$\sin 3t = 3 \sin t - 4 \sin^3 t;$$

$$\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1 = 1 - 2 \sin^2 t = \cos^2 t - \sin^2 t; \quad \cos 3t = 4 \cos^3 t - 3 \cos t;$$

$$\operatorname{tg} 2t = \frac{2 \operatorname{tg} t}{1 - \operatorname{tg}^2 t};$$

$$\operatorname{tg} 3t = \frac{3 \operatorname{tg} t - \operatorname{tg}^3 t}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 t}.$$

*Exprimarea funcțiilor trigonometrice cu ajutorul arcului dublu*

$$\sin t = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2t}{2}}; \quad \cos t = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 2t}{2}}; \quad \operatorname{tg} t = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t}};$$

Semnul din fața radicalului  $\begin{cases} \text{se stabilește cadranul ce îl conține pe } t; \\ \text{se alege semnul funcției din cadranul lui } t. \end{cases}$

*Exprimarea ratională a funcțiilor trigonometrice*

$$\sin t = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{t}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{t}{2}}; \quad \cos t = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{t}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{t}{2}}; \quad \operatorname{tg} t = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{t}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{t}{2}}.$$

*Transformarea sumei/diferenței în produs*

$$\begin{aligned}\sin p + \sin q &= 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}; & \sin p - \sin q &= 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}; \\ \cos p + \cos q &= 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}; & \cos p - \cos q &= -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}; \\ \operatorname{tg} p + \operatorname{tg} q &= \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}; & \operatorname{tg} p - \operatorname{tg} q &= \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}.\end{aligned}$$

*Transformarea produsului în sumă/diferență*

$$\begin{aligned}\sin a \sin b &= \frac{1}{2} \cos(a-b) - \frac{1}{2} \cos(a+b); \\ \cos a \cos b &= \frac{1}{2} \cos(a-b) + \frac{1}{2} \cos(a+b); \\ \sin a \cos b &= \frac{1}{2} \sin(a+b) + \frac{1}{2} \sin(a-b).\end{aligned}$$


## Functiile trigonometrice inverse

Restricția  $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$  este bijectivă (deci inversabilă).

*Definiție*

$\arcsin a =$  "arcul cuprins între  $-\frac{\pi}{2}$  și  $\frac{\pi}{2}$  al căruia sinus este  $a$ " ( $-1 \leq a \leq 1$ )

$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \arcsin x = y \Leftrightarrow x = \sin y$
$x \in [-1, 1] \quad , \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$




Restricția  $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$  este bijectivă (deci inversabilă).

*Definiție*

$\arccos a =$  "arcul cuprins între 0 și  $\pi$  al cărui cosinus este  $a$ "  $(-1 \leq a \leq 1)$

$$\boxed{\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad \arccos x = y \Leftrightarrow x = \cos y \\ x \in [-1, 1], \quad y \in [0, \pi]}$$




Restricția  $\tg : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$  este bijectivă (deci inversabilă).

*Definiție*

$\operatorname{arctg} a =$  "arcul cuprins între  $-\frac{\pi}{2}$  și  $\frac{\pi}{2}$  a cărui tangentă este  $a$ "  $(a \in \mathbb{R})$

$$\boxed{\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \operatorname{arctg} x = y \Leftrightarrow x = \tg y \\ x \in \mathbb{R}, \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)}$$



$$\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg}x$$

(arctg este impară)

Dreptele  $y = -\frac{\pi}{2}$  și  $y = \frac{\pi}{2}$  sunt asimptote orizontale la graficul funcției arctangentă.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2} \text{ și } \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}$$

*Relații remarcabile între funcțiile trigonometrice inverse*

$$\sin(\arccos x) = \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (x \in [-1, 1])$$

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \operatorname{sgn}(x) \cdot \frac{\pi}{2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$$

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \boxed{\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}}$$

### Ecuăriile trigonometrice elementare

1. *Ecuăția  $\sin x = a$  are soluție d.d.  $a \in [-1, 1]$ .*

Mulțimea soluțiilor sale este  $\left\{ (-1)^k \arcsin a + k\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$ .

În particular,  $\sin x = 0 \Leftrightarrow x \in \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ .

2. Ecuația  $\cos x = a$  are soluție d.d.  $a \in [-1, 1]$ .

Mulțimea soluțiilor sale este  $\{\pm \arccos a + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ .

În particular,  $\cos x = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{ (2k+1) \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z} \right\}$ .

3. Ecuația  $\operatorname{tg} x = a$  are soluție ( $\forall$ )  $a \in \mathbb{R}$ .

Mulțimea soluțiilor sale este  $\{\operatorname{arctg} a + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ .

În particular,  $\operatorname{tg} x = 0 \Leftrightarrow x \in \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ .

### *Ecuația liniară*

$$a \cos t + b \sin t = c \quad (a, b, c \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 > 0)$$

are soluții dacă și numai dacă  $a^2 + b^2 \geq c^2$ .

### *Metode de rezolvare a ecuației liniare*

- Substituția  $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$  conduce la sistemul  $\begin{cases} ax + by = c \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$
- Substituția  $z = \operatorname{tg} \frac{t}{2}$  conduce la ecuația de gradul al doilea

$$a(1 - z^2) + 2bz = c(1 + z^2).$$

Această metodă are neajunsul de a pierde (eventual) soluțiile de forma  $(2k+1)\pi$ .

Metoda unghiului auxiliar constă în transformarea expresiei din membrul stâng al ecuației.




$$a \cos t + b \sin t = c \Leftrightarrow \cos t + \frac{b}{a} \sin t = \frac{c}{a} \Leftrightarrow \cos t + \operatorname{tg} \varphi \sin t = \frac{c}{a},$$

unde  $\varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ , numit unghi auxiliar este unicul cu proprietatea  $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$ . Rezultă imediat

$$\begin{aligned} \cos(t - \varphi) &= \frac{c}{a} \cos \varphi \Leftrightarrow \\ t &\in \left\{ \varphi \pm \arccos \left( \frac{c}{a} \cos \varphi \right) + 2k\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}. \end{aligned}$$

## Aplicațiile trigonometriei în geometrie

$AE \perp BC$ ,  $h_a$  – lungimea înălțimii  
 $\widehat{BAF} \equiv \widehat{CAF}$ ,  $AF$  – bisectoare  
 $BD \equiv DC$ ,  $AD$  – mediană  
 $G$ , centrul de greutate  
 $AG = \frac{2}{3} AD$  și  $GD = \frac{1}{3} AD$   
 $|Du \perp BC$ ,  $|Du$  – mediatoare




**Teorema lui Thales**

$$M_2N_2 \parallel BC \Rightarrow \frac{AM_2}{BM_2} = \frac{AN_2}{CN_2}$$

$$MN \parallel BC \Rightarrow \frac{AM}{BM} = \frac{AN}{CN}$$

$$M_1N_1 \parallel BC \Rightarrow \frac{AM_1}{BM_1} = \frac{AN_1}{CN_1}$$



### Teorema asemănării

$$MN \parallel BC \Rightarrow \Delta AMN \sim \Delta ABC$$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} (= \rho)$$

$\rho$ , raportul de asemănare

$$\frac{S_{AMN}}{S_{ABC}} = \rho^2$$


*Teorema bisectoarei*

*AF, bisectoarea exterioară*

$$\frac{AB}{AC} = \frac{FB}{FC}$$


*AD, bisectoarea interioară*

$$\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$$



*Teorema lui Ceva*

$$\frac{DA}{DB} \cdot \frac{EB}{EC} \cdot \frac{FC}{FA} = 1$$





*Teorema lui Menelaus*

$$\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$$

$$\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = -1$$


(cazul segmentelor orientate)





*Puterea punctului față de cerc  
(P, interior)*

$$PA_1 \cdot PA_2 = PQ_1 \cdot PQ_2 = R^2 - PO^2$$



*Teorema sinusurilor*

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

*Teorema cosinusului*

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

*Aria triunghiului*

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{ah_a}{2} = \frac{bh_b}{2} = \frac{ch_c}{2} \\
 S &= \frac{bc \sin A}{2} = \frac{ca \sin B}{2} = \frac{ab \sin C}{2} \\
 S &= \frac{a^2 \sin B \sin C}{2 \sin A} = \frac{b^2 \sin C \sin A}{2 \sin B} = \frac{c^2 \sin A \sin B}{2 \sin C} \\
 S &= 2R^2 \sin A \sin B \sin C \\
 S &= r^2 \operatorname{ctg} \frac{A}{2} \operatorname{ctg} \frac{B}{2} \operatorname{ctg} \frac{C}{2} \\
 S &= pr \\
 S &= \frac{abc}{4R} \\
 S &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (\text{formula lui Heron})
 \end{aligned}$$

## Numere complexe

*Aplicațiile trigonometriei în algebră*

$\mathbb{C} = \{ z = x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1 \}$  -mulțimea numerelor complexe

$z = x + iy$ , forma algebrică a numărului complex  $z$

$\operatorname{Re} z = x$ , partea reală a numărului complex  $z$

$\operatorname{Im} z = y$ , partea imaginară a numărului complex  $z$

$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ , modulul numărului complex  $z$

$\bar{z} = x - iy$ , conjugatul numărului complex  $z$

$z \cdot \bar{z} = |z|^2$

Numărul complex  $z = x + iy$  este *afixul* punctului  $M(x, y)$  iar conjugatul său,  $\bar{z} = x - iy$ , este *afixul* simetricului punctului  $M(x, y)$  față de axa  $Ox$ .

- se notează prin  $t$  unghiul format de dreapta  $OM$  ( $M \neq O$ ) cu semiaxa pozitivă  $Ox$  (*argumentul* lui  $z$ );
- se notează prin  $r$  lungimea segmentului  $OM$  (*modulul* lui  $z$ );
- din definiția funcțiilor trigonometrice rezultă

$$\begin{cases} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases} \quad (r > 0 \text{ iar } t \in [0, 2\pi)).$$

$z = r(\cos t + i \sin t)$  forma trigonometrică a lui  $z$

Numerele  $r$  și  $t$  sunt cordonatele polare ale punctului  $M(x, y)$ :  $r$  este *raza polară*,  $O$  este *polul* iar  $t$  este *argumentul* lui  $z$ .

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ t &= \arctg \frac{y}{x} + k\pi \end{aligned}$$

( $k = 0$  pt.  $M \in CadrI$ ,  $k = 1$  pt.  $M \in CadrII - III$ ,  $k = 2$  pt.  $M \in CadrIV$ ).

Înmulțirea și împărțirea numerelor complexe  $z_j = r_j (\cos t_j + i \sin t_j)$ ,  $j = \overline{1, 2}$

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 [\cos(t_1 + t_2) + i \sin(t_1 + t_2)] \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} [\cos(t_1 - t_2) + i \sin(t_1 - t_2)] \end{aligned}$$

Formula lui Moivre

$$z = r(\cos t + i \sin t) \Rightarrow z^n = r^n [\cos nt + i \sin nt]$$

Rădăcina complexă de ordinul  $n$  a numărului complex  $z = r(\cos t + i \sin t)$ :

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left( \cos \frac{t + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{t + 2k\pi}{n} \right), \quad k = \overline{0, n-1}$$

## Elemente de geometrie analitică

### Vectori

Vesorii axelor de coordonate:  $\bar{\mathbf{i}} = (1, 0)$  și  $\bar{\mathbf{j}} = (0, 1)$ .

Vectorul de poziție al punctului  $M(x, y)$ :  $\overline{OM} = x\bar{\mathbf{i}} + y\bar{\mathbf{j}}$ .

Lungimea vectorului  $\overline{OM}$  (distanța dintre M și origine):  $\begin{aligned}\|OM\|^2 &= x^2 + y^2 \\ OM^2 &= x^2 + y^2.\end{aligned}$

Vectorul cu originea  $T(a, b)$  și extremitatea  $M(x, y)$ :

$$\overline{TM} = (x - a)\bar{\mathbf{i}} + (y - b)\bar{\mathbf{j}}.$$


Lungimea vectorului  $\overline{TM}$  (distanța dintre punctele  $T(a, b)$  și  $M(x, y)$ ):

$$\|\overline{TM}\| = TM = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}.$$

Împărțirea segmentului  $PQ$  în raportul  $k \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ :  $\overline{PM} = k\overline{MQ}$

$$P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2) \Rightarrow M(x, y) \text{ cu } x = \frac{x_1 + kx_2}{1 + k} \text{ și } y = \frac{y_1 + ky_2}{1 + k}.$$

Caz particular  $k = 1$ , mijlocul segmentului  $PQ$ :  $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ .



*Dreapta în plan*

1. Ecuația generală explicită :  $y = mx + n$   
 $(m$ , panta dreptei :  $m = \operatorname{tg} \varphi$ , unde  $\varphi$  este unghiul dintre dreaptă și semiaxă pozitivă  $Ox$ ).  
(Dreptele paralele cu axa  $Oy$  - dreptele verticale - sunt caracterizate prin ecuația  $x = p$ ; panta acestora este infinită.)
2. Ecuația generală implicită :  $Ax + By + C = 0$  ( $m = -\frac{A}{B}$ ).
3. Ecuația dreptei prin tăieturi :  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$  (dreapta taie  $Ox$  în  $a$  și  $Oy$  în  $b$ ).
4. Ecuația dreptei ce trece prin  $T(a, b)$  și are panta  $m$  :  $y - b = m(x - a)$ .

5. Ecuația dreptei ce trece prin  $T(a, b)$  și  $S(u, v)$  :  $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & b & 1 \\ u & v & 1 \end{vmatrix} = 0$ .

Aria triunghiului  $ABC$  cu  $A(a_1, a_2), B(b_1, b_2), C(c_1, c_2)$  :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \operatorname{mod} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 1 \\ b_1 & b_2 & 1 \\ c_1 & c_2 & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{adică modulul determinantului})$$

$A, B, C$  sunt coliniare  $\Leftrightarrow \mathcal{A} = 0$ .

Distanța de la punctul  $T(a, b)$  la dreapta  $(d)$   $Ax + By + C = 0$

$$\operatorname{dist}(d, T) = \frac{|Aa + Bb + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Unghiul ascuțit al dreptelor  $(d_1)$   $y = m_1x + n_1$  și  $(d_2)$   $y = m_2x + n_2$  este  $\psi$  cu

$$\operatorname{tg} \psi = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 m_1} \right|.$$

În cazul dreptelor exprimate explicit (de pantă finită)

$(d_1) \parallel (d_2) \Leftrightarrow m_1 = m_2$ .

$(d_1) \perp (d_2) \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = -1$  (relație utilă la determinarea normalei!).

### Cercul

Cercul este locul geometric al punctelor egale depărtate de un punct fix (numit centru).

1. Ecuația cercului de rază  $r$  și centru  $C(u, v)$

$$(x - u)^2 + (y - v)^2 = r^2.$$

2. Ecuația generală a cercului :  $x^2 + y^2 + a \cdot x + b \cdot y + c = 0$ .
3. Ecuația cercului ce trece prin punctele  $A(m, n), B(s, t)$  și  $C(p, q)$

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ m^2 + n^2 & m & n & 1 \\ s^2 + t^2 & s & t & 1 \\ p^2 + q^2 & p & q & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Intersecția dreptei cu cercul = soluția sistemului:  $\begin{cases} x^2 + y^2 + a \cdot x + b \cdot y + c = 0 \\ y = mx + n \end{cases}$ .

# ANALIZĂ MATEMATICĂ

## A. Siruri de numere reale

O funcție reală  $f$  definită pe multimea numerelor naturale  $\mathbb{N}$  (sau, echivalent, pe o secțiune  $\mathbb{N}_m$  a sa ce cuprinde toate numerele naturale ce depășesc o valoare fixată  $m$ ) se numește *sir de numere reale*. Este convenabilă precizarea sirului prin intermediul termenului său general:  $f(n) = a_n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) utilizând simplu notația  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ;

Sirul  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este *monoton* dacă și numai dacă  $\operatorname{sgn}(a_{n+1} - a_n)$  este constant oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n > 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}) &\Rightarrow (a_n) \text{ este strict crescător} \\ a_{n+1} - a_n < 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}) &\Rightarrow (a_n) \text{ este strict descrescător} \end{aligned}$$

Sirul  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este *mărginit* dacă și numai dacă toți termenii săi se găsesc într-un interval mărginit:

$$(\exists) M > 0 \text{ a. î. } (\forall) n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| \leq M.$$

### Definiție

Sirul de numere reale  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este *convergent* dacă există un număr real  $l$  cu proprietatea că pentru orice  $\varepsilon > 0$  există un rang  $n_\varepsilon$  astfel încât, pentru orice  $n \geq n_\varepsilon$ , are loc inegalitatea  $|a_n - l| < \varepsilon$ ; spunem că numărul real  $l$  este *limita* șirului cu termenul general  $a_n$  și notăm aceasta prin  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  sau  $a_n \rightarrow l$ .

Sirul de numere reale  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  are limita  $+\infty$  ( $-\infty$ ) dacă pentru orice număr  $M > 0$  se poate preciza un rang  $n_M$  astfel încât, pentru orice  $n \geq n_M$ , are loc inegalitatea  $a_n > M$  ( $a_n < -M$ ).

Sirurile care au limita infinită sau cele pentru care limita nu există se numesc *divergente*.

### Teoremă

Fie  $(a_n)_n$  și  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  două șiruri convergente având aceeași limită  $l$  iar  $(x_n)_n$  este un alt șir care verifică dubla inegalitate:

$$a_n \leq x_n \leq b_n \text{ oricare ar fi } n \geq n',$$

atunci  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este convergent iar  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ .

### Consecință 1

Fie  $(b_n)_n$  un șir convergent având limita 0 și  $(x_n)_n$  un alt șir pentru care există numărul real  $l$  cu proprietatea

$$|x_n - l| < b_n \text{ pentru orice rang } n \geq n'$$

atunci și  $(x_n)_n$  este convergent iar  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ .

### Consecință 2

Fie șirul  $(x_n)_n$  cu termenul general de forma  $x_n = a_n \cdot b_n$ ; dacă  $(a_n)_n$  este un șir mărginit iar  $(b_n)_n$  unul convergent cu limita 0 atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

Proprietățile șirurilor convergente

- i) Limita unui șir convergent de numere reale este unică.
- ii) Orice șir convergent de numere reale este mărginit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \Rightarrow (\exists) A, B \in \mathbb{R} \text{ a.î. } (\forall) n \geq n', \quad a_n \in [A, B].$$

*Teorema*

Orice sir monoton si mărginit este convergent.

Reciproca este falsă: sirul  $\left(\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right)_{n \geq 1}$  este convergent (cu limita 0) dar nu este monoton.

*Limite remarcabile*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = \begin{cases} 0, & r > 0 \\ 1, & r = 0 \\ \infty, & r < 0 \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1 \\ 1, & q = 1 \\ \infty, & q > 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 n^p + a_1 n^{p-1} + \dots + a_p) = \begin{cases} -\infty, & a_0 < 0 \\ +\infty, & a_0 > 0 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^p + a_1 n^{p-1} + \dots + a_p}{b_0 n^q + b_1 n^{q-1} + \dots + b_q} = \begin{cases} 0, & p < q \\ \frac{a_0}{b_0}, & p = q \\ \infty \cdot sgn\left(\frac{a_0}{b_0}\right), & p > q \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0 \quad (|a| > 1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (a \in \mathbb{R})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^r} = 0 \quad (r > 0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Sirul cu termenul general  $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  este crescător și mărginit în intervalul  $[2, 3]$ .

Sirul cu termenul general  $E_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$  este crescător și verifică inegalitățile

$$2 < e_n < E_n < e < 3.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}\right) = e.$$

Numărul  $e \approx 2,718281\dots$  este baza logaritmului natural:  $\ln e = 1$ .

## B. Limite de funcții și funcții continue

Fie  $D \subset \mathbb{R}$  o mulțime nevidă și  $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  un punct de acumulare al acesteia adică un punct pentru care există siruri  $(x_n)_n$  din  $D$ ,  $x_n \neq a$  a.î.  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ .

*Definiție*

Funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  are limita  $l$  (finită sau infinită) în punctul  $a$  dacă pentru orice sir  $(x_n)_n$  din  $D$ ,  $x_n \neq a$  cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  este verificată egalitatea  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$ . Notăm aceasta prin  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ .

Limita unei funcții într-un punct (de acumulare al domeniului de definiție), dacă există, este unică.

Dacă există două siruri  $(x'_n)_n$  și  $(x''_n)_n$  în  $D$ ,  $x'_n, x''_n \neq a$  cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x''_n = a$  dar  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n)$  atunci funcția  $f$  nu are limită în punctul  $a$ .

*Exemple*

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$  nu există deoarece pentru sirurile  $(n\pi)_n$  și  $\left((4n+1)\frac{\pi}{2}\right)_n$  cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} n\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} (4n+1)\frac{\pi}{2} = \infty$ , sirurile valorilor funcției au limite diferite,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ , în timp ce

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(4n+1)\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$  nu există deoarece pentru sirurile  $\left(\frac{1}{n\pi}\right)_n$  și  $\left(\frac{2}{(4n+1)\pi}\right)_n$  cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(4n+1)\pi} = 0$ , sirurile valorilor funcției au limite diferite,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0$ , în timp ce

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{\frac{2}{(4n+1)\pi}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(4n+1)\frac{\pi}{2} = 1.$$

*Limite laterale:*

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) \stackrel{\text{not}}{=} f(a-0)$  (limita la stânga) și  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \stackrel{\text{not}}{=} f(a+0)$  (limita la dreapta).

Dacă  $f$  are limite laterale egale  $f(a-0) = f(a+0) = l$  atunci  $f$  are limită în  $a$  și  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ .

Dacă  $f$  are limite laterale diferite  $f(a - 0) \neq f(a + 0)$  atunci  $f$  nu are limită în  $a$  ( $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  nu există).

*Teorema*

Fie  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  două funcții,  $a$  un punct de acumulare al domeniului  $D$ ,  $V_a$  o vecinătate a lui  $a$  și  $l$  un număr real.

Dacă i)  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$  atunci  $f$  are limită în  $a$  și  
ii)  $|f(x) - l| \leq |g(x)|$  ( $\forall x \in V_a \cap D$ )  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ .

*Exemplu*

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \text{ deoarece } \left| x \sin \frac{1}{x} - 0 \right| = |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| \cdot 1 = |x|.$$

*Limite remarcabile*

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_0 x^p + a_1 x^{p-1} + \cdots + a_p) = a_0 \cdot (\pm\infty)^p$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_0 x^p + a_1 x^{p-1} + \cdots + a_p}{b_0 x^q + b_1 x^{q-1} + \cdots + b_q} = \begin{cases} 0, & p < q \\ \frac{a_0}{b_0}, & p = q \\ \frac{a_0}{b_0} (\pm\infty)^{p-q}, & p > q \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x a^{-x} = 0 \quad (a > 1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^r} = 0 \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^r}{\ln x} = 0 \quad (r > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^r - 1}{x} = r$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{2} - \arccos x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

Fie  $D \subset \mathbb{R}$  o mulțime nevidă și  $a \in D$  un punct de acumulare al domeniului de definiție.

#### *Definiție*

Funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă în  $a$  dacă  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  există și coincide cu valoarea funcției în  $a$ , mai precis  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

Funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă pe mulțimea  $D_0 \subset D$  dacă este continuă în fiecare punct al mulțimii  $D_0$ .

Punctele de acumulare ale domeniului în care funcția nu este continuă se numesc puncte de discontinuitate.

Funcția  $f$  prezintă o discontinuitate de speță întâi în  $x = a$  dacă are limite laterale finite și diferite în  $a$  ( $f(a - 0) \neq f(a + 0)$ ) sau acestea sunt finite egale dar diferite de  $f(a)$ . Orice punct de discontinuitate care nu este de speță întâi este clasificat de speța a doua.

#### *Exemplu*

Funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  este discontinuă în  $a = 0$ ; punctul  $a = 0$  este punct de discontinuitate de speța a doua.

#### *Proprietăți ale funcțiilor continue*

- Orice funcție continuă pe un interval mărginit și închis este mărginită și își atinge marginile. Mai precis, oricare ar fi  $x \in [a, b]$  toate valorile  $f(x)$  se găsesc în intervalul  $[m, M]$  ( $m$  și  $M$  reprezintă minimul, respectiv maximul funcției) și în plus, există  $x_m \in [a, b]$  și  $x_M \in [a, b]$  așa încât  $m = f(x_m)$  și respectiv,  $M = f(x_M)$ .

- Dacă  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă și ia valori de semne diferite în capetele intervalului  $[a, b]$  atunci ecuația  $f(x) = 0$  are cel puțin o rădăcină în intervalul  $(a, b)$ .


- Dacă  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă pe intervalul  $I$  atunci imaginea acestuia  $J = f(I)$  ( $= \text{Im}(f)$ ) este de asemenea un interval.

#### *Observații asupra proprietății lui Darboux*

O funcție  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  are proprietatea lui Darboux dacă oricare ar fi  $a, b \in I$  ( $a < b$ ) și  $\lambda$  situat între  $f(a)$  și  $f(b)$  există cel puțin un punct  $c_\lambda \in (a, b)$  pentru care  $\lambda = f(c_\lambda)$ .

Orice funcție continuă pe un interval are proprietatea lui Darboux.

Funcțiile discontinue care prezintă o discontinuitate de speță întâi nu au proprietatea lui Darboux.




Funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  are proprietatea lui Darboux deși este discontinuă (discontinuitatea este de speță a doua!).

### C. Funcții derivabile

#### Definiție

O funcție  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  este *derivabilă* în punctul  $a$  (situat în intervalul  $I$ ) dacă limita  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  există și este finită.



#### Interpretarea geometrică a derivatei

Din punct de vedere geometric, raportul  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  este tangenta unghiului  $\widehat{AMN}$  (vezi figura) și urmare a trecerii la limită după  $x \rightarrow a$ ,  $f'(a)$  nu reprezintă altceva decât panta tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul  $A(a, f(a))$ . Cu alte cuvinte,  $f'(a)$  este tangenta (trigonometrică a) unghiului

pe care dreapta tangentă în punctul  $A$  îl face cu semiaxa pozitivă  $Ox$ . Ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă  $a$  este

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Uneori, pentru a pune în evidență și variabila independentă a funcției, numărul  $f'(a)$ , derivata lui  $f$  în  $x = a$  se notează prin  $\frac{df}{dx}(a)$  iar derivata  $f'(x)$  într-un punct arbitrar pur și simplu prin  $\frac{df}{dx}$ .

### *O interpretare fizică a derivatei*

Un mobil aflat în mișcare rectilinie parcurge în  $t$  unități de timp (secunde / minute / ore) distanța  $s(t)$  (măsurată în metri / kilometri) sau, cu alte cuvinte, distanța parcursă de mobil poate fi privită ca o funcție  $s : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ . Dacă  $s$  este derivabilă pe  $[0, T]$  atunci viteza sa la momentul  $t$  se definește prin  $v(t) = s'(t)$  iar dacă și  $v$  este o funcție derivabilă atunci accelerația mobilului la momentul  $t$  este  $a(t) = v'(t) = s''(t)$ .

### *Condiția necesară de derivabilitate*

Orice funcție derivabilă într-un punct este continuă în acel punct. Reciproca afirmației este falsă: spre exemplu funcția modul este continuă în origine fără a fi însă derivabilă.

### *Cum se studiază derivabilitatea unei funcții într-un punct?*

- se verifică proprietatea de continuitate în punctul precizat (dacă funcția este discontinuă studiul derivabilității nu are sens),

- se calculează derivatele laterale

$$f'_s(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{și} \quad f'_d(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Dacă derivatele laterale în  $a$  există, sunt finite și egale atunci funcția  $f$  este derivabilă în  $a$ . (Pentru punctele situate la extremitățile -finite- ale domeniului de definiție este suficient ca una singură din derivatele laterale să existe și să fie finită). În toate celelalte situații, funcția nu este derivabilă în punctul studiat.

*Tabelul derivatelor*

Identitățile din tabelele ce urmează se deduc cu formula

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

ce rezultă din definiție prin schimbarea de variabilă  $x - a = h$ .

1.	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = x^n$	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(n \in \mathbb{N})$
	$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = \frac{1}{x^n}$	$\left(\frac{1}{x^n}\right)' = -\frac{n}{x^{n+1}}$	$(n \in \mathbb{N})$
		$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	
	$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = x^r$	$(x^r)' = rx^{r-1}$	$(r \in \mathbb{R})$
		$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	
		$(\sqrt[3]{x})' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$	
2.	$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ , $f(x) = a^x$	$(a^x)' = a^x \ln a$	$(a > 0, a \neq 1)$
		$(e^x)' = e^x$	
3.	$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = \log_a x$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(a > 0, a \neq 1)$
		$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	
		$(\ln  x )' = \frac{1}{x}$	$(x \neq 0)$
4.	$f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ , $f(x) = \sin x$	$(\sin x)' = \cos x$	
5.	$f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ , $f(x) = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$	
6.	$f : \mathbb{R} \setminus \left\{ (2k+1) \frac{\pi}{2} \right\}_{k \in \mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = \operatorname{tg} x$	$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	
		$(\operatorname{tg} x)' = 1 + \operatorname{tg}^2 x$	
7.	$f : \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}_{k \in \mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = \operatorname{ctg} x$	$(\operatorname{ctg} x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$	

8.	$f : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], f(x) = \arcsin x$	$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \neq \pm 1)$
9.	$f : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], f(x) = \arccos x$	$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \neq \pm 1)$
10.	$f : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), f(x) = \operatorname{arctg} x$	$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{x^2+1}$

*Proprietăți ale funcțiilor derivabile*

$$\boxed{(cf(x))' = cf'(x)}$$

$$\boxed{(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)}$$

$$\boxed{(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}$$

$$\boxed{\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}, \quad g(x) \neq 0}$$

$$\boxed{\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = \frac{-g'(x)}{g^2(x)}, \quad g(x) \neq 0}$$

$$\boxed{(f(u(x)))' = f'(u(x)) \cdot u'(x)}$$

Dacă  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  este o funcție derivabilă pe intervalul  $I$  atunci derivata sa  $f'$  are proprietatea lui Darboux pe  $I$ .

*Derivate de ordin superior*

O funcție reală este de clasă  $\mathcal{C}^1$  pe intervalul  $I \subset \mathbb{R}$  dacă este derivabilă în fiecare punct din  $I$  și în plus, derivata sa  $f'$  este continuă pe  $I$ . Multimea funcțiilor de clasă  $\mathcal{C}^1$  pe  $I$  se notează cu  $\mathcal{C}_I^1$  iar  $\mathcal{C}_I^0$  desemnează în mod natural clasa funcțiilor continue pe intervalul  $I$ .

În general, pentru un indice  $n \in \mathbb{N}$  fixat, se spune că  $f$  este o funcție de clasă  $\mathcal{C}^n$  (notație  $f \in \mathcal{C}_I^n$ ) dacă  $f$  e derivabilă de  $n$  ori pe  $I$  cu derivata  $f^{(n)}$  continuă.

Funcțiile elementare cum ar fi  $e^x$ ,  $\cos x$ ,  $\sin x$ , polinoamele de orice grad, logaritmul (indiferent de bază) sunt funcții de clasă  $\mathcal{C}^\infty$  pe domeniul lor maxim de definiție  $I$ .

*Tabelul derivatelor de ordinul n*

$(x^p)^{(n)}$	$= p(p-1)\cdots(p-n+1)x^{p-n}$	$p \geq n, (p \in \mathbb{N})$
	$= 0$	$p < n, (p \in \mathbb{N})$
$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)}$	$= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$	$(x \neq 0)$
$(e^x)^{(n)}$	$= e^x$	
$(\sin x)^{(n)}$	$= \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$	$(n \in \mathbb{N})$
$(\cos x)^{(n)}$	$= \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$	$(n \in \mathbb{N})$
$((1+x)^r)^{(n)}$	$= r(r-1)\cdots(r-n+1)(1+x)^{r-n}$	$(x > -1, r \in \mathbb{R})$

### **Aplicațiile derivatei**

Fie  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție și  $a$  un punct al domeniului de definiție  $D$ .

Punctul  $a$  este *punct de extrem local* pentru  $f$  dacă există o vecinătate a sa  $V_a$  în care creșterea funcției  $f(x) - f(a)$  are semn constant; cu alte cuvinte, există  $r > 0$  a.î.

$$\operatorname{sgn}(f(x) - f(a)) = \operatorname{const}. \quad (\forall) x \in (a-r, a+r) \cap D.$$

Mai precis,

$$\begin{aligned} a \text{ este } \text{minim local} &\quad \text{d.d. } f(x) - f(a) \geq 0, \\ a \text{ este } \text{maxim local} &\quad \text{d.d. } f(x) - f(a) \leq 0 \quad (\forall) x \in (a-r, a+r) \cap D. \end{aligned}$$

*Teorema lui Fermat*


Fie  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție și  $a$  un punct din domeniul de definiție  $D$ .

$$\text{Dacă } \begin{cases} a \text{ este interior lui } D \\ a \text{ este punct de extrem local} \\ f \text{ este derivabilă în } a \end{cases} \text{ atunci } f'(a) = 0.$$

### *Interpretarea geometrică*


Tangenta la graficul funcției într-un punct de extrem local din interiorul domeniului de definiție al unei funcții derivabile, este paralelă cu axa  $Ox$ .

Punctul  $x_0$  este un *punct critic (stationar)* al funcției derivabile  $f$  dacă  $f'(x_0) = 0$ , deci conform teoremei lui Fermat, punctele critice sunt posibile puncte de extrem ale funcției.




### Teorema lui Rolle

Dacă  $\begin{cases} f \text{ este continuă pe } [a, b] \\ f \text{ este derivabilă pe } (a, b) \quad \text{atunci} \quad (\exists) c \in (a, b) \text{ a.î. } f'(c) = 0. \\ f(a) = f(b) \end{cases}$



Teorema lui Rolle



Teorema lui Lagrange

În particular, dacă  $f(a) = f(b) = 0$ , teorema afirmă că între două rădăcini ale ecuației  $f(x) = 0$  există cel puțin o rădăcină a derivatei.

Reciproc, între două rădăcini consecutive ale derivatei, dacă funcția își schimbă semnul, există o singură rădăcină a ecuației  $f'(x) = 0$ .

#### Aplicație

Separarea rădăcinilor ecuației  $f(x) = 0$  cu ajutorul sirului lui Rolle

Dacă  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă și derivabilă (extremitățile intervalului pot fi infinite) și  $c_1 < c_2 < \dots < c_k$  sunt rădăcinile ecuației  $f'(x) = 0$  atunci orice schimbare a semnului în sirul lui Rolle

$x$	$a$	$c_1$	$c_2$	$\dots$	$c_k$	$b$
$\text{sgn}(f(x))$	$\text{sgn}(f(a))$	$\text{sgn}(f(c_1))$	$\text{sgn}(f(c_2))$		$\text{sgn}(f(x_k))$	$\text{sgn}(f(b))$

indică intervalele ce conțin câte o rădăcină a ecuației  $f(x) = 0$ .

#### Teorema lui Lagrange

Dacă  $\begin{cases} f \text{ este continuă pe } [a, b] \\ f \text{ este derivabilă pe } (a, b) \end{cases}$  atunci  $(\exists) c \in (a, b)$  a.î.

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

### *Interpretarea geometrică*

Există cel puțin un punct  $(c, f(c))$ , situat pe graficul funcției, în care tangentă este paralelă cu coarda ce unește extremitățile  $(a, f(a))$  și  $(b, f(b))$ .

#### *Consecințe*

Orice funcție derivabilă pe un interval cu derivata pozitivă (negativă) este crescătoare (descrescătoare) pe acel interval.

Dacă derivata unei funcții este nulă pe un interval atunci funcția este constantă pe acel interval:

$$f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ derivabilă pe intervalul } I \subset D$$

$$f'(x) = 0 \quad (\forall) x \in I \Rightarrow f(x) = c \text{ (constantă) pe } I.$$

### *Teorema lui Cauchy*

$$\text{Dacă } \begin{cases} f, g \text{ sunt continue pe } [a, b] \\ f, g \text{ sunt derivabile pe } (a, b) \text{ atunci } (\exists) c \in (a, b) \text{ a.î.} \\ g'(x) \neq 0 \text{ pe } (a, b) \end{cases}$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

### *Limite de funcții* (completări)

Calculul limitelor de funcții conduce cel mai adesea la situații exceptate de la regulile de calcul algebric, cum ar fi  $\frac{0}{0}$  sau  $\frac{\infty}{\infty}$ , și este nevoie de multă îndemânare pentru evitarea lor. În condiții rezonabile de derivabilitate a termenilor, *regula lui l'Hospital* poate fi de mare ajutor dacă este aplicată corect și cu discernământ. Pe scurt, *regula lui l'Hospital* reduce calculul limitei  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  ( $a$ , finit sau infinit) aflată într-una din situațiile de nedeterminare  $\frac{0}{0}$  sau  $\frac{\infty}{\infty}$ , la calculul limitei (uneori mai simple)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ . Mai precis, dacă  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$  (finit sau infinit) atunci și  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ .

*Exemplu*

a)  $L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x^2 + x - 5)}{x^2 - 4} = \frac{0}{0}$ , nedeterminare.

Se calculează

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\ln(x^2 + x - 5))'}{(x^2 - 4)'} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 5}{2x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x + 1}{2x(x^2 + x - 5)} = \frac{5}{4}.$$

Conform regulii lui l'Hospital rezultă  $L = \frac{5}{4}$ .

b)  $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + \sin^2 x^2}{\ln(1 + \sin^4 x)} = \frac{0}{0}$ , nedeterminare.

Limita raportului derivatelor este dificil de calculat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln(x^4 + \sin^2 x^2))'}{(\ln(1 + \sin^4 x))'} = \dots \text{(dar nu imposibil de calculat).}$$

Este recomandată metoda directă, bazată pe utilizarea limitelor remarcabile evidențiate mai sus.

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + \sin^2 x^2}{\ln(1 + \sin^4 x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{\sin^4 x} \frac{1 + \left(\frac{\sin x^2}{x^2}\right)^2}{\frac{\ln(1 + \sin^4 x)}{\sin^4 x}} = 1 \cdot \frac{1 + 1^2}{1} = 2.$$

c)  $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \frac{0}{0}$ , nedeterminare. (Am văzut că  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ .)

Limita raportului derivatelor nu există

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x^2 \sin \frac{1}{x}\right)'}{(\sin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}}{\cos x}, \text{ deoarece } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ nu există.}$$

Totuși limita există:  $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x}\right) \left(x \sin \frac{1}{x}\right) = 1 \cdot 0 = 0$ .

d)  $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{\infty}{\infty}$ , nedeterminare.

Utilizarea (fără discernământ) a regulii lui l'Hospital nu duce la niciun rezultat:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x)'}{(\sqrt{x^2 + 1})'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$ .

Totuși limita poate fi calculată cu metoda factorului forțat:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = 1.$$

## Ghid pentru reprezentarea grafică a funcțiilor

Etapele reprezentării grafice a funcțiilor reale de variabilă reală  
 $f : E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \dots$

### 1. Stabilirea domeniului maxim de definiție $E$

*Domeniul maxim de definiție  $E$*  este alcătuit din toate numerele reale  $x$  pentru care expresia  $f(x)$  are sens și este finită:  $E = \{x \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$ . Mulțimea  $E$  este de regulă o reuniune de intervale și eventual, de puncte ”izolate”.

### 2. Limitele funcției la extremitățile (finite și infinite) ale intervalelor din $E$

*Domeniul de continuitate:*  $E_c = \{x \mid x \in E \text{ și } f \text{ este continuă în } x\}$  este o reuniune de intervale deschise sau închise.

*Asimptote verticale:*

$a$ , extremitate de interval al domeniului  $E_c$ ,  $a \neq \pm\infty$  ;  
 $x = a$  este *asimptotă verticală* dacă cel puțin una dintre limitele laterale  $f(a - 0)$  sau  $f(a + 0)$  este infinită.

*Asimptote oblice* (sau, în particular, *orizontale*):

$y = n$  este *asimptotă orizontală* dacă  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = n$  sau  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = n$ ;  
 $y = mx + n$  este *asimptotă oblică* dacă  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$  este infinită sau nu există, dar  $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$  și  $n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx)$  există și sunt finite.


### 3. Studiul derivatei întâi

Calculul derivatei întâi  $f'(x)$ .

*Domeniul de derivabilitate* este domeniul maxim de existență al expresiei  $f'(x) : E_d = \{x \mid x \in E_c \text{ și } f \text{ este derivabilă în } x\}$ .


Practic, pentru precizarea domeniului  $E_d$ , se calculează derivele laterale  $f'_s(b)$  și  $f'_d(b)$  în acele puncte  $b$  ale domeniului de continuitate  $E_c$  în care există dubii asupra existenței expresiei  $f'(x)$ .

- Dacă  $f'_s(b)$  și  $f'_d(b)$  sunt finite și egale atunci  $b$  aparține domeniului de derivabilitate  $E_d$ .




Funcția  $f$  este derivabilă în punctul  $b$  iar dreapta  $y - f(b) = f'(b)(x - b)$  este tangentă în punctul  $(b, f(b))$ .

- Dacă  $f'_s(b)$  și  $f'_d(b)$  sunt infinite, egale atunci  $f$  nu este derivabilă în  $b$ ,  $(b, f(b))$  este un punct de inflexiune cu tangentă verticală al graficului iar dreapta  $x = b$  este tangentă verticală.
- Dacă  $f'_s(b)$  și  $f'_d(b)$  sunt infinite, diferite atunci  $f$  nu este derivabilă în  $b$ ,  $(b, f(b))$  este un punct de întoarcere al graficului iar semidreapta  $x = b$  (cu  $y \geq f(b)$  sau cu  $y \leq f(b)$ , după caz) este semitangentă verticală.



- Dacă  $f'_s(b)$  și  $f'_d(b)$  sunt finite și diferite sau cel puțin una dintre derivatele laterale este finită atunci funcția nu este derivabilă în  $b$ ,  $(b, f(b))$  este un *punct unghiular* al graficului.



Se rezolvă ecuația  $f'(x) = 0$ . Rădăcinile derivatei sunt *punctele critice* sau *staționare* ale funcției.

Importanța studiului amănunțit al derivatei întâi constă în următoarele:

-*punctele de extrem* ale funcției se găsesc printre punctele sale critice, unghiulare sau de întoarcere;

-*semnul* derivatei întâi oferă informații despre intervalele de monotonie:

$f'(x) \geq 0$  pe intervalul  $I \subset E_d \Rightarrow f$  este crescătoare pe  $I$ ,

$f'(x) \leq 0$  pe intervalul  $I \subset E_d \Rightarrow f$  este descrescătoare pe  $I$ .

#### 4. Studiul derivatei a doua

Calculul derivatei a doua  $f''(x)$ .

Precizarea domeniului maxim de existență al expresiei  $f''(x)$ .

Se determină rădăcinile ecuației  $f''(x) = 0$ .

*Punctele de inflexiune* ale funcției se găsesc printre rădăcinile derivatei a doua. Semnul derivatei a doua stabilește intervalele pe care funcția este concavă sau convexă:


$f''(x) \geq 0$  pe intervalul  $I \Rightarrow f$  este convexă pe  $I$ ,

$f''(x) \leq 0$  pe intervalul  $I \Rightarrow f$  este concavă pe  $I$ .


Dacă expresia  $f'(x)$  are o formă complicată (calculul lui  $f''(x)$  ia mult timp) sau ecuația  $f''(x) = 0$  este dificil de rezolvat, se poate renunța la studiul derivatei a doua.

**5.** *Tabelul de variație al funcției*


$x$	Se așază crescător punctele importante determinate mai sus.
$f'(x)$	Se studiază semnul pe fiecare interval evidențiat la rubrica $x$ .
$f''(x)$	Se studiază semnul pe fiecare interval evidențiat la rubrica $x$ .
$f(x)$	Pe fiecare interval se trasează săgețile ce indică monotonia și forma ramurilor ce alcătuiesc graficul funcției, respectând următoarele reguli:




Crescătoare,  
convexă



Crescătoare,  
concavă



Descrescătoare,  
convexă



Descrescătoare,  
concavă

**6.** *Valori importante*

Se calculează coordonatele punctelor în care funcția nu este continuă, nu este derivabilă, ale punctelor critice și ale punctelor de inflexiune. Valorile găsite se trec în tabelul de variație al funcției.

Se calculează coordonatele punctelor de intersecție cu axele:

$$\cap Ox \quad y = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \quad (\text{se rețin doar valorile } x \in E).$$

$$\cap Oy \quad x = 0 \Rightarrow y = f(0) \quad (\text{doar dacă } 0 \in E).$$

**7.** *Reprezentarea grafică*

- se trasează axele de coordonate,
- se stabilește unitatea de măsură pe fiecare axă împărțită,
- se trasează asymptotele și tangentele verticale,
- se așeză pe grafic punctele importante ale căror coordonate au fost calculate mai sus,
- se trasează graficul funcției conform tabelului de variație.

8. *Observații*

Se studiază eventualele simetrii ale graficului.

- Dacă  $f$  este o funcție *pară*, adică  $f(-x) = f(x)$  ( $\forall x \in E$ ), atunci graficul funcției este *simetric față de axa Oy*.
- Dacă  $f$  este o funcție *impară*, adică  $f(-x) = -f(x)$  ( $\forall x \in E$ ), atunci graficul funcției este *simetric față de origine*.

Se studiază periodicitatea.

Funcția  $f$  este *periodică cu perioada T* dacă  $f(x+T) = f(x)$  ( $\forall x \in E$ ); cel mai mic număr pozitiv  $T$  cu această proprietate (dacă există) se numește *perioada principală*.

Se precizează imaginea funcției:  $\text{Im } f = \{y \mid (\exists) x \in E \text{ a.î. } y = f(x)\}$ .

## D. Integrabilitate și aplicații

### Definiție

Funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ( $D \subset \mathbb{R}$ , interval) este *primitivabilă* dacă există o funcție  $F : D \rightarrow \mathbb{R}$ , numită *primitiva* lui  $f$ , având proprietățile:

- (i)  $F$  este derivabilă pe  $D$
- (ii)  $F'(x) = f(x)$ , ( $\forall x \in D$ ).

Mulțimea tuturor primitivelor lui  $f$  este notată prin simbolul  $\int f(x)dx$  ce se citește *"integrala nedefinită a lui f în raport cu x"*. Întrucât orice două primitive ale aceleiasi funcții primitivabile diferă printr-o constantă ( $f$  este definită pe un interval !), pentru determinarea integralei nedefinite este suficientă găsirea unei singure primitive  $F$ . Are loc egalitatea de mulțimi

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

unde  $C$  reprezintă mulțimea funcțiilor reale constante definite pe  $D$ .

Proprietatea (ii) din definiție permite alcătuirea unui tabel cu integrale nedefinite a cărui consultare atentă reprezintă o primă metodă de primitivare. În plus, din (ii) rezultă și proprietatea de liniaritate a integralei nedefinite:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx$$

oricare ar fi  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ , primitivabile și  $\alpha, \beta$  numere reale.

*Tabelul primitivelor elementare<sup>2</sup>*

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad x \in I \subset \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

$$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C \quad x \in I \subset \mathbb{R}_+^*, \quad r \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C, \quad \int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C \quad x \in I \subset (0, \infty)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C \quad x \in I \subset \mathbb{R}_+^*$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad x \in I \subset \mathbb{R}$$

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C \quad x \in I \subset \mathbb{R}$$

$$\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \quad x \in I \subset \mathbb{R} \setminus \{-a, a\}$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C \quad x \in I \subset \mathbb{R}$$

$$\int \operatorname{tg} x dx = -\ln |\cos x| + C \quad x \in I \subset \mathbb{R} \setminus \left\{ (2k+1) \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C \quad x \in I \subset \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{R}\}$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C \quad x \in I \subset \mathbb{R} \setminus \left\{ (2k+1) \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln \left( x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C \quad x \in I \subset \mathbb{R}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C \quad x \in I \subset (-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C \quad x \in I \subset (-a, a)$$

---

<sup>2</sup>I reprezintă intervalul de integrare.

În practică își dovedesc utilitatea și următoarele trei formule de integrare ce se pot verifica imediat prin derivarea membrului drept:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \sqrt{x^2 + a^2} + C; \quad \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \sqrt{x^2 - a^2} + C;$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\sqrt{a^2 - x^2} + C.$$

### Problema A

*Cum se poate decide dacă funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ( $D \subset \mathbb{R}$ , interval) este sau nu primitivabilă?*

Direct, problema poate fi rezolvată intuind (de exemplu cu ajutorul tabloului) forma pe care ar trebui să-o aibă primitiva  $F$  și verificând dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile (i) și (ii) din definiție.

Posibilitatea rezolvării indirecte a problemei A se bazează pe următoarele rezultate:

- Orice funcție reală continuă pe intervalul  $D \subset \mathbb{R}$  este primitivabilă pe  $D$ .
- Dacă  $f$  este o funcție reală primitivabilă pe intervalul  $D \subset \mathbb{R}$  atunci din identitatea  $f = F'$  rezultă imediat că  $f$  are proprietatea lui Darboux pe  $D$ .

i) Dacă  $f$  nu are proprietatea lui Darboux pe intervalul  $D$  atunci  $f$  nu este primitivabilă pe  $D$ .

ii) Dacă  $f$  are în punctul  $x_0$  al intervalului  $D$  o discontinuitate de speță I (adică limitele laterale  $f(x_0 - 0)$  și  $f(x_0 + 0)$  sunt finite dar diferite) atunci  $f$  nu este primitivabilă pe  $D$ .

Astfel, pentru a dovedi primitivabilitatea unei funcții este suficient (nu și necesar) să se verifice continuitatea sa, ceea ce este mult mai comod în comparație cu verificarea condițiilor i) și ii) ale definiției.

Pentru a dovedi neprimitivabilitatea unei funcții este suficient (nu și necesar) să se verifice că  $f$  nu posedă proprietatea lui Darboux, adică faptul că există un interval  $D_0 \subset D$  a cărui imagine prin  $f$ ,

$$f(D_0) = \{y \mid y \in \mathbb{R}, (\exists)x_0 \in D_0 : y = f(x_0)\},$$

nu este interval.

### Problema B

*Cum poate fi determinată integrala nedefinită  $\mathcal{I} = \int f(x)dx$  a funcției primitiveabile  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ( $D \subset \mathbb{R}$ , interval)?*

O primă metodă o constituie, aşa cum remarcam înainte, consultarea atentă a tabelului cu primitivele unor funcții elementare. Descriem în continuare câteva procedee de calcul a integralei nedefinite utile în rezolvarea problemelor.

#### METODA INTEGRĂRII PRIN PĂRTI

Dacă  $f$  se poate exprima sub forma

$$f(x) = u(x) \cdot v'(x)$$

cu  $u, v : D \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile, atunci

$$\mathcal{I} = \int f(x)dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x)dx = \dots = F(x) + C$$

(cu alte cuvinte, calculul integralei inițiale  $\int u(x) \cdot v'(x)dx$  se reduce la cel al integralei  $\int u'(x) \cdot v(x)dx$  care, la o alegere judicioasă a funcțiilor  $u$  și  $v$ , poate fi mai simplă).

#### METODA SCHIMBĂRII DE VARIABILĂ (1)

Dacă  $f$  se poate exprima sub forma:

$$f(x) = g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x),$$

unde  $\varphi : D \rightarrow E$  ( $E \subseteq \mathbb{R}$  interval) este derivabilă iar  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  este primitivabilă cu primitiva  $G$ , atunci calculul integralei nedefinite

$$\mathcal{I} = \int f(x)dx = \int g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)dx,$$

prin schimbarea de variabilă  $t = \varphi(x)$ , se reduce la calculul integralei nedefinite:

$$\mathcal{I}_t = \int g(t)dt = \dots = G(t) + C$$

și în final

$$\mathcal{I} = G(\varphi(x)) + C.$$

### *METODA SCHIMBĂRII DE VARIABILĂ (2)*

Dacă  $\Psi : E \rightarrow \mathbb{R}$  ( $E \subseteq \mathbb{R}$ , interval) este bijectivă și derivabilă iar  $(f \circ \Psi) \cdot \Psi'$  este primitivabilă pe  $E$  cu primitiva  $H$  atunci calculul integralei nedefinite

$$\mathcal{I} = \int f(x) dx$$

se reduce prin schimbarea de variabilă (substituția)  $x = \Psi(t)$  la cel al integralei

$$\mathcal{I}_t = \int f(\Psi(t)) \cdot \Psi'(t) dt = \dots = H(t) + C,$$

iar în final, revenind la variabila inițială (în baza bijectivității lui  $\Psi$ ,  $t = \Psi^{-1}(x)$ ), se obține:

$$\mathcal{I} = H(\Psi^{-1}(x)) + C.$$

### *SUBSTITUȚII REMARCABILE*

*Utilizarea formei canonice a trinomului de gradul al-II-lea*

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= \frac{4a}{4a} (ax^2 + bx + c) = \frac{1}{4a} (4a^2x^2 + 4abx + 4ac) = \\ &= \frac{1}{4a} [(2ax + b)^2 + \Delta] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_x &= \int f(ax^2 + bx + c) dx \quad \text{cu } f \text{ integrabilă} \\ t = 2ax + b \Rightarrow \mathcal{I}_t &= \frac{1}{2a} \int g(t) dt, \quad \text{unde } g(t) = f\left(\frac{t^2 + \Delta}{4a}\right). \end{aligned}$$

*Primitivarea funcțiilor raționale*

$$\begin{aligned} \mathcal{I} &= \int R(x) dx = \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx \\ grP &\geq grQ \Rightarrow R = C + \frac{\rho}{Q} \text{ (restul) } \Rightarrow \mathcal{I} = \int C(x) dx + \int \frac{\rho(x)}{Q(x)} dx \\ grP &< grQ \Rightarrow Q \quad \text{se descompune în produs de factori} \\ &\quad \text{de gr.I și II la diverse puteri} \\ R &= \frac{P}{Q} \text{ se descompune în fracții simple de forma} \\ &\quad \frac{A}{(ax+b)^n} \text{ respectiv } \frac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)^m} \text{ (cu } \Delta < 0\text{)} \\ &\quad \text{care se vor primitiva fiecare în parte} \end{aligned}$$

*Substituții trigonometrice pentru eliminarea radicalului*

$$\begin{array}{ll} \int f(\sqrt{a^2 - x^2}) dx & x = a \cdot \sin t \\ \int f(\sqrt{x^2 + a^2}) dx & x = a \cdot \operatorname{tg} t \\ \int f(\sqrt{x^2 - a^2}) dx & x = \frac{a}{\cos t} \end{array}$$

*Substituțile lui Euler*

$$\begin{array}{ll} \int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx & \text{cu } R, \text{ rațională} \\ \left\{ \begin{array}{ll} \Delta < 0 \Rightarrow t \pm \sqrt{ax} = \sqrt{ax^2 + bx + c} \\ \Delta > 0 \Rightarrow t = \sqrt{a \frac{x - x_1}{x - x_2}} \end{array} \right. \end{array}$$

*Integrale reductibile la integrale de funcții raționale*

$$\begin{aligned} \int R \left( x, \sqrt[p]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \dots, \sqrt[q]{\frac{ax+b}{cx+d}} \right) dx & \quad R, \text{ rațională} \\ t = \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}} & \quad \text{unde } m = [p, \dots, q] \end{aligned}$$

reprezintă cel mai mic multiplu comun al numerelor  $p, \dots, q$ .

$$\int R(e^x) dx \quad R, \text{ rațională} \quad t = e^x$$

$$\int R(\cos x, \sin x) dx = R, \text{ rațională} \quad \begin{cases} R(u, -v) = -R(u, v) \Rightarrow t = \cos x \\ R(-u, v) = -R(u, v) \Rightarrow t = \sin x \\ R(-u, -v) = R(u, v) \Rightarrow t = \operatorname{tg} x \end{cases}$$

Precizăm în încheiere că alegerea schimbării de variabilă ține de imaginația și experiența rezolvitorului care poate aborda o aceeași problemă prin două sau chiar mai multe modalități. Este interesant să comparați în asemenea situații rezultatele obținute și să explicați diferențele remarcate. De asemenea este util ca la integralele nedefinite întâlnite să reflectați asupra intervalelor maxime pe care sunt definite funcțiile de sub semnul integralei.

### *Construcția integralei definite*

Oricărei funcții  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  îi se poate atașa un număr real  $\sigma_f$  după cum urmează:

- se construiește o *diviziune* a intervalului de definiție:

$$(\Delta) \quad a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b,$$


- se alege un *sistem de puncte intermediare* diviziunii:

$$(\tau) \quad \{t_1, t_2, \dots, t_i, \dots, t_n\}, \quad t_i \in [x_{i-1}, x_i] \quad (i = \overline{1, n}),$$

- se definește

$$\sigma_f(\Delta, \tau) = \sum_{i=1}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1}).$$

Numărul  $\sigma_f(\Delta, \tau)$  se numește *suma integrală Riemann* a lui  $f$  relativ la diviziunea  $(\Delta)$  și sistemul de puncte intermediare  $(\tau)$ . Din punct de vedere geometric, pentru funcții pozitive, acest număr reprezintă o aproximare a ariei "de sub grafic".



*Definiție*

Funcția  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  este *integrabilă* (în sens Riemann) d.d. există un număr real  $\mathbb{I}$  care verifică următoarea proprietate:

"pentru orice număr  $\varepsilon > 0$  există  $\delta_\varepsilon > 0$  așa încât

oricare ar fi diviziunea  $(\Delta)$  cu normă  $\mu(\Delta) := \max_i(x_i - x_{i-1}) < \delta_\varepsilon$  și

oricare ar fi sistemul de puncte  $(\tau)$ , intermediare diviziunii  $(\Delta)$  ,  
are loc inegalitatea  $|\sigma_f(\Delta, \tau) - \mathbb{I}| < \varepsilon$ ".

Numărul  $\mathbb{I}$ , dacă există, se notează  $\int_a^b f(x)dx$  și reprezintă "integrala definită a funcției  $f$  pe intervalul  $[a, b]$  în raport cu variabila  $x$ ".

În cazul particular al partiției uniforme cu număr  $\frac{b-a}{n}$  rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f \left( a + \frac{k(b-a)}{n} \right) = \int_a^b f(x) dx.$$

### Problema C

*Cum se poate decide dacă funcția  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  este sau nu integrabilă?*

Utilizarea definiției, deși incomodă, este uneori inevitabilă.

Următoarele rezultate sunt utile pentru evitarea definiției în studiul integrabilității:

- Oricare funcție integrabilă pe  $[a, b]$  este mărginită pe  $[a, b]$ .
- Funcțiile reale nemărginite nu sunt integrabile.
- Orice funcție reală monotonă pe  $[a, b]$  este integrabilă pe  $[a, b]$ .
- Dacă  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă pe  $[a, b] \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$  iar punctele de discontinuitate  $x_i$  ( $i = \overline{1, k}$ ) sunt toate de speță întâi ( $f(x_i - 0)$  și  $f(x_i + 0)$  există, sunt finite dar diferite) atunci  $f$  este integrabilă pe  $[a, b]$ .

### Problema D

Cum poate fi calculată integrala definită  $\mathcal{I} = \int_a^b f(x)dx$ ?

Pentru a calcula integralele este bine să cunoașteți:

a) Proprietatea de liniaritate:

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

b) Proprietatea de aditivitate la interval:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

$f$  integrabilă iar  $c \in [a, b]$ .

### FORMULA LUI LEIBNIZ-NEWTON

Dacă funcția  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  este integrabilă și primitivabilă iar  $F$  este o primitivă a sa atunci

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Există funcții integrabile care nu sunt primitivabile ceea ce face ca formula să nu poată fi aplicată. Un caz aparte, în care nu se poate utiliza (direct) formula este acela al integralei unei funcții, integrabile și primitivabile, a cărei primitivă nu este exprimabilă prin funcții elementare. Asemenea funcții sunt  $e^{-x^2}$ ,  $\cos x^2$ ,  $\frac{\sin x}{x}$ .

## METODE DE INTEGRARE

*Integrarea prin părți* se aplică dacă  $f(x) = u(x) \cdot v'(x)$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx = \dots$$

*Schimbarea de variabilă* (1) se aplică dacă  $f(x) = g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

$$\mathcal{I} = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx$$

$$t = \varphi(x) \Rightarrow dt = \varphi'(x) dx$$

$$x = a \Rightarrow t = \varphi(a) \quad \text{și} \quad x = b \Rightarrow t = \varphi(b)$$

$$\mathcal{I} = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} g(t) dt = G(\varphi(b)) - G(\varphi(a))$$

*Schimbarea de variabilă* (2) se aplică dacă  $f(x)$  are o formă specială (vezi lista substituțiilor remarcabile)

$$\mathcal{I} = \int_a^b f(x) dx$$

$$t = \varphi(x) \Leftrightarrow x = \psi(t) \quad (\psi = \varphi^{-1})$$

$$x = \psi(t) \Rightarrow dx = \psi'(t) dt$$

$$x = a \Rightarrow t = \varphi(a) \quad \text{și} \quad x = b \Rightarrow t = \varphi(b)$$

$$\mathcal{I} = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(\psi(t)) \cdot \psi'(t) dt = H(\varphi(b)) - H(\varphi(a))$$

### Proprietățile integralei definite

#### Teoremă

Dacă funcția  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă atunci

- i)  $f$  este integrabilă pe  $[a, b]$ ,
- ii)  $f$  este primitivabilă pe  $[a, b]$  iar  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  este o primitivă a lui  $f$ .

Pentru orice funcție continuă  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  are loc identitatea

$$\frac{d}{dx} \left( \int_a^x f(t) dt \right) = f(x).$$

*Observație*

Integrarea și derivarea sunt operații "inverse" una celeilalte în sensul că

$$\int g'(x) dx = g(x) + C \quad \text{și} \quad \left( \int_a^x g(t) dt \right)'_x = g(x)$$

*Teorema*


Dacă  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  sunt integrabile atunci

$$f(x) \leq g(x), \quad (\forall)x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

*Teorema*

Dacă  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  este integrabilă și  $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$  respectiv  $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$  atunci

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$



*Teorema* (formula de medie)

Dacă  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  este integrabilă atunci există un punct  $c$  situat între  $a$  și  $b$  așa încât

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$


Numărul  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$  se numește *valoarea medie a funcției*  $f$  pe intervalul  $[a, b]$ .

### *Aplicații ale integralei definite în geometrie*

#### i) *Aria domeniilor mărginite cuprinse între graficele a două funcții*

Dacă  $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  două funcții continue ale căror grafice se intersecțează în punctele de abscise  $a < b < c$  determină un domeniu mărginit a cărui arie este

$$A_{f,g} = \int_a^c |g(x) - f(x)| dx.$$



#### *Exemplu*

Aria discului circular de rază  $r$  (centrat în origine)


$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2\} = \{(x, y) \mid -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}\}$$

$$\begin{aligned} Aria(D) &= \int_{-r}^r \left| \sqrt{r^2 - x^2} - (-\sqrt{r^2 - x^2}) \right| dx = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \\ &= 4 \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \left| 2r^2 \arcsin \frac{x}{r} + 2x\sqrt{r^2 - x^2} \right|_0^r = r^2\pi. \end{aligned}$$

ii) *Volumul corpurilor generate prin rotirea graficului funcției în jurul axei  $Ox$*

Dacă  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție continuă atunci corpul generat prin rotirea porțiunii de grafic cuprinsă între punctele  $x = a$  și  $x = b$  în jurul axei  $Ox$  are volumul

$$V_f = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$





## PROBLEME DE ALGEBRĂ (simbol AL)

**AL 1** Să se calculeze

$$\{3, 3\} + \{-3, 3\},$$

unde  $\{x\}$  reprezintă partea fracționară a numărului real  $x$ .

- a) 0      b) 0,3      c) 0,6      d) 6,6      e) 1      f) -1

**AL 2** Fie  $A = (\sqrt{2}, 100 - \sqrt{2})$  și  $B = (\sqrt{5}, 100 + \sqrt{5})$ . Câte numere naturale conține mulțimea  $A \cap B$ ?

- a) 96      b) 97      c) 100      d) 101      e) 197      f) o infinitate

**AL 3** Să se determine suma soluțiilor ecuației  $|x| + |x + 2| = 3$ .

- a) -3      b) -2      c) -1      d) 1      e) 2      f) 3

**AL 4** Câte numere întregi se găsesc în mulțimea  $A = \{x \in \mathbb{R}, |2x - 3| \leq 6\}$ ?

- a) 0      b) 7      c) 4      d) 2      e) 6      f) 5

**AL 5** Să se determine mulțimea tuturor valorilor lui  $x$  pentru care

$$\frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1} \geq 0.$$

- a)  $(-\infty, -1) \cup [0, 1)$       b)  $(-\infty, -1)$       c)  $\mathbb{R}$   
d)  $\emptyset$       e)  $(1, +\infty)$       f)  $(-\infty, -2)$

**AL 6** Andrei și Cristian joacă un joc în care persoana care pierde o rundă îi dă celuilalt jumătate din punctele pe care le are în acel moment. Ei încep jocul cu  $4a$ , respectiv  $4c$  puncte. Dacă Andrei câștigă prima rundă, iar Cristian o câștigă pe a doua, câte puncte are Cristian la sfârșitul celei de-a doua runde?

- a)  $2c$     b)  $2c + a$     c)  $2a + c$     d)  $3c + a$     e)  $3c + 2a$     f)  $2c + 2a$

**AL 7** Maria cheltuiește  $\frac{3}{8}$  din salariul său lunar pe chirie și  $\frac{5}{12}$  pe mâncare. Ana, care câștigă dublu față de Maria, cheltuiește un sfert din salariul său pe chirie și jumătate pe mâncare. Cele două fete decid să doneze restul banilor din salariul pe o lună. Care este raportul dintre suma totală donată și suma pe care o câștigă fetele împreună?

- a)  $\frac{17}{72}$     b)  $\frac{17}{24}$     c)  $\frac{17}{48}$     d)  $\frac{23}{24}$     e)  $\frac{23}{72}$     f)  $\frac{23}{48}$

**AL 8** Dacă  $a = b \cdot c^2$ ,  $c$  scade cu 20%, iar  $a$  rămâne constant, cu ce procent crește  $b$ ?

- |           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| a) 56,25% | b) 40%  | c) 20% |
| d) 0,025% | e) 0,5% | f) 60% |

**AL 9** Suma totală de bani depusă la Smart Bank se mărește de 10 ori pe parcursul unui an, timp în care numărul conturilor deschise scade cu 20%. Cu ce factor crește suma medie depusă în fiecare cont?

- a) 2    b) 8    c) 9,8    d) 12    e) 12,5    f) 13

**AL 10** Prețul transportului pentru o comandă mai mică sau egală cu  $p$  lei este  $s$  lei. Pentru comenzi ce depășesc  $p$  lei se percepă o taxă suplimentară de 5% din ce depășeste  $p$  lei. Dacă valoarea comenзii este  $x$  lei ( $x > p$ ), care este prețul transportului?

- |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) $s + 0,05x$       | b) $s + 0,05p$       | c) $0,05(s - p + x)$ |
| d) $s + 0,05(x - p)$ | e) $s + 0,05(p - x)$ | f) $s + 0,05(x + p)$ |

**AL 11** Să se determine multimea soluțiilor reale ale ecuației

$$\left[ \frac{1}{\sqrt{x}} \right] = \frac{1}{[x]},$$

unde  $[a]$  reprezintă partea întreagă a numărului real  $a$ .

- |   |   |  |
|---|---|--|
| a) $\left\{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$ | b) $\bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} \left[ k, k + \frac{1}{k} \right]$ | c) $\{n^2, n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}\}$ |
| d) $\{1\}$  | e) $[0, 1]$   | f) $(0, 1)$                                    |

**AL 12** Să se calculeze suma soluțiilor ecuației

$$\left[ \frac{5+6x}{8} \right] = \frac{15x-7}{5}.$$

- |                    |                    |                    |      |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|
| a) $\frac{19}{15}$ | b) $\frac{20}{15}$ | c) $\frac{14}{15}$ | d) 1 | e) $\frac{13}{15}$ | f) $\frac{10}{15}$ |
|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|

**AL 13** Să se calculeze media aritmetică a soluțiilor ecuației

$$[x] + [2x] + [3x] = 4x.$$

- |      |                  |                  |                   |                   |      |
|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| a) 0 | b) $\frac{5}{8}$ | c) $\frac{3}{8}$ | d) $\frac{5}{12}$ | e) $\frac{7}{16}$ | f) 1 |
|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|

**AL 14** Să se determine multimea soluțiilor ecuației

$$[a]^2 - (2a - 1)[a] + 3a = 0.$$

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| a) $[-1, 4] \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$ | b) $[0, 4] \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}$  | c) $[0, 5)$   |
| d) $\{-3, -2, 0, 4, 5\}$                             | e) $(-1, 4] \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}$ | f) $\{0, 4\}$ |

**AL 15** Să se calculeze suma  $\sum_{i=1}^{100} \left( \sum_{j=1}^i j \right)$ .

a) 171700

b)  $\frac{5050}{3}$

c) 17

d) 206040

e) 2550

f)  $\frac{51}{2}$

**AL 16** Care dintre următoarele variante reprezintă negația afirmației

” $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D : |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$ ”?

a)  $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D : |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

b)  $\exists \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D : |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

c)  $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D : |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - l| \geq \varepsilon$

d)  $\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x \in D : |x - x_0| \geq \eta \text{ și } |f(x) - l| \geq \varepsilon$

e)  $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D : |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - l| \geq \varepsilon$

f)  $\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x \in D : |x - x_0| < \eta \text{ și } |f(x) - l| \geq \varepsilon$

**AL 17** A demonstra prin contrapozitie afirmația  $p \rightarrow q$  înseamnă a demonstra că este adevărată implicația  $\bar{q} \rightarrow \bar{p}$ . Care dintre enunțurile de mai jos trebuie argumentat pentru a demonstra prin contrapozitie proprietatea

” $\forall m \in M, \forall n \in N, p(m, n) \wedge q(m, n) \rightarrow r(m, n)$ ” ?

a)  $\forall m \in M, \forall n \in N, \bar{r}(m, n) \rightarrow \bar{p}(m, n) \vee \bar{q}(m, n)$

b)  $\exists m \in M, \exists n \in N, \bar{r}(m, n) \rightarrow \bar{p}(m, n) \vee \bar{q}(m, n)$

c)  $\exists m \in M, \exists n \in N, \bar{r}(m, n) \rightarrow \bar{p}(m, n) \wedge \bar{q}(m, n)$

d)  $\forall m \in M, \exists n \in N, \bar{r}(m, n) \rightarrow \bar{p}(m, n) \vee \bar{q}(m, n)$

e)  $\forall m \in M, \forall n \in N, \bar{r}(m, n) \rightarrow \bar{p}(m, n) \wedge \bar{q}(m, n)$

f)  $\exists m \in M, \forall n \in N, \bar{r}(m, n) \rightarrow \bar{p}(m, n) \vee \bar{q}(m, n)$

**AL 18** Fie propozițiile  $p$  și  $q$ . Să se precizeze în câte cazuri din cele prezentate în următoarele tabele de adevăr se poate trage concluzia că propoziția  $q$  este adevărată:

$p$	$p \rightarrow q$	$p$	$p \vee q$	$\bar{p}$	$\bar{q} \rightarrow \bar{p}$	$\bar{p}$	$\bar{q} \rightarrow p$	$\bar{p}$	$p \vee q$
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 3      e) 4      f) 5

**AL 19** Despre mulțimile  $A, B, C, D, E$  se știe că: toate elementele lui  $A$  sunt și în  $B$ , toate elementele lui  $B$  sunt și în  $C$ , există elemente ale lui  $C$  care nu sunt în  $B$ , toate elementele lui  $D$  sunt și în  $C$ , dar nu toate elementele din  $C$  sunt în  $D$ , nu există elemente comune mulțimilor  $A$  și  $D$ , există elemente care aparțin atât lui  $B$ , cât și lui  $D$ , unele elemente ale lui  $E$  sunt și elemente ale lui  $D$ , dar nu sunt elemente ale lui  $B$ . Care din următoarele afirmații rezultă din ipotezele anterioare?

- a) există elemente ale lui  $E$  care aparțin lui  $A$   
 b) mulțimea  $E$  este inclusă în mulțimea  $B$   
 c) toate elementele lui  $E$  aparțin și lui  $C$   
 d) există elemente ale lui  $B$  care sunt și în  $A$  și în  $E$   
 e) unele elemente ale lui  $E$  sunt elemente ale lui  $C$   
 f) mulțimile  $C$  și  $E$  nu au elemente comune

**AL 20** Câte perechi  $(x, y)$  de numere întregi satisfac inecuația

$$|x| + |y| < 10?$$

- a) 181      b) 180      c) 90      d) 91      e) 101      f)  $4 \cdot 181$

**AL 21** Câte triplete  $(x, y, z)$  de numere naturale verifică ecuația

$$x + y + z = 10 ?$$

- a) 66      b) 60      c) 72      d) 120      e) 144      f) o infinitate

**AL 22** Câte triplete  $(a, b, c)$  de numere întregi verifică inecuația

$$(a - 1)(a - 3) + (b - 5)(b - 7) + (c - 9)(c - 11) < 0 ?$$

- a) 0      b) 1      c) 6      d) 12      e) 18      f) 19

**AL 23** Să se determine câte numere de 6 cifre au toate cifrele pare.

- a)  $4 \cdot 5^5$       b)  $4 \cdot 5^4$       c)  $5^6$       d)  $5^5$       e)  $4 \cdot 5^6$       f)  $(4 \cdot 5)^6$

**AL 24** Câte numere pare de 4 cifre încep și se termină cu aceeași cifră?

- a) 324      b) 360      c) 400      d) 500      e) 900      f) 1000

**AL 25** Se formează un număr alăturând, unul după altul, pătratele numerelor naturale diferite de zero, consecutive: 149162536... Să se determine în acest număr cifra așezată pe poziția 99.

- a) 2      b) 1      c) 4      d) 0      e) 7      f) 3

**AL 26** Într-un sir  $a_1, a_2, \dots$ , fiecare termen, începând cu al doilea, se obține mărind cu 1 opusul termenului precedent. Dacă  $a_1 = 2$ , să se determine suma primilor 99 de termeni.

- a) 49      b) 50      c) 51      d) 99      e) 101      f) 98

**AL 27** Se consideră sirul de numere raționale pozitive

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

Să se determine al cătelea termen al sirului este numărul  $\frac{2016}{2015}$ .

- |            |            |         |
|------------|------------|---------|
| a) 8120450 | b) 8118435 | c) 2015 |
| d) 2016    | e) 8000111 | f) 8000 |

**AL 28** O particulă se mișcă în sistemul cartezian de coordonate după următoarea schemă: pornește din origine, după primul pas se mișcă o unitate la dreapta, la cel de-al doilea pas se mută 2 unități în sus, la al treilea pas 3 unități la stânga, la al patrulea pas 4 unități în jos, la al cincilea 5 unități la dreapta, etc. În ce punct se va afla particula după 2022 de pași?

- |                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| a) (1011, 1012)  | b) (1021, 1020) | c) (1020, 1020) |
| d) (1001, -1020) | e) (1004, 1005) | f) (1010, 1011) |

**AL 29** Fie  $a_1, \dots, a_n, \dots$  termenii unei progresii aritmetice de rație  $r$ . Știind că  $a_{21} = 20$  și  $a_{101} = 60$ , să se determine  $r$  și formula termenului  $a_{n+1}$ .

- |  |  |
|--|--|
| a) $r = \frac{1}{4}, a_{n+1} = n - 1$            | b) $r = 1, a_{n+1} = 10 + \frac{n}{2}$           |
| c) $r = \frac{1}{2}, a_{n+1} = 10 + \frac{n}{2}$ | d) $r = -\frac{1}{2}, a_{n+1} = 1 + \frac{n}{2}$ |
| e) $r = \frac{1}{2}, a_{n+1} = 1 + \frac{n}{4}$  | f) $r = 1, a_{n+1} = 10 + \frac{n}{6}$           |

**AL 30** Un muncitor taie o scândură cu lungimea de  $4\text{ m}$  în 10 bucăți, fiecare bucată fiind cu  $6\text{ cm}$  mai lungă decât precedentă. Ce lungime are cea mai scurtă bucată?

- a)  $10\text{ cm}$     b)  $11\text{ cm}$     c)  $12\text{ cm}$     d)  $13\text{ cm}$     e)  $14\text{ cm}$     f)  $15\text{ cm}$

**AL 31** O rachetă este lansată în plan vertical și parcurge în prima secundă  $150\text{ m}$ . În fiecare din următoarele secunde parcurge cu  $10\text{ m}$  mai puțin ca în secunda precedentă. Care este înălțimea maximă la care ajunge racheta? Cât durează până ajunge la înălțimea maximă?

- |   |   |
|---|---|
| a) $h_{max} = 1200\text{ m}, t = 15\text{ s}$ | b) $h_{max} = 1000\text{ m}, t = 10\text{ s}$ |
| c) $h_{max} = 1500\text{ m}, t = 20\text{ s}$ | d) $h_{max} = 2000\text{ m}, t = 25\text{ s}$ |
| e) $h_{max} = 800\text{ m}, t = 7\text{ s}$   | f) $h_{max} = 1800\text{ m}, t = 22\text{ s}$ |

**AL 32** Fie  $S_m$  și  $S_n$  suma primilor  $m$  și respectiv  $n$  termeni ai unei progresii aritmetice ( $m \neq n$ ) cu primul termen nenul. Știind că  $\frac{S_m}{S_n} = \frac{m^2}{n^2}$ , să se determine  $\frac{a_m}{a_n}$ .

a)  $\frac{2m - 1}{2n - 1}$

b)  $\frac{2m + 1}{2n + 1}$

c)  $\frac{m}{n}$

d)  $\frac{m - 1}{n - 1}$

e)  $\frac{2m - 3}{2n - 3}$

f)  $\frac{m + 1}{n + 1}$

**AL 33** Fie  $n$  un număr natural mai mare decât 3. Să se calculeze suma

$$2 + 22 + 222 + \dots + \underbrace{22\dots2}_{n\text{-ori}}.$$

a)  $\frac{2}{9} \left( \frac{10^{n+1} - 10}{9} - n \right)$

b)  $\frac{2}{81} \left( \frac{10^{n+1} - 10}{9} - n - 1 \right)$

c)  $\frac{1}{9} \left( \frac{20^{n+1} - 20}{9} - n \right)$

d)  $2 \left( \frac{10^{n+1} - 10}{9} - n \right)$

e)  $\frac{1}{9} \left( \frac{10^{n+1} - 10}{9} - n \right)$

f)  $\frac{2}{81} \left( \frac{10^{n+1} - 10}{9} - n + 1 \right)$

**AL 34** Populația de amoebă dintr-o colonie se dublează după fiecare două zile. Dacă acum șase zile erau 200 de amoebă, câte vor fi peste patru zile?

a) 1600

b) 3200

c) 6400

d) 12800

e) 800

f) 25600

**AL 35** Populația unui tip de bacterie se triplează la fiecare 10 minute. Dacă acum 20 de minute populația numără 100 de bacterii, peste câte minute din acest moment populația va atinge 24300 de bacterii?

a) 10 min

b) 15 min

c) 20 min

d) 25 min

e) 30 min

f) 35 min

**AL 36** Fie  $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ , o progresie geometrică cu termeni nenuli și rație  $q \neq 1$ . Știind că  $b_1 = 1$  și  $2b_{n+1} - b_n - b_{n-1} = 0$  pentru orice  $n \geq 2$ , să se determine  $q$  și suma  $S_n$  a primilor  $n$  termeni ai progresiei.

- a)  $q = \frac{1}{2}$ ,  $S_n = \frac{2}{3} \left( 1 - \left( -\frac{1}{2} \right)^n \right)$       b)  $q = -\frac{1}{2}$ ,  $S_n = \frac{2}{3} \left( 1 + \left( -\frac{1}{2} \right)^n \right)$   
 c)  $q = -\frac{1}{2}$ ,  $S_n = \frac{2}{3} \left( 1 - \left( -\frac{1}{2} \right)^n \right)$       d)  $q = \frac{1}{2}$ ,  $S_n = \frac{2}{3} \left( 1 + \left( \frac{1}{2} \right)^n \right)$   
 e)  $q = \frac{1}{4}$ ,  $S_n = \frac{1}{2} \left( 1 - \left( -\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right)$       f)  $q = \frac{1}{4}$ ,  $S_n = \frac{2}{3} \left( 1 - \left( \frac{1}{2} \right)^{n-1} \right)$

**AL 37** Fie progresia geometrică  $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ , de rație  $q$  și termeni strict pozitivi. Să se calculeze suma

$$\frac{b_1 + b_2}{b_2 + b_3} + \frac{b_2 + b_3}{b_3 + b_4} + \dots + \frac{b_{n-1} + b_n}{b_n + b_{n+1}}, \quad n \geq 2.$$

- a)  $\frac{2n}{q}$       b)  $\frac{n}{q}$       c)  $\frac{n}{q+1}$       d)  $\frac{n-1}{q+1}$       e)  $\frac{n-1}{q}$       f)  $\frac{n+2}{q}$

**AL 38** Fie progresia geometrică  $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ , de rație  $q \neq \pm 1$  și termeni nenuli. Să se calculeze raportul  $\frac{S}{P}$ , unde

$$S = b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_{n+1}^2 \quad \text{și} \quad P = \frac{1}{b_1^2} + \frac{1}{b_2^2} + \dots + \frac{1}{b_{n+1}^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

- a)  $b_1^4 q^{2n}$       b)  $b_1^2 q^{2n}$       c)  $b_1^{-4} q^{2n}$       d)  $b_1^4 q^{4n}$       e)  $b_1^2 q^{2n+2}$       f)  $b_1^{-4} q^{2n+2}$

**AL 39** Se consideră un pătrat de aria  $S_1$ . Mijloacele laturilor acestui pătrat sunt vârfurile unui alt pătrat, a cărui aria o notăm cu  $S_2$ . În același mod, construim succesiv un sir de pătrate ale căror arii le notăm cu  $(S_n)_{n \geq 1}$  (la fiecare pas construim pătratul de aria  $S_n$  ca fiind pătratul care are drept vârfuri mijloacele laturilor pătratului precedent, cel de aria  $S_{n-1}$ ). Să se determine cel mai mare număr natural nenul  $n$  pentru care  $2017S_n \geq S_1$ .

- a) 1      b) 10      c) 11      d) 2016      e) 2017      f) 2018

**AL 40** O particulă se mișcă în sistemul de coordonate  $xOy$  după următoarea regulă: la fiecare pas, din punctul de coordonate  $(x, y)$  particula se mută în punctul de coordonate  $(x + y, -x)$ . Dacă particula pleacă din punctul  $(1,1)$ , unde se va afla după 2022 pași?

- |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| a) $(1, 1)$  | b) $(1, 0)$  | c) $(0, 0)$  |
| d) $(0, -1)$ | e) $(-1, 1)$ | f) $(2, -1)$ |

**AL 41** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{x-1}{x+1}.$$

Să se determine  $f(-x)$ , pentru orice  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ .

- |                     |            |           |             |                      |                      |
|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|
| a) $\frac{1}{f(x)}$ | b) $-f(x)$ | c) $f(x)$ | d) $-f(-x)$ | e) $-\frac{1}{f(x)}$ | f) $\frac{1}{f(-x)}$ |
|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|

**AL 42** Fie funcțiile  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = x^2 - x \text{ și } g(x) = 3x - 1.$$

Să se determine funcția compusă  $(f \circ g)(x)$ , pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

- |                    |                  |                     |
|--------------------|------------------|---------------------|
| a) $9x^2 - 9x + 2$ | b) $3x(x^2 - x)$ | c) $(3x - 1)^2 - x$ |
| d) $x^2 + 2x - 1$  | e) $3x^2 - 3x$   | f) $x^2 - x$        |

**AL 43** Fie funcțiile  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{dacă } x < 0 \\ 2x-3, & \text{dacă } x \geq 0 \end{cases} \text{ și } g(x) = x-2.$$

Să se determine  $(f \circ g)(x)$ , pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

a)  $(f \circ g)(x) = \begin{cases} x - 3, & x < 0 \\ 2x - 7, & x \geq 0 \end{cases}$

c)  $(f \circ g)(x) = \begin{cases} x - 3, & x < 2 \\ 2x - 7, & x \geq 2 \end{cases}$

e)  $(f \circ g)(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ 2x, & x \geq 0 \end{cases}$

b)  $(f \circ g)(x) = \begin{cases} x, & x < 2 \\ 2x - 7, & x \geq 2 \end{cases}$

d)  $(f \circ g)(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ 2x - 7, & x \geq -2 \end{cases}$

f)  $(f \circ g)(x) = \begin{cases} x + 3, & x < 0 \\ 2x - 7, & x \geq 0 \end{cases}$

**AL 44** Să se determine toate funcțiile  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de forma

$$f(x) = ax + 1 \text{ și } g(x) = x + b, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

știind că  $f \circ g = g \circ f$ .

a)  $f(x) = x + 1, g(x) = x$

b)  $f(x) = ax + 1, g(x) = x$

c)  $f(x) = x + 1, g(x) = x + b$

d)  $f(x) = ax + 1, g(x) = x + 1$

e)  $f(x) = ax + 1, g(x) = x$  sau  $f(x) = x + 1, g(x) = x + b$

f)  $f(x) = x + 1, g(x) = x$  și  $f(x) = x + 1, g(x) = x - 1$

**AL 45** Să se determine funcția de gradul întâi, știind că graficul său taie axa  $Ox$  în  $x = \sqrt{3}$  și trece prin punctul  $B(2\sqrt{3}, 2)$ .

a)  $\frac{2}{\sqrt{3}} x + 2$

b)  $\frac{2}{\sqrt{3}} x - 2$

c)  $\frac{1}{\sqrt{3}} x + 2$

d)  $\frac{3}{\sqrt{3}} x + 1$

e)  $\frac{2}{\sqrt{3}} x - 1$

f)  $\frac{2}{\sqrt{3}} x$

**AL 46** În câte puncte taie axa  $Ox$  graficul funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{dacă } x < 0 \\ -2x - 3, & \text{dacă } x \geq 0 \end{cases}$$

a) 2

b) 1

c) 0

d) 3

e) 5

f) 4

**AL 47** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 6, & x \in (-\infty, 2) \\ (m-1)x, & x \in [2, 4] \\ x + 8, & x \in [4, \infty) \end{cases}.$$

Să se determine mulțimea tuturor valorilor parametrului real  $m$  pentru care  $f$  este strict monotonă pe  $\mathbb{R}$ .

- a)  $(1, 2)$     b)  $(1, 4)$     c)  $(1, 4]$     d)  $(1, 2]$     e)  $[0, 1]$     f)  $(1, \infty)$

**AL 48** Fie ecuația

$$x^2 + |x| = mx(x+3), \quad m \in \mathbb{R}.$$

Să se determine mulțimea tuturor valorilor parametrului  $m$  astfel încât această ecuație să aibă exact trei soluții reale diferite.

- |                   |                                     |                                 |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| a) $\mathbb{R}$   | b) $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$    | c) $\emptyset$                  |
| d) $(-\infty, 1]$ | e) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ | f) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ |

**AL 49** Fie ecuația

$$ax^2 - (a+1)x + a^2 = 0, \quad a \in \mathbb{R}^*$$

cu soluțiile  $x_1$  și  $x_2$ . Să se determine o relație independentă de  $a$  între  $x_1$  și  $x_2$ .

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $(x_1 + x_2)x_1x_2 = 1 + x_1x_2$ | b) $(x_1 + x_2)x_1x_2 = 1 - x_1x_2$ |
| c) $x_1 - x_2 = 2 + x_1x_2$         | d) $x_1x_2 = 1 + x_1 + x_2$         |
| e) $(x_1 - x_2)x_1x_2 = 3 + x_1x_2$ | f) $x_1^2 + x_2^2 = 1 + x_1x_2$     |

**AL 50** Să se calculeze expresia  $E = x_1^4 - x_2^4$ , știind că  $x_1$  și  $x_2$ , cu  $x_1 > x_2$ , sunt soluțiile ecuației  $x^2 - ax - a^2 = 0$ , unde  $a \in (0, \infty)$ .

- |                       |               |                       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|
| a) $E = 5a^4\sqrt{3}$ | b) $E = a^3$  | c) $E = 3a^4\sqrt{5}$ |
| d) $E = a^4\sqrt{5}$  | e) $E = 4a^3$ | f) $E = 3a^4$         |

**AL 51** Să se formeze ecuația de gradul al doilea cu rădăcinile

$$y_1 = \frac{x_2^3}{x_1^2} \text{ și } y_2 = \frac{x_1^3}{x_2^2},$$

știind că  $x_1$  și  $x_2$  sunt soluțiile ecuației  $x^2 + x - a = 0$ ,  $a \in \mathbb{R}^*$ .

- |   |  |
|---|--|
| a) $y^2 + \frac{5a^2 + 1}{a^2} y + a = 0$ | b) $y^2 - \frac{1}{a^2} y - a = 0$             |
| c) $y^2 + a = 0$                          | d) $y^2 + \frac{5a^2 + 5a + 1}{a^2} y - a = 0$ |
| e) $y^2 - a = 0$                          | f) $y^2 - 2a + 3 = 0$                          |

**AL 52** Să se determine multimea tuturor valorilor parametrului real nenul  $a$  știind că inecuația

$$ax^2 - (a+1)x + 1 \geq 0$$

este verificată pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

- |                    |                   |                |
|--------------------|-------------------|----------------|
| a) $(-\infty, -1]$ | b) $[1, +\infty)$ | c) $\{1\}$     |
| d) $(0, 1]$        | e) $\mathbb{R}^*$ | f) $\emptyset$ |

**AL 53** Fie multimile

$$A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - (a+2)x + 2a = 0\} \text{ și } B = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - (2a+1)x + 2a = 0\}.$$

Să se determine multimea tuturor valorilor parametrului real  $a$ , știind că  $A \cap B$  are un singur element.

- |                   |            |               |            |                 |                |
|-------------------|------------|---------------|------------|-----------------|----------------|
| a) $(-\infty, 1]$ | b) $\{0\}$ | c) $\{0, 1\}$ | d) $\{1\}$ | e) $\mathbb{R}$ | f) $\emptyset$ |
|-------------------|------------|---------------|------------|-----------------|----------------|

**AL 54** Fie  $a \in \mathbb{R}$  și mulțimile

$$A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - (a+2)x + 2a \leq 0\} \text{ și } B = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - (2a+1)x + 2a = 0\}.$$

Să se determine mulțimea tuturor valorilor parametrului  $a$ , știind că intersecția  $A \cap B$  are exact două elemente.

- |                                  |                |   |
|----------------------------------|----------------|---|
| a) $\{1\}$                       | b) $\{0\}$     | c) $\{0, 1\}$   |
| d) $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ | e) $\emptyset$ | f) $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right]$ |

**AL 55** O parabolă  $y = ax^2 + bx + c$  are vârful în punctul de coordonate  $(4, 2)$  și trece prin punctul  $(2, 0)$ . Să se calculeze produsul  $abc$ .

- |          |         |        |        |        |         |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| a) $-12$ | b) $-6$ | c) $0$ | d) $1$ | e) $6$ | f) $12$ |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------|

**AL 56** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2 - 2mx + 2m^2 + m + 1$ ,  $m \in \mathbb{R}$ , al cărei grafic este parabola  $(P)$ . Să se determine mulțimea tuturor valorilor parametrului  $m$  pentru care parabola  $(P)$  are vârful situat în semiplanul  $y \geq 0$ .

- |                   |               |                 |                |             |                   |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| a) $[0, +\infty)$ | b) $\{0, 1\}$ | c) $\mathbb{R}$ | d) $\emptyset$ | e) $\{-1\}$ | f) $(-\infty, 0]$ |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|

**AL 57** Să se determine funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , unde  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , știind că graficul său trece prin punctul  $A(0, 1)$  și este tangent axei  $Ox$  în punctul  $B(1, 0)$ .

- |                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) $2x^2 - 3x + 1$ | b) $-2x^2 + x + 1$ | c) $3x^2 - 4x + 1$  |
| d) $x^2 - 2x + 1$  | e) nu există       | f) $-4x^2 + 3x + 1$ |

**AL 58** Fie funcțiile  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = -x^2 - (a-2)x + 2a \text{ și } g(x) = x^2 + (b+1)x + b.$$

Să se determine parametrii reali  $a$  și  $b$ , știind că graficele funcțiilor  $f$  și  $g$  se intersecțează în două puncte distincte situate pe axa  $Ox$ .

- |                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) $a = 0, b = -2$ | b) $a = 1, b = -2$ | c) nu există        |
| d) $a = 0, b = 1$  | e) $a = 1, b = 2$  | f) $a = -1, b = -2$ |

**AL 59** Presiunea dintr-un recipient variază în timp după legea

$$p : [0, 10] \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(t) = \frac{5}{108}t^2 - \frac{5}{12}t + 7,$$

unde  $t$  este exprimat în minute. După câte minute presiunea este minimă?

- |        |           |      |      |      |        |
|--------|-----------|------|------|------|--------|
| a) 4,5 | b) 6,0625 | c) 0 | d) 1 | e) 9 | f) 6,5 |
|--------|-----------|------|------|------|--------|

**AL 60** Fie funcția  $f : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ . Să se determine valoarea minimă  $m$  și maximă  $M$  a funcției  $f$ .

- |                             |                    |                          |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| a) $m = 0, M = 1$           | b) $m = -4, M = 5$ | c) $m = -4, M = 4$       |
| d) $m \in \emptyset, M = 5$ | e) $m = -4, M = 1$ | f) $m = -4, M = +\infty$ |

**AL 61** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{x^2 + x + a}{x^2 + 1}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Să se determine multimea tuturor valorilor parametrului  $a$ , știind că imaginea funcției  $f$  este un interval de lungime 1.

- |                   |             |            |                |            |                   |
|-------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|
| a) $[0, +\infty)$ | b) $(0, 1]$ | c) $\{2\}$ | d) $\emptyset$ | e) $\{1\}$ | f) $(-\infty, 0]$ |
|-------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|

**AL 62** Dacă numerele reale  $x$  și  $y$  satisfac relația  $|x + y| + |x - y| = 2$ , să se determine valoarea maximă a expresiei  $x^2 - 6x + y^2$ .

- |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| a) 4 | b) 5 | c) 6 | d) 7 | e) 8 | f) 9 |
|------|------|------|------|------|------|

**AL 63** Fie  $M = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots\}$  mulțimea soluțiilor sistemului

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 5. \end{cases}$$

Să se calculeze

$$\left| \sum_{(x,y) \in M} xy \right|.$$

- a) 6      b)  $\frac{1}{2}$       c)  $\frac{1}{5}$       d)  $\frac{2}{5}$       e) 1      f) 2

**AL 64** Să se determine valoarea parametrului nenul  $a$  pentru care sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = a \\ x + y = 2a \end{cases}$$

are o singură soluție.

- a) -2      b) 2      c) 4      d) 3      e) -1      f) -6

**AL 65** Să se determine valorile reale ale lui  $x$  și  $y$  știind că  $x + y = 2$  și  $x^3 + y^3 = 2$ .

- a)  $x = y = 1$       b)  $x = 2, y = 0$       c)  $x = 1 + \sqrt[3]{2}, y = 1 - \sqrt[3]{2}$   
 d)  $x = 0, y = 2$       e)  $x = 4, y = -2$       f)  $x = 3, y = -1$

**AL 66** Fie  $x, y \in \mathbb{R}$  cu proprietatea

$$(x + \sqrt{1 + x^2})(y + \sqrt{1 + y^2}) = 1.$$

Să se calculeze  $(x + y)^{2023}$ .

- a) -1      b) 0      c) 1      d)  $\frac{1}{2^{2023}}$       e)  $\frac{1}{4^{2023}}$       f)  $-\frac{1}{2^{2023}}$

**AL 67** Să se determine mulțimea tuturor valorilor parametrului real  $a$  astfel încât între soluțiile complexe  $z_1$  și  $z_2$  ale ecuației  $z^2 + (2a - 1)z + 3a - 1 = 0$  să aibă loc relația

$$\left| \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2} \right| \leq 1.$$

- |                                  |                   |              |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| a) $\left[0, \frac{2}{5}\right]$ | b) $(0, 1]$       | c) $[-1, 1]$ |
| d) $(1, \infty)$                 | e) $(-\infty, 1)$ | f) $(2, 3)$  |

**AL 68** Să se determine suma modulelor soluțiilor ecuației

$$z^2 - (6 - i)z + 5 - i = 0.$$

- a)  $2 + \sqrt{6}$     b) 1    c)  $\sqrt{6}$     d)  $2\sqrt{6}$     e) 2    f)  $1 + \sqrt{26}$ .

**AL 69** Să se determine suma modulelor soluțiilor ecuației

$$z^6 - 9z^3 + 8 = 0.$$

- a) 3    b) 9    c) 2    d) 6    e) 8    f) 7

**AL 70** Să se calculeze

$$\frac{i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot \dots \cdot i^{2012}}{i + i^2 + i^3 + \dots + i^{2013}}.$$

- a) 2013    b)  $2013i$     c)  $i$     d)  $-1$     e)  $-i$     f) 1

**AL 71** Se consideră numerele complexe  $z$  și  $w$  astfel încât

$$|z| = |w| = \sqrt{1006} \quad \text{și} \quad |z + w| = \sqrt{2013}.$$

Să se determine valoarea lui  $|z - w|$ .

- a) 1    b)  $\sqrt{2012}$     c) 0    d)  $\sqrt{1006}$     e)  $\sqrt{2011}$     f)  $\sqrt{2013}$

**AL 72** Se consideră numerele complexe  $z$  și  $w$  astfel încât

$$|z| = 2, |w| = 8 \quad \text{și} \quad |z - w| = 4.$$

Să se determine valoarea lui  $|z + w|$ .

- a) 16      b) 10      c)  $\sqrt{31}$       d) 12      e)  $\sqrt{1001}$       f) 24

**AL 73** Fie multimea  $A = \{z \in \mathbb{C} : |z|^2 + z = 1 + i\}$  și  $n \geq 1$  un număr natural. Să se determine multimea  $\{z^{4n}, z \in A\}$ .

- |                    |                  |                     |
|--------------------|------------------|---------------------|
| a) $\{(-4)^{4n}\}$ | b) $\{(-4)^n\}$  | c) $\{1, (-4)^n\}$  |
| d) $\emptyset$     | e) $\{(i-1)^n\}$ | f) $\{(i(i-1))^n\}$ |

**AL 74** Fie  $z$  un număr complex ce verifică identitatea  $z^2 - iz - 1 = 0$ . Să se determine valoarea expresiei

$$\left(z^4 + \frac{1}{z^4}\right)^3.$$

- a)  $i$       b) 1      c)  $-1$       d)  $-i$       e) 0      f)  $2i$

**AL 75** Știind că  $z^2 - z + 1 = 0$ , să se determine  $\left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^9$ .

- a) 2      b)  $-1$       c) 0      d)  $\cos \frac{2\pi}{3}$       e) 1      f)  $-2$

**AL 76** Numărul complex  $z$  satisfacă condițiile  $|z - i| = |z - 1| = |z + 5|$ . Să se determine  $|z|$ .

- a)  $\sqrt{3}$       b) 2      c)  $\sqrt{5}$       d) 3      e)  $2\sqrt{2}$       f) 4

**AL 77** Se știe că imaginea în plan a unui număr complex  $z = x + iy$  este punctul  $P(x, y)$ . Imaginile în plan a patru numere complexe sunt vîrfurile unui pătrat. Trei dintre numerele complexe sunt  $-1 + 2i$ ,  $-2 - 2i$  și  $3 + i$ . Care este cel de-al patrulea număr?

- |              |              |             |
|--------------|--------------|-------------|
| a) $3 - 2i$  | b) $-2 + 3i$ | c) $2 - 3i$ |
| d) $-3 + 2i$ | e) $2 - 2i$  | f) $3 - 3i$ |

**AL 78** Fie numărul complex  $z$  care verifică ecuația  $z + |z| = 2 + 8i$ . Să se determine  $|z|^2$ .

- |       |       |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| a) 34 | b) 68 | c) 100 | d) 169 | e) 208 | f) 289 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|

**AL 79** Numărul complex  $z$  are proprietățile  $|z + 2| = |z - 6(1 + i)| = 5$ . Să se determine  $|z|$ .

- |      |               |               |                |                |      |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|
| a) 1 | b) $\sqrt{2}$ | c) $\sqrt{5}$ | d) $\sqrt{13}$ | e) $\sqrt{17}$ | f) 5 |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|

**AL 80** Care este valoarea expresiei

$$\left( \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}} \right)^{24} ?$$

- |              |             |             |              |          |           |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| a) $-2^{24}$ | b) $2^{24}$ | c) $2^{12}$ | d) $-2^{12}$ | e) $2^8$ | f) $-2^8$ |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|

**AL 81** Se dau numerele complexe  $z_1 = -1$  și  $z_2 = -2 + i$ . Să se determine numerele complexe  $z$  cu proprietățile

$$|z - z_1| = |z - z_2| = |z_1 - z_2|.$$

- |  |  |
|--|--|
| a) $-\frac{3 \pm \sqrt{3}}{2} + i\frac{1 \mp \sqrt{3}}{2}$ | b) $-\frac{3 \pm \sqrt{3}}{2} - i\frac{1 \mp \sqrt{3}}{2}$ |
| c) $-\frac{3 \pm \sqrt{3}}{2} + i\frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$ | d) $-\frac{3 \pm \sqrt{3}}{4} + i\frac{1 \mp \sqrt{3}}{4}$ |
| e) $-\frac{3 \pm \sqrt{2}}{2} + i\frac{1 \mp \sqrt{2}}{2}$ | f) $\frac{3 \pm \sqrt{3}}{2} + i\frac{1 \mp \sqrt{3}}{2}$  |

**AL 82** Fie mulțimea  $A = \{z \in \mathbb{C} \mid z^2 + z + 1 = 0\}$ . Știind că  $z \in A$ , să se calculeze

$$\frac{z^{11} + z^{10} + z^9 + z^8 + z^7 + z^6 + z^3 - 4}{z^{2013} + 2}.$$

- a)  $z$       b)  $z^2$       c)  $-\frac{4}{3}$       d)  $\frac{1}{3}$       e)  $-1$       f)  $0$

**AL 83** Să se determine suma soluțiilor ecuației

$$\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 + \frac{z-i}{z+i} + 1 = 0.$$

- a)  $i$       b)  $1$       c)  $-i$       d)  $-1$       e)  $0$       f)  $2i$

**AL 84** Se consideră numerele complexe  $z_1, z_2, z_3$  care îndeplinesc condițiile

$$|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1, \quad z_1 + z_2 + z_3 \neq 0 \quad \text{și} \quad z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0.$$

Să se determine  $|z_1 + z_2 + z_3|$ .

- a) 1      b) 0      c) 4      d) 8      e) 2      f) 6

**AL 85** Să se determine toate valorile nenule ale parametrului real  $a$  astfel încât ecuația

$$\sqrt{x-2} + \sqrt{ax^2 - 2x - \frac{1}{a}} = 0,$$

să aibă cel puțin o soluție reală.

- |                         |                     |                               |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| a) 2                    | b) $1 \pm \sqrt{2}$ | c) $\frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}$ |
| d) $-2, 1 \pm \sqrt{2}$ | e) $2 \pm \sqrt{2}$ | f) $0, 1 \pm \sqrt{2}$        |

**AL 86** Să se găsească mulțimea tuturor soluțiilor reale ale ecuației

$$\sqrt{1 - x - 2x^2} = -x - 1.$$

- |             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| a) $\{1\}$  | b) $\{0, -1\}$ | c) $\{0, 2\}$ |
| d) $\{-1\}$ | e) $\emptyset$ | f) $\{0\}$    |

**AL 87** Să se determine multimea tuturor soluțiilor reale ale ecuației

$$\sqrt{2x^3 - x^2 - 2x + 1} = x + 1.$$

- |                   |                         |                                 |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| a) $\{-1, 0, 1\}$ | b) $\{-1, 1, 2\}$       | c) $\{-1, 0, 2\}$               |
| d) $\{0, 1, 2\}$  | e) $\{0, 1, \sqrt{2}\}$ | f) $\{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$ |

**AL 88** Fie multimea

$$M = \left\{ x \in \mathbb{R} : |x| \geq 1, \sqrt[2017]{x + \sqrt{x^2 - 1}} + \sqrt[2017]{x - \sqrt{x^2 - 1}} = 2 \right\}.$$

Să se determine  $\sum_{x \in M} x^2$ .

- |      |      |      |       |       |      |
|------|------|------|-------|-------|------|
| a) 1 | b) 4 | c) 9 | d) 13 | e) 20 | f) 2 |
|------|------|------|-------|-------|------|

**AL 89** Să se determine numărul natural nenul  $n$  cu proprietatea

$$\frac{1}{2\sqrt{1} + 1\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}} = \frac{9}{10}.$$

- |       |       |        |        |      |        |
|-------|-------|--------|--------|------|--------|
| a) 99 | b) 24 | c) 999 | d) 624 | e) 9 | f) 399 |
|-------|-------|--------|--------|------|--------|

**AL 90** Să se găsească multimea tuturor valorilor lui  $x \in \mathbb{R}$  astfel încât

$$\sqrt{x^2 - 3x + 2} > x + 1.$$

- |  |  |  |
|--|--|--|
| a) $\left(-\infty, \frac{1}{5}\right)$ | b) $\left(\frac{1}{5}, +\infty\right)$ | c) $\left(-\infty, \frac{1}{5}\right]$ |
| d) $[-1, +\infty)$                     | e) $\emptyset$                         | f) $(-1, +\infty)$                     |

**AL 91** Să se găsească multimea tuturor valorilor lui  $x$  pentru care

$$\sqrt{x+8} \leq x+2.$$

- |                                     |                                |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| a) $[1, \infty)$                    | b) $[-8, -4] \cup [1, \infty)$ | c) $[-8, -4]$     |
| d) $(-\infty, -4] \cup [1, \infty)$ | e) $(-\infty, -4]$             | f) $[-2, \infty)$ |

**AL 92** Să se determine multimea tuturor valorilor lui  $x \in \mathbb{R}$  astfel încât

$$\sqrt{25x^2 - 44x - 12} \geq 1 - 4x.$$

- |  |   |
|--|---|
| a) $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right] \cup [2, \infty)$ | b) $(-\infty, -2]$  |
| c) $\left[\frac{6}{25}, \infty\right)$                   | d) $(-\infty, -2] \cup \left[\frac{6}{25}, \infty\right)$ |
| e) $\left[\frac{13}{3}, \infty\right)$                   | f) $\left[\frac{6}{25}, \frac{13}{3}\right)$              |

**AL 93** Să se găsească multimea tuturor valorilor lui  $x \in \mathbb{R}$  astfel încât

$$\sqrt{2x^2 - x - 1} + 2x \geq -1.$$

- |                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| a) $\mathbb{R}$                    | b) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup [1, \infty)$ | c) $[-2, 1)$     |
| d) $\left[-2, -\frac{1}{2}\right]$ | e) $\left[-2, -\frac{1}{2}\right] \cup [1, \infty)$      | f) $[1, \infty)$ |

**AL 94** Să se determine suma modulelor soluțiilor reale ale ecuației

$$\sqrt[3]{1-x} + \sqrt{x+8} = 3.$$

- |       |      |      |       |      |      |
|-------|------|------|-------|------|------|
| a) 36 | b) 0 | c) 7 | d) 28 | e) 1 | f) 3 |
|-------|------|------|-------|------|------|

**AL 95** Să se determine mulțimea tuturor valorilor parametrului  $a \in \mathbb{R}$ , știind că ecuația

$$\sqrt[3]{x^4 - 6x^2 + 9} - 3a\sqrt[3]{x^2 - 3} + 2a^2 = 0$$

are patru soluții reale distințe.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| a) $\left(-\frac{\sqrt[3]{3}}{2}, 2\sqrt[3]{3}\right)$ | b) $[-\sqrt[3]{3}, +\infty)$                                  | c) $\left(-\frac{\sqrt[3]{3}}{2}, -\sqrt[3]{3}\right)$ |
| d) $(1, 2]$  | e) $\left(-\frac{\sqrt[3]{3}}{2}, 0\right) \cup (0, +\infty)$ | f) $(0, 1]$  |

**AL 96** Să se determine valorile întregi pe care le poate lua numărul  $b$  astfel încât

$$\frac{2002}{10^{-b}}$$

să aparțină intervalului  $[1, 100]$ .

- |                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| a) $\{0, 1\}$       | b) $\{-2, -1\}$ | c) $\{-3, -2\}$ |
| d) $\{-4, -3, -2\}$ | e) $\emptyset$  | f) $\{-3, -1\}$ |

**AL 97** Fie  $60^a = 3$ ,  $60^b = 5$  și  $c = \frac{1-a-b}{2-2b}$ . Să se determine  $12^c$ .

- |               |      |               |      |                |      |
|---------------|------|---------------|------|----------------|------|
| a) $\sqrt{3}$ | b) 2 | c) $\sqrt{5}$ | d) 3 | e) $2\sqrt{3}$ | f) 4 |
|---------------|------|---------------|------|----------------|------|

**AL 98** Fie  $a > 0$ ,  $a \neq 1$  și  $n \geq 2$ . Să se calculeze

$$\frac{1}{\log_2 a} + \frac{1}{\log_3 a} + \dots + \frac{1}{\log_n a} .$$

- |                           |                              |                             |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| a) $\log_a n!$            | b) $\log_a n$                | c) $\frac{1}{\log_{n^n} a}$ |
| d) $\frac{1}{\log_a n^n}$ | e) $\log_a \frac{n(n+1)}{2}$ | f) $\log_n a$               |

**AL 99** Dacă  $a, b, c \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ ,  $bc \neq 1$  și notăm  $x = \log_b a$ ,  $y = \log_c a$ , atunci  $\log_{bc} a$  este egal cu:

- a)  $x + y$     b)  $xy$     c)  $\frac{1}{x+y}$     d)  $\frac{1}{xy}$     e)  $\frac{x+y}{xy}$     f)  $\frac{xy}{x+y}$

**AL 100** Câte numere naturale  $n > 1$  au proprietatea că  $\log_n 1024$  este număr întreg?

- a) 0    b) 1    c) 2    d) 3    e) 4    f) 5

**AL 101** Fie numerele reale  $x_1, x_2, \dots, x_n$  astfel încât  $x_1, x_2, \dots, x_n \in (0, 1)$  sau  $x_1, x_2, \dots, x_n \in (1, +\infty)$ . Să se determine valoarea minimă a expresiei

$$E = \log_{x_1}(x_1 x_2 \dots x_n) + \log_{x_2}(x_1 x_2 \dots x_n) + \dots + \log_{x_n}(x_1 x_2 \dots x_n).$$

- a) 1    b)  $n(n - 1)$     c)  $n$     d)  $n^2$     e)  $n^3$     f) 0

**AL 102** Fie  $a$  și  $b$  numere reale strict pozitive care satisfac relațiile

$$a^b = b^a \text{ și } b = 9a.$$

Să se determine valoarea lui  $a$ .

- a)  $1/9$     b) 3    c)  $\sqrt[9]{9}$     d)  $\sqrt[3]{9}$     e) 9    f)  $\sqrt[4]{3}$

**AL 103** Să se rezolve ecuația

$$2^{3^x} = 3^{2^x}.$$

- |                    |                              |  |
|--------------------|------------------------------|--|
| a) $-1$            | b) 0                         | c) 1   |
| d) $\ln 3 - \ln 2$ | e) $\ln(\ln 3) - \ln(\ln 2)$ | f) $\frac{\ln(\ln 3) - \ln(\ln 2)}{\ln 3 - \ln 2}$ |

**AL 104** Să se determine mulțimea tuturor valorilor lui  $x \in \mathbb{R}$ , știind că numerele  $9^x - 1$ ,  $6^x$ ,  $4^x + 1$  sunt în progresie aritmetică în această ordine.

- a)  $\{1\}$       b)  $\{2\}$       c)  $\{5\}$       d)  $\{0\}$       e)  $\emptyset$       f)  $\{-2\}$

**AL 105** Să se rezolve ecuația  $6^x - 3^{-x} = \sqrt{2^x - 9^{-x}}$ .

- a)  $\left\{0, \frac{2 \ln 2}{\ln 2 + 2 \ln 3}\right\}$       b)  $\left\{0, \frac{\ln 3}{\ln 2 + \ln 3}\right\}$       c)  $\left\{1, \frac{\ln 2}{2 \ln 2 + \ln 3}\right\}$   
 d)  $\left\{1, \frac{\lg 3}{1 + \lg 2}\right\}$       e)  $\left\{0, \frac{\lg 2}{\lg 2 + 2 \lg 3}\right\}$       f)  $\left\{0, \frac{\lg 3}{1 + 2 \lg 2}\right\}$

**AL 106** Să se determine mulțimea tuturor valorilor lui  $x \in \mathbb{R}$  știind că numerele  $9^x - 1$ ,  $6^x$ ,  $4^x + 1$  sunt în progresie geometrică în această ordine.

- a)  $\{-2\}$       b)  $\{0\}$       c)  $\{1\}$       d)  $\{2\}$       e)  $\emptyset$       f)  $\left\{\frac{1}{2}\right\}$

**AL 107** Fie  $S$  mulțimea soluțiilor ecuației

$$0,5^{x-1} + 9 = 0,2^{x+1}.$$

Să se calculeze

$$\sum_{x \in S} x^2.$$

- a) 5      b) 9      c) 25      d) 2      e) 6      f) 4

**AL 108** Să se găsească produsul tuturor soluțiilor reale ale ecuației

$$x^{\log_2 x} = 16.$$

- a) 1      b) 2      c) 4      d) 8      e) 16      f) 32

**AL 109** Numerele reale strict pozitive  $x$  și  $y$  verifică relațiile

$$\log_4 x = \log_6 y = \log_9(x+y).$$

Să se determine raportul  $\frac{y}{x}$ .

- a)  $\frac{3}{2}$     b)  $\frac{1}{2}(\sqrt{5}-1)$     c)  $\log_2 3$     d)  $\frac{9}{4}$     e)  $\frac{1}{2}(\sqrt{5}+1)$     f)  $\log_3 2$

**AL 110** Fie  $x > 10$ . Câte cifre are soluția ecuației  $\lg(\lg(\lg x)) = 1$ ?

- a) 1      b) 10      c) 1000      d)  $10^{10}$       e)  $10^{10} + 1$       f)  $10^{10^{10}}$

**AL 111** Să se determine numărul soluțiilor ecuației  $3^{x+1} + 100 = 7^{x-1}$ .

- a) 1              b) 0              c) 2              d) 3              e) 4              f) 5

**AL 112** Să se rezolve inecuația

$$\log_{\frac{1}{4}}(x^2 + 2x + 2) \geq \log_{\frac{1}{2}}(2x + 3).$$

- a)  $x \in [-1, +\infty)$

b)  $x \in \left(-\infty, -\frac{7}{3}\right] \cup [-1, +\infty)$

c)  $x \in \left(-\infty, -\frac{7}{3}\right] \cup \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right)$

d)  $x \in \emptyset$

e)  $x \in \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right)$

f)  $x \in (-\infty, 0]$

**AL 113** Să se rezolve în multimea numerelor reale inecuația

$$\log_x(x^2 - x + 2) > 2 \log_x(x + 1).$$

- a)  $x \in \left(\frac{1}{3}, 1\right)$       b)  $x \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$       c)  $x \in (1, \infty)$   
 d)  $x \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$       e)  $x \in (0, 1)$       f)  $x \in \left(\frac{1}{3}, \infty\right)$

**AL 114** În ce interval se află soluția strict pozitivă a ecuației

$$\frac{1}{(x^2 + 9)^{\log_x(x^2 + 9)}} = \sqrt[3]{-x^2 + 6x} ?$$

- |              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| a) $(2, 3]$  | b) $(0, 1) \cup \left(1, \frac{3}{2}\right]$ | c) $(1, 6)$ |
| d) $(-1, 0)$ | e) $[-1, 1]$                                 | f) $(1, 2)$ |

**AL 115** Să se determine multimea

$$\{x \in \mathbb{R} \mid (2\sqrt{3} + 4)^x - 3(\sqrt{3} + 1)^x + 2 < 0\}.$$

- |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| a) $\emptyset$    | b) $\mathbb{R}$ | c) $\left(0, \frac{\ln 2}{\ln(\sqrt{3} + 1)}\right)$       |
| d) $(0, +\infty)$ | e) $(0, 1)$     | f) $\left(\frac{\ln 2}{\ln(\sqrt{3} + 1)}, +\infty\right)$ |

**AL 116** Fie  $e$  baza logaritmului natural și  $x_1, x_2$  soluțiile ecuației

$$\left(\sqrt{3+2\sqrt{2}}\right)^x + e^3 \left(\sqrt{3-2\sqrt{2}}\right)^x - e(e+1) = 0,$$

unde  $x_1 > x_2$ . Să se determine raportul  $\frac{x_1}{x_2}$ .

- |             |        |      |          |      |              |
|-------------|--------|------|----------|------|--------------|
| a) $e(e+1)$ | b) $e$ | c) 1 | d) $e^3$ | e) 2 | f) nu există |
|-------------|--------|------|----------|------|--------------|

**AL 117** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} -x - 2, & x < -1 \\ mx - 3, & x \geq -1. \end{cases}$$

Să se determine valoarea parametrului real  $m$  pentru care  $f$  este bijectivă și să se determine în acest caz funcția ei inversă.

a)  $m = 2, f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(y) = \begin{cases} -2 - y, & y > -1 \\ \frac{y - 3}{2}, & y \leq -1 \end{cases}$

b)  $m = -2, f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(y) = \begin{cases} -2 - y, & y > -1 \\ \frac{-y - 3}{2}, & y \leq -1 \end{cases}$

c)  $m = 2, f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(y) = \begin{cases} -2 - y, & y \geq -1 \\ \frac{-y - 3}{2}, & y < -1 \end{cases}$

d)  $m = -2, f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(y) = \begin{cases} -2 - y, & y > -1 \\ \frac{-y + 3}{2}, & y \leq -1 \end{cases}$

e)  $m = -3, f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(y) = \begin{cases} -2 - y, & y > -1 \\ \frac{-y - 3}{2}, & y \leq -1 \end{cases}$

f)  $m = -1, f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(y) = \begin{cases} 2 + y, & y > -1 \\ \frac{-y - 3}{2}, & y \leq -1 \end{cases}$

**AL 118** Să se determine multimea tuturor valorilor lui  $x$  astfel încât se poate calcula  $C_{7x}^{x^2+10}$ .

- |                     |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| a) $\{2, 3, 4, 5\}$ | b) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ | c) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ |
| d) $\mathbb{N}$     | e) $\mathbb{R}$        | f) $\mathbb{Z}$           |

**AL 119** Să se calculeze suma

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + 100 \cdot 100! .$$

- |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| a) $(101!)^2$ | b) $(100!)^2$ | c) $101!$     |
| d) $101! - 1$ | e) $200! + 1$ | f) $200! - 1$ |

**AL 120** Fie sirul  $(x_n)_{n>1}$  cu termenul general

$$x_n = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{C_{n+1}^2}\right), \quad n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}.$$

Să se determine multimea  $\left\{n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\} \mid \frac{1}{2} \leq x_n \leq \frac{2}{3}\right\}$ .

- |                |                        |                  |
|----------------|------------------------|------------------|
| a) $\{3, 4\}$  | b) $\{5, 6, 7\}$       | c) $\{2, 3, 4\}$ |
| d) $\emptyset$ | e) $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ | f) $\{2, 4, 6\}$ |

**AL 121** Să se calculeze suma

$$C_9^3 + C_9^4 + C_9^5 + C_9^6 + C_9^7.$$

- |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a) 420 | b) 446 | c) 456 | d) 492 | e) 360 | f) 968 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**AL 122** Să se determine multimea tuturor valorilor parametrului natural  $n$  care satisfac inegalitatea

$$2C_{n-1}^1 A_{n+1}^2 \geq (C_{n+1}^3)^2.$$

- |                  |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|
| a) $\{2, 3, 4\}$ | b) $\{1, 2, 3, 4\}$ | c) $\emptyset$      |
| d) $\{2\}$       | e) $[2, +\infty)$   | f) $\{2, 3, 4, 5\}$ |

**AL 123** Fie  $C = \{0, 1, \dots, 9\}$  multimea cifrelor și  $S_k$  multimea stringurilor binare formate din  $k$  biți, adică

$$S_k = \{b_1 b_2 \cdots b_k : b_i \in \{0, 1\}, i = \overline{1, k}\}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

Să se calculeze câte funcții  $h : S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_8 \rightarrow \{c_1 c_2 c_3 : c_1, c_2, c_3 \in C\}$  se pot defini.

- |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| a) $1000^{510}$ | b) $900^{512}$  | c) $512^{1000}$ |
| d) $1000^{256}$ | e) $256^{1000}$ | f) $256^2$      |

**AL 124** Fie  $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ . Câte funcții impare  $f : A \rightarrow A$  există?

- a) 1250      b) 125      c) 625      d) 5      e) 20      f) 25

**AL 125** Să se determine numărul funcțiilor pare

$$f : \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

- a) 1250      b) 125      c) 625      d) 5      e) 1000      f) 25

**AL 126** Câte dintre submulțimile lui  $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$  conțin exact un număr impar?

- a) 5      b) 16      c) 32      d) 64      e) 37      f) 160

**AL 127** Câte dintre submulțimile lui  $\{1, 2, \dots, 10\}$  au produsul elementelor divizibil cu 10?

- a) 512      b) 100      c) 1024      d) 45      e) 752      f) 256

**AL 128** Câte numere de 10 cifre conțin 4 cifre de 3 și 6 cifre de 7?

- a) 24      b) 120      c) 210      d) 240      e) 256      f) 720

**AL 129** Câte din submulțimile de trei elemente ale mulțimii  $\{1, 2, \dots, 15\}$  au suma elementelor divizibilă cu 3?

- a) 30      b) 90      c) 125      d) 155      e) 455      f) 910

**AL 130** Câte dintre submulțimile nevide ale mulțimii  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  au suma elementelor divizibilă cu 5?

- a) 4      b) 5      c) 6      d) 7      e) 8      f) 16

**AL 131** Să se determine suma numerelor de 5 cifre distințe formate cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5.

- |                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| a) $33333 \cdot 5!$ | b) $33333 \cdot 5^5$ | c) $33333 \cdot 5^4$ |
| d) $33333 \cdot 6!$ | e) $66666 \cdot 5!$  | f) $66666 \cdot 5^5$ |

**AL 132** Câte numere de 12 cifre au exact cinci cifre de 1, patru cifre de 2 și trei cifre de 3?

- |                                 |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| a) 12!                          | b) 11!                          | c) $\frac{12!}{5! 4! 3!}$ |
| d) $C_{12}^5 C_{12}^4 C_{12}^3$ | e) $A_{12}^5 A_{12}^4 A_{12}^3$ | f) $3^{12}$               |

**AL 133** Într-o clasă sunt 15 elevi, dintre care 8 sunt fete și 7 băieți. În câte moduri se poate forma o grupă de 2 fete și 2 băieți pentru a participa la un concurs?

- |       |        |                  |        |                        |                    |
|-------|--------|------------------|--------|------------------------|--------------------|
| a) 28 | b) 588 | c) $C_7^4 C_8^4$ | d) 858 | e) $A_{15}^7 A_{15}^8$ | f) $C_7^2 + C_8^2$ |
|-------|--------|------------------|--------|------------------------|--------------------|

**AL 134** Alfabetul unui limbaj este format din literele A, B, E, L, R, T, aceasta fiind și ordinea lor alfabetică. Dicționarul acestui limbaj conține doar cuvinte de 6 litere, fiecare literă din alfabet fiind luată o singură dată în oricare cuvânt. Dacă așezarea în dicționar se face ținând cont de ordinea alfabetică a cuvintelor, atunci cuvântul aflat pe poziția 538 în acest dicționar este:

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| a) REBLTA | b) LERBAT | c) TBERLA |
| d) RABLET | e) TRABLE | f) ALBERT |

**AL 135** Considerăm un alfabet format din simbolurile  $\diamond$ ,  $\heartsuit$ ,  $*$  și  $\sharp$ . Câte cuvinte de lungime patru se pot forma în acest alfabet astfel încât fiecare simbol să apară o singură dată?

- |       |        |       |      |       |       |
|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| a) 24 | b) 256 | c) 16 | d) 1 | e) 64 | f) 32 |
|-------|--------|-------|------|-------|-------|

**AL 136** Un tren este format din 5 vagoane notate cu literele A, B, C, D, E. În câte moduri pot fi așezate aceste vagoane astfel încât vagonul A să se afle mereu înaintea vagonului B?

- a) 60      b) 20      c) 40      d) 80      e) 30      f) 45

**AL 137** Câte secvențe binare (0 sau 1) de lungime 8 încep cu 1 sau se termină cu 00?

- a) 1      b) 160      c) 32      d) 192      e) 128      f) 162

**AL 138** O anagramă a unui cuvânt este un alt cuvânt (cu sens sau fără sens) obținut prin permutarea literelor sale. Câte anagrame ale cuvântului SINUS pot fi construite?

- a) 15      b) 30      c) 45      d) 60      e) 90      f) 120

**AL 139** Fie  $M_1 = \{X, Y, Z\}$  și  $M_2 = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ . Un cod este format dintr-o literă din  $M_1$  pe prima poziție și 3 cifre distințe din  $M_2$  pe următoarele 3 poziții. Câte coduri ce conțin cel puțin una din cifrele 3,5,7 pot fi formate?

- a) 210      b) 510      c) 630      d) 720      e) 1530      f) 2160

**AL 140** Aveți la dispoziție 2 piese albe, 3 piese negre și mai multe piese de culoare violetă, toate de aceeași formă pătrată. Acestea se așezază în felul următor: o piesă pe primul rând, dedesubt 2 piese, sub acestea 3 și aşa mai departe, obținând 8 rânduri, ultimul cu 8 piese. În câte moduri pot fi așezate aceste piese?

- a)  $10 C_{36}^5$       b)  $10 C_{28}^5$       c)  $A_{28}^5$       d)  $A_{36}^5$       e)  $C_{28}^2 \cdot C_{28}^3$       f)  $C_{36}^2 \cdot C_{36}^3$

**AL 141** Un examen de matematică are două părți. Partea A conține 5 probleme, iar partea B conține 4 probleme. Fiecare student trebuie să rezolve în total 5 probleme, dintre care cel puțin două trebuie să fie din partea A și cel puțin 2 din partea B a examenului. Să se determine numărul de moduri diferite în care se pot alege cele 5 probleme pentru rezolvare.

- a) 100      b) 60      c) 40      d) 224      e) 2400      f) 120

**AL 142** La o ședintă cu părinții participă opt femei și şapte bărbați, printre care doamna X și domnul Y. În câte moduri se poate forma un comitet de trei femei și patru bărbați, știind că doamna X refuză să fie desemnată împreună cu domnul Y?

- |           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| a) 1540   | b) 1960 | c) 420    |
| d) 282240 | e) 5040 | f) 277200 |

**AL 143** Cinci prietene își fac una alteia cadouri astfel încât fiecare din ele oferă un cadou și primește un cadou (desigur, niciuna nu primește propriul cadou). În câte moduri diferite își pot oferi cadouri?

- |       |       |      |        |       |       |
|-------|-------|------|--------|-------|-------|
| a) 44 | b) 10 | c) 5 | d) 120 | e) 70 | f) 20 |
|-------|-------|------|--------|-------|-------|

**AL 144** Un pătrat  $3 \times 3$  este împărțit în 9 pătrățele  $1 \times 1$ . Trebuie colorate cinci din cele nouă pătrățele  $1 \times 1$ . În câte moduri se poate face colorarea astfel ca o linie să rămână necolorată?

- |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a) 12 | b) 15 | c) 16 | d) 18 | e) 24 | f) 32 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**AL 145** Un pătrat  $3 \times 3$  este împărțit în 9 pătrățele  $1 \times 1$ . Trebuie colorate cinci din cele nouă pătrățele  $1 \times 1$  astfel încât să existe cel puțin un pătrățel colorat pe fiecare linie și pe fiecare coloană. În câte moduri se poate face colorarea?

- |       |       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| a) 27 | b) 63 | c) 72 | d) 81 | e) 90 | f) 126 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

**AL 146** Câți termeni raționali conține dezvoltarea  $(\sqrt[3]{4} - \sqrt[4]{3})^{99}$ ?

- |       |      |      |       |       |      |
|-------|------|------|-------|-------|------|
| a) 10 | b) 8 | c) 0 | d) 44 | e) 15 | f) 9 |
|-------|------|------|-------|-------|------|

**AL 147** Fie  $x > 0$ . Câți termeni din dezvoltarea

$$\left( 3\sqrt[4]{x} - \frac{2}{3x} \right)^n$$

nu-l conțin pe  $x$ , știind că suma coeficienților binomiali ai dezvoltării este 1024?

- a) 4      b) 1      c) 0      d) 9      e) 3      f) 6

**AL 148** Fie binomul  $\left( 2\sqrt[3]{x^2} - \frac{3}{x\sqrt[4]{x}} \right)^n$ ,  $x > 0$ . Știind că termenul  $T_{13}$  este de forma  $c_1x$ , să se determine termenul  $T_k$  din dezvoltarea binomului care este de forma  $c_2x^{-22}$ , unde  $c_1$  și  $c_2$  sunt două constante reale ce nu depind de  $x$ .

- a)  $T_{24}$       b)  $T_{26}$       c)  $T_{25}$       d)  $T_{23}$       e)  $T_{28}$       f) nu există

**AL 149** Fie

$$A = C_{100}^1 + 2C_{100}^2 + 3C_{100}^3 + \dots + 100C_{100}^{100}.$$

Să se precizeze care din următoarele afirmații este adevărată.

- |                  |                         |                           |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| a) $A$ este prim | b) $A \in (10^5, 10^6)$ | c) $3 A$                  |
| d) $7 A$         | e) $A = 10000$          | f) $A = 100 \cdot 2^{99}$ |

**AL 150** Să se determine coeficientul lui  $x^4$  din dezvoltarea  $(1 + 5x + 4x^3)^{10}$ .

- |   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| a) $40 \cdot C_{10}^2$                      | b) $200 \cdot C_{10}^2$            | c) $5^4 \cdot C_{10}^4$                     |
| d) $40 \cdot C_{10}^2 + 5^4 \cdot C_{10}^4$ | e) $C_{10}^2 + 5^2 \cdot C_{10}^4$ | f) $40 \cdot C_{10}^2 + 5^2 \cdot C_{10}^3$ |

**AL 151** Să se determine coeficientul termenului  $x^3y^3$  din dezvoltarea expresiei  $(x + 2y + 3)^8$ .

- a) 5040      b) 560      c) 2016      d) 40320      e) 37      f) 65536

**AL 152** Să se determine multimea tuturor valorilor lui  $x$  pentru care al patrulea termen al dezvoltării  $(5 + 2x)^{16}$  este cel mai mare.

a)  $\left(\frac{15}{28}, \frac{10}{13}\right)$

b)  $(0, 1)$

c)  $(1, 3)$

d)  $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

e)  $(-2, 2)$

f)  $(-1, 1)$

**AL 153** Care este probabilitatea  $p$ , respectiv  $q$ , ca alegând una din soluțiile ecuației  $(x + 2)(x^2 - x - 1) = 0$  aceasta să fie reală, respectiv întreagă ?

a)  $p = \frac{1}{3}, q = 0$

b)  $p = 1, q = \frac{1}{3}$

c)  $p = q = \frac{1}{3}$

d)  $p = 1, q = 0$

e)  $p = \frac{1}{3}, q = \frac{2}{3}$

f)  $p = q = \frac{1}{2}$

**AL 154** Care este probabilitatea  $p$ , respectiv  $q$ , ca să extragem un număr impar, respectiv un cub perfect (adică de forma  $n^3, n \in \mathbb{N}^*$ ), dintre numerele de la 1 la 101 ?

a)  $p = \frac{50}{101}, q = \frac{4}{101}$

b)  $p = \frac{51}{101}, q = \frac{4}{101}$

c)  $p = \frac{50}{101}, q = \frac{5}{101}$

d)  $p = \frac{51}{101}, q = \frac{5}{101}$

e)  $p = \frac{50}{101}, q = \frac{3}{101}$

f)  $p = \frac{49}{100}, q = \frac{3}{101}$

**AL 155** Din multimea  $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$  se aleg aleator șase numere. Care este probabilitatea ca al doilea cel mai mare număr ales să fi fost 8?

a)  $\frac{1}{2}$

b)  $\frac{1}{3}$

c)  $\frac{1}{4}$

d)  $\frac{1}{6}$

e)  $\frac{1}{8}$

f)  $\frac{1}{10}$

**AL 156** Amestecăm un pachet de 52 de cărți de joc și extragem simultan două cărți la întâmplare. Care este probabilitatea să alegem doi ași de aceeași culoare?

- a)  $\frac{1}{52}$       b)  $\frac{1}{51 \cdot 52}$       c)  $\frac{1}{51 \cdot 26}$       d)  $\frac{A_4^2}{52}$       e)  $\frac{C_4^2}{52}$       f)  $\frac{1}{51 \cdot 13}$

**AL 157** Care este probabilitatea ca aruncând trei zaruri să obținem suma punctelor 6?

- a)  $\frac{5}{108}$       b)  $\frac{1}{36}$       c)  $\frac{1}{6}$       d)  $\frac{1}{108}$       e)  $\frac{1}{72}$       f)  $\frac{1}{12}$

**AL 158** Într-un magazin se găsesc la vânzare 10 calculatoare Asus, 5 Toshiba și 5 Sony. Delegatul Companiei-client, nefiind specialist IT, achiziționează la întâmplare 3 calculatoare. Care e probabilitatea ca acesta să fi ales 2 calculatoare Asus și unul Sony?

- a)  $\frac{15}{76}$       b)  $\frac{3}{20}$       c)  $\frac{5}{38}$       d)  $\frac{5}{114}$       e)  $\frac{1}{3}$       f)  $\frac{33}{38}$

**AL 159** Se aruncă o monedă de 5 ori. Să se determine probabilitatea să se obțină aceeași față de exact 2 ori?

- a)  $\frac{3}{4}$       b)  $\frac{1}{2}$       c)  $\frac{5}{8}$       d)  $\frac{1}{8}$       e)  $\frac{4}{5}$       f)  $\frac{1}{4}$

**AL 160** Se aruncă un zar de două ori. Care este probabilitatea ca produsul numerelor apărute să fie număr par?

- a)  $\frac{1}{3}$       b)  $\frac{3}{4}$       c)  $\frac{1}{2}$       d)  $\frac{2}{3}$       e)  $\frac{5}{6}$       f)  $\frac{25}{36}$

**AL 161** Din multimea numerelor de patru cifre se extrage aleator un număr. Calculați probabilitatea ca numărul să conțină două cifre de 5 și celelalte două de 7.

- a)  $\frac{1}{100}$       b)  $\frac{1}{250}$       c)  $\frac{1}{375}$       d)  $\frac{1}{750}$       e)  $\frac{1}{1500}$       f)  $\frac{1}{3000}$

**AL 162** Într-o urnă sunt bile numerotate de la 1 la 13. Se extrag aleator două bile. Care este probabilitatea ca suma numerelor de pe bilele extrase să fie un număr par?

- a)  $\frac{6}{13}$       b)  $\frac{7}{13}$       c)  $\frac{5}{26}$       d)  $\frac{7}{26}$       e)  $\frac{42}{169}$       f)  $\frac{84}{169}$

**AL 163** Un program folosește aleator cifrele din mulțimea  $\{0, 1, 2, 3\}$  pentru a scrie numere de patru cifre distințe. Se rulează programul. Care este probabilitatea ca numărul scris să fie număr par?

- a)  $\frac{1}{3}$       b)  $\frac{1}{2}$       c)  $\frac{5}{12}$       d)  $\frac{2}{3}$       e)  $\frac{5}{9}$       f)  $\frac{7}{9}$

**AL 164** Un tabel cu 2 linii și 6 coloane este completat aleator folosind toate numerele de la 1 la 12. Care e probabilitatea ca pe prima linie să fie doar numere impare?

- a)  $\frac{1}{A_{12}^6}$       b)  $\frac{1}{C_{12}^6}$       c)  $\frac{1}{6!}$       d)  $\frac{1}{2}$       e)  $\frac{2^6}{12!}$       f)  $\frac{1}{4}$

**AL 165** Un tabel cu mai multe linii și coloane completat cu 0 și 1 se numește *matrice binară*. Determinați probabilitatea ca alegând aleator o matrice binară cu 4 linii și 4 coloane, aceasta să aibă un singur element nenul.

- a)  $\frac{1}{15!}$       b)  $\frac{1}{16!}$       c)  $\frac{2}{7!}$       d)  $\frac{1}{2^{12}}$       e)  $\frac{1}{2^8}$       f)  $\frac{1}{2^4}$

**AL 166** Se consideră matricele:

$$A = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \text{ și } C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 4 & -5 & -6 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze  $A \cdot B - C$ .

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} & \text{b)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -7 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} & \text{c)} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \\
 \text{d)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} & \text{e)} \begin{pmatrix} -5 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} & \text{f)} \begin{pmatrix} -5 & 0 & -1 \\ 2 & -7 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

**AL 167** Se consideră matricele:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} y & 1 \\ 2y & y \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad C = \begin{pmatrix} y & 6 \\ 2x + 4y & 2y \end{pmatrix}.$$

Să se determine  $x, y \in \mathbb{R}$  astfel încât  $xA + yB = C$ .

- |                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) $x = 1, y = 2$  | b) $x = 2, y = 1$  | c) $x = -2, y = -2$ |
| d) $x = 2, y = -1$ | e) $x = 1, y = -2$ | f) $x = 2, y = 2$   |

**AL 168** Fie matricele:

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

și funcția

$$f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(X) = X^2 - 3X + I_2.$$

Să se determine matricele  $B \cdot A \cdot C$  și  $f(B)$ .

- |   |  |
|---|--|
| a) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & 4 \end{pmatrix}, 2B$  | b) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -4 \end{pmatrix}, 2 \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$  |
| c) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}, -2 \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ | d) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -4 \end{pmatrix}, -2B$  |
| e) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 4 & -2 & -4 \end{pmatrix}, -2B$   | f) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -4 \end{pmatrix}, -2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ |

**AL 169** Să se determine  $n \in \mathbb{N}^*$  astfel încât:

$$\sum_{k=1}^n \left[ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \ln k & k \\ 1 & \ln k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 10 - \ln 10! & -35 \\ 10 & 10 - \ln 10! \end{pmatrix}.$$

- |       |        |              |
|-------|--------|--------------|
| a) 10 | b) $e$ | c) nu există |
| d) 1  | e) 2   | f) 5         |

**AL 170** Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

- $P_1$  : Dacă  $A^2$  se poate calcula, atunci  $A$  este o matrice pătratică;  
 $P_2$  : Dacă  $AB$  și  $BA$  se pot calcula, atunci  $A$  și  $B$  sunt matrice pătratice;  
 $P_3$  : Dacă  $AB$  și  $BA$  se pot calcula, atunci  $AB$  și  $BA$  sunt matrice pătratice;  
 $P_4$  : Dacă  $AB = B$ , atunci  $A$  este matricea identitate ?

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| a) $P_1, P_2, P_3$ | b) $P_2, P_3$                       |
| c) $P_1, P_2$      | d) $P_1, P_3$                       |
| e) $P_2, P_3, P_4$ | f) nici o afirmație nu este corectă |

**AL 171** Fie  $A$  și  $B$  două matrice pătratice. Care dintre următoarele matrice sunt întotdeauna egale cu  $(A - B)^2$  ?

$$\begin{aligned} M_1 &= A^2 - B^2 \\ M_2 &= (B - A)^2 \\ M_3 &= A^2 - 2AB + B^2 \\ M_4 &= A(A - B) - B(A - B) \\ M_5 &= A^2 - AB - BA + B^2 \end{aligned}$$

- |                    |                    |                              |
|--------------------|--------------------|------------------------------|
| a) $M_2, M_4, M_5$ | b) $M_1, M_2, M_3$ | c) $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5$ |
| d) $M_2, M_3$      | e) $M_2, M_3, M_5$ | f) $M_1, M_2, M_3, M_4$      |

**AL 172** Să se determine numărul matricelor din mulțimea

$$\mathcal{M} = \left\{ M = \begin{pmatrix} a-1 & 1 & c \\ b & 0 & b \\ c & 1 & a-1 \end{pmatrix} \mid M^2 = \begin{pmatrix} x & 1 & y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & 1 & x \end{pmatrix}, a, b, c, x, y \in \mathbb{N} \right\}.$$

- a) 0      b) 5      c) 1      d) 3      e) 4      f) 2

**AL 173** Fie  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $y, z \in \mathbb{R}$ . Să se determine  $x^{yz}$ , dacă matricile

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & 1 \end{pmatrix} \text{ și } B = \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

verifică relația

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.$$

- a) 4      b)  $x$       c) 8      d) 2      e)  $e$       f) 1

**AL 174** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} 1 & a & -2 & 1 \\ 0 & -1 & b & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,4}(\mathbb{R})$ . Să se determine  $a + b$  astfel încât

$$A \cdot A^t = \begin{pmatrix} 31 & 1 \\ 1 & 14 \end{pmatrix}.$$

- a) -2      b) 8      c) 2      d) 3      e) 5      f) -1

**AL 175** Fie matricea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze

$$\text{tr}[(I_2 + A)(I_2 + 2A)(I_2 + 3A) \dots (I_2 + 2018A)],$$

unde  $\text{tr}(X)$  reprezintă suma elementelor de pe diagonala principală a unei matrice pătratice  $X$ .

- |            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| a) 0       | b) $2018!$     | c) $1 + 2017!$ |
| d) $2019!$ | e) $1 + 2018!$ | f) $1 + 2019!$ |

**AL 176** Fie

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$$

astfel încât  $AB \neq O_2$  și  $BA = O_2$ . Să se determine mulțimea tuturor valorilor pe care le poate lua suma elementelor matricei  $B$ .

- |  |                                 |                                |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| a) $\{2k : k \in \mathbb{Z} \setminus \{1\}\}$ | b) $\mathbb{N}$                 | c) $\mathbb{Z}$                |
| d) $\mathbb{Z} \setminus \{1\}$                | e) $\mathbb{Z} \setminus \{2\}$ | f) $\{2k : k \in \mathbb{Z}\}$ |

**AL 177** Dacă  $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ ,  $X = (x_{ij})_{i,j=1,2}$ , este o matrice care comută prin înmulțire cu orice matrice  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ , atunci:

- |   |   |
|---|---|
| a) $x_{11} = x_{22}$ , $x_{12} = x_{21} = 0$                  | b) $x_{11} = -x_{22}$ , $x_{12} + x_{21} = 1$           |
| c) $x_{11} = x_{12} = 0$ , $x_{22} = x_{21} \in \mathbb{Z}^*$ | d) $x_{11} = x_{12} = x_{21} = x_{22} \in \mathbb{Z}^*$ |
| e) $x_{11} + x_{12} + x_{21} + x_{22} = -1$                   | f) $x_{11} - x_{12} + x_{21} - x_{22} = 1$              |

**AL 178** Să se determine matricea  $X$  care verifică relația

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -6 \\ 6 & -3 & 9 \end{pmatrix}.$$

- |   |  |  |
|---|--|--|
| a) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ | b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ | c) $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$      |
| d) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$   | e) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$         | f) $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ |

**AL 179** Fie matricea

$$A = \begin{pmatrix} 2018 & 2 \\ 1009 & 1 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze

$$A + A^2 + A^3 + \dots + A^{2018}.$$

- |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $\frac{2019^{2018} + 1}{2018} A$ | b) $\frac{2018^{2016} + 1}{2017} A$ | c) $\frac{2019^{2018} - 1}{2018} A$ |
| d) $2018A$                          | e) $1009 \cdot 2019 A$              | f) $\frac{2018^{2016} - 1}{2017} A$ |

**AL 180** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ . Să se determine cel mai mic număr natural  $n \geq 2$  pentru care există  $k \in \mathbb{Z}$  astfel încât  $A^n = kA$ .

- a) 2      b) 3      c) 4      d) 5      e) 6      f) 7

**AL 181** Fie matricea  $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ . Să se calculeze  $X^{4n+1} + 2^{2n}X$  pentru  $n \in \mathbb{N}$  impar.

- a)  $X$       b)  $I_2$       c)  $O_2$       d)  $-X$       e)  $-I_2$       f)  $X^2$

**AL 182** Fie matricea  $A = (a_{ij})_{i,j=1,2,3}$  cu

$$a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i+j}, & i = j, \\ 0, & i > j, \\ (-1)^{i+j} C_j^i, & i < j. \end{cases}$$

Să se calculeze  $A^n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , exprimând rezultatul în funcție de matricea identitate  $I_3$  și de puterile matricei  $B = A - I_3$ .

- |   |  |
|---|--|
| a) $A^n = nB^n + 2I_3$                      | b) $A^n = \left(\frac{n^2 - n}{2} + 1\right) B + nI_3$ |
| c) $A^n = \frac{n^2 - n}{2} B^2 + nB + I_3$ | d) $A^n = \frac{n^2 - n}{2} B + nI_3$                  |
| e) $A^n = nB^2 + \frac{n^2 - n}{2} B + I_3$ | f) $A^n = \frac{n^2 - n - 1}{2} B^2 + nB + I_3$        |

**AL 183** Fie matricea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Să se determine suma elementelor matricei  $A^n$ ,  $n \geq 2$ .

- |                                |                            |  |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| a) $3^n + 2^{n+1}$             | b) $4 \cdot 3^n - 2^n$     | c) $4 \cdot 3^{n-1} + 7 \cdot 2^{n-1} + 6^{n-1}$ |
| d) $3^{n+1} + n \cdot 2^{n-1}$ | e) $4 \cdot 3^n - 2^{n-1}$ | f) $3^{n+1} - 2^n + 6^{n-1}$                     |

**AL 184** Fie matricea

$$A(x) = \begin{pmatrix} 1-x & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 \\ x & 0 & 1-x \end{pmatrix}, \quad x \neq \frac{1}{2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Să se determine  $(A(-2017))^n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- |  |  |
|--|--|
| a) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4035^n & 0 & -4035^n \\ 0 & 0 & 0 \\ -4035^n & 0 & 4035^n \end{pmatrix}$               | b) $\begin{pmatrix} 1 + 4035^n & 0 & 1 - 4035^n \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 - 4035^n & 0 & 1 + 4035^n \end{pmatrix}$           |
| c) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + 4035^n & 0 & 1 - 4035^n \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 - 4035^n & 0 & 1 + 4035^n \end{pmatrix}$ | d) $\begin{pmatrix} 2017^n & 0 & 4035^n \\ 0 & 0 & 0 \\ 4035^n & 0 & -2017^n \end{pmatrix}$                          |
| e) $\begin{pmatrix} -4035^n & 0 & 2017^n \\ 0 & 0 & 0 \\ 2017^n & 0 & -4035^n \end{pmatrix}$                           | f) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - 4035^n & 0 & 2017^{2n} \\ 0 & 0 & 0 \\ 2017^{2n} & 0 & 1 - 4035^n \end{pmatrix}$ |

**AL 185** Să se determine numerele reale  $a$  și  $b$  pentru care soluția ecuației

$$X^{2017} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

este de forma

$$X = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

- a)  $a = 0, b = 0$
- b)  $a = 2017, b = \frac{1}{2017}$
- c)  $a = \frac{1}{2017}, b = 2017$
- d)  $a = 0, b = \frac{1}{2017}$
- e)  $a = 2017, b = 0$
- f)  $a = \frac{1}{2017}, b = \frac{1}{2017}$

**AL 186** Fie  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  o matrice nenulă cu  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ,  $ad = bc$  și  $a+d \neq 0$ .

Să se determine suma elementelor matricei

$$\begin{pmatrix} a+1 & b \\ c & d+1 \end{pmatrix}^n, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

- a)  $\frac{(1+a+d)^n - 1}{a+d}(b+c) + 1$
- b)  $(a+b+c+d)^n + 2$
- c)  $\frac{(1+a+d)^{n-1}}{a+d}(a+b+c+d)$
- d)  $\frac{(1+a+d)^n - 1}{a+d}(a+b+c+d) + 2$
- e)  $(a+b+c+d+2)^n$
- f)  $(1+a+d)^n(b+c) + 1$

**AL 187** Să se calculeze  $A^{36}$ , unde  $A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ .

- a)  $I_2$
- b)  $O_2$
- c)  $A$
- d)  $\sqrt{3}A$
- e)  $2^{36}I_2$
- f)  $3^{36}I_2$

**AL 188** Fie matricea

$$A = \begin{pmatrix} 0 & e^x & e^{-x} \\ e^{-x} & 0 & 0 \\ e^x & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Să se calculeze  $A^{2017}$ .

- a)  $2^{2017}A$       b)  $I_3$       c)  $-I_3$       d)  $2^{1008}A$       e)  $2^{2017}I_3$       f)  $2^{1008}I_3$

**AL 189** Se consideră mulțimea matricelor de forma

$$X(m) = \begin{pmatrix} 1+4m & 6m \\ -2m & 1-3m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$$

Să se studieze dacă  $X(a)X(b) = X(a + b + ab)$ , pentru orice  $a, b \in \mathbb{R}$  și să se calculeze  $(X(1))^n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- |   |   |
|---|---|
| a) Nu, $\begin{pmatrix} 2^{n+2}-3 & 6(2^n-1) \\ 2+2^{n+1} & 4-3 \cdot 2^n \end{pmatrix}$                | b) Da, $\begin{pmatrix} 2^{n+2}-3 & 3 \cdot 2^{n+1}-6 \\ 2-2^{n+1} & 4-3 \cdot 2^n \end{pmatrix}$ |
| c) Da, $\begin{pmatrix} 2^{n+2}-3 & 3 \cdot 2^{n+1}+6 \\ 2(1-2^n) & 4(1-3 \cdot 2^{n-2}) \end{pmatrix}$ | d) Da, $\begin{pmatrix} 2^{n+2}+3 & 6(2^n+1) \\ 2-2^{n+1} & 4-3 \cdot 2^n \end{pmatrix}$          |
| e) Da, $\begin{pmatrix} 2^{n+2}+3 & 6(2^n-1) \\ 2(1-2^n) & 4(1-3 \cdot 2^{n-2}) \end{pmatrix}$          | f) Nu, $\begin{pmatrix} 2^{n+2}+3 & 3 \cdot 2^{n+1}+6 \\ 2(1-2^n) & 4+3 \cdot 2^n \end{pmatrix}$  |

**AL 190** Fie matricele

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

și  $X = A \cdot B \cdot C$ . Să se determine suma elementelor matricei  $X^n$ , unde  $n$  este un număr natural nenul.

- |                    |                    |                              |
|--------------------|--------------------|------------------------------|
| a) $2^{n+1}$       | b) $5^n - 2^{n-1}$ | c) $\frac{5^{n+1}}{3}$       |
| d) $\frac{2^n}{3}$ | e) $5^n - 1$       | f) $\frac{4^n + 5^n}{3} + 1$ |

**AL 191** Să se determine suma tuturor elementelor fiecărei matrice  $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  care verifică relația

$$X^2 - 4X = \begin{pmatrix} -3 & 2018 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

- |          |                   |                    |
|----------|-------------------|--------------------|
| a) -2015 | b) -2013          | c) -2015 sau 2023  |
| d) 2018  | e) -2017 sau 2023 | f) -2017 sau -2013 |

**AL 192** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2019 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ . Să se găsească  $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  astfel încât  $X^{2019} + X = A$ .

- |   |   |
|---|---|
| a) $\begin{pmatrix} 1 & 2019 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  | b) $\begin{pmatrix} 1 & \frac{2018}{2019} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$                               |
| c) $\begin{pmatrix} 1 & 1010 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  | d) $\frac{1}{2020} \begin{pmatrix} 2020 & 2019 \\ 0 & 2020 \end{pmatrix}$                       |
| e) $\begin{pmatrix} \sqrt[2019]{2} & \sqrt[2019]{2019} \\ 0 & \sqrt[2019]{2} \end{pmatrix}$ | f) $A - \begin{pmatrix} \sqrt[2019]{2} & \sqrt[2019]{2019} \\ 0 & \sqrt[2019]{2} \end{pmatrix}$ |

**AL 193** Se consideră mulțimea

$$\mathcal{M} = \left\{ A(a) = \begin{pmatrix} 1 & 5a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Să se calculeze  $B(a) = A(a) + A^2(a) + \dots + A^n(a)$  și să se determine  $a \in \mathbb{Z}$ , astfel încât  $\frac{1}{n} B(a) \in \mathcal{M}$ , pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- |  |  |
|--|--|
| a) $\frac{n}{2} \begin{pmatrix} 2 & 5a(n+1) \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, a \text{ impar}$ | b) $\begin{pmatrix} n & 5a \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & n \end{pmatrix}, a \text{ impar}$ |
| c) $\frac{n}{2} \begin{pmatrix} 2 & 5a(n+1) \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, a \text{ par}$   | d) $\begin{pmatrix} 1 & 5a \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, a \text{ par}$   |
| e) $\frac{n}{2} \begin{pmatrix} 1 & 5a(n+1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, a \text{ impar}$ | f) $\begin{pmatrix} n & 5a \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & n \end{pmatrix}, a \text{ par}$   |

**AL 194** Să se calculeze valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & a_1 - b_3 \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & a_2 - b_3 \\ a_3 - b_1 & a_3 - b_2 & a_3 - b_3 \end{vmatrix},$$

unde  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = \overline{1, 3}$ .

- |   |       |
|---|-------|
| a) $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3$  | b) 1  |
| c) $a_1 - b_1 + a_2 - b_2 + a_3 - b_3$  | d) 0  |
| e) $-a_1 + b_1 - a_2 + b_2 - a_3 + b_3$ | f) -1 |

**AL 195** Fie matricea  $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,3}}$ , unde  $a_{ij} = 1 + \log_{i+1} j$ . Să se calculeze  $(\text{tr}(A))^{\det A}$ , unde  $\text{tr}(A)$  reprezintă suma elementelor de pe diagonala principală a lui  $A$ .

- |                              |                               |  |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| a) $\log_3 2 + \log_2 3 + 3$ | b) 1                          | c) 0                                     |
| d) $\frac{1}{2} \log_2 3$    | e) $\frac{3}{2} \log_3 2 + 3$ | f) $\log_3 2 + \frac{1}{2} \log_2 3 + 3$ |

**AL 196** Fie matricele  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  și  $B = \sum_{k=1}^n A^k$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Să se calculeze determinantul matricei  $B$ .

- |                             |          |                    |
|-----------------------------|----------|--------------------|
| a) $(2^{n+1} - 1)(3^n - 1)$ | b) 1     | c) 0               |
| d) $3(2^n - 1)(3^n - 1)$    | e) $6^n$ | f) $\frac{1}{6^n}$ |

**AL 197** Să se calculeze valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| a) $a + b + c$    | b) $a^2 + b^2 + c^2$   |
| c) $ab + bc + ca$ | d) $(a+b)(a+c)(b+c)$   |
| e) $-a - b - c$   | f) $-4(b-a)(c-a)(c-b)$ |

**AL 198** Fie matricea  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  cu proprietatea că  $\det(A - I_2) = 2$ . Să se calculeze

$$\det A + \det(A - 2I_2).$$

- a) 1      b) 2      c) 3      d) 4      e) 5      f) 6

**AL 199** Să se calculeze valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

- a) 0      b)  $b$       c)  $c$   
d)  $a$       e)  $a+b+c$       f)  $(a+b+c)^3$

**AL 200** Să se găsească valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} \overline{abc} & \overline{bca} & \overline{cab} \\ \overline{cab} & \overline{abc} & \overline{bca} \\ \overline{bca} & \overline{cab} & \overline{abc} \end{vmatrix},$$

unde  $a, b, c = \overline{1, 9}$ .

- a) 99800  $(a-b)(b-c)(c-a)$       b) 998001  $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$   
c)  $10^6 abc$       d) 9908  $(a+b+c)^3$   
e) 0      f) 999  $\overline{abc}$

**AL 201** Fie matricea  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  ale cărei elemente satisfac condiția  $a_{ij} + a_{jk} + a_{ki} = 0$  pentru orice  $i, j, k = \overline{1, 3}$ . Să se determine valoarea determinantului matricei  $A$ .

- a) 2017      b) -2017      c) 1      d) -1      e) 0      f) 1009

**AL 202** Fie  $a, b, c$  lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic  $ABC$  cu  $a > b > c$ ,  $m(\widehat{C}) = 15^\circ$  și

$$\begin{vmatrix} c^2 + ac - a - 1 & ac - a & a^2 - b^2 - c \\ b^2 + ab - a - 1 & a^2 - c^2 - b & ab - a \\ b^2c + bc + bc^2 & a^2b - b^3 & a^2c - c^3 \end{vmatrix} = 0.$$

Să se determine ariile triunghiurilor de acest fel.

a)  $1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

b)  $1 \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$

c) 1

d)  $1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

e)  $\frac{1}{2}$

f)  $\frac{\sqrt{6} \pm \sqrt{2}}{4}$

**AL 203** Să se calculeze valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{a^3} & -\frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ \frac{1}{b^3} & -\frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ \frac{1}{c^3} & -\frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \end{vmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}^*.$$

a)  $\frac{1}{abc} \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) \left( \frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) \left( \frac{1}{c} - \frac{1}{a} \right)$

b)  $\frac{1}{abc} \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) \left( \frac{1}{c} - \frac{1}{a} \right)$

c)  $\frac{1}{abc} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \left( \frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) \left( \frac{1}{c} - \frac{1}{a} \right)$

d)  $\frac{1}{a^2b^2c^2} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \left( \frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2} \right) \left( \frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2} \right)$

e)  $\frac{1}{a^2b^2c^2} \left( \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} \right) \left( \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2} \right) \left( \frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2} \right)$

f)  $\frac{1}{a^2b^2c^2} \left( \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} \right) \left( \frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2} \right) \left( \frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2} \right)$

**AL 204** Fie determinantul

$$\Delta_n^i = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{i-1} & a_2^{i-1} & \dots & a_n^{i-1} \\ a_1^{i+1} & a_2^{i+1} & \dots & a_n^{i+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_n^n \end{vmatrix}, \text{ unde } 1 \leq i \leq n-1, n \in \mathbb{N}, n \geq 2, a_i \in \mathbb{R}^*.$$

Să se calculeze  $\Delta_3^1 + \Delta_3^2$ .

- a)  $(a_2 - a_1)(a_3 - a_2)(a_3 - a_1)$
- b)  $(a_1 + a_2 + a_3 + a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_3)(a_2 - a_1)(a_3 - a_2)(a_3 - a_1)$
- c)  $(a_1 + a_2 + a_3)(a_2 - a_1)(a_3 - a_2)(a_3 - a_1)$
- d)  $(1 + a_1 + a_2 + a_3 + a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_3)(a_2 - a_1)(a_3 - a_2)(a_3 - a_1)$
- e)  $(1 + a_1 + a_2 + a_3 + a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_3 + a_1a_2a_3)(a_2 - a_1)(a_3 - a_2)(a_3 - a_1)$
- f)  $a_1 - a_2 + a_3$

**AL 205** Fie  $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$  soluțiile ecuației  $\det(A - xI_3) = 0$ , unde

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ 2 & 3 & 6 \\ -1 & -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Să se determine  $|x_1| + |x_2| + |x_3|$ .

- a) 0
- b) 1
- c) 3
- d) 7
- e) -3
- f) 4

**AL 206** Să se determine suma numerelor reale  $x, y, z$  pentru care matricea

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & x & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & y & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & z & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

satisfac relațiile  $AA^t = A^tA = I_3$  și are determinantul egal cu 1.

- a)  $\frac{5}{3}$
- b)  $\frac{2}{3}$
- c)  $\frac{1}{3}$
- d)  $-\frac{2}{3}$
- e)  $-\frac{1}{3}$
- f) 0

**AL 207** Fie matricea  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  astfel încât  $\det A = \text{tr}(A) = 1$ , unde  $\text{tr}(A)$  reprezintă suma elementelor de pe diagonala principală a lui  $A$ . Câte elemente sunt multimea  $\{I_2, A, A^2, \dots, A^{2018}\}$ ?

- a) 5
- b) 2
- c) 7
- d) 3
- e) 6
- f) 4

**AL 208** Fie matricele

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

astfel încât  $AB \neq BA$  și  $A^3 = B^3$ . Să se determine valoarea expresiei

$$\det(AB) - \text{tr}(A + B),$$

unde  $\text{tr}(X)$  reprezintă suma elementelor de pe diagonala principală a lui  $X$ .

- a) 2
- b) 0
- c) -1
- d) -2
- e) 1
- f) 3

**AL 209** Să se determine multimea tututor valorilor parametrului  $m \in \mathbb{R}$  astfel încât ecuația

$$X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & m & m^2 \end{pmatrix},$$

să aibă soluție nesingulară.

- a)  $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$
- b)  $\{0, 1\}$
- c)  $\mathbb{R}$
- d)  $\emptyset$
- e)  $\{0\}$
- f)  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

**AL 210** Fie ecuația matriceală

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 8 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Să se determine suma elementelor matricei  $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ .

- a) 12      b) 5      c) -9      d) -4      e) 7      f) 3

**AL 211** Să se determine multimea tuturor soluțiilor ecuației matriceale

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot X = X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- |  |  |
|--|--|
| a) $\left\{ \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$                     | b) $\left\{ \begin{pmatrix} -m & -m \\ m & m \end{pmatrix}, m \in \mathbb{R} \right\}$     |
| c) $\left\{ \begin{pmatrix} m & m \\ m & m \end{pmatrix}, m \in \mathbb{R} \right\}$   | d) $\left\{ \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$                       |
| e) $\left\{ \begin{pmatrix} 3m & m \\ m & 3m \end{pmatrix}, m \in \mathbb{R} \right\}$ | f) $\left\{ \begin{pmatrix} m & m \\ -m+2 & -m+2 \end{pmatrix}, m \in \mathbb{R} \right\}$ |

**AL 212** Fie matricea

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Să se determine  $a, b, c \in \mathbb{R}$  astfel încât să aibă loc relația

$$A^{-1} = aA^2 + bA + cI_3.$$

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a) $2a + b = \det A$                  | b) $a = 1, b = 2, c = 0$  |
| c) $a = 0, b = 2, c = -1$             | d) $a = -1, b = 2, c = 0$ |
| e) nu există $a, b, c \in \mathbb{R}$ | f) $a = 1, b = -2, c = 0$ |

**AL 213** Fie matricea  $A = (a_{ij})_{i,j=1,2,3}$  ale cărei elemente sunt

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i \neq j \text{ sau } i = j = 1, \\ i^2 + i + 1, & i = j \text{ și } i \neq 1. \end{cases}$$

Să se determine suma elementelor inversei matricei  $A$ .

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 3      e) 4      f) 5

**AL 214** Să se determine valorile parametrului real  $m$  astfel încât matricea

$$A = \begin{pmatrix} 5 & m+1 & x+1 \\ x & x-1 & 1 \\ 2 & m & 1 \end{pmatrix}$$

să fie inversabilă pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

- a)  $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{2}{3}, 1 \right\}$       b)  $\left( \frac{2}{3}, 1 \right)$       c)  $\left( -\infty, \frac{2}{3} \right) \cup (1, +\infty)$   
 d)  $\left( \frac{1}{3}, 2 \right)$       e)  $\left( -\infty, \frac{1}{3} \right] \cup [2, +\infty)$       f)  $\left[ \frac{2}{3}, 1 \right]$

**AL 215** Fie  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ ac & bc - 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}_+^*)$  astfel încât

$$\det(A - aA^{-1}) = \det(A - A^{-1}) = 4.$$

Să se determine  $abc$ .

- a) 1      b) 2      c) 3      d) 6      e) 12      f) -18

**AL 216** Fie matricea

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

astfel încât  $A^2 \neq O_2$  și

$$A^4 - (a+d)^2 A^2 + (ad-bc)^2 I_2 = O_2.$$

Să se studieze existența inversei lui  $A$  și în cazul în care aceasta există să se determine  $A^{-1}$ .

a)  $\frac{a+d}{ad-bc} I_2$

c)  $\begin{pmatrix} a & -b \\ -c & d \end{pmatrix}$

e)  $A$

b) nu există

d)  $\frac{1}{a+d} \begin{pmatrix} a & -b \\ -c & d \end{pmatrix}$

f)  $\frac{1}{bc-ad} \begin{pmatrix} -a & c \\ b & -d \end{pmatrix}$

**AL 217** Fie  $A, B \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$  două matrice de forma

$$A = [ \begin{array}{c|c|c|c} a & c_2 & c_3 & c_4 \end{array} ], \quad \text{respectiv} \quad B = [ \begin{array}{c|c|c|c} b & c_2 & c_3 & c_4 \end{array} ],$$

unde  $a, b, c_2, c_3, c_4$  sunt coloanele acestor matrice. Dacă

$$\det(A) = 1 \quad \text{și} \quad \det(B) = 4,$$

cât este determinantul matricei  $C = [ \begin{array}{c|c|c|c} c_2 & a+b & c_3 & c_4 \end{array} ]$ ?

a) 5

b) 0

c) 4

d) -5

e) 1

f) Nu se poate determina

**AL 218** Să se determine rangul matricei

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -6 & -4 \end{pmatrix}.$$

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

e) 4

f) 6

**AL 219** Să se determine rangul matricei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & 8 \end{pmatrix}.$$

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

e) 4

f) 5

**AL 220** Să se determine  $m \in \mathbb{R}$  astfel încât matricea

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \sqrt{2} & m \\ m & \sqrt{2} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

să aibă rangul minim.

- a)  $\pm \frac{2}{3}$       b) 0      c)  $\sqrt{2}$       d)  $\frac{2}{3}$       e)  $-\sqrt{2}$       f)  $-\frac{2}{3}$

**AL 221** Pentru câte valori ale parametrului real  $m$ , matricea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & m & -1 \\ -2 & 4 & -6 & 2 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

are rangul doi?

- a) 0      b) 1      c) 2      d) o infinitate      e) 6      f) 10

**AL 222** Să se determine valorile parametrilor reali  $a$  și  $b$  pentru care matricele

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

și

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ a & 0 & -1 \\ 1 & 1 & b \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

au același rang.

- |                   |                    |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| a) $a = 1, b = 0$ | b) $a = -1, b = 0$ | c) $a = 0, b = 0$ |
| d) $a = 0, b = 1$ | e) $a = 0, b = -1$ | f) $a = 1, b = 1$ |

**AL 223** Să se determine multimea valorilor parametrului real  $m$  pentru care sistemul

$$\begin{cases} mx - 2y = 1 \\ -2x + y = m \\ x + my = -2 \end{cases}$$

este compatibil.

- |                                 |                                  |                   |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| a) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ | b) $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ | c) $\{-1\}$       |
| d) $\{\pm 1, 2\}$               | e) $\{1\}$                       | f) $\{1, \pm 2\}$ |

**AL 224** Se consideră sistemul

$$\begin{cases} 2x + 5y + mz + 8t = 7 \\ x - y + 5z - 3t = n \\ 3x - my + z + pt = 7, \end{cases}$$

unde  $m, n, p \in \mathbb{R}$  și  $n \neq 0$ . Să se calculeze suma  $m + p$  astfel încât sistemul să fie compatibil, iar rangul matricei sale extinse să fie egal cu 2.

- |      |       |       |        |        |       |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|
| a) 1 | b) 34 | c) 17 | d) -10 | e) -20 | f) -7 |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|

**AL 225** Se dă sistemul

$$\begin{cases} x - 2y + (m - 1)z = -2 \\ x + 2y + z = 2 \\ mx + y + 3z = 1. \end{cases}$$

Să se determine multimea tuturor valorilor lui  $m \in \mathbb{Z}$  astfel încât sistemul să fie compatibil nedeterminat.

- |                                     |                |            |             |                                     |            |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| a) $\left\{-2, \frac{1}{2}\right\}$ | b) $\{-2, 2\}$ | c) $\{0\}$ | d) $\{-2\}$ | e) $\left\{-2, \frac{5}{2}\right\}$ | f) $\{1\}$ |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------|

**AL 226** Se consideră sistemul

$$\begin{cases} x + y + mz + 4t = p \\ 2x + 3y + z + 6t = 1 \\ -x - 2y + 3z + nt = 2, \quad m, n, p \in \mathbb{R} . \end{cases}$$

Să se determine  $(m+n)^p$  astfel încât sistemul să fie compatibil și rangul matricei sistemului să fie egal cu 2.

- a)  $6^3$       b) 1      c)  $-8$       d)  $4^6$       e)  $-1$       f) 8

**AL 227** Fie sistemul

$$\begin{cases} x + 3y + 4z = m \\ 2x + 4y + 6z = -1 \\ -2x + 6y + 4z = 5, \quad m \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Să se determine multimea tuturor valorilor lui  $m$  pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

- a)  $-\frac{1}{10}$       b)  $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{10}\right\}$       c)  $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{10}\right\}$   
 d)  $\frac{1}{10}$       e)  $-\frac{1}{20}$       f)  $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{20}\right\}$

**AL 228** Fie sistemul

$$\begin{cases} -2x + my - 6z = m - 1 \\ mx - 2y + 7z = 1 - m \\ x + y + z = m^2 - 1, \quad m \in \mathbb{R} . \end{cases}$$

Să se determine multimea tuturor valorilor lui  $m$  pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

- a)  $m = -2$       b)  $m \in \emptyset$       c)  $m = 3$   
 d)  $m = 1$       e)  $m = 2$       f)  $m = -1$

**AL 229** Să se rezolve sistemul

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = -1 \\ 2x + 2y + 3z = 2 \\ x - 2y - z = 4 \end{cases}$$

- a)  $(-24, 14, 19)$       b)  $(-2, -3, 3)$       c)  $(21, 10, -14)$   
 d)  $(-5, -3, 6)$       e)  $(-14, -21, 24)$       f)  $(3, -2, -3)$

**AL 230** Fie sistemul

$$\begin{cases} 2x - y - 3z = 2 \\ x + 4y + 3z = 1 \\ -3x - 2y + z = -3 \end{cases}$$

Care din următoarele relații este verificată de soluțiile sistemului?

- a)  $x^2 - y^2 - 2z = 1$       b)  $x + y + z = 3$       c)  $x^2 + y - z^2 = -1$   
 d)  $x + y^2 - z^2 = 1$       e)  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$       f)  $x^2 + y + z^2 = 4z.$

**AL 231** Soluția sistemului  $(A - 9I_3)X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , unde  $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{pmatrix}$ ,

este  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ . Să se precizeze care din următoarele afirmații este adevărată pentru orice valori posibile ale lui  $x_1$ ,  $x_2$  și  $x_3$ .

- a)  $2x_1 + x_2 + x_3 = 0$       b)  $2x_1 - x_2 + x_3 = 0$       c)  $x_1 - x_2 + x_3 = 0$   
 d)  $2x_1 + x_2 - x_3 = 0$       e)  $2x_1 - x_2 - x_3 = 0$       f)  $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$

**AL 232** Fie sistemul

$$\begin{cases} x + ay = 1 \\ y + az = a \\ x + z = 1, \quad a \in \mathbb{R}^* \end{cases}$$

Să se determine mulțimea tuturor valorilor lui  $a$  pentru care soluția sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

- a)  $\{1\}$       b)  $\{2\}$       c)  $\mathbb{R}^*$       d)  $\mathbb{R}_+^*$       e)  $\mathbb{Q}^*$       f)  $\{-1\}$

**AL 233** Fie sistemul

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 + a \\ -x + y - z = a \\ 2x + y = 1, \quad a \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Să se determine mulțimea tuturor valorilor lui  $a$  pentru care soluția sistemului verifică relația  $3x + 3y - z = 0$ .

- a)  $\{0\}$       b)  $\mathbb{R}$       c)  $\{1\}$       d)  $\{-1\}$       e)  $\{2\}$       f)  $\{-2\}$

**AL 234** Să se determine acele soluții  $(x, y, z)$  ale sistemului

$$\begin{cases} 2x - 2y + z = 1 \\ 3x - y + 2z = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

pentru care  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

- |  |   |
|--|---|
| a) $(0, 1, 0), \left(\frac{12}{13}, \frac{4}{13}, \frac{10}{13}\right)$  | b) $(1, 0, 0), \left(\frac{12}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{3}{13}\right)$ |
| c) $\left(\frac{12}{13}, \frac{7}{13}, -\frac{3}{13}\right), (0, 0, -1)$ | d) $(0, 0, 1), \left(\frac{12}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{3}{13}\right)$ |
| e) $(0, 0, 1), \left(-\frac{12}{13}, \frac{4}{13}, \frac{3}{13}\right)$  | f) $\left(\frac{11}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{3}{13}\right), (0, 0, 1)$ |

**AL 235** Fie sistemul liniar omogen

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 9y + z = 0 \\ x - 3y + 2z = 0 \end{cases}$$

și  $(x_0, y_0, z_0)$  o soluție nebanală a sistemului. Să se determine valoarea raportului

$$\frac{5x_0 - 10y_0 - z_0}{10x_0 + 5y_0 + 3z_0}.$$

- a)  $\frac{23}{5}$       b) 1      c)  $\frac{7}{5}$       d) 2      e)  $-1$       f)  $-\frac{7}{5}$

**AL 236** Fie sistemul de ecuații liniare

$$\begin{cases} (a-2)x + ay + (a+1)z = 0 \\ (b-2)x + by + (b+1)z = 0 \\ (c-2)x + cy + (c+1)z = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Să se determine  $a, b, c$  astfel încât sistemul să aibă o singură soluție.

- a)  $a = b = c$       b)  $a, b, c \in \mathbb{R}$       c)  $a \neq b, b \neq c, c \neq a$   
 d)  $\nexists a, b, c \in \mathbb{R}$       e)  $a = b \neq c$       f)  $a \neq b = c$

**AL 237** Să se determine multimea valorilor lui  $m \in \mathbb{R}$  astfel încât sistemul

$$\begin{cases} x + my + m^2z = 0 \\ m^2x + y + mz = 0 \\ m^2x + my + z = 0 \end{cases}$$

să admită și soluții diferite de soluția banală.

- a)  $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$       b)  $\left\{ \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}, \pm 1 \right\}$       c)  $\{\pm 1\}$   
 d)  $\{1\}$       e)  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$       f)  $\left\{ \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \right\}$

**AL 238** Fie  $a \in \mathbb{R}^*$  pentru care sistemul

$$\begin{cases} x + ay - 1 = 0 \\ ax - 3ay - (2a + 3) = 0, \end{cases}$$

este compatibil nedeterminat. Să se calculeze determinantul

$$\begin{vmatrix} u & v \\ 3 & 1 \end{vmatrix},$$

unde  $(u, v)$  este o soluție a sistemului.

- a)  $u$       b)  $v$       c)  $uv$       d)  $0$       e)  $1$       f)  $-1$

**AL 239** Pentru care din următoarele cazuri de mai jos, sistemul

$$\begin{cases} ax + by + cz = b + c \\ bx + cy + az = a + c \\ cx + ay + bz = a + b, \quad a, b, c \in \mathbb{R} \end{cases}$$

este incompatibil?

- a)  $a - b + c = 0$       b)  $a, b, c \in \emptyset$       c)  $a + b - c = 0$   
 d)  $a + b - c \neq 0$       e)  $a + b + c = 0$       f)  $a + b + c \neq 0$

**AL 240** Fie sistemul

$$\begin{cases} ax + by + cz = 1 \\ cx + ay + bz = 1 \\ bx + cy + az = 1, \quad a, b, c \in \mathbb{R}^*. \end{cases}$$

Care dintre următoarele propoziții matematice este adevărată?

- a) Dacă  $a = b = c$  atunci sistemul este compatibil determinat
- b) Dacă  $a = 1, b = 2, c = -3$  atunci sistemul este incompatibil
- c) Dacă  $a = 1, b = 3, c = 2$  atunci sistemul este compatibil nedeterminat
- d) Dacă  $a = -1, b = 3, c = -2$  atunci sistemul este compatibil determinat
- e) Dacă  $a = b = c$  atunci sistemul este incompatibil
- f) Toate afirmațiile sunt false

**AL 241** Fie  $(x_t, y_t, z_t)$  soluția sistemului

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 + 2^{t+1} \\ x + 2y + z = 2 + 2^t - \frac{1}{2^t} \\ 2x + y + z = 1 + 2^t + \frac{1}{2^t}, \quad t \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Să se determine

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_t y_t z_t.$$

- a)  $\infty$
- b) 0
- c) 1
- d) 2
- e)  $-2$
- f) 3

**AL 242** Fie  $S$  mulțimea soluțiilor reale ale sistemului

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + y + z = 2 \\ 3x + 3y + 4z = 2. \end{cases}$$

Să se determine  $\min_{(x,y,z) \in S} (x^2 + y^2 + z^2)$ .

- a) 1
- b) 1, 4
- c) 1, 6
- d) 2
- e) 2, 4
- f) 3

**AL 243** Pe mulțimea  $(0, +\infty)$  se definește legea de compozitie  $x \circ y = \frac{xy}{x+y}$ .

Să se calculeze

$$\frac{1}{2} \circ \frac{1}{3} \circ \dots \circ \frac{1}{50}.$$

- a)  $\frac{1}{1225}$     b)  $\frac{1}{1274}$     c) 1275    d)  $\frac{1}{1275}$     e) 1274    f)  $\frac{1}{1300}$

**AL 244** Pe mulțimea  $(-1, 1)$  se consideră legea de compoziție  $x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$ .

Să se calculeze

$$\underbrace{\frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \dots * \frac{1}{2}}_{de\ n\ ori}.$$

- |   |                              |                                      |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| a) $\frac{4 \cdot 3^n - 32}{3^n - 4}$                 | b) $\frac{2^n}{2^n + 1}$     | c) $\frac{2^{n+1} - 1}{2^{n+1} + 1}$ |
| d) $\frac{7 \cdot 2^{n-2} - 1}{13 \cdot 2^{n-3} + 1}$ | e) $\frac{3^n - 1}{3^n + 1}$ | f) $\frac{4^{n+1} - 1}{4^{n+1} + 1}$ |

**AL 245** Pe mulțimea numerelor întregi se definește legea de compoziție

$$x \circ y = (x - a)^2(y - a) + a, \quad a \in \mathbb{Z}.$$

Să se determine mulțimea soluțiilor ecuației  $x \circ x = x$ .

- |                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| a) $\{a, a - 1\}$  | b) $\{a, a + 1\}$   | c) $\{a - 1, a, a + 1\}$   |
| d) $\{-a, 1 - a\}$ | e) $\{-a, -a - 1\}$ | f) $\{-a, 1 - a, -a - 1\}$ |

**AL 246** Pe mulțimea numerelor reale se definește operația algebrică

$$x \circ y = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Dacă  $(u, v)$ ,  $u, v > 0$ , este soluția sistemului

$$\begin{cases} x \circ y \circ 2 = \sqrt{17} \\ (x \circ 2) + (y \circ 3) = 2\sqrt{13}, \end{cases}$$

să se determine  $u + v$ .

- a) 1    b) 0    c) 5    d) 19    e)  $\sqrt{13}$     f)  $\sqrt{19}$ .

**AL 247** Se consideră  $\mathbb{R}$  cu legea de compoziție  $x * y = ax + y$ ,  $a \in \mathbb{R}$  și mulțimea

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^x \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$$

cu operația de înmulțire a matricelor "·". Știind că funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow M$ ,

$$f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^x \end{pmatrix}$$

satisfacă relația  $f(x * y) = f(x) \cdot f(y)$ , pentru orice  $x, y \in \mathbb{R}$ , să se determine mulțimea valorilor lui  $a$ .

- a)  $\{0\}$       b)  $\{-1\}$       c)  $\mathbb{R}$       d)  $\emptyset$       e)  $\{1\}$       f)  $\{2\}$

**AL 248** Să se determine  $k \in \mathbb{R}$ , știind că mulțimea  $[1, 3]$  este parte stabilă în raport cu operația  $x \circ y = xy - 2x - 2y + k$ .

- a)  $k = 0$       b)  $k = 1$       c)  $k = 2$       d)  $k = 3$       e)  $k = 6$       f)  $k = -2$

**AL 249** Se consideră mulțimea  $\mathcal{M} = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$ , care este parte stabilă a lui  $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$  în raport cu înmulțirea matricelor. Să se determine mulțimea tuturor valorilor pe care le poate lua  $\det A$ , știind că și  $A^{-1} \in \mathcal{M}$ .

- a)  $\{0, 1\}$       b)  $\{0\}$       c)  $\{-1, 1\}$       d)  $\{1\}$       e)  $\{-1\}$       f)  $\{-1, 0\}$

**AL 250** Fie mulțimea  $\mathcal{M} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \alpha x^2 & x \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \beta x & \gamma \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ . Să se

determine valorile parametrilor  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^*$  astfel încât  $(\mathcal{M}, \cdot)$  să fie parte stabilă a lui  $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \cdot)$ .

- a)  $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 1$       b)  $\alpha = \beta, \gamma = 0$       c)  $\beta = 2\alpha, \gamma = 1$   
 d)  $\alpha = 2\beta, \gamma = -1$       e)  $\alpha = 2\beta, \gamma = 1$       f)  $\alpha = -\beta, \gamma = 1$

**AL 251** Pe mulțimea

$$\mathcal{M} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

se consideră legea de compoziție  $A * B = A \cdot B + aA + bB + 6I_2$ , unde  $a, b \in \mathbb{R}$ . În care din următoarele cazuri legea este asociativă și comutativă?

- |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a) $a \in \{-3, 2\}$ , $b = a$ | b) $a \in \{-2, 3\}$ , $b = a$ | c) $a \in \{-1, 2\}$ , $b = a$ |
| d) $a = -2$ , $b = 3$          | e) $a = -1$ , $b = 2$          | f) $a = -3$ , $b = 2$          |

**AL 252** Să se determine o relație între parametrii reali  $a$  și  $b$  astfel încât legea de compoziție  $x * y = xy + ax + ay + b$  de pe  $\mathbb{R}$  să fie asociativă.

- |                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| a) $a^2 = a + b$ | b) $a = a^2 + b$  | c) $b^2 + a = a^2$ |
| d) $a + a^2 = b$ | e) $2a = b + a^2$ | f) $2b + a = a^2$  |

**AL 253** Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție

$$x * y = xy + 2x + 2y + k.$$

Să se găsească  $k \in \mathbb{R}$  astfel încât legea să fie asociativă. Pentru această valoare, să se determine mulțimea soluțiilor ecuației

$$x * x = -2.$$

- |            |             |                |                |                |             |
|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| a) $\{1\}$ | b) $\{-1\}$ | c) $\{1, -1\}$ | d) $\{2, -2\}$ | e) $\{1, -2\}$ | f) $\{-2\}$ |
|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|

**AL 254** Pe mulțimea numerelor complexe se consideră legea de compoziție

$$x * y = xy - i(x + y) - 1 + i.$$

Să se determine elementul neutru al acestei legi și să se calculeze  $i * i^2 * i^3 * i^4 * i^5$ .

- |                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| a) $e = 1 + i, -1$ | b) $e = 1 + i, i$  | c) $e = 1, 1 - 2i$    |
| d) $e = 1 - i, i$  | e) $e = -i, 2 - i$ | f) $e = 2 + i, 1 - i$ |

**AL 255** Pe mulțimea numerelor complexe se consideră legea de compoziție

$$x * y = xy + 2i(x + y) - 4 - 2i.$$

Să se determine elementul neutru  $e$  al acestei legi și să se calculeze

$$w = (1 - i) * (1 - i)^2 * (1 - i)^3 * (1 - i)^4 * (1 - i)^5.$$

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| a) $e = 1 - 2i$ și $w = 1 - i$ | b) $e = 2i$ și $w = -2i$   |
| c) $e = 2i$ și $w = 1 - i$     | d) $e = 2 - i$ și $w = -i$ |
| e) $e = 1 - 2i$ și $w = -2i$   | f) $e = -i$ și $w = 2 - i$ |

**AL 256** Pe mulțimea numerelor reale se consideră legea de compoziție

$$x * y = (x - 3)(y - 1) + 3.$$

Să se determine elementul neutru al acestei legi.

- |              |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|
| a) nu există | b) 4 | c) 3 | d) 0 | e) 2 | f) 6 |
|--------------|------|------|------|------|------|

**AL 257** Pe mulțimea numerelor întregi impare  $2\mathbb{Z} + 1$  se definește operația

$$x * y = \frac{1}{2}(xy + x + y - 1).$$

Să se determine mulțimea elementelor inversabile ale monoidului  $(2\mathbb{Z} + 1, *)$ .

- |                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| a) $\{-3, 1\}$        | b) $2\mathbb{N} + 1$  | c) $2\mathbb{Z} + 1$ |
| d) $\{-5, -3, 1, 3\}$ | e) $\{-3, -1, 1, 3\}$ | f) $\{-5, 1\}$       |

**AL 258** Fie mulțimea

$$\mathcal{M} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathcal{M}_3(\mathbb{Z}).$$

Să se determine numărul elementelor simetrizabile ale monoidului  $(\mathcal{M}, \cdot)$ , unde „ $\cdot$ ” reprezintă operația de înmulțire a matricelor.

- a) 0      b) 1      c) 8      d) 5      e) 7      f) 9

**AL 259** Pe mulțimea numerelor complexe se consideră legea de compoziție

$$z_1 \perp z_2 = z_1 \cdot z_2 + \operatorname{Im}(z_1) \cdot \operatorname{Im}(z_2).$$

Să se determine elementele inversabile în raport cu această lege.

- |   |  |
|---|--|
| a) $\{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) = 0\}$ | b) $\{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) \neq 0\}$ |
| c) $\mathbb{C}$                                     | d) $\mathbb{C}^*$                                      |
| e) $\{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Im}(z) = 0\}$ | f) $\{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Im}(z) < 0\}$    |

**AL 260** Se consideră matricile

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

și mulțimea  $\mathcal{M} = \{xA + B \mid x \in \mathbb{R}^*\}$ . Să se determine mulțimea elementelor inversabile din  $\mathcal{M}$  în raport cu operația de înmulțire a matricelor.

- |                                       |  |                                       |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| a) $\emptyset$                        | b) $\mathcal{M} \setminus \left\{ \frac{1}{2}A + B \right\}$ | c) $\mathcal{M} \setminus \{I_2\}$    |
| d) $\mathcal{M} \setminus \{-A + B\}$ | e) $\mathcal{M}$   | f) $\mathcal{M} \setminus \{2A + B\}$ |

**AL 261** Fie  $a \geq 0$  și  $M = (a, +\infty) \setminus \{a + 1\}$  pe care se definește legea de compoziție

$$x * y = (x - a)^{\ln \sqrt[k]{y-a}} + a, \quad k \geq 2, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Să se determine simetricul lui  $x \in M$ .

- |                                   |                              |                                   |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| a) $e^{\frac{k^2}{\ln(x-a)} + a}$ | b) $\frac{e^{k^2}}{x-a} + a$ | c) $\frac{e^{k^2}}{x-a}$          |
| d) $e^{\frac{k}{\ln(x-a)}}$       | e) $e^{k^2} - x - 2a$        | f) $e^{\frac{k^2}{\ln(x-a)}} + a$ |

**AL 262** Pe mulțimea  $\mathbb{R}_+^*$  se introduce legea de compoziție

$$x * y = a \sqrt[n]{\log_a^n x + \log_a^n y - \log_a^n b},$$

unde  $a, b \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ ,  $n$  impar,  $n \neq 1$ . Să se determine simetricul lui  $x \in \mathbb{R}_+^*$  în raport cu această lege de compoziție.

a)  $\frac{b^{2^n}}{x}$

b)  $a \sqrt[n]{\log_a^n b + \log_a^n x}$

c)  $a \sqrt[n]{2 \log_a^n b - \log_a^n x}$

d)  $\frac{b^2}{x}$

e)  $a \sqrt[n]{\log_a^n b - \log_a^n x}$

f)  $\frac{b^{\sqrt[2]{n}}}{x}$

**AL 263** Pe mulțimea  $\mathbb{R}_+^*$  se consideră legea de compoziție

$$x * y = 2 \sqrt[3]{\log_2^3 x + \log_2^3 y - 8}.$$

Știind că elementele  $2^p$  și  $2^q$  (unde  $p, q \in \mathbb{R}$ ) sunt simetrice în raport cu legea dată, să se calculeze  $p^3 + q^3$ .

a) 16

b) 2

c) 4

d) 32

e) 8

f) 24

**AL 264** Pe mulțimea  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  se definește legea de compoziție

$$(a, b) * (c, d) = (ac, bc + ad).$$

Să se determine elementele simetrizabile față de legea  $*$  din mulțimea  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ .

a)  $(b, 1)$ ,  $b \in \mathbb{Z}$

b)  $(b, 0)$ ,  $b \in \mathbb{Z}$

c)  $(b, \pm 1)$ ,  $b \in \mathbb{Z}$

d)  $(\pm 1, b)$ ,  $b \in \mathbb{Z}$

e)  $(0, b)$ ,  $b \in \mathbb{Z}$

f)  $(1, b)$ ,  $b \in \mathbb{Z}$

**AL 265** Pe mulțimea  $G = \mathbb{R} \setminus \{1\}$  se definește legea de compoziție

$$x * y = 3xy - 3x + 3(a^2 - 2)y - a + 3$$

pentru orice  $x, y \in G$ . Să se determine  $a \in \mathbb{R}$  pentru care  $(G, *)$  este grup.

a) 0

b) 2

c) -1

d) 1

e) -2

f) 3

**AL 266** Fie  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$  dat și multimea

$$G = \left\{ A = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{C}, A^n = I_2 \right\}.$$

Câte elemente are grupul  $G$  în raport cu înmulțirea matricelor?

- |                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| a) $(n - 1)^2$ | b) $n$         | c) $n - 1$ |
| d) $n - 2$     | e) $(n - 2)^2$ | f) $n^2$   |

**AL 267** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$  și multimea

$$G = \{M(x) = I_3 + xA^2, x \in \mathbb{R}\}.$$

Știind că funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow G$ ,  $f(x) = I_3 + xA^2$  este morfism între  $(\mathbb{R}, *)$  și  $(G, \cdot)$ , unde relația " \* " este definită prin  $x * y = x + y + axy$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , iar " . " este înmulțirea matricelor, să se determine valoarea parametrului  $a$ .

- |      |       |      |       |       |         |
|------|-------|------|-------|-------|---------|
| a) 1 | b) -1 | c) 4 | d) -4 | e) 25 | f) -25. |
|------|-------|------|-------|-------|---------|

**AL 268** Fie  $\mathbb{R}^*$  dotată cu legea de compozitie definită prin  $a * b = kab$ ,  $k \in \mathbb{R}$  și multimea

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}^* \right\}$$

dotată cu înmulțirea matricelor " . ". Știind că funcția

$$f : \mathbb{R}^* \rightarrow M, f(x) = \begin{pmatrix} x & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 \\ x & 0 & x \end{pmatrix}$$

este un morfism între grupurile  $(\mathbb{R}^*, *)$  și  $(M, \cdot)$ , să se determine multimea valorilor lui  $k$ .

- |                 |                 |                 |            |            |            |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| a) $\mathbb{R}$ | b) $\mathbb{Z}$ | c) $\mathbb{Q}$ | d) $\{0\}$ | e) $\{1\}$ | f) $\{2\}$ |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|

**AL 269** Fie  $G = (1, +\infty)$  care are o structură de grup față de operația ” $*$ ” definită prin

$$x * y = \sqrt{x^2 y^2 - x^2 - y^2 + 2}.$$

Să se determine  $a, b \in \mathbb{R}$  astfel încât funcția

$$f : (0, +\infty) \rightarrow G, \quad f(x) = \sqrt{ax + b}$$

să fie un izomorfism de la grupul  $((0, +\infty), \cdot)$  la grupul  $(G, *)$ .

- a)  $a = 0, b = 2$
- b)  $a = 1, b \in \{1, 2\}$
- c)  $a = 0, b = 1$
- d)  $a = 0, b \in \{1, 2\}$
- e)  $a = 1, b = 2$
- f)  $a = b = 1$

**AL 270** Pe mulțimea  $\mathbb{Z}$  se definesc legile de compoziție

$$x \perp y = x + y - 5 \text{ și } x \top y = x + y + 5.$$

Să se determine toate perechile  $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  astfel încât funcția  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(x) = ax + b$  să fie un izomorfism între grupurile  $(\mathbb{Z}, \perp)$  și  $(\mathbb{Z}, \top)$ .

- a)  $(1, -10), (-1, 0)$
- b)  $(1, -10)$
- c)  $(-1, -10)$
- d)  $(-1, 0)$
- e)  $(1, 0), (-1, -10)$
- f)  $(1, 0)$

**AL 271** Fie  $a, b \in \mathbb{Z}_5$ ,  $f : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$ ,  $f_{a,b}(x) = ax + b$ ,  $a \neq \hat{0}$ . Să se găsească toate funcțiile  $f_{a,b}$  pentru care are loc

$$f_{a,b}^4 = f_{\hat{2},\hat{0}}^{2018} \circ f_{\hat{2},\hat{2}}^{2020} \circ f_{\hat{2},\hat{4}}^{2022},$$

unde  $f^n = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{de\ n-ori}$ .

- a)  $f_{\hat{2},\hat{2}}$
- b)  $f_{\hat{1},\hat{2}}$
- c)  $f_{\hat{1},\hat{4}}; f_{\hat{2},\hat{1}}$
- d)  $f_{\hat{3},\hat{0}}$
- e)  $f_{\hat{2},\hat{0}}$
- f)  $f_{\hat{4},\hat{0}}$

**AL 272** Fie legile de compoziție

$$x \perp y = x + y + \hat{1}0 \quad \text{și} \quad x \top y = xy - \hat{3}x - \hat{3}y - \hat{1}.$$

Să se determine cele două elemente neutre ale inelului  $(\mathbb{Z}_{13}, \perp, \top)$ .

- |   |  |   |
|---|--|---|
| a) $e_{\perp} = \widehat{10}, e_{\top} = \widehat{3}$ | b) $e_{\perp} = \widehat{3}, e_{\top} = \widehat{3}$ | c) $e_{\perp} = \widehat{3}, e_{\top} = \widehat{6}$  |
| d) $e_{\perp} = \widehat{3}, e_{\top} = \widehat{4}$  | e) $e_{\perp} = \widehat{4}, e_{\top} = \widehat{3}$ | f) $e_{\perp} = \widehat{3}, e_{\top} = \widehat{11}$ |

**AL 273** Fie  $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ . Să se determine mulțimea elementelor inversabile ale inelului  $(\mathbb{Z}[i], +, \cdot)$ .

- |                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| a) $\mathbb{Z}[i]$    | b) $\mathbb{Z}[i] \setminus \{\pm 1, \pm i\}$ | c) $\{1, i\}$  |
| d) $\{\pm 1, \pm i\}$ | e) $\mathbb{Z}[i] \setminus \{1, i\}$         | f) $\emptyset$ |

**AL 274** Pe mulțimea numerelor întregi se definesc legile de compoziție

$$x \perp y = ax + by - 7 \quad \text{și} \quad x \top y = xy - 7x - 7y + c.$$

Să se determine  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  astfel încât  $(\mathbb{Z}, \perp, \top)$  să fie un inel.

- |                       |                        |                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| a) $a = b = c = 17$   | b) $a = b = 1, c = 56$ | c) $a = b = c = 7$  |
| d) $a = b = 1, c = 7$ | e) $a = b = c = 1$     | f) $a = b = c = -1$ |

**AL 275** Pe mulțimea numerelor întregi se definesc legile de compoziție

$$x * y = x + y - 2 \quad \text{și} \quad x \circ y = xy - 2x - 2y + 6.$$

Să se determine  $a, b \in \mathbb{Z}$  astfel încât între inelele  $(\mathbb{Z}, *, \circ)$  și  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  să existe izomorfismul  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(x) = ax + b$ ,  $a \neq 0$ ,  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

- |                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| a) $a = 1, b = 0$ | b) $a = 1, b = 1$  | c) $a = 1, b = 2$  |
| d) $a = 2, b = 1$ | e) $a = 1, b = -2$ | f) $a = -1, b = 2$ |

**AL 276** Pe mulțimea numerelor reale se definesc legile de compoziție

$$x \perp y = x + y - 1 \quad \text{și} \quad x \top y = 2xy - 2(x + y) + 3.$$

Să se determine  $a, b \in \mathbb{R}$  astfel încât funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = ax + b$  să fie un izomorfism între corpurile  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  și  $(\mathbb{R}, \perp, \top)$ .

a)  $a = b = 1$

b)  $a = b = \frac{1}{2}$

c)  $a = 0, b = 1$

d)  $a = 1, b = 0$

e)  $a = 1, b = \frac{1}{2}$

f)  $a = \frac{1}{2}, b = 1$

**AL 277** Fie mulțimea  $\mathcal{K} = \left\{ \begin{pmatrix} x + ay & by \\ cy & x - ay \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$ . Să se determine o relație între parametrii reali  $a, b, c$  astfel încât

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{K} \quad f(x + yi) = \begin{pmatrix} x + ay & by \\ cy & x - ay \end{pmatrix}$$

să fie izomorfism între corpul  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  și corpul  $(\mathcal{K}, +, \cdot)$ .

a)  $2a + bc = 1$

b)  $a^2 + bc = 1$

c)  $2a = bc - 1$

d)  $a^2 + bc + 1 = 0$

e)  $a^2 = bc - 1$

f)  $a^2 - bc = 1$

**AL 278** Fie sistemul

$$\begin{cases} \widehat{4}x + \widehat{3}y = \widehat{6} \\ \widehat{3}x + \widehat{2}y = \widehat{1} \end{cases}$$

în  $\mathbb{Z}_{11}$  cu soluția  $(x_0, y_0)$ . Dacă  $y'_0$  este inversul lui  $y_0$  în corpul  $(\mathbb{Z}_{11}, +, \cdot)$ , să se determine  $m \in \mathbb{Z}_{11}$  astfel încât  $\widehat{3}x_0^2 + my'_0 = x_0$ .

a)  $\widehat{5}$

b)  $\widehat{1}$

c)  $\widehat{3}$

d)  $\widehat{4}$

e)  $\widehat{10}$

f)  $\widehat{9}$

**AL 279** Să se determine  $a \in \mathbb{Z}_8$  pentru care sistemul

$$\begin{cases} a^2x + y = \widehat{5} \\ \widehat{3}x + ay = \widehat{7} \end{cases}$$

are soluția  $(\widehat{3}, \widehat{2})$  și să se specifice numărul total al soluțiilor.

a)  $a = \widehat{2}$ , 5 soluții;  $a = \widehat{7}$ , 4 soluții

b)  $a = \widehat{4}$ , 7 soluții;  $a = \widehat{6}$ , 3 soluții

c)  $a = \widehat{1}$ , 3 soluții;  $a = \widehat{5}$ , 8 soluții

d)  $a = \widehat{3}$ , 8 soluții;  $a = \widehat{7}$ , 4 soluții

e)  $a = \widehat{1}$ , 5 soluții;  $a = \widehat{5}$ , 3 soluții

f)  $a = \widehat{3}$ , 6 soluții;  $a = \widehat{7}$ , 4 soluții

**AL 280** În multimea  $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_3)$  să se rezolve ecuația

$$X^{2021} = \begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{0} & \widehat{1} \end{pmatrix}.$$

a)  $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{0} \\ \widehat{0} & \widehat{1} \end{pmatrix}$

b)  $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{1} \\ \widehat{0} & \widehat{2} \end{pmatrix}$

c)  $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{1} \\ \widehat{0} & \widehat{1} \end{pmatrix}$

d)  $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{0} & \widehat{1} \end{pmatrix}$

e)  $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{2} & \widehat{1} \end{pmatrix}$

f)  $\begin{pmatrix} \widehat{2} & \widehat{0} \\ \widehat{0} & \widehat{1} \end{pmatrix}$

**AL 281** Fie multimea

$$\mathcal{M} = \left\{ A(x) = \begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{4x} \\ \widehat{6x} & \widehat{1} \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{Z}_{12} \right\}.$$

Să se determine toate soluțiile ecuației  $A^2(x) + 2A(x) = \begin{pmatrix} \widehat{3} & \widehat{4} \\ \widehat{0} & \widehat{3} \end{pmatrix}$ .

a)  $A(\widehat{7})$

b)  $A(\widehat{3})$

c)  $A(\widehat{2}), A(\widehat{5}), A(\widehat{8})$

d)  $A(\widehat{1}), A(\widehat{4})$

e)  $A(\widehat{0})$

f) nu are soluții

**AL 282** Fie matricea  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{Z}_3)$ ,

$$A = \begin{pmatrix} \widehat{2} & \widehat{0} & \widehat{1} \\ \widehat{1} & \widehat{2} & \widehat{1} \\ \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{1} \end{pmatrix}.$$

Să se determine  $A^{-1}$ .

a)  $\begin{pmatrix} \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{0} & \widehat{2} & \widehat{1} \\ \widehat{1} & \widehat{1} & \widehat{1} \end{pmatrix}$

b)  $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{1} & \widehat{1} \\ \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{2} \\ \widehat{0} & \widehat{1} & \widehat{1} \end{pmatrix}$

c)  $\begin{pmatrix} \widehat{2} & \widehat{2} & \widehat{2} \\ \widehat{2} & \widehat{0} & \widehat{1} \\ \widehat{0} & \widehat{2} & \widehat{2} \end{pmatrix}$

d)  $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{0} \\ \widehat{0} & \widehat{1} & \widehat{0} \\ \widehat{0} & \widehat{0} & \widehat{1} \end{pmatrix}$

e)  $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{2} \\ \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{1} & \widehat{2} & \widehat{2} \end{pmatrix}$

f)  $\begin{pmatrix} \widehat{2} & \widehat{0} & \widehat{0} \\ \widehat{0} & \widehat{2} & \widehat{0} \\ \widehat{0} & \widehat{0} & \widehat{2} \end{pmatrix}$

**AL 283** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} m & \widehat{0} & \widehat{1} \\ m & \widehat{1} & \widehat{1} \\ \widehat{1} & \widehat{0} & m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{Z}_3)$ . Să se afle  $m \in \mathbb{Z}_3$  pentru care  $A$  este inversabilă și să se determine  $A^{-1}$ .

a)  $m = \widehat{0}$ ,  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \widehat{0} & \widehat{0} & \widehat{1} \\ \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{0} \\ \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{0} \end{pmatrix}$

b)  $m = \widehat{1}$ ,  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{1} \\ \widehat{0} & \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{0} \end{pmatrix}$

c)  $m = \widehat{0}$ ,  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \widehat{0} & \widehat{0} & \widehat{1} \\ \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{0} \end{pmatrix}$

d)  $m = \widehat{2}$ ,  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{0} \\ \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{0} \\ \widehat{0} & \widehat{0} & \widehat{1} \end{pmatrix}$

e)  $m = \widehat{1}$ ,  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \widehat{2} & \widehat{0} & \widehat{1} \\ \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{0} \\ \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{0} \end{pmatrix}$

f)  $m = \widehat{0}$ ,  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \widehat{0} & \widehat{0} & \widehat{1} \\ \widehat{0} & \widehat{1} & \widehat{1} \\ \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{0} \end{pmatrix}$

**AL 284** Fie polinomul  $P = 4X^3 + 3X^2 + 2X + 1$ . Să se determine polinomul  $Q$  astfel încât să fie îndeplinită condiția

$$P(x) = Q(x) + 2Q'(x) + 3Q''(x) + 4Q'''(x),$$

oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}$ .

a)  $4X^3 + 3X^2 + 2X + 1$

b)  $4X^3 - 21X^2 + 2X + 1$

c)  $4X^3 - 21X^2 + 14X + 3$

d)  $4X^3 - 7X^2 + 21X + 12$

e)  $4X^3 + 2X^2 + 3X + 1$

f)  $-4X^3 + 12X^2 + 13X - 1$

**AL 285** Fie polinoamele  $f = X^3 + 2X^2 - X - 5$  și  $g = X^2 + 1$ . Să se determine câtul  $c$  și restul  $r$  ale împărțirii lui  $f$  la  $g$ .

a)  $c = X + 2$ ,  $r = 0$

b)  $c = X^2 + 1$ ,  $r = X + 2$

c)  $c = X + 2$ ,  $r = -2X - 7$

d)  $c = -2X - 7$ ,  $r = X + 2$

e)  $c = X + 1$ ,  $r = -2$

f)  $c = X - 1$ ,  $r = 0$

**AL 286** Fie polinomul  $f = X^3 - 2X^2 + aX + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ . Să se determine  $a$  și  $b$  știind că  $-1$  este rădăcină a polinomului  $f$  și restul împărțirii polinomului  $f$  la  $X - 2$  este  $6$ . Să se găsească apoi restul împărțirii lui  $f$  la  $X^2 - X - 2$ .

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| a) $a = 1, b = 4, X + 1$  | b) $a = -1, b = 4, 2X + 2$ |
| c) $a = 1, b = 4, 2X + 2$ | d) $a = -1, b = 2, 2X + 1$ |
| e) $a = 1, b = 2, X + 2$  | f) $a = -1, b = 4, X - 1$  |

**AL 287** Să se determine  $a, b, c \in \mathbb{R}$  astfel încât restul împărțirii polinomului  $f = X^3 + aX^2 + bX + c$  la  $X^2 + 2$  să fie  $X + 1$  și restul împărțirii lui  $f$  la  $X + 1$  să fie  $3$ .

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| a) $a = 3, b = 2, c = 5$  | b) $a, b, c \in \emptyset$               |
| c) $a = -2, b = 3, c = 5$ | d) $a = 2, b = 3, c = 5$                 |
| e) $a = 3, b = 2, c = -5$ | f) $b = 3, c = 2a + 1, a \in \mathbb{R}$ |

**AL 288** Se consideră polinomul  $f = X^6 + aX^5 + bX^4 + cX^3 + aX^2 + bX + c$ , unde  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Să se determine  $a, b, c$  pentru care polinomul  $f$  se divide cu polinomul  $g = X^5 - 5X^3 + 4X$ .

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| a) $a, b, c \in \emptyset$ | b) $a, b, c \in \mathbb{R}$ |
| c) $a = b = c = 0$         | d) $a = c = 1, b = -1$      |
| e) $a = c = -1, b = 1$     | f) $a = 1, b = -5, c = 4$   |

**AL 289** Să se determine polinomul cu coeficienți raționali de grad minim care împărțit la  $X^2 + 2X - 3$  dă restul  $3X + 11$  și împărțit la  $X^2 - 4X + 5$  dă restul  $7X - 3$ .

- |                     |                    |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| a) $-X^3 - 4X + 12$ | b) $X^3 + 2X - 17$ | c) $-X^3 + 4X + 11$ |
| d) $X^3 - 4X + 17$  | e) $X^3 + 3X + 15$ | f) $-X^3 + 17X - 5$ |

**AL 290** Se consideră polinoamele

$$f = (X - 2014)(X - 2016) \text{ și } g = (X - 2015)^{2014} + X - 2001.$$

Să se determine restul împărțirii lui  $g$  la  $f$ .

- |               |                      |               |
|---------------|----------------------|---------------|
| a) $X$        | b) 0                 | c) $X - 2000$ |
| d) $X + 2014$ | e) $2016 \cdot 2014$ | f) $X - 2016$ |

**AL 291** Să se determine parametrii reali  $a, b, c$  astfel încât polinomul  $f = (X - 1)^7 + a(X - 1)^4 + bX + c$  să se dividă cu  $(X + 1)^3$ .

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a) $a = 28, b = 448, c = 128$ | b) $a = 56, b = 448, c = 576$ |
| c) $a = 56, b = 320, c = 81$  | d) $a = 28, b = 448, c = 192$ |
| e) $a = 84, b = 320, c = 81$  | f) $a = 28, b = 320, c = 128$ |

**AL 292** Să se determine parametrii reali  $m$  și  $n$  astfel încât polinomul  $X^9 + mX^2 + n$  să se dividă cu polinomul  $X^2 + X + 1$ .

- |                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| a) $m = 0, n = 0$   | b) $m = 0, n = -1$ | c) $m = -1, n = 0$ |
| d) $m = -1, n = -1$ | e) $m = 1, n = 0$  | f) $m = 0, n = 1$  |

**AL 293** Să se determine restul împărțirii polinomului  $X^n$  la polinomul  $X^2 + 2X - 3$ .

- |   |   |
|---|---|
| a) $\frac{1 - (-3)^n}{4}X + \frac{3 + (-3)^n}{4}$ | b) $\frac{1}{4}[(1 + (-3)^n)X + 3 + (-3)^n]$      |
| c) $\frac{1 - (-3)^n}{4}X + \frac{3 - (-3)^n}{4}$ | d) $\frac{2 - (-3)^n}{4}X + \frac{3 + (-3)^n}{4}$ |
| e) $\frac{1 - (-3)^n}{4}X + \frac{3 + 3^n}{4}$    | f) $\frac{1}{4}[(1 + 3^n)X + 3 + (-3)^n]$         |

**AL 294** Să se determine restul împărțirii polinomului  $(X^3 + X + 1)^{19}$  la polinomul  $X^2 - X + 1$ .

- a)  $-1$       b)  $X$       c)  $X + 1$       d)  $0$       e)  $X - 1$       f)  $1$

**AL 295** Să se determine parametrul  $a \in \mathbb{R}$  și să se rezolve ecuația

$$x^4 + ax^3 + 4x^2 - 6x + 4 = 0,$$

știind că are rădăcini opuse.

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| a) $a = -3, \{1, 2, \pm\sqrt{2}i\}$ | b) $a = -1, \{\pm 1, \pm 2\}$        |
| c) $a = 2, \{1, 2, \pm 2i\}$        | d) $a = -2, \{1 \pm i, \pm 1\}$      |
| e) $a = -1, \{\pm 2, \pm i\}$       | f) $a = -3, \{\pm 1, \pm\sqrt{2}i\}$ |

**AL 296** Fie polinomul  $f = X^4 + a^2X^3 - 7X^2 + aX + 6$ . Să se determine mulțimea tuturor valorilor întregi ale lui  $a$  astfel încât  $f$  să aibă o rădăcină întreagă impară.

- |  |                 |                                     |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| a) $\emptyset$                         | b) $\mathbb{R}$ | c) $\left\{-1, \frac{8}{9}\right\}$ |
| d) $\left\{-1, 0, \frac{8}{9}\right\}$ | e) $\{-1, 0\}$  | f) $\{-1\}$                         |

**AL 297** Fie polinomul  $f = X^3 + X^2 - 2X - 2$ . Să se determine descompunerea lui  $f$  în factori ireductibili în  $\mathbb{Q}[X]$ .

- |  |  |
|--|--|
| a) $(X + 1)(X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})$ | b) $(X - 1)(X^2 + 2)$                    |
| c) $(X + 1)(X^2 - 2)$                    | d) $(X - 1)(X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})$ |
| e) $(X + 1)(X - 2)(X + 2)$               | f) $(X + 1)(X^2 + 2)$                    |

**AL 298** Să se descompună în factori ireductibili peste  $\mathbb{Z}_5$  polinomul

$$f = X^4 + \widehat{2}X^3 + \widehat{4}X + \widehat{3} \in \mathbb{Z}_5[X].$$

- |  |  |
|--|--|
| a) $(X + \widehat{4})^2(X^2 + X + \widehat{1})$            | b) $(X + \widehat{4})(X + \widehat{2})(X^2 + \widehat{1})$     |
| c) $(X + \widehat{2})(X + \widehat{3})^2(X + \widehat{1})$ | d) $(X + \widehat{2})(X + \widehat{3})(X^2 + \widehat{1})$     |
| e) $(X + \widehat{2})^2(X^2 + X + \widehat{1})$            | f) $(X + \widehat{2})(X + \widehat{4})(X^2 + X + \widehat{1})$ |

**AL 299** Fie polinomul  $f = (1 - 2X)^{2017} + (3X - 2)^{2017}$ . Să se calculeze suma coeficienților polinomului  $f$ .

- a) 2017      b) 4034      c) 0      d)  $2^{2017}$       e)  $3^{2017}$       f)  $(-1)^{2017}$

**AL 300** Să se determine  $a, b \in \mathbb{R}$  astfel încât ecuația

$$x^4 + 5x^3 + ax^2 + 2x + b = 0$$

să admită soluția  $1 + i$  și să se găsească celelalte soluții.

- |  |  |
|--|--|
| a) $a = -6, b = 12, \{1 - i, -1, -6\}$ | b) $a = -3, b = 6, \{1 - i, 1 + i, -1\}$ |
| c) $a = 12, b = -6, \{1 - i, 1, 12\}$  | d) $a = 6, b = -12, \{1 + i, -1, -3\}$   |
| e) $a = -6, b = 12, \{1 - i, -1, 6\}$  | f) $a = 4, b = 6, \{1 + i, 1, 6\}$       |

**AL 301** Fie  $P \in \mathbb{R}[X]$  având coeficientul dominant 1. Știind că

$$xP(x - 1) = (x - 3)P(x),$$

pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ , să se determine  $P(5)$ .

- a) 0      b) 10      c) 20      d) 30      e) 50      f) 60

**AL 302** Fie polinomul  $P = X^3 + mX^2 + nX - a^3$ , unde  $m, n \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}^*$ . Știind că  $P(a - x) + P(a + x) = 0$ , pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ , să se determine  $P(2017)$ .

- a) 0      b)  $a$       c)  $(2017 - a)^3$       d)  $2017^3$       e)  $a^3$       f) 2017

**AL 303** Polinoamele cu coeficienți reali  $aX^2 + bX + c$ ,  $aX^3 + bX^2 + bX + a$  și  $aX^3 + cX^2 + cX + a$ ,  $a \neq 0$ , admit o rădăcină comună dacă și numai dacă:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| a) $a, b, c \in \mathbb{R}$  | b) $a + b + c = 0, b \neq c$    |
| c) $a - b + c = 0, b \neq c$ | d) $a + b - c = 0$              |
| e) $-a + b + c = 0$          | f) $-a + b + c = 0, a \neq b$ . |

**AL 304** Fie polinoamele  $P = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$  și  $Q = aX + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ . Să se calculeze suma soluțiilor ecuației  $P(Q(x)) = 0$ .

- |      |                  |                       |                  |                      |      |
|------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------|
| a) 0 | b) $\frac{a}{b}$ | c) $\frac{6 - 3b}{a}$ | d) $\frac{b}{a}$ | e) $\frac{1 - b}{a}$ | f) 1 |
|------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------|

**AL 305** Fie polinoamele  $P$  și  $Q$  cu proprietatea  $P(x) = Q(x) + Q(1 - x)$ . Știind că  $P$  are coeficienți naturali și  $P(0) = 0$ , să se determine  $P(P(3))$ .

- |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| a) 0 | b) 1 | c) 2 | d) 3 | e) 4 | f) 5 |
|------|------|------|------|------|------|

**AL 306** Fie polinoamele  $P$  și  $Q \in \mathbb{C}[X]$  cu proprietatea

$$P(x) = Q(x) + Q(1 - x),$$

pentru orice  $x \in \mathbb{C}$ . Știind că  $P$  are coeficientul dominant 1, gradul cel mult 5 și rădăcinile  $-1$  și  $0$ , să se determine  $P(3)$ .

- |       |      |       |          |          |      |
|-------|------|-------|----------|----------|------|
| a) 60 | b) 0 | c) 24 | d) $-24$ | e) $-60$ | f) 1 |
|-------|------|-------|----------|----------|------|

**AL 307** Fie polinomul  $P \in \mathbb{R}[X]$  cu proprietatea  $P(x) = -P(-x)$ , iar restul împărțirii lui  $P$  la  $X - 7$  este 3. Să se determine restul împărțirii lui  $P$  la  $X^2 - 7X$ .

- |                  |                   |                  |                  |      |                   |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------|-------------------|
| a) $\frac{7}{3}$ | b) $\frac{3}{7}X$ | c) $\frac{7}{3}$ | d) $\frac{7}{3}$ | e) 0 | f) $-\frac{3}{7}$ |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------|-------------------|

**AL 308** Fie polinomul  $P = X^4 - \sqrt{3}mX + n$ ,  $m, n \in \mathbb{Q}$ . Să se determine valorile parametrilor  $m, n$ , știind că restul împărțirii lui  $P(X+2)$  la  $X+1$  este  $3 - \sqrt{3}$ .

- |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| a) $m = 0, n = 1$ | b) $m = 1, n = 1$ | c) $m = 1, n = 2$ |
| d) $m = 2, n = 1$ | e) $m = 2, n = 2$ | f) $m = 1, n = 0$ |

**AL 309** Știind că polinomul  $P = X^3 + pX + q$  are rădăcinile  $x_1, x_2, x_3$ , să se determine valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} x_1 - x_1x_2x_3 & x_2 - x_1x_2x_3 & x_3 - x_1x_2x_3 \\ x_2 - x_1x_2x_3 & x_3 - x_1x_2x_3 & x_1 - x_1x_2x_3 \\ x_3 - x_1x_2x_3 & x_1 - x_1x_2x_3 & x_2 - x_1x_2x_3 \end{vmatrix}.$$

- |        |        |         |          |                  |                  |
|--------|--------|---------|----------|------------------|------------------|
| a) $p$ | b) $q$ | c) $pq$ | d) $9pq$ | e) $\frac{p}{q}$ | f) $\frac{q}{p}$ |
|--------|--------|---------|----------|------------------|------------------|

**AL 310** Dacă polinoamele  $f_i \in \mathbb{C}[X]$ ,

$$f_i = \sum_{k=1}^3 a_{ik} X^{k-1}, \quad i = \overline{1, 3},$$

au o rădăcină comună, să se găsească valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

- |   |  |
|---|--|
| a) $-1$   | b) $(a_{12} - a_{23})(a_{13} - a_{32})(a_{23} - a_{31})$ |
| c) $3a_{11}a_{22}a_{33} - a_{12} - a_{23} - a_{31}$ | d) $0$   |
| e) $1$  | f) $a_{12}a_{23}a_{31}$                                  |

**AL 311** Să se calculeze valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \end{vmatrix},$$

unde  $x_i$ ,  $i = \overline{1, 3}$  sunt soluțiile ecuației  $x^3 - x^2 - 11 = 0$ .

- |         |        |        |         |          |        |
|---------|--------|--------|---------|----------|--------|
| a) $-1$ | b) $0$ | c) $1$ | d) $11$ | e) $-11$ | f) $2$ |
|---------|--------|--------|---------|----------|--------|

**AL 312** Fie ecuația  $x^3 - ax + a^2 = 0$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , cu soluțiile  $x_1, x_2, x_3$ . Să se determine valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix}.$$

- a) 0      b)  $-a^2$       c)  $a^2$       d)  $2a^2$       e)  $-3a^2$       f)  $-2a^2$

**AL 313** Știind că  $x_1, x_2, x_3$  sunt soluțiile ecuației  $3x^3 - 17x - 15 = 0$ , să se calculeze determinantul

$$\begin{vmatrix} x_1x_2 + x_3 & x_1 + x_2 & -x_1x_2 \\ x_2x_3 + x_1 & x_2 + x_3 & -x_2x_3 \\ x_3x_1 + x_2 & x_3 + x_1 - x_2 & x_2 - x_3x_1 \end{vmatrix}.$$

- a) 0      b) 3      c)  $-17$       d)  $\frac{17}{3}$       e) 7      f)  $-5$

**AL 314** Se consideră ecuația  $x^3 - 4x^2 + 10 = 0$  cu soluțiile  $x_1, x_2, x_3$  și determinantul

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix}.$$

Să se determine valoarea lui  $\Delta^2$ .

- a) 140      b) 36      c) 144      d)  $-140$       e)  $-36$       f)  $-144$

**AL 315** Să se calculeze valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1i & a_1 - b_1i & b_1 - c_1 \\ a_2 + b_2i & a_2 - b_2i & b_2 - c_2 \\ a_3 + b_3i & a_3 - b_3i & b_3 - c_3 \end{vmatrix},$$

unde  $a_k, b_k, c_k$  sunt soluțiile ecuației  $x^3 + \alpha_k = 0$ ,  $\alpha_k \in \mathbb{C}$ ,  $k = \overline{1, 3}$ .

- a)  $(a_1 + b_1)(b_2 + c_2)(c_3 + a_3)$       b)  $a_1 b_2 c_3$   
 c) 0      d) 1  
 e)  $a_1 + a_2 + a_3 + i(c_1 + c_2 + c_3)$       f)  $(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)(b_3 - c_3)$

**AL 316** Fie  $f = X + a$  și  $g = X^2 + bX + c$  cu  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Să se determine valoarea minimă a lui

$$\Delta(x) = \begin{vmatrix} 1 & f(2) & g(2) \\ 1 & f(3) & g(3) \\ 1 & f(x) & g(x) \end{vmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- a)  $\frac{5}{2}$       b) 0      c)  $-\frac{1}{4}$       d)  $-(a + b + c)^2$       e) 1      f)  $abc$

**AL 317** Suma soluțiilor comune ale ecuațiilor

$$x^5 - 5x^4 + 3x^3 + 11x^2 - 6x - 4 = 0,$$

$$x^5 - 5x^4 + 6x^3 + 2x^2 - 12x + 8 = 0$$

este:

- a) 1      b) 0      c)  $2\sqrt{5}$       d) 3      e)  $1 + \sqrt{5}$       f)  $\sqrt{5}$

**AL 318** Fie  $P \in \mathbb{R}[X]$  polinomul de grad minim care satisface simultan condițiile:

- (i)  $P + 1$  este divizibil cu  $(X - 1)^3$ ;  
 (ii)  $P - 1$  este divizibil cu  $(X + 1)^3$ .

Să se calculeze  $P(0)$ .

- a) 1      b) -1      c) 0      d) 2017      e) -2017      f) 2

**AL 319** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție injectivă. Să se determine suma coeficienților polinomului  $P \in \mathbb{R}[X]$  care satisface relația

$$-2x + 4 + 5f(x + 2) = 4f(3x - 2) + f(2x - 7P(x - 1)),$$

pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

- a) 1      b) 2      c) 0      d) -1      e) -2      f) 3

**AL 320** Fie  $x_1, x_2, x_3, x_4$  soluțiile ecuației  $x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0$ . Dacă  $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_4$ , atunci ele verifică relația:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| a) $x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = -2$ | b) $x_i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, i = \overline{1, 4}$ |
| c) $x_1x_2 + x_3 - 2x_4 = -2$    | d) $x_1x_2x_3 - x_4 = -2$   |
| e) $x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = -2$ | f) $x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 = -2$ .                                |

**AL 321** Fie polinomul  $f = X^3 - mX^2 + 2X + 3$ ,  $m \in \mathbb{R}$ , cu rădăcinile  $x_1, x_2, x_3$ . Să se determine multimea valorilor parametrului  $m$  pentru care are loc relația

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}.$$

- |                |            |            |   |   |  |
|----------------|------------|------------|---|---|--|
| a) $\emptyset$ | b) $\{1\}$ | c) $\{0\}$ | d) $\left\{ \pm \sqrt{\frac{10}{3}} \right\}$ | e) $\left\{ \pm \sqrt{\frac{3}{10}} \right\}$ | f) $\left\{ \pm \frac{10}{3} \right\}$ |
|----------------|------------|------------|---|---|--|

**AL 322** Fie polinomul  $f = X^4 - 5X^3 + 2X^2 - 3X + 1$  cu rădăcinile  $x_1, x_2, x_3$  și  $x_4$ . Să se calculeze valoarea expresiei

$$\frac{1}{2-x_1} + \frac{1}{2-x_2} + \frac{1}{2-x_3} + \frac{1}{2-x_4}.$$

- |      |      |       |                    |                    |                     |
|------|------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) 0 | b) 1 | c) 23 | d) $\frac{21}{23}$ | e) $\frac{23}{21}$ | f) $-\frac{21}{23}$ |
|------|------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|

**AL 323** Fie polinomul  $f = X^3 + 5X + 3$  cu rădăcinile  $x_1, x_2, x_3$ . Să se determine polinomul care are ca rădăcini pe  $x_1^2, x_2^2, x_3^2$ .

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| a) $X^3 + 15X^2 + 10X - 7$ | b) $X^3 - 5X^2 + 25X + 5$  |
| c) $X^3 + 10X^2 + 25X - 9$ | d) $X^3 - 10X^2 - 5X + 3$  |
| e) $X^3 + 15X^2 - 5X + 5$  | f) $X^3 - 10X^2 + 25X - 9$ |

**AL 324** Să se afle  $a, b, c \in \mathbb{R}$  știind că soluțiile ecuației

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 64 = 0$$

sunt numere naturale în progresie geometrică cu rația număr natural.

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $a = 5, b = 67, c = 100$   | b) $a = -15, b = 70, c = -120$ |
| c) $a = 15, b = 70, c = 120$  | d) $a = -5, b = 67, c = 100$   |
| e) $a = 15, b = -70, c = 120$ | f) $a = 5, b = -67, c = -100$  |

**AL 325** Câte polinoame de forma  $P(X) = X^2 + aX + b, a, b \in \mathbb{R}$ , au proprietatea că rădăcinile lor satisfac condițiile  $x_1^3 = x_2$  și  $x_2^3 = x_1$ ?

- |             |                 |         |
|-------------|-----------------|---------|
| a) niciunul | b) 100          | c) 4    |
| d) 1000     | e) o infinitate | f) unul |

**AL 326** Fie polinomul  $P(X) = X^3 + aX^2 + bX + c, a, b, c \in \mathbb{R}$ , cu rădăcinile  $x_1, x_2, x_3$  simple. Să se determine valoarea expresiei

$$x_1P'(x_1) + x_2P'(x_2) + x_3P'(x_3).$$

- |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| a) 0                | b) $9c - a^2 + 2ab$ | c) $2ab - a^3 - 9c$ |
| d) $4ab - 9c - a^3$ | e) $9c + a^2 - 4ab$ | f) $c - a + bc$     |

**AL 327** Împărțind polinomul  $X^8$  la  $X - 1$  se obține câtul  $q_1$  și restul  $r_1$ , împărțind polinomul  $q_1$  la  $X - 1$  se obține câtul  $q_2$  și restul  $r_2$ , iar continuând procedeul și definind recursiv polinoamele  $q_{k+1}$  și restul  $r_{k+1}$  ca fiind, respectiv, câtul și restul împărțirii lui  $q_k$  la  $X - 1$ , pentru orice  $k \in \{1, 2, \dots, 7\}$ , să se determine  $r_5$ .

- |      |      |      |       |        |        |
|------|------|------|-------|--------|--------|
| a) 1 | b) 2 | c) 7 | d) 70 | e) 100 | f) 700 |
|------|------|------|-------|--------|--------|

**AL 328** Fie  $\alpha, \beta, \gamma$  soluțiile ecuației  $x^3 + 3x^2 - 24x + 1 = 0$ . Să se determine  $\sqrt[3]{\alpha} + \sqrt[3]{\beta} + \sqrt[3]{\gamma}$ .

- |       |                   |      |                  |      |       |
|-------|-------------------|------|------------------|------|-------|
| a) -3 | b) $-\frac{1}{3}$ | c) 0 | d) $\frac{1}{3}$ | e) 3 | f) 27 |
|-------|-------------------|------|------------------|------|-------|

## PROBLEME DE TRIGONOMETRIE ȘI GEOMETRIE PLANĂ (simbol TG)

**TG 1** Să se calculeze  $\sin^2 120^\circ - \cos^2 30^\circ$ .

- a)  $-\sqrt{3}$       b)  $-\sqrt{2}$       c)  $-1$       d)  $0$       e)  $1$       f)  $\sqrt{3}$

**TG 2** Fie  $x \in (0, \pi)$  astfel încât  $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Să se determine  $\operatorname{tg} x$ .

- a)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       b)  $1$       c)  $\sqrt{3}$       d)  $-\sqrt{3}$       e)  $-1$       f)  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

**TG 3** Se consideră expresia  $E(x) = \sin \frac{x}{2} + \cos x$ , unde  $x \in \mathbb{R}$ . Să se calculeze  $E\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ .

- a)  $1$       b)  $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$       c)  $\sqrt{3}$       d)  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$       e)  $0$       f)  $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

**TG 4** Valoarea lui  $a \in (0, \pi)$  pentru care  $2 \cos(\pi - a) - 1 = 0$  este:

- a)  $\frac{\pi}{6}$       b)  $\frac{\pi}{3}$       c)  $\frac{2\pi}{3}$       d)  $\frac{5\pi}{6}$       e)  $\frac{7\pi}{12}$       f)  $\frac{5\pi}{12}$ .

**TG 5** Să se calculeze  $\sin(2x)$  știind că  $\sin x = \frac{1}{2}$  și  $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ .

- a)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$       b)  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$       c)  $-\frac{1}{2}$       d)  $1$       e)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       f)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

**TG 6** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin(2x)$ . Dacă  $f(a) = \frac{1}{3}$ , atunci  $f\left(a + \frac{\pi}{2}\right)$  este:

- a)  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$       b)  $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$       c) 1      d) -1      e)  $\frac{2}{3}$       f)  $-\frac{1}{3}$ .

**TG 7** Să se rezolve ecuația trigonometrică

$$\cos x = -\cos 40^\circ,$$

unde  $x \in (0, 360^\circ)$ .

- a)  $x \in \{140^\circ, 220^\circ\}$       b)  $x \in \{135^\circ, 200^\circ\}$       c)  $x \in \{135^\circ, 315^\circ\}$   
 d)  $x \in \{45^\circ, 315^\circ\}$       e)  $x \in \{125^\circ, 320^\circ\}$       f)  $x \in \{135^\circ, 345^\circ\}$

**TG 8** Se consideră următoarele propoziții matematice:

- (i)  $\sin 144^\circ = \cos 54^\circ$ ;      (ii)  $\cos 2018^\circ = -\cos 38^\circ$ ;  
 (iii)  $\operatorname{tg}^2 15^\circ = \frac{1 - \cos 30^\circ}{1 + \cos 30^\circ}$ ;      (iv)  $\sin^2 5^\circ + \sin^2 45^\circ + \sin^2 85^\circ = \frac{3}{2}$ ;  
 (v)  $(\operatorname{ctg} 10^\circ - \operatorname{ctg} 80^\circ) \cos 70^\circ = 2 \sin 110^\circ$ .

Câte dintre afirmațiile date sunt false?

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 3      e) 4      f) 5

**TG 9** Care dintre numerele:

$$a = \cos 55^\circ, b = \sin 155^\circ, c = \sin 15^\circ, d = \cos 170^\circ, e = \cos 100^\circ, f = \sin 106^\circ$$

este cel mai aproape de zero?

- a)  $a$       b)  $b$       c)  $c$       d)  $d$       e)  $e$       f)  $f$

**TG 10** Să se calculeze  $\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b$ , dacă  $a, b \in (0, \pi) \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$  astfel încât  $\cos a + \cos b = 0$ .

- a)  $\operatorname{tg}(a+b) + 1$     b) 1    c)  $2\operatorname{tg} a$     d) 0    e) -1    f)  $2\operatorname{tg} b$

**TG 11** Dacă  $\sin a = \frac{3}{5}$ ,  $a \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , atunci  $\cos \frac{a}{2}$  este egal cu:

- a)  $\frac{4}{5}$     b)  $-\frac{4}{5}$     c)  $\frac{\sqrt{5}}{5}$     d)  $\frac{\sqrt{10}}{10}$     e)  $-\frac{\sqrt{5}}{5}$     f)  $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ .

**TG 12** Fie  $x$  un număr real pentru care  $\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 2$ . Să se calculeze  $\operatorname{tg} x$ .

- a)  $\frac{1}{3}$     b)  $-\frac{1}{3}$     c) 1    d) -1    e) 3    f) -3

**TG 13** Să se calculeze  $\cos \frac{3a}{2}$ , știind că  $\sin \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$  și  $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ .

- a)  $\frac{\sqrt{6}}{3}$     b)  $-\frac{\sqrt{6}}{3}$     c)  $\frac{5\sqrt{3}}{9}$     d)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$     e)  $-\frac{\sqrt{6}}{9}$     f)  $\frac{\sqrt{6}}{9}$

**TG 14** Să se determine partea întreagă a numărului  $\operatorname{tg} \frac{7\pi}{12} + \operatorname{ctg} \frac{5\pi}{12}$ .

- a) -4    b) -3    c) -1    d) 3    e) 4    f) 5

**TG 15** Fie  $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$  astfel ca  $\operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 2$ . Să se calculeze  $\sin x$ .

- a)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$     b)  $\frac{1}{2}$     c)  $\frac{\sqrt{10}}{10}$     d)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$     e)  $\frac{1}{3}$     f)  $\frac{1}{4}$

**TG 16** Să se determine valoarea maximă a expresiei

$$E(x) = \sin\left(\pi x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\pi x + \frac{\pi}{6}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- a) 2      b)  $\frac{1+\sqrt{3}}{3}$       c)  $\sqrt{3}$       d)  $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$       e) 1      f)  $\frac{3}{2}$

**TG 17** Să se calculeze  $\sin^8 \frac{\pi}{8} + \cos^8 \frac{\pi}{8}$ .

- a)  $\frac{17}{32}$       b)  $\frac{3}{16}$       c)  $\frac{3}{8}$       d)  $\frac{7}{32}$       e)  $\frac{7}{16}$       f)  $\frac{19}{32}$

**TG 18** Să se calculeze  $\sin^4 \frac{\pi}{16} + \sin^4 \frac{3\pi}{16} + \sin^4 \frac{5\pi}{16} + \sin^4 \frac{7\pi}{16}$ .

- a)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       b) 1      c)  $\frac{3}{2}$       d)  $\frac{1}{2}$       e)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       f)  $\sqrt{3}$

**TG 19** Fie  $E(x) = \cos^6 x + \sin^6 x$  definită pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ . Să se determine raportul dintre valoarea maximă și valoarea minimă a expresiei.

- a) 1      b)  $\sqrt{2}$       c) 2      d) 4      e) 7      f) 8.

**TG 20** Fie  $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$  astfel ca  $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 3$ . Să se calculeze  $\sin x - \cos x$ .

- a)  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$       b)  $-\frac{1}{3}$       c)  $\frac{1}{3}$       d)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       e)  $-\frac{\sqrt{15}}{3}$       f)  $\frac{\sqrt{15}}{3}$

**TG 21** Să se calculeze  $\cos 8x$  știind că  $\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} 2x = \operatorname{ctg} 2x \cdot \operatorname{ctg} 3x$ .

- a) -1      b)  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$       c) 0      d)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       e) 1      f)  $\frac{1}{2}$

**TG 22** Să se calculeze  $\cos(x + 2y)$  știind că  $x = \frac{4\pi}{3}$  și  $\operatorname{tg} y = 2 - \sqrt{3}$ .

- a)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       b)  $\frac{1}{3}$       c)  $-\frac{1}{2}$       d)  $\frac{1}{2}$       e) 0      f)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

**TG 23** Fie  $a$  și  $b$  două numere reale astfel încât

$$\sin a + \sin b = 1 \text{ și } \cos a + \cos b = \frac{1}{2}.$$

Să se calculeze  $\cos(a - b)$ .

- a)  $\frac{3}{8}$       b)  $-\frac{3}{8}$       c)  $\frac{1}{8}$       d)  $-\frac{1}{8}$       e)  $\frac{1}{2}$       f)  $-\frac{1}{2}$

**TG 24** Fie funcția  $f(x) = \cos x - \sin x$ . Să se determine cea mai mică valoare a lui  $f$  pe intervalul  $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ .

- a)  $-1$       b)  $-3$       c)  $-\sqrt{3}$       d)  $-\sqrt{2}$       e)  $-\frac{1}{2}$       f)  $-2$

**TG 25** Fie  $f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ . Să se determine imaginea funcției  $f$ .

- a)  $(-1, \sqrt{3}]$       b)  $(-1, 2]$       c)  $[-1, 2]$   
 d)  $(-\sqrt{3}, 1]$       e)  $[-1, \sqrt{3}]$       f)  $(-\sqrt{3}, 1)$

**TG 26** Într-un triunghi dreptunghic  $ABC$  au loc relațiile  $\cos B > \cos C$  și  $\operatorname{tg} B + \operatorname{tg} C = 6$ . Să se calculeze  $\sin B - \sin C$ .

- a)  $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$       b)  $-\frac{\sqrt{6}}{3}$       c)  $-\sqrt{2}$       d)  $\sqrt{2}$       e)  $\frac{\sqrt{6}}{3}$       f)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

**TG 27** Fie triunghiul  $ABC$  cu  $AB = 4$  și  $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$  astfel încât latura  $(BC)$  are cea mai mică valoare posibilă. Dacă punctul  $P$  este egal depărtat de laturile triunghiului, să se calculeze  $AP$ .

- a)  $\sqrt{3}$       b) 2      c)  $2\sqrt{2}$       d) 3      e)  $2\sqrt{3}$       f) 1

**TG 28** Lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic în care între catete există relația  $c - b = 1$ , iar  $m(\widehat{C}) - m(\widehat{B}) = 30^\circ$ , este:

- a)  $\sqrt{3} + 1$       b) 3      c)  $3\sqrt{3}$       d)  $3\sqrt{3} - 1$       e)  $3 + \sqrt{3}$       f)  $2\sqrt{3}$ .

**TG 29** Fie triunghiul  $ABC$  de laturi  $a, b, c$  cu  $b = 5$ ,  $c = 8$  și  $\cos A = \frac{1}{4}$ . Să se afle  $a$ .

- a)  $\sqrt{69}$       b)  $\sqrt{109}$       c)  $\sqrt{89}$       d) 89      e) 109      f) 69

**TG 30** Fie triunghiul  $PQR$  cu  $PQ = 4$ ,  $QR = 5$  și  $RP = 7$ . Să se determine  $\cos(\widehat{PQR})$ .

- a)  $\frac{29}{35}$       b)  $-\frac{1}{5}$       c)  $\frac{1}{7}$       d)  $\frac{4}{7}$       e)  $\frac{5}{7}$       f)  $-\frac{4}{7}$

**TG 31** În triunghiul  $ABC$ ,  $AB = 4\sqrt{3}$ ,  $AC = 4$ ,  $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . Să se calculeze  $\sin B$ .

- a)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       b)  $\frac{1}{2}$       c) 1      d)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       e)  $\frac{1}{3}$       f)  $\frac{\sqrt{2}}{3}$

**TG 32** Aria triunghiului  $ABC$  este  $10 \text{ m}^2$ . Să se determine  $AB$  știind că  $AC = 4 \text{ m}$  și unghiul  $\widehat{BAC}$  are  $30^\circ$ .

- a)  $\frac{10}{3} \text{ m}$       b) 5 m      c)  $\frac{10\sqrt{3}}{3} \text{ m}$       d) 10 m      e) 20 m      f) 8 m

**TG 33** Într-un cerc cu raza de  $4\text{ cm}$  se înscrie un triunghi  $ABC$  ce are unghiul  $\widehat{ABC}$  de  $30^\circ$ . Să se determine lungimea laturii  $[AC]$ .

- a)  $2\text{ cm}$     b)  $3\text{ cm}$     c)  $4\text{ cm}$     d)  $4\sqrt{3}\text{ cm}$     e)  $3\sqrt{3}\text{ cm}$     f)  $2\sqrt{3}\text{ cm}$

**TG 34** Fie triunghiul  $ABC$  cu  $AB = 2\sqrt{3}$ ,  $AC = 6$  și  $\tg A = -\sqrt{2}$ . Să se determine  $BC$ .

- a)  $6\sqrt{2}$     b)  $2\sqrt{6}$     c)  $3\sqrt{2}$     d)  $3\sqrt{3}$     e)  $3\sqrt{6}$     f)  $6\sqrt{3}$

**TG 35** Fie triunghiul  $ABC$  cu  $AB = 3$ ,  $BC = 8$ ,  $CA = 7$  și punctul  $P \in (BC)$  astfel încât  $BP = 6$ . Să se calculeze  $AP$ .

- a)  $\frac{8\sqrt{3}}{3}$     b)  $\frac{7\sqrt{3}}{2}$     c)  $3\sqrt{3}$     d)  $5$     e)  $3\sqrt{7}$     f)  $4\sqrt{3}$

**TG 36** Triunghiul ascuțitunghic  $ABC$  are  $AB = 6$ ,  $AC = 8$  și aria egală cu  $16\sqrt{2}$ . Să se determine  $\sin C$ .

- a)  $\frac{2\sqrt{34}}{17}$     b)  $\frac{4\sqrt{39}}{39}$     c)  $\frac{2\sqrt{42}}{21}$     d)  $\frac{4\sqrt{37}}{37}$     e)  $\frac{\sqrt{2}}{17}$     f)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

**TG 37** Un triunghi are aria  $2\sqrt{3}$ , perimetru  $12$  și un unghi de  $60^\circ$ . Să se afle lungimea razei cercului circumscris triunghiului.

- a)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$     b)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$     c)  $\sqrt{3}$     d)  $\frac{4\sqrt{3}}{3}$     e)  $\frac{5\sqrt{3}}{3}$     f)  $2\sqrt{3}$

**TG 38** Se consideră punctele  $A, B, C$  astfel încât  $AB = 5$ ,  $AC = 8$  și  $m(\widehat{BAC}) = 60^\circ$ . Să se calculeze lungimea minimă pe care o poate avea un segment  $[AP]$  atunci când  $P$  este un punct variabil pe dreapta  $BC$ .

- a)  $5$     b)  $7 - \sqrt{3}$     c)  $\frac{20}{7}$     d)  $\frac{20\sqrt{3}}{7}$     e)  $\frac{20}{\sqrt{89} + 40\sqrt{3}}$     f)  $4$

**TG 39** În triunghiul  $ABC$  de arie  $3\sqrt{15}$ , suma pătratelor lungimilor laturilor este egală cu 116. Să se calculeze  $\operatorname{ctg} A + \operatorname{ctg} B + \operatorname{ctg} C$ .

- a)  $\frac{29\sqrt{15}}{45}$     b)  $\frac{29\sqrt{5}}{3}$     c)  $\frac{29\sqrt{3}}{5}$     d)  $\frac{3\sqrt{29}}{5}$     e)  $\frac{29\sqrt{5}}{45}$     f)  $\frac{5\sqrt{29}}{3}$

**TG 40** Se consideră triunghiul  $ABC$  cu  $AB = \sqrt{3}$ ,  $AC = \sqrt{2}$  și  $m(\widehat{A}) = \frac{\pi}{3}$ . Să se determine lungimea bisectoarei  $(AD)$ ,  $D \in (BC)$ , a unghiului  $\widehat{BAC}$ .

- a)  $3 - \sqrt{6}$     b)  $\sqrt{2} - 6$     c)  $\sqrt{6} - 2$   
d)  $3\sqrt{6} - 6$     e)  $\sqrt{6} - 6$     f)  $3\sqrt{6} - 3$

**TG 41** Se consideră triunghiul  $ABC$  cu perimetrul

$$\mathcal{P} = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{6}$$

și măsurile unghiurilor direct proporționale cu numerele 3, 4, 5. Să se afle aria triunghiului  $ABC$ .

- a)  $\sqrt{6} + \sqrt{2}$     b)  $\sqrt{6} + 3$     c)  $\sqrt{3} + 3$   
d)  $4\sqrt{3}$     e)  $3\sqrt{3} + 3$     f)  $6 + \sqrt{2}$

**TG 42** Se consideră triunghiul  $ABC$  de laturi  $a, b, c$ , în care  $m(\widehat{C}) = \frac{3\pi}{8}$ , iar  $m(\widehat{B}) = \frac{\pi}{8}$ . Să se calculeze  $E = 4\frac{c^2}{a^2} - \frac{b}{c}$ .

- a)  $\sqrt{2}$     b) 3    c)  $\sqrt{2} + 3$     d) 4    e)  $3\sqrt{3} + 3$     f)  $\sqrt{2} - 1$

**TG 43** Triunghiul  $ABC$  are o latură de 9 cm și perimetrul de 50 cm. Să se calculeze aria maximă pe care o poate avea triunghiul.

- a)  $90 \text{ cm}^2$     b)  $120 \text{ cm}^2$     c)  $120\sqrt{2} \text{ cm}^2$   
d)  $200 \text{ cm}^2$     e)  $400 \text{ cm}^2$     f)  $300\sqrt{2} \text{ cm}^2$

**TG 44** În triunghiul  $ABC$ ,  $AB = 2\sqrt{3}BC$  și  $m(\widehat{C}) = m(\widehat{A}) + 30^\circ$ . Să se calculeze  $\sin B$ .

- a) 1      b)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       c)  $\frac{1}{3}$       d)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       e)  $\frac{11}{14}$       f)  $\frac{2}{3}$

**TG 45** Fie  $G$  centrul de greutate al triunghiului echilateral  $ABC$  ce are aria egală cu 18. Se notează cu  $\mathcal{M}_G$  mulțimea punctelor din interiorul triunghiului situate mai aproape de  $G$  decât de oricare dintre vârfurile triunghiului. Să se calculeze aria mulțimii  $\mathcal{M}_G$ .

- a) 6      b)  $6\sqrt{3}$       c) 9      d)  $9\sqrt{3}$       e) 12      f) 15

**TG 46** Fie triunghiul  $ABC$  cu  $CA = 2 \cos 15^\circ \cdot BC$  și  $m(A) = m(B) - 15^\circ$ . Să se determine  $\cos C$ .

- a)  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$       b)  $\frac{1}{2}$       c)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       d)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$       e)  $-\frac{1}{2}$       f)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

**TG 47** Triunghiul obtuzunghic  $ABC$  are laturile  $AC = 3$  și  $BC = 7$ , iar aria sa este egală cu  $4\sqrt{5}$ . Să se determine  $\sin B$ .

- |  |  |  |
|--|--|--|
| a) $\frac{2}{7}, \frac{4\sqrt{5}}{21}$ | b) $\frac{4}{7}, \frac{2\sqrt{5}}{21}$       | c) $\frac{2}{3}, \frac{4}{7}$                |
| d) $\frac{4}{21}, \frac{\sqrt{5}}{3}$  | e) $\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{2\sqrt{5}}{7}$ | f) $\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{8\sqrt{5}}{7}$ |

**TG 48** Fie hexagonul regulat  $ABCDEF$  cu  $AD \cap BE = \{O\}$ . Se consideră afirmațiile:

- |  |   |
|--|---|
| <i>(i)</i> $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF} = \vec{0}$ ; | <i>(ii)</i> $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB}$ ;   |
| <i>(iii)</i> $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OF} = \vec{0}$ ;   | <i>(iv)</i> $\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{FO} = \overrightarrow{FA}$ ;   |
| <i>(v)</i> $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \vec{0}$ ;   | <i>(vi)</i> $\overrightarrow{CE} = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ . |

Câte dintre afirmațiile de mai sus sunt corecte?

- a) 2      b) 3      c) 4      d) 5      e) 6      f) 1

**TG 49** Asupra unui corp punctiform acționează două forțe cu aceeași origine, una de  $8N$  și cealaltă de  $7N$ . Să se calculeze mărimea forței rezultante, știind că unghiul dintre cele două forțe este de  $60^\circ$ .

- a)  $13N$       b)  $\sqrt{41}N$       c)  $\sqrt{111}N$   
d)  $15N$       e)  $\sqrt{113 + 56\sqrt{3}}N$       f)  $14N$

**TG 50** În triunghiul echilateral  $ABC$  de latură 3, punctele  $P$  și  $Q$  împart latură  $(BC)$  în trei părți egale. Dacă  $G$  este centrul de greutate al triunghiului  $ABC$ , să se calculeze lungimea vectorului  $\overrightarrow{GP} + \overrightarrow{GQ}$ .

- a)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       b)  $\sqrt{3}$       c) 2      d)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$       e)  $2\sqrt{3}$       f)  $3\sqrt{3}$

**TG 51** În pătratul  $ABCD$  cu latura de 6, punctele  $M$  și  $N$  aparțin laturii  $(BC)$  astfel încât  $\frac{BM}{MC} = \frac{BN}{BC} = \frac{1}{2}$ . Să se calculeze lungimea vectorului  $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN}$ .

- a) 12      b)  $4\sqrt{10}$       c)  $\frac{25}{2}$       d) 13      e)  $8\sqrt{3}$       f)  $9\sqrt{2}$

**TG 52** Fie  $M$  mijlocul laturii  $[BC]$  a triunghiului  $ABC$ . Pe laturile  $[AB]$  și  $[AC]$  fie respectiv punctele  $D$  și  $E$  astfel ca  $AB = 3 \cdot AD$  și  $AC = 2 \cdot AE$ , iar  $\{F\} = AM \cap DE$ . Să se determine valoarea parametrului real  $k$  pentru care

$$k \cdot \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

- a) 1      b) 2      c) 5      d) 0      e) -1      f) 4

**TG 53** Fie  $G$  centrul de greutate al triunghiului neechilateral  $ABC$ , iar  $H$  ortocentrul său. Să se determine valoarea parametrului real  $k$  pentru care

$$\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = k \cdot \overrightarrow{HG}.$$

- a) 1      b) 2      c) 5      d) 3      e) -1      f) -3.

**TG 54** În sistemul cartezian de axe de coordonate se consideră punctele  $O(0,0)$ ,  $A(6,0)$ ,  $B(6,4)$  și  $M$  mijlocul segmentului  $[AB]$ . Dacă  $\overrightarrow{OM} = a\vec{i} + b\vec{j}$ , atunci  $a + b$  este:

- a) 8      b) 10      c) 4      d) 7      e) 9      f) 6

**TG 55** Fie vectorii  $\vec{u} = \vec{i} + (a+1)\vec{j}$ ,  $\vec{v} = -b\vec{i} + 4\vec{j}$ ,  $\vec{w} = (2a+4)\vec{i} - 4b\vec{j}$ , unde  $a, b \in \mathbb{R}$ . Dacă  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$ , calculați  $a - b$ .

- a) -2      b) -1      c) 0      d) 1      e) 2      f) 3

**TG 56** Fie vectorii coliniari  $\vec{u} = \vec{i} + (a+1)\vec{j}$ ,  $\vec{v} = -b\vec{i} + 4\vec{j}$ ,  $\vec{w} = (2a+2)\vec{i} - 4\vec{j}$ , unde  $a, b \in \mathbb{R}$ . Calculați  $a + b$ .

- a) -2      b) -1      c) 0      d) 1      e) 2      f) 3

**TG 57** Se consideră vectorii  $\overrightarrow{PA} = 4\vec{i} + \vec{j}$ ,  $\overrightarrow{PB} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$ , respectiv  $\overrightarrow{PC} = \vec{i} + a\vec{j}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ . Să se determine valoarea lui  $a$  pentru care punctele  $A, B, C$  sunt coliniare.

- a)  $\frac{1}{2}$       b) 2      c)  $\frac{5}{2}$       d)  $-\frac{1}{2}$       e) 1      f) 3

**TG 58** Să se calculeze perimetrul triunghiului  $ABC$ , știind că  $M(1,1)$ ,  $N(5,-1)$ ,  $P(3,5)$  sunt mijloacele laturilor sale.

- |                |                     |                             |
|----------------|---------------------|-----------------------------|
| a) $4\sqrt{5}$ | b) $12\sqrt{5}$     | c) $8\sqrt{5} + 4\sqrt{10}$ |
| d) 30          | e) $8\sqrt{5} + 12$ | f) $6\sqrt{5} + 14$         |

**TG 59** Fie triunghiul  $ABC$  cu  $A(1, 3)$ ,  $B(-2, -4)$ ,  $C(5, -1)$  și dreapta  $d$  de ecuație  $x - y - 2 = 0$ . Atunci:

- a)  $A \in d$
- b)  $d \perp BC$
- c)  $d \cap [AB] = \emptyset$
- d)  $d$  este bisectoarea unghiului  $ABC$
- e)  $d \parallel BC$
- f) niciunul dintre răspunsurile anterioare nu este adevărat.

**TG 60** Fie punctele  $A(1, 1)$ ,  $B(2, \frac{1}{2})$ ,  $C(-1, -4)$ ,  $D(\frac{5}{2}, 3)$ ,  $P(a, b)$ , unde  $a, b \in \mathbb{R}$ . Să se calculeze  $a \cdot b$  știind că punctele  $A, B, P$ , respectiv  $C, D, P$  sunt coliniare.

- a)  $\frac{28}{25}$
- b)  $\frac{10}{9}$
- c)  $\frac{21}{16}$
- d)  $\frac{11}{10}$
- e) 1
- f) 2

**TG 61** Se dau punctele  $A(2, 3)$ ,  $B(-1, 2)$  și  $C(3, 6)$ . Fie  $y = mx + n$  ecuația medianei dusă din  $A$  în triunghiul  $ABC$ . Să se calculeze  $m + n$ .

- a) 6
- b) 4
- c) -6
- d) -4
- e) 3
- f) -3

**TG 62** Punctul  $P(\frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3})$ , situat pe cercul trigonometric, se rotește în sens trigonometric în jurul originii cu  $90^\circ$ . Fie  $(a, b)$  coordonatele sale după rotire. Să se calculeze  $\log_4 \left| \frac{a}{b} \right|$ .

- a)  $-\frac{3}{4}$
- b)  $\frac{3}{4} - \log_2 3$
- c)  $\log_2 3 - \frac{3}{4}$
- d)  $\frac{3}{4}$
- e)  $\log_4 3$
- f)  $\log_2 3$

**TG 63** Se dă triunghiul  $ABC$  cu  $A(-1, 3)$ ,  $B(-2, -4)$ ,  $C(2, 6)$ . Să se calculeze distanța de la punctul  $O(0, 0)$  la punctul de intersecție dintre dreapta suport a medianei din  $A$  cu dreapta suport a înălțimii din  $B$ .

- a)  $2\sqrt{65}$
- b)  $\sqrt{218}$
- c)  $3\sqrt{34}$
- d) 16
- e)  $8\sqrt{5}$
- f)  $8\sqrt{6}$

**TG 64** Pornind din punctul  $A$  de coordonate  $(6, -1)$ , un punct mobil notat  $P$  se îndepărtează cu viteză constantă de acesta, echidistant față de dreapta  $d : x + 2y + 2 = 0$ , traversând primul cadran. Să se calculeze distanța parcursă de  $P$  între cele două axe de coordonate.

- a)  $\frac{9}{2}$       b)  $2\sqrt{5}$       c) 4      d)  $\frac{\sqrt{89}}{2}$       e)  $3\sqrt{2}$       f)  $2\sqrt{6}$

**TG 65** Se consideră punctele  $A(-1, 0)$ ,  $B(2, 3)$ ,  $C(-3, -4)$ ,  $D(4, 3)$ . Pe dreapta  $CD$  se alege punctul  $P$  astfel ca  $m(\widehat{APC}) = m(\widehat{BPD})$ . Să se calculeze distanța de la  $P$  la originea sistemului de axe de coordonate.

- a)  $\sqrt{3}$       b)  $\frac{8}{5}$       c)  $\frac{2 + \sqrt{2}}{2}$       d)  $\frac{3}{2}$       e)  $\frac{\sqrt{10}}{2}$       f)  $\frac{5}{3}$

**TG 66** Să se calculeze distanța dintre dreptele paralele  $d_1 : 3x + 4y - 10 = 0$  și  $d_2 : y = mx + 5$ , unde  $m \in \mathbb{R}$ .

- a) 1      b)  $\frac{3}{2}$       c) 2      d)  $\frac{5}{2}$       e) 3      f)  $2\sqrt{2}$

**TG 67** Fie punctele  $A(0, 4)$  și  $B(4, 0)$ . Punctul  $C(a, b)$  aparține segmentului  $[AB]$  astfel ca  $\frac{AC}{CB} = \frac{AB}{AC}$ . Să se calculeze  $a - b$ .

- a)  $\frac{3}{4}$       b)  $4\sqrt{5} - 8$       c)  $\frac{4}{3}$       d) 1      e)  $2\sqrt{2} - 2$       f)  $2\sqrt{5} - 4$

**TG 68** Fie trapezul dreptunghic  $ABCD$  cu  $AB \parallel CD$ ,  $DA \perp AB$ ,  $AB = 6$ ,  $AD = CD = 3$ . Dacă  $M$  este mijlocul lui  $(AB)$  și  $N \in (DC)$  cu  $CN = 1$ , la ce distanță de  $A$  se intersectează dreptele  $MN$  și  $BC$ ?

- a)  $\frac{3\sqrt{10}}{2}$       b)  $\frac{9}{2}$       c)  $2\sqrt{5}$       d)  $\frac{24}{5}$       e)  $\frac{47}{10}$       f) 5

**TG 69** Prin simetricul punctului  $A(-2, 3)$  față de punctul  $B(1, 2)$  se duce o dreaptă  $d$  paralelă cu prima bisectoare. Să se calculeze distanța de la punctul  $A$  la dreapta  $d$ .

- a)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       b)  $\sqrt{2}$       c)  $2\sqrt{2}$       d)  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$       e)  $4\sqrt{2}$       f) 5

**TG 70** Fiecărui număr natural  $n$  i se asociază punctul  $P_n$  de coordonate  $\left(\cos \frac{n\pi}{3}, \sin \frac{n\pi}{3}\right)$ . Câte drepte ce conțin cel puțin două din punctele considerate pot fi construite?

- a) 3      b) 6      c) 15      d) 30      e) 45      f) o infinitate

**TG 71** Fie  $O(0, 0)$ ,  $A(-1, 4)$ ,  $B(5, 1)$ . Să se afle coordonatele punctului  $C$  astfel ca simetricul lui față de dreapta  $AB$  să fie centrul de greutate al triunghiului  $AOB$ .

- |  |  |  |
|--|--|--|
| a) $\left(\frac{34}{15}, \frac{53}{15}\right)$ | b) $(2, 3)$                                | c) $\left(\frac{11}{5}, \frac{18}{5}\right)$ |
| d) $\left(\frac{7}{3}, \frac{11}{3}\right)$    | e) $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$ | f) $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$   |

**TG 72** Un punct din primul cadran situat pe o dreaptă  $d$  se numește *bine plasat* dacă distanța de la el la origine este un număr natural. Câte puncte *bine plasate* conține dreapta  $d : 2x + y - 4\sqrt{2} = 0$ ?

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 3      e) 4      f) 5

**TG 73** Fie  $P$  punctul egal depărtat de laturile triunghiului  $ABC$ , unde  $A(1, 1)$ ,  $B(4, 5)$  și  $C(5, 4)$ . Să se calculeze distanța de la  $P$  la dreapta  $AB$ .

- a)  $\frac{4}{7}$       b)  $\frac{1}{2}$       c)  $\frac{10 + \sqrt{2}}{7}$       d)  $\frac{10 + \sqrt{2}}{14}$       e)  $\frac{10 - \sqrt{2}}{14}$       f)  $\frac{2}{3}$

**TG 74** Fie  $A(2, 0)$ ,  $B(0, 4)$  și  $C(5, a)$  astfel încât triunghiul  $ABC$  este isoscel de bază  $AB$ . Dacă  $O(x_o, y_o)$  este centrul cercului circumscris triunghiului  $ABC$ , să se determine  $x_o - y_o$ .

- a)  $-1$       b)  $-\frac{1}{4}$       c)  $\frac{1}{2}$       d)  $\frac{4}{5}$       e)  $1$       f)  $0$

**TG 75** Fie punctele  $A(1, 3)$ ,  $B(3, 5)$  și  $C(c, c)$ ,  $c \in \mathbb{R} \setminus \{0, 3\}$ . Dacă  $\{P\} = CA \cap Ox$ ,  $\{Q\} = CB \cap Oy$ , să se determine coeficientul unghiular al dreptei  $PQ$ .

- a)  $1$       b)  $2$       c)  $-\frac{9}{2}$       d)  $\frac{1}{2}$       e)  $-1$       f)  $c$

**TG 76** Fie  $A(3, 0)$ ,  $B(0, 3)$  și fie  $C(a, b)$  pe dreapta  $x + y = 8$  astfel încât triunghiul  $ABC$  este isoscel de bază  $AB$ . Dacă  $H(x_0, y_0)$  este ortocentrul triunghiului  $ABC$ , să se determine  $x_0 + y_0$ .

- a)  $\frac{24}{5}$       b)  $\frac{16}{7}$       c)  $\frac{17}{3}$       d)  $\frac{12}{5}$       e)  $6$       f)  $4$

**TG 77** Fie  $A$  un punct variabil pe dreapta  $y = x + 1$ , iar  $B$  proiecția lui  $A$  pe dreapta de ecuație  $x = 3$ . Atunci mijlocul segmentului  $(AB)$  aparține dreptei:

- a)  $x = y$       b)  $y = 2x$       c)  $x + y = 1$   
 d)  $y = 2x - 2$       e)  $x + y = 2$       f)  $y = x + 1$ .

**TG 78** Pe laturile  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$  ale triunghiului de vârfuri  $A(4, 0)$ ,  $B(3, 0)$  și  $C(1, 4)$ , se consideră respectiv punctele  $M$ ,  $N$ ,  $P$  astfel încât

$$\frac{MA}{MB} = 3, \quad \frac{NB}{NC} = 2, \quad \frac{PC}{PA} = \frac{1}{6}.$$

Să se studieze dacă dreptele  $AN$ ,  $BP$  și  $CM$  sunt concurente și în caz afirmativ să se găsească coordonatele punctului de concurență.

- a) nu sunt concurente      b)  $\left(\frac{19}{10}, \frac{12}{5}\right)$       c)  $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$   
d)  $\left(\frac{10}{7}, \frac{24}{7}\right)$       e)  $\left(\frac{4}{3}, 2\right)$       f)  $\left(2, \frac{10}{3}\right)$

**TG 79** Pe laturile  $AB$  și  $BC$  ale triunghiului de vârfuri  $A(3, 0)$ ,  $B(0, 4)$  și  $C(2, 5)$  se consideră respectiv punctele  $M$ , și  $N$  astfel încât

$$\frac{MA}{MB} = a, \quad \frac{NB}{NC} = b, \quad a, b > 0.$$

Pentru ce valori ale lui  $a$  și  $b$  distanțele de la punctul  $I$ , de intersecție a dreptelor  $AN$  și  $CM$ , la cele trei laturi ale triunghiului  $ABC$  sunt egale între ele?

- a)  $a = 2\sqrt{5}$ ,  $b = 1$       b)  $a = \frac{\sqrt{130}}{5}$ ,  $b = \frac{5\sqrt{26}}{26}$       c)  $a = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ ,  $b = 1$   
d)  $a = 2$ ,  $b = 2$       e)  $a = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ,  $b = 2$       f)  $a = \sqrt{5}$ ,  $b = 1$

**TG 80** Simetrica dreptei  $d : y = 2 - x$  față de punctul  $A(2, -3)$  intersectează axele de coordonate în punctele  $P$  și  $Q$ . Să se calculeze aria triunghiului  $POQ$ .

- a) 8      b) 16      c) 6      d) 4      e) 10      f) 9

**TG 81** Se consideră punctele  $A(1, 0)$  și  $C(3, 1)$ . Dacă  $(AC)$  este o diagonală a patratului  $ABCD$ , să se afle coordonatele vâfurilor  $B$  și  $D$ .

- a)  $\left(\frac{12}{5}, -\frac{3}{5}\right), \left(\frac{7}{5}, \frac{7}{5}\right)$       b)  $\left(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right), \left(\frac{5}{3}, \frac{5}{3}\right)$       c)  $\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$   
d)  $\left(\frac{7}{3}, -\frac{1}{3}\right), \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$       e)  $\left(\frac{13}{5}, -\frac{11}{20}\right), \left(\frac{8}{5}, \frac{29}{20}\right)$       f)  $(2, -1), (1, 1)$

**TG 82** Se consideră dreptele concurente  $d_1 : x + 2y - 9 = 0$ ,  $d_2 : x - 2y + 3 = 0$  și  $d_3 : 2x + ay - 3 = 0$ ,  $a \in \mathbb{R}$ . O dreaptă  $d$  ce trece prin punctul  $O(0, 0)$  intersectează dreptele  $d_1, d_2, d_3$  respectiv în punctele distincte  $A, B, C$ . Să se afle panta dreptei  $d$  astfel ca  $(AB) \equiv (BC)$ .

- a)  $\frac{1}{2}$       b) 1      c)  $-\frac{1}{2}; 1$       d)  $-\frac{11}{2}$       e)  $-1$       f)  $-\frac{11}{2}; 1$

**TG 83** Se dau punctele  $A(4, 0)$  și  $B(0, 2)$ . Fie  $M, N$  proiecțiile punctului  $P$ , mijlocul segmentului  $(AB)$ , pe  $Ox$ , respectiv  $Oy$ . Dacă  $Q$  este punctul de intersecție al perpendicularei în  $B$  pe dreapta  $AB$  cu dreapta  $MP$ , iar  $R$  punctul de intersecție al perpendicularei în  $A$  pe  $AB$  cu dreapta  $NP$ , să se calculeze aria patrulaterului  $ABQR$ .

- a)  $\frac{25}{2}$       b)  $\frac{23}{2}$       c) 10      d)  $\frac{5}{2}$       e) 25      f) 27

**TG 84** Prin punctul  $A$  de intersecție al dreptelor

$$d_1 : x + y - 2 = 0 \quad \text{și} \quad d_2 : 2x - y - 4 = 0$$

se duce o dreaptă  $d$  paralelă cu prima bisectoare. Fie  $P$  un punct oarecare al dreptei  $d$ , diferit de  $A$ . Să se arate că raportul distanțelor de la  $P$  la  $d_1$ , respectiv la  $d_2$  este constant și să se determine valoarea lui.

- a)  $\frac{10}{3}$       b) 3      c)  $\frac{13}{4}$       d)  $\sqrt{10}$       e)  $2\sqrt{5}$       f)  $2\sqrt{3}$

**TG 85** Fie punctele  $A(2, 1), B(6, 1), C(4, 5)$  și mulțimea  $\mathcal{M}_A$  a punctelor din primul cadran situate mai aproape de  $A$  decât de celelalte două puncte date. Să se calculeze aria mulțimii  $\mathcal{M}_A$ .

- a) 12      b) 13      c) 14      d)  $\frac{23}{2}$       e)  $\frac{25}{2}$       f)  $\frac{31}{2}$

**TG 86** Prin simetricul punctului  $A(4, 2)$  față de punctul  $B(-1, 1)$  se construiește o dreaptă  $d$  de pantă  $\frac{3}{2}$ . Perpendiculara în  $A$  pe dreapta  $AB$  intersectează  $d$  în punctul  $C$ . Să calculeze aria triunghiului  $ABC$ .

- a)  $\frac{49}{2}$       b) 13      c) 26      d)  $\frac{39}{2}$       e) 36      f)  $\frac{13}{2}$

**TG 87** Multimea punctelor  $P(x, y)$  aflate la distanță  $r$  de punctul  $Q(a, b)$  formează cercul de centru  $Q$  și rază  $r$ . Să se determine ecuația ce descrie acest cerc.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| a) $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ | b) $x^2 + y^2 - 2ax - 2ay - r^2 = 0$             |
| c) $(x + a)^2 + (y + b)^2 = r^2$ | d) $x^2 + y^2 + a^2 + b^2 - r^2 = 0$             |
| e) $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r$   | f) $x^2 + y^2 + 2ax + 2ay + a^2 + b^2 - r^2 = 0$ |

**TG 88** Se consideră punctele  $A(3, 0)$  și  $B(0, 4)$ . Fie punctul  $Q$  situat în interiorul triunghiului  $OAB$  aflat la distanță  $r$  de fiecare latură a acestuia. Să se determine care din următoarele ecuații este verificată de toate punctele  $P(x, y)$  ce se află la distanță  $r$  de punctul  $Q$ .

- |  |  |
|--|--|
| a) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$                 | b) $x^2 + y^2 - x - y - \frac{1}{2} = 0$ |
| c) $x^2 + y^2 - 2\sqrt{2}x - 2\sqrt{2}y + 3 = 0$ | d) $x^2 - y^2 - 2x - 2y = 0$             |
| e) $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$                 | f) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 1 = 0$         |

**TG 89** Să se determine  $m \in (0, \sqrt{10})$  pentru care există punctele  $N$  și  $P$  situate în primul cadran astfel încât  $ON = OP = \sqrt{10}$  și  $MNPQ$  este patrat, unde  $M(m, 0)$  și  $Q(0, m)$ .

- |                          |      |                          |               |      |               |
|--------------------------|------|--------------------------|---------------|------|---------------|
| a) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ | b) 1 | c) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ | d) $\sqrt{2}$ | e) 2 | f) $\sqrt{5}$ |
|--------------------------|------|--------------------------|---------------|------|---------------|

**TG 90** Se consideră punctul  $Q(1, 0)$  și cercul de ecuație

$$(x - 5)^2 + (y - 3)^2 = 100 .$$

Dacă punctul  $P_0(x_0, y_0)$  este situat pe cerc la distanță maximă de  $Q$  să se calculeze  $x_0 + y_0$ .

- |       |      |       |       |       |       |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| a) 12 | b) 0 | c) 14 | d) 16 | e) 24 | f) 22 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|

## PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

### (simbol AM)

**AM 1** Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} - 1}{x - 1}$ .

- a) 10      b) -9      c) 1      d) -1      e) 11      f) 9

**AM 2** Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2 - \ln(x^2 + 1)}{x^2}$ .

- a) 0      b)  $\frac{1}{2}$       c) 1      d) 2      e) -1      f)  $-\frac{1}{2}$

**AM 3** Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^x - 2^x}{2^x - 4}$ .

- a) -1      b) 1      c)  $\ln 2$       d)  $\frac{1}{\ln 2}$       e)  $\ln \sqrt{2}$       f)  $e$

**AM 4** Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^{12x} + 1)}{\ln(1 + e^{3x})}$ .

- a) 4      b) 3      c) 12      d)  $e^3$       e)  $+\infty$       f) 1

**AM 5** Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sqrt{\operatorname{tg} x}}{2 - \operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^3 x}$ .

- a)  $\frac{1}{2}$       b) 0      c)  $\frac{1}{4}$       d) 1      e)  $\frac{1}{8}$       f)  $-\frac{1}{2}$

**AM 6** Să se calculeze limita  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x + \pi}{x - \pi} \right)^x$ .

- a)  $e^{2\pi}$       b)  $e^2$       c)  $e^\pi$       d)  $\pi^2$       e)  $\pi$       f)  $e$

**AM 7** Să se calculeze  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^x$ .

- a) 0      b) 1      c)  $e$       d)  $\frac{1}{e}$       e)  $e^2$       f)  $-1$

**AM 8** Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1) - \cos x + e^{x^2}}{10x^2}$ .

- a)  $\frac{3}{2}$       b)  $\frac{1}{10}$       c)  $\frac{1}{4}$       d)  $\frac{1}{2}$       e)  $\frac{5}{2}$       f)  $\frac{5}{4}$

**AM 9** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin  $f(x) = e^x(\sin x - \cos x)$ . Să se studieze existența limitei  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a)  $-\infty$       b) 0      c)  $+\infty$       d)  $-1$       e) 1      f) nu există

**AM 10** Să se studieze existența limitei  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{\pi})^{\frac{1}{x}}$  și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a) 1      b)  $+\infty$       c)  $\pi$       d)  $\sqrt{\pi}$       e) 0      f) nu există

**AM 11** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \left( e^{\frac{1}{x^2+1}} - e^{\frac{1}{x^2}} \right)$$

și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a) 0      b) 1      c) -1      d) 2      e) nu există      f)  $2e$

**AM 12** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left[ \frac{x}{4} \right]}{x}$$

și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a) 0      b) 4      c)  $\frac{1}{4}$       d) 1      e) nu există      f) 2

**AM 13** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x \ln(e^x + 1))$$

și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a)  $+\infty$       b) 0      c) 1      d)  $-\infty$       e) -1      f) nu există

**AM 14** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})\sqrt{x}$$

și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a)  $\frac{1}{2}$       b) 0      c)  $+\infty$       d) nu există      e) 1      f) 2

**AM 15** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^4 + 1}{x^2 + 2} \ln \frac{x^2 + 1}{x^2} \right)$$

și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a) 0      b) 1      c) 2      d)  $e$       e) 3      f) nu există

**AM 16** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( x - \frac{x^3}{6} - \sin x \right)$$

și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a)  $-1$       b)  $-\frac{1}{6}$       c)  $0$       d) nu există      e)  $+\infty$       f)  $-\infty$

**AM 17** Să se determine valoarea parametrului real  $a$  pentru care

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln(e^x + a) - x)(e^x + x) = 1.$$

- a)  $e^{-1}$       b)  $0$       c)  $1$       d)  $e$       e)  $-1$       f)  $-e$

**AM 18** Să se determine mulțimea tuturor valorilor posibile ale parametrului  $a \geq 0$  pentru care limita

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^{\operatorname{tg} x} - e^{\sin x}}{x^a}$$

există și este un număr real nenul.

- a)  $\{1\}$       b)  $\{2\}$       c)  $\{3\}$       d)  $(2, +\infty)$       e)  $(0, 2)$       f)  $\{0, 3\}$

**AM 19** Să se calculeze

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 - 1} \right)^x.$$

- a)  $e$       b)  $e^3$       c)  $e^{-2}$       d)  $e^2$       e)  $1$       f)  $+\infty$

**AM 20** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$ . Să se calculeze

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( f(e^x) \right)^{\frac{1}{x}}.$$

- a) 0      b) 1      c)  $\frac{1}{e}$       d)  $e$       e)  $e^2$       f)  $\frac{1}{e^2}$

**AM 21** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$$

și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a) 0      b) nu există      c) 1      d)  $+\infty$       e) 3      f) 2

**AM 22** Fie funcția  $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \{x\}(1 - \{x\})^2$ , unde  $\{x\}$  este partea fractionară a lui  $x$ . Să se studieze existența limitei  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a) 0      b) 1      c) nu există      d)  $-1$       e) 2      f)  $\frac{3}{2}$

**AM 23** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2}}$ . Să se studieze existența limitei  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a) 1      b) 0      c)  $-1$       d)  $\frac{1}{2}$       e)  $+\infty$       f) nu există

**AM 24** Să se calculeze  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^{\operatorname{tg} x}$ .

- a) 0      b) 1      c)  $-1$       d)  $+\infty$       e)  $\frac{1}{2}$       f)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

**AM 25** Fie  $n \in \mathbb{N}^*$  fixat. Să se calculeze

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x - 1}.$$

- |                         |            |               |
|-------------------------|------------|---------------|
| a) 0                    | b) 1       | c) $n(n + 1)$ |
| d) $\frac{n(n + 1)}{2}$ | e) $n + 1$ | f) $n$        |

**AM 26** Să se determine parametrul real  $a > 0$  astfel încât

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = 32.$$

- |      |      |      |      |       |      |
|------|------|------|------|-------|------|
| a) 0 | b) 2 | c) 4 | d) 1 | e) 16 | f) 8 |
|------|------|------|------|-------|------|

**AM 27** Să se studieze existența limitei  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x - 1}{|x|}$  și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- |      |       |      |            |             |              |
|------|-------|------|------------|-------------|--------------|
| a) 1 | b) -1 | c) 0 | d) $\ln 9$ | e) $-\ln 9$ | f) nu există |
|------|-------|------|------------|-------------|--------------|

**AM 28** Să se studieze existența limitei  $\lim_{x \rightarrow \infty} (e^{-2x} \sin(x^2 + 1))$  și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- |      |      |      |       |       |              |
|------|------|------|-------|-------|--------------|
| a) 2 | b) 0 | c) 1 | d) -1 | e) -2 | f) nu există |
|------|------|------|-------|-------|--------------|

**AM 29** Fie  $n \in \mathbb{N}^*$ . Să se calculeze

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{n - (\cos x + \cos^2 x + \dots + \cos^n x)}{\sin^2 x}.$$

- |      |      |                         |              |                  |                         |
|------|------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| a) 0 | b) 1 | c) $\frac{n(n + 1)}{2}$ | d) $+\infty$ | e) $\frac{n}{2}$ | f) $\frac{n(n + 1)}{4}$ |
|------|------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------|

**AM 30** Să se calculeze  $\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} (26 - 5x)^{\frac{1}{x-5}}$ .

- a) 1      b)  $e^{-5}$       c) 0      d)  $e$       e)  $e^5$       f)  $e^{-1}$

**AM 31** Fie  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  funcția definită prin  $f(x) = (1 + x^2)^{-\frac{1}{x}}$ . Să se calculeze media aritmetică a următoarelor trei limite:

$$l_1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \quad l_2 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad \text{și} \quad l_3 = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x).$$

- a) 3      b)  $\frac{2}{3}$       c)  $\frac{1}{3}$       d)  $\frac{4}{3}$       e) 1      f)  $\frac{1}{6}$

**AM 32** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left[ \frac{1}{\ln x} \right],$$

unde  $[x]$  este partea întreagă a lui  $x$ , iar în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a) 0      b) 1      c)  $-\infty$       d)  $-1$       e)  $+\infty$       f) nu există

**AM 33** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{\ln |x|} \right\},$$

unde  $\{t\}$  este partea fracționară a lui  $t$ , iar în cazul în care aceasta există, să se determine valoarea sa.

- a)  $\frac{1}{2}$       b)  $-\frac{1}{2}$       c) 0      d) 1      e)  $\frac{1}{e}$       f)  $\frac{2}{e}$

**AM 34** Să se calculeze  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{xe^{-\frac{1}{x}}}{\operatorname{tg}^2 x}$ .

- a)  $+\infty$       b)  $\frac{1}{e}$       c) 1      d) 0      e)  $e$       f) -1

**AM 35** Fie  $a > 0$  fixat. Să se calculeze

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}.$$

- a)  $\frac{1}{\sqrt{a}}$       b)  $\frac{1}{2}$       c)  $\frac{1}{\sqrt{2a}}$       d)  $\frac{1}{\sqrt{2}a}$       e)  $\frac{1}{2\sqrt{a}}$       f)  $\frac{1}{2a}$

**AM 36** Să se calculeze

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^{2018}) - \ln^{2018}(1+x)}{x^{2019}}.$$

- a) 2018      b) 0      c) 1      d) 1009      e) 2017      f) 1010

**AM 37** Să se calculeze limita

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{12} - \sin^{12}(x)}{x^{14}}.$$

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 6      e) 12      f) 24

**AM 38** Se consideră funcția  $h : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(x) = \left( \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$ , unde  $a_1, a_2, \dots, a_n$  sunt numere naturale nenule și diferite de 1,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ . Să se studieze existența limitei  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$  și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a) 0      b)  $+\infty$       c) 1      d) nu există      e)  $a_1 a_2 \cdots a_n$       f)  $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$

**AM 39** Să se determine ecuația asimptotei spre  $-\infty$  la graficul funcției

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} - x.$$

a)  $y = 0$

b)  $y = \frac{1}{2}$

c)  $y = 2x - \frac{1}{2}$

d)  $y = -2x - \frac{1}{2}$

e)  $y = -2x + \frac{1}{2}$

f)  $y = 2x + \frac{1}{2}$

**AM 40** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \operatorname{arctg} x$ . Să se studieze existența asimptotelor la graficul funcției  $f$  și în cazul în care acestea există să se determine ecuațiile lor.

a)  $y = \frac{\pi}{2}x - 1$

b)  $y = -\frac{\pi}{2}x + 1$

c)  $y = \pm \frac{\pi}{2}x + 1$

d)  $y = \pm \frac{\pi}{2}x - 1$

e) nu există

f)  $y = \frac{\pi}{2}x$

**AM 41** Să se studieze existența asimptotei spre  $+\infty$  la graficul funcției

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt{x^2 + x \ln(e^x + 1)}$$

și în cazul în care aceasta există să se determine ecuația sa.

a)  $y = x + \frac{1}{2}$

b)  $y = \sqrt{2}x$

c)  $y = x + 1$

d)  $y = \sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}}{4}$

e) nu există

f)  $y = \sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}$

**AM 42** Să se studieze existența asimptotelor la graficul funcției

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x \ln x$$

și în cazul în care acestea există să se determine ecuațiile lor.

a)  $y = x$

b)  $y = x + 1$

c)  $y = 0$

d) nu există asimptote

e)  $x = 0$

f)  $x = 0$  și  $y = 0$

**AM 43** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x - \sin x$ . Să se studieze existența asimptotelor la graficul funcției  $f$  și în cazul în care acestea există să se determine ecuațiile lor.

- |                |            |              |
|----------------|------------|--------------|
| a) $y = 0$     | b) $y = x$ | c) nu există |
| d) $y = x + 1$ | e) $x = 0$ | f) $y = 2x$  |

**AM 44** Fie funcția  $f : [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{x}{x-1} + \frac{x}{x+1}$ . Să se determine ecuația asimptotei spre  $+\infty$  la graficul funcției  $f$ .

- |             |            |                                  |
|-------------|------------|----------------------------------|
| a) $y = 0$  | b) $y = 2$ | c) $y = 1$                       |
| d) $y = 2x$ | e) $y = x$ | f) toate răspunsurile sunt false |

**AM 45** Se consideră  $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{e^{ax}}{x+1}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Să se determine multimea tuturor valorilor parametrului  $a$  astfel încât  $y = 0$  să fie asimptotă orizontală spre  $-\infty$  la graficul funcției  $f$ .

- |                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| a) $(0, +\infty)$ | b) $\{1\}$        | c) $(-1, 2)$    |
| d) $\emptyset$    | e) $[0, +\infty)$ | f) $\mathbb{R}$ |

**AM 46** Se consideră  $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x - 2}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Să se determine toate valorile parametrilor reali  $a, b$  astfel încât  $y = x + 2$  să fie asimptotă oblică spre  $+\infty$  la graficul funcției  $f$ .

- |                    |                                       |                                      |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| a) $a = 0, b = -2$ | b) $a = 1, b = 0$                     | c) $a = 0, \forall b \in \mathbb{R}$ |
| d) $a = 0, b = 3$  | e) $a = -2, \forall b \in \mathbb{R}$ | f) $a = 0, b = 0$                    |

**AM 47** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{x^2 + 1}$ . Să se determine toate asimptotele la graficul funcției  $f$ .

- a)  $x = 0$  este asimptotă verticală
- b)  $y = x$  este asimptotă oblică spre  $+\infty$
- c)  $y = x$  este asimptotă oblică spre  $-\infty$
- d)  $y = 0$  este asimptotă orizontală spre  $+\infty$
- e)  $y = 0$  este asimptotă orizontală spre  $-\infty$
- f)  $y = 0$  este asimptotă orizontală spre  $\pm\infty$

**AM 48** Se consideră  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \arctg x, & \text{dacă } x \leq 0 \\ 1 + \sqrt{x}, & \text{dacă } x > 0. \end{cases}$$

Să se determine ecuația asimptotei spre  $-\infty$  la graficul funcției  $f$ .

- a)  $y = 0$
- b)  $y = x - 1$
- c)  $y = -\frac{\pi}{2}$
- d)  $y = -\frac{\pi}{2}x$
- e)  $y = -\frac{\pi}{4}$
- f)  $y = 2\pi x$

**AM 49** Să se determine asimptotele la graficul funcției  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = e^{\frac{1}{x}}.$$

- a)  $y = 1$  este asimptotă orizontală spre  $+\infty$   
 $x = 0$  este asimptotă verticală la dreapta
- b)  $y = 1$  este asimptotă orizontală spre  $-\infty$   
 $x = 0$  este asimptotă verticală la dreapta
- c)  $y = 1$  este asimptotă orizontală spre  $\pm\infty$   
 $x = 0$  este asimptotă verticală la stânga

- d)  $y = 1$  este asimptotă orizontală spre  $\pm \infty$   
 $x = 0$  este asimptotă verticală la dreapta
- e)  $y = 1$  este asimptotă orizontală spre  $+\infty$   
 $x = 0$  este asimptotă verticală la stânga
- f)  $y = 1$  este asimptotă orizontală spre  $-\infty$   
 $x = 0$  este asimptotă verticală la stânga

**AM 50** Să se determine asimptotele la graficul funcției

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt{4x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 2}.$$

- a)  $y = 2x, \quad y = -2x$       b)  $y = 1 + x, \quad y = -x$       c)  $y = 1 - x, \quad y = x$   
d)  $y = x, \quad y = -x$       e)  $y = 1 - x, \quad y = 1 + x$       f)  $y = 2x, \quad y = 1 - x$

**AM 51** Fie  $a > 0$  și funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{x}{e^x - a},$$

unde  $D \subset \mathbb{R}$  reprezintă domeniul maxim de definiție. Știind că funcția  $f$  nu are asimptote verticale, să se studieze existența altor asimptote la graficul funcției  $f$  și în cazul în care acestea există să se determine ecuațiile lor.

- a)  $y = 0, \quad y = -x$       b)  $y = 0$       c)  $y = 0, \quad y = x$   
d)  $y = 0, \quad y = x + 1$       e)  $y = 1, \quad y = x$       f) nu are asimptote

**AM 52** Fie funcția  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{2^x - x^2}{x - 2}$ , unde prin  $D$  s-a notat domeniul maxim de definiție. Să se determine ecuațiile asimptotelor la graficul funcției  $f$ .

- a)  $x + y + 2 = 0$       b)  $y = x - 2$       c)  $x = 2$   
d)  $y = 2 - x$       e)  $x = 2, \quad y = -x - 2$       f)  $y = \pm x + 2$

**AM 53** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x + \sqrt{|1 - x^2|}$ . Câte dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

$P_1$ :  $f$  nu admite asimptotă orizontală spre  $-\infty$ .

$P_2$ :  $f$  admite asimptotă oblică spre  $-\infty$ .

$P_3$ : Axa  $Ox$  este una dintre asimptotele funcției  $f$ .

$P_4$ :  $f$  admite cel puțin o asimptotă verticală, printre care dreapta de ecuație  $x = 1$ .

$P_5$ :  $f$  admite cel mult o asimptotă orizontală.

$P_6$ :  $f$  admite exact o asimptotă oblică, care este o dreaptă ce trece prin origine.

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 3      e) 4      f) 5

**AM 54** Fie  $f : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție continuă astfel încât dreapta de ecuație  $y = 2x$  este asimptotă oblică spre  $-\infty$  la graficul funcției  $f$ . Câte dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

$P_1$ : Dreapta de ecuație  $y = 2x$  este asimptotă oblică spre  $+\infty$  la graficul funcției  $f$ .

$P_2$ : Dreapta de ecuație  $y = -2x$  este asimptotă oblică spre  $+\infty$  la graficul funcției  $f$ .

$P_3$ : Nu se pune problema existenței asimptotei spre  $+\infty$  la graficul funcției  $f$ .

$P_4$ : Dreapta de ecuație  $y = 0$  este asimptotă orizontală spre  $-\infty$  la graficul funcției  $f$ .

$P_5$ : Dreapta de ecuație  $x = 0$  este asimptotă verticală la stânga la graficul funcției  $f$ .

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 3      e) 4      f) 5

**AM 55** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x|x|(1 - \cos x)$ . Să se studieze existența asimptotelor la graficul funcției  $f$  și în cazul în care acestea există, să se determine ecuațiile lor.

- |   |   |
|---|---|
| a) $y = -2$ este asimptotă spre $-\infty$         | b) $y = -\frac{x}{2}$ este asimptotă spre $-\infty$ |
| $y = 2$ este asimptotă spre $\infty$              | $y = \frac{x}{2}$ este asimptotă spre $\infty$      |
| $x = 0$ este asimptotă verticală                  | $x = 0$ este asimptotă verticală                    |
| c) $y = \frac{x}{2}$ este asimptotă spre $\infty$ | d) $y = -\frac{x}{2}$ este asimptotă spre $-\infty$ |
| $x = 0$ este asimptotă verticală                  | $y = \frac{x}{2}$ este asimptotă spre $\infty$      |
| e) $f$ nu admite asimptote                        | f) $y = -x + 2$ este asimptotă spre $-\infty$       |
|   | $y = x - 2$ este asimptotă spre $\infty$            |

**AM 56** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3} \left[ \frac{2}{x} \right], & \text{dacă } x \neq 0 \\ a, & \text{dacă } x = 0, \end{cases}$$

unde  $[x]$  reprezintă partea întreagă a lui  $x \in \mathbb{R}$ . Să se determine valoarea lui  $a \in \mathbb{R}$  pentru care funcția  $f$  este continuă în punctul  $x = 0$ .

- a) 0      b)  $-\frac{2}{3}$       c)  $\frac{2}{3}$       d) 1      e) 2      f)  $\frac{1}{3}$

**AM 57** Se consideră funcția  $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} e^{3x}, & \text{dacă } x \in [0, 1] \\ \frac{a \sin(x-1)}{x^2 - 5x + 4}, & \text{dacă } x \in (1, \pi]. \end{cases}$$

Să se determine  $a \in \mathbb{R}$  astfel încât funcția  $f$  să fie continuă pe  $[0, \pi]$ .

- a)  $2e^3$       b)  $-3e^2$       c)  $e$       d)  $3e^3$       e)  $-3e^3$       f) 0

**AM 58** Fie funcția  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{\pi}{x}, & \text{dacă } x \in (0, 1] \\ 0, & \text{dacă } x = 0. \end{cases}$$

Să se precizeze care dintre răspunsurile de mai jos este corect.

- a)  $f$  este continuă pe  $[0, 1]$
- b)  $f$  este discontinuă în punctul  $x = 0$
- c)  $f$  este discontinuă în punctul  $x = \frac{1}{2}$
- d)  $f$  are limită nenulă în punctul  $x = 0$
- e)  $f$  este discontinuă în punctul  $x = 1$
- f)  $f$  nu admite limită în punctul  $x = 0$

**AM 59** Să se studieze posibilitatea prelungirii prin continuitate a funcției<sup>3</sup>

$$f : \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \setminus \{\pi\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \ln \left| \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2}} \right|$$

în punctul  $\pi$ . În caz afirmativ, să se precizeze și expresia funcției prelungite  $\tilde{f}$ .

- a)  $f$  se prelungește prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$
- b)  $f$  se prelungește prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq \pi \\ 1, & x = \pi \end{cases}$
- c)  $f$  nu este prelungibilă prin continuitate în  $x = \pi$

---

<sup>3</sup>Fie  $f : (a, c) \cup (c, b) \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție continuă pe fiecare din intervalele  $(a, c)$  și  $(c, b)$ . Dacă  $l = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$  există și este finită atunci  $\tilde{f} : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $\tilde{f}(x) = f(x)$  pentru  $x \neq c$  și  $\tilde{f}(c) = l$  este o funcție continuă, numită prelungirea prin continuitate a lui  $f$ .

- d)  $f$  se prelungeste prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \cos x}{1 - \sin x}$
- e)  $f$  se prelungeste prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq \pi \\ \frac{1}{2}, & x = \pi \end{cases}$
- f)  $f$  se prelungeste prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$

**AM 60** Să se studieze posibilitatea prelungirii prin continuitate a funcției

$$f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{\sin(3 \arccos x)}{\sqrt{1 - x^2}}$$

în punctele  $a = -1$  și  $b = 1$ . În caz afirmativ, să se precizeze și expresia funcției prelungite  $\tilde{f}$ .

- a)  $f$  nu este prelungibilă prin continuitate la  $[-1, 1]$
- b)  $f$  se prelungeste prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \begin{cases} 3, & x = -1 \\ f(x), & x \in (-1, 1) \\ -3, & x = 1 \end{cases}$
- c)  $f$  se prelungeste prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (-1, 1) \\ -3, & x \in \{-1, 1\} \end{cases}$
- d)  $f$  se prelungeste prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (-1, 1) \\ 3\pi, & x \in \{-1, 1\} \end{cases}$
- e)  $f$  se prelungeste prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \begin{cases} -3, & x = -1 \\ f(x), & x \in (-1, 1) \\ 3, & x = 1 \end{cases}$
- f)  $f$  se prelungeste prin continuitate la  $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (-1, 1) \\ 3, & x \in \{-1, 1\} \end{cases}$

**AM 61** Fie funcția continuă  $f : [1, 100] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (a + \{x\})(b - \{x\})$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ , unde  $\{x\}$  reprezintă partea fracționară a lui  $x$ . Dacă  $\text{Im } f = [m, M]$ , să se determine  $M - m$ .

- a)  $\frac{1}{4}$       b)  $\frac{1}{2}$       c)  $a^2 + a$       d)  $ab$       e)  $\frac{a^2 + b^2}{2}$       f)  $\frac{(a + b)^2}{4}$

**AM 62** Se consideră funcțiile  $f, g : (0, e) \rightarrow \mathbb{R}$ , definite prin

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{dacă } x \in (0, 1) \\ x + 1, & \text{dacă } x \in [1, e) \end{cases}, \text{ respectiv } g(x) = \frac{f(\ln(x + 1))}{\ln(1 + f(x))}.$$

Dacă notăm cu

$$A = \{x \in (0, e) : g \text{ este discontinuă în } x\} \text{ și } S = \sum_{a \in A} a,$$

să se determine  $S$ .

- a) 1      b)  $1 + e$       c)  $1 - e$       d)  $e - 1$       e) 0      f)  $e$

**AM 63** Fie  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x^2 - 4x| \arcsin \frac{1}{\sqrt{x}}$ , unde  $D$  este domeniul maxim de definiție al funcției  $f$ . Să se determine multimea punctelor de continuitate ale funcției  $f$ .

- a)  $[1, 4)$       b)  $[1, 4]$       c)  $(0, \infty)$       d)  $[1, \infty)$       e)  $(1, \infty)$       f)  $[1, \infty) \setminus \{4\}$

**AM 64** Se consideră funcția  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \arcsin \frac{|x|}{1 + |x|}$ , unde  $D$  este domeniul maxim de definiție. Să se determine multimea  $C$  a punctelor de continuitate ale lui  $f$ , respectiv multimea  $D_1$  a punctelor de derivabilitate ale lui  $f$ .

- |   |   |
|---|---|
| a) $C = D_1 = (0, \infty)$              | b) $C = [0, \infty), D_1 = (0, \infty)$ |
| c) $C = D_1 = \mathbb{R}$               | d) $C = D_1 = \mathbb{R}^*$             |
| e) $C = \mathbb{R}, D_1 = \mathbb{R}^*$ | f) $C = [-1, 1], D_1 = (-1, 1)$         |

**AM 65** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} x + \ln x, & \text{dacă } x > 1 \\ x^2, & \text{dacă } x \leq 1. \end{cases}$$

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a)  $f$  este continuă și derivabilă doar pe  $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$
- b)  $f$  este continuă pe  $\mathbb{R}$  și derivabilă doar pe  $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$
- c)  $f$  este continuă pe  $\mathbb{R}$  și derivabilă pe  $\mathbb{R}$  cu  $2f(1) = f'(1)$
- d)  $f$  este continuă pe  $\mathbb{R}$  și derivabilă pe  $\mathbb{R}$  cu  $f(1) = f'(1)$
- e)  $f$  este continuă pe  $\mathbb{R}$  și derivabilă pe  $\mathbb{R}$  cu  $f(1) = 2f'(1)$
- f)  $f$  este continuă pe  $\mathbb{R}$  și derivabilă pe  $\mathbb{R}$  cu  $f(1) = -f'(1)$

**AM 66** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{|x-1|}{e^x}.$$

Să se studieze derivabilitatea funcției în punctul  $x_0 = 1$  și în caz afirmativ să se calculeze  $f'(1)$ .

- |   |  |
|---|--|
| a) $f$ este derivabilă și $f'(1) = \frac{1}{e}$ | b) $f$ este derivabilă și $f'(1) = -\frac{1}{e}$ |
| c) $f$ este derivabilă și $f'(1) = 0$           | d) $f$ nu este derivabilă în $x_0 = 1$           |
| e) $f$ este derivabilă și $f'(1) = e$           | f) $f$ este derivabilă și $f'(1) = -e$           |

**AM 67** Se consideră funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{\sin x^2}$ , unde  $D$  este domeniul maxim de definiție. Să se studieze derivabilitatea lui  $f$  în punctul  $x_0 = 0$ . În caz afirmativ să se determine  $f'(0)$ .

- |  |   |
|--|---|
| a) $f$ este derivabilă și $f'(0) = -1$ | b) $f$ este derivabilă și $f'(0) = 1$           |
| c) $f$ nu este derivabilă în $x_0 = 0$ | d) $f$ este derivabilă și $f'(0) = 0$           |
| e) $f$ este derivabilă și $f'(0) = 2$  | f) $f$ este derivabilă și $f'(0) = \frac{1}{2}$ |

**AM 68** Să se determine parametrii reali  $a, b$  astfel încât funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & \text{dacă } x \leq 2 \\ ax + b, & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$$

să fie derivabilă pe  $\mathbb{R}$ .

- |                              |                   |                              |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| a) $a = 4, b = 0$            | b) $a = 3, b = 0$ | c) $a \in \mathbb{R}, b = 5$ |
| d) $a = 3, b \in \mathbb{R}$ | e) $a = 4, b = 1$ | f) $a = -1, b = 4$           |

**AM 69** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} e^x(a \sin x + b \cos x), & \text{dacă } x < 0 \\ x\sqrt{x^2 + 1}, & \text{dacă } x \geq 0 \end{cases}.$$

Determinați parametrii reali  $a, b$  astfel încât funcția  $f$  să fie derivabilă pe  $\mathbb{R}$ .

- |                                      |                |                                      |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| a) $a = 1, \forall b \in \mathbb{R}$ | b) $a = b = 0$ | c) $\forall a \in \mathbb{R}, b = 0$ |
| d) $a = 1, b = 0$                    | e) $a = b = 1$ | f) nu există $a, b \in \mathbb{R}$ . |

**AM 70** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin  $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ . Să se determine multimea  $D_1$  a punctelor de derivabilitate ale funcției  $f$ .

- |  |  |  |
|--|--|--|
| a) $D_1 = \mathbb{R} \setminus (1, 2)$ | b) $D_1 = \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$   | c) $D_1 = \mathbb{R} \setminus \{1\}$    |
| d) $D_1 = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ | e) $D_1 = \mathbb{R} \setminus \{-1, -2\}$ | f) $D_1 = \mathbb{R} \setminus (-2, -1)$ |

**AM 71** Să se precizeze numărul punctelor unghiulare ale funcției

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt{\ln(x^2 + 1)}.$$

- |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| a) 0 | b) 1 | c) 2 | d) 3 | e) 4 | f) 5 |
|------|------|------|------|------|------|

**AM 72** Fie funcția  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}.$$

Determinați domeniul maxim de definiție  $D$  și domeniul de derivabilitate  $D_1$ .

- |  |   |
|--|---|
| a) $D = D_1 = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ | b) $D = (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$<br>$D_1 = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ |
| c) $D = D_1 = (-\infty, -1] \cup (1, +\infty)$ | d) $D = \mathbb{R} \setminus (-1, 1]$<br>$D_1 = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$    |
| e) $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$            | f) $D = D_1 = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$                                       |
| $D_1 = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$         |   |

**AM 73** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \min \{x^4, x^5, x^6, x^7\}$ . Dacă notăm

$$A = \{x \in \mathbb{R} : f \text{ nu este derivabilă în } x\},$$

atunci  $S = \sum_{x \in A} x^2$  este:

- a) 1      b) 2      c) 3      d) 0      e) 4      f) 5

**AM 74** Să se calculeze derivata funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , unde  $f(x) = (x^2 + 1)^{x^2+1}$ .

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a) $2x(x^2 + 1)^{x^2+1} [\ln(x^2 + 1) + 1]$ | b) $2x(x^2 + 1)^{x^2+1} \ln(x^2 + 1)$ |
| c) $x(x^2 + 1)^{x^2+1} [\ln(x^2 + 1) + 1]$  | d) $2x[\ln(x^2 + 1) + 1]$             |
| e) $2x(x^2 + 1)[\ln(x^2 + 1) + 1]$          | f) $x(x^2 + 1)^{x^2+1} \ln(x^2 + 1)$  |

**AM 75** Să se calculeze derivata funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{\sqrt{x^2+e}}$  în punctul  $x_0 = 0$ .

- a)  $e$       b)  $2e$       c)  $e^{\sqrt{e}}$       d)  $0$       e)  $\sqrt{e}$       f)  $1$

**AM 76** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin(1 - x^2) + \sqrt{x^2 + 1}$ . Să se calculeze derivata funcției  $f$  în  $x_0 = 1$ .

a)  $\frac{4 + \sqrt{2}}{2}$

b)  $\frac{\sqrt{2} - 2}{2}$

c)  $\frac{\sqrt{2} - 4}{2}$

d)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

e)  $\sqrt{2}$

f)  $-2 + \sqrt{2}$

**AM 77** Fie  $a \in \mathbb{R}$  astfel încât funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2x^2}}, & \text{dacă } x \neq 0 \\ a, & \text{dacă } x = 0 \end{cases}$$

să fie continuă. În cazul în care există, să se calculeze  $f'(0)$ .

a) 0

b) 1

c)  $\frac{1}{2}$

d)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

e) nu există

f)  $\sqrt{2}$

**AM 78** Legea de mișcare a unui mobil pe o axă este exprimată prin relația  $s(t) = e^{-t} \cos t$  (timpul este măsurat în secunde). Să se determine accelerarea mobilului după 2 secunde.

a)  $e^{-2} \cos 2$

b)  $2e^{-2} \cos 2$

c)  $2e^{-2} \sin 2$

d)  $e^{-2} \sin 2$

e)  $\frac{e^{-2} \sin 2}{2}$

f)  $\frac{e^{-2} \cos 2}{2}$

**AM 79** Se consideră funcția  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x + \ln x$ . Să se studieze dacă  $f$  este inversabilă și în caz afirmativ să se calculeze limita

$$L = \lim_{y \rightarrow -\infty} e^{-y} f^{-1}(y).$$

a)  $f$  este inversabilă și  $L = +\infty$

b)  $f$  este inversabilă și  $L = 0$

c)  $f$  este inversabilă și  $L = 1$

d)  $f$  este inversabilă și  $L = e$

e)  $f$  este inversabilă și  $L = e^{-1}$

f)  $f$  nu este inversabilă

**AM 80** Fie funcția  $f_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_0(x) = \frac{x}{e^x}$  și funcțiile  $f_n(x) = f'_{n-1}(x)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ . Să se calculeze  $f_2(x)$ .

- |               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| a) 0          | b) $xe^{-x}$      | c) $xe^{-2x}$    |
| d) $(x-1)e^x$ | e) $(2x-3)e^{-x}$ | f) $(x-2)e^{-x}$ |

**AM 81** Se consideră funcția  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{-2|\ln x|}$ . Să se determine  $m \in \mathbb{R}$  astfel încât funcția  $g : (0, 1) \cup (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$g(x) = \frac{x^2 f''(x) + mx f'(x)}{f(x)}$$

să fie constantă.

- |      |                  |      |      |      |       |
|------|------------------|------|------|------|-------|
| a) 2 | b) $\frac{1}{2}$ | c) 0 | d) 4 | e) 1 | f) -1 |
|------|------------------|------|------|------|-------|

**AM 82** Se consideră funcția  $f : \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \arctg \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$ . Să se calculeze  $f'(x)$ .

- |                                 |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| a) $f'(x) = \frac{x}{2}$        | b) $f'(x) = \frac{1}{x+\pi}$ | c) $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{x+\pi}}$ |
| d) $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ | e) $f'(x) = \frac{1}{2}$     | f) $f'(x) = 1$                      |

**AM 83** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x) = |x^2 + |x^2 - x| - 1|.$$

Notăm cu  $M$  mulțimea punctelor în care  $f$  nu este derivabilă și  $S = \sum_{x \in M} f'_s(x)$ , unde  $f'_s(x)$  reprezintă derivata la stânga a funcției  $f$  în punctul  $x$ . Să se determine  $S$ .

- |       |      |      |       |      |                  |
|-------|------|------|-------|------|------------------|
| a) -3 | b) 0 | c) 1 | d) -1 | e) 3 | f) $\frac{1}{2}$ |
|-------|------|------|-------|------|------------------|

**AM 84** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă cu proprietățile:

$$f(x+y) - f(x) - f(y) = 5xy, \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \quad \text{și} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 2.$$

Să se determine  $f(0)$  și  $f'(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a) $f(0) = 1, f'(x) = 5x$     | b) $f(0) = 0, f'(x) = 5x$     |
| c) $f(0) = 2, f'(x) = 2x + 5$ | d) $f(0) = 1, f'(x) = 5x + 2$ |
| e) $f(0) = 0, f'(x) = 5x + 2$ | f) $f(0) = 0, f'(x) = 2x + 2$ |

**AM 85** Fie  $a > 0$  și funcția  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = (x+a) \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right).$$

Să se determine mulțimea valorilor lui  $a$  astfel încât  $f$  să fie convexă.

- |                  |                  |   |                |                                   |                                    |
|------------------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| a) $(0, \infty)$ | b) $[1, \infty)$ | c) $\left[ \frac{1}{2}, \infty \right)$ | d) $\emptyset$ | e) $\left\{ \frac{1}{2} \right\}$ | f) $\left[ \frac{1}{2}, 1 \right)$ |
|------------------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|

**AM 86** Se consideră funcția  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x-1}, & \text{dacă } x \neq 1 \\ 1, & \text{dacă } x = 1 \end{cases}.$$

În cazul în care există, să se determine  $f'(1)$ .

- |                   |      |      |      |              |      |
|-------------------|------|------|------|--------------|------|
| a) $-\frac{1}{2}$ | b) 0 | c) 1 | d) 2 | e) nu există | f) 3 |
|-------------------|------|------|------|--------------|------|

**AM 87** Fie funcția inversabilă  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^x + x - 1$ . În cazul în care există, să se determine  $(f^{-1})'(0)$ .

- |                  |      |      |              |      |                   |
|------------------|------|------|--------------|------|-------------------|
| a) $\frac{1}{2}$ | b) 0 | c) 1 | d) nu există | e) 2 | f) $-\frac{1}{2}$ |
|------------------|------|------|--------------|------|-------------------|

**AM 88** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x + 2012 - 2013\sqrt[2013]{x}$ . Să se scrie ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă  $x_0 = 1$ .

- |                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| a) $y = x - 1$ | b) $y = x + 1$ | c) $y = x$ |
| d) $y = 0$     | e) $y = 1$     | f) $y = 2$ |

**AM 89** Să se determine ecuația tangentei la graficul funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x$  în punctul de pe grafic în care panta tangentei este minimă.

- |                                       |                                      |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| a) $y = -\frac{5}{2}x + \frac{11}{2}$ | b) $y = \frac{5}{2}x + \frac{11}{2}$ | c) $y = 3$       |
| d) $y = x + 2$                        | e) $y = 2x + 1$                      | f) $y = -2x + 1$ |

**AM 90** Să se determine ecuația tangentei la graficul funcției

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin(x^3 - 1) - \frac{4}{x}$$

în punctul de abscisă  $x = 1$ .

- |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| a) $y = 7x - 11$ | b) $y = 7x$      | c) $y = 11x - 7$ |
| d) $7y = x - 11$ | e) $7y = x + 11$ | f) $y = 7x - 4$  |

**AM 91** Pentru ce valori ale parametrului  $a \in \mathbb{R}$ , dreapta  $y = ax - 2$  este tangentă la curba  $y = x^3 + 4x$ ?

- |      |       |      |      |       |      |
|------|-------|------|------|-------|------|
| a) 1 | b) -1 | c) 7 | d) 2 | e) -2 | f) 0 |
|------|-------|------|------|-------|------|

**AM 92** Se consideră funcția  $f : [-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{x+1}$ . Să se determine abscisa punctului situat pe graficul lui  $f$  în care tangenta la grafic este paralelă cu coarda care unește punctele de pe grafic de abscise  $x = 0$ ,  $x = 3$ .

- |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| a) $\frac{1}{3}$ | b) $-\frac{1}{3}$ | c) $\frac{1}{4}$ | d) $\frac{5}{4}$ | e) $\frac{3}{4}$ | f) $\frac{4}{3}$ |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**AM 93** Se consideră funcția  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x - \sqrt{x}$ . Să se determine coordonatele punctului situat pe graficul funcției  $f$  în care tangenta la grafic are panta egală cu  $\frac{1}{2}$ .

a)  $(1, 1)$

b)  $(0, 1)$

c)  $(1, 0)$

d)  $(2, 0)$

e)  $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

f)  $\left(\frac{1}{2}, \frac{1-\sqrt{2}}{2}\right)$

**AM 94** Se consideră funcția  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ . Să se determine punctele de pe graficul funcției  $f$  în care tangenta la grafic este paralelă cu axa  $Ox$ .

a)  $A(1, 0)$

b)  $A(e, \sqrt{e})$


c)  $A(e^{-2}, -2)$

d)  $A(e^{-2}, -2e^{-1})$

e)  $A(1, -2e^{-1})$

f)  $A(e^2, 2e)$

**AM 95** Graficul derivatei unei funcții  $f$ , derivabilă pe  $[-8, 8]$ , este dat în figura următoare:



Să se determine mulțimea tuturor valorilor lui  $m \in \mathbb{R}$ , pentru care graficul funcției  $f$  are exact două tangente paralele cu dreapta  $y = mx$ .

a)  $m \in \emptyset$

b)  $m \in \mathbb{R}$

c)  $m \in (-\infty, -1, 2)$

d)  $m \in \left[\frac{5}{2}, +\infty, \right)$

e)  $m \in \left[\frac{2}{5}, \frac{5}{2}\right)$

f)  $m \in [-8, 8]$

**AM 96** Cerința de omologare a unui tobogan este ca panta profilului lateral în orice punct al său să nu fie mai mare de 1. Să se determine multimea tuturor valorilor parametrului  $m \in \mathbb{R}$  astfel încât profilul tipului de tobogan descris de funcția

$$f : [0, 3] \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^3}{27} - \frac{mx^2}{9} - \frac{8x}{9} + m + \frac{5}{3},$$

să respecte condiția de omologare.

- |  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| a) $m \in \emptyset$                   | b) $m \in \mathbb{R}$   | c) $m \in \left(-\infty, \frac{1}{9}\right)$     |
| d) $m \in \left[\frac{1}{6}, 1\right]$ | e) $m \in (1, +\infty)$ | f) $m \in \left[\frac{1}{9}, \frac{1}{6}\right)$ |

**AM 97** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$ . Să se determine multimea punctelor de inflexiune ale lui  $f$ .

- |                                     |                                     |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| a) $\left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$ | b) $\left\{0, -\frac{1}{2}\right\}$ | c) $\emptyset$                  |
| d) $\{-1\}$                         | e) $\left\{-\frac{1}{2}\right\}$    | f) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ |


**AM 98** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$ . Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale funcției  $f$ .

- |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| a) 1 | b) 2 | c) 0 | d) 3 | e) 4 | f) 5 |
|------|------|------|------|------|------|

**AM 99** Fie funcția  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = ax^2 - \ln x$ ,  $a > 0$ . Să se stabilească numărul punctelor de inflexiune ale lui  $f$ .

- |      |      |                                |
|------|------|--------------------------------|
| a) 0 | b) 1 | c) 2                           |
| d) 3 | e) 4 | f) depinde de valoarea lui $a$ |

**AM 100** Graficul derivatei unei funcții  $f : [0, 6] \rightarrow \mathbb{R}$  este afișat mai jos. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate?



$P_1$  :  $f$  este strict crescătoare pentru  $x \in (0, 3)$ ;

$P_2$  :  $f$  este strict descrescătoare pentru  $x \in (3, 6)$ ;

$P_3$  :  $f$  strict crescătoare pentru  $x \in (1, 5)$ ;

$P_4$  :  $f$  strict descrescătoare pentru  $x \in (0, 1) \cup (5, 6)$ ;

$P_5$  :  $f$  strict crescătoare pentru  $x \in (1, 3)$ ;

$P_6$  :  $f$  strict descrescătoare pentru  $x \in (3, 5)$  ?

a)  $P_2$  și  $P_5$

b)  $P_1$  și  $P_2$

c)  $P_3$  și  $P_5$

d)  $P_4$  și  $P_3$

e)  $P_2$  și  $P_6$

f)  $P_1$  și  $P_6$

**AM 101** Graficul derivatei unei funcții  $f : [0, 6] \rightarrow \mathbb{R}$  este afișat la problema **AM 100**. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate?

- $P_1 : x = 1$  este punct de minim al funcției  $f$ ;
- $P_2 : x = 5$  este punct de maxim al funcției  $f$ ;
- $P_3 : x = 1$  este punct de maxim al funcției  $f$ ;
- $P_4 : x = 5$  este punct de minim al funcției  $f$ ;
- $P_5 :$ funcția  $f$  nu are puncte de extrem;
- $P_6 : x = 3$  este punct de maxim al funcției  $f$  ?
- a)  $P_1$  și  $P_2$       b)  $P_3$       c)  $P_4$   
d)  $P_5$       e)  $P_6$       f)  $P_3$  și  $P_4$

**AM 102** Graficul derivatei unei funcții  $f : [0, 6] \rightarrow \mathbb{R}$  este afișat la problema **AM 100**. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate?

- $P_1 : f$  este convexă pentru  $x \in (0, 3)$ ;
- $P_2 : f$  este concavă pentru  $x \in (3, 6)$ ;
- $P_3 : f$  este convexă pentru  $x \in (3, 6)$ ;
- $P_4 : f$  este concavă pentru  $x \in (0, 3)$ ;
- $P_5 : f$  este convexă pentru  $x \in (0, 6)$ ;
- $P_6 : f$  este concavă pentru  $x \in (0, 6)$  ?
- a)  $P_1$  și  $P_2$       b)  $P_3$       c)  $P_4$   
d)  $P_5$       e)  $P_6$       f)  $P_3$  și  $P_4$

**AM 103** Graficul derivatei unei funcții  $f : [0, 6] \rightarrow \mathbb{R}$  este afișat la problema **AM 100**. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate?

- $P_1 : f$  nu are puncte de inflexiune;
- $P_2 : x = 1, x = 5$  sunt puncte de inflexiune ale graficului funcției  $f$ ;

- $P_3 : x = 3$  este punct de inflexiune al graficului funcției  $f$ ;
- $P_4 : x = 1$  este punct de inflexiune al graficului funcției  $f$ ;
- $P_5 : x = 5$  este punct de inflexiune al graficului funcției  $f$ ;
- $P_6 : x = 0, x = 6$  sunt puncte de inflexiune ale graficului funcției  $f$  ?
- a)  $P_1$       b)  $P_2$       c)  $P_3$       d)  $P_4$       e)  $P_5$       f)  $P_6$

**AM 104** Funcția  $f : D_{\max} \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = \frac{ab}{a + (b - a)e^{-rt}}$ , cu parametrii  $a, b$  și  $r$  pozitivi (funcția logistică) modelează evoluția numărului de indivizi ai unei specii. Să se precizeze care dintre următoarele afirmații este adevărată:

- a) Dacă  $b < a$ , atunci  $f$  este descrescătoare, mărginită și își atinge marginile;
- b) Dacă  $b > a$ , atunci  $f$  este crescătoare și nemărginită pe  $D_{\max}$ ;
- c) Dacă  $b > a$ , atunci  $f$  este crescătoare, mărginită și își atinge marginile;
- d) Dacă  $b < a$ , atunci  $f$  este descrescătoare, mărginită dar nu își atinge marginile;
- e) Dacă  $b > a$ , atunci  $f$  este crescătoare, mărginită dar nu își atinge marginile;
- f) Dacă  $b < a$ , atunci  $f$  este descrescătoare și nemărginită pe  $D_{\max}$ .

**AM 105** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ ,  $x_0 \in [a, b]$  și  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție continuă oarecare. Se consideră afirmațiile:

- i) Dacă  $f$  este derivabilă în  $x_0$  și  $f'(x_0) \neq 0$ , atunci  $x_0$  nu este punct de extrem local al funcției  $f$ .
- ii) Dacă  $f$  este derivabilă în  $x_0$  și  $f'(x_0) = 0$ , atunci  $x_0$  este punct de extrem local al funcției  $f$ .
- iii) Dacă  $f$  este derivabilă în  $x_0$  și  $x_0$  nu este punct de extrem local al funcției  $f$ , atunci  $f'(x_0) \neq 0$ .
- iv) Dacă  $f$  este derivabilă în  $x_0$  și  $x_0$  este punct de extrem local al funcției  $f$ , atunci  $f'(x_0) = 0$ .

v) Dacă  $f$  nu este derivabilă în  $x_0$ , atunci  $x_0$  nu este punct de extrem local al funcției  $f$ .

Câte dintre afirmațiile date sunt false?

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 3      e) 4      f) 5

**AM 106** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x + 2}$ . Să se determine multimea punctelor de extrem local ale funcției  $f$ .

- a)  $\{-1\}$     b)  $\{0, 1\}$     c)  $\{1\}$     d)  $\{-1, 1\}$     e)  $\{1, 2\}$     f)  $\emptyset$

**AM 107** Fie funcția  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ . Să se determine punctele de extrem local ale graficului funcției  $f$  precizând și natura acestora.

- |  |   |
|--|---|
| a) $(e, 2e)$ , minim local                             | b) $\left(e, \frac{1}{2e}\right)$ , maxim local |
| c) $\left(\sqrt{e}, \frac{1}{2e}\right)$ , maxim local | d) $(\sqrt{e}, 2e)$ , minim local               |
| e) $\left(\sqrt{e}, \frac{1}{2e}\right)$ , minim local | f) $\left(\frac{1}{e}, 2e\right)$ , minim local |

**AM 108** Să se determine multimea punctelor de extrem local ale funcției  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x}$ , unde  $D$  este domeniul maxim de definiție al funcției  $f$ .

- a)  $\{0, 6\}$     b)  $\{3\}$     c)  $\emptyset$     d)  $\{0\}$     e)  $\{6\}$     f)  $\{1, 6\}$

**AM 109** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{ax + a - 2}{x^2 + 1},$$

unde  $a$  este un parametru real. Să se determine  $a$  astfel încât  $x_0 = 1$  să fie punct de extrem local al funcției  $f$ .

- a) 1      b) 2      c) -2      d) -1      e) 3      f) -3

**AM 110** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (x^2 - 2x + 1)e^x$ . Să se determine mulțimea punctelor de extrem local ale funcției  $f$ .

- a)  $\{-1, 0\}$     b)  $\{0\}$     c)  $\{0, 1\}$     d)  $\{-1, 1\}$     e)  $\{1\}$     f)  $\emptyset$

**AM 111** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{|x^2 - x|}$ . Să se determine mulțimea punctelor de extrem local ale funcției  $f$ .

- |                                 |                                       |                |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| a) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ | b) $\{0\}$                            | c) $\{1\}$     |
| d) $\{0, 1\}$                   | e) $\left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}$ | f) $\emptyset$ |

**AM 112** Să se determine mulțimea punctelor de extrem local pentru funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = (x - 1)(x - 3)(x - 5)(x - 7).$$

- |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a) $\{2, 4 \pm \sqrt{5}\}$ | b) $\{4, 2 \pm \sqrt{5}\}$ | c) $\{2\}$                 |
| d) $\{4\}$                 | e) $\{4, 4 \pm \sqrt{5}\}$ | f) $\{2, 2 \pm \sqrt{5}\}$ |

**AM 113** Funcția  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{x^3}{3} - \ln x$  are:

- a) un punct de minim local
- b) un punct de maxim local
- c) două puncte de maxim local
- d) două puncte de minim local
- e) un punct de minim local și un punct de maxim local
- f) nu are puncte de extrem local

**AM 114** Să se determine multimea punctelor de extrem local ale funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \sqrt[3]{|x^3 - 3x^2|}.$$

- a)  $f$  are doar două puncte de extrem local: 0 și 3
- b)  $f$  nu are puncte de extrem local
- c)  $f$  are un singur punct de extrem local: 2
- d)  $f$  are trei puncte de extrem local: 0, 1 și 3
- e)  $f$  are trei puncte de extrem local: 0, 2 și 3
- f)  $f$  are doar două puncte de extrem local:  $-1$  și 3

**AM 115** Se consideră punctele  $A(-1, 0)$  și  $B(3, 0)$ . Dacă  $C$  este un punct variabil pe graficul funcției  $f : (0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = xe^{-x}$ , să se calculeze valoarea maximă pe care o poate lua aria triunghiului  $ABC$ .

- a) 1
- b) 2
- c)  $\frac{1}{e}$
- d)  $\frac{2}{e}$
- e)  $\frac{4}{e}$
- f)  $\frac{12}{e^3}$

**AM 116** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{mx + 1}{x^2 + 1}.$$

Să se determine multimea tuturor valorilor parametrului real  $m$  astfel ca funcția  $f$  să aibă două puncte de extrem local.

- a)  $\{-1\}$
- b)  $(-1, 1)$
- c)  $(-\infty, -1)$
- d)  $(1, \infty)$
- e)  $(0, 1)$
- f)  $\mathbb{R}^*$

**AM 117** Se consideră funcția

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x}{2+x}.$$

Să se determine punctele de extrem local ale graficului funcției  $f$  precizând și natura acestora.

- a)  $(-1, e)$ , maxim local      b)  $\left(1, \frac{e}{3}\right)$ , minim local  
 c)  $\left(-1, \frac{1}{e}\right)$ , maxim local      d)  $\left(1, \frac{e}{3}\right)$ , maxim local  
 e)  $\left(-1, \frac{1}{e}\right)$ , minim local      f)  $(1, e)$ , maxim local

**AM 118** Să se determine valoarea minimă a funcției  $f : \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x) = 3\tan x + \cot x.$$

- a)  $\sqrt{3}$       b)  $\frac{\pi}{6}$       c)  $\frac{\pi}{3}$       d)  $2\sqrt{3}$       e)  $4\sqrt{3}$       f) 0

**AM 119** Să se determine punctul de minim al funcției  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x) = (x^2 + 1)\sqrt{x} - 12 \operatorname{arctg} \sqrt{x}.$$

- a) 2      b) 1      c) 0      d)  $\pi$       e)  $\frac{\pi}{2}$       f)  $\frac{1}{2}$

**AM 120** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = a^x b^{1-x} + b^x a^{1-x}$ , cu  $a, b > 0$ ,  $a \neq b$ ,  $a \neq 1$ ,  $b \neq 1$ . Atunci:

- a)  $\left(\frac{1}{2}, 2\sqrt{ab}\right)$  este punct de maxim local al graficului funcției  $f$   
 b)  $\left(\frac{1}{2}, 2ab\right)$  este punct de minim local al graficului funcției  $f$   
 c)  $\left(\frac{1}{2}, 2\sqrt{ab}\right)$  nu este punct de extrem al graficului funcției  $f$   
 d)  $\left(\frac{1}{2}, 2ab\right)$  este punct de maxim local al graficului funcției  $f$   
 e)  $\left(\frac{1}{2}, 2\sqrt{ab}\right)$  este punct de minim local al graficului funcției  $f$   
 f)  $\left(\frac{1}{2}, \sqrt{ab}\right)$  este punct de maxim local al graficului funcției  $f$

**AM 121** Fie funcția  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x) = \frac{e^{|\ln x|}}{x+1}.$$

Să se determine numărul punctelor de extrem local ale funcției  $f$ .

- a) 0      b) 2      c) 3      d) 1      e) 4      f) 5

**AM 122** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x + \sqrt{|1 - x^2|}$  și mulțimile

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ este punct de extrem local al lui } f\},$$

respectiv

$$I = \{x \in \mathbb{R} : (x, f(x)) \text{ este punct de înțoarcere pentru graficul funcției } f\}.$$

Știind că  $|A|$  notează numărul de elemente ale unei mulțimi finite  $A$ , să se calculeze  $|E|^{|I|}$ .

- a) 1      b) 2      c) 4      d) 8      e) 9      f) 6

**AM 123** Fie funcția  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{e^{|\ln|x-2||}}{x+1}$ , unde  $D$  reprezintă domeniul maxim de definiție. Să se calculeze suma

$$S = \sum_{x \in E} f(x),$$

unde  $E = \{x \mid x \in D, x \text{ este punct de extrem local al lui } f\}$ .

- a)  $S = \frac{3}{4}$     b)  $S = \frac{7}{4}$     c)  $S = 3$     d)  $S = \frac{5}{4}$     e)  $S = \frac{3}{2}$     f)  $S = 1$

**AM 124** Să se determine abscisa punctului din cadrul doi corespunzător distanției maxime dintre graficul funcției  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \ln(x^2)$  și axa  $Ox$ .

- a)  $-1$     b)  $-e$     c)  $-\frac{1}{e}$     d)  $-\frac{1}{e^2}$     e)  $-\frac{1}{2}$     f)  $-2$

**AM 125** Concentrația unui medicament în fluxul sanguin la  $t$  ore după administrare este

$$C(t) = \frac{13,6t}{(9,6t + 19,2)^2}.$$

În cât timp este atinsă concentrația maximă  $C_{\max}$  a medicamentului? Care este durata de timp pentru care concentrația depășește  $\frac{8}{9}$  din  $C_{\max}$ ?

- a)  $t_{\max} = 1$  ore și  $C \geq \frac{8}{9}C_{\max}$  pentru trei ore;
- b)  $t_{\max} = 3$  ore și  $C \geq \frac{8}{9}C_{\max}$  pentru două ore;
- c)  $t_{\max} = 2$  ore și  $C \geq \frac{8}{9}C_{\max}$  pentru două ore;
- d)  $t_{\max} = 1$  ore și  $C \geq \frac{8}{9}C_{\max}$  pentru jumătate de oră;
- e)  $t_{\max} = 2$  ore și  $C \geq \frac{8}{9}C_{\max}$  pentru trei ore;
- f)  $t_{\max} = 3$  ore și  $C \geq \frac{8}{9}C_{\max}$  pentru jumătate de oră.

**AM 126** Să se determine abscisa punctului de pe graficul funcției

$$f : (-2, 0) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 + 2x},$$

situat cel mai aproape de prima bisectoare.

- a)  $-\sqrt{2}$
- b)  $-1$
- c)  $-\frac{3}{2}$
- d)  $-\frac{1}{2}$
- e)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- f)  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

**AM 127** Fie  $A$  punctul aparținând graficului funcției

$$f : \left[-\frac{1}{2}, \infty\right) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}},$$

situat cel mai aproape de originea  $O$  a sistemului de coordonate carteziene  $xOy$ . Să se afle distanța de la  $O$  la  $A$ .

$$\text{a) } \frac{\sqrt{2}}{4} \quad \text{b) } \frac{1}{2} \quad \text{c) } \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{d) } \frac{\sqrt{6}}{36} \quad \text{e) } \frac{\sqrt{21}}{18} \quad \text{f) } \frac{\sqrt{6}}{2}$$

**AM 128** Un camion trebuie să parcurgă  $100 \text{ km}$  cu o viteză constantă  $v \text{ km/h}$  (cu condiția  $40 \leq v \leq 70$ ) consumând  $\left(8 + \frac{v^2}{300}\right) \text{ litri/h}$  de benzină. Să se determine viteza pentru care costul este minim, știind că șoferul este plătit cu  $15 \text{ lei/h}$  și benzina costă  $6 \text{ lei/litru}$ .

$$\begin{array}{lll} \text{a) } 50 \text{ km/h} & \text{b) } 55 \text{ km/h} & \text{c) } 15\sqrt{14} \text{ km/h} \\ \text{d) } 16\sqrt{14} \text{ km/h} & \text{e) } 70 \text{ km/h} & \text{f) } 14\sqrt{14} \text{ km/h} \end{array}$$

**AM 129** Să se determine dintre toate numerele reale pozitive pe cel pentru care diferența dintre acesta și cubul său să fie maximă.

$$\text{a) } \sqrt{3} \quad \text{b) } \frac{1}{3} \quad \text{c) } \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{d) } 2\sqrt{3} \quad \text{e) } \frac{\sqrt{3}}{9} \quad \text{f) } \frac{2}{\sqrt{3}}$$

**AM 130** Să se determine mulțimea soluțiilor inecuației

$$x - \frac{x^3}{6} - \sin x \leq 0.$$

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) & \text{b) } (-\infty, 0] & \text{c) } [0, \infty) \\ \text{d) } \left[0, \frac{\pi}{2}\right) & \text{e) } \mathbb{R} & \text{f) } \mathbb{Z} \end{array}$$

**AM 131** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^x - x$ . Soluția inecuației  $f(x) - 1 > 0$  este:

$$\text{a) } (0, +\infty) \quad \text{b) } (-\infty, 0) \quad \text{c) } \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \text{d) } (1, +\infty) \quad \text{e) } (-\infty, -1) \quad \text{f) } \emptyset$$

**AM 132** Să se determine cel mai mare număr real  $a$  cu proprietatea

$$x^2 + 1 \geq a + 2 \ln x, \text{ pentru orice } x \in (0, \infty).$$

- a) 0      b) 2      c) 1      d) -1      e) 4      f) 3

**AM 133** Să se determine multimea valorilor parametrului  $m \in \mathbb{R}$  astfel încât

$$x + e^x \geq mx + 1, \text{ pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

- a)  $\{1\}$       b)  $\{2\}$       c)  $\{0\}$       d)  $\{0, 2\}$       e)  $\{0, 1\}$       f)  $\emptyset$

**AM 134** Să se determine multimea tuturor valorilor parametrului real  $m$  astfel ca ecuația  $e^x = mx^2$  să aibă trei rădăcini reale distințe.

- |  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| a) $(-\infty, 0]$                              | b) $\{1\}$                              | c) $\left(0, \frac{e^2}{8}\right)$ |
| d) $\left(\frac{e^2}{8}, \frac{e^2}{4}\right)$ | e) $\left(\frac{e^2}{4}, \infty\right)$ | f) $\left\{\frac{e^2}{4}\right\}$  |

**AM 135** Să se determine multimea tuturor numerelor reale  $x$  care verifică inegalitatea:

$$e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} - \frac{x^4}{4!} \geq 0.$$

- a)  $(0, \infty)$       b)  $(-\infty, 0)$       c)  $[0, \infty)$       d)  $\mathbb{R}$       e)  $[1, \infty)$       f)  $\emptyset$

**AM 136** Să se rezolve inecuația  $e^{13x} + 13e^{-x} \geq 14$ .

- a)  $\emptyset$       b)  $\{0\}$       c)  $[0, \infty)$       d)  $(-\infty, 0]$       e)  $\mathbb{R}$       f)  $\{1\}$

**AM 137** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{x+3}, & \text{dacă } x \neq -3 \\ 0, & \text{dacă } x = -3. \end{cases}$$

Să se studieze monotonia funcției  $f$ .

- a)  $f$  este crescătoare pe  $\mathbb{R}$
- b)  $f$  este crescătoare pe  $\mathbb{R} \setminus \{3\}$
- c)  $f$  este crescătoare pe  $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$
- d)  $f$  este descrescătoare pe  $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$
- e)  $f$  este descrescătoare pe  $\mathbb{R}$
- f)  $f$  nu este monotonă pe  $\mathbb{R}$

**AM 138** Se consideră funcția  $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}.$$

Să se determine imaginea funcției  $f$ .

- a)  $[0, 1]$
- b)  $[0, +\infty)$
- c)  $\mathbb{R}$
- d)  $[0, 10]$
- e)  $[1, 4]$
- f)  $\left[ \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, 1 \right]$

**AM 139** Fie  $f(t) = t^3 e^{-\frac{t}{5}}$  puterea emisă la descărcarea unui aparat electric la fiecare moment  $t > 0$  (puterea este măsurată în wați și timpul în secunde). Să se determine la ce moment puterea va fi maximă.

- a) 3
- b) 15
- c) 5
- d) 20
- e)  $15^2$
- f) 25

**AM 140** Fie funcția  $f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x}, & \text{dacă } x \neq 0 \\ 0, & \text{dacă } x = 0 \end{cases}$$


și afirmațiile:

- (i)  $f$  este continuă, dar nu este derivabilă;
- (ii)  $x = 0$  este asimptotă verticală;
- (iii)  $y = 0$  este asimptotă orizontală;
- (iv)  $f'(0) = \frac{1}{2}$ ;
- (v)  $f$  este strict crescătoare;
- (vi)  $\text{Im } f = \left[-\frac{2}{\pi}, \frac{2}{\pi}\right]$ .

Câte dintre afirmațiile date sunt adevărate?

- a) 6      b) 5      c) 4      d) 3      e) 2      f) 1

**AM 141** Graficul derivatei unei funcții  $f$  de două ori derivabilă pe  $[-8, 8]$  este dat în figura următoare:



Știind că acest grafic are exact 2 tangente orizontale în punctele  $(-4; f'(-4))$  și  $(5; 2,5)$ , să se determine numărul punctelor de inflexiune ale funcției  $f$ .

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 3      e) 4      f) 5

**AM 142** Fie funcția  $f : [-100, 100] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = t + 2 \cdot 10^{-5}t^2 + 3 \cdot 10^{-7}t^3$ . Să se determine intervalul  $I \subset [-100, 100]$ , de lungime maximă, pe care funcția este convexă. Să se calculeze apoi valorile minimă  $m$  și maximă  $M$  ale funcției  $f$  pe intervalul  $I$ .

- a)  $I = \left[ -\frac{200}{3}; 100 \right]$  și  $m = -\frac{2}{9} \cdot 10^2 + \frac{16}{243} \cdot 10^{-1}$  și  $M = 100 + 6 \cdot 10^{-1}$ ;
- b)  $I = \left[ -\frac{200}{9}; 100 \right]$  și  $m = -\frac{2}{3} \cdot 10^2 + \frac{16}{81} \cdot 10^{-1}$  și  $M = 100 + 5 \cdot 10^{-1}$ ;
- c)  $I = \left[ -100; -\frac{200}{9} \right]$  și  $m = -2 \cdot 10^2$  și  $M = 100 + \frac{16}{243} \cdot 10^{-1}$ ;
- d)  $I = \left[ -\frac{200}{3}; 100 \right]$  și  $m = 0$  și  $M = 100 + \frac{16}{243} \cdot 10^{-1}$ ;
- e)  $I = \left[ -\frac{200}{9}; 100 \right]$  și  $m = -\frac{2}{9} \cdot 10^2 + \frac{16}{243} \cdot 10^{-1}$  și  $M = 100 + 5 \cdot 10^{-1}$ ;
- f)  $I = \left[ -100; -\frac{200}{9} \right]$  și  $m = -\frac{2}{3} \cdot 10^2 + \frac{16}{81} \cdot 10^{-1}$  și  $M = 100 + 6 \cdot 10^{-1}$ .

**AM 143** Pentru motocicliști, într-un concurs de motociclete, este importantă aflarea punctelor impuse schimbărilor de viraj, de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, pentru ca parcursul să fie ideal. În ce punct de pe pistă un concurent trebuie să schimbe poziția de viraj a motocicletei de la stânga la dreapta, pentru a avea un parcurs optim, dacă traseul este descris de funcția  $f : [-4, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = -0,05 \cdot x^4 + 1,2 \cdot x^2 + 2$ ?

- |             |  |   |
|-------------|--|---|
| a) $(0, 0)$ | b) $(0, 2)$                                  | c) $(-2, 6)$                                |
| d) $(2, 6)$ | e) $\left( -2\sqrt{3}, \frac{46}{5} \right)$ | f) $\left( 2\sqrt{3}, \frac{46}{5} \right)$ |

**AM 144** Fie funcția  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x) = (3x^2 - 6x) \sqrt[3]{x}$ . Să se precizeze care dintre următoarele afirmații este adevărată:

- a)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (6x - 6) \sqrt[3]{x}$
- b)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (x^3 - 3x^2) \sqrt[3]{x^2}$
- c)  $F$  nu este o funcție derivabilă pe  $\mathbb{R}$
- d)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (7x - 8) \sqrt[3]{x}$
- e)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (7x - 8) \sqrt[3]{x^2}$
- f)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (x^3 - 3x^2) \sqrt[3]{x}$

**AM 145** Fie funcția  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x) = x|x - 1|$ . Să se precizeze care dintre următoarele afirmații este adevărată:

- a)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \left| \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right|$
- b)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{x^2}{2}|x - 1|$
- c)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |2x - 1|$
- d)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \left| \frac{x^2}{2} - x \right|$
- e)  $F$  nu poate fi primitivă a nici unei funcții  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- f)  $F$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x - 1| + x$

**AM 146** Să se determine mulțimea primitivelor funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} 2x + e^{-x}, & x < 0 \\ 1 + xe^x, & x \geq 0 \end{cases}.$$

- a)  $\int f(x) dx = \begin{cases} (x^2 - 2) - e^{-x}, & x < 0 \\ (x - 1)(2e^x + 1), & x \geq 0 \end{cases} + C$
- b)  $\int f(x) dx = \begin{cases} (x^2 + 1) - e^{-x}, & x < 0 \\ (x - 1)(1 - e^x), & x \geq 0 \end{cases} + C$
- c)  $\int f(x) dx = \emptyset$  deoarece  $f$  nu este primitivabilă
- d)  $\int f(x) dx = \begin{cases} (x^2 + 2) - e^{-x}, & x \leq 0 \\ x + e^x, & x > 0 \end{cases} + C$
- e)  $\int f(x) dx = \begin{cases} x^2 - 1 - e^{-x}, & x < 0 \\ (x - 1)(1 + e^x), & x \geq 0 \end{cases} + C$
- f)  $\int f(x) dx = \begin{cases} (x^2 - 2) - e^{-x}, & x \leq 0 \\ (x - 1)(e^x + 2), & x > 0 \end{cases} + C$

**AM 147** Să se determine valorile parametrilor reali  $a, b, c$  pentru care funcția  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x) = ax + (bx^2 + c) \operatorname{arctg} x$  este o primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \operatorname{arctg} x$ .

- a)  $a = -\frac{1}{2}, b = c = \frac{1}{2}$
- b)  $a = b = \frac{1}{2}, c = -\frac{1}{2}$
- c)  $a = b = c = -\frac{1}{2}$
- d)  $a = b = c = \frac{1}{2}$
- e)  $a = c = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$
- f)  $a = b = c = 1$

**AM 148** Să se calculeze

$$\int (x^2 - x) e^{-2x} dx.$$

- a)  $(2x - 1) e^{-2x} + C$
- b)  $\frac{x^2}{2} e^{-2x} + C$
- c)  $\left( \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) e^{-2x} + C$
- d)  $(1 - 2x) e^{-2x} + C$
- e)  $-\frac{x^2}{2} e^{-2x} + C$
- f)  $\left( -\frac{2x^3}{3} + x^2 \right) e^{-2x} + C$

**AM 149** Să se calculeze

$$\int (2x - 1) \cos 2x dx.$$

- a)  $x \sin 2x + \frac{1}{2} (\cos 2x - \sin 2x) + C$
- b)  $2x \cos 2x - (\cos 2x - \sin 2x) + C$
- c)  $x \sin 2x + 2 (\cos 2x + \sin 2x) + C$
- d)  $\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} (\cos 2x - \sin 2x) + C$
- e)  $x \cos 2x + (\sin 2x - \cos 2x) + C$
- f)  $\frac{x}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} (\sin 2x - \cos 2x) + C$

**AM 150** Fie  $I(a) = \int \frac{e^x}{x^a} dx$ ,  $x \in (0, +\infty)$ , unde  $a$  este un număr natural nenul. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

a)  $I(3) = \frac{e^x}{2x^2} - \frac{1}{2}I(1)$

b)  $3I(3) = \frac{e^x}{x^2} - I(1)$

c)  $I(3) = -\frac{e^x}{2x} \left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{2}I(1)$

d)  $2I(3) = \frac{e^x}{x^2} - \frac{2}{3}I(2)$

e)  $I(3) = \frac{e^x}{3x^2} - \frac{2}{3}I(2)$

f)  $I(3) = \frac{e^x}{3x^3} - \frac{e^x}{2x^2} + \frac{1}{3}I(2)$

**AM 151** Să se determine constantele reale  $a$  și  $b$  astfel încât funcția  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$F(x) = e^{-x}(a \cos 4x + b \sin 4x)$$

să fie primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{-x} \cos 4x$ .

a)  $a = \frac{1}{7}, b = -\frac{1}{7}$

b)  $a = \frac{4}{17}, b = -\frac{4}{17}$

c)  $a = -\frac{1}{17}, b = \frac{4}{17}$

d)  $a = b = \frac{5}{17}$

e)  $a = -\frac{1}{7}, b = \frac{4}{7}$

f)  $a = b = \frac{1}{17}$

**AM 152** Fie  $I \subset (-\infty, 1)$  un interval și funcția  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2-6x+5}.$$

Să se calculeze  $\int f(x) dx$ .

a)  $\frac{11}{4} \ln(1-x) - \frac{3}{4} \ln(5-x) + C$

b)  $\frac{11}{4} \ln(5-x) - \frac{3}{4} \ln(1-x) + C$

c)  $\frac{11}{4} \ln \frac{x-5}{x-1} + C$

d)  $\frac{3}{4} \ln \frac{1-x}{|x-5|} + C$

e)  $\frac{7}{4} \ln|x-1| - \frac{3}{4} \ln(5-x) + C$

f)  $\frac{11}{4} \ln(1-x) - \frac{7}{4} \ln|x-5| + C$

**AM 153** Să se determine familia primitivelor funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{ax+b}{a^2x^2+b^2}, \quad a > 0, \quad b \in \mathbb{R}^*.$$

- a)  $F(x) = \frac{1}{2a} \ln(a^2x^2 + b^2) + \frac{1}{ab} \operatorname{arctg} \frac{ax}{b} + C$
- b)  $F(x) = \frac{1}{2a} \ln(a^2x^2 + b^2) + \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{ax}{b} + C$
- c)  $F(x) = \frac{1}{2a} \ln(a^2x^2 + b^2) + \frac{a}{b} \operatorname{arctg} \frac{ax}{b} + C$
- d)  $F(x) = \frac{b}{a} \ln(a^2x^2 + b^2) + \frac{b}{a} \operatorname{arctg} \frac{ax}{b} + C$
- e)  $F(x) = \frac{1}{a} \ln(a^2x^2 + b^2) + \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{ax}{b} + C$
- f)  $F(x) = \frac{b}{2a} \ln(a^2x^2 + b^2) + \frac{b}{a} \operatorname{arctg} \frac{ax}{b} + C$

**AM 154** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + (x - 1)^2}$$

și  $F$  o primitivă a sa. Să se determine acea primitivă pentru care  $F(0) = \frac{\pi}{24}$ .

- |  |   |
|--|---|
| a) $F(x) = \operatorname{arctg}(2x - 1) + \frac{7\pi}{24}$ | b) $F(x) = \operatorname{arctg}(2x - 1) - \frac{5\pi}{24}$  |
| c) $F(x) = \ln(2x - 1) + \frac{5\pi}{24}$                  | d) $F(x) = \operatorname{arctg}(x - 1) + \frac{7\pi}{12}$   |
| e) $F(x) = \ln(x - 1) + \frac{\pi}{4}$                     | f) $F(x) = \operatorname{arctg}(x^2 + 1) + \frac{5\pi}{24}$ |

**AM 155** Se consideră funcția  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{2x - 8 - x^2}{x^4 + 4x^3} .$$

Să se determine acea primitivă  $F$  a funcției  $f$  care verifică relația  $F(5) = \frac{4}{25}$ .

- |  |   |
|--|---|
| a) $\ln \sqrt{\frac{x+4}{x}} - \frac{x-1}{x^2} + \frac{8}{25} - \ln \frac{3\sqrt{5}}{5}$ | b) $\ln \sqrt{\frac{x+4}{x^3}} - \frac{x-1}{x^2} + \frac{6}{25} - \ln \frac{3\sqrt{3}}{5}$      |
| c) $\ln \sqrt{\frac{x+4}{x}} - \frac{x^2}{x+1} + \frac{8}{5} - \ln \frac{3\sqrt{5}}{5}$  | d) $\ln \sqrt{\frac{x+4}{x}} - \frac{x-1}{x^2} - \ln \frac{3\sqrt{5}}{5}$                       |
| e) $\ln \sqrt{\frac{x}{x+4}} + \frac{x-1}{x^2} + \frac{6}{25} - \ln \frac{3\sqrt{3}}{5}$ | f) $\ln \sqrt{\frac{x}{\sqrt{x+4}}} - \frac{x-1}{x^2} + \frac{1}{25} - \ln \frac{3\sqrt{5}}{5}$ |

**AM 156** Să se determine mulțimea primitivelor funcției  $f(x) = \frac{1}{x^{2018} + x}$  pe intervalul  $I \subset (0, \infty)$ .

- |  |  |
|--|--|
| a) $\ln x - \frac{\ln(1+x^{2017})}{2017} + C$  | b) $\ln x + \frac{\ln(1+x^{2017})}{2017} + C$              |
| c) $\ln x + \ln(1+x^{2017}) \cdot 2017 + C$    | d) $\ln x - \frac{\ln(x+x^{2018})}{2018} + C$              |
| e) $-\ln x + \frac{\ln(1+x^{2017})}{2017} + C$ | f) $\frac{\ln x}{2018} - \frac{\ln(1+x^{2017})}{2017} + C$ |

**AM 157** Fie  $I \subset (-\infty, 1)$  un interval și funcția  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}.$$

Să se calculeze  $\int f(x) dx$ .

- |  |
|--|
| a) $11 \ln  2x - 6 + 2\sqrt{x^2 - 6x + 5}  + 3\sqrt{x^2 - 6x + 5} + C$               |
| b) $\frac{11}{3} \ln \frac{6 - 2x + 2\sqrt{x^2 - 6x + 5}}{\sqrt{x^2 - 6x + 5}} + C$  |
| c) $7 \ln  2x - 6 + 2\sqrt{x^2 - 6x + 5}  + 2\sqrt{x^2 - 6x + 5} + C$                |
| d) $\frac{7}{2} \ln \frac{ 2x - 6 + 2\sqrt{x^2 - 6x + 5} }{\sqrt{x^2 - 6x + 5}} + C$ |
| e) $2 \ln  2x - 6 + 2\sqrt{x^2 - 6x + 5}  + 11\sqrt{x^2 - 6x + 5} + C$               |
| f) $\frac{3}{7} \ln \frac{6 - 2x + 2\sqrt{x^2 - 6x + 5}}{\sqrt{x^2 - 6x + 5}} + C$   |

**AM 158** Să se determine multimea primitivelor funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2 - 6x + 10}}.$$

- a)  $\frac{2}{7}\sqrt{x^2 - 6x + 10} + \ln|x - 3 - \sqrt{x^2 - 6x + 10}| + C$
- b)  $\frac{2}{7}\operatorname{arctg}\sqrt{x^2 - 6x + 10} + C$
- c)  $\frac{2(x-3)}{7}\ln\sqrt{x^2 - 6x + 10} + C$
- d)  $\frac{2x}{7}\sqrt{x^2 - 6x + 10} + C$
- e)  $2\sqrt{x^2 - 6x + 10} + 7\ln(x - 3 + \sqrt{x^2 - 6x + 10}) + C$
- f)  $2\sqrt{x^2 - 6x + 10} + 7\ln(x + \sqrt{x^2 - 6x + 10}) + C$

**AM 159** Fie  $I \subset (0, \infty)$  un interval și funcția  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}}.$$

Să se calculeze  $\int f(x) dx$ .

- a)  $2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6\ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$
- b)  $3\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - \ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$
- c)  $2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x} - 6\sqrt[6]{x} + 6\ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$
- d)  $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x} - 6\ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$
- e)  $2\sqrt{x} + 2\sqrt[3]{x} + 3\sqrt[6]{x} - 3\ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$
- f)  $3\sqrt[3]{x} + 2\sqrt{x} - \sqrt[6]{x} - \ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$

**AM 160** Fie funcția  $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{x}}.$$

Să se determine familia primitivelor funcției  $f$ .

- a)  $\frac{12}{13} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{13}} - \frac{18}{5} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{10}} + \frac{36}{7} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^7} - 3 \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^4} + C$
- b)  $\frac{1}{13} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{13}} + \frac{1}{10} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{10}} + \frac{1}{7} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^7} + \frac{1}{4} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^4} + C$
- c)  $\frac{1}{13} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{13}} - \frac{1}{10} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{10}} + \frac{1}{7} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^7} - \frac{1}{4} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^4} + C$
- d)  $\frac{11}{13} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{13}} + \frac{9}{10} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{10}} + \frac{6}{7} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^7} + \frac{3}{4} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^4} + C$
- e)  $\frac{4}{13} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{13}} + \frac{2}{5} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{10}} + \frac{4}{7} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^7} + \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^4} + C$
- f)  $\frac{13}{4} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{13}} + \frac{5}{2} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^{10}} + \frac{7}{4} \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^7} + \sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{x})^4} + C$

**AM 161** Să se calculeze

$$\int \frac{1}{\sqrt{2x-1} + \sqrt[4]{2x-1} + 1} dx, \quad x > \frac{1}{2}.$$

- a)  $\sqrt{2x-1} - \sqrt[4]{2x-1} - \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{2\sqrt[4]{2x-1} + 1}{\sqrt{3}} + C$
- b)  $-\sqrt{2x-1} + \sqrt[4]{2x-1} - \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt[4]{2x-1}}{\sqrt{3}} + C$
- c)  $\sqrt{2x-1} - 2\sqrt[4]{2x-1} - \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{2\sqrt[4]{2x-1} + 1}{\sqrt{3}} + C$
- d)  $\sqrt{2x-1} - 2\sqrt[4]{2x-1} + \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{2\sqrt[4]{2x-1} + 1}{\sqrt{3}} + C$
- e)  $-\sqrt{2x-1} + \sqrt[4]{2x-1} - \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{2\sqrt[4]{2x-1} + 1}{\sqrt{3}} + C$
- f)  $\sqrt{2x-1} - 2\sqrt[4]{2x-1} - \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{2\sqrt[4]{2x-1} + 1}{\sqrt{3}} + C$

**AM 162** Se consideră funcția

$$f(x) = x^5 \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^2}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Să se determine familia primitivelor funcției  $f$ .

- a)  $\frac{1}{8} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^8} - \frac{a^3}{5} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^5} + C$
- b)  $\frac{3}{8} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^8} - \frac{a^2}{5} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^5} + C$
- c)  $\frac{1}{3} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^5} - \frac{a^2}{3} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^3} + C$
- d)  $\frac{1}{5} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^8} - \frac{a^2}{5} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^5} + C$
- e)  $\frac{1}{5} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^8} - \frac{a^2}{3} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^5} + C$
- f)  $\frac{5}{8} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^8} - \frac{3a^2}{5} \sqrt[3]{(a^3 + x^3)^5} + C$

**AM 163** Să se determine multimea primitivelor funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{2 - e^x}{e^x + e^{2-x}}.$$

- a)  $\frac{2}{e} \operatorname{arctg} e^{x-1} - \ln(e^{2x} + e^2) + C$
- b)  $2 \operatorname{arctg} e^{x-1} - \frac{1}{2} \ln(e^{2x} + e^2) + C$
- c)  $\frac{2}{e} \operatorname{arctg} e^{x-1} - \frac{1}{2} \ln(e^{2(x-1)} + 1) + C$
- d)  $\frac{1}{e} \operatorname{arctg} e^x - \frac{1}{2} \ln(e^{2(x-1)} + 1) + C$
- e)  $2 \operatorname{arctg} e^{x-1} - \frac{1}{2} \ln(e^{2x} + e^2) + C$
- f)  $\frac{2}{e} \operatorname{arctg} e^x - \ln(e^{2(x-1)} + 1) + C$

**AM 164** Fie funcțiile<sup>4</sup> :

$$\operatorname{ch} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{și respectiv} \quad \operatorname{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

---

<sup>4</sup>Functia ch se numește *cosinus hiperbolic* iar funcția sh se numește *sinus hiperbolic*

Să se determine primitiva  $F$  a funcției  $f(x) = \operatorname{ch}^2 x \cdot \operatorname{sh}^2 x$  care verifică relația  $F(0) = 0$ .

- |  |   |
|--|---|
| a) $\frac{e^{4x}}{64} - \frac{e^{-4x}}{64} - \frac{x}{8}$                | b) $-\frac{x}{16} + \frac{1}{32} \operatorname{sh} 4x$  |
| c) $\frac{e^{4x}}{64} - \frac{e^{-4x}}{64} + 2x$                         | d) $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \operatorname{ch} x$   |
| e) $\frac{e^{2x}}{16} + \frac{e^{-2x}}{16} + \frac{3x}{4} - \frac{1}{8}$ | f) $\frac{e^{4x}}{64} + \frac{e^{-4x}}{64} + \frac{e^{2x}}{16} + \frac{e^{-2x}}{16} - \frac{5}{32}$ |

**AM 165** Se definește funcția<sup>5</sup>

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} .$$

Să se determine mulțimea primitivelor funcției  $\operatorname{th}$  și să se precizeze domeniul maxim  $D$  pe care sunt definite acestea.

- |   |  |
|---|--|
| a) $\ln(e^x - e^{-x}) + C$ și $D = (0, \infty)$     | b) $\frac{1}{2} \ln(e^x + e^{-x}) + C$ și $D = \mathbb{R}$ |
| c) $\frac{1}{e^x + e^{-x}} + C$ și $D = \mathbb{R}$ | d) $-x + \ln(1 + e^{2x}) + C$ și $D = \mathbb{R}$          |
| e) $-x + \ln(1 - e^{2x}) + C$ și $D = (0, \infty)$  | f) $\frac{2}{e^x - e^{-x}} + C$ și $D = (0, \infty)$       |

**AM 166** Să se determine familia primitivelor funcției

$$f : \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{\cos x} .$$

- |  |   |   |
|--|---|---|
| a) $\ln \frac{1 + \cos x}{1 - \sin x} + C$             | b) $\frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + C$  | c) $\frac{1}{2} \ln \left  \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} \right  + C$ |
| d) $\frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \cos x} + C$ | e) $\ln \left  \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2}} \right  + C$ | f) $\ln \left  \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} \right  + C$             |

---

<sup>5</sup>Funcția  $\operatorname{th}$  se numește *tangenta hiperbolică*

**AM 167** Să se determine familia primitivelor funcției

$$f(x) = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x - 1}$$

pe intervalul  $I = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$ .

- |  |   |
|--|---|
| a) $F(x) = \frac{x}{2} + \ln \sqrt{\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x}} + C$ | b) $F(x) = \operatorname{tg} x + \frac{1}{4} \ln \sqrt{\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x}} + C$  |
| c) $F(x) = 2x + \ln \sqrt{\frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x}} + C$          | d) $F(x) = x^2 + \ln \left  \frac{\operatorname{tg} x - 1}{\operatorname{tg} x + 1} \right  + C$                      |
| e) $F(x) = x + \ln \left  \frac{\operatorname{tg} x - 1}{\operatorname{tg} x + 1} \right  + C$   | f) $F(x) = -\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \ln \left  \frac{\operatorname{tg} x - 1}{\operatorname{tg} x + 1} \right  + C$ |

**AM 168** Pentru orice  $b \in \mathbb{N}$  se definesc integralele

$$I(b) = \int \frac{1}{x^b \sqrt{a^2 + x^2}} dx, \quad x \in (0, \infty), \quad a \in \mathbb{R}^*.$$

Care dintre următoarele relații este adevărată?

- |   |   |
|---|---|
| a) $I(9) = \frac{1}{8a^2} \left( -7I(7) - \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^8} \right)$ | b) $I(9) = \frac{1}{9a^2} \left( -8I(7) - \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^8} \right)$ |
| c) $I(9) = \frac{1}{9a^2} \left( 8I(7) - \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^8} \right)$  | d) $I(9) = \frac{1}{7a^2} \left( 8I(7) - \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^8} \right)$  |
| e) $I(9) = \frac{1}{9a^2} \left( \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^8} - 8I(7) \right)$  | f) $I(9) = \frac{1}{8a^2} \left( \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^8} - 7I(7) \right)$  |

**AM 169** Fie integralele

$$I(c) = \int \frac{x^c}{\sqrt{1 + x^2}} dx, \quad c \in \mathbb{N}.$$

Să se exprime  $I(2017)$  sub forma  $I(2017) = a x^{2016} \sqrt{1 + x^2} + b I(2015)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  și să se precizeze care dintre următoarele afirmații este adevărată.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| a) $a = b$            | b) $a - b = 1$   |
| c) $a \cdot b = 2016$ | d) $a = 2017b$   |
| e) $a + b = -2015$    | f) $\nexists a, b \in \mathbb{R}$ care să verifice relația |

**AM 170** Pentru  $b \in \mathbb{N}$  se consideră integralele

$$I(b) = \int \frac{x^b}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx, \quad x \in (-a, a), \quad a > 0.$$

Să se determine o relație între  $I(5)$  și  $I(3)$ .

- |  |  |
|--|--|
| a) $5I(5) = x^4 \sqrt{a^2 - x^2} - 3a^2 I(3)$  | b) $5I(5) = -x^4 \sqrt{a^2 - x^2} + 4a^2 I(3)$ |
| c) $5I(5) = 4x^4 \sqrt{a^2 - x^2} - 3a^2 I(3)$ | d) $I(5) = x^4 \sqrt{a^2 - x^2} - 2a^2 I(3)$   |
| e) $I(5) = 4x^4 \sqrt{a^2 - x^2} - 5a^2 I(3)$  | f) $4I(5) = x^4 \sqrt{a^2 - x^2} - 3a^2 I(3)$  |

**AM 171** Să se calculeze

$$\int_1^e \frac{1 + 2 \ln x}{x(2 + \ln x)} dx.$$

- |                            |                          |                           |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| a) $3 \ln 2 + 3 \ln 3 + 2$ | b) $\ln \frac{9e^2}{32}$ | c) $6 + \ln \frac{9}{8e}$ |
| d) $2 \ln 2 + 3 \ln 3 + 1$ | e) $\ln \frac{8e^2}{27}$ | f) $4 - \ln \frac{3}{2e}$ |

**AM 172** Să se calculeze

$$\int_0^1 e^{-3x} \cos \pi x dx.$$

- |                                      |                                   |                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| a) $\frac{3(1 + e^{-3})}{9 + \pi^2}$ | b) $\frac{2(1 + e^2)}{4 + \pi^2}$ | c) $\frac{1 + e^{-3}}{9 + \pi^2}$    |
| d) $\frac{1 + e^3}{4 + \pi^2}$       | e) $\frac{2(1 + e^3)}{9 + \pi^2}$ | f) $\frac{3(1 + e^{-3})}{4 + \pi^2}$ |

**AM 173** Să se calculeze  $\int_0^1 \frac{x - x^3}{x^4 + 1} dx.$

a)  $\frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{8}$

b)  $\frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}$

c)  $\pi - 2 \ln 2$

d)  $2\pi - 4 \ln 2$

e)  $\frac{\pi}{2} - \frac{\ln 2}{2}$

f)  $\frac{\pi}{6} - \frac{\ln 2}{3}$

**AM 174** Să se calculeze  $\int_0^1 \frac{x^2}{x^4 + 4} dx.$

a)  $\frac{\arctg 3 - \ln 5}{8}$

b)  $\frac{\arctg 2 - \ln 2}{4}$

c)  $\frac{2\arctg 3 - \ln 2}{4}$

d)  $\frac{2\arctg 2 - \ln 5}{8}$

e)  $\frac{\arctg 4 - \ln 3}{8}$

f)  $\frac{2\arctg 4 - \ln 3}{4}$

**AM 175** Să se calculeze  $\int_1^e (2x + 1) \ln x dx.$

a)  $\frac{1}{2}(e + 3)$

b)  $\frac{1}{3}(e^2 + 2)$

c)  $\frac{1}{2}(e^2 + 3)$

d)  $\frac{1}{2}(e^2 - 2)$

e)  $\frac{1}{3}(e - 3)$

f)  $\frac{1}{3}(e^2 + 1)$

**AM 176** Să se calculeze  $\int_0^2 \frac{x^5}{\sqrt{1+x^3}} dx.$

a)  $\frac{40}{9}$

b)  $\frac{10}{3}$

c)  $\frac{50}{9}$

d)  $\frac{20}{3}$

e)  $\frac{10}{9}$

f)  $\frac{40}{3}$

**AM 177** Să se calculeze  $\int_1^4 \frac{dx}{(4x - 1)\sqrt{x}}.$

a)  $\sqrt{5}$

b)  $\frac{1}{2}\ln\frac{5}{2}$

c)  $\ln\frac{9}{2}$

d)  $\ln\frac{5}{2}$

e)  $\frac{1}{2}\ln\frac{9}{5}$

f)  $3\sqrt{5}$

**AM 178** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{3+x^2}, & |x| \leq \sqrt{3} \\ 0, & |x| > \sqrt{3}, \end{cases} \quad a \in \mathbb{R}^*$$

și integrala  $F(x) = \int_{-e}^x f(t)dt$ . Să se calculeze  $F(1) - F(0)$ .

- a) 0      b) 1      c)  $a\sqrt{3}$       d)  $2a$       e)  $2a\sqrt{3}$       f)  $\frac{a\pi}{6\sqrt{3}}$

**AM 179** Să se calculeze  $\int_5^{45} \frac{1}{x+3\sqrt{2x-9}} dx$ .

- a)  $2 \ln 3 - 2$       b)  $\ln \frac{9}{e}$       c)  $\ln \frac{12}{\sqrt{e}}$   
 d)  $4 - \ln 3$       e)  $\ln \frac{12}{e}$       f)  $\ln \frac{8}{e}$

**AM 180** Să se calculeze  $\int_7^{27} \frac{1}{x+\sqrt{2x-5}} dx$ .

- a)  $\ln \frac{10}{7} - \operatorname{arctg} \frac{2}{25}$       b)  $\ln \frac{17}{5} - \operatorname{arctg} 6 + \operatorname{arctg} 3$   
 c)  $\ln \frac{17}{5} - \operatorname{arctg} \frac{2}{9}$       d)  $\ln \frac{10}{9} - \operatorname{arctg} \frac{9}{25}$   
 e)  $\ln \frac{34}{7} - \operatorname{arctg} 4 + \operatorname{arctg} 2$       f)  $\ln \frac{34}{5} - \operatorname{arctg} \frac{4}{3}$

**AM 181** Să se determine valoarea integralei  $\int_{-1}^1 |x| \arcsin x dx$ .

- a)  $-\frac{\pi}{2}$       b)  $-1$       c)  $1$       d)  $\frac{\pi}{2}$       e)  $0$       f)  $\pi$

**AM 182** Să se determine valoarea integralei

$$\int_{-1}^1 |x| \arcsin^2 x \, dx.$$

- a)  $\frac{\pi}{8}$       b)  $\frac{\pi^2}{8}$       c)  $\frac{\pi}{4}$       d)  $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}$       e)  $\frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{2}$       f)  $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}$

**AM 183** Să se determine valoarea parametrului  $a > 0$  astfel încât integrala

$$\int_{-a}^a \frac{x^4}{1 + e^x} \, dx$$

să ia valoarea 20000.

- a) 4      b)  $\frac{1}{2}$       c)  $e$       d) 1      e) 10      f) 100

**AM 184** Să se calculeze valoarea integralei

$$\int_0^{1024} \frac{\ln(2017 - x)}{\ln[1505^2 - (512 - x)^2]} \, dx.$$

- |         |                               |                      |
|---------|-------------------------------|----------------------|
| a) 2017 | b) $993 \cdot 2017$           | c) $1024 \cdot 2017$ |
| d) 512  | e) $\frac{993 \cdot 2017}{2}$ | f) $993 \cdot 1024$  |

**AM 185** Să se calculeze

$$\int_1^3 x[x] \, dx,$$

unde  $[a]$  reprezintă partea întreagă a numărului real  $a$ .

- a)  $\frac{11}{2}$       b)  $\frac{11}{3}$       c)  $\frac{13}{2}$       d)  $\frac{13}{3}$       e) 4      f) 5

**AM 186** Se consideră funcția  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = [mx], \quad m > 0,$$

unde  $[a]$  reprezintă partea întreagă a numărului real  $a$ . Să se determine constanta  $m$  pentru care  $\int_0^1 f(x)dx = \frac{3}{2}$ .

- a) 1      b)  $\frac{1}{2}$       c)  $\frac{3}{4}$       d) 2      e) 4      f) 8

**AM 187** Studiați dacă există  $a \in (0, \infty)$  pentru care  $\int_{-a}^a [x] dx = -82$ , unde  $[x]$  reprezintă partea întreagă a lui  $x$ . În caz afirmativ, precizați valoarea parametrului  $a$ .

- a) nu există      b) 40      c) 41      d) 81      e) 82      f) 164

**AM 188** Să se determine multimea tuturor valorilor parametrului  $m \in [-2, 3]$  pentru care

$$\int_{-2}^3 (x + |m - x|) dx = 9.$$

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| a) $\left\{-\frac{1}{2}, 2\right\}$ | b) $\{0, 1\}$                                 | c) $\left\{\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right\}$ |
| d) $\left\{-2, \frac{1}{2}\right\}$ | e) $\left\{-\frac{3}{2}, \frac{2}{3}\right\}$ | f) $\{-1, 3\}$                               |

**AM 189** Să se calculeze integrala

$$\int_0^{12} x \sqrt{14 - \sqrt{13^2 - x^2}} dx.$$

- a)  $\frac{2400}{49}$       b)  $\frac{2536}{15}$       c)  $\frac{2188}{15}$       d)  $\frac{2195}{17}$       e)  $\frac{2638}{49}$       f)  $\frac{2600}{17}$

**AM 190** Să se calculeze integrala definită

$$\int_{-2}^1 (1 - |x|) \, dx.$$

- a) 1      b) 2      c)  $\frac{1}{2}$       d)  $-\frac{1}{2}$       e)  $-2$       f) 0

**AM 191** Să se calculeze integrala definită

$$\int_{-2}^2 \left(1 - \left||x| - 1\right|\right) dx.$$

- a) 0      b) 1      c) 2      d)  $\frac{1}{2}$       e)  $-1$       f)  $-\frac{1}{2}$

**AM 192** Să se calculeze

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \min \left\{ \sin x, \frac{1}{2} \right\} dx.$$

- a)  $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$       b)  $\frac{\pi}{6} + \frac{3}{2}$       c)  $\frac{\pi}{3} + \frac{3}{2}$   
d)  $\frac{\pi + 6 - 3\sqrt{3}}{6}$       e)  $\frac{\pi + 3 + 3\sqrt{3}}{6}$       f)  $\frac{2\pi}{3} + 1$

**AM 193** Să se calculeze

$$\int_0^\pi \min \{ \sin x, \cos x \} \, dx.$$

- a)  $\sqrt{2}$       b)  $1 - \sqrt{2}$       c) 0      d)  $2\pi$       e)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       f)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

**AM 194** Să se calculeze

$$\int_{-1}^1 \max \{1, 2^x\} \, dx.$$

a)  $\ln 2 + 1$

b)  $\ln 2 - 1$

c)  $1 - \frac{1}{\ln 2}$

d)  $1 + \frac{1}{\ln 2}$

e)  $-1 + \frac{1}{\ln 2}$

f)  $\ln 2$

**AM 195** Să se calculeze valoarea integralei

$$\int_0^1 \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2} dx.$$

a)  $\frac{\pi}{2} + 1$

b)  $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{4}$

c)  $\frac{\pi}{4} + 1$

d)  $\frac{\pi}{8} + 1$

e)  $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$

f)  $\frac{\pi - 1}{4}$

**AM 196** Să se calculeze valoarea integralei

$$\int_{\sqrt{3}}^3 \frac{1}{(x^2 + 9)^2} dx.$$

a)  $\frac{\pi - 3\sqrt{3}}{324}$

b)  $\frac{\pi - 3\sqrt{3} + 3}{648}$

c)  $\frac{\pi - 3\sqrt{3} + 6}{648}$

d)  $\frac{\pi + 3}{648}$

e)  $\frac{6\sqrt{3} - 3}{648}$

f)  $\frac{\pi + 3\sqrt{3} - 6}{324}$

**AM 197** Se consideră funcția inversabilă  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{-x^3 + 2x^2 - 5x + 8}{x^2 + 7}.$$

Să se calculeze  $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{8}{7}} f^{-1}(y) dy$ , unde  $f^{-1}$  reprezintă inversa funcției  $f$ .

a)  $1 + \ln \frac{8}{7} - \frac{6\sqrt{7}}{7} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{7}}{7}$

b)  $1 + \ln \frac{7}{8} - \frac{\sqrt{7}}{6} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{7}}{7}$

c)  $1 + \ln \frac{8}{7}$

d)  $-1 - \ln \frac{8}{7} + \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{6}$

e)  $2 + \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{7}}{7}$

f) 0

**AM 198** Fie integrala

$$I(a) = \int_1^3 \frac{dx}{|x-a|+1}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Să se calculeze  $\lim_{a \rightarrow \infty} I(a)$ .

- a) 0      b)  $\infty$       c) 2      d)  $\ln 3$       e) 1      f)  $\frac{1}{2}$

**AM 199** Să se calculeze integrala

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin x + \cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx.$$

- |  |   |   |
|--|---|---|
| a) $\frac{\pi}{3} + \frac{9}{10} \ln \frac{9}{10}$ | b) $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{10} \ln \frac{9}{2}$ | c) $\frac{\pi}{5} + \frac{3}{10} \ln \frac{9}{2}$ |
| d) $\frac{2\pi}{5} + \frac{10}{3} \ln \frac{2}{9}$ | e) $\frac{\pi}{4} + \frac{10}{7} \ln \frac{9}{2}$ | f) $\frac{\pi}{5} + \frac{3}{4} \ln \frac{9}{2}$  |

**AM 200** Să se calculeze

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{3 + \cos^2 x} dx.$$

- a)  $\frac{\pi^2}{4}$       b)  $\frac{\pi}{4}$       c)  $\frac{\pi^2}{\sqrt{3}}$       d)  $\frac{\pi^2 \sqrt{3}}{6}$       e)  $\frac{\pi^2 \sqrt{3}}{12}$       f)  $\frac{\pi^2 \sqrt{3}}{18}$

**AM 201** Să se calculeze integrala

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos \frac{x}{2}}{1 + e^{ax}} dx,$$

unde  $a \in \mathbb{R}$ .

- a)  $2a$       b)  $\frac{a\pi}{2}$       c)  $\frac{1}{2}$       d) 2      e)  $e^{a\pi}$       f)  $2e^a$

**AM 202** Să se determine constanta reală  $a$  pentru care valoarea integralei

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{a}{\sin x \cos x} dx$$

este  $\ln \sqrt[4]{3}$ .

- a) 2      b) 1      c)  $\pi$       d)  $\sqrt{3}$       e)  $\frac{1}{2}$       f)  $\frac{1}{3}$

**AM 203** Se consideră integralele

$$C = \int_0^{\pi/4} \cos^4 x \, dx \quad \text{și} \quad S = \int_0^{\pi/4} \sin^4 x \, dx.$$

Să se precizeze care dintre următoarele afirmații este adevărată.

- |                             |                              |                             |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| a) $C + S = \frac{3\pi}{8}$ | b) $C - S = \frac{\pi}{2}$   | c) $C + S = \frac{\pi}{16}$ |
| d) $C - S = 0$              | e) $C + S = \frac{3\pi}{16}$ | f) $C - S = \frac{3\pi}{4}$ |

**AM 204** Să se calculeze integrala definită

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} dx.$$

- |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a) $\frac{2\sqrt{3} + \pi}{6}$ | b) $\frac{6\sqrt{3} - \pi}{2}$ | c) $\frac{3\sqrt{3} + \pi}{6}$ |
| d) $\frac{5\sqrt{3} - \pi}{3}$ | e) $\frac{4\sqrt{3} - \pi}{6}$ | f) $\frac{5\sqrt{3} + \pi}{2}$ |

**AM 205** Să se calculeze integrala definită  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^5 x \cos x \, dx$ .

- a)  $\frac{13}{129}$       b)  $\frac{31}{129}$       c)  $\frac{13}{192}$       d)  $\frac{31}{192}$       e)  $\frac{27}{129}$       f)  $\frac{71}{192}$

**AM 206** Să se calculeze integrala definită

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^4 2x \sin 2x \, dx.$$

- a) 0      b)  $-\frac{1}{10}$       c)  $\frac{1}{10}$       d)  $\frac{1}{5}$       e)  $-\frac{1}{5}$       f) 1

**AM 207** Se consideră integralele definite

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^a x \, dx, \quad \text{unde } a \in \mathbb{N}.$$

Să se calculeze produsul  $aI(a)I(a-1)$  pentru toate valorile lui  $a \in \mathbb{N}^*$ .

- a)  $\frac{\pi a}{2}$       b)  $\frac{\pi}{2(a-1)!}$       c)  $\pi$       d)  $\frac{\pi}{2}$       e)  $\frac{\pi a}{a-1}$       f)  $\frac{\pi(a-1)}{2}$

**AM 208** Fie integralele

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^a x \, dx, \quad \text{unde } a \in \mathbb{N}.$$

Să se precizeze care dintre următoarele relații este adevărată pentru  $a \in \mathbb{N}$ ,  $a \geq 2$ .

- a)  $I(a) = \frac{\pi}{2} - I(a-1)$     b)  $I(a) = \frac{a-1}{a} I(a-2)$     c)  $I(a) = \frac{1}{a+1} I(a-2)$   
d)  $I(a) = \frac{a-1}{a} I(a-1)$     e)  $I(a) = \frac{\pi}{2} - I(a-2)$     f)  $I(a) = \frac{a}{a+1} I(a-2)$

**AM 209** Fie  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  funcția definită prin

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1, \\ n (\operatorname{sign} x)^{n+1}, & |x| = 1, \quad n \in \mathbb{N}^*, \end{cases}$$

unde  $\operatorname{sign}$  reprezintă funcția semn. Să se calculeze  $\int_{-1}^1 f(x) \, dx$ .

- |                               |                                |                           |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| a) $\frac{1}{n}$              | b) $\cos \frac{\pi}{n}$        | c) $\frac{1 + (-1)^n}{n}$ |
| d) $\frac{1 + (-1)^{n+1}}{n}$ | e) $(-1)^n \cos \frac{\pi}{n}$ | f) 0                      |

**AM 210** Să se calculeze

$$\int_0^{\ln 2} \frac{x}{1 + e^{-x}} dx + \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{x}{1 - e^{-x}} dx.$$

- |                    |                        |                      |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| a) $\ln 2 \ln 3$   | b) $\ln 2 + 4 \ln 3$   | c) $\ln 2 + \ln 3$   |
| d) $2 \ln 2 \ln 3$ | e) $3 \ln 2 + 2 \ln 3$ | f) $\ln 2 + 2 \ln 3$ |

**AM 211** Să se determine numărul real  $m$  pentru care are loc identitatea

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \sqrt[3]{x}} dx = m \int_1^2 (x - 1)^2 \sqrt{x} dx.$$

- |         |      |         |
|---------|------|---------|
| a) 3, 5 | b) 2 | c) 3    |
| d) 1, 5 | e) 1 | f) 2, 5 |

**AM 212** Să se calculeze  $\lim_{a \rightarrow \infty} I(a)$ , unde

$$I(a) = \int_{\frac{1}{a}}^a \frac{1}{x^2 + x + 1} dx, \quad \text{unde } a > 1.$$

- |                             |                            |                             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| a) $\frac{2\pi\sqrt{3}}{3}$ | b) $\frac{\pi}{2}$         | c) $\frac{2\pi\sqrt{3}}{9}$ |
| d) $\pi\sqrt{3}$            | e) $\frac{\pi\sqrt{3}}{3}$ | f) 1                        |

**AM 213** Să se calculeze

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{a^2} e^{-\sqrt{x}} dx.$$

- |                  |             |                  |
|------------------|-------------|------------------|
| a) $\frac{1}{2}$ | b) 2        | c) $\sqrt{2}$    |
| d) 4             | e) $\infty$ | f) $\frac{1}{4}$ |

**AM 214** Să se calculeze valoarea limitei

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\int_0^{\cos x} e^{t^2} dt}{\int_0^{\operatorname{ctg} x} \ln(t^2 + 2) dt} .$$

- a) 1      b)  $\frac{1}{2}$       c)  $\frac{1}{\ln 2}$       d)  $\frac{2}{\ln 2}$       e) 0      f)  $\ln 2$

**AM 215** Fie  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funcția definită prin  $F(x) = \int_x^{2x} \frac{t^2}{t^2 + \sin^2 t} dt$ . Să se precizeze care dintre afirmațiile următoare este adevărată.

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| a) $F$ este crescătoare | b) $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$ |
| c) $F$ este pară        | d) $F$ este descrescătoare                |
| e) $F(1) = 0$           | f) nici un răspuns nu este corect         |

**AM 216** Să se calculeze  $I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin(101x) \cdot \sin^{99} x dx$ .

- |  |   |  |
|--|---|--|
| a) $\frac{\sqrt{3}}{100 \cdot 2^{101}}$  | b) $\frac{\sqrt{3}}{101 \cdot 2^{100}}$ | c) $-\frac{\sqrt{3}}{100 \cdot 2^{101}}$ |
| d) $-\frac{\sqrt{3}}{101 \cdot 2^{100}}$ | e) $\frac{1}{2^{101}}$                  | f) $\frac{1}{10100}$                     |

**AM 217** Se consideră funcția continuă  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât  $f(2x) = 3f(x)$ , pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ . Dacă

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 ,$$

să se calculeze

$$\int_1^2 f(x) dx .$$

- a) 1      b) 2      c) 3      d) 4      e) 5      f) 6

**AM 218** Să se calculeze

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n^2}} \right).$$

- |                    |                |                         |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| a) 1               | b) 0           | c) $\sqrt{2}$           |
| d) $2\sqrt{2} - 2$ | e) $2\sqrt{2}$ | f) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |

**AM 219** Să se calculeze limita şirului cu termenul general

$$a_n = \frac{\pi}{3n} \left[ \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3n}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3n}\right) + \dots + \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{n\pi}{3n}\right) \right].$$

- |                  |                          |                  |
|------------------|--------------------------|------------------|
| a) $\pi$         | b) $\frac{3}{\pi}$       | c) $\frac{1}{2}$ |
| d) $\frac{1}{3}$ | e) $\frac{1}{\pi} \ln 3$ | f) $\ln 2$       |

**AM 220** Să se calculeze

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+4} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2} \right).$$

- |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| a) $\frac{\pi}{2}$ | b) $\frac{3}{\pi}$ | c) $\frac{2}{\pi}$ |
| d) $\frac{\pi}{4}$ | e) 1               | f) $\frac{\pi}{6}$ |

**AM 221** Să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \int_0^1 x^n e^{x^2} dx.$

- |                  |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| a) 0             | b) $\frac{1}{2}$ | c) 1        |
| d) $\frac{e}{2}$ | e) $e$           | f) $\infty$ |

**AM 222** Să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \int_0^1 x^n e^{-ax^2} dx$ , unde  $a > 0$ .

- a)  $e^a$       b)  $e^{-a}$       c)  $1 + ae^2$       d)  $e^{-2a}$       e)  $e^{2a}$       f)  $1 - ae^2$

**AM 223** Un mobil pornește de pe loc și se deplasează în linie dreaptă timp de  $T$  minute,  $T > 1$ , număr întreg, cu viteza

$$v(t) = \begin{cases} t & , 0 \leq t \leq 60 \\ 60 + \frac{1}{\pi} \sin \pi(t-60) & , 60 < t \leq 60T \end{cases}$$

măsurată în metri/secundă. Să se calculeze  $a_1$ , accelerația atinsă de mobil la un minut de la pornire și  $d$ , distanța parcursă în cele  $T$  minute.

- a)  $a_1 = 60T$  m/s<sup>2</sup> și  $d = 1740 - T$  m;  
 b)  $a_1 = 2T$  m/s<sup>2</sup> și  $d = 1740 + 60T$  m;  
 c)  $a_1 = 60T$  m/s<sup>2</sup> și  $d = 1800 - T$  m;  
 d)  $a_1 = 2T$  m/s<sup>2</sup> și  $d = 1800 + 60T$  m;  
 e)  $a_1 = 1$  m/s<sup>2</sup> și  $d = 1800(2T - 1)$  m;  
 f)  $a_1 = 1$  m/s<sup>2</sup> și  $d = 1800 + 60T$  m.

**AM 224** Variația sumei depuse într-un cont bancar de-a lungul unui deceniu este descrisă de funcția  $S : [0, 10] \rightarrow \mathbb{R}$ ,


$$S(t) = 2000 - 10t \cdot \exp\left(5 - \frac{t^2}{8}\right).$$

Să se stabilească la câți ani (notație:  $t_{\min}$ ) de la inițierea contului, depozitul atinge valoarea minimă  $S_{\min}$ . Care este valoarea medie  $S_{md}$  a funcției  $S$  în acest interval de timp?

- a)  $t_{\min} = 3$  ani,  $S_{\min} = 2000 - 20e^4\sqrt{e}$ ,  $S_{md} = 20e^{\frac{9}{2}} - 20e^5 + 2000$ ;  
 b)  $t_{\min} = 2$  ani,  $S_{\min} = 2000 - 18e^4\sqrt{e}$ ,  $S_{md} = 18e^{\frac{9}{2}} - 18e^5 + 1800$ ;  
 c)  $t_{\min} = 3$  ani,  $S_{\min} = 1800 - 20e^4\sqrt{e}$ ,  $S_{md} = 18e^{\frac{9}{2}} - 18e^5 + 2000$ ;

- d)  $t_{\min} = 5$  ani,  $S_{\min} = 1800 - 18e^4\sqrt{e}$ ,  $S_{md} = 18e^{\frac{9}{2}} - 20e^5 + 1800$ ;
- e)  $t_{\min} = 2$  ani,  $S_{\min} = 2000 - 20e^4\sqrt{e}$ ,  $S_{md} = 20e^{\frac{9}{2}} - 20e^5 + 2000$ ;
- f) Toate răspunsurile de mai sus sunt greșite.

**AM 225** Graficul unei primitivei  $F$  a unei funcții continuă  $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  este dat mai jos. Câte dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate?



- (i)  $F'(1) = f(1)$       (ii)  $f(1) = F(1)$       (iii)  $\int_0^2 f(x)dx = 3$   
 (iv)  $f(F(-2)) > 0$       (v)  $f(x) < 0, \forall x \in (-1, 1)$

- a) 0      b) 1      c) 3      d) 2      e) 4      f) 5

**AM 226** Să se determine aria subgraficului funcției  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{x+1}{x+3}.$$

a)  $\ln \frac{16}{9}$

b)  $2 - \ln \frac{16}{9}$

c)  $1 - \ln \frac{16}{9}$

d)  $\ln \frac{9}{16}$

e)  $1 - \ln \frac{9}{16}$

f) 2

**AM 227** Să se determine aria mulțimii mărginite cuprinse între

$$y = \frac{x^2 + 3}{x + 3} \quad \text{și} \quad y = 2.$$

a)  $12 - 3 \ln 3$

b)  $12 + 3 \ln 3$

c)  $16 - 3 \ln 3$

d)  $16 - 12 \ln 3$

e)  $16 - \ln 12$

f)  $\ln 12$

**AM 228** Să se calculeze aria domeniului mărginit ce este cuprins între parabolele  $y = 2x^2 + 5x - 3$  și  $y = 6 - x - x^2$ .

a)  $2^5$

b) 12

c)  $2^4$

d) 60

e)  $2^6$

f) 34

**AM 229** Să se calculeze aria domeniului plan mărginit, delimitat de curbele de ecuații  $y = 3 - x^2$ ,  $y = 2x$ .

a)  $\frac{32}{3}$

b)  $\frac{32}{5}$

c)  $\frac{16}{5}$

d)  $\frac{2}{15}$

e)  $\frac{1}{3}$

f)  $\frac{1}{5}$

**AM 230** Să se determine aria domeniului mărginit, delimitat de parabola  $y^2 = 10x$  și dreapta  $y = 5x$ .

a)  $\frac{3}{2}$

b)  $\frac{4}{3}$

c)  $\frac{9}{2}$

d)  $\frac{2}{15}$


e)  $\frac{1}{3}$

f)  $\frac{1}{5}$

**AM 231** Să se determine aria domeniului mărginit, delimitat de parabola  $x = y - y^2$  și dreapta  $x + y = 0$ .

- a)  $\frac{3}{2}$       b)  $\frac{4}{3}$       c)  $\frac{9}{2}$       d)  $\frac{2}{15}$       e)  $\frac{1}{3}$       f)  $\frac{1}{5}$

**AM 232** Graficul unei funcții derivabile  $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$  este afișat mai jos.



Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate ?

$A_1$ : Există o funcție constantă  $g : [a, b] \rightarrow (0, \infty)$  astfel încât aria subgraficului lui  $g$  să coincidă cu aria subgraficului lui  $f|_{[a,b]}$

$A_2$ : Există cel mult un punct  $x_0 \in (a, c)$  cu proprietatea că  $f'(x_0) = 0$

$A_3$ : Valoarea integralei  $\int_a^c f(x) dx$  este  $2 \int_a^b f(x) dx$

$A_4$ : Punctul  $x_0 = b$  este punct de inflexiune pentru  $f$

$A_5$ : Funcția  $f : [a, c] \rightarrow \left[ \frac{a-b}{2}, \frac{b-a}{2} \right]$  este surjectivă

$A_6$ : Valoarea integralei  $\int_a^c |f(x)| dx$  este mai mare decât  $\frac{(b-a)^2}{2}$

- |                        |                   |                             |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| a) $A_1, A_5$ și $A_6$ | b) $A_3$ și $A_5$ | c) $A_1, A_3, A_4$ și $A_5$ |
| d) toate               | e) $A_2$ și $A_4$ | f) $A_3, A_5$ și $A_6$      |

**AM 233** Fie funcțiile  $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definite prin:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

respectiv

$$h(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt.$$

Să se calculeze aria suprafeței delimitate de graficul funcției  $h$  și axa  $Ox$ .

- a) 4      b) 1      c) 0      d) 2      e) 6      f) 8

**AM 234** Să se determine volumul corpului de rotație generat de graficul funcției  $f : [0, 6] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt[4]{7 - x^2 + 6x}$ .

- |  |  |
|--|--|
| a) $\pi \left( 3\sqrt{3} + 12 \arcsin \frac{1}{4} \right)$ | b) $\pi \left( 3\sqrt{7} - 12 \arcsin \frac{1}{4} \right)$       |
| c) $\pi \left( 3\sqrt{7} + 16 \arcsin \frac{3}{4} \right)$ | d) $\pi \left( \ln \frac{3}{4} + 16 \arcsin \frac{3}{4} \right)$ |
| e) $\pi \left( 3\sqrt{7} + \ln \frac{3}{4} \right)$        | f) $\pi \left( 7\sqrt{3} - 16 \arcsin \frac{5}{6} \right)$       |

**AM 235** Să se calculeze volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei  $Ox$  a graficului funcției  $f : \left[0, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \cos x$ .

- |   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| a) $\frac{4\pi^4}{9} - \frac{3\pi^2}{2}$  | b) $\frac{1}{16}\pi^2(3\pi^2 + 2)$ | c) $\frac{\pi^4}{16} - \frac{3\pi^2}{4}$ |
| d) $\frac{9\pi^4}{16} - \frac{3\pi^2}{8}$ | e) $\frac{3}{8}\pi^2(\pi^2 - 2)$   | f) $\frac{8\pi^4}{9} - \frac{3\pi^2}{8}$ |

**AM 236** Să se calculeze volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei  $Ox$  a cercului de ecuație  $x^2 + (y-2)^2 - 1 = 0$ .

- a)  $2\pi$       b)  $2\pi^2$       c)  $\pi$       d)  $\pi^2$       e)  $4\pi$       f)  $4\pi^2$

**AM 237** Să se calculeze volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei  $Ox$  a elipsei de ecuație  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - 1 = 0$ .

- a)  $12\pi$       b)  $10\pi$       c)  $16\pi$       d)  $12\pi^2$       e)  $10\pi^2$       f)  $16\pi^2$

**AM 238** Să se determine parametrul  $m$  așa încât volumul corpului obținut prin rotirea graficului funcției

$$f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2 \left( x - \frac{m}{x} \right)$$

în jurul axei  $Ox$  să fie egal cu volumul unei sfere de rază 1.

- a) 3      b) 2      c) -1      d) -2      e) 4      f) -3

**AM 239** Să se calculeze volumul corpului obținut prin rotirea în jurul axei  $Ox$  a graficului funcției  $f : [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{\sqrt{\ln(1+x)}}{x}.$$

- |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| a) $\pi \ln \frac{5}{\sqrt[3]{4}}$ | b) $\pi \ln \frac{4}{\sqrt[3]{3}}$ | c) $\frac{3\pi}{\sqrt[3]{4}}$      |
| d) $\frac{4\pi}{\sqrt[3]{3}}$      | e) $\pi \ln \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$ | f) $\pi \ln \frac{2}{\sqrt[3]{5}}$ |

**AM 240** Să se calculeze volumul corpului obținut prin rotirea în jurul axei  $Ox$  a graficului funcției  $f : [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+4}}.$$

- |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a) $\pi \ln \frac{5}{13}$   | b) $3\pi \ln \frac{13e}{5}$ | c) $\pi \ln \frac{5}{13}$   |
| d) $3\pi \ln \frac{5e}{13}$ | e) $2\pi \ln \frac{13}{5e}$ | f) $2\pi \ln \frac{5e}{13}$ |

**AM 241** Să se calculeze volumul corpului obținut prin rotirea în jurul axei  $Ox$  a graficului funcției  $f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin^2 x$ .

- a)  $\frac{3\pi^2}{4}$       b)  $\frac{3\pi}{4}$       c)  $\frac{3\pi}{16}$       d)  $\frac{3\pi^2}{8}$       e)  $\frac{3\pi^2}{16}$       f)  $\frac{3\pi}{8}$



## **ANEXE**

**Subiectele date la admitere  
în anii 2014-2022  
cu rezolvările  
integrale**

**SESIUNEA: IULIE, DATA 22.07.2014****A**

**1.(8p)** Fie ecuația  $\sqrt[3]{2-x} + \sqrt{x+7} = 3$ . Să se determine suma modulelor rădăcinilor ecuației.

- a) 1      b) 29      c) 36      d) 25      e) 37

**2.(10p)** Să se calculeze

$$E = \sum_{i=1}^{2014} \left[ \left( 1 + \frac{1}{i} \right) \sum_{k=1}^i k!(k^2 + 1) \right].$$

- a)  $2014!$       b)  $2014! - 1$       c)  $2015!$       d)  $2015! - 2$       e)  $2016! - 2$

**3.(8p)** Fie matricea  $A = (a_{ij})_{i,j=1,2,3}$  cu elementele date de

$$a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i+j}, & \text{dacă } i = j, \\ (-1)^{i+j} C_j^i, & \text{dacă } i < j, \\ 0, & \text{dacă } i > j, \end{cases}$$

unde  $C_j^i$  reprezintă combinări de  $j$  luate câte  $i$ . Să se calculeze  $A^{-1}$ .

- |  |   |  |
|--|---|--|
| a) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$    | c) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ |
| d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  | e) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ |  |

**4.(7p)** Se consideră grupul  $(\mathcal{M}, \cdot)$ , unde

$$\mathcal{M} = \left\{ A(m) = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, m \in \mathbb{Z} \right\}$$

și ”.” este operația de înmulțire a matricelor. Să se determine simetricul elementului  $A(2014)$ .

- a)  $A(1)$       b)  $A(0)$       c)  $A(-2014)$       d)  $A(-1)$       e)  $A\left(\frac{1}{2014}\right)$

**5.(9p)** Se consideră polinoamele

$$f = (X - 2014)(X - 2016) \text{ și } g = (X - 2015)^{2014} + X - 2001.$$

Să se determine restul împărțirii lui  $g$  la  $f$ .

- a)  $X + 2014$     b)  $X - 2000$     c)  $X - 2016$     d)  $X - 2014$     e)  $X + 2016$

**6.(9p)** Știind că  $a \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$  și  $\sin a + \cos a = \frac{7}{5}$ , să se afle  $\operatorname{tg} \frac{a}{2}$ .

- a)  $\frac{1}{3}$       b)  $\frac{1}{2}$       c) 1      d)  $\frac{1}{2}$  și  $\frac{1}{3}$       e)  $\sqrt{2} - 1$

**7.(7p)** Dreapta  $d : 2x + y - 2 = 0$  intersectează axele de coordonate în punctele  $A$  și  $B$ . Să se determine coordonatele punctului  $C$  astfel ca punctul  $G(3, 2)$  să fie centrul de greutate al triunghiului  $ABC$ .

- a)  $(8, 4)$       b)  $\left(1, \frac{1}{2}\right)$       c)  $(3, 5)$       d)  $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$       e)  $(6, 2)$

**8.(9p)** Fie funcția  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \operatorname{arctg} x$ . Să se determine asymptotele la graficul funcției  $f$ .

- a)  $y = \frac{\pi}{2}x - 1$       b)  $y = \frac{\pi}{2}x - 1$ ,  $y = -\frac{\pi}{2}x - 1$       c)  $y = -\frac{\pi}{2}x + 1$   
d) nu există      e)  $y = -\frac{\pi}{2}x + 1$ ,  $y = \frac{\pi}{2}x + 1$

**9.(7p)** Fie  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{\sin x^2}$ , unde  $D$  este domeniul maxim de definiție. Să se studieze derivabilitatea lui  $f$  în punctul  $x_0 = 0$ . În caz afirmativ să se determine  $f'(0)$ .

- a)  $f$  este derivabilă în  $x_0 = 0$  și  $f'(0) = -1$
- b)  $f$  este derivabilă în  $x_0 = 0$  și  $f'(0) = 2$
- c)  $f$  este derivabilă în  $x_0 = 0$  și  $f'(0) = 1$
- d)  $f$  nu este derivabilă în  $x_0 = 0$
- e)  $f$  este derivabilă în  $x_0 = 0$  și  $f'(0) = 0$

**10.(10p)** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{ax + a - 2}{x^2 + 1},$$

unde  $a$  este un parametru real. Să se determine  $a$  astfel încât funcția să aibă un extrem în punctul  $x = 1$ .

- a) -2
- b) 1
- c) -1
- d) 3
- e) 2

**11.(9p)** Să se calculeze

$$\int_{-1}^0 |4x^2 - 11x - 3| dx.$$

- a)  $\frac{435}{96}$
- b)  $\frac{135}{32}$
- c)  $\frac{221}{48}$
- d)  $\frac{37}{96}$
- e)  $\frac{231}{48}$

**12.(7p)** Calculați aria cuprinsă între graficul funcției  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \ln^2 x$ , axa  $Ox$  și dreptele  $x = \frac{1}{e}$  și  $x = e$ .

- a)  $\frac{e^2}{2} - \frac{5}{4e^2}$
- b)  $\frac{e^2}{4} - \frac{5}{4e^2}$
- c)  $\frac{e^2}{2} - \frac{3}{4e^2}$
- d)  $\frac{e^2}{4} - \frac{7}{4e^2}$
- e)  $\frac{e^2}{8} - \frac{5}{4e^2}$

## SOLUȚII AC+ETC 2014

**1.** Punem condiția de existență  $x + 7 \geq 0$  și obținem  $x \in [-7, +\infty)$ .

Notăm  $\sqrt[3]{2-x} = u$  și  $\sqrt{x+7} = v$  și atunci avem  $2-x = u^3$  și  $x+7 = v^2$ , de unde obținem sistemul

$$\begin{cases} u^3 + v^2 = 9 \\ u + v = 3 \end{cases}$$

cu soluțiile  $u_1 = 0$ ,  $v_1 = 3$ ,  $u_2 = 2$ ,  $v_2 = 1$ ,  $u_3 = -3$  și  $v_3 = 6$ , adică  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = -6$  și  $x_3 = 29$ .

În concluzie, suma modulelor rădăcinilor ecuației este

$$|2| + |-6| + |29| = 37.$$

Răspuns corect: e).

**2.**

$$\begin{aligned} E &= \sum_{i=1}^{2014} \left\{ \left(1 + \frac{1}{i}\right) \sum_{k=1}^i k![(k+1)^2 - 2(k+1) + 2] \right\} = \\ &= \sum_{i=1}^{2014} \left\{ \left(1 + \frac{1}{i}\right) \sum_{k=1}^i [k!(k+1)(k+1) - 2k!(k+1) + 2k!] \right\} = \\ &= \sum_{i=1}^{2014} \left\{ \left(1 + \frac{1}{i}\right) \left[ \sum_{k=1}^i [(k+1)!(k+1)] - 2 \sum_{k=1}^i [(k+1)! - k!] \right] \right\} = \\ &= \sum_{i=1}^{2014} \left\{ \left(1 + \frac{1}{i}\right) \left[ \sum_{k=1}^i [(k+1)!(k+2-1)] - 2[(i+1)! - 1] \right] \right\} = \\ &= \sum_{i=1}^{2014} \left\{ \frac{1+i}{i} \left[ \sum_{k=1}^i [(k+2)! - (k+1)!] - 2(i+1)! + 2 \right] \right\} = \\ &= \sum_{i=1}^{2014} \left\{ \frac{1+i}{i} [(i+2)! - 2 - 2(i+1)! + 2] \right\} = \\ &= \sum_{i=1}^{2014} \left\{ \frac{1+i}{i} [(i+1)!(i+2) - 2(i+1)!] \right\} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^{2014} \left[ \frac{1+i}{i} (i+1)! i \right] = \sum_{i=1}^{2014} [(1+i)(i+1)!] = \\
&= \sum_{i=1}^{2014} [(2+i-1)(i+1)!] = \sum_{i=1}^{2014} [(2+i)! - (i+1)!] = \\
&= 2016! - 2
\end{aligned}$$

Răspuns corect: e).

### 3. Cum

$$\begin{aligned}
a_{11} &= (-1)^{1+1} = 1, \quad a_{22} = (-1)^{2+2} = 1, \quad a_{33} = (-1)^{3+3} = 1, \\
a_{12} &= (-1)^{1+2} C_2^1 = -2, \quad a_{13} = (-1)^{1+3} C_3^1 = 3, \quad a_{23} = (-1)^{2+3} C_3^2 = -3, \\
a_{21} &= 0, \quad a_{31} = 0, \quad a_{32} = 0,
\end{aligned}$$

rezultă că

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

și atunci

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Răspuns corect: b).

### 4. Simetricul elementului

$$A(2014) = \begin{pmatrix} 1 & 2014 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

în raport cu înmulțirea matricelor este

$$[A(2014)]^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2014 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A(-2014).$$

Răspuns corect: c).

5. Cum restul împărțirii polinomului  $g$  la  $f$  este un polinom de grad cel mult 1, din Teorema împărțirii cu rest avem

$$g = f \cdot q + ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

unde  $q$  este câtul împărțirii, adică

$$(x - 2015)^{2014} + x - 2001 = (x - 2014)(x - 2016) \cdot q + ax + b.$$

Pentru  $x = 2014$  și  $x = 2016$ , ecuația precedentă ne conduce la sistemul

$$\begin{cases} 2014a + b = 14 \\ 2016a + b = 16 \end{cases}$$

cu soluția  $a = 1$  și  $b = -2000$ .

În concluzie, restul căutat este  $X - 2000$ .

Răspuns corect: b).

6. Cum  $a \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$  rezultă că  $\frac{a}{2} \in \left(0, \frac{\pi}{8}\right)$ , iar  $\tan \frac{a}{2} \in (0, \sqrt{2} - 1)$ , deoarece

$$\tan \frac{\pi}{4} = \frac{2 \tan \frac{\pi}{8}}{1 - \tan^2 \frac{\pi}{8}} \Leftrightarrow \tan^2 \frac{\pi}{8} + 2 \tan \frac{\pi}{8} - 1 = 0,$$

adică  $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$ .

Deci, relația din enunț este echivalentă cu

$$\frac{2 \tan \frac{a}{2}}{1 + \tan^2 \frac{a}{2}} + \frac{1 - \tan^2 \frac{a}{2}}{1 + \tan^2 \frac{a}{2}} = \frac{7}{5}, \quad \text{unde } \tan \frac{a}{2} \in (0, \sqrt{2} - 1),$$

adică

$$6 \tan^2 \frac{a}{2} - 5 \tan \frac{a}{2} + 1 = 0,$$

de unde obținem că  $\tan \frac{a}{2} = \frac{1}{3}$  este singura soluție.

Răspuns corect: a).

**7.** Dreapta  $d$  intersectează axele de coordonate în punctele  $A(1, 0)$  și  $B(0, 2)$ .

Cum punctul  $G$  este centrul de greutate al  $\triangle ABC$ , rezultă că

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \Leftrightarrow 3 = \frac{1 + 0 + x_C}{3} \Leftrightarrow x_C = 8$$

și

$$y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \Leftrightarrow 2 = \frac{0 + 2 + y_C}{3} \Leftrightarrow y_C = 4.$$

Răspuns corect: a).

**8.** Cum  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ , rezultă că funcția  $f$  nu are asymptote orizontale.  
În continuare, verificăm dacă  $f$  are asymptote oblice, adică asymptote de forma  $y = mx + n$ , unde

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctgx = \pm\frac{\pi}{2}$$

și

$$\begin{aligned} n &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[ f(x) \mp \frac{\pi}{2}x \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \left( \arctgx \mp \frac{\pi}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\arctgx \mp \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\frac{x^2}{1+x^2} = -1. \end{aligned}$$

În concluzie,  $y = \frac{\pi}{2}x - 1$  este asymptotă oblică la  $+\infty$  și  $y = -\frac{\pi}{2}x - 1$  este asymptotă oblică la  $-\infty$ .

Răspuns corect: b).

**9.** Deoarece

$$\begin{aligned} f'_s(0) &= \lim_{x \nearrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \nearrow 0} \frac{\sqrt{\sin x^2}}{x} = \lim_{x \nearrow 0} \sqrt{\frac{\sin x^2}{x^2}} \cdot \frac{\sqrt{x^2}}{x} = \\ &= \lim_{x \nearrow 0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \nearrow 0} \frac{-x}{x} = -1 \end{aligned}$$

și

$$\begin{aligned} f'_d(0) &= \lim_{x \searrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \searrow 0} \frac{\sqrt{\sin x^2}}{x} = \lim_{x \searrow 0} \sqrt{\frac{\sin x^2}{x^2}} \cdot \frac{\sqrt{x^2}}{x} = \\ &= \lim_{x \searrow 0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \searrow 0} \frac{x}{x} = 1, \end{aligned}$$

rezultă că  $f$  nu este derivabilă în 0.

Răspuns corect: d).

**10.** Cum  $f$  admite un extrem în punctul  $x = 1$ , rezultă că  $f'(1) = 0$ .

Dar

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{a(x^2 + 1) - (ax + a - 2) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \\ &= \frac{ax^2 + a - 2ax^2 - 2ax + 4x}{(x^2 + 1)^2} = \\ &= \frac{-ax^2 + (4 - 2a)x + a}{(x^2 + 1)^2}, \end{aligned}$$

ceea ce ne conduce la ecuația  $4 - 2a = 0$  cu soluția reală  $a = 2$ .

Răspuns corect: e).

**11.** Deoarece

$$|4x^2 - 11x - 3| = \begin{cases} 4x^2 - 11x - 3, & \text{dacă } x \in \left(-\infty, -\frac{1}{4}\right] \cup [3, \infty) \\ -4x^2 + 11x + 3, & \text{dacă } x \in \left(-\frac{1}{4}, 3\right), \end{cases}$$

integrala devine

$$\int_{-1}^{-\frac{1}{4}} (4x^2 - 11x - 3)dx + \int_{-\frac{1}{4}}^0 (-4x^2 + 11x + 3)dx =$$

$$= \left( 4 \cdot \frac{x^3}{3} - 11 \cdot \frac{x^2}{2} - 3x \right) \Big|_{-1}^{-\frac{1}{4}} + \left( -4 \cdot \frac{x^3}{3} + 11 \cdot \frac{x^2}{2} + 3x \right) \Big|_{-\frac{1}{4}}^0 = \frac{221}{48} .$$

Răspuns corect: c).

**12.** Folosind formula de integrare prin părți de două ori, obținem

$$\begin{aligned} A &= \int_{\frac{1}{e}}^e x \ln^2 x dx = \int_{\frac{1}{e}}^e \left( \frac{x^2}{2} \right)' \ln^2 x dx = \frac{x^2}{2} \ln^2 x \Big|_{\frac{1}{e}}^e - \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{x^2}{2} (\ln^2 x)' dx = \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2e^2} - \int_{\frac{1}{e}}^e x \ln x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2e^2} - \int_{\frac{1}{e}}^e \left( \frac{x^2}{2} \right)' \ln x dx = \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2e^2} - \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_{\frac{1}{e}}^e - \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{x^2}{2} (\ln x)' dx = -\frac{1}{e^2} + \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{e}}^e x dx = \\ &= -\frac{1}{e^2} + \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4e^2} = \frac{e^2}{4} - \frac{5}{4e^2} . \end{aligned}$$

Răspuns corect: b).

**SESIUNEA: IULIE, DATA 22.07.2015**

A

**1.(7p)** Fie ecuația  $\sqrt[3]{1+\sqrt{x}} + \sqrt[3]{8-\sqrt{x}} = 3$ . Să se determine suma rădăcinilor ecuației.

- a)  $S = -49$     b)  $S = 49$     c)  $S = 0$     d)  $S = -48$     e)  $S = 48$

**2.(9p)** Fie sirul  $(x_n)_{n>1}$  cu termenul general

$$x_n = \left( 1 - \frac{1}{3} \right) \cdot \left( 1 - \frac{1}{6} \right) \cdot \dots \cdot \left( 1 - \frac{1}{C_{n+1}^2} \right), \quad n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}.$$

Să se determine suma tuturor elementelor multșimii

$$M = \left\{ n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\} : \frac{1}{2} \leq x_n \leq \frac{2}{3} \right\}.$$

- a) 7      b) 18      c) 9      d) 20      e) 12

**3.(9p)** Fie multșimile

$$M = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - 2| = 2 \text{ și } \left[ \frac{1}{|z - 3|} \right] = 1 \right\}, \quad P = \{|z| : z \in M\}.$$

Atunci:

- a)  $P \subset \left(4, \frac{\sqrt{70}}{2}\right]$       b)  $P = \left(4, \frac{35}{8}\right)$       c)  $P = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$   
 d)  $P \subset (1, 4]$       e)  $P = \left(4, \frac{\sqrt{75}}{2}\right)$

**4.(8p)** Să se determine multșimea valorilor parametrului real  $m$  pentru care sistemul

$$\begin{cases} mx - 2y = 1 \\ -2x + y = m \\ x + my = -2 \end{cases}$$

este compatibil.

- a)  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$       b)  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$       c)  $\{-1\}$       d)  $\{\pm 1, 2\}$       e)  $\{1\}$

**5.(7p)** Fie polinomul  $f = X^3 + aX^2 + bX + c, a, b, c \in \mathbb{R}$ . Să se determine  $(b+c)^a$  știind că restul împărțirii polinomului  $f$  la  $X^2 + 2$  să fie  $X + 1$  și restul împărțirii lui  $f$  la  $X + 1$  este 3.

- a) 49      b) 32      c)  $\frac{1}{64}$       d) 64      e) -27

**6.(10p)** Fie  $OA$  și  $OB$  două raze perpendiculare în cercul de centru  $O$  și rază  $2\sqrt{5}$ . Să se calculeze latura pătratului  $MNPQ$ , unde  $Q \in (OA)$ ,  $P \in (OB)$ , iar  $M$  și  $N$  aparțin arcului mic  $AB$ .

- a)  $\frac{\sqrt{10}}{2}$       b)  $\sqrt{5}$       c)  $2\sqrt{2}$       d) 2      e)  $\sqrt{2}$

**7.(8p)** Fie  $C$  simetricul punctului  $A(1, 2)$  față de punctul  $B(3, 4)$ . Prin  $C$  se duce o dreaptă  $d$  ce intersectează axa  $Ox$  în punctul  $P$ . Să se determine toate valorile pantei dreptei  $d$  astfel încât aria triunghiului  $APC$  să fie egală cu 4.

- a)  $-3, 1$       b)  $\frac{6}{5}, \frac{6}{7}$       c)  $-2, 0$       d)  $\frac{3}{2}, \frac{3}{4}$       e)  $1, \frac{6}{5}$

**8.(9p)** Să se determine

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x \ln(e^x + 1)).$$

- a)  $\infty$       b) 0      c) 1      d)  $-\infty$       e) nu există

**9.(10p)** Să se calculeze integrala

$$\int_1^2 \sqrt{\frac{x-1}{3-x}} dx.$$

- a)  $\frac{\pi}{2} + 1$       b)  $\frac{\pi}{2} - 1$       c)  $\pi + 1$       d)  $\pi - \frac{1}{2}$       e)  $\frac{\pi - 1}{2}$

**10.(8p)** Să se determine aria figurii plane situată în cadranul IV, mărginită de parabola  $y^2 = 9 - 2x$  și de dreapta  $2x - 3y = 9$ .

- a) 9      b)  $\frac{9}{2}$       c) 18      d)  $\frac{9}{4}$       e) 24

**11.(8p)** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (x^2 - 2x + 1)e^x$ . Să se determine multimea absciselor punctelor de extrem local ale funcției  $f$ .

- a)  $\{-1, 0\}$       b)  $\{0\}$       c)  $\{0, 1\}$       d)  $\{-1, 1\}$       e)  $\{1\}$

**12.(7p)** Fie funcția  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x) = x \ln x$ . Să se determine ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă 1.

- a)  $2y - x + 1 = 0$       b)  $y - x - 1 = 0$       c)  $y + x = 0$   
 d)  $y - x + 1 = 0$       e)  $y - 2x + 1 = 0$

### SOLUȚII AC+ETC 2015

**1.** Notând  $\sqrt[3]{1 + \sqrt{x}} = u$ ,  $\sqrt[3]{8 - \sqrt{x}} = v$  și eliminând  $x$  din cele două relații, se obține:

$$u + v = 3, u^3 + v^3 = 9,$$

cu soluțiile  $u = 2, v = 1$  și  $u = 1, v = 2$ . Rezultă  $x = 49$  sau  $x = 0$ .

Răspuns corect: b).

**2.** Avem succesiv:

$$\begin{aligned} x_n &= \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{C_{n+1}^2}\right) = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{2}{C_{k+1}^2}\right) \\ &= \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{2}{k(k+1)}\right) = \prod_{k=2}^n \frac{k^2 + k + 2}{k(k+1)} = \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)} \\ &= \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+2}{k+1} = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \prod_{k=2}^n \frac{k+2}{k+1} = \frac{n+2}{3n}. \end{aligned}$$

Rămâne de rezolvat în  $\mathbb{N}$  inecuația:

$$\frac{1}{2} \leq \frac{n+2}{3n} \leq \frac{2}{3},$$

deci  $n \in \{2, 3, 4\}$ .

Răspuns corect: c).

**3.** Considerăm numărul complex  $z$  scris în forma algebrică, adică  $z = a + ib$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ . Din condiția  $|z - 2| = 2$  se obține  $a^2 + b^2 = 4a$ , adică  $-a^2 + 4a = b^2 \geq 0$ , ceea ce implică  $a \in [0, 4]$ .

Din a doua relație,  $1 \leq \frac{1}{|z - 3|} < 2$  rezultă  $\frac{1}{4} < 9 - 2a \leq 1$ , deci  $a \in \left[4, \frac{35}{8}\right)$ . Înănd acum cont că  $a \in [0, 4]$  avem unica soluție  $a = 4, b = 0$  sau  $z = 4$ , deci  $P = \{4\}$ .

Răspuns corect: d).

**4.** Din Teorema Kronecker-Capelli, sistemul este compatibil dacă și numai dacă rang  $A = \text{rang } \bar{A}$ . Cum rangul maxim al lui  $A$  este 2, rezultă că determinantul lui  $\bar{A}$  trebuie să fie 0, adică  $m = 1$ . Se verifică ușor că pentru  $m = 1$  avem rang  $A = \text{rang } \bar{A} = 2$ , deci sistemul este compatibil.

Răspuns corect: e).

**5.** Aplicând Teorema lui Bézout rezultă că  $f(-1) = 3$  și aplicând apoi Teorema împărțirii cu rest, rezultă că există polinomul  $Q$  astfel încât

$$f(x) = (x^2 + 2)Q(x) + x + 1.$$

Coroborând acum cele două informații, avem  $a - b + c = 4$ . Înlocuind în polinomul  $f$  pe  $c = 4 - a + b$  și împărțindu-l la  $X^2 + 2$  se obține restul  $(b - 2)X + 4 - 3a + b$ , care trebuie să coincidă cu  $X + 1$ . Se obțin  $a = 2, b = 3, c = 5$ .

Răspuns corect: d).

**6.** Notând cu  $x$  lungimea segmentelor  $[OQ]$  și  $[OP]$ , cu  $C$  proiecția punctului  $O$  pe latura  $PQ$  și cu  $D$  proiecția punctului  $O$  pe latura  $MN$  rezultă imediat că latura pătratului  $MNPQ$  este  $x\sqrt{2}$ ,  $OC = \frac{x\sqrt{2}}{2}$ , iar  $OD = \frac{3x\sqrt{2}}{2}$ . Aplicând Teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic  $OMD$  se obține că  $x = 2$ , deci latura pătratului  $MNPQ$  este  $PQ = 2\sqrt{2}$ .

Răspuns corect: c).

**7.** Cum  $C$  este simetricul punctului  $A(1, 2)$  față de  $B(3, 4)$ , se obține imediat că  $C(5, 6)$ . Fie  $P(p, 0)$ ,  $p \in \mathbb{R}$ . Atunci, aria triunghiului  $APC$  se calculează astfel:

$$A_{\Delta APC} = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ p & 0 & 1 \\ 5 & 6 & 1 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} |2p + 2| = 4,$$

de unde rezultă că  $p = 1$  sau  $p = -3$ . Dacă  $p = 1$  atunci panta dreptei  $AP$  este  $m = \frac{3}{2}$ , iar dacă  $p = -3$  se obține  $m = \frac{3}{4}$ .

Răspuns corect: d).

**8.** Făcând schimbarea de variabilă  $e^x + 1 = y$ , avem:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x \ln(e^x + 1)) = \lim_{y \rightarrow \infty} (\ln^2(y-1) - \ln(y-1) \ln y) = \lim_{y \rightarrow \infty} \ln(y-1) \cdot \ln \frac{y-1}{y}.$$

Din cauza nedeterminării  $0 \cdot \infty$ , trecem unul din factori la numitorul celuilalt și aplicăm apoi de două ori Regula lui l' Hospital:

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{y-1}{y}}{\frac{1}{\ln(y-1)}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{-\ln^2(y-1)}{y} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{-2}{y-1} = 0.$$

Răspuns corect: b).

**9.** Amplificând raportul din integrală cu  $\sqrt{x-1}$  se obține:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \sqrt{\frac{x-1}{3-x}} dx &= \int_1^2 \frac{x-1}{\sqrt{(3-x)(x-1)}} dx = \int_1^2 \frac{x-1}{\sqrt{1-(x-2)^2}} dx \\ &= \int_1^2 \frac{x}{\sqrt{1-(x-2)^2}} dx - \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{1-(x-2)^2}} dx \\ &= -\sqrt{1-(x-2)^2} \Big|_1^2 + \arcsin(x-2) \Big|_1^2 = \frac{\pi}{2} - 1. \end{aligned}$$

Răspuns corect: b).

- 10.** Punctele de intersecție ale parabolei  $y^2 = 9 - 2x$  cu dreapta  $2x - 3y = 9$  sunt  $A(0, -3)$  și  $B\left(\frac{9}{2}, 0\right)$ . Cum graficul parabolei se află sub graficul dreptei pe tot interiorul intervalului  $\left[0, \frac{9}{2}\right]$ , aria suprafeței determinate de parabolă și dreaptă se calculează cu formula:

$$A = \int_0^{\frac{9}{2}} \left( \frac{2x - 9}{3} + \sqrt{9 - 2x} \right) dx = \frac{x^2}{3} \Big|_0^{\frac{9}{2}} - 3x \Big|_0^{\frac{9}{2}} - \frac{1}{3}(9 - 2x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{9}{2}} = \frac{9}{4}.$$

Răspuns corect: d).

- 11.** Știind că multimea punctelor de extrem local ale unei funcții se găsesc printre soluțiile primei derivate, rezolvăm ecuația  $f'(x) = 0$ . Se obțin soluțiile  $x = \pm 1$ . Folosind tabelul de monotonie al funcției  $f$  se observă că  $x = -1$  este punct de maxim local, iar  $x = 1$  este punct de minim local al funcției  $f$ .

Răspuns corect: d).

- 12.** Ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă 1 este:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1).$$

Cum  $f(1) = 0$  iar  $f'(1) = 1$ , se obține  $y = x - 1$ .

Răspuns corect: d).

**SESIUNEA: IULIE, DATA 26.07.2016**

**A**

- 1.(8p)** Să se determine valoarea minimă  $m$ , respectiv valoarea maximă  $M$ , a funcției  $f : [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = x^2 - 3x + 2.$$

- a)  $m = -\frac{1}{4}$ ,  $M = 0$       b)  $m = 0$ ,  $M = 42$       c)  $m = -42$ ,  $M = 0$   
d)  $m = 0$ ,  $M = 2$       e)  $m = -\frac{1}{4}$ ,  $M = 2$

**2.(9p)** Să se calculeze suma

$$S = \frac{1}{\sum_{k=1}^{2016} \log_2 k^2} + \frac{1}{\sum_{k=1}^{2016} \log_3 k^2} + \dots + \frac{1}{\sum_{k=1}^{2016} \log_{2016} k^2} - \frac{1}{3}.$$

- a)  $S = 0$       b)  $S = \frac{2015}{3}$       c)  $S = 2016$       d)  $S = \frac{1}{6}$       e)  $S = \frac{2}{3}$

**3.(7p)** Fie  $X \in \mathcal{M}_{1,3}(\mathbb{R})$  astfel încât

$$X \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -4 & 1 & -12 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Să se determine suma elementelor matricei  $X$ .

- a) 11      b) 12      c) 10      d) 4      e) 5

**4.(8p)** Fie  $G = (3, +\infty)$ . Să se găsească valorile parametrilor reali  $a$  și  $b$  astfel încât legea de compoziție

$$x * y = xy - 3x - 3y + a$$

să determine pe  $G$  o structură de grup abelian, iar aplicația  $f : \mathbb{R} \rightarrow G$ ,  $f(x) = e^x + b$  să fie morfism între grupul aditiv al numerelor reale  $(\mathbb{R}, +)$  și  $(G, *)$ .

- a)  $a = -12$ ,  $b = 3$       b)  $a = 3$ ,  $b = 12$       c)  $a = 12$ ,  $b = 3$   
d)  $a = 12$ ,  $b = -3$       e)  $a = 3$ ,  $b = -3$

**5.(7p)** Să se determine numărul de rădăcini întregi  $n$  ale polinomului

$$X^3 + X^2 + X - 3.$$

- a) 4      b) 0      c) 3      d) 1      e) 2

**6.(10p)** Să se determine multimea valorilor parametrului real  $m$  pentru care nu există  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  astfel încât

$$\cos 4x + (m+3)(\sin x + \cos x)^2 - 3m - 2 = 0.$$

- a)  $m \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$       b)  $m \in [1, 2)$       c)  $m = 2$   
 d)  $m = 3$       e)  $m \in (2, 3)$

**7.(9p)** În sistemul cartezian  $xOy$  se consideră punctele  $A(1, -2)$  și  $B(1, 3)$ . Să se determine valoarea parametrului pozitiv  $a$  pentru care punctul  $P(2, a)$  aparține bisectoarei unghiului  $AOB$ .

- a)  $10\sqrt{2} - 14$       b)  $\frac{\sqrt{2}}{10}$       c)  $14\sqrt{2} - 10$       d)  $\frac{\sqrt{3}}{10}$       e)  $\frac{1}{10}$

**8.(8p)** Să se calculeze

$$\lim_{x \searrow 0} x^x.$$

- a)  $\frac{1}{e}$       b) 0      c) 1      d)  $\infty$       e)  $e$

**9.(8p)** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^x - e \cdot x$ . Să se determine imaginea mulțimii  $\mathbb{R}$  prin  $f$ .

- a)  $[1, \infty)$       b)  $[e, \infty)$       c)  $(-\infty, 0]$       d)  $[0, \infty)$       e)  $\mathbb{R}$

**10.(8p)** Se consideră funcția  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{x} \cdot \ln x$ . Să se determine panta tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul  $A(1, 0)$ .

- a)  $\frac{1}{2}$       b) 0      c)  $\frac{3}{2}$       d) 1      e)  $e$

**11.(8p)** Să se calculeze integrala

$$\int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x(1 + \sqrt{\ln x})^3} dx.$$

- a)  $\frac{5}{4} - 2 \ln 2$     b)  $2 \ln 2 - \frac{1}{4}$     c)  $\frac{3}{4} - \ln 4$     d)  $\ln 4 - \frac{5}{4}$     e)  $2 \ln 2 - \frac{5}{6}$

**12.(10p)** Să se calculeze aria suprafeței cuprinse între graficul funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 + 4}},$$

axa  $Ox$  și dreptele  $x = 1$ , respectiv  $x = 3$ .

- a)  $\sqrt{13} - \sqrt{5} + 2 \ln \frac{(\sqrt{13} - 3)(\sqrt{5} + 1)}{4}$   
 b)  $\sqrt{5} + \sqrt{13} - 4\sqrt{2} + 2 \ln \frac{(3 + 2\sqrt{2})(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{13} - 3)}{4}$   
 c)  $13\sqrt{5} - 4 \ln (3 + 2\sqrt{2})$   
 d)  $4\sqrt{2} + \sqrt{13} - \sqrt{5} + 2 \ln \frac{(3 + 2\sqrt{2})(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{13} - 3)}{4}$   
 e)  $\sqrt{5} + \sqrt{13} - 4\sqrt{2} - 2 \ln \frac{(3 + 2\sqrt{2})(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{13} - 3)}{4}$

### SOLUȚII AC+ETC 2016

1. Cum vârful parabolei asociate funcției  $f(x)$  este  $V\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}\right)$ , minimul funcției pe intervalul  $[1, 3]$  este  $m = -\frac{1}{4}$ ; în plus,  $f(1) = 0, f(3) = 2$ , deci maximul este  $M = 2$ .

Răspuns corect: e).

**2.** Suma dată se poate scrie succesiv:

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{1}{\log_2 1 + \log_2 2^2 + \dots + \log_2 2016^2} + \frac{1}{\log_3 1 + \log_3 2^2 + \dots + \log_3 2016^2} + \\
 &\quad + \dots + \frac{1}{\log_{2016} 1 + \log_{2016} 2^2 + \dots + \log_{2016} 2016^2} - \frac{1}{3} \\
 &= \frac{1}{\log_2 1^2 \cdot 2^2 \cdot \dots \cdot 2016^2} + \frac{1}{\log_3 1^2 \cdot 2^2 \cdot \dots \cdot 2016^2} + \dots + \frac{1}{\log_{2016} 1^2 \cdot 2^2 \cdot \dots \cdot 2016^2} - \frac{1}{3} \\
 &= \log_{1^2 \cdot 2^2 \cdot \dots \cdot 2016^2} 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2016 - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

Răspuns corect: d).

**3.** Considerând  $X = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$ , ecuația devine:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -4 & 1 & -12 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Se obțin relațiile  $2a - 4b + c = 1$ ,  $b = 2$ ,  $5a - 12b + 3c = 3$  de unde  $a = 0$ ,  $b = 2$ ,  $c = 9$ , deci  $X = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 9 \end{pmatrix}$ .

Răspuns corect: a).

**4.** Din condiția ca legea de compozitie să fie asociativă se obține  $a = 12$ . Se observă că pentru această valoare a parametrului  $a$  restul axiomelor grupului sunt îndeplinite. Folosind definiția morfismului între două grupuri,  $f(x+y) = f(x) \star f(y)$ , avem succesiv:

$$f(x+y) = e^{x+y} + b$$

și

$$f(x) \star f(y) = e^{x+y} + (b-3)e^x + (b-3)e^y + b^2 - 4b + 12.$$

Egalând cele două expresii, se obține  $(b-3)(e^x + e^y + b + 4) = 0$  pentru orice  $x, y \in \mathbb{R}$ , adică  $b = 3$ .

Răspuns corect: c).

5. Se observă că suma coeficienților polinomului este 0, deci  $x = 1$  este rădăcină a polinomului. Împărțind polinomul la  $X - 1$  (sau folosind Schema lui Horner) se obține câtul  $X^2 + 2X + 3$  care, având discriminantul negativ, nu mai are rădăcini reale. Deci polinomul are o singură rădăcină întreagă.

Răspuns corect: d).

6. Ecuația dată se poate scrie sub forma:

$$-2 \sin^2 2x + (m+3) \sin 2x - 2m + 2 = 0.$$

Notând  $\sin 2x = t$ , ecuația devine:

$$-2t^2 + (m+3)t - 2m + 2 = 0,$$

și are rădăcinile  $t_1 = 2, t_2 = \frac{m-1}{2}$ . Cum prima rădăcină este în afara intervalului  $[0, 1]$ , rămâne ca și a doua rădăcină să fie în afara aceluiași interval, adică  $\frac{m-1}{2} < 0$  și  $\frac{m-1}{2} > 1$ . Se obține  $m \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$ .

Răspuns corect: a).

7. Folosind proprietatea punctelor aflate pe bisectoarea unui unghi de a se afla la distanțe egale de laturile unghiului, punem condiția  $d(P, OB) = d(P, OA)$ . Se găsesc ecuațiile dreptelor  $OA : y = -2x$  și  $OB : y = 3x$ , deci distanțele de la punctul  $P$  aflat pe bisectoare la acestea sunt:

$$d(P, OA) = \frac{|4+a|}{\sqrt{5}}, \quad d(P, OB) = \frac{|6-a|}{\sqrt{10}}.$$

Egalând cele două expresii se obține  $a = 10\sqrt{2} - 14$ .

Răspuns corect: a).

8. Observăm că suntem în cazul nedeterminării  $0^0$ , deci avem succesiv:

$$\lim_{x \searrow 0} x^x = \lim_{x \searrow 0} e^{x \ln x} = \lim_{x \searrow 0} e^{\frac{\ln x}{x}}.$$

Aplicând Regula lui l' Hospital, se obține:

$$\lim_{x \searrow 0} e^{\frac{\ln x}{x}} = \lim_{x \searrow 0} e^{\frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}}} = e^{-\lim_{x \searrow 0} x} = e^0 = 1.$$

Răspuns corect: c).

**9.** Soluția ecuației  $f'(x) = 0$  este  $x = 1$  iar limitele la capetele domeniului de definiție sunt  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ . Folosind tabloul de variație al funcției, se obține că  $Imf = [0, \infty)$ .

Răspuns corect: d).

**10.** Panta tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul  $A(1, 0)$  este  $f'(1) = 1$ .

Răspuns corect: d).

**11.** Folosind substituția  $\ln x = t$ ,  $\frac{1}{x} dx = dt$ , integrala devine:

$$\int_1^2 \frac{\sqrt{t}}{(1 + \sqrt{t})^3} dt = 2 \int_1^2 \frac{t}{2\sqrt{t}(1 + \sqrt{t})^3} dt.$$

Se face apoi schimbarea de variabilă  $1 + \sqrt{t} = s$ ,  $\frac{1}{2\sqrt{t}} dt = ds$  și se obține:

$$2 \int_1^2 \frac{(s-1)^2}{s^3} ds = 2 \left( \int_1^2 \frac{1}{s} ds - 2 \int_1^2 \frac{1}{s^2} ds + \int_1^2 \frac{1}{s^3} ds \right) = 2 \ln 2 - \frac{5}{4}.$$

Răspuns corect: d).

**12.** Observând că funcția  $f$  este pozitivă pe intervalul  $[2, 3]$  și negativă pe  $[1, 2]$ , aria se va calcula astfel:

$$\begin{aligned} A &= \int_1^2 \frac{2-x}{\sqrt{x^2+4}} dx + \int_2^3 \frac{x-2}{\sqrt{x^2+4}} dx \\ &= 2 \ln(x + \sqrt{x^2+4}) \Big|_1^2 - \sqrt{x^2+4} \Big|_1^2 + \sqrt{x^2+4} \Big|_2^3 - 2 \ln(x + \sqrt{x^2+4}) \Big|_2^3 \end{aligned}$$

$$= \sqrt{5} + \sqrt{13} - 4\sqrt{2} + 2 \ln \frac{(3 + 2\sqrt{2})(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{13} - 3)}{4}.$$

Răspuns corect: b).

**SESIUNEA: IULIE, DATA 25.07.2017**

**A**

**1.(9p)** Fie  $x_1$  și  $x_2$  soluțiile ecuației

$$x^2 - 2a(x - 1) - x(a + 1) = -a,$$

unde  $a$  este un parametru real. Să se calculeze  $x_1^2 + x_2^2 - 1$ .

- a)  $9a^2 + 1$       b)  $9a^2 - 12a$       c)  $9a^2 - 1$       d)  $9a^2$       e)  $9a^2 - 3a + 12$

**2.(7p)** Să se determine numărul termenilor raționali ai dezvoltării binomului

$$(\sqrt[3]{5} - \sqrt[5]{2})^{80}.$$

- a) 3      b) 4      c) 5      d) 6      e) 7

**3.(8p)** Să se calculeze valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a-2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b-2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c-2)^2 \end{vmatrix}.$$

- a) 0      b)  $-4(b-a)(c-a)(c-b)$   
 c)  $12(b-a)(c-a)(c-b)$       d)  $4(b-a)(c-a)(b-c)$   
 e)  $12(a-b)(c-a)(b-c)$

**4.(9p)** Fie multimea numerelor reale înzestrată cu legea de compozitie

$$x * y = 2xy - 6(x + y) + 21$$

pentru orice  $x, y \in \mathbb{R}$ . Produsul soluțiilor ecuației  $2^x * 2^{-x} = 8$  este:

- a) 0      b)  $-1$       c) 1      d) 2      e)  $\frac{1}{2}$

**5.(10p)** Să se determine restul împărțirii polinomului  $(2X^3 + X + 1)^{2017}$  la polinomul  $X^2 - X + 1$ .

- a)  $X - 1$       b)  $X$       c)  $X + 1$       d)  $-X + 1$       e)  $-X - 1$

**6.(7p)** În paralelogramul  $ABCD$ , unghiurile  $\widehat{BAC}$  și  $\widehat{ABC}$  au măsurile de  $30^\circ$ , respectiv  $135^\circ$ , iar lungimea laturii  $AD$  este 3. Să se calculeze aria paralelogramului  $ABCD$ .

- a)  $\frac{9}{4}(3 - \sqrt{3})$       b)  $\frac{3}{2}(3 - \sqrt{3})$       c)  $\frac{9}{2}(\sqrt{3} + 1)$   
 d)  $\frac{9}{4}(\sqrt{3} - 1)$       e)  $\frac{9}{2}(\sqrt{3} - 1)$

**7.(8p)** Prin punctul  $A$  de intersecție a dreptelor  $d_1 : x + y - 2 = 0$  și  $d_2 : 2x - y - 4 = 0$  se duce o dreaptă  $d$  paralelă cu dreapta de ecuație  $y = x$ . Fie  $P$  un punct oarecare al dreptei  $d$ , diferit de  $A$ . Să se calculeze raportul dintre distanța de la  $P$  la  $d_1$  și distanța de la  $P$  la  $d_2$ .

- a)  $2\sqrt{5}$       b)  $\sqrt{5}$       c)  $\sqrt{10}$       d)  $\frac{\sqrt{10}}{2}$       e)  $2\sqrt{10}$

**8.(8p)** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{3x^4}{x^2 + 1}$ . Să se calculeze

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( f(e^x) \right)^{\frac{1}{x}}.$$

- a)  $e^3$       b)  $e$       c) 1      d)  $e^2$       e)  $\infty$

**9.(8p)** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2e^{-x}$ . Să se calculeze  $f''(-1)$ .

- a)  $7e$       b)  $-7e$       c)  $e$       d)  $-3e$       e)  $4e$

**10.(8p)** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{|x^2 - 4x|}$ . Să se determine multimea tuturor punctelor de extrem local ale funcției  $f$ .

- a)  $\{2\}$       b)  $\{0, 2, 4\}$       c)  $\{2, 4\}$       d)  $\{0, 4\}$       e)  $\emptyset$

**11.(8p)** Să se determine  $a \in \mathbb{R}$  astfel încât

$$\int_{-a}^a \frac{x^4}{e^x + 1} dx = -\frac{32}{5}.$$

- a) 1      b)  $-\sqrt[3]{3^2}$       c)  $-3\sqrt[3]{3^2}$       d) 2      e) -2

**12.(10p)** Să se calculeze volumul corpului obținut prin rotirea în jurul axei  $Ox$  a graficului funcției  $f : [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{\sqrt{\ln(1+x)}}{x}.$$

- a)  $\frac{\pi}{3} \ln \frac{27}{4}$       b)  $\frac{\pi}{3} \ln \frac{64}{3}$       c)  $\frac{\pi}{3} \ln \frac{9}{4}$       d)  $\frac{\pi}{3} \ln \frac{3\sqrt{3}}{4}$       e)  $\pi \ln \frac{5}{\sqrt[3]{4}}$

### SOLUȚII AC+ETC Iulie 2017

**1.** Deoarece ecuația din enunț este echivalentă cu  $x^2 - (3a + 1)x + 3a = 0$ , se observă că  $x_1 + x_2 = 3a + 1$  și  $x_1 x_2 = 3a$ , de unde

$$x_1^2 + x_2^2 - 1 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 - 1 = 9a^2.$$

Răspuns corect: d).

**2.** Termenul general din dezvoltarea binomului  $(\sqrt[3]{5} - \sqrt[5]{2})^{80}$  fiind

$$T_{k+1} = C_{80}^k (\sqrt[3]{5})^{80-k} (\sqrt[5]{2})^k = C_{80}^k 5^{\frac{80-k}{3}} 2^{\frac{k}{5}}, \quad k \in \overline{0, 80},$$

el este număr rațional dacă și numai dacă sunt satisfăcute simultan condițiile:

$$\frac{80-k}{3} \in \mathbb{N} \quad \text{și} \quad \frac{k}{5} \in \mathbb{N},$$

adică  $k \in \{5, 20, 35, 50, 65, 80\}$ .

Răspuns corect: d).

**3.** Făcând operații cu coloane și linii, determinantul poate fi scris

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{ccc} a^2 & (a+1)^2 & (a-2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b-2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c-2)^2 \end{array} \right| \xrightarrow[C_2:=\underline{C}_2-C_1]{} \left| \begin{array}{ccc} a^2 & 2a+1 & -4a+4 \\ b^2 & 2b+1 & -4b+4 \\ c^2 & 2c+1 & -4c+4 \end{array} \right| \xrightarrow[C_3:=\underline{\underline{C}}_3+2C_2]{} \\ & = 6 \left| \begin{array}{ccc} a^2 & 2a+1 & 1 \\ b^2 & 2b+1 & 1 \\ c^2 & 2c+1 & 1 \end{array} \right| \xrightarrow[L_2:=\underline{\underline{L}}_2-L_1]{} 6 \left| \begin{array}{ccc} a^2 & 2a+1 & 1 \\ b^2-a^2 & 2(b-a) & 0 \\ c^2-a^2 & 2(c-a) & 0 \end{array} \right| = \\ & = 12(b-a)(c-a)(b-c). \end{aligned}$$

Răspuns corect: c).

**4.** Ecuația din enunț este echivalentă cu  $2(2^x + 2^{-x}) = 5$ , care are soluțiile  $x_1 = 1$  și  $x_2 = -1$ , deci produsul lor este  $-1$ .

Răspuns corect: b).

**5.** Cum restul împărțirii polinomului  $(2X^3 + X + 1)^{2017}$  la  $X^2 - X + 1$  este un polinom de grad cel mult 1, din Teorema împărțirii cu rest avem

$$(2x^3 + x + 1)^{2017} = (x^2 - x + 1) \cdot Q(x) + ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

unde  $Q$  este câtul împărțirii.

Fie  $\omega$  o rădăcină a polinomului  $X^2 - X + 1$ . Atunci  $\omega^3 = -1$  și  $\omega^2 - \omega + 1 = 0$ , adică  $\omega^2 = \omega - 1$  și înlocuind pe  $x$  cu  $\omega$  în relația de mai sus se obține

$$(\omega - 1)^{2017} = a\omega + b \Leftrightarrow (\omega^2)^{2017} = a\omega + b \Leftrightarrow \omega^2 = a\omega + b,$$

de unde rezultă că  $a = 1$  și  $b = -1$ , deci restul căutat este  $X - 1$ .

Răspuns corect: d).

**6.** Aplicând Teorema sinusurilor în triunghiul  $ABC$  se obține că

$$\frac{BC}{\sin(\widehat{BAC})} = \frac{AC}{\sin(\widehat{ABC})} \Leftrightarrow \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{AC} \Leftrightarrow AC = 3\sqrt{2}.$$

Cum  $m(\widehat{ACB}) = 15^\circ$  și

$$\cos(15^\circ) = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \cdot \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} + 1)$$

atunci din Teorema cosinusului avem că

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos(\widehat{ACB}) = 9(2 - \sqrt{3}) = \left[ \frac{3\sqrt{2}}{2}(\sqrt{3} - 1) \right]^2,$$

adică

$$A_{ABCD} = AB \cdot BC \cdot \sin(\widehat{ABC}) = \frac{9}{2}(\sqrt{3} - 1).$$

Răspuns corect: e).

**7.** Cum  $A$  este punctul de intersecție al dreptelor  $d_1$  și  $d_2$ , atunci coordonatele lui se găsesc rezolvând sistemul format din ecuațiile celor două drepte și obținem  $A(2, 0)$ , iar ecuația dreptei  $d$  este  $y = x - 2$ .

Fie  $P(p, p - 2) \in d$ ,  $p \neq 2$ . Raportul cerut este

$$\frac{d(P, d_1)}{d(P, d_2)} = \frac{\frac{2|p - 2|}{\sqrt{2}}}{\frac{|p - 2|}{\sqrt{5}}} = \sqrt{10}.$$

Răspuns corect: c).

**8.** Funcția  $f$  poate fi scrisă

$$f(x) = \frac{3x^4}{x^2 + 1} = 3x^2 \cdot \frac{x^2}{x^2 + 1} = 3x^2 \cdot \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} = 3x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2 + 1}\right)$$

și atunci

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(f(e^x)\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[3e^{2x} \left(1 - \frac{1}{e^{2x} + 1}\right)\right]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} 3^{\frac{1}{x}} e^2 \left(1 - \frac{1}{e^{2x} + 1}\right)^{\frac{1}{x}} = e^2.$$

Răspuns corect: d).

**9.** Observând că  $f'(x) = e^{-x}(2x - x^2)$  și  $f''(x) = e^{-x}(x^2 - 4x + 2)$ , rezultă că  $f''(-1) = 7e$ .

Răspuns corect: a).

**10.** Explicitând modulul, funcția  $f$  devine

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 4x}, & \text{dacă } x \in (-\infty, 0] \cup [4, +\infty) \\ \sqrt{-x^2 + 4x}, & \text{dacă } x \in (0, 4), \end{cases}$$

iar derivata sa este

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x - 2}{2\sqrt{x^2 - 4x}}, & \text{dacă } x \in (-\infty, 0) \cup (4, +\infty) \\ \frac{-x + 2}{2\sqrt{-x^2 + 4x}}, & \text{dacă } x \in (0, 4). \end{cases}$$

Din tabloul de variație al funcției se observă că punctele de extrem ale funcției sunt  $\{0, 2, 4\}$ .

Răspuns corect: b).

**11.** Notând integrala din enunț cu  $I$  și făcând schimbarea de variabilă  $-x = t$  obținem

$$I = \int_a^{-a} -\frac{t^4}{e^{-t} + 1} dt = \int_{-a}^a \frac{t^4 e^t}{e^t + 1} dt = \int_{-a}^a \frac{t^4 (e^t + 1 - 1)}{e^t + 1} dt =$$

$$= \int_{-a}^a \left( t^4 - \frac{t^4}{e^t + 1} \right) dt = \frac{t^5}{5} \Big|_{-a}^a - I \quad \Leftrightarrow \quad I = \frac{a^5}{5}$$

Prin urmare, soluția ecuației  $\frac{a^5}{5} = -\frac{32}{5}$  este  $a = -2$ .

Răspuns corect: e).

**12.** Volumul căutat este

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^3 \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = \pi \int_1^3 \ln(x+1) \left(-\frac{1}{x}\right)' dx = \\ &= \pi \left[ -\frac{1}{x} \ln(x+1) \Big|_1^3 + \int_1^3 \frac{1}{x(x+1)} dx \right] = \\ &= \pi \left[ \frac{1}{3} \ln 2 + \int_1^3 \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx \right] = \frac{\pi}{3} \ln \frac{27}{4}. \end{aligned}$$

Răspuns corect: a).

**SESIUNEA: SEPTEMBRIE, DATA 13.09.2017**

**A**

**1.(8p)** Fie  $x_1$  și  $x_2$  soluțiile ecuației

$$\log_2(6x^2 - 11x + 6) = 0.$$

Să se determine  $x_1 + x_2$ .

- |                  |      |                   |      |       |
|------------------|------|-------------------|------|-------|
| a) $\frac{5}{6}$ | b) 1 | c) $\frac{11}{6}$ | d) 8 | e) 12 |
|------------------|------|-------------------|------|-------|

**2.(9p)** Se consideră progresia aritmetică  $(a_n)_{n \geq 1}$  în care  $a_1 = 1$  și rația  $r = \frac{1}{2}$ . Să se determine  $a_5$ .

- |      |                  |      |      |                  |
|------|------------------|------|------|------------------|
| a) 3 | b) $\frac{5}{2}$ | c) 4 | d) 6 | e) $\frac{9}{2}$ |
|------|------------------|------|------|------------------|

**3.(8p)** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ . Să se calculeze determinantul matricei  $A^{2017}$ .

- a) 1      b)  $2^{2017}$       c)  $-2^{2017}$       d) 0      e)  $-1$

**4.(9p)** Să se rezolve sistemul

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = -1 \\ 2x + 2y + 3z = 2 \\ x - 2y - z = 4 \end{cases}$$

- a)  $(-2, 1, 1)$       b)  $(3, -2, -3)$       c)  $(-5, -3, 6)$   
 d)  $(0, -1, 0)$       e)  $(-14, -21, 24)$

**5.(7p)** Fie polinomul  $f = X^3 - 2X^2 + aX + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ . Să se determine  $a$  și  $b$  știind că  $-1$  este rădăcină a polinomului  $f$  și restul împărțirii polinomului  $f$  la  $X - 2$  este 6.

- a)  $a = 1, b = -1$       b)  $a = 1, b = 4$       c)  $a = 2, b = 4$   
 d)  $a = 0, b = 3$       e)  $a = -4, b = 1$

**6.(8p)** Să se calculeze  $\operatorname{tg} x$  știind că  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  și  $\sin x = \frac{3}{5}$ .

- a)  $-\frac{3}{4}$       b) 1      c)  $\frac{4}{5}$       d)  $\frac{3}{4}$       e)  $-\frac{4}{5}$

**7.(10p)** Fie  $a \in \mathbb{R}$  astfel încât punctul  $Q(4, -1)$  aparține dreptei

$$d : 2x + ay - 9 = 0.$$

Să se scrie ecuația dreptei ce conține punctul  $P(-1, 1)$  și este paralelă cu dreapta  $d$ .

- a)  $y = x + 2$       b)  $y = -x$       c)  $y = 2x + 3$   
 d)  $y = -2x - 1$       e)  $y = 2x + 1$

**8.(8p)** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 2x^4 + x^2 + 3$ . Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^4}$ .

- a)  $-2$       b)  $0$       c)  $\infty$       d)  $1$       e)  $2$

**9.(8p)** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \cos x$ . Să se determine ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă  $x_0 = 0$ .

- a)  $y = x$       b)  $y = 2x$       c)  $y = 0$   
 d)  $y = -x$       e)  $y = x + 1$

**10.(8p)** Să se determine multimea punctelor de extrem local ale funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = e^x(x^2 - 2x + 1).$$

- a)  $\{-1, 0\}$       b)  $\{-1, 1\}$       c)  $\{0\}$       d)  $\{0, 1\}$       e)  $\emptyset$

**11.(10p)** Să se calculeze aria suprafeței plane cuprinsă între graficul funcției  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = x \ln^2 x,$$

axa  $Ox$  și dreptele  $x = \frac{1}{e}$  și  $x = e$ .

- a)  $\frac{e^2}{8} - \frac{3}{e^2}$       b)  $\frac{e^2}{16} - \frac{7}{4e^2}$       c)  $\frac{e^2}{2} - \frac{7}{4e^2}$   
 d)  $\frac{e^2}{4} - \frac{5}{4e^2}$       e)  $\frac{e^2}{8} - \frac{5}{2e^2}$

**12.(7p)** Să se calculeze integrala nedefinită

$$\int \frac{x-3}{x^2+4x-5} dx$$

pe un interval  $I \subset (1, \infty)$ .

- a)  $\frac{4}{3} \ln(x+5) - \frac{1}{3} \ln(x-1) + C, C \in \mathbb{R}$
- b)  $\frac{1}{3} \ln(x+5) - \frac{4}{3} \ln(x-1) + C, C \in \mathbb{R}$
- c)  $\frac{4}{3} \ln(x+1) + \frac{1}{3} \ln(x+5) + C, C \in \mathbb{R}$
- d)  $\frac{1}{3} \ln(x-1) - \frac{4}{3} \ln(x+5) + C, C \in \mathbb{R}$
- e)  $\frac{1}{2} \ln(x+5) + \frac{4}{3} \ln(x-1) + C, C \in \mathbb{R}$

## SOLUȚII AC+ETC Septembrie 2017

**1.** Cum  $6x^2 - 11x + 6 > 0$  pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ , ecuația din enunț este echivalentă cu  $6x^2 - 11x + 5 = 0$  și atunci suma soluțiilor ei este  $\frac{11}{6}$ .

Răspuns corect: c).

**2.** Termenul căutat este  $a_5 = a_1 + 4r = 1 + 4 \cdot \frac{1}{2} = 3$ .

Răspuns corect: a).

**3.** Cum  $\det A = 0$ , rezultă că  $\det(A^{2017}) = (\det A)^{2017} = 0$ .

Răspuns corect: d).

**4.** Fie  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$  matricea asociată sistemului. Cum  $\det A = 1 \neq 0$ , rezultă că sistemul este compatibil determinat și aplicând Formulele lui Cramer se obține soluția  $x = -14$ ,  $y = -21$  și  $z = 24$ .

Răspuns corect: e).

5. Din condițiile  $f(-1) = 0$  și  $f(2) = 6$  rezultă sistemul

$$\begin{cases} a - b = -3 \\ 2a + b = 6 \end{cases}$$

care are soluția  $a = 1$  și  $b = 4$

Răspuns corect: b).

6. Din Formula fundamentală a trigonometriei rezultă că  $\cos x = \frac{4}{5}$ , de unde se obține că  $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{3}{4}$ .

Răspuns corect: d).

7. Cum  $Q(4, -1)$  aparține dreptei  $d$  se obține că  $2 \cdot 4 + a \cdot (-1) - 9 = 0$ , adică  $a = -1$ . Din faptul că dreapta căutată este paralelă cu dreapta  $d$  rezultă că pantele lor sunt egale cu 2 și prin urmare, ecuația ei este  $y = 2x + 3$ .

Răspuns corect: c).

8. Limita căutată poate fi scrisă

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 + x^2 + 3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 \left(2 + \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x^4}\right)}{x^4} = 2.$$

Răspuns corect: e).

9. Ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă 0 este:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0).$$

Cum  $f(0) = 0$  iar  $f'(0) = 1$ , se obține  $y = x$ .

Răspuns corect: a).

**10.** Cum  $f'(x) = e^x(x^2 - 1)$ , rezultă că  $x = \pm 1$  sunt cele două puncte de extrem ale funcției  $f$ .

Răspuns corect: b).

**11.** Aria căutată poate fi scrisă

$$\begin{aligned} A &= \int_{\frac{1}{e}}^e x \ln^2 x dx = \int_{\frac{1}{e}}^e \left( \frac{x^2}{2} \right)' \ln^2 x dx = \frac{x^2}{2} \ln^2 x \Big|_{\frac{1}{e}}^e - \int_{\frac{1}{e}}^e x \ln x dx = \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2e^2} - \int_{\frac{1}{e}}^e \left( \frac{x^2}{2} \right)' \ln x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2e^2} - \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_{\frac{1}{e}}^e + \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{e}}^e x dx = \frac{e^2}{4} - \frac{5}{4e^2}. \end{aligned}$$

Răspuns corect: d).

**12.** Integrala poate fi scrisă

$$\begin{aligned} \int \frac{x-3}{x^2+4x-5} dx &= \int \frac{x-3}{(x-1)(x+5)} dx = \\ &= -\frac{1}{3} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{4}{3} \int \frac{1}{x+5} dx = -\frac{1}{3} \ln(x-1) + \frac{4}{3} \ln(x+5) + C. \end{aligned}$$

Răspuns corect: a).

### SESIUNEA: IULIE, DATA 23.07.2018

A

**1.(7p)** Fie progresia geometrică  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ , având termenii strict pozitivi și rația 2018. Dacă

$$S = \frac{a_1 + a_2}{a_2 + a_3} + \frac{a_2 + a_3}{a_3 + a_4} + \dots + \frac{a_{2017} + a_{2018}}{a_{2018} + a_{2019}},$$

atunci:

- a)  $S = 1$     b)  $S = 2017$     c)  $S = \frac{2017}{2018}$     d)  $S = 2018$     e)  $S = \frac{2018}{2017}$

**2.(8p)** Fie mulțimea

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} : z \cdot \bar{z} = 2 \text{ și } \left| \frac{2z + 3}{z - 3i} \right| = 1 \right\}.$$

Dacă  $S = \sum_{z \in A} z$ , atunci:

- |                 |                                      |                 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| a) $S = 1 - 2i$ | b) $S = -\frac{4}{5} - \frac{2}{5}i$ | c) $S = 1 + 2i$ |
| d) $S = 3$      | e) $S = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$  |                 |

**3.(10p)** Să se calculeze valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} 0 & n+1 & C_1^1 \\ C_2^1 & (n+1)^2 & C_2^2 \\ C_3^2 & (n+1)^3 & C_3^3 \end{vmatrix}.$$

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a) $n(n+1)(n+2)$  | b) 0              |
| c) $n(n+1)(2n-1)$ | d) $n(n+1)(2n+1)$ |
| e) $n(n-1)(n+2)$  |                   |

**4.(9p)** Fie sistemul

$$\begin{cases} x + 3y + 4z = m \\ 2x + 4y + 6z = -1 \\ -2x + 6y + 4z = 5. \end{cases}$$

Să se determine valorile parametrului  $m \in \mathbb{R}$  pentru care sistemul este incompatibil.

- |                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| a) $\left\{ -\frac{1}{10} \right\}$ | b) $\left\{ \frac{1}{10} \right\}$                       | c) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{10} \right\}$ |
| d) $\emptyset$                      | e) $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{10} \right\}$ |   |

**5.(8p)** Se consideră polinoamele

$$f = (X - 2018)^{2017} + X - 2020 \text{ și } g = (X - 2017)(X - 2019).$$

Să se determine restul împărțirii lui  $f$  la  $g$ .

- |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| a) $4X - 8076$ | b) $X + 2019$  | c) $2X + 4038$ |
| d) $2X - 2019$ | e) $2X - 4038$ |                |

**6.(7p)** În triunghiul dreptunghic  $ABC$  cu  $m(\widehat{A}) = 90^\circ$ ,  $m(\widehat{B}) = 30^\circ$  și  $AB = 6$  se înscrive pătratul ce are două vârfuri pe ipotenuză și celelalte două, respectiv, pe câte o catetă. Să se afle lungimea laturii pătratului.

- |                                   |                                  |                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| a) $1 + \sqrt{3}$                 | b) $\frac{12}{13}(4 - \sqrt{3})$ | c) $\frac{6\sqrt{3} - 5}{2}$ |
| d) $\frac{12}{13}(4\sqrt{3} - 3)$ | e) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$         |                              |

**7.(9p)** Se dau punctele  $A(0, 1)$ ,  $B(1, 1)$  și  $C(4, 3)$ . Fie  $y = mx + n$  ecuația înăltimii triunghiului  $ABC$  dusă din  $A$ . Să se calculeze  $m \cdot n$ .

- |                   |                   |                  |                  |      |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|
| a) $-\frac{3}{2}$ | b) $-\frac{1}{2}$ | c) $\frac{5}{2}$ | d) $\frac{5}{3}$ | e) 1 |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|

**8.(8p)** Se consideră funcția  $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{4 - 3x^2}{x^3}.$$

Să se determine mulțimea valorilor funcției  $f$ .

- |                 |                   |              |              |                    |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| a) $\mathbb{R}$ | b) $[1, +\infty)$ | c) $[-1, 1]$ | d) $[-1, 2]$ | e) $[-1, +\infty)$ |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|

**9.(10p)** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = e^{-x}(ax + b), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Să se determine  $a, b \in \mathbb{R}$  astfel încât  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = 2$ .

- a)  $a = 1, b = 1$       b)  $a = 3, b = 1$       c)  $a = 2, b = 1$   
d)  $a = -2, b = -1$       e)  $a = 1, b = -1$

**10.(7p)** Fie funcția  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x - \operatorname{tg} x$ , unde  $D$  este domeniul maxim de definiție a funcției. Să se calculeze

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\operatorname{tg} x)}{3x^3}.$$

- a)  $-1$       b)  $\frac{1}{3}$       c)  $0$       d)  $-\frac{1}{3}$       e)  $-\frac{1}{9}$

**11.(8p)** Să se calculeze

$$\int_3^7 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x-1}}.$$

- a)  $\frac{\pi\sqrt{2}}{12}$       b)  $\frac{\pi\sqrt{2}}{3}$       c)  $\frac{\pi}{6}$       d)  $\frac{\pi}{12}$       e)  $\frac{\pi\sqrt{2}}{6}$

**12.(9p)** Să se calculeze aria suprafeței cuprinsă între graficele funcțiilor  $f, g : \left[0, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ , unde  $f(x) = \sin x$  și  $g(x) = \cos x$ .

- a)  $2\sqrt{2}$       b)  $2\sqrt{2} - 2$       c)  $2\sqrt{2} - 1$       d)  $4\sqrt{2} - 1$       e)  $4\sqrt{2} - 2$

SOLUȚII AC+ETC Iulie 2018

1. Cum  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  este o progresie geometrică, atunci suma poate fi scrisă

$$S = \frac{a_1 + a_1 r}{a_1 r + a_1 r^2} + \frac{a_1 r + a_1 r^2}{a_1 r^2 + a_1 r^3} + \dots + \frac{a_1 r^{2016} + a_1 r^{2017}}{a_1 r^{2017} + a_1 r^{2018}} =$$

$$= \frac{a_1(1+r)}{a_1r(1+r)} + \frac{a_1r(1+r)}{a_1r^2(1+r)} + \dots + \frac{a_1r^{2016}(1+r)}{a_1r^{2017}(1+r)} = \frac{1}{r} \cdot 2017 = \frac{2017}{2018}.$$

Răspuns corect: c).

**2.** Fie  $z = a + bi$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ . Atunci relația  $z \cdot \bar{z} = 2$  este echivalentă cu

$$a^2 + b^2 = 2. \quad (1)$$

Pe de altă parte, relația  $\left| \frac{2z+3}{z-3i} \right| = 1$  poate fi scrisă

$$\begin{aligned} \left( \frac{2z+3}{z-3i} \right) \cdot \overline{\left( \frac{2z+3}{z-3i} \right)} &= 1 \Leftrightarrow \left( \frac{2a+2bi+3}{a+bi-3i} \right) \cdot \overline{\left( \frac{2a+2bi+3}{a+bi-3i} \right)} = 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left( \frac{2a+2bi+3}{a+bi-3i} \right) \cdot \left( \frac{2a+3-2bi}{a-bi+3i} \right) &= 1 \Leftrightarrow \frac{(2a+3)^2 + 4b^2}{a^2 + (b-3)^2} = 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow b &= -2a - 1. \end{aligned} \quad (2)$$

Rezolvând sistemul format din ecuațiile (1) și (2), se obțin două soluții:

$$a_1 = \frac{1}{5}, \quad b_1 = -\frac{7}{5}, \quad \text{de unde} \quad z_1 = \frac{1}{5} - \frac{7}{5}i$$

și

$$a_2 = -1, \quad b_2 = 1, \quad \text{de unde} \quad z_2 = -1 + i.$$

$$\text{În concluzie, } S = z_1 + z_2 = -\frac{4}{5} - \frac{2}{5}i.$$

Răspuns corect: b).

**3.** Determinantul poate fi scris

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{ccc} 0 & n+1 & 1 \\ 2 & (n+1)^2 & 1 \\ 3 & (n+1)^3 & 1 \end{array} \right| &= (n+1) \left| \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1 \\ 2 & n+1 & 1 \\ 3 & (n+1)^2 & 1 \end{array} \right| \xrightarrow{C_2 := C_2 - C_3} \\ &= (n+1) \left| \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 1 \\ 2 & n & 1 \\ 3 & (n+1)^2 - 1 & 1 \end{array} \right| = n(n+1)(2n+1). \end{aligned}$$

Răspuns corect: d).

**4.** Fie

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \\ -2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

matricea asociată sistemului. Cum  $\det A = 0$  și determinantul principal este

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \neq 0,$$

rezultă că  $\text{rang } A = 2$ . Sistemul este incompatibil dacă și numai dacă determinantul caracteristic este nenul, adică

$$\Delta_c = \begin{vmatrix} 1 & 3 & m \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & 6 & 5 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad m \neq -\frac{1}{10}.$$

Răspuns corect: e).

**5.** Cum restul împărțirii polinomului  $f$  la  $g$  este un polinom de grad cel mult 1, din Teorema împărțirii cu rest avem

$$(x - 2018)^{2017} + x - 2020 = (x - 2017)(x - 2019) \cdot Q(x) + ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

unde  $Q$  este câtul împărțirii. Înlocuind în această relație pe  $x$  cu 2017, respectiv 2019, se obțin relațiile din următorul sistem

$$\begin{cases} 2017a + b = -4 \\ 2019a + b = 0, \end{cases}$$

de unde  $a = 2$  și  $b = -4038$ , adică restul împărțirii lui  $f$  la  $g$  este  $2X - 4038$ .

Răspuns corect: d).

**6.** Fie  $D \in [AB]$ ,  $E \in [AC]$ ,  $F, G \in [BC]$  astfel încât  $DEFG$  este pătratul a cărei latură ni se cere. Notăm lungimea acestei laturi cu  $x$ .

Aplicând Teorema unghiului de  $30^\circ$  în triunghiul  $BDG$  cu  $m(\widehat{BGD}) = 90^\circ$ , rezultă că  $BD = 2x$ , iar

$$\cos(\widehat{DBG}) = \frac{BG}{BD} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{BG}{2x} \Leftrightarrow BG = x\sqrt{3}.$$

Analog, în triunghiul  $ABC$  cu  $m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$ , avem

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{6}{BC} \Leftrightarrow BC = 4\sqrt{3},$$

iar în triunghiul  $EFC$  cu  $m(\widehat{EFC}) = 90^\circ$  și  $m(\widehat{FCE}) = 60^\circ$ , avem

$$\tg(\widehat{FCE}) = \frac{EF}{FC} \Leftrightarrow \sqrt{3} = \frac{x}{FC} \Leftrightarrow FC = \frac{x\sqrt{3}}{3}.$$

Dar  $BC = BG + GF + FG$ , adică  $\frac{x\sqrt{3}}{3} + x + x\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ , de unde se obține  $x = \frac{12}{13}(4 - \sqrt{3})$ .

Răspuns corect: b).

7. Cum panta dreptei  $BC$  este  $\frac{2}{3}$ , rezultă că panta înălțimii căutate este  $-\frac{3}{2}$ , iar ecuația ei este  $y = -\frac{3}{2}x + 1$ . Deci,  $m \cdot n = -\frac{3}{2}$ .

Răspuns corect: a).

8. Cum funcția  $f$  este descrescătoare pe intervalul  $[1, 2]$  și crescătoare pe intervalul  $(2, \infty)$ ,  $f(1) = 1$ ,  $f(2) = -1$  și  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ , rezultă că  $Imf = [-1, 1]$ .

Răspuns corect: c).

9. Din  $f(0) = 1$ , rezultă  $b = 1$ , iar cum  $f'(x) = e^{-x}(-ax - b + a)$  se obține că  $a = 3$ .

Răspuns corect: b).

**10.** Aplicând Regula lui l' Hospital, se obține

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\operatorname{tg} x)}{3x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} (\operatorname{tg} x)}{3x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\cos^2(\operatorname{tg} x)} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{9x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{9x^2 \cos^2 x} \left( 1 - \frac{1}{\cos^2(\operatorname{tg} x)} \right) = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2(\operatorname{tg} x)}{9x^2 \cos^2 x} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2(\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg}^2 x} \cdot \frac{\operatorname{tg}^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{9 \cos^2 x} = -\frac{1}{9}. \end{aligned}$$

Răspuns corect: e).

**11.** Făcând schimbarea de variabilă  $\sqrt{x-1} = t$ , rezultă că  $x = t^2 + 1$  și integrala din enunț devine

$$\int_3^7 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x-1}} = 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} \frac{1}{t^2+2} dt = \frac{2}{\sqrt{2}} \arctg \frac{t}{\sqrt{2}} \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{12}.$$

Răspuns corect: a).

**12.** Aria suprafeței căutate poate fi scrisă

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (\sin x - \cos x) dx + \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} (\cos x - \sin x) dx = 4\sqrt{2} - 2.$$

Răspuns corect: e).

**SESIUNEA: SEPTEMBRIE, DATA 17.09.2018**

**A**

**1.(8p)** Să se găsească soluțiile reale ale ecuației

$$\sqrt{1-x-2x^2} = -x-1.$$

- a) 1      b) -1      c) 4      d) 0 și 2      e) 3

**2.(9p)** Care este probabilitatea să se extragă un număr impar dintre numerele de la 1 la 101.

- a)  $\frac{50}{101}$       b)  $\frac{51}{100}$       c)  $\frac{49}{100}$       d)  $\frac{1}{2}$       e)  $\frac{51}{101}$

**3.(8p)** Se consideră matricele

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ -7 & 4 \end{pmatrix} \text{ și } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Să se determine valoarea expresiei  $B - \frac{1}{2}(A + A^t)$ .

- a)  $O_2$       b)  $A$       c)  $B$       d)  $-I_2$       e)  $I_2$

**4.(10p)** Să se calculeze valoarea determinantului

$$\begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 \\ 3^2 & 1^2 & 2^2 \\ 2^2 & 3^2 & 1^2 \end{vmatrix}.$$

- a)  $2^3 \cdot 7^3$       b)  $2 \cdot 7^3$       c)  $2^3 \cdot 7$       d)  $-2 \cdot 7^3$       e)  $-2^3 \cdot 7$

**5.(8p)** Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compozitie

$$x * y = xy + 2x + 2y + 2,$$

pentru orice  $x, y \in \mathbb{R}$ . Să se rezolve ecuația

$$x * x = -2.$$

- a) 1      b) -2      c) 0      d) 4      e) -1

**6.(8p)** Fie  $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$  astfel ca  $\tan x = -2$ . Să se calculeze  $\cos x$ .

- a)  $-\frac{1}{5}$       b)  $-\sqrt{5}$       c)  $-\frac{1}{3}$       d)  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$       e)  $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

**7.(8p)** Se dau punctele  $A(2, 3)$ ,  $B(-1, 2)$  și  $C(3, 6)$ . Fie  $y = mx + n$  ecuația medianei dusă din  $A$  în triunghiul  $ABC$ . Să se calculeze  $m + n$ .

- a)  $-6$       b)  $3$       c)  $-4$       d)  $-3$       e)  $4$

**8.(10p)** Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x))^x$ , unde  $f : \mathbb{R} - \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 - 1}.$$

- a)  $1$       b)  $e^2$       c)  $\infty$       d)  $e$       e)  $e^{-2}$

**9.(8p)** Fie funcția  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin  $f(x) = x \ln x$ . Să se scrie ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă 1.

- a)  $y = -x$       b)  $y = x + 1$       c)  $y + 1 = x$   
d)  $y = x$       e)  $y = 2(x - 1)$

**10.(7p)** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{mx + 1}{x^2 + 1}.$$

Să se determine toate valorile parametrului real nenul  $m$  astfel ca funcția  $f$  să aibă două puncte de extrem.

- a)  $\{-1\}$       b)  $(-1, 1)$       c)  $(0, 1)$       d)  $\mathbb{R}^*$       e)  $[0, +\infty)$

**11.(7p)** Să se calculeze integrala

$$\int_0^\pi (x \cos x)^2 dx.$$

a)  $\frac{\pi^2}{6} + \frac{\pi}{2}$

b)  $\frac{\pi^3}{6} + \frac{3\pi}{4}$

c)  $\frac{\pi^3}{6} + \frac{\pi}{4}$

d)  $\frac{\pi^3}{6} + \frac{\pi}{2}$

e)  $\frac{\pi^2}{3} + \frac{\pi}{4}$

**12.(8p)** Să se determine aria suprafeței plane cuprinse între graficul funcției  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \left(10x - \frac{3}{x}\right) \ln x,$$

axa  $Ox$  și dreptele  $x = 1$  și  $x = e^2$ .

a)  $\frac{15e^4 - 7}{2}$

b)  $10e^2 - \frac{7}{2}$

c)  $\frac{15e^2 - 1}{2}$

d)  $10e^4 - \frac{7}{2}$

e)  $\frac{7e^4 - 15}{2}$

### SOLUȚII AC+ETC Septembrie 2018

**1.** Punând condițiile de existență în ecuația dată se obține

$$\begin{cases} 1 - x - 2x^2 \geq 0 \\ -x - 1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \left[-1, \frac{1}{2}\right] \\ x \in (-\infty, -1] \end{cases} \Leftrightarrow x = -1$$

care este soluție a ecuației.

Răspuns corect: b).

**2.** Cum de la 1 la 101 sunt 51 de numere impare, probabilitatea cerută este  $\frac{51}{101}$ .

Răspuns corect: e).

**3.** Expresia din enunț poate fi scrisă

$$\begin{aligned} B - \frac{1}{2}(A + A^t) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \left[ \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ -7 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 9 & 4 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2. \end{aligned}$$

Răspuns corect: d).

**4.** Aplicând Regula triunghiului, valoarea determinantului este

$$\begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 \\ 3^2 & 1^2 & 2^2 \\ 2^2 & 3^2 & 1^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 9 & 1 & 4 \\ 4 & 9 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 9^3 + 4^3 - 36 - 36 - 36 = 2 \cdot 7^3.$$

Răspuns corect: b).

**5.** Ecuația din enunț poate fi scrisă  $x^2 + 4x + 2 = -2$ , care are soluția  $x = -2$ .

Răspuns corect: b).

**6.** Cum

$$\operatorname{tg} x = -2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\sin x}{\cos x} = -2 \quad \Leftrightarrow \quad \sin x = -2 \cos x.$$

Aplicând Teorema fundamentală a trigonometriei se obține  $\cos x = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$ . Dar  $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , deci  $\cos x = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ .

Răspuns corect: e).

**7.** Dacă  $M$  este mijlocul segmentului  $[BC]$ , atunci  $M(1, 4)$  și ecuația medianei din  $A$  este  $y = 5 - x$ , de unde rezultă că  $m = -1$  și  $n = 5$ . Deci,  $m + n = 4$ .

Răspuns corect: e).

**8.** Limita căutată poate fi scrisă

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x))^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 - 1} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 - 1} - 1 \right)^x = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{2x + 6}{x^2 - 1} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{2x + 6}{x^2 - 1} \right)^{\frac{x^2 - 1}{2x + 6}} \right]^{\frac{2x^2 + 6x}{x^2 - 1}} = e^2. \end{aligned}$$

Răspuns corect: b).

**9.** Ecuția tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă 1 este:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1).$$

Cum  $f(1) = 0$  iar  $f'(1) = 1$ , se obține  $y = x - 1$ .

Răspuns corect: c).

**10.** Cum  $f'(x) = \frac{-mx^2 - 2x + m}{(x^2 + 1)^2}$ , rezultă că  $f$  are două puncte de extrem dacă și numai dacă discriminantul ecuației  $-mx^2 - 2x + m = 0$  este pozitiv. În concluzie,

$$\Delta = 4 + 4m^2 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad m \in \mathbb{R}^*.$$

Răspuns corect: d).

**11.** Aplicând Formula de integrare prin părți, integrala din enunț devine

$$\begin{aligned} \int_0^\pi (x \cos x)^2 dx &= \int_0^\pi x^2 \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \int_0^\pi \frac{x^2}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^\pi x^2 \cos 2x dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^\pi + \frac{1}{2} \int_0^\pi x^2 \left( \frac{1}{2} \sin 2x \right)' dx = \frac{\pi^3}{6} + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} x^2 \sin 2x \Big|_0^\pi - \int_0^\pi x \sin 2x dx \right) = \\ &= \frac{\pi^3}{6} - \frac{1}{2} \int_0^\pi x \left( -\frac{1}{2} \cos 2x \right)' dx = \frac{\pi^3}{6} - \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{2} x \cos 2x \Big|_0^\pi + \frac{1}{4} \sin 2x \Big|_0^\pi \right) = \frac{\pi^3}{6} + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Răspuns corect: c).

**12.** Cum funcția  $f$  este pozitivă pe intervalul  $[1, e^2]$ , aria căutată poate fi scrisă

$$A = \int_1^{e^2} \left( 10x - \frac{3}{x} \right) \ln x \, dx = 10 \int_1^{e^2} x \ln x \, dx - 3 \int_1^{e^2} \frac{1}{x} \ln x \, dx.$$

Pentru prima integrală se folosește Formula de integrare prin părți, iar pentru a doua integrală se face schimbarea de variabilă  $\ln x = u$ , de unde  $\frac{1}{x} dx = du$  și atunci se obține

$$\begin{aligned} A &= 10 \int_1^{e^2} \left( \frac{x^2}{2} \right)' \ln x \, dx - 3 \int_0^2 u \, du = \\ &= 10 \left( \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^{e^2} - \frac{x^2}{4} \Big|_1^{e^2} \right) - 3 \cdot \frac{u^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{15e^4 - 7}{2}. \end{aligned}$$

Răspuns corect: a).

**SESIUNEA: IULIE, DATA 22.07.2019**

**A**

**1.(8p)** Fie mulțimile

$$A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - (a+2)x + 2a = 0\} \quad \text{și} \quad B = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 4ax + 4a^2 = 0\}.$$

Să se determine mulțimea tuturor valorilor parametrului real  $a$ , știind că  $A \cap B$  are un singur element.

- a)  $\{0, 2\}$       b)  $\{2\}$       c)  $\{0, 1\}$       d)  $\{0\}$       e)  $\{1\}$

**2.(7p)** Într-o clasă sunt 13 elevi, dintre care 7 sunt fete și 6 sunt băieți. În câte moduri se poate forma o grupă de 3 fete și 2 băieți?

- |         |         |        |
|---------|---------|--------|
| a) 50   | b) 6300 | c) 240 |
| d) 1050 | e) 525  |        |

**3.(10p)** Fie  $a, b, c$  lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic  $ABC$  cu  $a > b > c$ ,  $m(\widehat{C}) = 15^\circ$  și

$$\begin{vmatrix} c^2 + ac - 2a - 4 & ac - 2a & a^2 - b^2 - 2c \\ b^2 + ab - 2a - 4 & a^2 - c^2 - 2b & ab - 2a \\ b^2c + 2bc + bc^2 & a^2b - b^3 & a^2c - c^3 \end{vmatrix} = 0.$$

Să se determine ariaile triunghiurilor de acest fel.

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| a) $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ , $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ | b) $4 + 2\sqrt{3}$ , $4 - 2\sqrt{3}$ |
| c) $2\sqrt{3}$ , $\frac{3\sqrt{3}}{2}$                 | d) 2, 1                              |
| e) $\sqrt{6} + \sqrt{2}$ , $\sqrt{6} - \sqrt{2}$       |                                      |

**4.(8p)** Pe mulțimea numerelor reale se definesc legile de compozitie

$$x \perp y = x + y - 1 \quad \text{și} \quad x \top y = 2xy - 2(x + y) + 3.$$

Să se determine  $a, b \in \mathbb{R}$  astfel încât funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = ax + b$  să fie un izomorfism între corporile  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  și  $(\mathbb{R}, \perp, \top)$ .

- |                      |                          |                                |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| a) $a = b = 1$       | b) $a = b = \frac{1}{2}$ | c) $a = \frac{1}{2}$ , $b = 1$ |
| d) $a = 1$ , $b = 0$ | e) $a = 0$ , $b = 1$     |                                |

**5.(8p)** Să se determine parametrii reali  $m$  și  $n$  astfel încât polinomul

$$(X + 1)^{17} + mX^2 + n$$

să se dividă cu polinomul  $X^2 + X + 1$ .

- |                       |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| a) $m = 0$ , $n = -1$ | b) $m = -1$ , $n = 0$ | c) $m = -1$ , $n = -1$ |
| d) $m = 1$ , $n = 0$  | e) $m = 1$ , $n = 1$  |                        |

**6.(9p)** Triunghiul ascuțitunghic  $ABC$  are  $AB = 6$ ,  $AC = 8$  și aria  $16\sqrt{2}$ . Să se determine  $\sin C$ .

- a)  $\frac{4\sqrt{39}}{39}$       b)  $\frac{2\sqrt{42}}{21}$       c)  $\frac{4\sqrt{37}}{37}$       d)  $\frac{2\sqrt{34}}{17}$       e)  $\frac{\sqrt{2}}{17}$

**7.(8p)** Fie  $A(-1, -1)$ ,  $B(-2, 3)$  și  $C(4, 0)$ . Să se afle coordonatele punctului  $D$  astfel ca simetricul lui față de dreapta  $BC$  să fie centrul de greutate al triunghiului  $ABC$ .

- a)  $(1, 2)$       b)  $\left(\frac{34}{15}, \frac{53}{15}\right)$       c)  $\left(\frac{19}{15}, \frac{38}{15}\right)$       d)  $\left(\frac{6}{5}, \frac{12}{5}\right)$       e)  $\left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right)$

**8.(7p)** Să se calculeze

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2019} + 1}{x^3 + 1}.$$

- a) 2019      b) -673      c) 0      d) -2019      e) 673

**9.(8p)** Să se determine ecuația tangentei la graficul funcției

$$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin(x^3 - 1) - \frac{4}{x}$$

în punctul de abscisă  $x = 1$ .

- a)  $y = 7x - 11$       b)  $y = 7x$       c)  $y = 11x - 7$   
 d)  $7y = x - 11$       e)  $7y = x + 11$

**10.(9p)** Să se determine numărul real și pozitiv cu proprietatea că diferența dintre dublul său și cubul său este maximă.

- a)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       b)  $\frac{\sqrt{6}}{3}$       c)  $\frac{2}{3}$       d) 1      e)  $\frac{\sqrt{3}}{9}$

**11.(8p)** Să se calculeze volumul corpului obținut prin rotirea în jurul axei  $Ox$  a graficului funcției  $f : [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4}}.$$

- a)  $2\pi \left( 1 + \ln \frac{13}{5} \right)$       b)  $\pi \left( 2 + \ln \frac{13}{5} \right)$       c)  $2\pi \left( 1 - \ln \frac{13}{5} \right)$   
 d)  $2\pi \ln \frac{13}{5}$       e)  $\pi \left( 2 - \ln \frac{13}{5} \right)$

**12.(10p)** Să se calculeze valoarea integralei

$$\int_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} \frac{x + \sqrt{7}}{(x^2 + 7)^2} dx .$$

- a)  $\frac{\pi}{14}$       b)  $\frac{\pi + 1}{14}$       c)  $\frac{2\pi + 1}{28}$       d)  $\frac{\pi + 2}{28}$       e)  $\frac{1}{28} \left( \frac{\pi}{2} + 1 \right)$

SOLUȚII AC+ETC Iulie 2019

**1.** Cum soluțiile ecuației  $x^2 - (a+2)x + 2a = 0$  sunt  $a$  și  $2$ , iar soluția ecuației  $x^2 - 4ax + 4a^2 = 0$  este  $2a$ , atunci mulțimea  $A \cap B$  are un singur element dacă și numai dacă

$$2a = a \iff a = 0$$

sau

$$2a = 2 \iff a = 1 .$$

În concluzie,  $a \in \{0, 1\}$ .

Răspuns corect: c).

**2.** Cu 7 fete se poate forma o grupă de câte 3 fete în  $C_7^3 = 35$  moduri, iar cu 6 băieți se poate forma o grupă de câte 2 băieți în  $C_6^2 = 15$  moduri. Deci, sunt  $35 \cdot 15 = 525$  moduri în care se poate forma o grupă de 3 fete și 2 băieți.

Răspuns corect: e).

**3.** Cum  $\triangle ABC$  este dreptunghic cu  $a > b > c$ , atunci din Teorema lui Pitagora avem că  $a^2 = b^2 + c^2$ , care înlocuită în determinant ne conduce la relația

$$bc(b-2)(c-2)[(b-c)^2 + (a-c)^2 + (a-b)^2] = 0,$$

de unde distingem două cazuri:

a) Dacă  $b = 2$ , din Teorema sinusurilor, obținem

$$\frac{2}{\sin 75^\circ} = \frac{c}{\sin 15^\circ}.$$

Cum  $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cdot \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \cdot \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$  și  $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$  atunci  $c = 4 - 2\sqrt{3}$  și, prin urmare  $A_{\triangle ABC} = 4 - 2\sqrt{3}$ .

b) Dacă  $c = 2$  atunci  $A_{\triangle ABC} = 4 + 2\sqrt{3}$ .

Răspuns corect: b).

**4.** Cum  $f$  este un izomorfism între corpurile  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  și  $(\mathbb{R}, \perp, \top)$ , atunci

(i)  $f$  este bijectivă, de unde rezultă că  $a \neq 0$ ;

(ii)  $f$  satisfac simultan condițiile:

$$f(x+y) = f(x) \perp f(y) \Rightarrow b = 1$$

$$f(x \cdot y) = f(x) \top f(y) \Rightarrow a \in \left\{ \frac{1}{2}, 0 \right\}.$$

În concluzie,  $a = \frac{1}{2}$  și  $b = 1$ .

Răspuns corect: c).

**5.** Fie  $\omega$  o rădăcină a polinomului  $X^2 + X + 1$ . Atunci  $\omega^3 = 1$  și  $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ .

Cum polinomul  $(X + 1)^{17} + mX^2 + n$  se divide cu polinomul  $X^2 + X + 1$  se obține că

$$\begin{aligned} (\omega + 1)^{17} + m\omega^2 + n = 0 &\Leftrightarrow (-\omega^2)^{17} + m(-1 - \omega) + n = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -(1 + m)\omega - m + n = 0, \end{aligned}$$

de unde  $m = n = -1$ .

Răspuns corect: c).

**6.** Notăm  $AB = c$ ,  $AC = b$  și  $BC = a$ . Cum

$$A_{\triangle ABC} = \frac{bc}{2} \cdot \sin A \Leftrightarrow \sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

și atunci din Teorema fundamentală a trigonometriei rezultă că  $\cos A = \frac{1}{3}$ . Aplicând Teorema cosinusului

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Leftrightarrow a = 2\sqrt{17}$$

$$\text{și apoi din Teorema sinusurilor } \sin C = \frac{2\sqrt{34}}{17}.$$

Răspuns corect: d).

**7.** Cum centrul de greutate al  $\triangle ABC$  este  $G\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$  și  $m_{BC} = -\frac{1}{2}$ , rezultă că ecuația dreptei  $GD$  este  $y = 2x$ . De asemenea, ecuația dreptei  $BC$  este  $y = -\frac{1}{2}x + 2$  și dacă  $\{E\} = GD \cap BC$  se obține că  $E\left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$  și că  $E$  este mijlocul lui  $[GD]$ . Deci,  $D\left(\frac{19}{15}, \frac{38}{15}\right)$ .

Răspuns corect: c).

**8.** Aplicând Regula lui l' Hospital se obține

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2019} + 1}{x^3 + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2019x^{2018} + 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow -1} 673x^{2016} = 673.$$

Răspuns corect: c).

**9.** Ecuția tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă 1 este:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1).$$

Cum  $f(1) = -4$  iar  $f'(1) = 7$ , se obține  $7x - y - 11 = 0$ .

Răspuns corect: a).

**10.** Fie funcția  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 2x - x^3$ . Cum  $f'(x) = 2 - 3x^2$ , rezultă că  $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$  sunt punctele de extrem local ale lui  $f$ . În concluzie,  $f$  are valoarea maximă pentru  $x = \frac{\sqrt{6}}{3}$ .

Răspuns corect: b).

**11.** Volumul căutat este

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^3 \frac{(x+2)^2}{x^2+4} dx = \pi \int_1^3 \left(1 + \frac{4x}{x^2+4}\right) dx = \\ &= \pi \left(x \Big|_1^3 + 2 \ln(x^2+4) \Big|_1^3\right) = 2\pi \left(1 + \ln \frac{13}{5}\right). \end{aligned}$$

Răspuns corect: d).

**12.** Deoarece

$$\frac{x+\sqrt{7}}{(x^2+7)^2} = \frac{x}{(x^2+7)^2} + \frac{\sqrt{7}}{(x^2+7)^2}$$

și cum  $\frac{x}{(x^2+7)^2}$  este o funcție impară, rezultă că integrala ei pe intervalul simetric  $[-\sqrt{7}, \sqrt{7}]$  este nulă. Prin urmare, avem

$$\begin{aligned} \int_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} \frac{x+\sqrt{7}}{(x^2+7)^2} dx &= \sqrt{7} \int_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} \frac{1}{(x^2+7)^2} dx = \frac{\sqrt{7}}{7} \int_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} \frac{x^2+7-x^2}{(x^2+7)^2} dx = \\ &= \frac{\sqrt{7}}{7} \left( \int_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} \frac{1}{x^2+7} dx + \int_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} x \cdot \frac{x}{(x^2+7)^2} dx \right) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{7}}{7} \left[ \frac{1}{\sqrt{7}} \arctg \frac{x}{\sqrt{7}} \Big|_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} + \int_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} x \cdot \left( -\frac{1}{2(x^2 + 7)} \right)' dx \right] = \\
&= \frac{\pi}{14} - \frac{\sqrt{7}}{7} \left( -\frac{x}{2(x^2 + 7)} \Big|_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} + \frac{1}{2} \int_{-\sqrt{7}}^{\sqrt{7}} \frac{1}{x^2 + 7} dx \right) = \frac{\pi + 2}{28}.
\end{aligned}$$

Răspuns corect: d).

SESIUNEA: SEPTEMBRIE, DATA 14.09.2019

A

**1.(10p)** Câte numere întregi are mulțimea

$$\{x \in \mathbb{R}, |2x - 3| \leq 6\} ?$$

- a) 0      b) 7      c) 4      d) 2      e) 6

**2.(8p)** Să se calculeze

$$\frac{i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4 \cdot i^5}{i + i^2 + i^3 + i^4 + i^5}.$$

- a) 5      b) -5      c) 1      d) -1      e)  $i$

**3.(8p)** Să se determine matricea  $X$  care verifică relația

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -6 \\ 6 & -3 & 9 \end{pmatrix}.$$

- a)  $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$       b)  $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$       c)  $(2 \quad -3 \quad 1)$   
 d)  $(2 \quad -1 \quad 3)$       e)  $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

**4.(10p)** Să se rezolve sistemul

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 14 \\ x + 2y + z = 5 \\ 3x + y + 3z = 20 \end{cases} .$$

- a)  $(1, 1, -1)$
- b)  $(8, -2, 1)$
- c)  $(2, -1, 5)$
- d)  $(2, -7, -1)$
- e)  $(6, -1, 1)$

**5.(7p)** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dată de

$$f(x) = \begin{vmatrix} a+x & b+x & c+x \\ a^2+x^2 & b^2+x^2 & c^2+x^2 \\ a^3+x^3 & b^3+x^3 & c^3+x^3 \end{vmatrix},$$

unde  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Să se calculeze  $f'(x)$ .

- a)  $f'(x) = (b-a)(c-a)(c-b)[x^2 - (a+b+c)x + ab + ac + bc]$
- b)  $f'(x) = (a-b)(c-a)(c-b)[x^2 - (a+b+c)x + ab + ac + bc]$
- c)  $f'(x) = (b-a)(c-a)(c-b)[3x^2 - 2(a+b+c)x + ab + ac + bc]$
- d)  $f'(x) = (b-a)(c-a)(b-c)[3x^2 - 2(a+b+c)x + ab + ac + bc]$
- e)  $f'(x) = (b-a)(c-a)(c-b)[2x^2 - 3(a+b+c)x + ab + ac + bc]$

**6.(8p)** Să se calculeze  $\sin(2x)$ , știind că  $\sin x = \frac{1}{2}$  și  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ .

- a) 0
- b) 1
- c)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- d)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- e)  $\sqrt{3}$

**7.(8p)** Fie  $A$  un punct variabil pe dreapta  $y = x + 1$ , iar  $B$  proiecția lui  $A$  pe dreapta de ecuație  $x = 3$ . Atunci mijlocul segmentului  $(AB)$  aparține dreptei:

- a)  $x = y$
- b)  $y = 2x$
- c)  $x + y = 1$
- d)  $y = 2x - 2$
- e)  $x + y = 2$

**8.(9p)** Să se calculeze

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 - 3}{x - 1}.$$

- a) 6      b) 0      c) 1      d) 3      e) 12

**9.(9p)** Fie funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 2e^x + 3x - 1$ . Să se determine  $f'(0)$ .

- a) 1      b) 2      c) 3      d) 4      e) 5

**10.(8p)** Se consideră funcția  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x - \sqrt{x}$ . Să se determine punctul de extrem local al lui  $f$ .

- a)  $\frac{1}{4}$       b)  $\frac{1}{2}$       c) 1      d) 2      e) 4

**11.(8p)** Să se calculeze

$$\int_7^{27} \frac{1}{x + \sqrt{2x - 5}} dx.$$

- a)  $\ln \frac{10}{7} - \operatorname{arctg} \frac{2}{25}$       b)  $\ln \frac{17}{5} - \operatorname{arctg} 6 + \operatorname{arctg} 3$   
 c)  $\ln \frac{17}{5} - \operatorname{arctg} \frac{2}{9}$       d)  $\ln \frac{10}{9} - \operatorname{arctg} \frac{9}{25}$   
 e)  $\ln \frac{34}{7} - \operatorname{arctg} 4 + \operatorname{arctg} 2$

**12.(7p)** Să se determine constantele reale  $a$  și  $b$  astfel încât funcția  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$F(x) = e^{-x}(a \cos 4x + b \sin 4x)$$

să fie primitivă a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{-x} \cos 4x$ .

- a)  $a = \frac{1}{7}$ ,  $b = -\frac{1}{7}$       b)  $a = -\frac{1}{17}$ ,  $b = \frac{4}{17}$       c)  $a = \frac{4}{17}$ ,  $b = -\frac{4}{17}$   
 d)  $a = b = \frac{5}{17}$       e)  $a = -\frac{1}{7}$ ,  $b = \frac{4}{7}$

## SOLUȚII AC+ETC Septembrie 2019

- 1.** Inecuația din enunț este echivalentă cu  $-6 \leq 2x - 3 \leq 6$ , de unde se obține că  $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{9}{2}$ , deci  $x \in \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ .

În concluzie, mulțimea conține 6 numere întregi.

Răspuns corect: e).

- 2.** Fracția din enunț poate fi scrisă

$$\frac{i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4 \cdot i^5}{i + i^2 + i^3 + i^4 + i^5} = \frac{i^{1+2+3+4+5}}{i - 1 - i + 1 + i} = \frac{i^{15}}{i} = i^{14} = i^{4 \cdot 3 + 2} = i^2 = -1 .$$

Răspuns corect: d).

- 3.** Se observă că matricea  $X$  este de forma  $(a \ b \ c)$  și atunci ecuația matriceală devine

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot (a \ b \ c) = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -6 \\ 6 & -3 & 9 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2a & -2b & -2c \\ 3a & 3b & 3c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -6 \\ 6 & -3 & 9 \end{pmatrix},$$

de unde se obține că  $a = 2$ ,  $b = -1$  și  $c = 3$ , deci matricea căutată este  $X = (2 \ -1 \ 3)$ .

Răspuns corect: d).

- 4.** Fie  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  matricea asociată sistemului. Cum  $\det A = -5 \neq 0$ , rezultă că sistemul este compatibil determinat și aplicând Formulele lui Cramer se obține soluția  $x = 2$ ,  $y = -1$  și  $z = 5$ .

Răspuns corect: c).

**5.** Funcția din enunț poate fi scrisă

$$\begin{aligned}
 f(x) & \stackrel{C_2:=C_2-C_1}{=} \left| \begin{array}{ccc} a+x & b-a & c-a \\ a^2+x^2 & (b-a)(b+a) & (c-a)(c+a) \\ a^3+x^3 & (b-a)(b^2+ab+a^2) & (c-a)(c^2+ac+a^2) \end{array} \right| = \\
 & = (b-a)(c-a) \left| \begin{array}{ccc} a+x & 1 & 1 \\ a^2+x^2 & b+a & c+a \\ a^3+x^3 & b^2+ab+a^2 & c^2+ac+a^2 \end{array} \right| \stackrel{C_3:=C_3-C_2}{=} \\
 & = (b-a)(c-a) \left| \begin{array}{ccc} a+x & 1 & 0 \\ a^2+x^2 & b+a & c-b \\ a^3+x^3 & b^2+ab+a^2 & (c-b)(a+b+c) \end{array} \right| = \\
 & = (b-a)(c-a)(c-b) \left| \begin{array}{ccc} a+x & 1 & 0 \\ a^2+x^2 & b+a & 1 \\ a^3+x^3 & b^2+ab+a^2 & a+b+c \end{array} \right| = \\
 & = (b-a)(c-a)(c-b)[(a+x)(a+b)(a+b+c) + a^3+x^3 - \\
 & \quad -(a+x)(b^2+ab+a^2) - (a^2+x^2)(a+b+c)],
 \end{aligned}$$

de unde se obține că  $f'(x) = (b-a)(c-a)(c-b)[3x^2 - 2(a+b+c)x + ab + ac + bc]$ .

Răspuns corect: c).

**6.** Cum  $\sin x = \frac{1}{2}$  și  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ , rezultă că  $x = \frac{\pi}{6}$ , de unde se obține că  $\sin 2x = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Răspuns corect: d).

**7.** Fie  $A(a, a+1)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , atunci  $B(3, a+1)$  și mijlocul segmentului  $(AB)$  este  $M\left(\frac{3+a}{2}, a+1\right)$  care aparține dreptei  $y = 2x - 2$ , pentru că

$$a+1 = 2 \cdot \frac{3+a}{2} - 2.$$

Răspuns corect: d).

**8.** Aplicând Regula lui l' Hospital se obține

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 2x + 1}{1} = 6.$$

Răspuns corect: a).

**9.** Cum  $f'(x) = 2e^x + 3$ , rezultă că  $f'(0) = 5$ .

Răspuns corect: e).

**10.** Cum  $f'(x) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x}}$ , rezultă că  $x = \frac{1}{4}$  este punctul de extrem local al lui  $f$ .

Răspuns corect: a).

**11.** Integrala din enunț poate fi scrisă

$$\int_7^{27} \frac{1}{x + \sqrt{2x - 5}} dx = \int_7^{27} \frac{1}{\sqrt{2x - 5} \left( \frac{x}{\sqrt{2x - 5}} + 1 \right)} dx.$$

Făcând schimbarea de variabilă  $\sqrt{2x - 5} = t$ , rezultă că  $x = \frac{t^2 + 5}{2}$  și  $\frac{1}{\sqrt{2x - 5}} dx = dt$ , iar integrala devine

$$\begin{aligned} & \int_3^7 \frac{1}{\frac{t^2 + 5}{2t} + 1} dt = \int_3^7 \frac{2t}{t^2 + 2t + 5} dt = \int_3^7 \frac{2t + 2 - 2}{t^2 + 2t + 5} dt = \\ & = \int_3^7 \frac{2t + 2}{t^2 + 2t + 5} dt - 2 \int_3^7 \frac{1}{t^2 + 2t + 5} dt = \ln(t^2 + 2t + 5) \Big|_3^7 - 2 \int_3^7 \frac{1}{(t + 1)^2 + 4} dt = \\ & = \ln 68 - \ln 20 - \operatorname{arctg} \frac{t + 1}{2} \Big|_3^7 = \ln \frac{17}{5} - \operatorname{arctg} 4 + \operatorname{arctg} 2 = \\ & = \ln \frac{17}{5} - (\operatorname{arctg} 4 - \operatorname{arctg} 2) = \ln \frac{17}{5} - \operatorname{arctg} \frac{4 - 2}{1 + 4 \cdot 2} = \ln \frac{17}{5} - \operatorname{arctg} \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

Răspuns corect: c).

**12.** Cum  $F$  este primitivă a lui  $f$ , rezultă că  $F'(x) = f(x)$  pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ , ceea ce este echivalent cu

$$\begin{aligned} -e^{-x}(a \cos 4x + b \sin 4x) + e^{-x}(-4a \sin 4x + 4b \cos 4x) &= e^{-x} \cos 4x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow e^{-x}[(-a + 4b) \cos 4x - (4a + b) \sin 4x] &= e^{-x} \cos 4x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -a + 4b = 1 \\ 4a + b = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{17} \\ b = \frac{4}{17} \end{cases}. \end{aligned}$$

Răspuns corect: b).

**SESIUNEA: IULIE, DATA 18.07.2020**

**A**

**1.(7p)** Să se calculeze

$$E_1 = \frac{1}{x_1^3} + \frac{1}{x_2^3} \quad \text{și} \quad E_2 = |x_1 - x_2|,$$

unde  $x_1$  și  $x_2$  sunt soluțiile ecuației

$$x^2 - x - a^2 = 0, \quad a \in \mathbb{R}^*.$$

- |   |  |
|---|--|
| a) $E_1 = -\frac{1+3a}{a^6}, E_2 = \sqrt{1+4a}$     | b) $E_1 = \frac{1+3a}{a^6}, E_2 = \sqrt{1+4a}$   |
| c) $E_1 = -\frac{1+3a^2}{a^6}, E_2 = \sqrt{1+4a^2}$ | d) $E_1 = \frac{1+3a}{a^6}, E_2 = \sqrt{1+4a^2}$ |
| e) $E_1 = \frac{1+3a^2}{a^6}, E_2 = \sqrt{1+4a^2}$  |  |

**2.(8p)** Amestecăm un pachet de 52 de cărți de joc și extragem simultan două cărți la întâmplare. Care este probabilitatea să alegem doi ași de aceeași culoare?

$$\text{a) } \frac{1}{51 \cdot 52} \quad \text{b) } \frac{1}{51 \cdot 26} \quad \text{c) } \frac{1}{51 \cdot 13} \quad \text{d) } \frac{C_4^2}{52} \quad \text{e) } \frac{A_4^2}{52}$$

**3.(9p)** Să se calculeze  $B \cdot A \cdot C$ , unde

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 \\ -4 & -2 & 4 \end{pmatrix} & \text{b) } \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -4 & -2 & -4 \end{pmatrix} & \text{c) } \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \\ \text{d) } \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -4 \end{pmatrix} & \text{e) } \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 \\ -4 & -2 & -4 \end{pmatrix} & \end{array}$$

**4.(8p)** Să se determine acele soluții  $(x, y, z)$  ale sistemului

$$\begin{cases} 2x - 2y + z = 1 \\ 3x - y + 2z = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

pentru care  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } (0, 1, 0), \left( \frac{12}{13}, \frac{4}{13}, \frac{10}{13} \right) & \text{b) } (1, 0, 0), \left( -\frac{12}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{3}{13} \right) \\ \text{c) } (0, 0, 1), \left( \frac{12}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{3}{13} \right) & \text{d) } (0, 0, 1), \left( -\frac{12}{13}, \frac{4}{13}, \frac{3}{13} \right) \\ \text{e) } \left( \frac{11}{13}, \frac{4}{13}, \frac{3}{13} \right), (0, 0, 1) & \end{array}$$

**5.(7p)** Pe mulțimea numerelor complexe se consideră legea de compoziție

$$x * y = xy - i(x + y) - 1 + i.$$

Să se determine elementul neutru al acestei legi și să se calculeze  $i * i^2 * i^3 * i^4 * i^5$ .

$$\begin{array}{lll} \text{a) } e = i, z = -1 + i & \text{b) } e = 1 + i, z = i & \text{c) } e = 1, z = 1 - 2i \\ \text{d) } e = 1 - i, z = i & \text{e) } e = -i, z = 2 - i & \end{array}$$

**6.(8p)** Dacă  $\sin a = \frac{3}{5}$ ,  $a \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$  atunci  $\cos \frac{a}{2}$  este egal cu:

- a)  $\frac{4}{5}$       b)  $-\frac{4}{5}$       c)  $\frac{\sqrt{5}}{5}$       d)  $\frac{\sqrt{10}}{10}$       e)  $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

**7.(8p)** Se consideră punctele  $A(-1, 0)$ ,  $B(2, 3)$ ,  $C(-3, -4)$ ,  $D(4, 3)$ . Pe dreapta  $CD$  se alege punctul  $P$  astfel ca  $m(\widehat{APC}) = m(\widehat{BPD})$ . Să se calculeze distanța de la  $P$  la originea sistemului de axe de coordonate.

- a)  $\sqrt{3}$       b)  $\frac{8}{5}$       c)  $\frac{2 + \sqrt{2}}{2}$       d)  $\frac{3}{2}$       e)  $\frac{\sqrt{10}}{2}$

**8.(9p)** Să se studieze existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})\sqrt{x}$$

și în cazul în care aceasta există să se determine valoarea sa.

- a)  $\frac{1}{2}$       b) 0      c)  $\infty$       d) nu există      e) 1

**9.(10p)** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \cos x$ . Să se determine ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă  $x_0 = 0$ .

- a)  $y = x - 1$     b)  $y = x + 1$     c)  $y = -x$     d)  $y = -x + 2$     e)  $y = x$

**10.(8p)** Funcția  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{x^3}{3} - \ln x$  are:

- a) un punct de minim local  
 b) un punct de maxim local  
 c) două puncte de maxim local  
 d) două puncte de minim local  
 e) un punct de minim local și un punct de maxim local

**11.(8p)** Să se calculeze

$$\int (2x - 1) \cos 2x dx.$$

- a)  $x \sin 2x + \frac{1}{2} (\cos 2x - \sin 2x) + C$       b)  $2x \cos 2x - (\cos 2x - \sin 2x) + C$   
 c)  $x \sin 2x + 2(\cos 2x + \sin 2x) + C$       d)  $\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} (\cos 2x - \sin 2x) + C$   
 e)  $x \cos 2x + (\sin 2x - \cos 2x) + C$

**12.(10p)** Să se calculeze integrala

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin x + \cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx .$$

- a)  $\frac{\pi}{4} + \frac{9}{10} \ln \frac{9}{10}$       b)  $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{10} \ln \frac{9}{2}$       c)  $\frac{\pi}{5} + \frac{9}{10} \ln \frac{9}{10}$   
 d)  $\frac{\pi}{5} + \frac{3}{10} \ln \frac{9}{2}$       e)  $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{10} \ln \frac{9}{10}$

### SOLUȚII AC+ETC Iulie 2020

1. Din relațiile lui Viète avem că  $x_1 + x_2 = 1$  și  $x_1 \cdot x_2 = -a^2$  și atunci

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{x_1^3 + x_2^3}{x_1^3 \cdot x_2^3} = \frac{(x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1 \cdot x_2 + x_2^2)}{(x_1 \cdot x_2)^3} = \\ &= \frac{(x_1 + x_2)^2 - 3x_1 \cdot x_2}{(x_1 \cdot x_2)^3} = \frac{1 - 3(-a^2)}{(-a^2)^3} = -\frac{1 + 3a^2}{a^6} \end{aligned}$$

și

$$\begin{aligned} E_2^2 &= (x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2x_1 \cdot x_2 + x_2^2 = \\ &= (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2 = 1 - 4(-a^2) = 1 + 4a^2, \end{aligned}$$

deci  $E_2 = \sqrt{1 + 4a^2}$ .

Răspuns corect: c).

**2.** Extrăgând simultan 2 cărți la întâmplare din pachetul de 52 de cărți de joc, numărul cazurilor posibile este  $C_{52}^2$ . Cum cele două cărți trebuie să fie doi ași de aceeași culoare, ei pot fi 2 ași roșii sau 2 ași negri, deci avem 2 cazuri favorabile. Probabilitatea cerută este

$$P = \frac{2}{C_{52}^2} = \frac{2}{51 \cdot 26} = \frac{1}{51 \cdot 13}.$$

Răspuns corect: c).

**3.**

$$\begin{aligned} B \cdot A \cdot C &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Răspuns corect: d).

**4.** Fie

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

matricea extinsă asociată sistemului. Cum rang  $A = 2 = \text{rang } \bar{A} \neq 3 =$  numărul de necunoscute ale sistemului rezultă, din Teorema lui Kronecker-Capelli, că sistemul este compatibil nedeterminat cu necunoscutele principale  $x, y$  și  $z = \alpha$  necunoscută secundară. Atunci sistemul devine

$$\begin{cases} 2x - 2y = 1 - \alpha \\ 3x - y = 2 - 2\alpha , \end{cases}$$

de unde obținem

$$x = \frac{3 - 3\alpha}{4} \quad \text{și} \quad y = \frac{1 - \alpha}{4} ,$$

care înlăciute în relația  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  ne conduc la ecuația  $13\alpha^2 - 10\alpha - 3 = 0$  cu soluțiile:

$$\alpha_1 = 1 \implies x = 0, y = 0, z = 1$$

și

$$\alpha_2 = -\frac{3}{13} \implies x = \frac{12}{13}, y = \frac{4}{13}, z = -\frac{3}{13}.$$

Răspuns corect: c).

**5.** Cum legea de compoziție din enunț poate fi scrisă

$$x * y = (x - i) \cdot (y - i) + i,$$

elementul neutru  $e = i + 1$  se găsește ușor. Pentru a determina elementul absorbant al legii, căutăm  $a \in \mathbb{C}$  cu proprietatea că  $x * a = a * x = a$  pentru orice  $x \in \mathbb{C}$  și obținem  $a = i$ .

În concluzie,  $i * i^2 * i^3 * i^4 * i^5 = i$

Răspuns corect: b).

**6.** Cum  $\sin a = \frac{3}{5}$  și  $a \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$  rezultă, din Teorema fundamentală a trigonometriei, că  $\cos a = -\frac{4}{5}$ , de unde se obține că

$$\cos \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos a}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

Răspuns corect: d).

**7.** Cum ecuația dreptei  $CD$  este  $y = x - 1$ , putem considera  $P(a, a - 1) \in CD$ ,  $a \in \mathbb{R}$ . Dar  $m(\widehat{APC}) = m(\widehat{BPD})$ , deci  $\operatorname{tg}(\widehat{APC}) = \operatorname{tg}(\widehat{BPD})$ , ceea ce este echivalent cu

$$\left| \frac{m_{AP} - m_{CD}}{1 + m_{AP} \cdot m_{CD}} \right| = \left| \frac{m_{BP} - m_{CD}}{1 + m_{BP} \cdot m_{CD}} \right|$$

care ne conduce la ecuația

$$\left| \frac{a}{3-a} \right| = 1 \iff a = \frac{3}{2} \implies P\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) \implies OP = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

Răspuns corect: e).

**8.** Având cazul de nedeterminare  $\infty - \infty$  în limită, înmulțim cu conjugata și obținem

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})\sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1-x)\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} \left( \sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right)} = \frac{1}{2}.$$

Răspuns corect: a).

**9.** Ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă  $x_0 = 0$  este:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0).$$

Cum  $f(0) = 0$  iar  $f'(0) = 1$ , se obține ecuația  $y = x$ .

Răspuns corect: e).

**10.** Cum

$$f'(x) = \frac{x^3 - 1}{x},$$

rezultă că  $f$  este strict descrescătoare pe intervalul  $(0, 1)$  și strict crescătoare pe intervalul  $(1, \infty)$ , deci  $x = 1$  este punct de minim local pentru  $f$ .

Răspuns corect: a).

**11.** Folosind formula de integrare prin părți obținem:

$$\begin{aligned} \int (2x-1) \cos 2x dx &= \int (2x-1) \left( \frac{\sin 2x}{2} \right)' dx = \\ &= (2x-1) \cdot \frac{\sin 2x}{2} - \int \sin 2x dx = \\ &= x \sin 2x + \frac{1}{2} (\cos 2x - \sin 2x) + C. \end{aligned}$$

Răspuns corect: a).

**12.** Căutăm o descompunere a fracției de forma:

$$\begin{aligned} \frac{2 \sin x + \cos x}{\sin x + 2 \cos x} &= \frac{A(\sin x + 2 \cos x) + B(\sin x + 2 \cos x)'}{\sin x + 2 \cos x} = \\ &= \frac{A(\sin x + 2 \cos x) + B(\cos x - 2 \sin x)}{\sin x + 2 \cos x} = \\ &= \frac{(A - 2B) \sin x + (2A + B) \cos x}{\sin x + 2 \cos x}, \end{aligned}$$

de unde obținem, identificând coeficienții, că  $A = \frac{4}{5}$  și  $B = -\frac{3}{5}$ . Deci integrala devine:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin x + \cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{4}{5} dx - \frac{3}{5} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x + 2 \cos x)'}{\sin x + 2 \cos x} dx = \\ &= \frac{4}{5} \cdot x \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} - \frac{3}{5} \ln |\sin x + 2 \cos x| \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{\pi}{5} + \frac{3}{10} \ln \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Răspuns corect: d).

**SESIUNEA: IULIE, DATA 19.07.2021**

**A**

**1.(7p)** Să se determine funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2 + mx - 1$ ,  $m \in \mathbb{R}$ , știind că punctul  $A(-2, 3)$  aparține graficului ei.

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| a) $f(x) = x^2 + 2x - 1$ | b) $f(x) = x^2 - x - 1$  |
| c) $f(x) = x^2 - 1$      | d) $f(x) = x^2 - 2x - 1$ |
| e) $f(x) = x^2 + x - 1$  |                          |

**2.(8p)** Să se determine în care dintre următoarele intervale se află soluția pozitivă a ecuației

$$\log_7(x^2 - x + 1) = 1 .$$

- a)  $[0, 2]$       b)  $(2, 5)$       c)  $[5, 7)$       d)  $[1, 2)$       e)  $(4, 6]$

**3.(8p)** Fie numerele reale  $a$  și  $b$  astfel încât

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \end{pmatrix} .$$

Să se calculeze  $7a + 4b$ .

- a) 2021      b) 0      c) 15      d) -9      e) 23

**4.(7p)** Se consideră matricele de forma

$$X(m) = \begin{pmatrix} 1 + 4m & 6m \\ -2m & 1 - 3m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) .$$

Să se calculeze determinantul matricei  $X(1)$ .

- a) 3      b) -2      c) -10      d) 10      e) 2

**5.(8p)** Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compozitie

$$x * y = xy + 2x + 2y + 2.$$

Să se determine  $a \in \mathbb{R}$  astfel încât  $a * 1 = 6$ .

- a) -1      b) 2      c)  $\frac{2}{3}$       d) 3      e)  $\frac{3}{2}$

**6.(8p)** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \cdot e^x + 2$ . Să se calculeze  $f'(0)$ .

- a) 1      b) 3      c) 4      d) 2      e) 0

**7.(8p)** Să se determine distanța dintre dreptele paralele

$$d_1 : 5x + 12y - 11 = 0 \quad \text{și} \quad d_2 : y = mx + 2, \quad m \in \mathbb{R}.$$

- |      |      |      |      |                  |
|------|------|------|------|------------------|
| a) 1 | b) 3 | c) 2 | d) 1 | e) $\frac{3}{2}$ |
|------|------|------|------|------------------|

**8.(10p)** În triunghiul  $ABC$  de arie  $3\sqrt{15}$ , suma pătratelor lungimilor laturilor este egal cu 116. Să se calculeze  $\operatorname{ctg} A + \operatorname{ctg} B + \operatorname{ctg} C$ .

- |                             |                             |                             |                            |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| a) $\frac{58\sqrt{15}}{45}$ | b) $\frac{58\sqrt{15}}{15}$ | c) $\frac{29\sqrt{15}}{15}$ | d) $\frac{58\sqrt{15}}{9}$ | e) $\frac{29\sqrt{15}}{45}$ |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|

**9.(9p)** Fie funcția  $f : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \{x\}(1 - 2\{x\})^2$ , unde  $\{x\}$  este partea fracționară a lui  $x$ . Să se studieze existența limitei  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  și, în cazul în care aceasta există, să se determine valoarea sa.

- |      |              |      |       |      |
|------|--------------|------|-------|------|
| a) 1 | b) nu există | c) 0 | d) -1 | e) 2 |
|------|--------------|------|-------|------|

**10.(9p)** Se consideră punctele  $A(-1, 0)$  și  $B(3, 0)$ . Dacă  $C$  este un punct variabil pe graficul funcției  $f : [1, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{8x - x^2}$ , să se calculeze valoarea minimă pe care o poate lua aria triunghiului  $ABC$ .

- |      |      |                |                |                 |
|------|------|----------------|----------------|-----------------|
| a) 8 | b) 4 | c) $\sqrt{15}$ | d) $2\sqrt{7}$ | e) $2\sqrt{15}$ |
|------|------|----------------|----------------|-----------------|

**11.(8p)** Fie funcțiile  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{și respectiv} \quad g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Să se determine primitiva  $H$  a funcției  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(x) = f^2(x) \cdot g^2(x)$  care verifică relația  $H(0) = \frac{1}{8}$ .

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a) $\frac{1}{8}[f(4x) - g(4x) + x]$ | b) $\frac{1}{64}[f(4x) + 8x + 7]$ |
| c) $\frac{1}{32}[g(4x) - 4x + 4]$   | d) $\frac{1}{64}[g(4x) + 4x + 8]$ |
| e) $\frac{1}{32}[f(4x) + 4x + 3]$   |                                   |

**12.(10p)** Să se calculeze

$$\int_1^2 \frac{x - e^x}{1 - 2e^{-x}} dx + \int_{\ln(e-2)}^{\ln(e^2-2)} \frac{x}{1 + 2e^{-x}} dx.$$

- a)  $2 \ln(e^2 - 2)$
- b)  $\ln(e - 2) \cdot \ln(e^2 - 2)$
- c)  $\ln 2 \cdot \ln 3$
- d)  $4 \ln(e^2 - 2) - 3 \ln(e - 2) + e^2 - e$
- e)  $\ln(e - 2) - e^2 + e$

### SOLUȚII AC+ETC Septembrie 2021

**1.** Punctul  $A(-2, 3)$  aparține graficului funcției  $f(x) = x^2 + mx - 1$  dacă  $f(-2) = 3$ , de unde obținem  $m = 0$ , adică funcția  $f(x) = x^2 - 1$

Răspuns corect: c).

**2.** Ecuația logaritmică este echivalentă cu ecuația  $x^2 - x + 1 = 7$  care are soluția pozitivă  $x = 3 \in (2, 5)$ .

Răspuns corect: b).

**3.** Ecuația matriceală ne conduce la urmatoarele relații  $a + 2b = -7$  și  $b = -4$ , de unde  $7a + 4b = -9$ .

Răspuns corect: d).

**4.** Cum

$$X(1) = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -2 & -2 \end{pmatrix},$$

rezultă că  $\det X(1) = -10 + 12 = 2$ .

Răspuns corect: e).

5. Ecuatia din enunt este echivalentă cu  $3a = 2$ , de unde avem că  $a = \frac{2}{3}$ .

Răspuns corect: c).

6. Cum  $f'(x) = e^x + e^x \cdot x$ , rezultă că  $f'(0) = e^0 = 1$ .

Răspuns corect: a).

7. Fie  $A(0, 2)$  un punct de pe dreapta  $d_2$ . Distanța dintre cele două drepte paralele coincide cu

$$d(A, d_1) = \frac{|5x_A + 12y_A - 11|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{|12 \cdot 2 - 11|}{\sqrt{169}} = 1.$$

Răspuns corect: d).

8. Cum

$$A_{\triangle ABC} = \frac{b \cdot c \cdot \sin A}{2} \implies \sin A = \frac{6\sqrt{15}}{bc}$$

și atunci

$$\operatorname{ctg} A = \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}}{\frac{6\sqrt{15}}{bc}} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{12\sqrt{15}}.$$

Analog,

$$\operatorname{ctg} B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{12\sqrt{15}} \quad \text{și} \quad \operatorname{ctg} C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{12\sqrt{15}},$$

de unde obținem

$$\operatorname{ctg} A + \operatorname{ctg} B + \operatorname{ctg} C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{12\sqrt{15}} = \frac{116}{12\sqrt{15}} = \frac{29\sqrt{15}}{45}.$$

Răspuns corect: e).

**9.** Cum

$$[x] = \begin{cases} 1, & \text{dacă } x \in [1, 2) \\ 2, & \text{dacă } x \in [2, 3) \end{cases}$$

rezultă că

$$f(x) = (x - [x])(1 - 2x + 2[x])^2 = \begin{cases} (x - 1)(3 - 2x)^2, & \text{dacă } x \in [1, 2) \\ (x - 2)(5 - 2x)^2, & \text{dacă } x \in [2, 3) \end{cases}$$

și atunci

$$l_s(2) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} (x - 1)(3 - 2x)^2 = 1$$

și

$$l_d(2) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} (x - 2)(5 - 2x)^2 = 0,$$

de unde deducem că nu există  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

Răspuns corect: b).

**10.** Fie  $C(a, \sqrt{8a - a^2})$ ,  $a \in [1, 5]$ . Atunci, folosind intervalele de monotonie, aria  $A_{\triangle ABC} = 2\sqrt{8a - a^2}$  are valoare minimă pentru  $a = 1$ , adică valoarea minimă pe care o poate lua aria triunghiului  $ABC$  este  $2\sqrt{7}$ .

Răspuns corect: d).

**11.** Cum

$$h(x) = \frac{e^{4x} + e^{-4x} - 2}{16},$$

rezultă că

$$H(x) = \frac{e^{4x} - e^{-4x} - 8x}{64} + C.$$

Dar  $H(0) = \frac{1}{8}$ , de unde obținem că  $C = \frac{1}{8}$ , adică

$$\begin{aligned} H(x) &= \frac{e^{4x} - e^{-4x} - 8x}{64} + \frac{1}{8} = \frac{e^{4x} - e^{-4x} - 8x + 8}{64} \\ &= \frac{1}{32} \left( \frac{e^{4x} - e^{-4x}}{2} - 4x + 4 \right) = \frac{1}{32}[g(4x) - 4x + 4]. \end{aligned}$$

Răspuns corect: c).

**12.**

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \frac{x - e^x}{1 - 2e^{-x}} dx &= \int_1^2 \frac{x - e^x}{1 - \frac{2}{e^x}} dx = \int_1^2 \frac{x \cdot e^x - e^{2x}}{e^x - 2} dx = \\
 &= \int_1^2 \frac{x \cdot e^x}{e^x - 2} dx - \int_1^2 \frac{e^{2x}}{e^x - 2} dx = \\
 &\stackrel{e^x=t}{=} \int_1^2 x \cdot \frac{e^x}{e^x - 2} dx - \int_e^{e^2} \frac{t}{t - 2} dt = \\
 &= \int_1^2 x \cdot [\ln(e^x - 2)]' dx - \int_e^{e^2} \frac{t - 2 + 2}{t - 2} dt = \\
 &= x \cdot \ln(e^x - 2) \Big|_1^2 - \int_1^2 \ln(e^x - 2) dx - t \Big|_e^{e^2} - 2 \ln|t - 2| \Big|_e^{e^2} = \\
 &= \ln(e - 2) - e^2 + e - \int_1^2 \ln(e^x - 2) dx.
 \end{aligned}$$

Făcând schimbarea de variabilă  $\ln(e^x - 2) = y$ , rezultă că  $x = \ln(e^y + 2)$ , de unde  $dx = \frac{e^y}{e^y + 2} dy$  și atunci integrala devine:

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \frac{x - e^x}{1 - 2e^{-x}} dx &= \ln(e - 2) - e^2 + e - \int_{\ln(e-2)}^{\ln(e^2-2)} y \cdot \frac{e^y}{e^y + 2} dy \iff \\
 \iff \int_1^2 \frac{x - e^x}{1 - 2e^{-x}} dx + \int_{\ln(e-2)}^{\ln(e^2-2)} y \cdot \frac{e^y}{e^y + 2} dy &= \ln(e - 2) - e^2 + e \iff \\
 \iff \int_1^2 \frac{x - e^x}{1 - 2e^{-x}} dx + \int_{\ln(e-2)}^{\ln(e^2-2)} \frac{x \cdot e^x}{e^x + 2} dx &= \ln(e - 2) - e^2 + e
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \int_1^2 \frac{x - e^x}{1 - 2e^{-x}} dx + \int_{\ln(e-2)}^{\ln(e^2-2)} \frac{x \cdot e^x}{e^x(1+2e^{-x})} dx = \ln(e-2) - e^2 + e \quad \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \int_1^2 \frac{x - e^x}{1 - 2e^{-x}} dx + \int_{\ln(e-2)}^{\ln(e^2-2)} \frac{x}{1+2e^{-x}} dx = \ln(e-2) - e^2 + e . \end{aligned}$$

Răspuns corect: e).

**SESIUNEA: SEPTEMBRIE, DATA 13.09.2021**

**A**

**1.(7p)** Graficul cărei funcții  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de mai jos conține punctul  $A(-1, 4)$ ?

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$  | b) $f(x) = -2x^2 + x + 1$ |
| c) $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$  | d) $f(x) = x^2 - 2x + 1$  |
| e) $f(x) = -4x^2 + 3x + 1$ |                           |

**2.(8p)** Să se calculeze

$$N = i + i^2 + i^3 + i^4 .$$

- |            |            |             |            |             |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| a) $N = i$ | b) $N = 0$ | c) $N = -1$ | d) $N = 1$ | e) $N = -i$ |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|

**3.(8p)** Să se rezolve sistemul

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 0 \\ 2x + 2y + 3z = -1 \\ x - 2y - z = 2. \end{cases}$$

- |                 |                |                  |                |                |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| a) $(1, 0, -1)$ | b) $(0, 1, 1)$ | c) $(0, -1, -1)$ | d) $(1, 1, 0)$ | e) $(1, 1, 1)$ |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|

**4.(10p)** Să se calculeze integrala

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + 2 \cos x}{2 \sin x + \cos x} dx .$$

a)  $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{5} \ln \frac{4}{9}$

b)  $\frac{\pi}{5} + \frac{3}{5} \ln \frac{4}{9}$

c)  $\frac{\pi}{5} + \frac{3}{10} \ln \frac{8}{9}$

d)  $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{2} \ln \frac{1}{9}$

e)  $\frac{\pi}{3} + \frac{1}{5} \ln \frac{8}{9}$

**5.(9p)** Să se calculeze integrala

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \max \left\{ \cos x, \frac{1}{2} \right\} dx .$$

a)  $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$

b)  $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}$

c)  $\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

d)  $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

e)  $\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2}$

**6.(8p)** Fie matricea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} .$$

Să se calculeze  $B = A^2 - A$ .

a)  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

b)  $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

c)  $B = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

d)  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

e)  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

**7.(7p)** Pe mulțimea  $G = [1, +\infty)$  se definește legea de compoziție

$$x * y = \sqrt{x^2 y^2 - x^2 - y^2 + 2} .$$

Să se calculeze  $N = 2 * 1$ .

- a)  $N = 1$       b)  $N = 2$       c)  $N = \sqrt{3}$       d)  $N = 0$       e)  $N = \sqrt{5}$

**8.(8p)** Fie  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 2x + \ln x - 1$ . Să se calculeze  $f'(1)$ .

- a) 2      b) 1      c) 0      d) -1      e) 3

**9.(9p)** Să se determine mulțimea punctelor de extrem local ale funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2 \cdot e^x$ .

- a)  $\{-1, 0\}$       b)  $\{-2, 0\}$       c)  $\{1, -1\}$   
d)  $\{1, -2\}$       e)  $\{0, 1\}$

**10.(8p)** Să se calculeze

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}.$$

- a)  $L = \frac{1}{2}$       b)  $L = 1$       c)  $L = \frac{1}{6}$       d)  $L = 0$       e)  $L = \frac{1}{3}$

**11.(10p)** Se consideră punctele  $A(2, 3)$ ,  $B(-1, 2)$  și  $C(3, 6)$ . Fie  $y = mx + n$  ecuația înălțimii dusă din  $A$  în  $\triangle ABC$ . Să se calculeze  $S = m + n$ .

- a)  $S = -3$       b)  $S = 2$       c)  $S = -1$       d)  $S = 0$       e)  $S = 4$

**12.(8p)** Să se calculeze  $\sin x$ , știind că  $\cos x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  și  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ .

- a)  $\frac{\sqrt{2}}{3}$       b)  $\frac{1}{2}$       c) 1      d)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       e)  $\frac{\sqrt{6}}{3}$

## SOLUȚII AC+ETC Iulie 2021

**1.** Graficul funcției  $f(x) = x^2 - 2x + 1$  conține punctul  $A(-1, 4)$ , pentru că  $f(-1) = 4$ .

Răspuns corect: d).

**2.**  $N = i + i^2 + i^3 + i^4 = i - 1 - i + 1 = 0$ .

Răspuns corect: b).

**3.** Fie  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$  matricea asociată sistemului. Cum  $\det A = 1 \neq 0$ , rezultă că sistemul este compatibil determinat și aplicând Formulele lui Cramer se obține soluția  $x = 1$ ,  $y = 0$  și  $z = -1$ .

Răspuns corect: a).

**4.** Căutăm o descompunere a fracției de forma:

$$\begin{aligned} \frac{\sin x + 2 \cos x}{2 \sin x + \cos x} &= \frac{A(2 \sin x + \cos x) + B(2 \sin x + \cos x)'}{2 \sin x + \cos x} = \\ &= \frac{A(2 \sin x + \cos x) + B(2 \cos x - \sin x)}{2 \sin x + \cos x} = \\ &= \frac{(2A - B) \sin x + (A + 2B) \cos x}{2 \sin x + \cos x}, \end{aligned}$$

de unde obținem, identificând coeficienții, că  $A = \frac{4}{5}$  și  $B = \frac{3}{5}$ . Deci integrala devine:

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + 2 \cos x}{2 \sin x + \cos x} dx &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{4}{5} dx + \frac{3}{5} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2 \sin x + \cos x)'}{2 \sin x + \cos x} dx = \\
&= \frac{4}{5} \cdot x \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{3}{5} \ln |2 \sin x + \cos x| \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= \frac{\pi}{5} + \frac{3}{10} \ln \frac{8}{9}.
\end{aligned}$$

Răspuns corect: c).

5. Cum  $\cos x = \frac{1}{2}$  pentru  $x = \frac{\pi}{3}$ , integrala din enunț devine

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \max \left\{ \cos x, \frac{1}{2} \right\} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Răspuns corect: d).

- 6.

$$\begin{aligned}
B &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2.
\end{aligned}$$

Răspuns corect: a).

7.  $N = 2 * 1 = \sqrt{2^2 \cdot 1^2 - 2^2 - 1^2 + 2} = \sqrt{4 - 4 - 1 + 2} = 1$ .

Răspuns corect: a).

8. Cum  $f'(x) = 2 + \frac{1}{x}$ , rezultă că  $f'(1) = 2 + 1 = 3$ .

Răspuns corect: e).

**9.** Cum  $f'(x) = e^x \cdot (x^2 + 2x)$  se anulează în  $-2$  și  $0$ , folosind monotonia funcției deducem că multimea punctelor de extrem local este  $\{-2; 0\}$ .

Răspuns corect: b).

**10.** Aplicând Regula lui l' Hospital de 2 ori se obține

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}.$$

Răspuns corect: c).

**11.** Cum panta dreptei  $BC$  este  $1$ , rezultă că panta înălțimii din  $A$  este  $-1$  și atunci ecuația ei este  $y = -x + 5$ , de unde  $m = -1$  și  $n = 5$ , deci  $m + n = 4$ .

Răspuns corect: e).

**12.** Din Formula fundamentală a trigonometriei rezultă că  $\sin^2 x = \frac{2}{3}$ . Înand cont de intervalul dat se obține  $\sin x = \frac{\sqrt{6}}{3}$ .

Răspuns corect: e).

**SESIUNEA:** IULIE, **DATA** 14.07.2022

**A**

**1.(8p)** Un muncitor taie o scândură cu lungimea de  $4\text{ m}$  în  $10$  bucăți, fiecare bucătă fiind cu  $6\text{ cm}$  mai lungă decât precedenta. Ce lungime are cea mai lungă bucătă?

- a)  $61\text{ cm}$       b)  $67\text{ cm}$       c)  $70\text{ cm}$       d)  $73\text{ cm}$       e)  $79\text{ cm}$

**2.(8p)** Care este probabilitatea ca aruncând trei zaruri să obținem suma punctelor 5?

- a)  $\frac{1}{108}$       b)  $\frac{1}{72}$       c)  $\frac{1}{36}$       d)  $\frac{1}{12}$       e)  $\frac{1}{6}$

**3.(8p)** Să se determine rangul matricei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & 2022 \end{pmatrix}.$$

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 3      e) 5

**4.(9p)** Să se determine numărul matricelor  $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  care satisfac condițiile

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot X = X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

și  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 2022$ .

- a) 0      b) 1      c) 2      d) 4      e) o infinitate

**5.(8p)** Pe mulțimea numerelor complexe se consideră legea de compoziție

$$z_1 \perp z_2 = z_1 \cdot z_2 + \operatorname{Im}(z_1) \cdot \operatorname{Im}(z_2),$$

unde pentru  $z = a + bi$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $b = \operatorname{Im}(z)$ . Să se determine modulul simetricului elementului  $z = 2 + i$  în raport cu această lege.

- a)  $\frac{\sqrt{5}}{4}$       b)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$       c)  $\sqrt{5}$       d) 1      e)  $2\sqrt{5}$

**6.(8p)** Să se calculeze  $\sin(2x)$ , știind că  $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  și  $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ .

- a) 1      b)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       c) 0      d)  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$       e) -1

**7.(7p)** Se dau punctele  $A(2, 3)$ ,  $B(-1, 2)$  și  $C(3, 6)$ . Fie  $y = mx + n$  ecuația medianei duse din  $A$  în triunghiului  $ABC$ . Să se calculeze  $m + n$ .

- a) -6      b) -4      c) 0      d) 4      e) 6

**8.(9p)** Să se determine ecuația asymptotei spre  $-\infty$  la graficul funcției

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} - 2022x.$$

- a)  $y = -2023x + \frac{1}{2}$       b)  $y = -2023x - \frac{1}{2}$       c)  $y = -2021x - 2$   
 d)  $y = -2021x$       e)  $y = -2022x$

**9.(7p)** Să se determine ecuația tangentei la graficul funcției

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin(x^2 - 1) - \frac{4}{x}$$

în punctul de abscisă  $x = 1$ .

- a)  $y = 5x - 9$       b)  $y = 6x - 10$       c)  $y = -6x + 2$   
 d)  $y = 6x - 2$       e)  $y = 4x - 8$

**10.(10p)** Să se determine mulțimea valorilor parametrului  $m \in \mathbb{R}$  astfel încât

$$(1 - mx)e^x \leq 1,$$

pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

- a)  $\emptyset$       b)  $\{0\}$       c)  $\{1\}$       d)  $\{2\}$       e)  $\{-1\}$

**11.(9p)** Să se calculeze

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2x - 1) \cos(2x) dx.$$

- a)  $-1$       b)  $-\frac{1}{2}$       c)  $0$       d)  $\frac{\pi}{2}$       e)  $\frac{\pi - 1}{2}$

**12.(9p)** Să se calculeze

$$\int_0^2 \frac{x^5}{\sqrt{1+x^3}} dx .$$

- a)  $\frac{40}{3}$       b)  $\frac{10}{9}$       c)  $\frac{20}{3}$       d)  $\frac{10}{3}$       e)  $\frac{40}{9}$

### SOLUȚII AC Iulie 2022

**1.** Observăm că lungimile celor 10 bucăți reprezintă primii zece termeni ai progresiei aritmetice  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  de ratie  $r = 6 \text{ cm}$  și suma  $S_{10} = 4 \text{ m} = 400 \text{ cm}$ . Obținem că  $a_1 = 13 \text{ cm}$  și  $a_{10} = 67 \text{ cm}$ .

Deci, cea mai lungă bucată are  $67 \text{ cm}$ .

Răspuns corect: b).

**2.** Cum la aruncarea a trei zaruri numărul cazurilor posibile este  $6^3$  și în doar șase dintre ele suma punctelor este 5, adică în cazurile:

$$(1, 1, 3), (1, 3, 1), (3, 1, 1), (1, 2, 2), (2, 1, 2), (2, 2, 1) ,$$

rezultă că probabilitatea cerută este  $\frac{6}{6^3} = \frac{1}{36}$ .

Răspuns corect: c).

**3.** Deoarece determinantul de ordinul 3

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -4 & 2022 \end{vmatrix}$$

este nenul, rezultă că rang  $A = 3$ .

Răspuns corect: d).

**4.** Din ecuația matriceală din enunț obținem sistemul

$$\begin{cases} 3a + c = a + b \\ 3b + d = a + b \\ a + 3c = c + d \\ b + 3d = c + d \end{cases} \iff \begin{cases} 2a - b + c = 0 \\ -a + 2b + d = 0 \\ a + 2c - d = 0 \\ b - c + 2d = 0 \end{cases}$$

care are matricea asociată

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

cu  $\det A = 0$  și

$$\left| \begin{array}{ccc} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{array} \right|$$

nenul, deci  $\text{rang } A = 3$ . Cum sistemul este omogen, rezultă că el este compatibil nedeterminat cu  $a, b, c$  necunoscute principale și  $d$  necunoscută secundară, primele trei ecuații sunt principale și ultima e secundară, deci avem sistemul

$$\begin{cases} 2a - b + c = 0 \\ -a + 2b = -d \\ a + 2c = d \end{cases}$$

cu soluția  $a = -d, b = -d$  și  $c = d$ , care înlocuită în relația  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 2022$ , ne conduce la  $d = \pm\sqrt{\frac{2022}{4}}$ , adică două matrice.

Răspuns corect: c).

5. Cum elementul neutru al legii de compozitie date este 1, simetricul lui  $z = 2 + i$  îl găsim rezolvând ecuația  $z \perp z' = 1$ , de unde rezultă  $z' = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}i$  cu modulul  $\frac{\sqrt{5}}{4}$ .

Răspuns corect: a).

6. Din Formula fundamentală a trigonometriei obținem că  $\cos^2 x = \frac{1}{2}$ . Dar  $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , de unde rezultă că  $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  și atunci  $\sin 2x = -1$ .

Răspuns corect: e).

7. Dacă  $M$  este mijlocul segmentului  $BC$  atunci  $M(1, 4)$  și ecuația lui  $AM$  este  $y = -x + 5$ , deci  $m = -1$  și  $n = 5$ , adică  $m + n = 4$ .

Răspuns corect: d).

8. Cum  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ , rezultă că  $f$  nu are asimptotă orizontală la  $-\infty$ , deci căutăm asimptotă oblică la  $-\infty$ . Avem

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} - 2022x}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left( -\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 2022 \right)}{x} = -2023 \end{aligned}$$

și

$$\begin{aligned} n &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + 2023x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} + x) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \left( 1 - \frac{1}{x} \right)}{-x \left( \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1 \right)} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

deci  $y = -2023x + \frac{1}{2}$ .

Răspuns corect: a).

**9.** Ecuția tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă 1 este

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1).$$

Cum  $f(1) = -4$  iar  $f'(1) = 6$ , se obține  $y = 6x - 10$ .

Răspuns corect: b).

**10.** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (1 - mx)e^x$ . Cum  $f(0) = 1$ , rezultă că  $f(x) \leq f(0)$ , pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ , deci  $x = 0$  este punct de maxim local pentru  $f$ . Cum  $f$  este derivabilă în  $x = 0$ , rezultă conform teoremei lui Fermat, că  $f'(0) = 0$ .

Dar  $f'(x) = -me^x + (1 - mx)e^x$  cu  $f'(0) = -m + 1$ , de unde se obține  $m = 1$  care satisface condiția problemei.

Răspuns corect: c).

**11.** Folosind formula de integrare prin părți obținem:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2x - 1) \cos 2x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2x - 1) \left( \frac{\sin 2x}{2} \right)' dx = \\ &= (2x - 1) \cdot \frac{\sin 2x}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx = \\ &= (\pi - 1) \cdot \frac{\sin \pi}{2} + \frac{\sin 0}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -1. \end{aligned}$$

Răspuns corect: a).

**12.** Folosind formula de integrare prin părți obținem:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{x^5}{\sqrt{1+x^3}} dx &= \frac{2}{3} \int_0^2 \frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}} \cdot x^3 dx = \frac{2}{3} \int_0^2 (\sqrt{1+x^3})' \cdot x^3 dx = \\ &= \frac{2}{3} \left( x^3 \sqrt{1+x^3} \Big|_0^2 - \int_0^2 3x^2 \sqrt{1+x^3} dx \right) \underset{3x^2 dx = dt}{=} \\ &= \frac{2}{3} \left( 24 - \int_1^9 \sqrt{t} dt \right) = \frac{2}{3} \left( 24 - \frac{2}{3} t \sqrt{t} \Big|_1^9 \right) = \frac{40}{9}. \end{aligned}$$

Răspuns corect: e).

# Bibliografie

- [1] T. Bânzaru, N. Boja, O. Lipovan, A. Kovacs, G. Babescu, P. Găvruta, D. Rendi, I. Mihuț, D. Daianu, D. Păunescu, C. Milici, R. Anghelescu, *Teste grilă de matematică pentru examenul de bacalaureat și admiterea în învățământul superior*, Editura Politehnica, 2010.
- [2] Gh. Cenușă, V. Burlacu, M. Covrig, B. Iftime, I. Mircea, C. Raischi, R. Șerban, O. Vegheș, *Admitere ASE București, Teste grilă și autoevaluare, 2005-2008*, Editura Cison, București.
- [3] *Gazeta Matematică*.
- [4] P. Găvruta, I. Goleț, D. Păunescu, C. Arieșanu, C. Lăzureanu, A. Gîrban, L. Cădariu, G. Țigan, A. Juratoni, C. Hedrea, O. Bundău, C. Petrișor, *Culegere de probleme pentru examenul de bacalaureat și admiterea în Universitatea Politehnica Timișoara*, Editura Politehnica Timișoara, 2013.
- [5] Gh. Gussi, O. Stănașilă, T. Stoica, *Matematică, Elemente de Analiză Matematică*, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și Pedagogică, R.A. București, 1994.
- [6] D. V. Ionescu, *Complemente de Matematică pentru liceu*, Editura Didactică și Pedagogică, 1978.
- [7] C. Ionescu-Țiu, L. Pîrșan *Calcul diferențial și integral pentru admitere în facultate*, Editura Albatros, București, 1975.
- [8] *Manuale alternative de Matematică aprobată de Ministerul Educației Naționale*.
- [9] C. P. Niculescu, *Analiză matematică. Aplicații*, Editura Albatros, 1987.
- [10] C. P. Niculescu, *Teste de analiză matematică*, Editura Albatros, 1984.

- [11] I. Petrică, E. Constantinescu, D. Petre, *Probleme de Analiză Matematică*, Vol. 1 (clasa XI), Editura Petrion, 1993.
- [12] *Probleme date la olimpiade și concursuri de matematică*.
- [13] V. Radu, *Teme și probleme de matematică pentru Concursul "Traian Lalescu"*, caiete de studiu - clasa a XI-a, Editura Mirton, 1999.
- [14] *Variante Bacalaureat Matematică emise de Ministerul Educației Naționale*.