

*Solutions Exercices MP/MP**

Table des matières

1	Calcul matriciel
---	------------------

2

1 Calcul matriciel

Solution 1.1. Soit $(k, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$, on a

$$[M\overline{M}]_{k,m} = \sum_{j=1}^n \omega^{(k-1)(j-1)} \overline{\omega}^{(j-1)(m-1)} \quad (1.1)$$

$$= \sum_{j=0}^{n-1} [\omega^{k-1} \overline{\omega}^{m-1}]^j \quad (1.2)$$

$$= \sum_{j=0}^{n-1} [\omega^{k-m}]^j \quad (1.3)$$

Or $\omega^{k-m} = 1$ si et seulement si $n \mid k - m$ si et seulement si $k = m$ car $|k - m| \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$. Si $k = m$, on a $[M\overline{M}]_{k,m} = n$ et si $k \neq m$, on a

$$[M\overline{M}]_{k,m} = \frac{1 - (\omega^{k-m})^n}{1 - \omega^{k-m}} = 0 \quad (1.4)$$

Donc $M\overline{M} = nI_n$. Ainsi, $M \in GL_n(\mathbb{C})$ et

$$\boxed{M^{-1} = \frac{1}{n} \overline{M}} \quad (1.5)$$

On a $\det(M\overline{M}) = \det(M) \det(\overline{M}) = n^n = \det(M) \overline{\det(M)} = |\det(M)|^2$ donc $|\det(M)| = n^{\frac{n}{2}}$.

On calcul M^2 . On a

$$[M^2]_{k,m} = \sum_{j=1}^n \omega^{(k-1)(j-1) + (j-1)(m-1)} = \sum_{j=0}^{n-1} [\omega^{k+m-2}]^j \quad (1.6)$$

On a $k + m - 2 \in \llbracket 0, 2n - 2 \rrbracket$ donc $n \mid k + m - 2$ si et seulement si $k + m = n + 2$ ou $k + m = 2$ si et seulement si $m = n + 2 - k$ ou $k = m = 1$. Donc

$$M^2 = \begin{pmatrix} n & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & & & & n \\ \vdots & & & n & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & n & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (1.7)$$

En développant par rapport à la première ligne (ou colonne), on a

$$\det(M^2) = n^n (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \quad (1.8)$$

donc

$$\det(M) = \begin{cases} \pm n^{\frac{n}{2}} & \text{si } \frac{n(n+1)}{2} \text{ est pair i.e. } \begin{cases} n \equiv 0[4] \\ \text{ou} \\ n \equiv 3[4] \end{cases} \\ \pm i n^{\frac{n}{2}} & \text{si } \frac{n(n+1)}{2} \text{ est impair i.e. } \begin{cases} n \equiv 1[4] \\ \text{ou} \\ n \equiv 2[4] \end{cases} \end{cases} \quad (1.9)$$

■

Solution 1.2.

1. Si $A \geq 0$, soit $X \geq 0$, on a

$$[AX]_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \geq 0 \quad (1.10)$$

donc $AX \geq 0$.

Réciproquement, soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on prend

$$X_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.11)$$

où le 1 est en j -ième position. $X_j \geq 0$ et

$$AX = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix} \geq 0 \quad (1.12)$$

donc $A \geq 0$.

2. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ avec $A = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \geq 0$, $A^{-1} = (A^{-1})_{1 \leq i,j \leq n} \geq 0$. Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $i \neq j$. On a

$$\sum_{k=1}^n A_{i,k} A_{k,j}^{-1} = 0 \quad (1.13)$$

donc pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on a $A_{i,j} = 0$ ou $A_{k,j}^{-1} = 0$.

i étant fixé, comme $A \in GL_n(\mathbb{R})$, il existe $k_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $A_{i,k_0} > 0$. Alors pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}$, on a $A_{k_0,j}^{-1} = 0$ et $A_{k_0,i}^{-1} > 0$ (car A^{-1} est inversible). Supposons qu'il existe $k_1 \neq k_0$ tel que $A_{i,k_1} > 0$. Alors pour tout $j \neq i$, on a $A_{k,j}^{-1} = 0$ et $A_{k_1,i}^{-1} > 0$, mais alors les lignes k_0 et k_1 sont liées, ce qui est impossible. Donc il existe un unique $k_i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_{i,k_i} > 0$. Comme A est inversible, pour $i \neq i'$, on a $k_i \neq k_{i'}$, sinon on aurait deux lignes proportionnelles. Donc

$$\begin{aligned} \Delta : \llbracket 1, n \rrbracket &\rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket \\ i &\mapsto k_i \end{aligned}$$

Ainsi il existe une unique permutation $\sigma \in \Sigma_n$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_{i,\sigma(i)} > 0$ et pour tout $j \neq \sigma(i)$, $A_{ij} = 0$. Donc

$$\boxed{A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n) P_\sigma} \quad (1.14)$$

avec $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{i,j}$ et $a_i > 0$.

Réciproquement, si A est de cette forme, on a $A \geq 0$ et

$$A^{-1} = P_\sigma^{-1} \text{diag} \left(\frac{1}{a_1}, \dots, \frac{1}{a_n} \right) = P_{\sigma^{-1}} \text{diag} \left(\frac{1}{a_1}, \dots, \frac{1}{a_n} \right) \quad (1.15)$$

donc $A^{-1} \geq 0$.

■

Remarque 1.1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (1.16)$$

Si $AX \geq 0$, en définissant $x_0 = x_{n+1} = 0$, on a pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$-x_{k-1} + 2x_k - x_{k+1} \geq 0 \quad (1.17)$$

Si $x_{i_0} = \min(x_0, \dots, x_{n+1})$, on a

$$2x_{i_0} \geq x_{i_0-1} + x_{i_0+1} \geq 2x_{i_0} \quad (1.18)$$

donc $x_{i_0-1} = x_{i_0+1} = x_{i_0}$. De proche en proche, on a $x_{i_0} = x_0 = 0$. Donc $X \geq 0$.

Si $AX = 0$, on a $AX \geq 0$ et $A(-X) = 0$ donc $X \geq 0$ et $-X \geq 0$ donc $X = 0$ et $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et pour tout $Y = AX \geq 0$, on a $A^{-1}Y = X \geq 0$ donc $A^{-1} \geq 0$.

Solution 1.3. Soit

$$\begin{aligned} u: \mathbb{R}_{n-1}[X] &\rightarrow \mathbb{R}_{n-1}[X] \\ P &\mapsto P(X+1) \end{aligned}$$

Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$(X+1)^{j-1} = \sum_{i=0}^{j-1} \binom{j-1}{i} X^i = \sum_{i=1}^j \binom{j-1}{i-1} X^{i-1} \quad (1.19)$$

On note $P_i = X^{i-1}$ et $\mathcal{B} = (P_1, \dots, P_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. On note $A = \text{mat}_{\mathcal{B}}(u)$. $u^{-1}: P \mapsto P(X-1)$ donc A est inversible et pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$(X-1)^{j-1} = \sum_{i=0}^{j-1} \binom{j-1}{i} X^i (-1)^{j-i-1} = \sum_{i=1}^j \binom{j-1}{i-1} X^{i-1} (-1)^{j-i} \quad (1.20)$$

donc

$$\boxed{A^{-1} = \left(\binom{j-1}{i-1} (-1)^{j-i} \right)_{1 \leq i, j \leq n}} \quad (1.21)$$

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $u^k: P \mapsto P(X+k)$ et pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$(X+k)^{j-1} = \sum_{i=0}^{j-1} \binom{j-1}{i} X^i k^{j-i-1} = \sum_{i=1}^j \binom{j-1}{i-1} X^{i-1} k^{j-i} \quad (1.22)$$

donc

$$\boxed{A^k = \left(\binom{j-1}{i-1} k^{j-i} \right)_{1 \leq i, j \leq n}} \quad (1.23)$$

■

Solution 1.4.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $H(n)$: 'si $\dim(E) = n$ et si $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifie $\text{Tr}(u) = 0$, alors il existe une base \mathcal{B} de E telle que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & \star & \dots & \star \\ \star & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \star \\ \star & \dots & \star & 0 \end{pmatrix} \quad (1.24)$$

,

Pour $n = 1$, on a $u = 0$ si $\text{Tr}(u) = 0$. Pour $n \geq 1$, on suppose $H(n)$, soit E de dimension $n+1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Tr}(u) = 0$. S'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u = \lambda \text{id}_E$, on a $\text{Tr}(u) = (n+1)\lambda = 0$ donc $\lambda = 0$ donc $u = 0$.

Sinon, il existe $e_1 \neq 0$ tel que $(e_1, u(e_1))$ est libre (résultat classique, redémontré en remarque ci-dessous). On pose $e_2 = u(e_1)$ et on complète (e_1, e_2) en une base de E : $(e_1, e_2, \dots, e_{n+1}) = \mathcal{B}_1$. Alors $\text{mat}_{\mathcal{B}_1}(u)$ est de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & \star & \dots & \dots & \star \\ 1 & & & & \\ 0 & & A & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{pmatrix} \quad (1.25)$$

avec $\text{Tr}(u) = \text{Tr}(A') = 0$. Posons $F = \text{Vect}(e_2, \dots, e_{n+1})$. On note Π la projection sur F parallèlement à $\text{Vect}(e_1)$. Alors si

$$\begin{aligned} u' : F &\rightarrow F \\ x &\mapsto \Pi(u(x)) \end{aligned}$$

et $A' = \text{mat}_{(e_2, \dots, e_{n+1})}(u')$ donc $\text{Tr}(u') = 0$. D'après $H(n)$, il existe (f_2, \dots, f_{n+1}) une base de F telle que

$$\text{mat}_{(f_2, \dots, f_{n+1})}(u') = \begin{pmatrix} 0 & \star & \dots & \star \\ \star & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \star \\ \star & \dots & \star & 0 \end{pmatrix} \quad (1.26)$$

Soit donc $\mathcal{B}_2 = (e_1, f_2, \dots, f_{n+1})$ base de E . On a $u(e_1) \in F$ donc

$$\text{mat}_{\mathcal{B}_2}(u) = \begin{pmatrix} 0 & \star & \dots & \star \\ \star & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \star \\ \star & \dots & \star & 0 \end{pmatrix} \quad (1.27)$$

2. Soit $M = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ et $D = (i\delta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$. On a

$$[DM]_{i,j} = \sum_{k=1}^n i\delta_{i,k}a_{k,j} = ia_{i,j} \quad (1.28)$$

et

$$[MD]_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k}k\delta_{k,j} = ja_{i,j} \quad (1.29)$$

On a $M \in \ker(\varphi)$ si et seulement si pour tout $i \neq j$, $a_{i,j} = 0$ si et seulement si $M \in D_n(\mathbb{K})$ (ensemble des matrices diagonales). Donc $\dim(\ker(\varphi)) = n$ et $\dim(\text{Im}(\varphi)) = n^n - n$. Or pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $[MD - DM]_{i,i} = 0$. Notons Δ_n l'ensemble des matrices de diagonale nulle. On a $\text{Im}\varphi \subset \Delta_n$ et $\dim(\Delta_n) = n^2 - n$ (une base de Δ_n est $(E_{i,j})_{i \neq j}$, matrices élémentaires) donc $\text{Im}(\varphi) = \Delta_n$.

Soit alors $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\text{Tr}(A) = 0$. D'après 1. il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP \in \Delta_n = \text{Im}(\varphi)$ donc il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP = MD - DM$ donc

$$A = P(MD - DM)P^{-1} \quad (1.30)$$

$$= PMDP^{-1} - PDM P^{-1} \quad (1.31)$$

$$= \boxed{XY - YX} \quad (1.32)$$

avec $X = PMP^{-1}$ et $Y = PDP^{-1}$.

■

Remarque 1.2. Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, $(x, u(x))$ est liée i.e. pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, $u(x) = \lambda_x x$. Alors u est une homothétie.

En effet, soit $(x, y) \in (E \setminus \{0\})^2$, si (x, y) est liée, il existe $\mu \in \mathbb{K}^*$ tel que $y = \mu x$. On a alors

$$u(y) = \lambda_y y = \mu u(x) = \mu \lambda_x x = \lambda_x y \quad (1.33)$$

On a $y \neq 0$ donc $\lambda_x = \lambda_y$.

Si (x, y) est libre, on a

$$u(x + y) = \lambda_{x+y}(x + y) = \lambda_x x + \lambda_y y \quad (1.34)$$

Par liberté de (x, y) , on a $\lambda_{x+y} = \lambda_x = \lambda_y$.

Ainsi, λ_x ne dépend pas de x : il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que pour tout $x \in E$, $u(x) = \lambda x$, i.e. $u = \lambda \text{id}_E$.

Solution 1.5.

1. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix}^\top$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \end{pmatrix}^\top$, on a

$$XY^\top = \begin{pmatrix} x_1 y_1 & \dots & \dots & x_1 y_n \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ x_n y_1 & \dots & \dots & x_n y_n \end{pmatrix} \quad (1.35)$$

est de rang 1. On a

$$(XY^\top)^2 = X(Y^\top X)Y^\top = \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) XY^\top \quad (1.36)$$

Si $\lambda = 0$, c'est évident.

Si $\lambda \neq 0$ et $B = I_n + \lambda XY^\top$, on a

$$XY^\top = \frac{B - I_n}{\lambda} \quad (1.37)$$

et

$$(XY^\top)^2 = \frac{(B - I_n)^2}{\lambda^2} \quad (1.38)$$

soit

$$(XY^\top)^2 = \frac{B^2 - 2B + I_n}{\lambda^2} = \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) \left(\frac{B - I_n}{\lambda} \right) \quad (1.39)$$

d'où

$$\lambda (Y^\top X) (B - I_n) = B^2 - 2B + I_n \quad (1.40)$$

d'où

$$B^2 + (-2 - \lambda (Y^\top X)) B + I_n (1 + \lambda (Y^\top X)) = 0 \quad (1.41)$$

Si $1 + \lambda Y^\top X \neq 0$, alors B est inversible et

$$\boxed{B^{-1} = -\frac{1}{1 + \lambda Y^\top X} (B - (2 + \lambda Y^\top X) I_n)} \quad (1.42)$$

Si $1 + \lambda Y^\top X = 0$, on a

$$B(B - I_n) = 0 \quad (1.43)$$

Si B est inversible, on aura $B = I_n$ et $\lambda XY^\top = O_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$. Or $\lambda \neq 0$ donc $X = Y = 0$ et $1 = 0$: absurde. Donc $B \notin GL_n(\mathbb{K})$.

2. On a

$$M = A + \lambda XY^Y = A(I_n + \lambda A^{-1}XY^\top) \quad (1.44)$$

donc $M \in GL_n(\mathbb{R})$ si et seulement si $(I_n + \lambda A^{-1}XY^\top)$ est inversible si et seulement si $1 + \lambda Y^\top A^{-1}X$ est inversible d'après 1. Alors

$$\boxed{M^{-1} = \left(I_n - \frac{\lambda A^{-1}XY^\top}{1 + \lambda Y^\top A^{-1}X} \right) A^{-1}} \quad (1.45)$$

■

Solution 1.6. On a $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1$ donc il faut montrer que (S_0, \dots, S_n) est libre. Soit donc $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que

$$\alpha_0 S_0 + \dots + \alpha_n S_n = 0 \quad (1.46)$$

Si $\alpha \neq 0$, on pose $k_0 = \max(k \in \llbracket 0, n \rrbracket | \alpha_k \neq 0)$. On a

$$\alpha_0(1 - X)^n + \dots + \alpha_{k_0} X^{k_0}(1 - X)^{n-k_0} = 0 \quad (1.47)$$

soit

$$\alpha_0(1 - X)^{k_0} + \dots + \alpha_{k_0} X^{k_0} = 0 \quad (1.48)$$

En évaluant en 1, on a $\alpha_{k_0} = 0$ ce qui est absurde. Donc (S_0, \dots, S_n) est une base de $\mathbb{R}_n[X] = n + 1$.

Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a

$$S_j = X^j(1 - X)^{n-j} \quad (1.49)$$

$$= X^j \left(\sum_{k=0}^{n-j} \binom{n-j}{k} (-1)^k X^k \right) \quad (1.50)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n-j}{k} (-1)^k X^{k+j} \quad (1.51)$$

$$= \sum_{k=j}^n \binom{n-j}{k-j} (-1)^{k-j} X^k \quad (1.52)$$

donc

$$A = P_{(1, \dots, X^n) \rightarrow (S_0, \dots, S_n)} = \left(\binom{n-j}{k-j} (-1)^{k-j} \right)_{0 \leq k, j \leq n} \quad (1.53)$$

On considère $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[X])$ tel que $u(X^j) = S_j$ pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On a $u(X^j) = \left(\frac{X}{1-X}\right)^j (1-X)^n$. Pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on a $u(P) = P\left(\frac{X}{1-X}\right) (1-X)^n$. Soit $(P, Q) \in \mathbb{R}_n[X]^2$, on a $u(P) = Q$ si et seulement si $P\left(\frac{X}{1-X}\right) (1-X)^n = Q(X)$ si et seulement si $P(Y) \left(\frac{1}{1+Y}\right)^n = Q\left(\frac{Y}{1+Y}\right)$ soit $u(P) = Q$ si et seulement si $P(Y) = Q\left(\frac{Y}{1+Y}\right) (1+Y)^n$. Ainsi $u^{-1}(X^j) = X^j(1+X)^{n-j}$, donc

$$A^{-1} = \text{mat}_{(1, \dots, X^n)}(u^{-1}) = \left(\binom{n-j}{k-j} \right)_{0 \leq k, j \leq n} \quad (1.54)$$

■

Solution 1.7. Si on a $H \cap GL_n(\mathbb{K}) = \emptyset$, on a $I_n \notin H$. On écrit donc

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = H \oplus \mathbb{K}I_n \quad (1.55)$$

Soit $i \neq j$, on prend $E_{i,j} = M + \lambda I_n$ (décomposition précédente) avec $\lambda \in \mathbb{K}$. Si $\lambda \neq 0$, on a

$$M = E_{i,j} - \lambda I_n \in GL_n(\mathbb{K}) \quad (1.56)$$

donc $M \in GL_n(\mathbb{K}) \cap H$: absurde. Donc $\lambda = 0$ et $E_{i,j} \in H$, d'où $\text{Vect}(E_{i,j})_{i \neq j} \subset H$. Or

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 1 & \ddots & & & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in (GL_n(\mathbb{K}) \cap \text{Vect}(E_{i,j})_{i \neq j}) \subset (GL_n(\mathbb{K}) \cap H) \quad (1.57)$$

donc $H \cap GL_n(\mathbb{K}) \neq \emptyset$: absurde. ■

Remarque 1.3. *Il existe une forme linéaire non nulle $\varphi: \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ telle que $H = \ker(\varphi)$.*

En effet, pour toute forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\varphi(M) = \text{Tr}(AM) \quad (1.58)$$

Pour le montrer : si A existe, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $\varphi(E_{i,j}) = \text{Tr}(AE_{i,j}) = a_{j,i}$. Réciproquement, soit $A = (\varphi(E_{j,i}))_{1 \leq i, j \leq n}$. On a pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\varphi(M) = \text{Tr}(AM)$ car ces deux formes linéaires coïncident sur les $(E_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$.

Il existe donc $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \setminus \{0\}$,

$$H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(AM) = 0\} \quad (1.59)$$

Si $r = \text{rg}(A)$, il existe $(P, Q) \in GL_n(\mathbb{K})^2$ telles que $A = Q^{-1}J_{n,n,r}P$ ($J_{n,n,r}$: matrice de taille $n \times n$ avec les r premiers coefficients diagonaux valant 1). Alors pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a

$$\text{Tr}(AM) = \text{Tr}(J_{n,n,r} \underbrace{MPQ^{-1}}_{= M'}) \quad (1.60)$$

et il suffit de prendre

$$M' = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 1 & \ddots & & & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.61)$$

Solution 1.8.

1. On prend $\lambda = 0$ et $N(0 \times 0) = 0 \times N(0) = 0$ donc

$$\boxed{N(0) = 0} \quad (1.62)$$

2. On a pour $j \neq i$, $E_{i,j} \times E_{j,j} = E_{i,j}$ et $E_{j,j}E_{i,j} = 0$ donc $N(E_{i,j}) = N(E_{i,j}E_{j,j}) = N(E_{j,j}E_{i,j})$
d'où

$$\boxed{N(E_{i,j}) = 0} \quad (1.63)$$

3. Déjà traité à l'exercice 1.

4. Si $\text{Tr}(A) = 0$, alors il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que

$$P^{-1}AP = \sum_{i \neq j} \alpha_{i,j} E_{i,j} \quad (1.64)$$

donc

$$\boxed{N(A) = N(P^{-1}AP) \leq \sum_{i \neq j} \alpha_{i,j} N(E_{i,j}) = 0} \quad (1.65)$$

5. Soit $A' = A - \frac{\text{Tr}(A)}{n} I_n$. On a $N(A') = 0$ d'après ce qui précède. Montrons que pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$,

$$|N(A) - N(B)| \leq N(A - B) \quad (1.66)$$

On écrit $A = A - B + B$ et $N(A) \leq N(A - B) + N(B)$ d'où $N(A) - N(B) \leq N(A - B)$ et on a le résultat par symétrie de A et B .

On a donc

$$\left| N(A) - N\left(\frac{\text{Tr}(A)}{n} I_n\right) \right| \leq N\left(A - \frac{\text{Tr}(A)}{n} I_n\right) = 0 \quad (1.67)$$

d'où

$$\boxed{N(A) = N\left(\frac{\text{Tr}(A)}{n} I_n\right) = |\text{Tr}(A)| \times \underbrace{N\left(\frac{I_n}{n}\right)}_{= a \geq 0}} \quad (1.68)$$

■

Solution 1.9. On écrit

$$f + g = f \circ (id + f^{-1} \circ g) \quad (1.69)$$

avec $f^{-1} \circ g$ de rang 1. Il existe une base \mathcal{B} de E telle que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(f^{-1} \circ g) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & \star \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \alpha \end{pmatrix} \quad (1.70)$$

avec $\alpha = \text{Tr}(f^{-1} \circ g)$ et donc $\text{mat}_{\mathcal{B}}(id + f^{-1} \circ g)$ est inversible si et seulement si $1 + \alpha \neq 0$ si et seulement si $\text{Tr}(f^{-1} \circ g) \neq -1$. ■

Solution 1.10. Par symétrie du problème, il suffit de déterminer les

$$a_{n,j} = |\{\text{chemins de longueur } n \text{ de } 1 \text{ vers } j \in \{2, 3, 4\}\}| \quad (1.71)$$

On pose

$$X_n = \begin{pmatrix} a(n,1) \\ a(n,2) \\ a(n,3) \\ a(n,4) \end{pmatrix} \quad (1.72)$$

On a alors

$$X_{n+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{= A} X_n \quad (1.73)$$

car (en raisonnant modulo 4) il y a autant de chemins de longueur $n+1$ reliant 1 à j que de chemins de longueur n reliant 1 à $j-1$ + chemins de longueur n reliant 1 à $j+1$. d'où $X_n = A^n X_0$ avec

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.74)$$

On a

$$A = \begin{pmatrix} B & B \\ B & B \end{pmatrix} \quad (1.75)$$

avec

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.76)$$

On a $B^2 = I_2$ et on montre par récurrence

$$\begin{cases} A^{2p} = 2^{2p-1} \begin{pmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & I_2 \end{pmatrix} & p \geq 1 \\ A^{2p+1} = 2^{2p} \begin{pmatrix} B & B \\ B & B \end{pmatrix} & p \geq 0 \end{cases} \quad (1.77)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
a(2p, 1) &= 2^{2p-1} = a(2p, 3) \\
a(2p, 2) &= 0 = a(2p, 4) \\
a(2p+1, 1) &= 0 = a(2p+1, 3) \\
a(2p+1, 4) &= 2^{2p} = a(2p+1, 4)
\end{aligned}
\tag{1.78}$$

Ici, on a

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}
\tag{1.79}$$

En deux itérations, il y a chaque fois deux possibilités pour relier deux sommets différents de même partié, et 3 pour revenir au même sommet. On a donc

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} = I_8 + 2 \begin{pmatrix} B & B & B & B \\ B & B & B & B \\ B & B & B & B \\ B & B & B & B \end{pmatrix}
\tag{1.80}$$

On applique le binôme de Newton pour calculer les puissances paires de A , puis on déduit les puissances impaires en multipliant par A . ■

Solution 1.11. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix}^\top \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$. Supposons $AX = 0$. Alors pour tout $i \in$

$\llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j = 0 \Rightarrow -a_{i,i} x_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{i,j} x_j \quad (1.81)$$

donc

$$\left| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{i,j} x_j \right| = |a_{i,i} x_i| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j} x_j| \quad (1.82)$$

Soit $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que

$$x_{i_0} = \max \{ |x_i|, i \in \llbracket 1, n \rrbracket \} \quad (1.83)$$

On a alors

$$|a_{j,i_0}| |x_{i_0}| \leq |x_{i_0}| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i_0,j}| \quad (1.84)$$

D'après l'hypothèse, on a $|x_{i_0}| = 0$ donc $X = 0$ et A est inversible.

Il faut l'inégalité stricte, un contre-exemple est donnée par une ligne nulle. ■

Remarque 1.4. Si pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|a_{j,j}| > \sum_{i \neq j} |a_{i,j}|$ alors $A^T \in GL_n(\mathbb{C})$ et donc $A \in GL_n(\mathbb{C})$.

Solution 1.12. On écrit, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$,

$$i \wedge j = \sum_{k | i \wedge j} \varphi(k) \quad (1.85)$$

$$= \sum_{\substack{k | i \\ k | j}} \varphi(k) \quad (1.86)$$

$$= \sum_{k=1}^n b_{k,i} b_{k,j} \varphi(k) \quad (1.87)$$

avec $b_{k,i} = 1$ si $k \mid i$ et 0 sinon. On a alors, si $A = (i \wedge j)_{1 \leq i, j \leq n}$, $A = B^T C$ avec $B = (b_{k,i})_{1 \leq i, k \leq n}$ (triangulaire supérieure) et $C = (\varphi(k) b_{k,j})_{1 \leq k, j \leq n}$ (triangulaire supérieure). Donc

$$\boxed{\det(A) = \prod_{i=1}^n \varphi(i)} \quad (1.88)$$

■

Solution 1.13. Pour l'unicité, si $A = L_1 U_1 = L_2 U_2$ telles que proposées. Comme A est inversible, on a $\det(A) = \det(L_i) \det(U_i) \neq 0$ pour $i \in \{1, 2\}$ et donc L_i et U_i sont inversibles. Ainsi,

$$L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1} \in \mathcal{T}_n^-(\mathbb{C}) \cap \mathcal{T}_n^+(\mathbb{C}) \quad (1.89)$$

avec des 1 sur la diagonale, c'est donc I_n , d'où l'unicité.

Pour l'existence, on travaille par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$: pour $n = 1$ on a $A = (1) \times (a_{1,1})$. Soit $A_{n+1} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C})$ vérifiant l'hypothèse, alors A_n vérifie l'hypothèse $A_n = L_n U_n$ avec

$$A_{n+1} = \begin{pmatrix} A_n & Y \\ X^\top & a_{n+1,n+1} \end{pmatrix} \quad (1.90)$$

On veut

$$A_{n+1} = \begin{pmatrix} 0 \\ L' \\ \vdots \\ 0 \\ X_1^\top & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} U' & Y_1 \\ 0 & \dots & 0 & u_{n+1,n+1} \end{pmatrix} \quad (1.91)$$

On a $(X, Y) \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C})$, par produits par blocs, on a $A_n = L' U' = L_n U_n$ et par unicité, $L' = L_n$ et $U' = U_n$. On a $X^\top = X_1^\top U'$ et donc $X_1^\top = X^\top U_n^{-1}$ et $Y = L_n Y_1$ donc $Y_1 = L_n^{-1} Y$.

Enfin, $a_{n+1,n+1} = X_1^\top Y_1 + u_{n+1,n+1}$ et donc

$$u_{n+1,n+1} = a_{n+1,n+1} - X_1^\top Y_1 = a_{n+1,n+1} - X^\top U_n^{-1} L_n^{-1} Y \quad (1.92)$$

Réciproquement, en définissant ainsi U et L , on a bien $A = Lu$ en remontant les calculs. ■

Solution 1.14. On a $\sum_{k \in A_i} a_k - \sum_{k \in B_i} a_k = 0$ (combinaison linéaire des a_k avec des coefficients ± 1), donc

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \pm 1 & \dots & \dots & \pm 1 \\ \pm 1 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \pm 1 \\ \pm 1 & \dots & \dots & \pm 1 & 0 \end{pmatrix}}_{= A} \underbrace{\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{2n+1} \end{pmatrix}}_{= X} = 0 \quad (1.93)$$

Sur chaque ligne, il y a n fois 1 et n fois -1 (car les A_i et B_i sont disjoints). On veut montrer que $X = \alpha \mathbf{1}$. On a $X \in \ker(A)$ et $\mathbf{1} \in \ker(A)$ (car il y a n 1 et n -1 par ligne). On veut donc montrer que $\dim(\ker(A)) = 1$, soit $\text{rg}(A) = 2n$.

On doit donc montrer qu'il existe une sous-matrice de taille $2n$ inversible car $\dim(\ker(A)) \geq 1$. Comme on est bloqué par les ± 1 , on se place dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Soit donc

$$\overline{B_n} = \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{1} & \dots & \dots & \overline{11} \\ \overline{1} & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \overline{11} \\ \overline{11} & \dots & \dots & \overline{11} & \overline{0} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \quad (1.94)$$

Si $\det(\overline{B_n}) \neq 0$, on a $\det(B_n) \neq 2k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ où B_n est obtenue en enlevant à A sa dernière ligne et sa dernière colonne, et donc $\det(A) \neq 0$.

On cherche un polynôme annulateur de $\overline{B_n}$. On a

$$(\overline{B_n} + \overline{I_{2n}})^2 = \overline{B_n}^2 + 2\overline{B_n} + \overline{I_{2n}} = \begin{pmatrix} \overline{1} & \dots & \overline{1} \\ \vdots & & \vdots \\ \overline{1} & \dots & \overline{1} \end{pmatrix}^2 = 2n \begin{pmatrix} \overline{1} & \dots & \overline{1} \\ \vdots & & \vdots \\ \overline{1} & \dots & \overline{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{0} \end{pmatrix} \quad (1.95)$$

Ainsi,

$$\overline{B_n} (\overline{B_n} + 2\overline{I_{2n}}) = -\overline{I_{2n}} = \overline{I_{2n}} \quad (1.96)$$

donc $\overline{B_n} \in GL_n(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ et donc $B_n \in GL_{2n}(\mathbb{R})$, ce qui démontre bien que $\text{rg}(A) = 2n$ et $\ker(A) = \text{Vect}(\mathbf{1})$, d'où

$$\boxed{a_1 = \dots = a_{2n+1}} \quad (1.97)$$

■

Table des figures