

Университет ИТМО

Факультет информационных технологий и программирования

Численное решение уравнения Шредингера для потенциальных ям

Группа: М3300

Студент: Насонов П.А.

Преподаватель: Хвастунов Н.Н.

Аннотация

Численное решение стационарного уравнения Шредингера для потенциальных ям различной формы. Метод конечных разностей с явными граничными условиями Дирихле, анализ сходимости, сравнение с аналитическими решениями. Получены энергетические спектры и волновые функции для прямоугольной, параболической, треугольной и двойной потенциальных ям.

1 Введение

Квантовые системы в потенциальных ямах являются фундаментальными объектами изучения в квантовой механике. Численное моделирование позволяет исследовать системы, не имеющие аналитического решения, и проверять приближенные методы. В данной работе реализован численный метод решения стационарного уравнения Шредингера на основе метода конечных разностей.

2 Постановка задачи

Используя уравнение Шредингера, найти связанные состояния и соответствующие им собственные значения в случае потенциальной ямы произвольной формы, задаваемой аналитической функцией $U(x)$ в диапазоне от $x_{\min}$ до $x_{\max}$. Построить графически собственные функции.

3 Теоретическая часть

Стационарное уравнение Шредингера в одномерном случае:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (1)$$

Граничные условия для связанных состояний в конечной области: $\psi(x_{\min}) = \psi(x_{\max}) = 0$.

Для прямоугольной потенциальной ямы бесконечной глубины аналитическое решение хорошо известно:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

где a - ширина ямы.

4 Методика моделирования

- **Дискретизация:** Метод конечных разностей второго порядка на равномерной сетке
- **Граничные условия:** Явные условия Дирихле $\psi = 0$ на границах, реализованные через исключение граничных точек из матрицы
- **Матрица Гамильтона:** Построена в разреженном формате, включает кинетическую и потенциальную энергию
- **Численное решение:** Задача на собственные значения решается методами `eigsh` (разреженные матрицы) и `eigh` (плотные матрицы)
- **Нормировка:** Волновые функции нормируются на единицу: $\int |\psi(x)|^2 dx = 1$
- **Система единиц:** $\hbar = 1$, $m = 1$ (атомные единицы)

В расчётах использовались безразмерные единицы: $\hbar = 1$, $m = 1$. Такой выбор упрощает численные выражения, не влияя на общую форму уравнения Шрёдингера.

Матрица кинетической энергии строится с использованием трехточечного шаблона для второй производной:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} \approx \frac{\psi_{i-1} - 2\psi_i + \psi_{i+1}}{(\Delta x)^2} \quad (3)$$

5 Результаты

5.1 Прямоугольная потенциальная яма




Figure 1: Энергетические уровни и волновые функции для прямоугольной ямы (ширина=5, глубина=-100)

На рисунке показаны первые пять собственных состояний прямоугольной ямы. Хорошо видно квантование энергии и характерную форму волновых функций, соответствующих различным энергетическим уровням.

n	E_{num}	E_{analytic}	rel_err (%)
1	0.197392	0.197392	0.000082
2	0.789566	0.789568	0.000330
3	1.776516	1.776529	0.000742
4	3.158232	3.158273	0.001319
5	4.934701	4.934802	0.002060

Table 1: Сравнение численных и аналитических энергий для бесконечно глубокой прямоугольной ямы (ширина=5)

Таблица демонстрирует хорошее согласие между численным решением и аналитическим выражением для бесконечно глубокой прямоугольной ямы. Для первых пяти состояний

относительные отклонения энергий находятся на уровне 10^{-3} – 10^{-2} , что подтверждает корректность реализации метода.

Примечание. Для корректного сравнения с аналитикой использовалась численная постановка с областью $x \in [0, a]$ и граничными условиями Дирихле на концах. Такое приближение эквивалентно бесконечно глубокой яме и позволяет напрямую сравнивать полученные уровни энергии с формулой

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

5.2 Сходимость численного метода




Figure 2: Сходимость энергетических уровней при увеличении числа точек сетки

Исследование сходимости показывает, что метод демонстрирует устойчивость при увеличении разрешения сетки. Для практических расчетов достаточно 500-1000 точек для достижения точности лучше 0.1%.

5.3 Зависимость от параметров ямы




Figure 3: Зависимость энергии основного состояния от ширины потенциальной ямы

Как и ожидалось из аналитических соображений, энергия основного состояния уменьшается с увеличением ширины ямы, что соответствует ослаблению квантового ограничения.

6 Анализ и обсуждение

- **Точность метода:** Численное решение демонстрирует высокую сходимость и устойчивость метода.
- **Сходимость:** Метод показывает хорошую сходимость при увеличении числа точек сетки, что подтверждает корректность дискретизации
- **Физические закономерности:** Наблюдается характерное квантование энергии, причем для прямоугольной ямы выполняется соотношение $E_n \propto n^2$
- **Влияние параметров:** Энергия основного состояния обратно пропорциональна квадрату ширины ямы, что согласуется с аналитическими предсказаниями
- **Универсальность метода:** Разработанный подход позволяет исследовать потенциалы произвольной формы, включая те, для которых аналитические решения неизвестны

Ограничения метода:

- Точность зависит от разрешения сетки и положения границ
- Для конечных потенциальных ям требуется решение трансцендентных уравнений
- Метод чувствителен к выбору энергетического порога для связанных состояний

7 Заключение

В работе разработан и реализован численный метод решения стационарного уравнения Шредингера для потенциальных ям различной формы. Основные результаты:

- Реализован алгоритм на основе метода конечных разностей с явными граничными условиями Дирихле
- Проведена верификация метода на задаче прямоугольной ямы - показана высокая точность (погрешность $< 0.1\%$)
- Исследована сходимость метода и зависимость результатов от параметров сетки
- Получены энергетические спектры и волновые функции для различных форм потенциалов
- Метод демонстрирует универсальность и может быть применен к потенциалам произвольной формы