

Dm n°3

Exercice 1

1. À l'aide de la calculatrice je calcule les 3 premiers termes de la suite.

$$u_n = \frac{3 \times n - 1}{n - 2}$$

$$u_3 = \frac{3 \times 3 - 1}{3 - 2} \Leftrightarrow \frac{9 - 1}{1} \Leftrightarrow \frac{8}{1} \Leftrightarrow 8$$

$$u_4 = \frac{3 \times 4 - 1}{4 - 2} \Leftrightarrow \frac{12 - 1}{2} \Leftrightarrow \frac{11}{2}$$

$$u_5 = \frac{3 \times 5 - 1}{5 - 2} \Leftrightarrow \frac{15 - 1}{3} \Leftrightarrow \frac{14}{3}$$

La suite (u_n) semble décroissante car $u_3 > u_4 > u_5$

2. On cherche pour $\forall n \geq 3$ $u_{n+1} - u_n$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3 \times (n+1) - 1}{(n+1) - 2} - \frac{3 \times n - 1}{n - 2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(3n+3-1)}{n+1-2} - \frac{(3n-1)}{n-2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(3n+2)(n-2)}{(n-1)(n-2)} - \frac{(3n-1)(n-1)}{(n-2)(n-1)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3n^2 - 6n + 2n - 4}{(n-1)(n-2)} - \frac{3n^2 - 3n - n + 1}{(n-1)(n-2)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3n^2 - 6n + 2n - 4 - 3n^2 + 4n - 1}{(n-1)(n-2)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\cancel{3n^2} - 4n - 4 - \cancel{3n^2} + 4n - 1}{(n-1)(n-2)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{-5}{(n-1)(n-2)}$$

Donc pour $n \geq 3$ on a bien $u_{n+1} - u_n = \frac{-5}{(n-1)(n-2)}$

n ne peut pas être égal à moins de 3 car si $n=1 : (1-1) = 0$, si $n=2 : (2-2) = 0$. Une multiplication par 0 fait toujours 0. Le numérateur ne peut être égal à 0.

3. Le numérateur est négatif, diviser un nombre positif par un nombre négatif est toujours négatif donc la suite $u_n = \frac{3 \times n - 1}{n - 1}$ est toujours décroissante.

Exercice 2

$$\begin{aligned}
1. \quad z &= x + 2 + i(-ix + x) + 2i - 5ix \\
z &= x + 2 + (-i^2x) + ix + 2i - 5ix \\
z &= x + 2 + x + ix + 2i - 5ix \\
z &= 2x + 2 + 2i - 4ix \\
z &= 2x + 2 + i(2 - 4x)
\end{aligned}$$

Partie réelle : $2x + 2$ Partie imaginaire : $i(2 - 4x)$ Pour que z soit un nombre réel il faut trouver quand $i(2 - 4x) = 0$.

$$0 = 2i - 4ix \Leftrightarrow 4ix = 2i$$

$$x = \frac{2i}{4i} \Leftrightarrow \frac{i}{2i} \Leftrightarrow \frac{i(-2i)}{2i(-2i)} \Leftrightarrow \frac{-2i^2}{-4i^2} \Leftrightarrow \frac{2}{4} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \Leftrightarrow 0.5$$

Donc z est un nombre réel pour $x = 0.5$.2. Pour que z soit un nombre imaginaire il faut trouver quand $2x + 2 = 0$.

$$0 = 2x + 2 \Leftrightarrow -2x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{2}{-2} \Leftrightarrow -1$$

Donc z est un nombre imaginaire pour $x = -1$.**Exercice 3**1. On doit démontrer que $z_1 = \overline{z_2}$

$$z_1 = \frac{3-i}{5+7i} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{3+i}{5-7i}$$

$$z_2 = \frac{(3+i)(5+7i)}{(5-7i)(5+7i)} \Leftrightarrow \frac{15+21i+5i+7i^2}{25-49i^2} \Leftrightarrow \frac{15+26i-7}{25+49} \Leftrightarrow \frac{8+26i}{74} \Leftrightarrow \frac{4}{37} + \frac{13}{37}i$$

$$\overline{z_2} = \frac{4}{37} - \frac{13}{37}i$$

$$z_1 = \frac{(3-i)(5-7i)}{(5+7i)(5-7i)} \Leftrightarrow \frac{15-21i-5i+7i^2}{25-49i^2} \Leftrightarrow \frac{15-26i-7}{25+49} \Leftrightarrow \frac{8-26i}{74} \Leftrightarrow \frac{4}{37} - \frac{13}{37}i$$

$$z_1 = \frac{4}{37} - \frac{13}{37}i$$

Donc $z_1 = \overline{z_2}$ 2. $z_1 + z_2$ est un réel car z_1 est négatif. On applique la règle des signes et donc les imaginaires s'anulent.

$$\left(\frac{4}{37} + \frac{4}{37}\right) + \left(\frac{13}{37} - \frac{13}{37}\right)i = \frac{8}{37}$$

3. $z_1 - z_2$ est un imaginaire pur car tout les réels sont positifs. On applique la règle des signes donc les réels s'anulent.

$$\left(\frac{4}{37} - \frac{4}{37}\right) + \left(\frac{13}{37} + \frac{13}{37}\right)i = \frac{26}{37}i$$