# Linear Maps

Flower

Linear Algebar

#### A. The Vector Space of Linear Maps

## Problem 3

假设  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ . 证明存在  $A_{j,k} \in \mathbb{F}$  , 其中  $j=1,\ldots,m$   $k=1,\ldots,n$ , 使得

$$T(x_1, \dots, x_n) = (A_{1,1}x_1 + \dots + A_{1,n}x_n, \dots, A_{m,1}x_1 + \dots + A_{m,n}x_n)$$

对于每一个  $(x_1,\ldots,x_n)\in\mathbb{F}^n$  都成立.

*Proof.* 对于任意的  $x \in \mathbb{F}^n$ , 我们可以写

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n,$$

其中  $e_1, \ldots, e_n$  是  $\mathbb{F}^n$  的标准基. 因为 T 是线性的, 我们有

$$Tx = T(x_1e_1 + \dots + x_ne_n) = x_1Te_1 + \dots + x_nTe_n.$$

现在对于  $Te_k \in \mathbb{F}^m$ , 其中  $k=1,\ldots,n$ , 都存在  $A_{1,k},\ldots,A_{m,k} \in \mathbb{F}$  使得

$$Te_k = A_{1,k}e_1 + \dots + A_{m,k}e_m$$
  
=  $(A_{1,k}, \dots, A_{m,k})$ 

因此

$$x_k T e_k = (A_{1,k} x_k, \dots, A_{m,k} x_k).$$

所以我们有

$$Tx = \sum_{k=1}^{n} (A_{1,k}x_k, \dots, A_{m,k}x_k)$$
$$= \left(\sum_{k=1}^{n} A_{1,k}x_k, \dots, \sum_{k=1}^{n} A_{m,k}x_k\right),$$

就证得存在  $A_{j,k} \in \mathbb{F}$  , 其中 j = 1, ..., m 并且 k = 1, ..., n 使得等式成立.

## Problem 4

设  $T \in \mathcal{L}(V, W)$  并且  $v_1, \ldots, v_m$  是 V 中的一组向量,其使得  $Tv_1, \ldots, Tv_m$  在 W 上的线性独立。证明  $v_1, \ldots, v_m$  线性独立.

Proof. 假设  $v_1, \ldots, v_m$  不线性独立,则有方程

$$a_1v_1 + \dots + a_mv_m = 0$$

有一组  $a_i$  不全为零的解,接下来

$$T(a_1v_1 + \dots + a_mv_m) = a_1Tv_1 + \dots + a_mTv_m = 0$$

则存在一组不全为零的  $a_i$  使得上式成立。与条件矛盾, 故假设不成立。原命题正确.  $\Box$ 

## Problem 7

证明如果  $\dim V=1$  并且  $T\in \mathcal{L}(V,V)$ , 存在  $\lambda\in\mathbb{F}$  使得对于任意的  $v\in V$  都有  $Tv=\lambda v$ .

Proof. 因为 dim V = 1, 所以 V 的基为单向量, 设为 e 则存在  $\alpha, \lambda$  使得下式成立

$$Tv = T(\alpha e) = \alpha Te = \alpha \lambda e = \lambda v$$

其中 λ 即为所需。原命题证明完毕

#### Problem 8

找到一个  $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$  函数  $\varphi$ , 且对于任意的  $a \in \mathbb{R}$  和  $V \in \mathbb{R}^2$  都满足

$$\varphi(av) = a\varphi(v)$$

并且  $\varphi$  不是线性的.

Proof. 找到如下函数

$$\varphi = \ln(xy), \ (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

则可有

$$\varphi(av) = \varphi[(ax, ay)] = a \ln(xy) = a\varphi(v)$$

但是  $\varphi$  不满足

$$\varphi(\nu + \omega) \neq \varphi(\nu) + \varphi(\omega)$$

故  $\varphi$  不是线性的.

#### Problem 9

给出一个  $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$  的函数  $\varphi$ , 对于所有的  $z, \omega \in \mathbb{C}$  有

$$\varphi(\omega + z) = \varphi(\omega) + \varphi(z)$$

但是  $\varphi$  不是线性的.

Proof. 定义

$$\varphi: \mathbb{C} \to \mathbb{C}$$
$$x + yi \mapsto x - yi.$$

然后对于  $x_1 + y_1 i, x_2 + y_2 i \in \mathbb{C}$ , 有

$$\varphi((x_1 + y_1i) + (x_2 + y_2i)) = \varphi((x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i)$$

$$= (x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)i$$

$$= (x_1 - y_1)i + (x_2 - y_2)i$$

$$= \varphi(x_1 + y_1i) + \varphi(x_2 + y_2i)$$

所以  $\varphi$  满足加法分配律. 然而

$$\varphi(i \cdot i) = \varphi(-1) = -1$$

此外

$$i \cdot \varphi(i) = i(-i) = 1$$

则  $\varphi$  不是线性的.

## Problem 10

设  $U \neq V$  的子集且  $U \neq V$ . 设  $S \in \mathcal{L}(U, W)$  且  $S \neq 0$ . 定义  $T: V \to W$ 

$$Tv = \begin{cases} S\nu, & \text{if } v \in U \\ 0, & \text{if } v \in V \text{ and } v \notin U \end{cases}$$
 (1)

证明 T 不是 V 上的线性映射.

Proof. 令

$$v \in U, \ \omega \in V \text{ and } \omega \notin U$$

所以有

$$v + \omega \in V$$
 and  $v + \omega \notin U$ 

故下面不等式成立

$$T(v+\omega) \neq Tv + T\omega$$

故 T 不是 V 上的线性映射.