

# Distance vector of non tubical nanotube fullerenes of type-(5-0)

Amanda Babič, Aljaž Flus

Mentorja Riste Škrekovski, Janoš Vidali

13. marec 2025

# 1 Uvod

**Definicija 1.1** Vektor razdalje  $d_u$  je vektor, katerega  $i$ -ta koordinata predstavlja število vozlišč, ki so od izbranega vozlišča  $u$  oddaljeni natanko za  $i$ .

**Definicija 1.2** Graf fullerena je 3-povezan, 3-regularen ravninski graf, sestavljen izključno iz petkotnih in šestkotnih ploskev.

**Opomba 1.1** Po Eulerjevi formuli je število petkotnih ploskev vedno 12.

**Definicija 1.3**  $Z$   $L_0$  začetni sloj kot množico vozlišč, ki so sosednji s petkotnikom  $p$ , ki je središčni petkornik na začetku našega nanotuba in definiramo  $s$   $F_0 = \{p\}$ . Za vsak  $j = 1, \dots, k$  množica plasti  $F_j$  vsebuje vse plasti, ki so sosednje z vozlišči iz  $L_{j-1}$  in niso v  $F_{j-1}$ . Podobno  $L_j$  vsebuje vsa vozlišča, ki so sosednja plasti  $F_j$  in niso v  $L_{j-1}$ . Zato je nanotub sestavljen iz  $k+1$  plasti, kjer  $L_0$  in  $L_k$  vsebujeta 5 vozlišč, vsaka vmesna plast pa vsebuje 10 vozlišč.

**Definicija 1.4** Naj bo  $e = uv$  povezava v grafu  $C_{10k}$ , kjer je  $u \in L_{j-1}$  in  $v \in L_j$ . Vozlišču  $u$  rečemo odhodno vozlišče za  $L_{j-1}$ , vozlišču  $v$  pa pravimo da je prihodno vozlišče za  $L_j$ . Tukaj lahko opazimo, da imamo v vsaki plasti 5 odhodnih in 5 prihodnih vozlišč, ki se zaporedoma izmenjujejo.

**Definicija 1.5** Naj bo  $G$  neprazen končen povezan graf in  $v$  vozlišče v grafu  $G$ . Distančna particija  $\pi_d(v)$  relativno na  $v$  je skupina disjunktnih množic:

- $D_0 = v$ ,
- $D_i = u : d(v, u) = i, i = 1, 2, 3, \dots, ecc(v)$ ,  
kjer je  $ecc(v)$  ekscentričnost vozlišča  $v$ , t.j.  $ecc(v) = \max_{u \in V(G)} d(v, u)$

**Definicija 1.6** Naj bo  $G$  neprazen končen povezan graf in  $v$  vozlišče v  $G$ . Vektor distančne particije  $DV(v) \in \mathbb{N}^{diam(G)}$  za vozlišče  $v$  definiramo kot

$$DV(v) = (n_0(v), n_1(v), \dots, n_{diam(G)}(v)),$$

kjer je  $n_i(v) = |D_i|$  za  $i = 0, 1, \dots, ecc(v)$ , in  $n_i(v) = 0$  za  $ecc(v) < i \leq diam(G)$ .

V naslednjem delu poročila bomo zaradi večje preglednosti izpustili ničelne komponente vektorja  $DV(v)$ . Pripomnemo lahko še da bo  $n_0(v) = 1$  za vsak  $v \in V(G)$

## 2 Preverjanje izrekov

**Lema 2.1** Če imamo

$$\text{diam}(C_{10k}) = \begin{cases} 2k + 1, k = 2; \\ 2k, k \in \{3, 4\}; \\ 2k - 1, k \geq 5. \end{cases}$$

Potem lahko izračunamo ekscentričnosti.

V kodi sva preverila to lemo za zečetnih 20  $k$  in so rezultati pravilni. Iz tega sklepamo da to velja za vse  $k \in \mathbb{N}$

**Lema 2.2** Za ekscentričnosti vozlišč v grafu  $C_{10k}$  imamo:

- Če je  $k = 2$ , potem je  $\text{ecc}(v) = 5$  ta vse  $v \in V(C_{10k})$ .
- Če je  $k = 3$ , potem je  $\text{ecc}(v) = 6$  ta vse  $v \in V(C_{10k})$ .
- Če je  $k \geq 4$  in  $v \in L_j^{\text{in}} \cup L_{l-j}^{\text{out}}$  za  $1 \leq j \leq \lfloor k/2 \rfloor$  potem je

$$\text{ecc}(v) = 2(k - j) + \delta,$$

kjer je  $\delta = 2$  za  $(k, j) = (4, 2)$ ,  $\delta = 1$  za  $(k, j) \in \{(4, 1), (5, 2), (6, 3)\}$  in  $\delta = 0$  sicer.

- Če je  $k \geq 4$  in  $v \in L_j^{\text{out}} \cup L_{k-j}^{\text{in}}$  za  $0 \leq j \leq \lfloor k/2 \rfloor$  potem je

$$\text{ecc}(v) = 2(k - j) - 1 + \delta$$

kjer je  $\delta = 2$  za  $(k, j) \in \{(4, 1), (5, 2)\}$ ,  $\delta = 1$  za  $(k, j) \in \{(4, 0), (5, 1), (6, 2), (7, 3)\}$  in  $\delta = 0$  sicer.

Lemo 2 sva preverila in ugotovila, da velja za  $k = 2$  in  $k = 3$ . Vendar pa se pri večjih vrednostih  $k$  izkaže, da lema ne drži, pri čemer ni očitne rešitve, kako bi jo ustrezno popravila.

Za  $k \geq 2$  in za vsak  $j = 0, 1, \dots, k$  plast  $L_j$  razdeli naš nanotub na dva disjunktne dela. Lev del sestavljajo plasti  $L_i$  za  $i = 0, 1, \dots, j - 1$ , desni del pa je sestavljen iz plasti  $L_i$  za  $i = j + 1, \dots, k$ . Z  $L(v)$  označimo levo stran particije, z  $R(v)$  pa desno stran. Z  $D(v)$  pa označimo distančni vektor znotraj plasti  $L_j$ .

**Trditev 2.1** Naj bo  $k \geq 2$  in naj bo  $v$  vozlišče iz grafa  $C_{10k}$  tak da velja  $v \in L_j, 0 \leq j \leq k$ . Potem velja

$$D(v) = \begin{cases} (1, 2, 2), \text{ če } j \in \{0, k\}, \\ (1, 2, 2, 2, 2, 1), \text{ sicer,} \end{cases}$$

$L(v)$	$v \in L_j^{in}$	$v \in L_j^{out}$
$j = 1$	$[0, 1, 2, 2, 0, 0]$	$[0, 0, 2, 2, 1, 0]$
$j = 2, k = 2$	$[0, 1, 4, 6, 3, 1]$	
$j = 2, k \geq 3$	$[0, 1, 2, 4, 4, 3, 1]$	$[0, 0, 2, 3, 5, 4, 1]$
$j = 3, k = 3$	$[0, 1, 4, 6, 6, 6, 2]$	
$j = 3, k \geq 4$	$[0, 1, 2, 4, 5, 7, 5, 1]$	$[0, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 2]$
$j = 4, k = 4$	$[0, 1, 4, 6, 6, 6, 6, 5, 1]$	
$j = 4, k \geq 5$	$[0, 1, 2, 4, 5, 7, 7, 7, 2]$	$[0, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 6]$
$j = 5, k = 5$	$[0, 1, 4, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5]$	
$j = 5, k \geq 6$	$[0, 1, 2, 4, 5, 7, 7, 7, 6, 6]$	$[0, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 6, 5, 5]$
$6 \leq j \leq k-1, k \geq 7$	$[0, 1, 2, 4, 5, 7, 7, 7, 6, 6, 5^{\#2(j-5)}]$	$[0, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 6, 5^{\#2(j-4)}]$
$j = k, k \geq 7$	$[0, 1, 4, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5^{\#(2k-9)}]$	

Tabela 1: Vektorji distančne particije, kjer gledamo samo vektorje ki so levo od našega vozlišča. Notacija  $\#5^k$  nam predstavlja število petic zapored na koncu vektorja.

in

$$DV(v) = L(v) + D(v) + R(v).$$

Če imamo  $u \in L_j^{in}$  in  $v \in L_{k-j}^{out}$  zaradi simetrije velja  $R(u) = L(v)$ . Velja tudi obratno, če imamo  $u \in L_j^{out}$  in  $v \in L_{k-j}^{in}$  prav tako velja  $R(u) = L(v)$ . Zaradi tega je dovolj izračunati samo  $L(v)$ . Izračuni so objavljeni v Tabela 1.

V Tabela 1 opazimo, da se distančni vektorji razlikujejo za vozlišča znotraj iste orbite. To je posledica dejstva, da so vozlišča lahko bodisi vhodna bodisi izhodna. Vidimo, da je prvo število v vseh vektorjih vedno enako 0, saj upoštevamo le vozlišča v orbitah na levi strani izbranega vozlišča. Pri izhodnih vozliščih opazimo, da je tudi drugi element enak 0, kar pomeni, da sta potrebni vsaj dve potezi, da zapustimo svojo orbito. Poleg tega opazimo, da se distančni vektorji od  $k = 7$  naprej stabilizirajo.

**Izrek 2.1** *Naj bo  $k \geq 10$ . Dodatno naj bo  $x = 'in'$ , če je  $k$  sod in  $x = 'out'$ , če je  $k$  lih. Tako lahko izračunamo vektorje distančne particije za vsa vozlišča  $C_{10k}$ . Te vektorji so napisani v Tabela 2.*

V Tabela 2 lahko opazimo, da distančni vektor ni odvisen zgolj od tega, ali je vozlišče  $v$  vhodno ali izhodno, temveč tudi od tega ali je  $k$  sodo ali liho število.

	Vektor distanc DV(v)
$j = 0$ in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5^{\#(2k-9)}]$
$j = 1, k$ sod in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 5^{\#(2k-12)}]$
$j = 1, k$ sod in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5^{\#(2k-10)}]$
$j = 1, k$ lih in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5^{\#(2k-14)}]$
$j = 1, k$ lih in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 5^{\#(2k-12)}]$
$j = 2, k$ sod in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 11, 10, 8, 6, 6, 5^{\#(2k-12)}]$
$j = 2, k$ sod in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 12, 8, 7, 6, 6, 5^{\#(2k-14)}]$
$j = 2, k$ lih in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 11, 10, 8, 6, 6, 5^{\#(2k-14)}]$
$j = 2, k$ lih in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 12, 8, 7, 6, 6, 5^{\#(2k-16)}]$
$j = 3, k$ sod in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 9, 6, 6, 5^{\#(2k-16)}]$
$j = 3, k$ sod in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 12, 7, 6, 5^{\#(2k-14)}]$
$j = 3, k$ lih in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 9, 6, 6, 5^{\#(2k-18)}]$
$j = 3, k$ lih in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 12, 7, 6, 5^{\#(2k-16)}]$
$j = 4, k$ sod in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 8, 5^{\#(2k-16)}]$
$j = 4, k$ sod in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 6, 5^{\#(2k-18)}]$
$j = 4, k$ lih in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 8, 5^{\#(2k-18)}]$
$j = 4, k$ lih in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 6, 5^{\#(2k-20)}]$
$j = 5, k > 12$ , sod in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 10, 5^{\#(2k-21)}]$
$j = 5, k > 12$ , sod in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 5^{\#(2k-19)}]$
$j = 5, k > 13$ , lih in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 10, 5^{\#(2k-23)}]$
$j = 5, k > 13$ , lih in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 5^{\#(2k-21)}]$
$j > 5, k > 14$ , sod in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 10^{\#(2j-10)}, 5^{\#(2k-4j+1)}]$
$j > 5, k > 14$ , sod in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 10^{\#(2j-9)}, 5^{\#(2k-4j-1)}]$
$j > 5, k > 15$ , lih in $v \in L_j^{out}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 10^{\#(2j-9)}, 5^{\#(2k-4j-3)}]$
$j > 5, k > 15$ , lih in $v \in L_j^{in}$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 10^{\#(2j-10)}, 5^{\#(2k-4j-1)}]$
$j = \lfloor k/2 \rfloor, k$ sod za vsak $v \in L_j$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 10^{\#(k-10)}, 5]$
$j = \lfloor k/2 \rfloor, k$ lih za vsak $v \in L_j$	$[1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 13, 12, 11, 10^{\#(k-11)}, 5]$

Tabela 2: Vektorji distančne particije za graf  $C_{10k}$ , kjer je  $k \geq 10$ . Notaciji  $\#5^k$  in  $\#10^k$ , nam povejo število petic oziroma desetic na koncu distančnega vektorja