

Probabilidade

Esperança

Prof. Dr. Tetsu Sakamoto

Instituto Metr pole Digital - UFRN

Sala A224, ramal 182

Email: tetsu@imd.ufrn.br





Slides e notebook em:

github.com/tetsufmbio/IMD0033/





Na aula passada...

- Variáveis aleatórias
 - Discretas;
 - Finita;
 - Infinita;
 - Contínuas;
- Distribuição de probabilidade;
- Função de distribuição acumulada;




Propriedades das variáveis aleatórias

Medidas de tendência central:

- Média;

Medidas de dispersão:

- Variância;






Média em uma variável aleatória

Média do intervalo;

Média dos elementos;

Média da amostra;



Esperança matemática

Valor esperado, expectância

Valor médio “esperado” de um experimento se ele for repetido muitas vezes.

Média dos elementos de um espaço amostral ponderada pelas suas probabilidades.

$E(X)$, EX , μ




Esperança matemática em jogadas de n dados



$n \rightarrow \infty$

Qual é a média dos valores observados?






Esperança matemática em jogadas de n dados



$n \rightarrow \infty$

Qual é a média dos valores observados?

Cada valor aparecerá $n/6$ vezes.




$$\frac{\frac{n}{6} \cdot 1 + \frac{n}{6} \cdot 2 + \dots + \frac{n}{6} \cdot 6}{n} = \frac{1 + 2 + \dots + 6}{6} = 3.5$$

Esperança matemática em jogadas de n dados

$n \rightarrow \infty$

Qual é a média dos valores observados?

face	prob
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4






Esperança matemática em jogadas de n dados



$n \rightarrow \infty$

Qual é a média dos valores observados?

face	prob
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4



$$\frac{0,1.n.1+0,2.n.2+\dots+0,4.n.4}{n} = 0,1 + 0,4 + \dots + 1,6 = 3$$



Esperança matemática

$$\text{6 faces} \quad \frac{\frac{n}{6} \cdot 1 + \frac{n}{6} \cdot 2 + \dots + \frac{n}{6} \cdot 6}{n}$$

$n \rightarrow \infty$

$$\text{4 faces} \quad \frac{0,1 \cdot n \cdot 1 + 0,2 \cdot n \cdot 2 + \dots + 0,4 \cdot n \cdot 4}{n}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{\sum_x P(X=x) \cdot n \cdot x}{n} &= \sum_x P(X=x) \cdot x \\ & &= \sum_x p_x \cdot x \end{aligned}$$



Exemplo:

$X = \{\# \text{ de exercícios realizado por semana por João}\}$

Qual é o número de exercícios esperado que João faria em uma dada semana?

X	P(X)
0	0,1
1	0,15
2	0,4
3	0,25
4	0,1



O valor esperado é esperado?

Se $\mu = E(X)$, p_μ é alto?


Não necessariamente...

$$X \in \{0, 1\}$$

$$P_0 = P_1 = 0,5$$

$$E(X) = 0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 1 = 0,5$$

0,5 nunca ocorrerá...




0,5 é a média dos resultados após várias repetições do experimento

Esperança em uma distribuição discreta e infinita

$$\sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Problema de Basileia



Esperança em uma distribuição discreta e infinita

$$\sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Problema de Basileia


$$\frac{6}{\pi^2} \cdot \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x^2} = 1$$

$$p_x = \frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{1}{x^2}, \quad x > 0$$

$$E(X) = \sum_x p_x \cdot x$$

$$\sum_{x=1}^{\infty} \frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot x$$

$$\frac{6}{\pi^2} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x}$$




Esperança em uma distribuição discreta e infinita

$$p_x = \frac{3}{\pi^2} \cdot \frac{1}{2^x}, \quad x \neq 0$$

$$E(X) = \sum_x p_x \cdot x$$

$$E(X) = \infty - \infty$$

Esperança indefinida





Modificações nas variáveis aleatórias

Variáveis aleatórias X assumem um valor em R ;

Frequentemente temos interesse de analisar uma segunda variável relacionada ao X ($Y = g(X)$)

- Adição por uma constante $\rightarrow Y = X + 10$;
- Multiplicação por uma constante $\rightarrow Y = 1.1X$;
- Exponencial $\rightarrow Y = X^2$.


Adição por uma constante (Tradução)

Adição por uma constante b :

$$Y = X + b$$


$$P(Y = y) = P(X + b = y)$$

$$= P(X = y - b)$$



Adição por uma constante (Tradução)

$$E(Y) = E(X+b)$$



Adição por uma constante (Tradução)


$$E(Y) = E(X+b)$$

$$= \sum (p_x) \cdot (x+b)$$

$$= \sum (p_x \cdot x) + \sum (p_x \cdot b)$$

$$= \sum (p_x \cdot x) + b \sum (p_x)$$

$$= E(X) + b$$




Multiplicação por uma constante (dimensionamento)

Multiplicação por uma
constante **b**:


$$Y = bX$$

$$\begin{aligned} P(Y = y) &= P(bX = y) \\ &= P(X = y/b) \end{aligned}$$



Multiplicação por uma constante (dimensionamento)

$$E(Y) = E(bX)$$




Multiplicação por uma constante (dimensionamento)

$$E(Y) = E(bX)$$

$$= \sum (p_x) \cdot (xb)$$

$$= b \sum (p_x) \cdot (x)$$

$$= bE(X)$$





Exponencial

1 para 1

X

x	0	1	2
P(X=x)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$$Y = X^2$$

y	0	1	4
P(Y=y)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

muitos para 1

X

x	-2	-1	0	1	2
P(X=x)	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$Y = X^2$$

y	0	1	4
P(Y=y)	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$



Exercício

Um participante de um show de quiz tem duas perguntas a sua frente, questão 1 e questão 2. Ele pode escolher uma das perguntas para responder primeiro. Se ele responder a primeira pergunta selecionada errada, ele não poderá responder a segunda questão. Se os prêmios caso ele responda corretamente as questões 1 e 2 são respectivamente R\$200 e R\$100, e o participante possui 60% e 80% de certeza de responder corretamente as questões 1 e 2, qual das questões ele deve responder primeiramente para maximizar o prêmio esperado?



Revisão

Esperança matemática

- Valor médio “esperado” de um experimento se ele for repetido muitas vezes.
- Média dos elementos de um espaço amostral ponderada pelas suas probabilidades.