

二、高阶偏导数



函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y)$$

后者称为混合偏导数

定义：二阶及二阶以上的偏导数统称为**高阶偏导数**。



类似可以定义更高阶的偏导数.

例如, $z = f(x, y)$ 关于 x 的三阶偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$$

$z = f(x, y)$ 关于 x 的 $n-1$ 阶偏导数, 再关于 y 的一阶偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^{n-1} z}{\partial x^{n-1}} \right) = \frac{\partial^n z}{\partial x^{n-1} \partial y}$$



例4: 求函数 $z = e^{x+2y}$ 的二阶偏导数及 $\frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x+2y}$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2e^{x+2y}$$

(2)

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^{x+2y}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2e^{x+2y}$$

(3)

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 2e^{x+2y}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4e^{x+2y}$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right) = 2e^{x+2y}$$



注意:上例中 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x},$

与求偏导数的次序无关

一般而言: 这一结论并不总成立(如: 例5).

为此, 我们可证明以下结论:

定理: 如果二元函数两个混合偏导数在区域D上连续, 则它们必然在D上相等

例5、

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f_x(x, y) = \begin{cases} y \frac{x^4 + 4x^2 y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f_y(x, y) = \begin{cases} x \frac{x^4 - 4x^2 y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f_{xy}(0,0) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, \Delta y) - f_x(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-\Delta y}{\Delta y} = -1 \\ f_{yx}(0,0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f_y(\Delta x, 0) - f_y(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 \end{aligned} \right\} \text{二者不等}$$

