

- Mit tud mondani a hatványsor összegfüggvényének a határértékéről?

1. Tétel (Hatványsor összegfüggvényének a határértéke). Tegyük fel, hogy a $\sum \alpha_n(x-a)^n$ hatványsor R konvergenciasugara pozitív. Jelölje

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n(x-a)^n \quad (x \in K_R(a))$$

az összegfüggvényét. Ekkor $\forall b \in K_R(a)$ pontban létezik a $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ határérték, és

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n(b-a)^n.$$

- Mit tud mondani monoton függvények határértékéről?

3. Tétel. Legyen $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$ tetszőleges (korlátos vagy nem korlátos) nyílt intervallum. Ha az f függvény monoton (α, β) -n, akkor f -nek $\forall a \in (\alpha, \beta)$ pontban létezik a jobb oldali, illetve a bal oldali határértéke, és ezek végesek.

a) Ha $f \nearrow (\alpha, \beta)$ -n, akkor

$$\lim_{a+0} f = \inf \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x > a \},$$

$$\lim_{a-0} f = \sup \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x < a \}.$$

b) Ha $f \searrow (\alpha, \beta)$ -n, akkor

$$\lim_{a+0} f = \sup \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x > a \},$$

$$\lim_{a-0} f = \inf \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x < a \}.$$

- Definíálja egy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény pontbeli folytonosságát!

1. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, |x-a| < \delta: |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Jelölés: $f \in C\{a\}$.

- Mi a kapcsolat a pontbeli folytonosság és a határérték között?

4. Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Ha $a \in \mathcal{D}_f \setminus \mathcal{D}'_f$, azaz izolált pontja \mathcal{D}_f -nek, akkor $f \in C\{a\}$,
2. Ha $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$, azaz torlódási pontja \mathcal{D}_f -nek, akkor

$$f \in C\{a\} \iff \exists \lim_a f \text{ és } \lim_a f = f(a).$$

- Írja le a folytonosságra vonatkozó átviteli elvet!

5. Tétel (A folytonosságra vonatkozó átviteli elv). Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \text{ esetén } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a).$$

- Milyen tételt ismer hatványsor összegfüggvényének a folytonosságáról?

7. Tétel (Hatványsor összegfüggvényének folytonossága). Minden hatványsor összegfüggvénye folytonos a hatványsor teljes konvergenciahalmazán.

- Milyen tételt ismer a folytonos függvények előjeltartásáról?

8. Tétel (Előjeltartás). Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban és $f(a) > 0$. Ekkor

$$\exists K(a), \forall x \in \mathcal{D}_f \cap K(a) : f(x) > 0,$$

azaz $f(a)$ előjelét egy alkalmas $K(a)$ környezetben felvett függvényértékek is öröklik.

- Mondja ki az összetett függvény folytonosságára vonatkozó tételt!

9. Tétel (Az összetett függvény folytonossága). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C\{a\}$ és $f \in C\{g(a)\}$. Ekkor $f \circ g \in C\{a\}$, azaz az összetett függvény „örökli” a belső- és a külső függvény folytonosságát.