

COLLECTION "RICHESSSES CACHÉES"

COURS DE RADIOESTHÉSIE PRATIQUE

à l'usage des débutants de la
MÉTHODE PHYSIQUE

mise à la portée de tous, excluant tout occultisme

J. CORRENSON
Ancien Elève
de l'Ecole Polytechnique

et

P. BÉASSE
Technicien-Conseil
Radio-Physicien



INSTRUCTION GÉNÉRALE ET DÉVELOPPEMENT DE LA SENSIBILITÉ
EN 30 LEÇONS PLUS DE 150 EXERCICES FACILES

Appendice : Procédés de la Méthode MENTALE, par P. BÉASSE

RICHESSES IGNORÉES

COURS

DE

RADIESTHÉSIE

PRATIQUE

DES MEMES AUTEURS :

Ouvrages parus :

Traité Élémentaire Théorique et Pratique de Radiesthésie Physique, par J. CORRENSON, Ancien Elève de l'Ecole Polytechnique. 1936. (Epuisé).

Nouveaux procédés simples et rationnels de Radiesthésie Physique, par P. BÉASSE, Technicien-conseil. 1938. (Epuisé).

La Radiesthésie expliquée et pratiquée par la Méthode Physique, par P. BÉASSE, Technicien-conseil. 1939. (Trois éditions : française, anglaise, espagnole).

Cours de Radiesthésie Pratique à l'usage des débutants de la Méthode Physique, par J. CORRENSON, Ancien Elève de l'Ecole Polytechnique, et P. BÉASSE, Technicien-conseil. 1943. TOME I : Instruction Générale et Développement de la Sensibilité (suivi d'un Appendice sur les procédés de la Méthode Mentale, par P. BÉASSE).

En préparation :

Cours de Radiesthésie Pratique à l'usage des débutants de la Méthode Physique, par P. BÉASSE, Technicien-conseil. TOME II : Applications diverses et Prospection.

Visa de Contrôle de la Censure Scientifique, Secrétariat Général,
de l'Information : N° 8.089, du 30 septembre 1943.

Copyright by Pierre BÉASSE, Editeur, 1943. — Droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Pour s'initier sans Professeur

COURS
de
RADIESTHÉSIE
PRATIQUE

à l'usage des débutants de la

MÉTHODE PHYSIQUE

mise à la portée de tous, excluant tout occultisme

par

J. CORRENSON

Ancien Elève
de l'Ecole Polytechnique

et

P. BÉASSE

Technicien-Conseil
Radio-Physicien



Instruction Générale. — Développement de la Sensibilité

En 30 Leçons — 150 Exercices faciles

Appendice :

Procédés de la Méthode MENTALE, par P. BÉASSE

Ouvrage couronné

par le Syndicat des Journalistes et Ecrivains

Concours de 1943

Par suite des conséquences de
la guerre, nous ne pouvons
offrir qu'un papier de qualité
inférieure, bien que de prix
élevé. Nous nous en excusons
auprès de nos Lecteurs.

TABLE DES MATIÈRES DU TOME I

	Pages
AVERTISSEMENT	V
ABRÉVIATIONS	VII

AVANT-PROPOS. — Qu'est-ce que la Radiesthésie ?

Le Monde extérieur. Sa connaissance à l'aide des perceptions sensibles. Les 5 sens externes usuels. Le 6^{mo} sens externe, chez les animaux, chez l'homme primitif, chez le civilisé IX

La Radiesthésie. Sa définition. Son objet. Le phénomène radiesthésique. La radiesthésie est-elle une science ou un art ? Le vocabulaire radiesthésique. La Radiesthétique XIV

CHAPITRE PREMIER. — Qu'est-ce que la Radiesthétique ? 1

§ 1 ^{er} La Microphysique	3
§ 2. Le rayonnement de la matière (Les ondes électro-magnétiques, dont le rayonnement spécifique. Les radiations corpusculaires)	3
§ 3. Electricité	9
§ 4. Magnétisme	11
§ 5. Radio-activité	15
§ 6. Lumière	17
§ 7. Rayons telluriques nocifs. Damier du D ^r Peyré	19
§ 8. La Biologie infinitésimale. La polarité humaine	24

CHAPITRE II. — Les instruments du radiesthésiste 33

§ 1 ^{er} La baguette neutre des sourciers	34
§ 2. Le pendule neutre	39
§ 3. Les instruments actifs	44

	Pages
CHAPITRE III. — La perception des ondes	49
1 ^{re} Leçon : Réglage expérimental du pendule sur la nappe des rayons verticaux des différents corps. La perception des rayons spécifiques	52
2 ^{me} Leçon : Polarité des corps. Corps positifs. Corps négatifs	64
3 ^{me} Leçon : Giration du pendule, l'index de la main libre en antenne. Réaction différente quand cet index est mis en contact direct avec l'objet radiant	72
4 ^{me} Leçon : Giration du pendule par l'intervention du rayon visuel	77
5 ^{me} Leçon : Giration du pendule par l'intervention du rayon mental	80
6 ^{me} Leçon : Le travail à la Pointe-Antenne. La Réflexion. La Réfraction	84
7 ^{me} Leçon : Réglage du pendule neutre sphérique de précision	89
8 ^{me} Leçon : Autoréglage du Pendule. Cas du pendule creux. Cas du pendule plein. Le pendule coloré	100
9 ^{me} Leçon : Les rayons à 45° et à 135°	103
10 ^{me} Leçon : Les séries. Le Nombre Particulier. Le Nombre Caractéristique	105
11 ^{me} Leçon : L'angle fondamental. Le Plan fondamental.	110
12 ^{me} Leçon : Les « Témoins »	118
13 ^{me} Leçon : Mode d'emploi du Révélateur SCHUMFELL de précision, anti-images	121
CHAPITRE IV. — Quelques phénomènes de microphysique d'utilité pratique	126
14 ^{me} Leçon : Lignes et Plans fluidiques	126
15 ^{me} Leçon : Les champs fluidiques. La Croix magnétique. Le champ fluide d'un aimant rectiligne. Triangle photogénique	131
16 ^{me} Leçon : Le Rayon d'Union	139
17 ^{me} Leçon : Le rayonnement radio-actif des corps. L'axe spécifique des corps simples	145
18 ^{me} Leçon : Amplification par l'action de la Radio-activité . .	147
19 ^{me} Leçon : Les Ondes de forme	150

	Pages
20 ^{me} Leçon : Les Rayons Telluriques nocifs. La pointe verticale. L'antenne. Les écrans	153
21 ^{me} Leçon : La recherche d'un cours d'eau souterrain.....	162

CHAPITRE V. — Le Rayonnement des Etres Vivants 170

22 ^{me} Leçon : Les rayons nerveux. L'onde vitale. L'onde sexuelle. L'onde humaine	172
23 ^{me} Leçon : Le rayon mental. Les ondes d'espèces	176
24 ^{me} Leçon : Le rayon sympathique. L'onde personnelle	179

CHAPITRE VI. — Les Images en Radiesthésie 183

25 ^{me} Leçon : Les diverses catégories d'images. Leur élimination. Tableaux synoptiques de leurs propriétés physiques	184
26 ^{me} Leçon : Les images diurnes	196
27 ^{me} Leçon : Les images permanentes	205
28 ^{me} Leçon : La Rémanence et l'Imprégnation	207
29 ^{me} Leçon : L'Imprégnation mentale	215
30 ^{me} Leçon : Les Ecueils	217

AVERTISSEMENT

Au moment de la publication de l'ouvrage « La RADIES-THÉSIE expliquée et pratiquée par la MÉTHODE PHYSIQUE » de P. BÉASSE, plusieurs correspondants avaient exprimé le vœu de lui voir adjoindre un guide exclusivement pratique, mais, en même temps suffisamment clair et précis pour que, avec son aide, un débutant de cette méthode pût s'instruire facilement lui-même, sans avoir besoin de recourir à l'expérience d'un professeur.

C'est à ce vœu que s'efforce de répondre ce manuel présenté aujourd'hui au public. Si ce livre s'adresse avant tout à un lecteur qui possède, du moins dans ses grandes lignes, l'essence du traité précité, il a été composé de façon à ce qu'il pût, à la rigueur, se suffire à lui-même, et que l'ensemble de son texte constituât un tout suffisamment complet.

C'est pourquoi chaque série de leçons est précédée d'une documentation très succincte résumant, dans le minimum de mots, l'exposé des questions traitées dans les exercices proposés à sa suite, et permettant de les exécuter aisément avec logique et méthode.

Une méthode, si bonne soit-elle, ne se suffit pas à elle-même. Une grande part du succès réside dans l'exécution ; c'est pourquoi nous nous sommes appliqués à régler avec le plus de précision possible, les modalités d'exécution pour alléger encore l'effort de l'élève. Notre but est d'être complet, car ce qui inquiète souvent un néophyte est considéré comme tout naturel pour le lecteur déjà averti.

D'autre part, la Microphysique étant en perpétuel progrès, cette documentation a été augmentée de quelques précisions résultant d'acquisitions nouvelles.

Ce Cours étant, avant tout, destiné à un débutant, le texte strictement indispensable à son initiation a été imprimé en grands caractères, réservant le texte en plus petits caractères au radiesthésiste confirmé ou au néophyte pourvu d'un bagage scientifique suffisant. Mis à la portée de tout le monde, ce cours pratique évince tout exposé scientifique d'un ordre trop élevé pour ne pas être saisi immédiatement.

Enfin, un appendice sur les procédés de la Méthode MENTALE, par Pierre BÉASSE, a été adjoint à ce cours. Il est destiné aux adeptes exercés de la Méthode PHYSIQUE, dont la sensibilité spéciale ou simplement développée grâce à ce cours, ou encore les aptitudes particulières, permettraient la pratique de la Méthode Mentale, pour plus de commodité.

ABRÉVIATIONS

Ondes EM	Onde électro-magnétique.
Ondes ES	Onde spécifique de l'électricité, à support électrique.
Ondes MS	Onde spécifique du magnétisme, à support magnétique.
Image EM	Image électro-magnétique.
Champ El	Champ électrique des Physiciens.
Champ Mag	Champ magnétique des Physiciens.
Champ ES + ..	Espace limite parcouru par des rayons spécifiques à supports électriques positifs.
Champ MS — ..	Espace limite parcouru par des rayons spécifiques à supports magnétiques négatifs.
Champ RS	Espace limite parcouru par des rayons spécifiques à support radioactif.
Image M	Image magnétique.
Image RA	Image radioactive.
Image ERM	Image électro-radio-magnétique.
Image ERA	Image électro-radioactive.
Image IM	Imprégnation mentale.
N ^m	Nord magnétique.
S ^m	Sud magnétique.
N-S	Nord-Sud.
E-O	Est-Ouest.
N. O. S. E. ..	Nord. Ouest. Sud. Est.
N. E. S. O. ..	Nord. Est. Sud. Ouest.
Pf	Plan fondamental.
Pef	Plan électro-fondamental.
Rayons CL	Rayons calorifiques.
Rayons CH	Rayons chimiques.
CM	Croix magnétique.

P ou +	Positif.
N ou —	Négatif.
±	Plus ou moins, suivant le cas.
Rf	Rayon fondamental.

Les mots : onde, rayon, radiation, rayonnement, vibration, ont, en principe, le même sens dans cet ouvrage. Ces termes sont employés pour exposer avec le maximum de clarté possible des faits encore plus ou moins obscurs.

Appellation des lettres de l'alphabet grec utilisées :

α alfa	ν nu
β bêta	$\omicron$ omicronn
γ gamma	π pi
ε epsilon	ρ rô
ζ dzéta	σ sigma
θ thêta	τ tau
κ kappa	ω oméga
μ mu	

Reports à l'ouvrage : « Radiesthésie Méthode Physique »

Au cours des leçons qui vont suivre, nous référerons souvent le lecteur à l'ouvrage « La Radiesthésie expliquée et pratiquée par la Méthode Physique », de P. BÉASSE. Il y trouvera un complément de détails qui faciliteront sa compréhension et aideront à ses progrès. L'indication de ces pages paraîtra en caractères comme suit : (Page 57 de « Radiesthésie Méthode Physique »). Par contre, lorsque nous renverrons le lecteur à une leçon du présent manuel, l'indication de la page se fera en caractères courants : (Page 57).

AVANT-PROPOS

Ce cours comporte deux genres de textes :

L'un, imprimé en caractères normaux, essentiellement pratique, à la portée de tout le monde, est destiné au prospecteur : — l'autre, imprimé en caractères plus petits, est plus théorique et destiné aux techniciens.

QU'EST-CE QUE LA RADIESTHÉSIE ?

Du monde extérieur qui nous entoure, nous ne connaissons presque rien. Les idées que nous nous faisons à son sujet ne nous sont suggérées que par l'impression que ce monde exerce sur les organes de chacun des sens externes dont le Créateur nous a pourvus. C'est aux images que cette impression représente, et aux rapports qu'elles nous permettent de déduire entre des objets réels qui nous échappent, que se borne notre connaissance de la matière.

L'excitation physiologique que détermine sur ces organes l'action d'une réalité impossible à saisir produit sur notre sensibilité une modification instantanée que nous nommons la **sensation**. A côté du fait **affectif** que l'on constate dans toute sensation, se produit, en même temps, dans notre intelligence, un fait de connaissance, un **fait représentatif** ; et c'est l'ensemble de ces deux faits, indissolublement liés l'un à l'autre par la conscience, qui détermine l'image sensible que nous nous représentons.

Ainsi, lorsque, transmises par l'air, les vibrations d'une corde de piano viennent frapper la peau de tambour que constitue notre tympan, nous éprouvons une sensation

d'ébranlement que notre intelligence se représente immédiatement comme le son d'un timbre et d'une hauteur déterminés. Lorsque les rayons lumineux diffusés par un objet coloré viennent, après réfraction dans notre organe visuel, frapper notre rétine, nous nous représentons instantanément une nuance de couleur déterminée.

Pour la clarté de la compréhension des phénomènes dont nous sommes les perpétuels témoins, les psychologues ont convenu d'appeler **sensation**, leur côté affectif ; et **perception** leur côté représentatif, et notre conscience nous révèle l'existence, en chacun d'eux, aussi bien du premier que du second de ces deux aspects.

Leur mécanisme peut, d'ailleurs, s'analyser ainsi :

- 1° L'excitation extérieure produit, sur l'organe sensible, une impression physiologique ;
- 2° Cette impression est transmise au cerveau par les nerfs sensibles ;
- 3° Dans le cerveau, se produit alors le mouvement à la suite duquel apparaît, dans la conscience, la sensation, agréable, désagréable ou indifférente, en connexion de laquelle se forme presque instantanément la représentation de l'image sensible qui naît dans notre intelligence ;
- 4° Enfin, dans la plupart des cas, le cycle se complète par une réaction motrice que les nerfs moteurs transmettent à l'organe impressionné. C'est le sursaut violent que détermine un bruit insolite ou l'éclair d'un coup de tonnerre soudain ou de la flamme d'une explosion inattendue, c'est le retrait de la main au contact d'un objet à haute température.

Mais il peut se faire aussi que l'ébranlement nerveux, au lieu d'être transmis au cerveau, soit simplement enregistré par la moelle épinière et n'aille pas plus loin. Dans ce cas, la conscience n'apparaît pas, mais la sensation motrice se déclanche au dehors par des gestes, et au dedans, sous forme de mouvements automatiques irréfléchis, auxquels on donne le nom de réflexes.

Les six sens externes

En sus des cinq sens usuels auxquels nous sommes redevables des sensations visuelles, auditives, tactiles, gustatives, olfactives, il existe un **sixième sens externe**, plus ou moins parfait, plus ou moins développé chez les animaux ou chez l'homme primitif, fortement atténué et le plus souvent complètement atrophié chez l'homme civilisé, c'est le sens radiesthésique ou sens de la perception sur place ou à distance du rayonnement de la matière.

C'est sur les indications de ce sens que l'oiseau migrateur se dirige, que le pigeon rejoint son colombier, l'abeille sa ruche, que le Nègre du Centre de l'Afrique ou le Peau Rouge de l'Amazone retrouvent leur case ou leur campement, que le chien ou l'animal féroce découvrent le premier le gibier, le second sa proie.

L'organe de ce sens, chez l'homme, est le **récepteur humain** pour lequel chaque extrémité nerveuse constitue une antenne réceptrice. Sa structure et son mécanisme sont encore insuffisamment étudiés, alors qu'ils mériteraient de l'être avec autant de soin que ceux des organes de l'audition et de la vision dont le fonctionnement est exposé en tous détails dans les ouvrages de physique.

« En radiesthésie, les animaux sont nos maîtres », a pu dire avec beaucoup de vérité le commandant de la Bastide ; et, aux animaux, nous ajouterons l'homme primitif dont le comte de Marsay, dans son ouvrage « Electricité, Magnétisme, Radiesthésie », a décrit quelques traits de perception radiesthésique qui lui laissent peu à envier au privilège de ses frères inférieurs.

Chez les êtres parfaits à ce point de vue, il est infiniment probable que le mécanisme de la perception par le 6^{me} sens est absolument identique à ce qu'il est chez l'homme normal pour la perception par ses sens usuels. L'ébranlement atteint le cerveau et détermine la formation d'une **image consciente**. Chez les êtres à réception atténuée, cette image est presque inconsciente. Enfin, chez les êtres dont le récepteur radiesthésique est presque atrophié, l'ébranlement

ne dépasse pas la moelle épinière et détermine simplement des mouvements automatiques dont la réalité ne nous apparaît que lorsque leur amplitude a été considérablement multipliée par l'intervention d'un détecteur artificiel. C'est seulement sur la constatation de ces mouvements devenus sensibles que l'intelligence intervient pour les interpréter.

Si nous prolongeons par le fil d'un pendule réglé les extrémités nerveuses de l'une de nos mains, les mouvements de cette main, sans être toujours visibles, deviendront, cependant, assez prononcés pour déterminer soit le balancement, soit la giration de l'instrument, s'il se trouve placé dans une zone radiante.

Si, après avoir saisi dans les conditions requises la baguette avec les deux mains, nous pénétrons dans une zone radiante, les muscles qui la forceront à se relever ou à s'abaisser obéiront à une action réflexe tellement violente que notre volonté sera absolument incapable de la maîtriser ou de la contrarier. Nos mains auront cessé de nous appartenir pour devenir momentanément **le jouet d'une impulsion**, provoquée par une action extérieure et à l'égard de laquelle nous ne pourrons que constater notre complète impuissance.

A l'égard d'un organe de sens radiesthésique atténué, l'amplificateur jouera le rôle du cornet acoustique pour la diminution de la surdité, des verres de lunettes pour la correction d'une vue anormale, enfin celui du microscope ou du télescope lorsque nous chargeons ces instruments de suppléer à l'imperfection et à l'insuffisance de notre organe visuel.

La perception du rayonnement de la matière

C'est sous la forme de radiations corpusculaires ou d'**ondes électro-magnétiques** simples que se manifeste le rayonnement de la matière, mais ce sont ces dernières, seules, qui excitent le sens radiesthésique.

Le choc des ondes électro-magnétiques peut, cependant, impressionner des organes sensibles autres que celui du sixième sens externe. Certains radiesthésistes aperçoivent des sortes de vapeurs sur la verticale des ruisseaux souter-

rains. D'autres, lorsqu'ils prospectent un filon de minéral cuivre perçoivent, d'après M. Viré, docteur ès sciences, le goût amer du vert de gris ; d'autres perçoivent à distance l'odeur de l'objet radiant qu'ils cherchent.

Mais c'est le sens du toucher qui est le plus fréquemment affecté. Les ondes E.M. de longueur d'onde infinitésimale produisent sur la main qu'elles frappent tantôt une sensation de chaleur, tantôt une sensation de froid ; parfois elles provoquent une raideur des tendons et des muscles.

C'est ainsi qu'avec un peu d'exercice certains médecins parviennent à distinguer du premier coup par la sensation du rayonnement particulier qui s'en échappe un organe malade d'un organe sain et finissent par devenir très experts dans ce genre de discrimination.

Saisissons dans notre main droite une tige d'acier assez importante et terminée par une pointe assez effilée. Dirigeons cette pointe vers le poignet de notre main gauche, mais de façon qu'elle reste contenue dans un plan vertical orienté soit N.O.S.E., soit N.E.S.O. Nous éprouverons, au bout de quelques secondes, au point frappé par le rayonnement de la pointe, une sensation très nette de refroidissement que rendra encore plus sensible la sensation de réchauffement qui lui succédera, lorsque nous écarterons définitivement la pointe du poignet gauche. Si, au contraire, nous laissons son action se prolonger quelque temps, nous constaterons une certaine raideur des muscles de la main, raideur qui, après avoir atteint l'avant-bras, s'étendra peu à peu du coude jusqu'à l'épaule.

Certaines personnes distinguent très facilement le plein du vide, à la seule présentation de la main et reconnaissent non seulement la présence de cavités souterraines, mais encore les profondeurs différentes de certaines de leurs parties.

Qu'est-ce que la Radiesthésie ?

Du mot radiesthésie, chacun, suivant sa culture et son tempérament, a donné une définition qui, le plus souvent, détourne le terme de son sens étymologique, lequel n'est autre que **sensibilité aux radiations** (du mot grec **aïsthésis** qui signifie sensibilité). Nous nous permettrons donc de proposer celle qui, compte tenu de tout ce qui précède, nous paraît la plus logique et la plus conforme à la réalité des faits, en disant que **la radiesthésie est la faculté de percevoir le rayonnement de la matière**. Le terme de radiesthésie devient donc absolument analogue à ceux de vision, audition, toucher, facultés de percevoir les odeurs ou les goûts.

De même qu'on appelle **optique** et **acoustique** les branches de la physique qui concernent l'étude des phénomènes perceptibles à l'aide des sens de la vue et de l'ouïe, de même, il sera logique d'appeler **radiesthétique** la branche de la physique qui est en train de naître, et qui concerne l'étude des phénomènes perceptibles à l'aide des impressions du sixième sens.

C'est en nous plaçant à ce point de vue que nous exposerons l'étude sommaire qui fait l'objet du chapitre premier, avant de commencer celle de la **rééducation pratique du sixième sens** qui forme, pour nous, l'objet principal du présent manuel et qui constituera la matière des autres chapitres.

Le phénomène radiesthésique

Ayant fixé, dans la mesure où cela nous a été possible, la nature du sixième sens externe, nous n'en sommes que plus à l'aise pour définir le **phénomène radiesthésique** tel que nous le voyons se produire avec l'organe fortement diminué du civilisé normal. Ainsi que nous l'avons exposé dans l'ouvrage : « **La Radiesthésie expliquée et pratiquée par la Méthode Physique** », page 14, ce phénomène n'est pas simple au sens propre du mot, mais comporte une succession de trois faits :

1° Un fait physique, extérieur à l'opérateur et objectif qui n'est autre que l'émission d'une source radiante, rayonnement de la matière d'un ordre de grandeur infinitésimal ; notre appareil récepteur humain étant aussi passif et aussi inconscient que possible.

2° Un fait physiologique et subjectif, C'est le choc de l'émission de cette source sur l'organe atténué de notre sixième sens ; et, comme conséquence, la naissance d'un réflexe, ainsi que celle du mouvement consécutif qu'il détermine, mouvement amplifié par le détecteur (pendule ou baguette).

Un réflexe, par lui-même, est inconscient, mais son effet ne l'est pas toujours ; et, dans le cas du phénomène radiesthésique, cet effet, mouvement de la baguette ou du pendule, nous donne la conscience d'une sensation de l'organe du toucher, qui constitue la **perception sourcière**.

3° Un fait psychique. C'est une seconde intervention de notre intelligence qui, en déduisant du fait physiologique l'existence du fait physique et objectif vient donner au second fait l'interprétation que paraît dicter la raison. Lorsque le rôle de l'intelligence se limite à la seule constatation de la relation qui existe entre le premier et le second fait, c'est que l'opérateur a laissé le cycle se produire automatiquement, c'est qu'il a adopté l'**attitude passive**, celle qui convient aux procédés de radiesthésie par la **Méthode Physique**.

Mais il est hors de doute que, dans la perception du phénomène radiesthésique, l'âme peut intervenir activement, notamment par l'exercice de la volonté. L'opérateur pourra, par exemple, adopter l'**attitude sélective** propre aux procédés de radiesthésie par la **Méthode Mentale** ; c'est-à-dire que, dans une nuée de rayonnements différents, il ne permettra à son organe d'être réceptif qu'à ceux en provenance d'une source radiante déterminée, dont il aura mentalement fait choix, à l'exclusion des autres. Son attitude sera absolument comparable à celle de l'auditeur d'un concert qui, de toute la musique d'un orchestre, s'imposera de n'entendre que les notes d'un instrument déterminé. (On

remarquera, d'autre part, que si la sélection des sons est possible, il en est de même de celle des odeurs et des goûts).

C'est l'exercice de cette faculté que le Frère Padey nomme l'emploi du « fluide d'intention » et que d'autres radiesthésistes désignent sous le nom « d'appel à l'orientation mentale ».

L'attitude sélective, dans les cas où elle s'impose, doit précéder l'opération de la recherche. Il faut séparer avant de saisir.

Enfin, il existe une **troisième attitude** sur laquelle nous n'insisterons pas dans le présent manuel, parce que, semblant exiger des facultés spéciales, elle ne paraît présenter aucun intérêt pour le débutant ; c'est l'exercice de la **convention mentale**.

Certains radiesthésistes, chez qui l'intervention psychique est prépondérante, ont nié la possibilité de la perception dans l'attitude passive. Mais cette opinion est contraire, non seulement aux lois de la psychologie, mais surtout aux faits eux-mêmes. Que de fois n'arrive-t-il pas de tenir entre les doigts un pendule réglé sur le rayonnement d'une substance déterminée. Tout à coup, au milieu d'une conversation, alors qu'on n'a même plus conscience de l'avoir en mains, l'instrument se met à tourner. Cherchant les raisons d'un fait aussi inattendu, on constate que le pendule se trouvait effectivement sur la verticale d'une substance identique à celle pour laquelle il avait été réglé. Le récepteur humain s'était comporté comme une machine absolument automatique !

Quand deux opérateurs voisins ont, en mains, un pendule réglé pour la même substance, si l'un des deux appareils vient à tourner, l'autre suit inmanquablement le même mouvement, par le fait d'une sorte de résonance, par synchronisme, ou d'une transmission de réflexes analogue au fait de la contagion du bâillement en société.

La passivité peut être inconsciente et involontaire ; dans ce cas, elle est absolue, comme dans les deux faits précédents. Mais elle peut aussi être imposée par la volonté ; dans ce cas, elle n'est que relative, et se rapproche

d'autant plus de la passivité absolue que le sujet a plus d'empire sur lui-même.

La Radiesthésie est-elle un art ou une science ?

Si on conserve au mot radiesthésie son sens étymologique, ou si on lui donne la définition que nous avons choisie, il ne peut pas plus y avoir de radiesthésie scientifique qu'il ne peut exister d'audition scientifique, de vision scientifique, de dégustation scientifique. On a l'ouïe plus ou moins fine, la vue plus ou moins perçante, le palais plus ou moins éduqué ou raffiné, mais on ne peut avoir l'œil, l'oreille ou le palais savants.

Par contre, la **Radiesthétique**, étude des phénomènes révélés par les perceptions du sixième sens, est une branche de la physique, et, par conséquent, une science d'observation.

Pour les mêmes raisons, la radiesthésie ne saurait être un art ; mais la **technique radiesthésique**, recueil des procédés les plus avantageux pour faciliter ou amplifier la perception radiesthésique, est, incontestablement, un art. Il ne suffit pas d'être sensible ; il faut, encore, savoir tirer tout le parti possible de l'exercice de cette faculté.

Les objections contre la Radiesthésie :

Comme toutes les nouveautés susceptibles d'inquiéter des intérêts acquis, il n'était pas possible qu'à ses débuts, la radiesthésie ne provoquât pas de violentes réactions. C'est bien ce qui s'est passé, en effet.

Nous ne reviendrons pas sur une question qui a été traitée dans l'ouvrage : « **La Radiesthésie expliquée et pratiquée par la Méthode Physique** » avec toute l'ampleur nécessaire ; mais à propos des écrits parus sur ce sujet, nous nous permettrons d'ajouter un simple mot :

Pour pouvoir rendre un arrêt équitable, il faut que le juge soit impartial, cela va de soi, mais, avant tout, compétent. Pour mériter d'être entendu, il est indispensable que celui qui parle ou qui écrit, connaisse parfaitement la

question qu'il traite, que sa connaissance ne soit pas que le résultat de l'étude des livres écrits sur le sujet, mais bien une connaissance expérimentale. « C'est en forgeant que l'on devient forgeron ». Que dirait-on d'un aveugle de naissance qui voudrait nous persuader de l'inexistence des couleurs ? Que penserait-on d'un sourd-muet suffisamment rééduqué qui se proposerait de faire une conférence sur les œuvres de Mozart ou de Chopin ? Condamner à priori la radiesthésie, sans avoir essayé, au préalable, de faire tourner une baguette ou un pendule, c'est tenter de réaliser un tour de force aussi prodigieux.

Car, enfin, comme dirait le Maréchal Foch : « De quoi s'agit-il dans toute cette controverse ? » Il s'agit de savoir si, oui ou non, le sens radiesthésique existe. C'est la vraie, l'unique question qui se pose. Toutes les autres sont accessoires. Comment la résoudre si l'on n'est pas radiesthésiste ? Si l'on n'en a acquis qu'une idée livresque ? Pourquoi se refuser à en faire l'expérience personnelle ? Nous ne demandons pas de « croire ». Nous demandons de « savoir » par l'expérience.

Ceux qui veulent l'éluder viennent nous dire : « Il y a des radiesthésistes qui se trompent ». Nous répondrons : Quel est le médecin qui n'a jamais commis d'erreur de diagnostic ? D'autres ajouteront : « Il y a des radiesthésistes qui, lorsqu'ils parlent science, disent d'affreuses bêtises ». Et quand cela serait ? Vous jouez faux sur un instrument. Vous êtes un mauvais musicien, voilà tout. Mais personne n'oserait prétendre que votre instrument n'existe pas, ni que d'autres plus habiles que vous ne sauront pas un jour en tirer des merveilles.

Comme les chemins de fer ont débuté il y a cent ans, la radiesthésie débute en ce moment. Ceux qui considèrent les merveilleuses machines ultra-modernes qui circulent maintenant constatent qu'elles ne ressemblent que de très loin à la locomotive du train dans lequel Dumont d'Urville perdit la vie.

Quand elle comptera le même nombre d'années que les chemins de fer, qui pourra dénombrer les immenses services que la Radiesthésie aura rendus à l'humanité ?

Que serait devenue la sensationnelle découverte du mouvement réel de la terre sans le calme mépris du physicien Galilée, qui fut jusqu'à être dénoncé hérétique par l'Inquisition en 1633, se heurtant ainsi à l'incompréhension générale ?

Que serait devenue l'une des plus belles découvertes de la physique moderne, l'électricité dynamique, sans le courage téméraire du physicien Galvani, devant les habiles calomnies de ses détracteurs en 1780 ?

Que serait devenue la merveilleuse découverte de la T.S.F. sans les énergiques et ardentes convictions de l'ingénieur Hertz, sur la propagation des ondes électriques, bouleversant préjugés et routines et faisant jaillir sa victorieuse étincelle en 1885 ?

Le grand Pasteur lui-même, véritable révolutionnaire dans l'art de guérir, en 1890, fut traduit « comme accusé » selon l'expression de Brouardel, à la tribune de l'Académie de Médecine « lorsqu'il dut entendre clamer que ses découvertes étaient antiscientifiques, inefficaces, dangereuses et qu'elles constituaient un double péril : péril social, homicide ; — péril intellectuel, la déraison ! »

Laissons actuellement les esprits que la Radiesthésie chagrine écrire en paix les pages qui les soulagent et passons... mais non sans avoir constaté que si la Radiesthésie compte encore des détracteurs, elle compte aussi parmi ses défenseurs des noms illustres.

Parmi ceux-ci, citons le glorieux Edouard Branly, qui accepta jusqu'à sa mort le titre de Président d'honneur de l'Association Internationale des Amis de la Radiesthésie, et MM. Deslandres et d'Arsonval (ce dernier décédé récemment), tous deux membres de l'Institut, l'un actuel Président d'honneur, le second Membre d'honneur de l'Association Scientifique Française de Radiesthésie.

CHAPITRE PREMIER

QU'EST-CE QUE LA RADIESTHÉTIQUE ?

On a donné plusieurs définitions de la science. Les uns l'ont dénommée la connaissance exacte et raisonnée d'un ensemble de faits d'une catégorie bien déterminée ; d'autres ont pu dire avec plus de justesse que la science est un effort pour réduire à l'unité stable de la loi la fuyante complexité des faits. La science n'est science, en effet, qu'à la condition de se dégager des faits particuliers et d'établir des lois générales.

Ceci étant bien entendu, on a classé les sciences en trois catégories :

1° Les sciences mathématiques ou sciences exactes dont les acquisitions relèvent du raisonnement déductif.

La mathématique ou science de la grandeur mesurable ou de la quantité envisagée sous forme de nombres ou de figures, est la plus simple de toutes les sciences parce qu'il n'y a qu'à réfléchir pour saisir les rapports vrais des idées qu'elle présente.

2° Les sciences naturelles dont le développement relève exclusivement de l'observation des faits et de l'induction. C'est dans cette deuxième catégorie que se classe la physique, ou connaissance raisonnée de ce que nous pouvons savoir du monde extérieur.

3° Les sciences morales qui tiennent le milieu entre les deux.

Nos cinq sens externes connus peuvent être considérés comme des fenêtres ouvertes sur le monde extérieur et qui nous permettent d'en recevoir cinq impressions de nature différente. Ce sont les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher qui ont permis d'édifier les branches de la physique classique que l'on a dénommées : optique, acoustique, chaleur, électricité, magnétisme, radio-activité. Il est de toute évidence que si nous possédons réellement un sixième sens et si nous parvenons à le mettre en action, il nous permettra d'apercevoir de nouveaux aspects du monde extérieur et nous révélera, entre les réalités qui nous échappent, l'existence de nouveaux rapports encore ignorés. Or, comme il est hors de doute que ce sixième sens existe, nous pouvons dire que c'est une nouvelle branche de la physique, dont il va nous être donné de voir bientôt l'épanouissement ; et cette branche, par analogie avec l'acoustique et l'optique, nous la nommerons la radies-

thétique. Ce terme, en effet, nous paraît plus propre que celui de radiesthésie scientifique, par lequel certains l'ont désignée jusqu'ici.

Parmi les praticiens qui se sont occupés de radiesthésie scientifique, certains se sont imposé de n'entreprendre leurs recherches que dans le domaine exclusif des connaissances de la science officielle et à rejeter impitoyablement, comme faux, tout ce qui ne leur paraissait pas une confirmation ou un complément de ce qu'ils savaient.

Agir ainsi c'est, à notre avis, se condamner à piétiner éternellement sur place. Comme, ainsi que l'a dit Pascal, nous ne connaissons jamais le tout de rien ; comme aussi, d'autre part, plus l'homme avance dans l'étude des sciences, plus, aussi, il se rend compte de son ignorance, il faut bien admettre que la physique, la chimie, la biologie actuelles ne connaissent que des cas particuliers d'une science beaucoup plus générale, à peine soupçonnée. S'obstiner à vouloir tout rattacher à ces cas particuliers, c'est tomber dans l'erreur d'un conformisme étroit, dont l'effet immédiat est de s'opposer à tout progrès dans les sciences naturelles, en perpétuelle évolution.

Nous nous écarterons donc d'un dangereux écueil qui nous ferait sombrer et, faisant dans la mesure du possible table rase de tout ce que nous savons, nous chercherons tout simplement la vérité en suivant la voie qui y conduit dans les sciences naturelles, c'est-à-dire à l'aide de la méthode expérimentale.

L'expérience étant la source de toute vérité, c'est à elle que nous demanderons de nous procurer les connaissances que nous cherchons. La méthode expérimentale à laquelle nous aurons recours consistera :

1^o) A observer et constater les faits.

2^o) A formuler à leur sujet une hypothèse que l'on cherchera à vérifier le plus tôt et le plus souvent possible.

3^o) A généraliser, c'est-à-dire à passer du particulier au général et à établir des lois.

4^o) Enfin, à déduire, c'est-à-dire à passer ensuite du général au particulier, et, des lois établies, conduire à l'existence de faits qui devront inmanquablement se produire si ces lois sont exactes.

Si la science officielle répudie les rattachements inadmissibles que se sont permis plusieurs radiesthésistes, si elle proteste énergiquement contre les emprunts qu'ils ont faits à son vocabulaire pour désigner des faits tout à fait différents de ceux qu'elle a en vue, c'est avec les raisons les plus légitimes.

Plusieurs phénomènes que l'on rencontre en radiesthésie, bien qu'ayant avec des faits acquis et connus de longue date une cause commune, en sont des effets absolument distincts. Il est donc indispensable, sous peine d'engendrer le chaos et la confusion, de les désigner par la dénomination propre qui leur convient.

C'est à cette règle que nous nous assujettirons strictement dans l'exposé qui va suivre, exposé que nous avons tenté de faire aussi simple et aussi élémentaire que possible, afin de le mettre à la portée de tous nos lecteurs.

§ 1^{er} — La Microphysique

Pour peu que le radiesthésiste travaille avec réflexion, soit en laboratoire, soit en plein air, il se rend très vite compte que son pendule le met en contact avec toutes les forces de la nature, étudiées dans les traités de physique : gravité, chaleur, électricité, magnétisme radio-activité, lumière ; mais il s'aperçoit aussi que ces modes d'énergie se présentent à lui, le plus souvent, avec un ordre de grandeur infinitésimal, dont la mesure échappe aux appareils les plus perfectionnés. Ce sont, par exemple, des poids d'un millionième de milligramme, des forces électro-motrices d'un dix-millième de millivolt, des intensités de courant électrique d'un millième de micro-ampère, des intensités radioactives d'un millionième de micro-curie, etc., etc... L'ensemble des phénomènes qui résultent de la mise en jeu de ces forces infinitésimales constitue ce que l'on peut appeler la **microphysique**.

En même temps qu'il est impressionné par cette particularité très nette que présentent des manifestations de forces de la nature qui lui sont familières, il se trouve en contact avec des faits nouveaux, complètement inconnus des physiciens, parce que rien n'a permis à ceux-ci, jusqu'ici, non seulement de les saisir, mais, même, d'en soupçonner l'existence.

L'étude des phénomènes de microphysique, qui n'ont été révélés jusqu'ici que par les perceptions du sixième sens, constitue la **radiesthétique**.

§ 2 — Le rayonnement de la matière

Parmi les ondes en général, retenons essentiellement deux sortes de radiations : les ondes électro-magnétiques ; les radiations corpusculaires.

1° Les ondes électro-magnétiques : Nous ne reviendrons pas ici sur les considérations relatives aux ondes électro-magnétiques (EM). On les trouvera suffisamment développées au chapitre II, page 48, du traité de « **Radiesthésie par la Méthode Physique** » de P. BÉASSE.

De même que les ondes audibles, appelées son (résultat d'un corps en vibration) se déplacent dans un milieu solide, liquide ou gazeux (l'air généralement dans ce dernier cas), de même les ondes électro-magnétiques se propagent dans le milieu élastique interstellaire, appelé éther, qui remplit tous les espaces et pénètre tous les corps.

Les ondes électro-magnétiques seraient-elles le résultat de la vibration de l'éther, substance élastique, dont nous ignorons complètement la nature ? Serait-ce cette vibration qui

engendrerait la formation et la propagation des champs électrique et magnétique ? Simples hypothèses.

Parmi les ondes électro-magnétiques en général, notons l'existence :

a) des ondes électro-magnétiques **spécifiques des corps simples** (les corps composés émettent des ondes spécifiques de chacun des corps simples qui entrent dans leur composition). Toutes ces ondes spécifiques sont de très faibles longueurs (quelques millimètres pour des masses peu importantes) ;

b) des ondes du **champ électro-magnétique terrestre**, qui saisissent et transportent les ondes électro-magnétiques spécifiques des corps simples précités et leur servent de **support**. Ce sont ces ondes du champ électro-magnétique terrestre qui permettront aux ondes électro-magnétiques spécifiques des corps simples (du règne animal, végétal et minéral) de se propager à grande distance.

Ces **ondes de support** sont, suivant le cas, électriques, magnétiques, lumineuses, nerveuses, etc...

Les ondes électro-magnétiques, dites « spécifiques »
Revenant aux ondes électro-magnétiques **spécifiques** des corps simples, nous signalerons :

a) que les ondes électro-magnétiques polarisées (positives ou négatives) comportent deux plans de vibration : l'un électrique toujours vertical ; l'autre magnétique perpendiculaire au premier, et passant par le rayon de propagation, qui se trouve être ainsi à l'intersection des deux plans ;

b) que lorsque l'onde se propage verticalement, son plan magnétique de vibration est toujours orienté dans une direction fixe (direction du **plan fondamental**). L'angle que ce plan forme avec celui du méridien magnétique pris pour origine, s'appelle **angle fondamental** de l'onde ;

c) que chaque onde est caractérisée par un nombre spécial, qui apparaît dans de nombreux phénomènes, nombre que l'on appelle **chiffre objectif de série** ou **nombre particulier** de l'onde (et qui dépend lui-même d'un autre nombre, dit **nombre caractéristique** avec lequel il est relié par une relation mathématique très simple : $N = 2 n + 1$) ;




Fig. 1
Rayon vertical




Fig. 2




Fig. 2 bis
Rayon horizontal




Fig. 3

d) qu'en ajoutant à ces données la longueur d'onde de l'onde, si on a pu la déterminer, et plusieurs réglages millimétriques du pendule lui convenant, on peut établir une sorte de carte d'identité qui permet de reconnaître et d'identifier l'onde en toute circonstance ;

e) que la polarité d'une onde dépend du sens de l'orientation de son champ magnétique par rapport au champ électrique correspondant. Deux ondes identiques, mais de polarité différente, sont décalées l'une par rapport à l'autre d'une demi-phase et ont leur angle fondamental à 180° l'un de l'autre.

C'est, vraisemblablement, sous l'effet de la giration atomique planétaire que les corps émettent le rayonnement électro-magnétique spécial, découvert par l'ingénieur Voilaume et qui s'identifie avec celui que les anciens sourciers nommaient « effluves ». Ce rayonnement, qu'il a appelé : **rayonnement spécifique** du corps, caractérise chaque substance.

De très faible longueur, comme nous venons de le signaler plus haut, ce rayonnement ne serait perceptible qu'à très faible distance, s'il n'était saisi et emporté par les ondes du champ électro-magnétique terrestre qui lui servent de support.

Ce rayonnement n'est pas unique, il comprend un faisceau de radiations EM de longueurs d'onde différentes, mais qui ont cette particularité de posséder même angle fondamental, même nombre particulier en même temps que plusieurs propriétés physiques communes telles que la faculté de traverser certains écrans, ou d'être arrêtés par eux.




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

C'est ainsi que sous l'action du champ électro-magnétique terrestre, un **corps** ou **objet** émet :

1°) Dans les deux sens (ciel ou terre), des rayons électro-magnétiques spécifiques **verticaux**, très courts, à support ES (ondes de l'électricité radiante) ;

2°) Dans les directions à **45°** et **135°** par rapport à la verticale, des rayons électro-magnétiques spécifiques inclinés, très courts, à support MS (**magnétisme radiant**) ;

3°) Dans la direction **horizontale** des rayons électro-magnétiques spécifiques, de longueur limitée, à support « » (ondes émises par les **champs magnétiques**) ;

4°) Dans une **direction fixe**, caractéristique de chaque substance, un faisceau de rayons électro-magnétiques spécifiques, très courts, à support MS (Phénomène du **Plan fondamental**) ;

5°) Sous l'action combinée de la lumière et du champ EM terrestre, et dans la direction de chacun des quatre points cardinaux magnétiques de l'objet, un faisceau de rayons spécifiques très courts, à support MS. Ce rayonnement constitue la **Croix magnétique** de l'objet.

Nous passons sous silence le « rayon particulier », décrit à la page 87 du traité de « **Radiesthésie par la Méthode Physique** », parce que, sans intérêt pratique au point de vue de la prospection, il semble inutile d'en encombrer le bagage du débutant.

2° Radiations corpusculaires : Il existe aussi dans la nature des corpuscules matériels infiniment petits mais pesants et doués d'énergie. Leur déplacement en nuage ou en faisceau constitue une **radiation corpusculaire**.

Les découvertes de la physique moderne ont montré que ces radiations corpusculaires sont formées de corpuscules, transportés par des ondes électro-magnétiques, particulières pour chacun d'eux. Ce sont ces ondes qui leur communiquent le mouvement, sans lequel elles resteraient immobiles, et que Louis de Broglie appelle l'**onde associée** au corpuscule.

Parmi ces corpuscules, citons :

a) Les **Photons** transportés par les ondes électro-magnétiques lumineuses et dont le choc sur notre rétine produit la sensation de lumière ;

b) Les **Electrons** transportés par des ondes électro-magnétiques ES négatives et qui constituent, soit le courant électrique, soit les rayons β des corps radio-actifs ;

c) Les **rayons α** des corps radioactifs, atomes de l'hélium, transportés par les rayons spécifiques de ce gaz.

Le corpuscule et l'onde étant étroitement associés, le mouvement du corpuscule et la propagation de l'onde ne sont pas indépendants (1) ; et, aux grandeurs mécaniques (quantité de mouvement et énergie) du corpuscule, se lient les caractéristiques de l'onde associée (vitesse de propagation, longueur d'onde et tous autres éléments qui, au point de vue radiesthésique constituent sa carte d'identité).

Le radiesthésiste ne reconnaît donc une radiation corpusculaire qu'en identifiant l'onde associée au corpuscule en mouvement. Lorsque la quantité de mouvement du corpuscule s'annule, l'onde s'amortit.

On distingue facilement une onde EM d'une radiation corpusculaire par ce fait que tandis que la première est captée instantanément par une antenne placée à distance convenable du faisceau de propagation, la seconde reste absolument insensible à l'appel de ce dispositif. L'onde associée étroitement aux corpuscules suit leur trajet sans pouvoir en être ni dissociée, ni détournée.

L'exemple des rayons α , atomes d'hélium, dont l'onde associée n'est autre que le rayonnement spécifique de l'hélium ; celui de l'électron, dont l'onde associée est le rayon ES, montre que ce que les physiciens ont nommé l'onde associée, s'identifie avec le rayon spécifique du corpuscule. C'est le corpuscule qui la produit et naturellement elle l'accompagne partout, puisque c'est lui qui lui donne naissance. Elle n'a, bien entendu, aucune influence sur le mouvement du corpuscule qui est dû à une force extérieure.

§ 3 — Electricité

L'une des premières acquisitions de la microphysique réalisée par la voie des procédés radiesthésiques, a été la découverte des **ondes ES**, ou ondes spécifiques de l'électricité, qui constituent ce que certains appellent l'**électricité radiante**. Ces ondes, à polarité soit positive, soit négative, s'échappent en permanence de toute **charge** électrique sta-

(1) Louis de Broglie : « Matière et Lumière ».

tique ou de tout conducteur parcouru par un courant continu ou alternatif. Elles constituent les ondes associées à l'électron ou au positon (1). Leur longueur d'onde, 11 microns 363, que M. l'ingénieur Voillaume a déterminée en 1932, les situe dans la région infra-rouge du spectre. Depuis plusieurs années, leur existence paraît avoir été reconnue par des physiciens américains, sous le nom d'ondes extra-courtes émises par les lampes à incandescence allumées, et leur action utilisée ensuite, outre-Atlantique, pour divers effets thérapeutiques.

Par un mécanisme que la place ne permet pas de décrire ici, ces ondes ES constituent l'agent actif des phénomènes d'induction électrique. Ce sont aussi les mêmes ondes, qui exportent verticalement dans les deux sens, et, à des distances considérables, les ondes spécifiques de tous les corps (à l'exception du zinc), ondes qui, réduites à leur énergie propre, ne dépasseraient pas une portée de quelques millimètres.

Mais, si ces ondes ES s'échappent d'une charge électrique, en revanche, on ne trouve aucune trace de leur émission dans un champ électrique, à moins de l'y provoquer artificiellement par des procédés d'induction.

Les champs électriques émettent d'autres ondes électromagnétiques d'une longueur d'onde qui paraît infinitésimale et de l'ordre de celle des rayons X, ondes dont on a pu, après les avoir isolées, déterminer les caractéristiques. Ce sont les rayons η à double polarité, positifs ($\eta +$) dans les champs électriques positifs ; négatifs ($\eta -$) dans les champs électriques négatifs.

Les rayons η à longueur limitée s'arrêtent à la surface équipotentielle extrême du champ électrique, ce qui permet d'en tracer le contour à l'aide du pendule dans un plan choisi, par exemple horizontal ou vertical.

Il existe, encore, dans les champs électriques d'autres rayonnements EM. de longueur moindre et qui s'amortissent sur des surfaces équipotentielles intermédiaires. Ce sont

(1) *Positon* : Nom que Louis de Broglie a donné à l'électron positif corpuscule électrique positif. Au début on l'appelait *positron*. L'électron est le corpuscule électrique négatif.

les rayons ε et σ de polarité positive dans les champs positifs ; les rayons ν et ζ de polarité négative dans les champs négatifs.




Fig. 13

Les rayons θ^+ , ν et ζ sont émis par le champ électrique que le phénomène de la désintégration détermine dans les corps radio-actifs, et, comme nous le verrons plus loin, on les rencontre dans le faisceau de rayons telluriques nocifs qui s'échappe de certaines parties du sol.


§ 4 — Magnétisme

Les ondes MS dont la longueur d'onde, déterminée également par M. l'ingénieur Voillaume (10 microns 787), les situe dans l'infra-rouge, jouent, à l'égard du magnétisme un rôle qui paraît analogue à celui des ondes ES à l'égard de l'électricité. Seraient-elles, comme les premières, les ondes associées à un corpuscule analogue à l'électron et dont la science officielle ignorerait encore l'existence ? Ce n'est pas invraisemblable. Elles s'échappent de tout corps aimanté.

Le globe terrestre paraît parcouru en permanence par une émission rectiligne de rayons MS parallèles au méridien magnétique. Cette émission paraît correspondre au système géométrique de radiations découvertes et décrites par le docteur Peyré.

Dans les mêmes conditions que les rayons ES, les ondes

MS exportent de tous les corps des rayons spécifiques qui s'échappent sous des inclinaisons comprises entre 45° et 135° ; les rayons extrêmes de cette zone étant, de beaucoup les plus intenses.



Répartition des radiations (O), O, L. et M. dans un champ magnétique développé par la charge d'un aimant rectiligne

Fig. 14

Les rayons MS constituent donc les ondes d'émission des charges (1) magnétiques. On ne les trouve dans un champ magnétique que si on y provoque leur émission par un procédé d'induction.

Mais si les champs magnétiques n'émettent pas de rayons MS, ils émettent, par contre, des rayons ω à polarité toujours positive et des rayons o dont la polarité, double, correspond à celle du champ dont ils émanent.

Les rayons ω , de longueur limitée, s'arrêtent à la surface équipotentielle extrême du champ magnétique, ce qui permet de tracer à l'aide du pendule le contour de ce champ dans un plan choisi, par exemple, un plan vertical ou un plan horizontal. Les rayons o de longueur moindre s'arrêtent à une surface équipotentielle intermédiaire.

L'aimant classique des physiciens se compose d'un barreau d'acier. Les charges magnétiques y paraissent concentrées en deux points situés près des extrémités du barreau et que l'on nomme pôles. La partie située entre ces deux points est appelée zone neutre. Cependant, cette zone n'est pas complètement dépourvue de magnétisme, puisque le pendule, réglé sur rayons MS, tourne sur toute la longueur du barreau. En réalité cette charge très faible, après le pôle, décroît de plus en plus jusqu'à une ligne neutre, à partir de laquelle elle change de polarité.




Fig. 15

Tous les corps, les uns à un degré mesurable, les autres à un degré infinitésimal, possèdent une charge magnétique. Les objets en fer forment un seul aimant à deux pôles. Mais

(1) Par « charge », il faut entendre la quantité de magnétisme ou d'électricité contenue dans un corps.

Par « champ » la région soumise à l'influence d'un aimant (magnétisme) ou d'un courant (électricité).

les objets, de toute substance autre que le fer, se composent de deux aimants accolés.

Nous donnons ci-après l'exemple d'une cuillère d'argent sur laquelle ont été indiqués l'emplacement des pôles ainsi que le tracé des lignes neutres de son double aimant (Fig. 16).

Quand un objet possède une pointe, l'un de ses pôles magnétiques se trouve généralement situé à proximité de cette pointe.

Pour finir, disons que les rayons ω s'échappent de toutes les pointes et de toutes les parties extrêmes des corps allongés entraînant avec eux de l'électricité et des rayons spécifiques de ces corps, rayons auxquels ils servent de supports.




Fig. 16

Emplacement des pôles et tracé des lignes neutres
du double aimant d'une cuillère d'argent

§ 5 — Radioactivité

Pour les physiciens la radio-activité caractérise la propriété d'un corps d'émettre sans interruption des rayons corpusculaires α et β en même temps que des ondes EM, dénommées par eux rayons γ . Cette émission est due à un phénomène de désintégration atomique et de transmutation qui s'opère d'une façon continue mais avec une extrême lenteur.

Par l'action d'un champ magnétique négatif produit par un fragment de pechblende, par exemple, il est facile de séparer les différentes radiations d'un corps radio-actif. Les rayons α s'échappent alors dans le plan fondamental de la substance tel qu'il s'oriente après la déviation que lui fait subir le champ magnétique ; et les rayons β dans un plan perpendiculaire au précédent. Les rayons γ continuent à s'échapper verticalement.

Les rayons α sont des atomes d'hélium, dont on peut suivre le trajet à l'aide d'un pendule réglé sur ce gaz ; les rayons β des électrons, dont un réglage sur rayon ES permet de reconnaître le trajet.

Un champ magnétique positif est sans aucune action.

Si l'on étudie attentivement à l'aide d'une imprégnation sur papier le rayonnement d'un corps radio-actif, on s'aperçoit qu'il est entouré d'un champ électrique négatif, prolongé lui-même par un champ magnétique négatif.

La figure 17, ci-après, indique le résultat de l'étude faite sur un fragment de pechblende.

Le champ électrique négatif à l'intérieur duquel le corps lui-même est compris, émet des rayons I , γ , ζ . Par suite d'une anomalie dont la cause n'a pu être encore trouvée, les rayons I qui, associés aux rayons γ et ζ devraient être de polarité négative, sont positifs dans les corps radio-actifs.

Aux rayons émis par le champ électrique s'ajoute une quatrième radiation, les rayons RS découverts par l'ingénieur Voillaume et qui constitue vraiment le rayonnement spécifique propre de la radio-activité. On la rencontre sur les êtres vivants. L'ensemble des quatre rayons, ondes RS I^+ , γ et ζ (ondes EM des corps radio-actifs), constitue sans aucun doute le groupe des rayons γ des physiciens. Il y a lieu d'observer que dans une étude publiée en 1926 par M. F. Honoré et éditée par la librairie Gauthier-Villars, l'auteur mentionnait déjà plusieurs rayons γ de longueur d'onde différente.

Rayonnement radio-actif des corps : Les physiciens qui se sont occupés de la question si captivante de la radio-activité, nous ont appris que, si les corps radio-actifs émettaient des rayons corpusculaires α et β et des ondes électromagnétiques dénommées rayons γ , radia-




Fig. 17

**Examen à la pointe-antenne
d'un fragment de Pechblende**

tions qu'il était facile de séparer les unes des autres à l'aide d'un champ magnétique négatif, tous les corps non radio-actifs émettaient également ce même rayonnement, mais à un degré infinitésimal.

La radiesthésie nous permet de faire, avec la plus grande facilité, la constatation de ce rayonnement radio-actif de tous les corps, qui est tout à fait distinct du rayonnement RS, dont M. Voillaume a découvert les lois.

Sans qu'il soit besoin, cette fois, de recourir à l'action d'un champ magnétique (car, en raison de la faible intensité de ce rayonnement, le champ magnétique terrestre suffit à en séparer les éléments), nous constaterons, avec des réglages appropriés, que les rayons α émis par une substance, s'échappent dans le plan fondamental de cette substance et les rayons β dans un plan vertical perpendiculaire à la direction de ce plan.

Si nous étudions, par exemple, le rayonnement radio-actif d'une pièce de monnaie d'argent, nous constatons que les rayons α partent dans la direction de l'Est magnétique et les rayons β dans celle du Nord magnétique.

De tout ce qui précède, il résulte que, considérés au point de vue microphysique, tous les corps sont électrisés, magnétiques et radio-actifs.

§ 6 — Lumière

Si nous connaissons bien peu de choses de la matière, nous sommes encore bien plus ignorants en ce qui concerne la lumière, dont bien des effets restent encore pour nous tout à fait mystérieux. Par les perceptions supplémentaires qu'elle nous apporte, la radiesthésie va pouvoir venir à notre aide, et contribuer, vraisemblablement, à nous donner la solution de certains problèmes troublants.

Les travaux les plus récents des physiciens modernes nous apprennent que la cause lumière nous atteint sous forme du choc de radiations corpusculaires.

Les corps matériels infiniment petits, dénommés photons, qu'elle lance avec une vitesse considérable, sont associés à des ondes EM non polarisées appelées ondes lumineuses. S'il est exact, ainsi que nous l'avons rappelé au § 4 (page 11), qu'il existe un lien entre les grandeurs mécaniques du corpuscule et les caractéristiques de l'onde qui lui est associée, chaque nuance de couleur correspondrait, semble-t-il, à une énergie différente du photon, laquelle déterminerait la longueur d'onde différente de l'onde lumineuse ; et, par suite, une impression différente sur notre rétine.

Le nombre des nuances de couleur n'est pas infini, mais limité ; car, dans le spectre de dispersion, chacune correspond à une raie homogène d'une largeur relative. La lumière blanche constitue l'impression que fait sur notre rétine la composition des impressions élémentaires déterminées par chaque nuance de couleur.

Ainsi que les physiciens nous l'ont appris, il y a déjà plus d'un siècle, les ondes lumineuses sont accompagnées d'ondes calorifiques (rayons CL à polarité négative) qui produisent de la chaleur, et de rayons chimiques (rayons CH à polarité positive), qui jouent un rôle considérable en photographie.

Rayons d'accompagnement des couleurs : Le spectre de dispersion de la lumière blanche est divisé nettement en deux zones bien distinctes, séparées par la nuance du vert moyen : une zone électrique et une zone magnétique.

Dans la zone électrique qui s'étend de cette nuance de vert au violet extrême, et, même au delà, dans l'ultra-violet, les rayons lumineux sont accompagnés en même temps que de rayons CH, de rayons ES présentant de fréquentes alternances de polarité. Ces alternances déterminent un grand nombre de subdivisions séparées par des nuances neutres sur lesquelles un pendule réglé sur rayons ES ne réagit pas. Dans les subdivisions positives, les rayons visibles ou non, sont accompagnés de rayons θ^+ , ε et σ et, dans les subdivisions négatives, de rayons θ^- , ν et γ .

Dans la zone magnétique les rayons lumineux sont accompagnés en même temps que de rayons calorifiques (dont l'effet, tout d'abord imperceptible, ne commence à devenir sensible qu'à partir du jaune), d'ondes MS dont les alternances de polarité paraissent en parfaite

Zone Magnétique

Zone Electrique



Rayons ES à polarité alternative

Fig. 18 RAYONS D'ACCOMPAGNEMENT DES COULEURS (1)
sur un spectre solaire réunissant l'ensemble des rayons colorés
résultant de la décomposition de la lumière solaire

concordance avec celles de la zone précédente. Dans les subdivisions positives, les rayons lumineux sont accompagnés d'ondes ω et ω^+ ; et, dans les subdivisions négatives, d'ondes ω et ω^- , c'est-à-dire des mêmes ondes que l'on trouve dans les champs magnétiques. La zone magnétique s'étend du vert moyen au rouge sombre extrême et se prolonge, au delà, dans l'infra-rouge. Le nombre des alternances de polarité dans la partie visible du spectre paraît être d'une cinquantaine environ.

Action physiologique des couleurs : Depuis plusieurs années, déjà, plusieurs radiesthésistes, M. Mellin, en particulier, ont signalé la grande influence physiologique des couleurs, influence pernicieuse dans certains cas, bienfaisante dans d'autres. Il est hors de doute que l'énergie différente des photons, la longueur d'onde différente de l'onde associée, la nature, la polarité et l'intensité des rayons d'accompagnement sont autant de facteurs qui réagissent sur le mouvement vibratoire des cellules des êtres vivants et, par suite, influent sur leur santé. D'où le principe de la chromothérapie.

Les couleurs peuvent également agir sur le cerveau et, par suite, sur l'état mental. Une personne habituée au travail intellectuel dit avoir remarqué qu'en se coiffant la tête d'une écharpe jaune elle sentait sa lucidité et sa puissance intellectuelle considérablement augmentées.

Il va sans dire, que la couleur susceptible de produire un tel effet varie suivant les personnes.

§ 7 — Rayons telluriques nocifs

Damier du Docteur Peyré

Il n'est plus contesté, aujourd'hui, qu'il s'échappe de certaines zones de terrain, des rayonnements préjudiciables à la santé des êtres vivants, par la perturbation qu'ils apportent à la vibration normale des cellules qu'ils atteignent.

Nous ne mentionnerons ici que les rayons qui s'échappent normalement de certaines régions du sol, laissant à dessein de côté toute autre radiation émanant notamment de cultures microbiennes, qui s'y trouverait accidentellement mêlée.

Pour des raisons qui vont être expliquées, les zones nocives, parfois de très petites dimensions, sont extrêmement répandues. L'intensité de leur émission, très variable, d'ailleurs, n'est, heureusement, pas toujours suffisante pour provoquer des troubles appréciables. C'est donc, surtout, des zones de rayonnement intense que nous allons nous occuper.

Le rayonnement nocif se décèle par le malaise plus ou moins rapide, plus ou moins accentué, qu'il détermine chez la plupart des personnes séjournant dans la zone irradiée, par la constatation, en certaines fractions de terrain, sinon d'une absence totale, au moins d'une sérieuse atténuation de la végétation.

Nature des radiations telluriques nocives : Si, après avoir exposé pendant quelques secondes une feuille de papier blanc au rayonnement d'une zone nocive, on l'étudie en laboratoire, on constate que ce papier est imprégné de plusieurs radiations distinctes, dont une sélection méthodique permet de déterminer les caractéristiques et le signalement respectifs. Ce sont, invariablement, des ondes ES et MS négatives (ES—, MS—) ; puis des rayons β positifs (rayons $\beta \div$) ; des rayons γ et ζ ; des rayons RS, c'est-à-dire les ondes EM qui s'échappent normalement de la verticale de tout corps radio-actif. Les rayons ES et MS n'étant pas malfaisants, les radiations telluriques nocives ne sont donc autres que des rayons γ (RS, $\beta \div$, γ , ζ) qui s'échappent d'une fraction radio-active du sol. Nous verrons un peu plus loin dans quels cas, les rayons γ peuvent être accompagnés d'autres radiations également nocives, les rayons ρ , τ et χ . (Voir page 98, tableau de réglage du pendule sur chacune de ces ondes).

Provenance des rayons nocifs. — L'émission des rayons nocifs peut provenir de plusieurs sources radiantes :

1° Région généralement assez étendue dans laquelle la composition du sol comporte des éléments de minéraux radio-actifs, dont la présence, en raison de leur dosage infinitésimal, échappe à l'analyse chimique. C'est le cas de certaines marnes, de certaines ocre. Il est hors de doute que l'habitation, ou le séjour prolongé sur de tels terrains, ne peut qu'être préjudiciable à la santé.

2° Souterrain hermétiquement clos ou ne communiquant avec l'atmosphère que d'une façon précaire ; c'est le cas d'une cavité souterraine naturelle, grotte, caverne, fissure de faille, ou d'une cavité établie par la main de l'homme, puits fermé, galerie, tunnel, égout, etc...

Ainsi qu'il est facile de le constater en laboratoire à l'aide d'un flacon bouché ou d'une boîte en carton se fermant bien, l'air confiné dans une enceinte, s'ionise et devient radioactif.

Un souterrain hermétiquement clos émet donc le rayonnement d'un corps radio-actif. Si son fond ou ses parois renferment des minerais de radium (1), de thorium, d'actinium, l'ionisation de l'air provoque la formation des émanations gazeuses découvertes par Rutherford, dénommées depuis radon, thoron, actinon, et dont les rayons spécifiques sortent du souterrain en même temps que les rayons γ . Pour s'en assurer, en laboratoire, il suffit de mettre dans le flacon ou dans la boîte de carton d'expérience, un fragment de minerai contenant les éléments précités. Au bout de quelques secondes, on constatera l'émission des rayons ρ , τ et χ , qui sont également nocifs.

(1) C'est par analogie seulement que nous citons l'actinium, l'expérience n'ayant été faite, jusqu'à présent, que sur le radium et le thorium.

3° Ruisseau souterrain ayant traversé une cavité ou un terrain radio-actif. Imprégné de leur émission, le ruisseau transporte ces radiations et les émet verticalement sur tout son parcours.

4° Rectangle du damier du Docteur Peyré.

Damier du Docteur Peyré : « A la surface du globe, dit le Docteur Peyré, on trouve partout, et d'une façon géométrique, des rayonnements telluriques parallèles ou perpendiculaires au méridien magnétique et formant un damier de 8 mètres environ de côté entre axes ».

Sous réserve des dimensions des éléments du damier, qui peuvent varier légèrement d'un lieu à l'autre suivant les influences locales, on peut, après avoir tracé à l'aide du pendule, la figure géométrique sur le terrain, constater que les lignes Nord-Sud sont parcourues par des rayons MS et les lignes Est-Ouest par des rayons ES, accompagnés de rayons γ . Le sens de propagation et la polarité des rayons ES et MS,




Fig. 19

qui ne sont pas verticaux, mais inclinés, paraissent alterner brusquement toutes les douze heures.

L'émission des rayons nocifs qui est, normalement, peu intense, devient, au contraire, parfois extrêmement violente aux points de croisement du damier. En ces points, l'émission des rayons ES et MS s'arrête complètement pour ne laisser subsister qu'une émission de rayons γ . Sans qu'on puisse s'en expliquer les raisons, l'intensité de cette

émission est extrêmement variable d'un croisement à l'autre. La nocivité d'un rectangle peut être très bénigne, alors que celle du rectangle voisin peut être extrêmement préjudiciable à la santé, et notamment provoquer la formation du cancer.

Subdivisions des éléments du damier : Chaque élément du damier comporte lui-même plusieurs divisions secondaires déterminées par des bandes parcourues par les mêmes rayons et dont les croisements jouissent des mêmes propriétés que ceux des bandes extrêmes de l'élément.

Terrain positif : Le champ électrique terrestre étant négatif, ce sont des rayons ES — qui s'en échappent en tout lieu ; mais ces rayons sont, généralement, d'une intensité beaucoup trop faible pour impressionner un pendule réglé sur cette radiation. C'est M. Orcel qui a observé le premier l'existence de zones de terrains de faibles dimen-

sions émettant avec une intensité plus ou moins élevée des rayons ES positifs. Il a nommé ces terrains, terrains positifs et signalé leur influence extrêmement bienfaisante sur la végétation. Il a recommandé de ne planter d'arbres qu'en terrain positif. Il est aisé de se rendre compte que la recommandation est excellente, parce que tout arbre vivant sur un tel terrain prospère d'une façon remarquable.

Si on étudie en détail un élément de damier Peyré, on constate que chaque croisement est flanqué de deux rectangles plus petits, contigus, émettant des rayons ES+.




Fig. 20

Croquis de la page 24 bis : Le croquis colorié de cette page représente un élément du damier du Docteur Peyré.

Les raies teintées en rouge représentent les bandes parcourues par des rayons MS; celles teintées en bleu, les bandes parcourues par des rayons ES; les rectangles jaunes figurent les croisements émetteurs de rayons nocifs, les rectangles verts adjacents les zones de terrains positifs.

Sur l'élément étudié sur place, donné en exemple, les bandes magnétiques extrêmes étaient espacées de 7 m. 66 d'axe en axe, les bandes électriques de 8 m. 60. Cet élément était subdivisé par des bandes secondaires parallèles aux bandes principales. Parmi les bandes secondaires suffisamment larges et intenses pour être perceptibles, on comptait 8 bandes électriques et 4 bandes magnétiques.

La largeur et l'espacement des bandes qui ont été reportés à l'échelle sur le dessin, peuvent varier légèrement suivant les lieux, et peut-être aussi suivant les époques de l'année.

Explication du phénomène du Damier Peyré : La formation du damier Peyré est un effet du champ électro-magnétique terrestre, ainsi que le prouve la petite expérience que nous décrivons ci-après et qui permet de reproduire artificiellement le phénomène. Sur une table, posons un petit condensateur électrique de T.S.F., la face négative en-dessus. Sur ce condensateur, plaçons un aimant droit comme il est indiqué sur la figure 21. Nous réalisons ainsi un champ EM analogue au champ EM terrestre, au moins tel qu'il se présente dans l'hémisphère boréal (1).




Fig. 21

Sur cet ensemble, laissons reposer pendant quelques secondes une feuille de papier blanc, dont le centre soit placé au-dessus du condensateur, et le grand axe de la feuille orienté parallèlement à celui de la ligne des pôles de l'aimant droit.

(1) Le pôle Nord ou pôle positif de la boussole étant attiré vers le Nord, le pôle boréal, de l'aimant terrestre, est de polarité contraire, donc négatif.

Ceci fait, étudions à l'aide du pendule l'imprégnation fluïdique du rayonnement du dispositif qui s'est imprimé sur la feuille de papier. Ce sont les éléments de cette imprégnation qui sont reproduits sur le croquis en 4 couleurs du damier Peyré, page 24bis. Nous y trouvons :

1° Des bandes parallèles à l'axe de l'aimant droit parcourues par des rayons MS.

2° Des bandes perpendiculaires à cet axe, parcourues par des rayons ES accompagnés de rayons γ (RS, θ^+ , ν , ζ).

3° Des croisements sur lesquels les rayons MS et ES s'arrêtent et qui ne laissent passer que des rayons γ de plus ou moins grande intensité.

4° Enfin, dans chaque élément du quadrillage, des subdivisions analogues à celles du damier Peyré.

5° A ces divers rayonnements s'ajoute l'émission des ruisseaux ou rivières fluorhydriques. Ces cours d'eau découverts et signalés par M. Orcel, seraient extrêmement nombreux. Ils couleraient de l'Est à l'Ouest et à une profondeur assez grande, de 80 à 150 mètres. Leur émission est d'autant plus pernicieuse qu'elle est généralement inconnue des radiesthésistes.

Tandis que les cours d'eau transporteurs de rayons γ (RS, θ^+ , ν , ζ) sont simplement imprégnés de ces radiations, le fluor en combinaison se trouve à l'état de dissolution dans les cours d'eau fluorhydriques, à dose absolument infinitésimale qu'aucune analyse chimique n'est capable de déceler. Mais cette dose « homéopathique » suffit à la longue par produire de grands ravages sur la santé.

Par une méthode, qu'il serait trop long d'exposer ici, il est possible de mesurer l'intensité relative de plusieurs ondes EM identiques. Ce sont les chiffres correspondant à cette mesure pour les rayons θ^+




Fig. 22

qui ont été, sur le croquis en 4 couleurs du damier Peyré, placés à côté de chaque rectangle-croisement. On se rendra compte qu'ils sont extrêmement variables d'un rectangle à l'autre, ce qui explique pourquoi, dans la nature, le nombre des rectangles véritablement nocifs est beaucoup moins grand qu'on ne pourrait le supposer.

Un navire à coque en tôle d'acier constitue un aimant dont la ligne des pôles peut ne pas se trouver dans le plan axial de symétrie du bâtiment, bien que le plus souvent, il le soit suivant son grand axe.

Comme ses installations comportent une charge électrique entourée d'un champ électrique, il s'en suit que le navire donne naissance à un champ EM et produit un quadrillage Peyré identique à celui que nous venons de décrire, et orienté suivant la ligne de ses pôles magnétiques.

La constatation de ce fait a été faite par le Docteur Peyré lui-même qui l'a signalé.

Le même phénomène se produit dans un wagon métallique de chemin de fer, un camion-citerne ou une voiture automobile, etc...

§ 8. — La Biologie infinitésimale

S'il existe, dans la nature inanimée, un grand nombre de phénomènes qui développent une énergie imperceptible et dont la connaissance constitue ce que l'on peut appeler la microphysique, il est incontestable que des manifestations d'une faiblesse d'intensité du même ordre de grandeur se produisent également chez les êtres vivants.

Leur connaissance constitue une **biologie infinitésimale** que l'on aurait pu nommer microbiologie, si le terme n'avait pas déjà été choisi pour désigner une science toute différente : celles des micro-organismes rudimentaires. Cette biologie, qui est celle de l'avenir, et qui se rattache à la radiesthétique, permettra, avec le concours du sixième sens externe, de percer bien des mystères de la vie organique (mode de vibration des cellules, lois de leur développement, mécanisme des influences extérieures qui agissent sur ce développement, mécanisme du tropisme végétal, etc..., etc...).

Nous nous contenterons, dans ce chapitre, de faire à cette science un emprunt discret, en nous bornant à étudier sommairement le corps humain au point de vue électrique et magnétique.


Polarité humaine

Une étude de M. l'ingénieur Voillaume, intitulée : « Essai sur les rayonnements de l'Homme et des Êtres vivants », dont la parution en 1933 peut être considérée comme un événement historique, a signalé l'émission par le corps humain d'un certain nombre de rayonnements inconnus jusqu'à ce jour et dont il a donné les caractéristiques.

Bande principale
magnétique ↓

Bande secondaire

Bande Principale élec-
trique et rayons γ ←



NOTE

relative au dessin du recto, représentant avec ses subdivisions un élément du damier du Docteur Peyré

La terre est parcourue dans le sens Nord-Sud magnétique par des rayons magnétiques MS (à support magnétique) et, dans le sens Est-Ouest par des rayons électriques ES (à support électrique), accompagnés de rayons γ (rayons nocifs).

Le damier qui en résulte n'est pas formé de carrés, mais de rectangles dont les dimensions ne sont pas rigoureusement constantes, mais peuvent varier légèrement suivant les lieux.

Dans le dessin coloré ci-contre, qui est le relevé d'un élément de damier mesuré sur le terrain, les bandes principales Nord-Sud magnétique sont écartées de 8 mètres 60 d'axe en axe, et les bandes principales Est-Ouest de 7 mètres 66. Les bandes Est-Ouest sont toujours beaucoup plus larges que les bandes Nord-Sud magnétique.

Les **rectangles** (en jaune) formés par le croisement des bandes n'émettent que des rayons γ (RS, η , ν , ξ) : ce sont des **zones nocives**.

De part et d'autre de chaque rectangle jaune se trouvent deux petits rectangles (en vert), émettant des rayons ES+, beaucoup moins larges du **terrain positif**, signalés par M. Orcel dans ses ouvrages comme particulièrement favorables à la végétation.

Le damier Peyré est lui-même subdivisé par des bandes secondaires parallèles aux bandes principales. On compte 10 bandes secondaires électriques et 6 bandes secondaires magnétiques suffisamment larges et d'un rayon suffisamment intense pour être perceptibles.

L'élément représenté a été tracé et mesuré sur place. Mais les dimensions de tels éléments, et, a fortiori, celles de leurs subdivisions, pouvant varier d'un moment à l'autre, il était inutile d'indiquer des mesures rigoureuses. L'important pour ce dessin est de donner une idée exacte du phénomène. A titre indicatif cependant, voici les largeurs des bandes mesurées dans cette expérience :

1 = 0 m. 58	a = 0 m. 28
2 = 0 m. 38	b = 0 m. 14
3 = 0 m. 27	c = 0 m. 04
4 = 0 m. 08	d = 0 m. 01
5 = 0 m. 03	
6 = 0 m. 01	

Ce sont notamment :

1° L'Onde nerveuse à double polarité, aussi bien chez l'homme que chez la femme et qui est émise par l'ensemble du système cérébro-spinal.

2° L'Onde sympathique également à double polarité émise par tous les nerfs, faisant partie du système sympathique.

3° L'Onde humaine toujours positive et qui est caractéristique de l'espèce humaine. A cette onde correspond une onde raciale caractéristique de l'espèce aussi bien chez les animaux que les végétaux : onde canine, onde porcine, onde féline, onde de l'ormeau ou du peuplier, etc...

4° L'Onde vitale toujours positive et qui est commune à tous les êtres vivants, animaux et végétaux. L'onde vitale n'est pas émise par les parties malades de l'être vivant.

5° L'Onde sexuelle positive chez le mâle, négative chez la femelle et qui est également commune à tous les êtres vivants, animaux et végétaux.

6° Le rayon mental toujours positif, émis par le cerveau et qui est un effet matériel de la pensée.

7° L'Onde personnelle ou individuelle, positive chez le mâle, négative chez la femelle et qui est spéciale à chaque être vivant, homme, animal ou végétal. Cette onde caractéristique de chaque individu, varie d'un être à l'autre et permet de le reconnaître.

Des renseignements détaillés concernant les ondes humaines seront donnés au chapitre V, sur le rayonnement des êtres vivants.

Parler de la polarité d'un membre ou d'un organe vivant sans préciser en même temps l'émission que l'on a en vue, est un non-sens. L'être vivant émet, en effet, simultanément, plusieurs ondes différentes et de polarité variable.

L'onde nerveuse et l'onde sympathique sont à double polarité. D'un certain doigt, c'est une onde nerveuse positive qui jaillit ; du doigt voisin, c'est, au contraire, une onde nerveuse négative. C'est donc seulement en spécifiant bien que nous nous plaçons au point de vue de l'onde nerveuse, que nous pourrions dire que tel doigt est positif, tel autre négatif. De même, c'est en nous plaçant au point de vue de la polarité de l'onde sympathique qu'il émet, que nous pourrions dire que tel organe est positif, tel autre négatif.

Prétendre que, tandis que l'homme est positif, la femme est négative, est une affirmation évasive qui ne correspond à aucune réalité tangible.

Polarité électrique humaine : Si nous l'examinons au point de vue électrique, nous constatons que le corps humain est comparable à une pile sèche pour lampe de poche. Partagé par un plan vertical médian, passant par le milieu de la face, le corps humain comporte

une moitié positive et une moitié négative. Les mains jouent le même rôle que les lamelles de cuivre dont l'extrémité sert de pôles à la pile de poche.

Si nous saisissons avec chacune des deux mains les deux extrémités d'un fil de cuivre sur lequel aura été intercalé un micro-ampèremètre, nous constatons la déviation de l'aiguille à la suite de la production et du passage d'un courant électrique (expérience du Docteur Léprince).

Le côté droit de l'homme normal est positif, le côté gauche négatif : c'est le contraire chez la femme normale. Mais il y a dans l'un et l'autre sexe des individus dont la polarité est anormale et inversée (5 % environ).

Dans un ménage, la différence de polarité électrique paraît être une des conditions de l'attrait et par suite du bonheur des deux époux.

Sens de giration du Pendule : Un corps positif est un corps dont les rayons spécifiques sont des ondes EM spécifiques positives ; un corps appelé négatif émet, au contraire, des ondes EM spécifiques négatives.

Un pendule tenu par une main électriquement positive tourne dans le sens des aiguilles d'une montre au-dessus d'un corps positif sur lequel il est réglé ; il tourne en sens contraire au-dessus d'un corps négatif. Si le pendule est tenu par une main électriquement négative, ses mouvements sont inversés.

Champs électriques humains : Quand les pôles de la pile humaine ne sont pas réunis, cette pile forme un condensateur d'électricité dont le contour de la charge électrique est facile à délimiter à l'aide d'un réglage sur rayons ES.

Ce condensateur détermine un double champ électrique, positif d'un côté, négatif de l'autre, dont les limites peuvent être déterminées très facilement à l'aide d'un réglage sur rayons lj ($lj +$ d'un côté, $lj -$ de l'autre).

Les figures 23 et 23 bis indiquent les grandes lignes de ces champs dont la forme varie suivant les individus et dont les extrémités aboutissent à peu près au tiers arrière de la partie supérieure de la tête et au tiers arrière des pieds.

Le corps humain n'étant pas immobile, il va sans dire que les formes des champs se modifient en même temps que celles du corps et en particulier suivant le mouvement des membres.

Polarité magnétique humaine : Considéré au point de vue magnétique, le corps humain, comme tous les objets d'une substance autre que le fer, forme un groupe de deux aimants situés dans le prolongement l'un de l'autre et dont la ligne de séparation se trouve sur une surface aboutissant au niveau du plexus solaire.

L'aimant supérieur a la forme d'un aimant droit à section rectangulaire (et même carré chez les personnes jeunes). Chez les vieillards, cette section affecte une forme un peu plus compliquée :






Fig. 23

Limite du champ électrique humain
vu de face




Fig. 23 bis

Limite du champ électrique humain
vu de profil

Réglage sur rayons 0 . Les deux moitiés du champ sont rarement symétriques. A la partie inférieure le champ aboutit au tiers postérieur du pied. Quand les pieds ne sont pas joints le champ prend la forme indiquée ci-dessus.

L'aimant supérieur part du sommet de la tête (pôle négatif) et aboutit au plexus solaire (creux de l'estomac ou pointe du sternum).

L'aimant inférieur a la forme d'une cisaille pointue. Il commence au niveau du plexus solaire (pôle négatif) et aboutit au talon de chaque pied (pôle positif). (Fig. 24 et 24 bis).

Cet aimant inférieur se situe entre le condensateur humain et la colonne vertébrale. Il est très facile à l'aide d'un pendule réglé sur rayons MS d'en déterminer le contour, soit sur la personne même, soit sur une imprégnation sur papier de cette personne, soit sur une photographie.

La charge magnétique humaine, concentrée ainsi que l'indique la figure 24 bis est généralement très faible et difficilement perceptible avec les instruments des laboratoires de physique actuels. Cependant, quelques personnes en nombre assez restreint, la possèdent à un degré assez élevé pour que leur approche suffise à faire dévier l'aiguille de la boussole.




Fig. 24
Vu de profil




Fig. 24 bis
Vu de face

Emplacement des pôles et des lignes neutres du double aimant humain. Comme pour les champs électriques, les points où les champs magnétiques sortent du corps sont des points de lignes de rebroussement. Aussi bien sur la tête que sur les pieds, ces points de rebroussement sont en arrière de ceux similaires électriques.

Cette charge paraît se présenter d'une façon identique chez l'homme et chez la femme.

Double champ magnétique humain : A chacune des deux charges magnétiques humaines correspond un champ magnétique dont le contour peut être déterminé très aisément à l'aide d'un pendule réglé sur rayons (1).

Les figures 25 et 25 bis donnent une idée de ce contour à la fois chez un individu vu de profil et chez un individu vu de face.

Champ électro-magnétique humain : La superposition d'un champ électrique et d'un champ magnétique détermine, pour la partie commune de ces deux champs, un champ électro-magnétique humain possédant des propriétés physiques analogues à celles du champ EM terrestre.




Fig. 25
Vu de profil




Fig. 25 bis
Vu de face

Double champ magnétique des deux aimants humains

La surface neutre de séparation de ces deux aimants passe par le plexus solaire (pointe du sternum).

Double auréole humaine : La croyance à l'existence d'une auréole fluïdique dans le voisinage de la tête humaine est très ancienne. Les artistes qui peignent les portraits de saints personnages les représentent souvent pourvus au-dessus de leur tête d'un cercle horizontal lumineux.

La radiesthésie précise cette question. Elle nous permet, en effet, de constater que la possession d'une auréole n'est pas l'apanage des seuls saints personnages, mais qu'elle fait partie des attributs de tout être humain.

Toutefois, au lieu d'être circulaire, horizontale, et de planer au-dessus de la tête, l'auréole est généralement ovale, presque verticale, et placée en arrière de la tête. En outre, cette auréole n'est pas unique, car si l'être humain possède une auréole au niveau de la tête, il en possède également une seconde, plus aplatie, au-dessus des pieds.

La figure 26 reproduit, vues de profil, les deux auréoles humaines ; toutes deux sont situées dans des plans perpendiculaires au plan vertical et inclinées de 20 à 25° sur la verticale. La figure 26 bis représente sur un homme vu de face, l'aspect de la double auréole humaine.




Fig. 26

Plans des deux auréoles humaines (supérieure et inférieure). Elles sont dans des plans verticaux faisant angle de 20 à 25° avec la verticale.




Fig. 26 bis

Vues de face, les deux auréoles humaines. La partie inférieure de l'auréole supérieure est indiquée en pointillé parce qu'elle est cachée par la tête. L'auréole supérieure dépasse le niveau supérieur de la tête ; son niveau inférieur repose sur un plan horizontal passant par le tiers inférieur du nez. L'auréole inférieure paraît reposer sur les cous-de-pied.




Fig. 26 ter

Imprégnation sur papier d'un aimant droit vertical et de ses deux anneaux (ou auréoles).

La forme et la situation de ces anneaux fluidiques varient évidemment légèrement suivant les individus.

Le plus souvent, l'anneau supérieur repose sur un plan horizontal passant par le 1/3 inférieur du nez, et, par sa partie supérieure, dépasse de 0,05 et 0,06 le niveau supérieur de la tête. Beaucoup plus aplati que le précédent, dans le sens horizontal, l'anneau inférieur

repose généralement sur un plan horizontal, à 0,05 ou 0,06 au-dessus du sommet des cous-de-pied.

La double auréole humaine est un phénomène magnétique : Si nous présentons une feuille de papier blanc derrière la nuque d'une personne, de manière à ce qu'elle dépasse le sommet de la tête de cette personne, et si, à l'aide d'un crayon formant pointe-antenne et d'un pendule réglé sur rayons MS, nous étudions en laboratoire l'imprégnation ainsi produite, nous constatons :

1° Qu'il s'est formé sur la feuille de papier un anneau ovale de un centimètre de largeur environ, qui émet sur toute sa surface des rayons MS+.

2° Que, de la gauche à la droite de la personne, l'anneau est parcouru par des rayons MS+ qui, s'ils circulaient avec la vitesse de la lumière (ce qui est vraisemblable), feraient 8.500.000 tours par seconde.

La forme de l'anneau peut être influencée par l'action d'un champ magnétique (machine à coudre par exemple).

Si nous opérons de la même façon pour l'auréole inférieure, après avoir placé une feuille de papier reposant sur les cous-de-pied d'une personne, nous constatons :

1° Qu'il s'est formé sur la feuille de papier un anneau ovale aplati, de 5 à 6 millimètres de largeur, qui émet sur toute sa surface des rayons MS—.

2° Que de la droite à la gauche de la personne l'anneau est parcouru par des rayons MS— circulant vraisemblablement avec une vitesse de 8.500.000 tours par seconde.

La formation de la double auréole humaine correspond à un phénomène magnétique d'ordre général.

Posons sur une table un aimant rectiligne que nous maintiendrons vertical, de manière à ce que son extrémité positive repose sur la table et que son pôle négatif soit en l'air.

La position de cet aimant correspondra à celle d'un être humain debout. Derrière cet aimant, glissons une feuille de papier blanc verticale, et à l'aide d'un crayon formant pointe-antenne et d'un pendule réglé sur rayons MS, étudions en laboratoire l'imprégnation produite.

Nous constatons autour du pôle négatif un anneau formé de rayons MS+ circulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et autour du pôle positif, un anneau de rayons MS— circulant dans le sens de ces aiguilles.

Il est à remarquer que les rayons MS qui circulent à l'intérieur d'un anneau sont d'une polarité inverse de celle du pôle que cet anneau entoure.

Pour terminer, nous dirons, en nous plaçant au point de vue micro-physique que tous les corps, les uns à un degré sensible, les autres à un degré infinitésimal, sont électrisés, magnétiques et radio-actifs. Tout comme un fil de cuivre, un fil de coton est conducteur de l'électricité ; une cuillère d'argent possède une charge magnétique ; un objet de nickel émet des rayons α , β et γ . Saisissant des énergies imperceptibles, jusqu'ici, notre sixième sens va nous permettre d'avancer dans la connaissance des propriétés physiques de la matière, et les applications pratiques qui seront faites de nouvelles découvertes, procureront à l'humanité d'immenses avantages de toute nature.

LE RAYONNEMENT DE LA MATIERE
sous l'action du champ électro-magnétique terrestre ou, parfois, de la lumière

A. Sources d'émission des RADIATIONS CORPUSCULAIRES

dont le déplacement est corrélatif de la propagation d'une onde électro-magnétique, nommée « onde associée ».

N'excitent pas le sens radiesthésique

1° Corpuscules PHOTONS, A support de rayons lumineux.

2° Corpuscules ELECTRONS, qui constituent soit le courant électrique, soit les rayons des corps radio-actifs.

A support soit ES—, soit radio-actifs.

3° Corpuscules RAYONS α des corps radio-actifs, atomes de l'Hélium.

A support de rayons spécifiques de ce gaz.

(Pages 8, 9, 61)

I

Rayonnement spécifique de l'ÉLECTRICITÉ

exportant verticalement les rayons spécifiques des corps.

ES s'échappant des charges électriques ;

γ , β , α , τ s'échappant des champs électriques.

(Pages 9, 57, 131)

II

Rayonnement spécifique du MAGNÉTISME

exportant entre 45° et 135° les rayons spécifiques des corps.

MS s'échappant des charges magnétiques ;


ω , ν s'échappant des champs magnétiques.

(Pages 11, 132)

B. Sources d'émission des ONDES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES. Excitent seules le sens radiesthétique


III

Rayonnement des CORPS, SUBSTANCES ou OBJETS Humains, Animaux, Végétaux, Minéraux (Exemple d'une urne de cuivre)




Rayons électro-magnétiques spécifiques verticaux. A support ES.

(Pages 3, 57, 61)




Rayons électro-magnétiques spécifiques inclinés à 45° et 135°. A support MS.

(Pages 7, 8, 58, 61, 103)




Rayons électro-magnétiques spécifiques horizontaux. A support ω .

(Pages 8, 59, 62, 127)



Rayons électro-magnétiques spécifiques du Plan Fondamental. A support MS.

(Pages 8, 110, 133)




Rayons électro-magnétiques spécifiques de la Croix Magnétique. A support MS.

(Pages 8, 126, 133)

IV

Rayonnements verticaux TELLURIQUES de certaines régions du sol



Zone nocive affectant une partie d'habitation, provenant de minéraux radioactifs, ou de souterrains clos, ou de ruisseaux imprégnés, ou de Rectangles Peyré, etc...

(Pages 19, 59, 153)

V

Rayonnement de la LUMIÈRE

1° Ondes lumineuses (lumière et couleurs).


2° Ondes caloriques (chaleur).

3° Rayons chimiques (photographie).

(Page 17)

VI

Rayonnement des FORMES GÉOMÉTRIQUES



Sauvastika

Svastika (Pages 60, 150)


VII

Rayonnement de la RADIOACTIVITÉ

1° Emission de radiations corpusculaires α et β

2° Emission de certaines ondes électro-magnétiques appelées γ , réunissant les ondes γ , β , α .

3° Emission d'ondes RS, rayonnement spécifique propre de la radioactivité, rattaché également aux rayons.



(Pages 15, 59, 61, 145, 147)

VIII

Rayonnement des ETRES VIVANTS

(Humains, Animaux, Végétaux)

1° Onde nerveuse.

2° » sympathique.

3° » humaine.

4° » vitale.


5° » sexuelle.

6° » mentale.

7° » personnelle.

8° » d'espèce.

On rencontre sur les êtres vivants le rayonnement spécifique propre à la radioactivité (RS).



(Pages 24, 60, 170)

CHAPITRE II

LES INSTRUMENTS DU RADIESTHÉSISTE

Documentation

Tandis que la raison d'être du sens de l'ouïe est la perception des ondes sonores, celle du sens de la vue, la perception des ondes lumineuses, le propre du 6^m sens, tel que l'a appelé le professeur Charles Richet, est la perception des ondes EM (électro-magnétiques), polarisées ou non. Mais, exception faite pour l'homme primitif et les sujets ultrasensibles, l'action de ces ondes sur les centres nerveux humains est tellement faible qu'elle ne devient consciente qu'après l'intervention d'un amplificateur, dont l'effet peut être comparé à celui du cornet acoustique chez les sourds.

Sur 100 personnes, 80 au moins réagissent au premier contact des ondes EM. Bien qu'atrophie, le 6^m sens ne diffère pas des autres.

Les **amplificateurs** les plus communément employés par les radiesthésistes sont la baguette et le pendule, l'un et l'autre plus ou moins perfectionnés. Ils peuvent être **neutres** ou **actifs**, selon qu'ils sont ou non sans action perturbatrice sur les rayonnements que l'on désire capter par leur action.

Nous allons les décrire très brièvement, l'un et l'autre, en nous en tenant, pour le moment, aux amplificateurs neutres. •

§ 1^{er} — Baguette neutre des Sourciers

La baguette est un Y constitué en une matière suffisamment élastique et perméable aux ondes électro-magnétiques. Les premiers sourciers employaient une fourche en bois flexible, noisetier ou coudrier, de 40 à 50 centimètres de longueur.




Fig. 27




Fig. 27 bis

Première manière de tenir la baguette

Certains utilisent encore de préférence deux tiges de baleine plate d'un demi à un centimètre de largeur, de 25 à 30 centimètres de longueur, reliées entre elles par une ligature longue de 4 à 5 centimètres. Quelques sourciers trouvent insuffisante la longueur de 30 centimètres et lui substituent celles de 40 à 50 centimètres qui leur donnent, disent-ils, plus de sensibilité.

Chacun doit trouver, par des essais personnels, la manière de tenir la baguette qui lui donne la meilleure sensibilité. Voici deux excellentes manières, au choix :

Première manière de tenir la baguette : Suivant la figure 27, la baguette doit être tenue par le **bout des doigts**, les paumes des mains au-dessus, la pointe de la baguette en avant et légèrement relevée ; elle ne doit pas être serrée entre les doigts, de façon à demeurer, en souplesse, toujours en équilibre instable. Au moment où elle pénètre dans une zone radiante, vers laquelle l'opérateur doit se diriger, la baguette se relève ou s'abaisse, d'abord lentement, puis plus ou moins brusquement, suivant le cas (fig. 27 bis).

Deuxième manière : Suivant la figure 28, la baguette doit être tenue légèrement, mais à **pleines mains**, les paumes et ongles au-dessus, la pointe en avant, légèrement relevée, les avant-bras horizontaux, au contact du corps, les coudes écartés. Cette position, qui n'est pas préconisée par tous les radiesthésistes, est cependant, à notre avis, la plus avantageuse pour obtenir le maximum de sensibilité. Veiller encore à ce que la baguette, pointe légèrement relevée à la hauteur du plexus solaire de votre poitrine, forme, en souplesse, un angle de 45° environ, plus ou moins suivant la nécessité de votre cas personnel. Ecartez alors les branches, en plus ou en moins, ou demeurez à 45°, suivant que vous sentirez la position la plus favorable à la réaction de l'instrument, à son passage sur l'objet de votre étude : ruisseau souterrain connu, ou gros poids de fonte de 5 à 10 kg., etc...

Il ne semble pas, au moins pour la majorité des opérateurs, que le sens des mouvements de la baguette ait un rapport quelconque avec la polarité (+ ou —) de l'objet radiant.




Fig. 28




Fig. 28 bis

Deuxième manière (recommandée) de tenir la baguette

Lors des premiers essais, le débutant est souvent trop absorbé à la recherche de la meilleure position, et, passant sur un ruisseau souterrain qui lui tient lieu d'exercice, il oublie tout à fait de se rappeler l'objet de sa recherche,

l'eau ; il n'est pas étonnant que la réaction de sa baguette se fasse attendre... Mais avec un peu d'habitude, le débutant adoptera, sans plus y penser, la bonne position de sa baguette, et ne se préoccupant plus que de l'objet étudié (ou recherché) la baguette se manifestera.

Ainsi que l'a fait remarquer M. Mellin dans son ouvrage « **La Radiesthésie agricole et domestique** » après un bref usage, chacune des extrémités des branches de la baguette, comme d'ailleurs chacune des faces de la pointe se trouvent chargées d'électricité de nom contraire (fig. 29). Cette constatation peut se taire aisément à l'aide du pendule neutre sphérique noir P.S. (1), complété par un témoin de polarité (pile de poche ou aimant) (2). Chaque opérateur a le plus grand intérêt, en gravant sur les branches de sa




Fig. 29

La vérification de la polarité des extrémités de la baguette se fait à l'aide d'un pendule réglé sur l'électricité, en utilisant le procédé de contrôle indiqué à la page 52 de « Radiesthésie Méthode Physique », et en se servant de préférence d'un aimant. Les signes + ou — seront ensuite marqués sur la baguette.

(1) En vente aux Editions du « Progrès Scientifique », 37, rue Rossini, Nice.

(2) Voir page 52 de « Radiesthésie Méthode Physique » contrôle de polarité.

baguette, les signes + ou —, à prendre note des résultats de l'expérience qu'il a faite à cet égard, et à les utiliser en plaçant toujours la même branche dans la main de même polarité électrique. Il s'apercevra ainsi que son instrument est beaucoup plus sensible. L'homme, dans 95 % des cas, a la main droite positive, et la main gauche négative ; la femme, dans la même proportion, a la main droite négative et la main gauche positive.

Pour être neutre, la baguette doit être formée d'une substance non radio-active dont la charge électrique ou magnétique soit infinitésimale. Le rayonnement des couleurs ayant des propriétés physiques assez accentuées, elle doit être noire et ses ligatures en fil de même couleur. La baguette la plus avantageuse et celle qui a été adoptée par le plus grand nombre de radiesthésistes, est la baguette à tiges de baleines plates.

C'est par la pointe de la baguette et non par les pieds de l'opérateur que les ondes EM pénètrent dans le récepteur humain. Conduites par les filets nerveux, elles atteignent le centre nerveux qui déclenche le réflexe violent, auquel la volonté ne peut s'opposer, et qui fait basculer l'instrument dans un sens ou dans un autre.

Pour s'en rendre compte, il suffit de présenter la pointe de la baguette au-dessus d'une source radiante de faibles dimensions, objet de cuivre, boîte d'aluminium, point malade du corps humain, et de constater la réaction.

Le port de semelles en caoutchouc ou de chaussettes de soie, condamné par certains auteurs pendant les opérations de radiesthésie, est donc complètement indifférent.

Imprégnation de la baguette : Une baguette qui a reçu pendant quelque temps le rayonnement d'un objet ou d'une substance (masse métallique, ou masse d'eau, etc...) s'imprègne des radiations de cet objet ou de cette substance, et les rayonne à son tour. Il s'agit là d'une imprégnation temporaire. Ainsi imprégnée, la baguette a l'inconvénient de contrarier ou de fausser les résultats des opéra-

tions suivantes, si l'on n'y remédie pas. L'opérateur fait cesser ce phénomène temporaire en frappant la pointe de la baguette contre la table d'exercices, ou contre un mur, un arbre, ou le sol. On peut encore simplement abandonner une des branches de la baguette.

Imprégnation des mains : Le même phénomène par imprégnation se produit pour les mains qui tiennent la baguette. Après chaque opération différente, ou de temps en temps au cours d'une opération prolongée, frottez vigoureusement les paumes de vos deux mains, puis secouez celles-ci séparément comme si vous désiriez vous débarrasser de l'imprégnation. Cette précaution est surtout recommandable à l'opérateur qui tient à se désimprégner tout entier lorsqu'il opère sur des radiations microbiennes, en radiesthésie médicale.

§ 2 — Le pendule neutre

Le pendule courant se compose d'une masse (sphère, cylindre, etc...) en bois, ivoire, grès, métal, etc..., suspendue à un fil de 30 centimètres environ de longueur pouvant s'enrouler autour d'un bâtonnet de 0,04 à 0,06 centimètres de longueur, de 1 à 3 millimètres de diamètre environ.




Fig. 30

Pendule neutre
sphérique noir P.S.,
d'étude.

Comme nous l'avons exposé pour la baguette, pour être **neutre** le pendule courant doit avoir chacun de ses trois éléments (masse, fil et bâtonnet), composés d'une substance **non radioactive**, et d'une charge électrique et magnétique infinitésimale et ces trois éléments doivent être de couleur noire.

La forme la plus avantageuse de la masse est la forme sphérique. Nous recommandons notre pendule neutre sphérique noir, marque P.S., construit suivant les données de l'ingénieur Voillaume ; avec son fil suspenseur en soie noire dont le bâtonnet noir sert à régler commodément la longueur.

Le pendule neutre a l'inconvénient de capter aussi bien les multiples « images » des corps et radiations, que ces corps et radiations eux-mêmes. Or, ces **images**, en radiesthésie, sont l'**apparence** par rapport à la **réalité**. Elles sont très souvent une cause d'erreurs dans la recherche des objets **invisibles**.

Par contre, nous recommandons le pendule neutre P.S. au débutant qui ne travaille d'abord que sur objets **visibles**, pour en percevoir les ondes. En effet, le pendule neutre P.S. constitue un pendule d'étude très commode pour l'initiation aux premiers exercices, quitte à adopter au plus tôt le Révélateur « Schumfell » anti-image, pendule scientifiquement construit et de premier ordre, surtout pour les travaux professionnels ultérieurs.

Le pendule doit être tenu par le bâtonnet, en serrant le moins possible, entre le pouce et l'index (ou, pour certaines personnes, entre le pouce et le médus), que la main, comme les doigts qui suspendent le pendule, pendent, détendus sans crispation, immobiles, les autres doigts relevés et écartés sans effort (fig. 34). Convenablement réglé en longueur et en poids (on verra plus loin ce dont il s'agit), et présenté au-dessus d'un corps radiant, le pendule se met à tourner, suivant les cas, soit dans le sens des aiguilles d'une montre (sens direct ou positif), soit dans le sens opposé (sens inverse ou négatif).

Dans le plus grand nombre des cas, le pendule présente l'avantage de pouvoir être manié du premier coup par l'opérateur le plus inexpérimenté, et d'être plus sensible et plus précis que la baguette, dont l'usage exige quelque peu d'expérience et requiert une certaine souplesse.

Imprégnation du pendule : Un pendule qui a reçu quelque temps le rayonnement d'un objet, s'imprègne des radiations de cet objet et les rayonne à son tour. Il s'agit là d'un fait d'autoréglage temporaire par imprégnation. Ainsi imprégné des radiations d'un objet, le pendule a acquis l'inconvénient de tourner lorsque, sans changer la longueur de son fil de suspension, on le présente sur n'importe quel autre objet, de substance différente. Ce serait

là une cause de graves erreurs, pour les opérations suivantes, si l'on n'y remédiait. L'opérateur fait cesser ce phénomène temporaire, après chaque opération prolongée, en donnant une légère secousse au pendule en l'élevant brusquement, ou mieux, pour plus de sécurité, en cognant légèrement sa base contre la table d'exercices ou contre le sol.

Imprégnation de la main opératrice : Le même phénomène par imprégnation se produit pour la main qui soutient le pendule. Après chaque opération prolongée, il convient pour y obvier, de frotter le dos de la main gauche libre avec les doigts libres de la main droite, ce qui a pour effet de ramener les deux mains au même potentiel électrique.

L'attitude passive dans la perception, suivant la Méthode Physique : Pour obtenir un succès presque immédiat, sinon immédiat, il suffit dans la majorité des cas, de régler la longueur du fil de suspension, soit du pendule neutre d'étude P.S., soit du pendule Schumfell, à 126 millimètres, suivant la manière indiquée figure 46, page 95. Cette longueur de réglage correspond à l'une des longueurs de réglage millimétrique de l'argent. Ainsi, le débutant n'a plus qu'à présenter l'un comme l'autre de ces pendules, à la longueur de fil indiquée, sur la verticale d'une petite masse de pièces de monnaie quelconque d'argent. Il est rare que la réaction du pendule ne se produise pas insensiblement et après quelques essais pour les plus réfractaires. Mais, même en l'absence de ce réglage précis indiqué, les premiers exercices suivants suffiront amplement au débutant pour parvenir rapidement à la perception normale.

Dans les mêmes conditions que pour la pointe de la baguette, c'est par la masse oscillante et le fil de suspension, que l'onde EM captée, pénètre dans le récepteur humain et atteint le centre nerveux, qui produit à son tour les réflexes de la main qui déterminent les mouvements du pendule — imperceptible mouvement de la main en avant ou en arrière, en cas de balancement ; double mouvement à orientations orthogonaux (en avant ou en arrière, à droite ou à gauche), en cas de giration.

Tout se passe donc comme si l'ensemble constitué par le corps de l'opérateur et son outil formait un appareil récepteur d'ondes EM, le pendule jouant à la fois le rôle d'amplificateur et d'accessoire de réglage.

Si, d'une façon générale, une action réflexe est inconsciente, son effet ne l'est pas toujours. Cet effet qui, chez le radiesthésiste, se traduit par le mouvement imprimé à son détecteur, lui donne conscience d'une sensation du sens du toucher.

Et c'est la conscience de cette sensation qui chez le civilisé constituera la **perception sourcière**, perception qui sera ensuite, bien ou mal interprétée par l'intelligence.

Dans la perception radiesthésique, nous sommes libres de réduire au minimum, c'est-à-dire à la simple conscience du réflexe, cette intervention de l'âme, de manière à rendre notre appareil récepteur aussi passif et aussi inconscient que possible ; c'est l'**attitude passive**. Mais nous pouvons aussi adopter diverses attitudes **actives** que nous examinerons plus loin.

Certains radiesthésistes chez qui l'intervention psychique est prépondérante, ont nié la possibilité de la perception dans l'attitude passive. Mais cette opinion est contraire, non seulement aux lois de la psychologie, mais aux faits eux-mêmes. En voici des preuves :

Preuves de la possibilité de la perception purement physique dans l'attitude passive : Quelle que soit la méthode qu'il emploie, tout praticien entraîné s'est aperçu, au cours de ses travaux de prospection, que si par hasard, son pendule se trouvait sur la verticale d'un objet, pour lequel il a été volontairement ou non réglé, son pendule se mettait tout à coup à tourner ; ceci tout à fait en dehors de son intention.

Dans une autre circonstance, il peut arriver que deux opérateurs aient prospecté une même substance et conservé le réglage précis de leur pendule respectif sur cette substance. Si l'un d'eux s'avise de renouveler l'expérience sur la substance, et que l'autre tienne correctement son pendule, alors même qu'il n'a plus conscience de l'avoir en main, son pendule — donc bien tenu dans l'attitude passive, mentalement et physiquement — se met à tourner également. Ce phénomène physique est basé sur des égalités de longueurs et de fréquence d'ondes entre les deux pendules considérés, sorte de résonance ou accord, qui le plus souvent est le fondement de la radiesthésie. C'est par le même procédé de résonance que fonctionnent d'ailleurs les

appareils de T.S.F. Le poste émetteur n'accroche le poste récepteur que si le bouton d'accord des longueurs d'ondes est en synchronisme avec les ondes hertziennes émises.

Signalons une troisième preuve. Laissons tourner un pendule réglé sur un corps. Fermons même les yeux. A notre insu faisons glisser, par un tiers, une plaque épaisse de mica entre ce corps et ce pendule, et le tiers constatera que le pendule s'arrêtera aussitôt. Ceci prouve avec évidence suffisante, l'action de cet écran sur les ondes émises par le corps et l'impossibilité de perception de l'opérateur.

Une quatrième preuve peut être fournie par le phénomène de la « rémanence » ou de l'« imprégnation », obtenu par le contact d'un corps quelconque sur une feuille de papier. Maintenons ce contact pendant une demi-heure environ et ensuite présentons le pendule au-dessus de l'endroit occupé antérieurement par le corps ; nous enregistrerons, à cet emplacement, toutes les réactions successives du pendule (girations polarisées, séries, rayons fondamentaux, etc...) bien que le corps en question n'ait laissé aucun atome de lui-même à cet endroit, mais seulement une action physique de ses ondes spécifiques.

De nombreuses autres preuves pourraient être encore données qui n'apporteraient pas davantage de confirmation au fait physique de la radiesthésie.

La passivité peut être inconsciente et involontaire ; dans ce cas, elle est absolue, comme dans les deux faits précédents. Mais elle peut être, aussi, imposée par la volonté ; dans ce cas, elle n'est que relative et se rapproche d'autant plus de la passivité absolue que le sujet a plus d'emprise sur lui-même.

Les attitudes de la méthode mentale : Mais il est hors de doute que l'âme peut aussi intervenir activement, notamment à l'ordre du désir, et que certains sujets particulièrement doués arrivent, par cette action étudiée et disciplinée, à des possibilités considérables. C'est l'**attitude expectante** où celle du « désir mental » ou « orientation mentale » recommandée par certains auteurs et qui, d'après eux, doit précéder la recherche. C'est l'**attitude sélective**, par laquelle, dans un faisceau de rayonnements divers, nous choisissons celui auquel nous voulons être réceptif, nous interdisant la réception des autres. Enfin, l'**attitude intuitive** par laquelle nous prions, en quelque sorte, le subconscient de se découvrir. Telle est peut-être l'attitude qu'adoptent les personnes qui sentent leur pendule s'alléger ou s'alourdir, ou qui, au-dessus du pétrole, par exemple, ont l'impression de le balancer dans un bain d'huile. Telle est aussi, semble-t-il,

l'attitude que prennent certains opérateurs, pour apprécier le débit ou la pression d'un cours d'eau souterrain.

Si l'attitude **passive**, absolue ou relative, est celle qui convient le mieux au débutant ou à l'opérateur qui veut prospecter par les procédés de la **méthode physique**, aucune des autres attitudes actives convenant à la **Méthode Mentale**, ne lui est interdite, et il peut y recourir successivement, et à son gré, suivant ses facultés particulières et les besoins de la prospection.

Et par là, tombent toutes les objections que l'on a faites à la méthode de radiesthésie physique. Rien n'empêche la même personne de recourir aux méthodes de précision dans les cas où elles s'imposent, et, au contraire, dans des cas tout à fait différents, de faire appel à d'autres procédés (mentaux, psychiques), en harmonie avec leurs facultés cérébrales spéciales et reconnus particulièrement efficaces dans les cas dont il s'agit.

Mais, ainsi que l'explique P. Béasse dans l'appendice relatif à la **Radiesthésie par la Méthode Mentale**, page 229, le débutant aura le plus grand intérêt à rester, pendant la première année, fidèle à la Méthode Physique, car c'est lorsqu'il sera parfaitement familiarisé avec toutes les ondes que l'on rencontre en microphysique que les **attitudes expectante, sélective et intuitive** de la Méthode Mentale, lui rendront le plus de services.

§ 3 — Les instruments actifs

Les instruments actifs sont les pendules possédant une émission propre.

1° Un pendule à charge électrique ou magnétique détermine sur un objet très proche des effets d'induction ainsi que, parfois, des effets d'attraction ou de répulsion qui ne sont pas sans influence sur le rayonnement spécifique de cet objet. En outre, il dévie plus ou moins considérablement son angle fondamental.

2° Un pendule comportant une substance radio-active amplifie considérablement l'intensité du rayonnement d'une source radiante très proche; en outre, par les champs électriques et magnétiques qu'il développe, il produit des effets analogues à ceux des pendules précédents.

3° Le pendule terminé par une pointe est assujéti aux propriétés physiques que présente cette pointe, lorsqu'elle est dirigée vers le sol.

Parmi les pendules à charge magnétique, nous citerons le pendule Arar B, de M. Baradat, qui contient une petite spirale de cuivre ; le pendule Bovis, le pendule à spirale d'aluminium de M. l'ingénieur Pitois, le pendule électro-magnétique de M. Badoit, terminé par une tige d'ébonite jouant le rôle de pointe ; le pendule de M. Turenne. Tous ces pendules présentent cette particularité qu'ils ne se règlent pas et qu'ils tournent sur n'importe quelle radiation, quelle que soit la longueur du fil suspenseur. Avec ces instruments, la recherche de l'identité des substances exige que l'on ait recours, soit à la sélection mentale, soit à l'emploi d'un témoin.

Parmi les pendules à charge électrique, citons : Un pendule dont la masse, constituée par une balle de caoutchouc, se charge peu à peu d'électricité négative.

Un pendule terminé par une pointe ; cette pointe fût-elle un cône, a la propriété d'éteindre les images EM et RA situées dans le rayon d'action de cette pointe.

Un pendule à charge électrique statique ne tourne pas au-dessus des images EM rencontrées par son champ.

Un pendule parcouru, au moins partiellement, par un courant électrique, même d'intensité infinitésimale, produit par exemple, par le contact de deux métaux différents appropriés. Ce pendule, par son balancement, produit des effets d'induction électrique qui ne sont pas sans action sur le rayonnement des corps qu'il atteint. Il a, d'autre part, la propriété d'effacer les images électro-magnétiques.

Si avec un pendule actif, non muni d'un témoin, nous prenons à l'aide du procédé des secousses le chiffre de série d'une substance ou d'une radiation, nous trouvons des chiffres très différents de ceux que l'on obtient avec le pendule neutre convenablement réglé. Ces chiffres diffèrent, bien entendu, du nombre particulier de l'onde ou de la substance.

Ainsi, tandis que le « nombre particulier » (ou chiffre objectif de série), de l'argent est 3, on trouve le chiffre 7 avec un pendule Arar B, ou avec le pendule Turenne ; 5 avec le Pendule Pitois. Si nous munissons ces pendules d'un « témoin », nous retrouvons le chiffre 3.

Le pendule coloré est également un pendule actif et son action est différente suivant sa couleur et aussi suivant que cette couleur est à accompagnement électrique ou magnétique.

Tout ce que nous avons dit, d'une façon générale, pour le pendule actif, est également vrai pour la baguette active.

Un pendule électrique ou magnétique dévie cependant l'angle fondamental de la substance ou de la radiation au-dessus de laquelle il est présenté ; et quand, après une série de secousses, sa giration s'arrête, il oscille dans la direction déviée du plan fondamental de l'objet.

Le Révélateur « Schumfell »

Breveté S. G. D. G. — N° 734.234 (Modèle déposé)

Cet appareil électro-radio-magnétique, d'origine alsacienne, de construction très étudiée (1) est un pendule perfectionné « anti-images ». Eteignant les images de toutes catégories, y compris la Rémanence et l'Imprégnation, son emploi enlève à l'opérateur le souci provenant de cette délicate question, tout en simplifiant considérablement la prospection.

En conséquence, par son emploi, l'acquisition des connaissances sur les « images » de la page 183 à la page 206 n'est plus indispensable, en principe, à moins de les rechercher pour les utiliser.




Fig. 31 - Suspension du « Schumfell »

Main droite pour droitier tenant correctement le « Révélateur Radio-Magnétique Schumfell », c'est-à-dire :

1° La main disposée sans raideur en col de cygne ;

2° Les doigts relevés et écartés ;

3° Le plan médian de l'anneau (A, B, C, D de la Fig. 32) et l'aiguille bleutée de la boussole dirigés dans la ligne Nord-Sud.

Amener le plan médian de l'anneau ainsi que l'aiguille bleutée de la boussole dans la ligne Nord-Sud magnétique ;

4° Faire osciller légèrement l'anneau en le maintenant dans ce plan ;

5° Laisser glisser le fil entre les doigts jusqu'à giration bien circulaire maxima.

(1) On peut trouver le Révélateur de précision « Schumfell » anti-images aux Editions du « Progrès Scientifique », 37, rue Rossini, Nice.




Fig. 32 - Orientation convenable du plan médian de l'anneau

Le Révélateur Schumfell se compose d'un anneau métallique creux, dont la partie supérieure entourée d'un enroulement en fil de cuivre isolé, est assimilable au dispositif d'un électro-aimant en fer à cheval, dont les pôles seraient situés au niveau de la partie inférieure de la boîte cylindrique qui renferme la boussole servant à l'orienter.

Cette boîte, hermétiquement fermée, contient de l'air confiné qui, pour cette raison, s'ionise au bout de très peu de temps, et devient radio-actif. La tige filetée qui fixe la boîte de la boussole, dépassant très peu la partie inférieure de l'anneau, est prolongée par une tige d'ébonite et joue le rôle de pointe.

Pour orienter l'appareil dans le sens magnétique Nord-

Sud (1), il convient de faire tourner l'appareil de manière que la pointe bleue de l'aiguille de la boussole vienne se placer à 340° (Nord Magnétique), c'est-à-dire à 20° à gauche de la lettre N (Nord Géographique) qui est à 0° .

Quand l'appareil est au repos, placé soit horizontal soit vertical, mais dans un orientation autre que celui du méridien magnétique Nord-Sud, on peut constater à l'aide du pendule neutre, qu'il développe autour de lui un champ magnétique. L'appareil n'est plus qu'un pendule **radio-magnétique**, qui tourne alors sur n'importe quelle radiation ou corps, et avec n'importe quelle longueur de fil. Il ne convient ainsi qu'à la méthode de **radiesthésie mentale**.

Si, au contraire, plaçant l'anneau verticalement, nous le faisons balancer dans le plan du méridien magnétique, Nord-Sud, nous réalisons les conditions de l'expérience de Faraday, et nous constatons que le bobinage est parcouru par un courant électrique induit par le magnétisme terrestre.

L'appareil se transforme alors en pendule **électro-radio-magnétique**, et ne tourne plus que sur les radiations pour lesquelles il est convenablement réglé. Il convient essentiellement alors à la méthode de **Radiesthésie Physique**, objet de ce cours. Il importe de le maintenir dans le plan du méridien magnétique (340° — 160°) tout en modifiant la longueur du fil jusqu'à obtention de la giration parfaite d'intensité maxima, qui caractérise le réglage approprié.

Le courant électrique qui parcourt l'anneau, le champ magnétique qui entoure l'électro-aimant, la pointe, le rayonnement radioactif de l'appareil, le rendent impropre à la perception des images de toute nature et en font le pendule anti-image idéal. Ajoutons que la composition spéciale dont une certaine quantité de plomb, qui entre dans l'alliage du fil suspenseur, constitue un écran radiesthésique qui protège l'opérateur contre la perception des images radio-actives.

Pour s'initier rapidement à l'usage du Révélateur électro-radio-magnétique anti-images « Schumfell », se reporter à la page 121.

(1) Le Nord magnétique est celui indiqué vers 340° par l'aiguille aimantée bleue. Le Nord géographique se trouve environ 20° à l'Est du Nord magnétique, soit à 0° .

CHAPITRE III

LA PERCEPTION DES ONDES

PREMIERE LEÇON

RÉGLAGE EXPÉRIMENTAL DU PENDULE SUR LA NAPPE DES RAYONS VERTICAUX DES DIFFÉRENTS CORPS

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 27 et 28)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Sauf dans quelques cas rares et accidentels, tout objet émet sur toute sa surface une **nappe de rayons spécifiques verticaux**, transportés vers le ciel à très grande distance par des ondes à support électrique (ES—), et correspondant à chacun des corps simples dont il est composé.

Pour percevoir ces rayons spécifiques (ou ondes électromagnétiques) à l'aide de notre sixième sens, il faudra ajuster notre récepteur humain (c'est-à-dire l'ensemble formé par notre corps et notre pendule) à la longueur d'onde de la radiation à capter, ainsi que nous le faisons avec notre récepteur de T.S.F. De même qu'avec cet appareil, plus le réglage est juste, plus l'audition est parfaite, de même plus l'ajustage de la longueur du fil de suspension de notre pendule sera précis, plus notre perception sera intense.

C'est le Vicomte Henri de France qui a été le grand vulgarisateur du **réglage du pendule**, dont le principe est dû à l'Abbé Ferran. En cela il a rendu à la radiesthésie un service inappréciable dont on reconnaîtra, certainement, un jour, toute l'étendue. De nombreux radiesthésistes n'hésitent pas à dire que leur principal secret de réussite en radiesthésie réside dans un **réglage soigneusement précis**. C'est le réglage du pendule qui aura permis le dressage de la Carte d'identité des ondes (voir Tableau d'identification, page 96) et par suite, de déterminer les conséquences incalculables qui résulteront de ce fait.

Les manifestations du Pendule : Celui-ci se manifeste de quatre manières différentes : par

la giration ou rotation,
l'ellipse,
l'oscillation,
l'arrêt.




Fig. 32 bis

La giration ou rotation prend un sens, suivant la polarité du corps étudié ou recherché. Ainsi une giration est de **polarité positive** lorsqu'elle s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Une giration est de **polarité négative**,

dans le sens contraire. Un corps est donc positif si, sur la verticale de celui-ci, le pendule fait une giration positive. Ce corps est négatif, si la giration est en sens contraire.

L'ellipse est le mouvement transitoire que prend le pendule entre les oscillations et les girations.

L'oscillation est un battement, ou balancement, aller et retour dans le même plan, du pendule. Elle se produit, notamment, sur les extrémités d'un aimant droit, ou en fer à cheval (magnétisme), pour indiquer la polarité, positive ou négative, de chaque extrémité ou pôle. Il en est de même en ce qui concerne une pile de poche (**électricité**) ; le sens de l'oscillation sur chaque extrémité (ou pôle) constituée par les deux lames de cuivre flexibles, est différent, suivant la polarité, positive ou négative, perçue par le pendule. Il en est également de même à l'égard de certains points dans l'étude des **ondes de forme**.

L'arrêt du pendule prend parfois toute sa signification.

Ces réactions diverses doivent être reçues **normalement** par le pendule, c'est-à-dire à la suite d'une expérimentation objective et mécanique constante et uniforme à tous les radiesthésistes. Il en résultera ensuite, tout naturellement, l'unité d'interprétation, indispensable pour constituer une science.

On comprendra, dès lors, toute l'importance qu'il y a, avant d'expérimenter sur l'inconnu, d'épuiser tous les exercices que peut fournir l'observation des corps visibles.

Mais avant d'aborder le premier exercice d'assouplissement, nous désirons vous permettre d'apprécier vous-même, vos possibilités radiesthésiques :

Vous pouvez vous-même connaître vos dispositions à la radiesthésie : C'est le procédé que conseille le R.P. Bourdoux : Suspendez votre pendule, avec une longueur de fil quelconque, sur le milieu de votre avant-bras gauche (du poignet au coude), dans le but de chercher la direction de la circulation du sang dans vos veines. Si votre pendule ne tarde pas à osciller dans le sens longitudinal de votre

avant-bras, c'est que vous avez des dispositions suffisantes pour devenir radiesthésiste. Même si l'oscillation est faible, mais existe, vous devez être satisfait. Quelques exercices, parmi ceux qui vont suivre, augmenteront rapidement votre sensibilité radiesthésique. Plus la réaction aura été rapide, et l'oscillation à allure rapide, plus vous serez en bonne disposition pour l'avenir. Si, par contre, la réaction tardait à se manifester, faites cette expérience en d'autres moments, sans vous inquiéter. L'état de votre santé, ou une mauvaise disposition physique, peut, momentanément, vous rendre inapte. Dans les quelques semaines qui suivront vous aurez peut-être plus de chance.

Exercices :

1. Pour faire ses premiers pas, le débutant se procurera un pendule neutre sphérique noir, type « Progrès Scientifique ».

Il pourra employer ce pendule sphérique neutre d'étude, durant les premiers exercices sur objets **visibles**. Ces leçons peuvent tout aussi bien être suivies de suite avec le pendule électro-radio-magnétique « Schumfell ». Ultérieurement, l'opérateur n'étant plus un débutant, utilisera de préférence dans les mêmes conditions, le pendule « Schumfell », dont les qualités sont incontestables dans la prospection pratique de corps **invisibles**, et notamment, dans la lutte constante contre les « **images** », ce qui en fait un instrument de contrôle de grande valeur.

Momentanément muni du pendule neutre sphérique noir P.S. précité, qu'il tiendra, suivant les cas, soit de la main droite, soit de la main gauche, suivant ses commodités manuelles, de la manière antérieurement prescrite ; il le présentera sur la verticale d'un objet quelconque assez volumineux (chandelier de bronze, boîte d'aluminium, réveil-matin en nickel, etc...).

Bien entendu, sans s'inquiéter de sa propre polarité, il choisira pour tenir le pendule la main avec laquelle le maniement de cet instrument lui paraîtra le plus aisé.

La masse du pendule étant sur la verticale de l'objet, à 5 centimètres environ, il la fera osciller légèrement, puis modifiera progressivement, en plus ou en moins, et très lentement la longueur du fil suspenseur, en faisant rouler le bâtonnet entre le pouce et l'index qui le supporteront. C'est là la recherche expérimentale, par tâtonnement, du réglage précis (fig. 35).

Pendant cette opération, il suivra de biais le mouvement du pendule, sans regarder celui-ci ; son regard se fixera, au contraire, sur l'objet étudié, tout en gardant son esprit attentif quant à la recherche, passif quant au résultat.

La main suspendant le pendule sera disposée pendant, détendue, « en col de cygne », les deux doigts serrant le moins possible le bâtonnet de suspension, à la manière de la figure 34 :

Que toute votre pensée se porte alors sur l'objet étudié (ou recherché) ; surtout ne pensez pas à autre chose.

A un moment donné, le mouvement de balancement commencera à se transformer en mouvement elliptique très allongé ; puis le petit axe de l'ellipse s'agrandira peu à peu et sa forme se rapprochera de plus en plus de celle d'un cercle. Enfin, la giration deviendra absolument circulaire et prendra la vitesse maxima et ne pourra plus s'arrêter. A ce moment-là, l'instrument se trouvera correctement réglé « expérimentalement ».

A ses débuts, le néophyte, sans s'inquiéter du sens de gira-




Fig. 34

Manière de tenir et de faire rouler le bâtonnet du pendule entre les doigts.




Fig. 35

Perception sur les rayons verticaux

tion du pendule, devra multiplier ce premier exercice un grand nombre de fois, de manière à acquérir une grande souplesse des doigts. C'est de l'acquisition de cette souplesse que dépendra en grande partie le succès des exercices qui vont suivre.

2. Régler, comme il a été dit plus haut, le pendule sur un objet d'aluminium, par exemple, et lorsque le réglage paraîtra parfait (soit dans les environs de 143 ou 164 millimètres de longueur de fil), sans déranger cette longueur du fil, présenter l'instrument sur la verticale d'un autre objet d'aluminium : l'amorcer par un léger balancement et constater qu'il tourne. S'il ne tourne pas, c'est que le premier réglage a été mauvais.

3. Dès que le premier exercice aura été bien réussi, le refaire, dans les mêmes conditions, sur un autre objet en cuivre, en fer, en nickel, en argent, en étain, en plomb,

etc... Constater que chaque fois que l'on change de substance, le réglage doit changer (sauf dans le cas exceptionnel où des longueurs de réglage presque identiques conviendraient à deux substances distinctes, tels que 133 millimètres pour l'argent, 133,50 pour le cuivre).

4. Ces premières notions étant bien acquises et possédées à fond, multiplier les exercices d'assouplissement en passant très rapidement d'une source radiante à une autre, en procédant chaque fois à un réglage rapide, mais aussi précis que possible du pendule, par la simple rotation du bâtonnet entre le pouce et l'index.

Pour cela, présenter le pendule successivement, sur une table en bois, sur une plaque de marbre, sur un objet en verre, sur un bol rempli d'eau, sur le dos de la main, etc..., etc..., en s'imposant d'obtenir chaque fois un réglage rapide et parfait. En passant d'une substance à l'autre, ne pas manquer chaque fois de **désimprégner** le pendule suspendu en lui faisant subir par sa base un léger choc sur la table. Cette précaution est indispensable pour éviter toute erreur.

5. Régler le pendule au-dessus (entre les deux lames : giration négative) d'une pile de poche, debout, même usagée (réglage sur rayons ES, rayons spécifiques de l'électricité), puis présenter le pendule ainsi réglé au-dessus d'un fil amenant à une ampoule électrique allumée et constater ainsi que le courant électrique passant par ce fil émet des rayons ES.

6. Régler le pendule sur l'un des pôles d'un aimant rectiligne ou en fer à cheval, posé à plat, horizontalement, c'est-à-dire sur les rayons MS, rayons spécifiques du magnétisme. Suivant le pôle, il y aura oscillation, positive ou négative. Présenter ce pendule, ainsi réglé, au-dessus d'un objet en fer quelconque. Constater ainsi que cet objet est aimanté, puisqu'il émet des rayons MS qui se manifestent par une oscillation ou giration positive ou négative.

7. Régler le pendule successivement sur des cartons colorés à chacune des sept couleurs du spectre.

Constater ensuite que si on présente le pendule au-dessus d'une feuille de papier blanc, il tourne, quelle que soit la longueur du fil de suspension, ce qui n'a rien de surprenant car sur les nombreuses nuances dont l'assemblage compose la couleur blanche, il s'en trouve toujours une pour laquelle le réglage correspond à la longueur de fil du pendule.

*
**

Lire, dès à présent, la 30^{me} leçon, sur les écueils en radiesthésie, page 217.

LA PERCEPTION DES RAYONS SPÉCIFIQUES

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique »,
pages 51 à 53 et 65 à 76)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Précisons, dès à présent, que le rayonnement de la matière par les ondes électro-magnétiques et par les radiations corpusculaires, s'effectue de deux façons que nous étudierons en détail dans ce cours : la première, par rayonnement **direct** (les rayons spécifiques, les rayons radio-actifs, les rayons de forme) ; la seconde, par le rayonnement **indirect** (les images).

Envisagées sous un autre angle, toutes les substances ou corps simples (des règnes animal, minéral et végétal) et toutes les radiations (électricité, magnétisme, radio-activité, etc...) rayonnent, émettant des rayons ou ondes, dont l'origine est, vraisemblablement, atomique, et due au mouvement des électrons planétaires autour du noyau de chaque atome.

M. l'ingénieur Voillaume, qui a découvert des ondes électro-magnétiques spéciales et en a étudié leurs propriétés physiques communes, les a dénommées « **ondes spécifiques des corps simples** ». (Revoir les notions préliminaires à ce sujet, page 4).

Ces ondes spécifiques sont **électro-magnétiques**. Elles ne sont pas uniques pour le même corps, mais, au contraire, multiples, quoique en nombre limité. Elles sont aussi de longueur d'onde différente. Mais elles ont des propriétés physiques communes, notamment celle d'avoir même polarité, même Nombre Particulier et même Angle Fondamental.

Toujours identiques, elles caractérisent le corps simple ; et, par la reconnaissance de leurs éléments particuliers, permettent de le distinguer et de l'identifier.

Livrées à elles-mêmes, ces ondes s'amortissent très rapidement et s'éteignent au bout de quelques millimètres de parcours. Il est donc probable qu'elles seraient restées inconnues si elles n'étaient saisies et emportées, à plus ou moins grande distance, par d'autres ondes plus puissantes, **qui leur servent de support**. Celles-ci sont les ondes ES (à support électrique), les ondes MS (à support magnétique) et quelquefois RS (à support de la radio-activité) qui s'échappent du sol, et les ondes à support « ω », qui s'échappent des parties extrêmes de tous les corps, et, en particulier des pointes.

Les sources d'émission des ondes électro-magnétiques : Une source d'émission d'une onde électro-magnétique est un espace renfermant une énergie capable de produire l'onde en question.

Rappelons préalablement que par **charge**, il faut entendre la quantité d'électricité ou de magnétisme contenue dans un corps, et par **champ**, la région soumise à l'influence d'une charge, soit d'un courant (électricité), soit d'un aimant (magnétisme).

Ainsi,

a) Pour ce qui concerne les radiations :

1° Une charge électrique, qui peut être positive ou négative, est une source d'émission d'ondes à double polarité : rayons ES+, ou rayons ES— (1). Les rayons ES (c'est-à-dire à support électrique, rayons émis par le champ électrique terrestre) ont été dénommés : **rayons spécifiques de**

(1) La polarité, positive ou négative, d'une onde électro-magnétique, résulte du sens relatif de ses vibrations magnétiques par rapport à ses vibrations électriques.

l'électricité. On les rencontre sur une pile de poche, ou sur les fils détorsadés d'un courant électrique.

Le réglage sur cette onde ES peut se faire, soit expérimentalement, c'est-à-dire par tâtonnement, par raccourcissement ou augmentation du fil de suspension du pendule, sur la verticale et au-dessus du centre d'une pile de poche, même usagée, tenue debout, ou encore sur une ampoule électrique allumée, soit aussi, automatiquement, sur l'électricité en utilisant les réglages millimétriques automatiques du Tableau des réglages, pages 96 à 99.

Les rayons **verticaux** sont à support électrique (ES). Le **rayon d'union** comporte un double champ ES.

2° Une charge magnétique, qui peut être positive ou négative, est une source d'émission d'ondes à double polarité : rayons $MS+$, ou rayons $MS-$. Les rayons MS (c'est-à-dire à support magnétique, rayons émis par le champ magnétique terrestre) ont été dénommés : **rayons spécifiques du magnétisme**. On les rencontre principalement aux environs de chacun des deux pôles d'un aimant.

Le réglage sur cette onde MS peut se faire soit expérimentalement, par tâtonnement, vers les extrémités d'un aimant, placé horizontalement, soit encore, automatiquement sur le Magnétisme, suivant le Tableau des réglages millimétriques automatiques, pages 96 à 99.

L'émission peut être verticale, ou à 45° , ou à 135° , ou horizontale. Le **rayon fondamental** est à support magnétique. Le **rayon d'union** comporte un champ MS.

3° Une charge électro-magnétique, qui peut être positive ou négative, est une source d'émission d'ondes ES et MS (c'est-à-dire à support électrique et magnétique, rayons émis par le champ électro-magnétique terrestre).

Le réglage peut se faire soit sur l'onde ES, soit sur l'onde MS, d'après les indications du Tableau de réglage millimétrique automatique, pages 96 à 99.

Les rayons à 45° et 135° sont à support électro-magnétique.

4° Un champ magnétique négatif, est une source d'émission d'ondes à support ω et $\omega-$. Les rayons ω sont des ondes très pénétrantes, qui s'échappent des parties extrêmes de tous les corps, et, en particulier, des **pointes**, ou, dans une direction horizontale, de tous les points de la ligne de contour apparent horizontal des corps. Les rayons $\omega-$, d'une intensité beaucoup plus faible, paraissent accompagner les rayons ω , au moins dans l'émission des pointes et dans le rayonnement horizontal.

Pour régler expérimentalement sur les rayons ω , régler sur l'extrémité d'une pointe fine, fixée verticalement. On peut encore utiliser, tant pour les rayons ω que pour les rayons $\omega-$, les réglages millimétriques automatiques indiqués au Tableau pages 96 à 99.

Les rayons ω accompagnant, en particulier, les **rayons nerveux digitaux et visuels**, ainsi que le **rayon mental**, constituent véritablement l'agent mécanique actif de la **perception à distance**.

5° Un champ magnétique positif, est une source d'émission d'ondes à support ω et $\omega+$, émises dans les mêmes conditions.

Mêmes réglages et mêmes considérations que le 4° précédent.

6° Un champ électrique négatif, est une source d'émission à support $\psi-$, γ et ζ .

Réglages millimétriques automatiques, page 98.

La perception de ces ondes est nécessaire dans la recherche ou la suppression des **ondes telluriques nocives**.

7° Un champ électrique positif, est une source d'émission d'ondes à support $\psi+$, ε et σ .

Réglages millimétriques automatiques, page 98.

La perception de l'onde $\psi+$ est nécessaire dans la recherche et la suppression des **ondes telluriques nocives**.

b) Pour ce qui concerne les substances :

8° Un corps radio-actif, est une source d'émission d'ondes à support RS, $\psi+$, γ , ζ . Les rayons RS ont été

dénommés : **rayons spécifiques de la radio-activité**. Ces rayons RS, toujours positifs, font partie du groupe des rayons γ des physiciens. Ils doivent être une expression de l'énergie de la vibration cellulaire, car on les trouve sur tous les êtres vivants.

Réglages millimétriques automatiques, pages 98 et 99.

La perception de ces diverses ondes est nécessaire dans la recherche des **ondes telluriques nocives**.

9° Un corps, une substance ou un objet matériel, est une source d'émission d'ondes électro-magnétiques **spécifiques** des corps simples, dont il est composé.

Le réglage se fait sur « témoin », expérimentalement ; ou, pour certains corps simples les plus usuels, en se référant au Tableau de réglage millimétrique automatique.

La perception de ces ondes est nécessaire dans la recherche d'**objets cachés, perdus, gisements divers, sources**, traces infinitésimales de substances dans les analyses, fraudes dans les produits alimentaires et industriels, etc..., par les rayons verticaux, ou par les rayons à 45° ou 135°.

10° Un objet de forme déterminée, est une source d'émission d'onde électro-magnétique particulière, dite « **onde de forme** », spéciale pour chaque forme géométrique : sphère, cube, cercle, spirale, etc...

Le réglage se fait expérimentalement sur la forme en question.

Certaines formes peuvent servir à la formation d'**ondes nocives**, d'autres à leur élimination.

11° Un être vivant, (homme, animaux, végétaux), est une source d'émission de nombreuses ondes électro-magnétiques.

Réglage particulier sur les ondes : sympathique, personnelle, humaine, vitale, d'espèce, etc..., indiqué au Tableau spécial des réglages millimétriques automatiques, page 171.

Recherche des **maladies** et des **remèdes** appropriés. Recherche des criminels, des **disparus**, sur photo, écriture, témoins. Vie ou mort d'un être vivant, etc...

Notons, en passant, qu'un même espace peut émettre une ou plusieurs sources différentes d'émission.

Nous insistons sur les avantages que l'étudiant trouvera pages 96 à 99 aux Tableaux de réglage et d'identification des corps simples et des êtres vivants. Ces réglages sont identiques pour les deux pendules, soit d'étude P.S., soit Révélateur Schumfell, dont la conception a été prévue à cet effet.

Les sources d'émission des radiations corpusculaires :

Les rayons α et β , rayons corpusculaires (atomes d'Hélium et Electrons), ne sont perceptibles pour le radiesthésiste que par l'onde associée (expression de Louis de Broglie), qui les accompagne, rayons spécifiques de l'Hélium pour les premiers, ondes ES— pour les seconds.

Le réglage du pendule se fera donc sur l'Hélium pour la perception des rayons α , et sur les ondes ES pour les rayons β . Se reporter aux réglages millimétriques automatiques, pages 97 et 98.

Les corps radio-actifs émettent des rayons corpusculaires α et β , entre autres. Les rayons α émis par une substance, s'échappent dans le plan fondamental de cette substance, et les rayons β dans un plan vertical perpendiculaire à la direction de ce plan.

Le rayonnement d'un corps : Si l'on examine un corps soumis à l'action des deux champs terrestres électrique et magnétique (Fig. 33), on constate que leurs effets donnent lieu à la formation de champs spéciaux, exportant des ondes dans des directions diverses fixes.

Pour la clarté, plaçons l'urne de la figure 33 sur une table bien horizontale. Cet objet est de forme simple. Si de bas en haut nous promenons notre pendule ou une pointe-antenne dans le plan vertical, puis dans le plan horizontal, en passant par le plan à 45°, la réaction du pendule nous signalera les rayons divers émis : verticaux, à 45°, horizontaux, etc..., avec leurs supports divers.

Les rayons à 45° et à 135° sont à la fois à support électrique et magnétique.

L'émission normale et ses deux anomalies : Notons, dès à présent, que tous les corps obéissent aux lois de l'émission normale. Leurs rayons verticaux, dirigés vers le ciel, sont sous l'influence du champ électrique terrestre, à support électrique négatif ; ceux dirigés vers la terre sont à support électrique positif.

Cependant, deux corps simples, le fer et le zinc, pour des raisons encore inconnues, présentent des anomalies différentes à l'égard de cette règle. Il conviendra de s'en rappeler dans le choix des métaux destinés aux exercices.

Les rayons verticaux du fer, donc dirigés vers le ciel, sont à support électrique positif.

Le zinc n'émet pas de rayons verticaux vers le ciel, mais seulement des rayons verticaux vers la terre, et ces rayons sont à support électrique positif, comme tous les autres corps.

Pourtant, certaines personnes non averties affirmeront que leur pendule, s'il est réglé et présenté au-dessus d'un morceau de zinc, se met à tourner. Mais, si elles observent avec attention, elles reconnaîtront que c'est sous l'influence du « rayon nerveux visuel » (regard), dont nous nous occuperons ultérieurement, et non sous l'influence du champ électrique terrestre que la giration se produit. Qu'elles cessent de regarder l'objet, et d'y penser, et le pendule s'arrêtera.

De même, mettons le doigt au contact d'un morceau de zinc, ou dirigeons vers lui notre main en antenne, autrement dit agissant par nos « rayons nerveux digitaux » (doigt), et nous constaterons que le pendule réglé sur le zinc tournera ; mais ce ne sera pas sous l'influence du champ électrique terrestre.

DEUXIEME LEÇON

POLARITÉ DES CORPS CORPS POSITIFS — CORPS NÉGATIFS

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 51, 52, 53)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Polarité des corps : Le phénomène de l'électrolyse, en nous apprenant que les molécules de certains corps simples sont attirées par l'électrode positive du dispositif, et celles de certains autres par l'électrode négative, constitue pour nous une première révélation de l'existence du fait de la polarité (positive ou négative) (1), de tous les corps dans la Nature, qu'ils appartiennent au règne animal, végétal ou minéral.

Elle complète celle que nous ont donnée nos maîtres lorsque nous avons balbutié les premières notions de l'électricité et quand ils nous ont appris qu'il existait deux sortes d'électricité, l'une positive, l'autre négative, dont les propriétés physiques sont différentes.

Nous allons définir ici la polarité des corps simples.

Un corps simple est dit **positif** quand les **rayons spécifiques** qu'il émet sont **positifs** ; il est dit **négatif**, au contraire, quand ces mêmes **rayons** sont **négatifs**. Quand on décompose un corps composé par l'électrolyse, le corps négatif est attiré par l'anode ou l'électrode positive, et le corps positif par la cathode ou électrode négative. Les corps positifs ou négatifs se confondent donc avec ceux qui, en chimie, sont désignés sous le nom d'électro-positifs ou électro-négatifs.

(1) Pour le technicien, la polarité, positive ou négative, d'une onde électro-magnétique résulte du sens relatif de ses vibrations magnétiques par rapport à ses vibrations électriques.

C'est en se basant sur le phénomène de l'électrolyse que les radiesthésistes scientifiques avaient donné jusqu'ici aux corps positifs la dénomination d'électro-positifs, et aux corps négatifs, celle d'électro-négatifs. Nous croyons qu'il est préférable de renoncer à une terminologie qui trouble les débutants et leur fait croire dans le rayonnement simple de la matière à un phénomène électrique qui n'existe pas.

Parmi les corps positifs citons : l'Aluminium, l'Argent, le Calcium, le Carbone, le Cuivre, le Fer, l'Hydrogène, le Mercure, l'Or, le Sodium, le Zinc, etc...

Parmi les corps négatifs citons : l'Arsenic, le Bismuth, le Chlore, l'Étain, le Nickel, l'Oxygène, le Plomb, le Phosphore, le Soufre, le Tungstène, etc...

Polarité de la main opératrice : Mais si, dans l'expérience de l'électrolyse, les corps positifs se précipitent sur l'électrode négative, et les corps négatifs sur l'électrode positive, par contre, l'appareil récepteur humain du radiesthésiste réagit d'une façon différente lorsque le pendule, réglé, est présenté sur la verticale de substances soit positives, soit négatives. Car dans une recherche radiesthésique n'intervient pas seulement la polarité de la substance considérée, intervient également la polarité de la main opératrice de l'opérateur, celle qui suspend le pendule.

Loin d'être une source de confusion, cette question se solutionne facilement lorsque l'on prend la peine de l'étudier sommairement.

Nous avons appris précédemment qu'au point de vue électrique, le corps humain est comparable à une pile pour lampe de poche. L'une des moitiés (partage par un plan vertical médium) en est positive, et l'autre négative. Les deux mains jouent le même rôle que les deux lamelles de cuivre qui servent de pôles à la pile électrique.

Habituellement, l'homme est positif du côté droit ; négatif du côté gauche. Il s'ensuit que sa main droite est positive ; sa main gauche négative.

Habituellement, la femme est, au contraire, positive côté

gauche, donc avec main gauche positive ; et négative côté droit, avec main droite négative.

Mais il y a dans l'un ou l'autre sexe des individus dont la polarité est anormalement renversée (5 % environ). On constate parfois aussi que certaines personnes changent une ou plusieurs fois de sens de polarité au cours de leur vie. Il est donc indispensable de connaître parfaitement la polarité de la main tenant habituellement le pendule, et de vérifier cette polarité de temps à autre, pour éviter des erreurs de résultats, ou une fausse interprétation des mouvements du pendule.

Rappelons en passant que la différence de polarité paraît être pour le Professeur Bosset, de l'Université de Lausanne, et pour de nombreux radiesthésistes avertis, une des conditions du bonheur d'un ménage.

Ce principe de la polarité humaine étant établi, nous ferons désormais, par simplification, abstraction du sexe et nous dirons que telle personne possède une **main opératrice positive**, telle autre une **main opératrice négative**, sans considération de sexe. Par main opératrice nous entendons celle qui suspend le pendule.

En conséquence, un pendule tenu par une **main positive** tournera automatiquement dans le sens **positif** au-dessus d'une substance ou d'une radiation **positive**. Il tournera dans le sens négatif sur une substance ou radiation négative.

De même, pour un pendule tenu par une **main négative**, les girations, dans les deux cas, auront lieu dans le sens inverse de celui indiqué précédemment.

Ce sera donc toujours la polarité de la **main opératrice**, sans considération de sexe, qui décidera du sens de giration sur une substance, ou positive ou négative.

Détermination de la polarité de la main qui suspend le pendule : Il s'ensuit que pour connaître la polarité de sa main opératrice, ce qui est de la plus grande importance pour la compréhension de ce cours et l'interprétation exacte des mouvements du pendule, le débutant, après avoir réglé son pendule sur le cuivre, par exemple, corps positif, expérimentera le sens de giration de son pendule

sur ce corps. S'il tourne positif, sa main sera positive ; s'il tourne négatif, sa main sera négative. A divers moments, il contrôlera cette expérience en la renouvelant. Il la contrôlera également sur divers corps, au hasard, dont il vérifiera la polarité obtenue d'après le Tableau des réglages et identifications, pages 96 et 97.

Il pourra encore vérifier la polarité positive de sa main opératrice de la façon suivante : si le pendule suspendu par cette main tourne négatif dans le creux de sa main gauche libre. Si, au contraire, le pendule tourne positif dans le creux de sa main gauche libre, c'est que sa main droite opératrice est négative.

Polarité de l'onde de support : Un pendule réglé sur les rayons spécifiques d'une substance tourne dans le sens indiqué ci-dessus, quelle que soit la polarité de l'onde de support qui transporte ses rayons spécifiques ; en effet, cette onde de support a elle-même sa polarité ou positive ou négative, suivant les cas.

Si, notre pendule étant réglé sur le rayon spécifique d'un corps, nous plaçons notre index libre gauche, d'abord au-dessus, puis ensuite au-dessous de ce corps, notre pendule tournera toujours dans le même sens, malgré la polarité différente du support.

Si, au lieu de régler notre pendule sur le rayon spécifique du corps, nous le réglons sur l'électricité (Rayons ES), il n'en sera plus de même. Tenu par une main positive, il tournera en sens inverse des aiguilles d'une montre au-dessus du corps, et en sens direct, positif, au-dessous. (Fig. 36).




Fig. 36

Réglage sur une onde à support électrique d'un corps positif.

La raison en est que les rayons verticaux, dirigés vers le ciel, de tous les corps, sont à support électrique négatif, alors que ceux dirigés vers la terre sont à support électrique positif.

Pour conclure, un corps

positif est un corps dont les rayons spécifiques sont positifs. Un corps négatif, un corps dont les rayons spécifiques sont négatifs. Dans le phénomène de l'électrolyse, les corps électro-positifs ne sont autres que les corps positifs, et les corps électro-négatifs les corps négatifs.

On trouvera à la page 50 de « Radiesthésie Méthode Physique », l'explication du phénomène de la polarité des ondes électro-magnétiques sur laquelle nous ne reviendrons pas.

Nous donnons ci-après, cependant, les moyens, très intéressants, de contrôler l'exactitude de cette polarité.

Contrôle de la polarité d'un corps : Normalement, un pendule accordé sur une onde positive doit, à la réception de cette onde, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ; au contraire, réglé sur une onde négative, il doit tourner en sens inverse. Il arrive parfois que chez certaines personnes, le réflexe est mal accentué et que le pendule tourne indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Il y a là matière à perfectionnement par un entraînement calme et régulier de courte durée durant une ou deux semaines. Parfois, la correction est facilitée en tenant le pendule réglé, non pas entre le pouce et l'index, mais entre le pouce et le majeur. En tout cas, dans les circonstances les plus désavantageuses, l'essentiel, au début, c'est que le pendule tourne, oscille ou s'arrête lorsqu'il convient ; la polarité se précisera par la suite avec un peu d'entraînement.

Mais il est parfois nécessaire de déterminer exactement, avec un contrôle sérieux, la polarité d'un corps ou d'une radiation. On y parvient à l'aide d'un « témoin de polarité ». Il faut se rappeler d'abord que seuls des réglages précis permettent d'obtenir une giration normale, c'est-à-dire dans le sens exact de la polarité de l'onde reçue. Le pendule étant réglé sur un corps positif, par exemple (argent ou cuivre), on touche avec le majeur de la main gauche le pôle positif d'une pile de poche, même usagée (pour les piles de fabrication française, généralement la lame la plus courte), et le pendule doit continuer à tourner positif. Si, au contraire, on touche le pôle négatif de cette pile, il se met à osciller.

Il en serait de même si l'on mettait le majeur de la main gauche au contact successif des pôles d'un aimant (la branche marquée N ou — étant positive).

Les réactions du pendule, après l'intervention du « témoin de polarité », redeviennent normales et sont bien indicatrices de la polarité de l'onde étudiée.

La polarité des corps les plus usuels : Parmi les corps simples positifs, nous citerons : l'aluminium, l'argent, l'azote, le baryum, le bore, le calcium, le carbone, le potassium, le chrome, le cuivre, le fer, l'hydrogène, le magnésium, le platine, le radium, le sodium, le zinc, l'or, le mercure.

Parmi les corps composés : l'eau (Polarité négative).

Parmi les corps complexes : l'air.

Parmi les corps simples négatifs : l'antimoine, l'arsenic, le bismuth, le brome, le chlore, le cobalt, l'étain, le fluor, l'iode, le manganèse, le nickel, le phosphore, le plomb, le soufre, le tellure, l'uranium.

Il est entendu désormais que les modalités décrites dans la suite de ce cours s'appliquent à une main positive, c'est-à-dire à environ 95 % du cas des hommes. Il appartiendra par suite à un opérateur homme ayant une main négative, ou à environ 95 % des dames, d'inverser tous les mouvements décrits ci-après dans ce manuel.

Polarité de l'électricité et du magnétisme : la réaction du Pendule n'est pas différente, comme on l'a supposé antérieurement, suivant que cette réaction est provoquée par les corps, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'une part ; ou que cette réaction soit provoquée par les radiations de l'électricité ou du magnétisme d'autre part.

En conséquence, nous constaterons que sur le pôle positif d'une pile de poche électrique (en principe la lame la plus courte), le pendule effectue une **giration positive** (comme il le ferait sur les corps positifs). Il tournera négatif sur le pôle négatif (longue lame). Se méfier des fabrications de piles


étrangères dont les polarités sont parfois différentes de celles de fabrication française. Remarquons que, sur le centre d'une pile placée debout, la pendule oscille entre les deux pôles.

La même remarque est à faire sur un aimant (magnétisme), qu'il soit en fer à cheval ou droit. Le pendule tourne positivement ou négativement suivant les pôles. Remarquons aussi que, sur le centre de l'aimant droit, ou dans le centre de l'aimant en fer à cheval, le pendule oscille.

Ces observations se confirment lorsque, ayant dirigé notre index de main libre, vers un nuage, par exemple, nous constaterons que le pendule tourne positif, lorsque le nuage est chargé d'électricité positive, et tourne négatif, lorsqu'il est chargé d'électricité négative.

Enfin, pour éviter toute hésitation au débutant, nous précisons que, lorsque, dans les exercices qui suivent, il aura à régler son pendule sur l'électricité (sur une pile de poche), il le présentera entre les deux pôles de la pile debout : l'oscillation maximum indiquera le réglage parfait. Pour le réglage sur le magnétisme (sur un aimant en fer à cheval), le pendule sera présenté dans le cintre ; et dans le cas d'un aimant droit, il sera présenté sur le centre : dans ces deux derniers cas, l'oscillation maximum indiquera un réglage parfait.

Le réglage sur l'électricité ou sur le magnétisme pourra



aussi bien se faire respectivement sur les pôles (extrémités) d'une pile de poche, ou d'un aimant droit ou en fer à cheval, mais alors le pendule se manifestera par des oscillations, qui, suivant le pôle, seront positives ou négatives.

Exercices :

8. Régler le pendule sur plusieurs des corps cités ci-dessus et constater qu'il tourne bien dans le sens précisé plus haut.

9. Dans le cas où il en serait autrement, faire appel au témoin de polarité (pile de poche usagée ou aimant ; voir « **Radiesthésie Méthode Physique** », page 50).

Renouveler l'exercice aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour que le pendule tourne automatiquement dans le sens normal.

S'imposer, quelle que soit la polarité du corps observé, de prendre toujours des réglages expérimentaux très précis.

TROISIEME LEÇON

GIRATION DU PENDULE PAR L'INTERVENTION DE LA MAIN LIBRE EN ANTENNE OU EN CONTACT DU CORPS

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 54 et 55)

A. — DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Index en antenne : Si on dirige l'index de la main libre (celle qui ne suspend pas le pendule) vers un objet, ainsi que l'indique la figure 37, le pendule réglé préalablement sur cet objet, mais écarté de cet objet, se met à tourner.

Que se passe-t-il ?




Fig. 37

Le rayon nerveux, dont la portée est pratiquement illimitée, sort de l'index et va frapper l'objet. Puis, en retour, il transporte vers l'opérateur, en lui servant de support, le rayon ES ou MS qui sert de véhicule aux rayons spécifiques de l'objet. Il ramène, par conséquent, ces derniers rayons à l'opérateur.

Le récepteur humain se trouve, ainsi, actionné instantanément. L'expérience prouve, en effet, qu'une onde EM peut parfaitement servir de support à une autre onde EM qui se propage en sens inverse par la même voie de l'index libre.

La portée du rayon nerveux étant illimitée, il devient, dès lors, possible d'identifier la nature d'un objet situé à une distance considérable.

Exercices :

10. Le débutant s'exercera à régler chaque fois, expérimentalement, son pendule, par le rayon nerveux de son index libre, sur de nombreux objets situés d'abord à petite distance, puis à distance de plus en plus grande, enfin à très grande distance. Toutefois, il ne cherchera à identifier la nature d'un objet très éloigné que lorsqu'il possédera bien toute la substance du présent cours.

11. Il s'exercera d'abord à des exercices plus à sa portée de débutant, dont celui-ci : Il réglera son pendule sur la verticale d'un corps quelconque (pièce de monnaie d'argent, par exemple, qui est un corps positif). Puis, au lieu de continuer de présenter son pendule sur cette verticale, il présentera à sa place, sur cette verticale, l'index gauche en antenne. Constaté que le pendule réglé pour ce corps et tenu de la main droite, loin de ce corps, mais à hauteur de l'index gauche, tourne comme s'il était présenté sur la verticale de ce corps.

12. Identifier, après réglage sur l'électricité, la polarité, positive ou négative, dont un nuage est chargé, en évitant, cependant, de faire cette expérience en temps d'orage.

13. S'habituer à régler expérimentalement le pendule en prenant la position précédente, c'est-à-dire en recher-

chant le point de réglage précis, par tâtonnements, le pendule demeurant écarté du corps étudié, l'index gauche toujours en antenne.

Recouvrir cette pièce de monnaie d'argent de différentes substances : papier, cuir, bois, carton, porcelaine, feuille de zinc, de cuivre, papier d'aluminium, soie, caoutchouc, laine, tissus divers, etc... Constater la perméabilité ou non perméabilité de ces diverses substances aux rayons verticaux. Constater que ces rayons étant à support électrique, les isolants de l'électricité ne les laissent pas passer.

14. Le précédent exercice étant terminé, il sera possible de contrôler s'il a été réussi, en se rappelant que les véritables isolants électriques sont le verre, la porcelaine, l'ardoise, le papier sec, le carton sec, la soie naturelle, le caoutchouc, etc... Quant aux mauvais conducteurs de l'électricité, ce sont le bois (non verni), le carbone, la faïence, le coton, la soie artificielle, le marbre, etc...

Dans la précédente opération, il convient de demeurer physiquement et mentalement neutre. Ne jamais regarder l'objet étudié, ni regarder le pendule, afin d'empêcher que celui-ci tourne sous l'action des rayons spécifiques exportés par le **rayon visuel**, qui se produit dans les mêmes conditions que le **rayon d'antenne**. Ce rayon visuel, que nous étudierons plus tard, est provoqué par la rencontre des rayons d'un corps avec les rayons nerveux qui partent de chacun des deux yeux de l'opérateur.

15. Au besoin, fermer les yeux et faire recouvrir (par un tiers qui se mettra lui-même en état de parfaite neutralité) la pièce de monnaie par les écrans isolants électriques précités, en demandant à ce tiers de noter ses constatations successives. En effet, la perception dans cet exercice doit uniquement être effectuée avec le doigt en antenne.

B. — DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Index en contact: Il va sans dire que si nous rapprochons de plus en plus l'index en antenne de l'objet, jusqu'à ce qu'il se trouve presque en contact avec lui, le pendule, réglé

sur cet objet, tournera, mais à une condition, cependant, c'est qu'il soit tenu éloigné de l'objet. (Fig. 38).

Mettons, en effet, le pendule, réglé, sur la verticale de l'objet, il tournera. Le laissant dans cette position, touchons avec l'index de la main libre la partie supérieure de l'objet, c'est-à-dire toujours sur les rayons verticaux, l'instrument s'arrêtera.




Fig. 38

La raison de ce fait est très simple :

Captés par le pendule (tenu d'une part, par exemple, par la main positive), arrivent, aux centres nerveux de l'opérateur, les rayons spécifiques à support ES— de l'objet. Par la main libre, d'autre part, arriveront des rayons identiques. Ces deux trains d'ondes se propageant en sens inverse, mais de même nature, puisqu'émanant tous deux des rayons verticaux, se rencontreront dans le corps de l'opérateur et y produiront une interférence. Dès lors, ses centres nerveux n'étant plus impressionnés, le réflexe s'éteindra et le pendule s'arrêtera.

Par contre, supposons que l'expérience se fasse sur le cylindre représenté par la figure 39. Si, au lieu de placer l'index en *a*, au milieu de la nappe de rayons spécifiques **verticaux** (sur lesquels est suspendu le pendule), nous plaçons cet index en *b*, point d'émission de rayons spécifiques à 45° à support MS, la rencontre de deux ondes se propageant en sens inverse, mais de nature différente (rayons verticaux d'une part, rayon à 45° à support MS d'autre part), ne produira aucune interférence et le pendule continuera à tourner.

Exercices :

16. Le débutant s'exercera aussi un grand nombre de fois au réglage expérimental, l'index de la main libre étant en contact avec la partie supérieure de l'objet étudié, c'est-à-dire avec les rayons verticaux, mais en ayant soin, contrai-




Fig. 39

C = ligne de contour apparent horizontal du corps

rement aux exercices précédents, de tenir son pendule en dehors de la nappe verticale de cet objet. Dans ce cas, le pendule tournera.

17. Il constatera que si, tout en conservant le contact, il place son pendule sur la verticale de l'objet, l'instrument s'arrêtera.

18. Il tournera si l'index, au lieu d'être placé sur la verticale de l'objet, est mis en contact avec la zone d'émission des rayons à 45° , le pendule demeurant éloigné de l'objet.

QUATRIEME LEÇON

GIRATION DU PENDULE PAR L'INTERVENTION DU RAYON VISUEL

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 55 et 56)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Le rayon qui sort de chacun de nos yeux, est un **rayon nerveux** absolument identique à celui qui s'échappe de nos doigts. Antérieurement appelé rayon capital, nous lui avons choisi la dénomination **rayon visuel**, pour éviter tout malentendu, comme il sera expliqué plus loin.




Fig. 40

Rayon nerveux visuel

Si nous tenons dans la main positive, par exemple, un pendule, réglé préalablement sur un objet, mais éloigné de cet objet, et que nous regardions attentivement cet objet, le pendule se mettra à tourner par un mécanisme identique à celui que détermine l'action du rayon nerveux digital de la leçon précédente. Le rayon nerveux visuel rencontrera l'objet expérimenté et en ramènera vers le cerveau de l'opérateur les rayons ES, MS ou RS suivant les cas qui servent de support à ses rayons spécifiques, et le pendule tournera. (Fig. 40).

Recouvrons un objet d'un verre à boire transparent, renversé, et présentons au-dessus du verre, et sans le regarder,




Fig. 41

un pendule préalablement réglé sur cet objet. Le verre étant un isolant électrique, les rayons spécifiques verticaux à support ES— ne passeront pas et le pendule restera immobile. Regardons l'objet, le rayon nerveux visuel, traversant le verre, l'instrument se mettra à tourner. (Fig. 41).

Au lieu de placer l'objet dans une cage transparente, plaçons-le dans une boîte de carton opaque. Les rayons verticaux étant arrêtés par le carton, isolant électrique, le pendule réglé sur l'objet et placé au-dessus de la boîte ne tournera pas.

Promenons notre regard sur la boîte et essayons de le faire pénétrer dans l'intérieur, invisible pour nous, de cette boîte. Au moment où le rayon nerveux partant de notre œil rencontrera l'objet, le pendule tournera. Notre regard agit donc non point par un phénomène de visibilité, mais uniquement par le rayon nerveux qu'il dirige.

Le rayon nerveux visuel peut servir à découvrir des objets cachés et à identifier la nature d'objets très éloignés, car sa portée paraît, pratiquement, illimitée.

Procéder de même en remplaçant la boîte de carton opaque par un récipient en porcelaine : Constatons que le pendule, réglé, suspendu au-dessus du récipient en porcelaine opaque ne tourne pas, les rayons verticaux étant arrêtés par

la porcelaine, isolant électrique également, et que le rayon visuel, n'arrivant pas à traverser la porcelaine, donc à joindre l'objet recouvert, n'arrivera pas à faire tourner le pendule.

Exercices :

19. Régler le pendule sur un objet d'une substance déterminée et constater qu'il tourne si nous regardons un objet de même substance éloigné de nous et de notre pendule.

20. Faire l'expérience sur un objet de cuivre, de nickel, d'argent, d'aluminium.

21. S'exercer à régler le pendule à l'aide du rayon visuel en regardant des objets de substance différente, vérifier que le réglage est bon en plaçant le pendule ainsi réglé sur la verticale de ces objets.

22. Pour l'étude d'objets éloignés, on peut se servir d'une jumelle ou d'une longue-vue tenue dans la main libre.

CINQUIEME LEÇON

GIRATION DU PENDULE PAR L'INTERVENTION DU RAYON MENTAL

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », page 57)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Ainsi que nous le verrons plus loin, au chapitre V, le **rayon mental** est une onde électro-magnétique complètement différente du rayon nerveux visuel.

Quand nous pensons à un objet concret, notre pensée, par un mécanisme qui nous échappera toujours, provoque un mouvement du cerveau, et ce mouvement déclenche une onde électro-magnétique qui n'est autre que le **rayon mental**.

Dès qu'il rencontre l'objet, ce rayon, servant de support aux rayons spécifiques que cet objet émet, les amène aux centres nerveux humains, et, si l'opérateur tient à la main un pendule réglé sur la substance de l'objet, ce pendule se met à tourner, sans qu'il soit au-dessus de cet objet.

Le rayon mental, étant une onde magnétique comme les autres, peut être arrêté par des écrans appropriés ; parmi ces écrans, citons la porcelaine.

Plaçons sur une table une pièce d'argent ; réglons notre pendule sur l'argent et avec notre pendule, tournons le dos à la table. Si nous pensons à cette pièce d'argent, notre pendule, éloigné d'elle, se mettra à tourner. Tout en continuant à penser à cette pièce, tournons le dos à la table et deman-

dons à un aide de la recouvrir d'une assiette de porcelaine, la giration de l'instrument s'arrêtera au bout de deux ou trois secondes.

La longueur du rayon mental étant illimitée, donne à l'homme pour ses recherches, d'immenses possibilités, et constitue pour celui qui sait l'utiliser, un avantage incalculable dont bien peu de personnes se doutent.

Réglage mental : Comme nous venons de l'exposer, si nous pensons à un objet de cuivre, par exemple, notre rayon mental va à la rencontre de cet objet et ramène au récepteur humain des rayons spécifiques de cuivre. Dès lors, il va devenir possible de régler notre pendule sur le cuivre et ce sera le **réglage mental**.

Tenons, dans la main positive, par exemple, un pendule, éloigné de tout objet en cuivre, mais pensons au cuivre, et en faisant rouler entre nos doigts le bâtonnet de l'instrument, allongeons ou raccourcissons le fil suspenseur. Il viendra un moment où le pendule commencera à se mettre en mouvement. Perfectionnons la longueur du fil jusqu'à ce que la giration se fasse suivant un cercle bien régulier et que sa vitesse soit maxima. A ce moment, nous aurons réalisé un **réglage mental**, ce dont nous pourrons nous rendre compte en présentant notre pendule ainsi réglé au-dessus d'un objet en cuivre et en constatant sa giration.

Le réglage mental, quand il est fait avec tout le soin nécessaire, est, généralement, très précis.

Sous la même dénomination de **rayon capital**, l'abbé Mermet qui ne possédait pas les moyens dont on dispose aujourd'hui pour identifier et distinguer entre elles les ondes électro-magnétiques, a confondu le **rayon visuel** et le **rayon mental** qui, évidemment, sortent tous les deux de la tête de l'observateur.

Pour éviter ce quiproquo, nous renonçons définitivement dans cet ouvrage à l'expression de **rayon capital** par laquelle nous avons distingué jusqu'ici le **rayon visuel**. Nous désignons donc ce rayon par la dénomination qui lui convient et qui ne peut donner lieu à aucun malentendu.

Exercices .:

23. Régler le pendule au-dessus d'un objet en argent. Avec le pendule, tourner le dos à cet objet et y penser. Constater, si le réglage a été bien pris, que le pendule se met à tourner chaque fois que l'on pense à cet objet et, qu'au contraire, sa giration s'arrête chaque fois que l'on cesse d'y penser.

24. Recommencer un grand nombre de fois l'expérience avec des objets de substances très différentes.

25. Plaçons, ou plutôt faisons placer par un tiers (non hostile à la radiesthésie) et sans qu'il nous prévienne du moment, sur une pièce de monnaie, un écran de verre, de papier, de carton ou de soie, etc... Cet écran sera sans effet sur le phénomène : le pendule réglé sur le métal de la pièce de monnaie, bien réglé, continuera de tourner.

26. Mais, faisons placer la pièce de monnaie sous une assiette de porcelaine, nous aurons beau y penser, le pendule ne tournera pas. Si nous prolongeons même l'expérience, nous ressentirons bientôt un mal de tête, déterminé par la réflexion prolongée du rayon mental, qui n'aura pu parvenir à son objectif. Ne pas confondre avec la faïence qui laisse passer le rayon mental.

27. S'exercer au réglage mental sur de nombreuses substances et constater, chaque fois, que le réglage a été bien pris, en présentant ensuite l'instrument sur une substance identique et en constatant sa parfaite giration.

Sélectionnement des ondes : Les exercices qui précèdent nous ont également appris en désignant mentalement dans notre esprit un corps quelconque, parmi tant d'autres, à sélectionner les ondes par réglage mental précis du pendule sur les ondes spécifiques du corps étudié. Nous rappellerons toutefois, qu'en méthode physique, la sélection se fait par l'adjonction au pendule, d'un « témoin » (dont il sera question page 118) : ainsi le pendule ne réagit plus qu'en présence d'un corps identique à ce témoin.

Toutefois, il y a lieu d'attacher une grande importance à savoir, avec précision ce que l'on cherche, avec ou sans témoin. Si par exemple, ayant une main positive, nous avons pensé que la pièce d'argent sur laquelle nous réglons expérimentalement, est un alliage de divers métaux où l'argent prédomine cependant, cette pièce se présentera sous le pendule comme argent impur, et le pendule tournera négatif. Il ne faut donc bien envisager dans cette pièce que l'argent pur qu'elle contient, en réglant sur argent pur, et le pendule tournera positif.

La même grande attention doit être apportée dans la désignation du témoin dont il faut bien connaître la composition pour éviter toute erreur d'interprétation du mouvement exact du pendule.


SIXIÈME LEÇON

LE TRAVAIL DE LA POINTE-ANTENNE LA RÉFLEXION — LA RÉFRACTION

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique »,
pages, 29, 30, 31, 77 et 78)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Travail à la pointe-antenne : Les exercices proposés consistent à recueillir sur un écran la trace des limites du



Délimitation de rayons verticaux ascendants.
Tenue verticale de la pointe-antenne.

contour d'un faisceau ou d'un champ, à l'aide de la pointe-antenne.

Cas des rayons **verticaux ascendants**, venant frapper l'écran : lorsqu'on opère, comme dans le cas de la Fig. 42 sur un faisceau de rayons verticaux, à support électrique, venant donc de bas en haut, il faut prohiber l'emploi de la feuille de papier pour recueillir les limites de la zone d'émission de l'objet étudié qui se trouve en dessous. Le papier étant un isolant électrique, ne se laisserait pas traverser. Mais employer une feuille de zinc, ou encore opérer en plaçant l'objet sous le bois de la table (celle-ci faisant office d'écran), soit sous le marbre de la table, sous une planchette en bois ou une plaque métallique posée sur cette table d'exercice. Ces différentes substances serviront d'écran pour recevoir la trace du contour du faisceau ou du champ, parce que ces substances sont bonnes ou mauvaises conductrices de l'électricité, mais non isolantes.

Cas des rayons **verticaux descendants** venant frapper l'écran : si l'objet est, au contraire, au-dessus de la table d'exercice, par exemple à un étage supérieur, nous pourrions parfaitement tracer, à l'étage inférieur, sa projection horizontale descendante sur la surface supérieure d'une feuille de papier blanc placée sur la table. Le papier, isolant électrique, ne se laissera pas traverser par le faisceau ; il sera facile de recueillir la trace du contour de ce faisceau venant d'en haut. Cette projection sera seulement quelque peu déplacée et, sans doute, aussi légèrement déformée par suite de la réfraction de la nappe descendante à travers le plancher.

Emploi de la pointe-antenne : Pour tracer avec précision les limites d'une zone de perception, prolongeons notre main libre gauche par une tige de cuivre ou d'acier, à pointe fine (une ancienne épingle à chapeau de dame, par exemple), ou même par un simple crayon finement taillé, faisant office de « pointe-antenne neutre ». Toujours tenir cette pointe très verticalement.

Pour bien opérer à la pointe-antenne, il est indispensable que le pendule soit tenu en dehors de la surface sur laquelle se promène cette pointe, et autant que possible à son niveau.

L'œil de l'opérateur doit toujours éviter de regarder le pendule, mais il doit en surveiller les mouvements de côté, à la dérobée. Le regard devra, au contraire, fixer l'extrémité de la pointe-antenne qui, tenue verticalement, doit être en contact avec la surface de l'écran.

Chaque fois que la pointe-antenne se trouvera à l'intérieur du tracé et en contact avec l'écran, le pendule, réglé sur l'objet étudié, tournera. Quand elle en sortira, il oscillera.

Le choix de préférence d'une feuille de papier blanc neuve comme écran, et d'un crayon bien appointé comme pointe-antenne, déplacée avec une grande lenteur, permet de marquer le tracé par une succession de petits points de la mine du crayon sur le papier.

Exercices :

28. Déterminer le contour d'un objet quelconque placé sous une feuille de zinc, puis sous le dessus d'une table de bois, d'une table de marbre, d'une planchette de bois placée sur la table, d'une plaque métallique placée sur cette table.

29. Employer dans les mêmes conditions une feuille de papier sec (isolant électrique) et constater l'impossibilité de la perception.

30. Humidifier cette feuille de papier et constater la perception.

31. Déterminer le contour d'un objet quelconque placé au plafond de la salle d'expérience (suspension métallique, ou en cristal, par exemple), ou placé à l'étage supérieur, sur une feuille de papier placée sur une table de travail. Constater la déformation pour cause de réfraction.

32. Réflexion : Placer une pièce de monnaie de cuivre dans une petite boîte de carton rectangulaire dont on maintiendra le couvercle (débarrassé de son retour avant), incliné à 30° , comme le présente la Figure 43 suivante :

Recueillons devant la boîte, sur une feuille de papier blanc sec formant écran, la trace de la nappe verticale réfléchie




Fig. 43

Réflexion d'une pièce de monnaie
sur un écran papier

par le couvercle. Celui-ci n'étant généralement pas parfaitement plan, mais plus ou moins convexe ou concave, on obtiendra une image allongée ou raccourcie et déformée de la pièce de monnaie.

33. Pour arrêter les rayons à 45° , réfléchis sur le couvercle de la boîte, disposer horizontalement sur la boîte ouverte une plaque de fer (Fig. 43 bis).




Fig. 43 bis

Arrêt de cette réflexion
par une plaque de fer

34. Réfraction : Plaçons sur un escabeau disposé au-dessous de la table (de bois ou de marbre) sur laquelle nous travaillons, un objet quelconque, en cuivre par exemple. Nous recueillerons sur la surface de bois ou de marbre de cette table, la trace de la nappe verticale qui affectera la forme de la projection de l'objet sur un plan horizontal, et celle du faisceau à 45° légèrement réfracté par l'épaisseur de la table.

35. Au-dessus de l'objet, disposer deux ou trois carreaux de ciment inclinés à 30° ou 40° . Constater que les deux images se sont déplacées et ont été légèrement déformées par la réfraction.

SEPTIEME LEÇON

RÉGLAGE DU PENDULE NEUTRE SPHÉRIQUE DE PRÉCISION

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique »,
pages 27, 28 et 29)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Le réglage de tout pendule, quel qu'il soit (neutre ou actif) repose sur cette propriété très curieuse du récepteur humain, que la longueur de fil d'un pendule ajusté est proportionnelle à la longueur d'onde de la radiation à capter, et cela pour tous les opérateurs.

Le récepteur humain est donc comparable à un récepteur de T.S.F. et sa sensibilité dans un cas déterminé dépend, comme la clarté de l'audition, de la précision de l'ajustage.

Suivant M. Voillaume, « par l'usage constant d'un réglage précis on développe sa propre sensibilité analytique et on arrive très vite à ne plus ressentir une onde si le pendule se dérègle dans une proportion de plus en plus faible. C'est à cette condition que l'on arrive à discriminer les ondes les unes des autres et à les identifier d'une manière précise. »

Comme certaines personnes exigent des preuves, nous décrivons ci-après à leur intention la série des expériences par lesquelles M. l'Ingénieur Voillaume est arrivé à cette conclusion.

Ayant réglé son pendule sur des morceaux de carton des couleurs suivantes : bleu, vert, jaune, rouge, il constata que les longueurs du fil suspenseur se trouvaient presque proportionnelles aux longueurs d'onde de ces couleurs.

Il construisit alors un pendule très précis (bâtonnet très mince, terminé par une pointe très fine). Sur une ligne droite, en partant d'une origine, il porta, après un nouveau réglage, les longueurs de pendule (Fig. 44), obtenues en O.B. pour le bleu, O.V. pour le vert, O.J. pour le jaune, O.R. pour le rouge. Fixant à ces divers points la longueur d'onde moyenne de ces couleurs donnée par l'Annuaire du Bureau des Longitudes, il gradua les intervalles en centièmes de μ (microns).




Fig. 44

Longueur d'onde du pendule
en centièmes de microns sur
les couleurs

Sachant que la longueur d'onde moyenne du violet est $0\mu 41$, il mesura sur l'échelle une longueur de pendule correspondant à la graduation 0,41 et le pendule tourna immédiatement en donnant la série du violet (voir § 6, Séries). Même succès pour l'indigo 0,44 et l'orangé 0,60.

Pour serrer la question de plus près, M. Voillaume voulut opérer non plus sur les couleurs, qui constituent un élément insuffisamment précis, mais sur les

raies du spectre fournies par les corps simples à l'état gazeux. Il chercha la longueur d'onde de ces radiations dans les tableaux de spectroscopie qui en donnent la valeur, et en porta les chiffres sur une épure, en commençant par la raie D du sodium ($0\mu 589$).

Il constata qu'en présentant son pendule arrêté à cette longueur au-dessus d'un sel de sodium, ce pendule tournait vivement en donnant la série du sodium.

Ayant répété son expérience une troisième fois et dans des conditions encore plus précises, il trouva une nouvelle confirmation de toutes ses conclusions précédentes et put formuler cette loi :

Il existe une relation simple entre les longueurs de fil de pendule correspondant à des réglages très précis sur un corps ou une radiation et les longueurs d'onde de ce corps ou de cette radiation telles qu'elles se présentent sur l'échelle d'un spectroscope. Cette relation, qui est du premier degré, est celle de la proportionnalité.

Cette découverte incita M. Voillaume à supposer que, dans l'art du sourcier, on se trouvait en présence de phénomènes ayant nettement pour base les mouvements ondulatoires des radiations des corps et qu'il convenait, en conséquence, de poursuivre la vérification de cette hypothèse, laquelle conduirait vraisemblablement à constater des

phénomènes d'interférences et de polarisation, susceptibles d'expliquer bien des points mystérieux.

Pour arriver à l'énoncé de ces conclusions, M. Voillaume avait dû construire une épure dont il est reproduit ici, à l'échelle $1/2$, un fragment qui en donne une idée (Fig. 45). C'est cette épure qui lui a permis de dresser la table de réglage par longueurs d'onde dont il est question à la page 96.

Poursuivant la série de ses expériences, M. Voillaume a démontré expérimentalement :

1° Qu'au même titre que les ondes hertziennes, caloriques, lumineuses, radio-actives, etc... la radiation spécifique d'un corps est bien réellement une onde électro-magnétique et en possède toutes les propriétés ;

2° Que cette radiation n'est pas simple, mais composée d'un faisceau de radiations dont il a pu opérer la dispersion et dont les longueurs d'onde correspondent à chacune des raies spectrales du corps déterminées optiquement.

Ces radiations invisibles, et dont l'existence est révélée par la réaction du récepteur humain, sont les mêmes que celles qui agissent sur les appareils de physique. La radiation de sodium qui, sur le spectroscope, donne la raie $D = 5.890$, bien connue, n'est autre que celle qui fait tourner un pendule réglé sur le sodium. Il y a donc égalité de longueur d'onde entre celle de la couleur jaune du sodium et celle du métalloïde correspondant à la raie.

3° Que le pendule, tenu par une main positive, girant positivement sur tous les corps positifs, et négativement sur les corps négatifs, le sens de la giration constituait une propriété spécifique, bien réelle de chaque corps, qu'il a nommée polarité du corps.

4° Que les rayons spécifiques se réfléchissent et se réfractent comme les ondes lumineuses. Les corps ont donc pour ces ondes des indices de réfraction comme les corps transparents pour la lumière.

5° Que, comme les rayons lumineux, ils donnent lieu à des phénomènes d'interférences et de diffraction.

Pour réaliser ces expériences, M. Voillaume construisit un pendule dont la suspension est assurée par un fil très solide et la masse oscillante par une sphère de 31 millimètres 5 de diamètre et d'un poids de 40 grammes. Le pendule sphérique neutre « Progrès Scientifique » est construit sur les mêmes bases, comme il est conseillé par M. Voillaume dans son remarquable ouvrage : « Essai sur les Rayonnements de l'Homme et des Etres vivants » (1).

Notre pendule neutre sphérique de précision « Progrès Scientifique » comporte, pour faciliter le réglage, un bâionnet

(1) Librairie Scientifique de Paul Lechevallier, 12, rue de Tournon, Paris.

mince, terminé en pointe. Cette pointe facilite aussi la prise de longueur d'onde sur un simple double-décimètre. Avec le pendule neutre « P. S. » la longueur du fil de suspension, pour le réglage en millimètres, se compte à partir de l'axe du bâtonnet, tenu horizontalement, et saisi entre les deux doigts suspenseurs. (Voir Fig. 46).




Fig. 45

Longueur d'onde du pendule en centièmes de microns
sur les raies du spectre fournies par les corps simples à l'état gazeux

Avec cet instrument on peut obtenir pour la prospection courante, la précision d'un demi-millimètre, qui est suffisante.

Il importe de bien se convaincre que le réglage de précision est indispensable pour opérer méthodiquement. Avec des réglages lâches il se produit quantité de phénomènes secondaires susceptibles de dérouter le débutant et de le décourager (inversions de polarité, interférences, chiffres bizarres de série). Avec des réglages précis au contraire, les résultats sont généralement simples et clairs.

Exercices :

36. Constater, dans une pièce de monnaie d'argent, la présence de chacun des trois éléments : argent, cuivre et aluminium.

37. Plus tard, quand on sera familiarisé avec les 8^{me} et 9^{me} Leçons, rechercher le « nombre particulier » et l' « angle fondamental » de ces trois substances, de manière à les identifier sans erreur possible.

38. Constater la présence du cuivre et de l'aluminium dans une pièce de bronze d'aluminium, employé dans la fabrication des ustensiles de ménage (le bronze des pièces de monnaie est un alliage de cuivre, d'étain et de zinc) ; constater la présence du carbone dans le bois ; de calcium dans le marbre ; du phosphore dans l'ivoire.

39. Vérifier les réglages sur l'électricité. (pile électrique ou lampe à incandescence allumée, conducteur électrique en circuit, etc...), et sur le magnétisme (aimant en fer à cheval ou rectiligne). Tenir compte, en passant, des particularités de polarité de l'électricité et du magnétisme, signalées page 69.

40. Vérifier les réglages propres à l'eau, en opérant sur un verre rempli d'eau.

41. Vérifier que des réglages sur l'oxygène ou l'hydrogène donnent une giration au-dessus de l'eau (H^2O).

42. Essayer les divers réglages sur le creux (air, oxygène.

azote), en se plaçant au-dessus d'une cave, d'un étage ou d'un souterrain connu.

43. Essayer les réglages sur les couleurs. Une nuance de couleur ne possède qu'un seul réglage vrai qui correspond à sa longueur d'onde propre. Mais on peut régler un pendule sur les différentes harmoniques de cette longueur d'onde, qui sont parfois plus faciles à prendre que le réglage vrai, parce que plus puissantes.

Réglage millimétrique du pendule sphérique neutre de précision, soit Voillaume, soit « P. S. ». Le réglage précis de ces deux pendules, identiques, est indispensable pour l'identification des radiations. Il faut, en effet, les succès de 3 ou 4 longueurs de réglages millimétriques connues, du « nombre particulier » et de « l'angle fondamental » d'une radiation, pour distinguer celle-ci, sans erreur possible, des autres radiations ou ondes. La connaissance de ces trois éléments a permis à Voillaume d'établir une carte d'identité pour de nombreux corps simples et radiations usuels. On trouvera à la page 96 le tableau de ces caractéristiques.

Dès que le débutant aura acquis l'habitude rapide du réglage expérimental, c'est-à-dire par tâtonnement personnel, que les radiesthésistes expérimentés exécutent instantanément, en se jouant, il pourra se permettre l'usage de ces réglages paresseux, automatiques, millimétriques, établis dans ce Tableau, au choix, d'avance et définitivement pour les corps les plus usuels. La commodité et la rapidité que ce Tableau procure, grâce à l'emploi d'une réglette millimétrique (ou d'un simple double-décimètre) permettent aussi une technique de réglage d'une ponctualité rigoureuse.

Mais, répétons-le, ce Tableau, utile aux initiés pour leur faire gagner du temps, n'est pas recommandable aux débutants. Avant son emploi, il faut vaincre personnellement la difficulté initiale du réglage expérimental.

Manière de régler automatiquement le pendule sphérique neutre P.S. et le révélateur Schumfell par le réglage millimétrique. Les figures 46 et 51 donnent, mieux que par explications, la façon de prendre une mesure millimétrique,

suivant le Tableau de réglage Voillaume, à l'aide d'un double-décimètre de dessinateur, à défaut de réglette spéciale.

Les longueurs millimétriques de ce Tableau ont été établies pour un opérateur de sensibilité moyenne. Mais pour obtenir la meilleure giration, il y a important avantage à tenir compte de l'équation personnelle de chaque opérateur, en vérifiant (par un réglage expérimental très précis sur plusieurs corps différents), une fois pour toutes, s'il convient de les augmenter ou de les réduire d'une fraction de millimètre, ou même d'un millimètre dans le cas le plus désavantageux.




Fig. 46

Exemple de réglage automatique en longueur de fil sur 99 millimètres
(Onde sympathique)
d'après le Tableau d'identification des ondes, page 96

**TABLEAU DE RÉGLAGE DES CHIFFRES CARACTÉRISTIQUES DES CORPS SIMPLES
ET RADIATIONS LES PLUS USUELLES**
permettant d'établir leur carte d'identité à l'aide du pendule sphérique neutre de précision P.S.,
ou Voillaume, ou Schumfell.

D'après tableau de C. Voillaume, Ingénieur E.C.P.
(Entre N et n doit exister la relation : $N=2n+1$)

Nom des Corps ou Radiations	Polarité et Chiffre de série (pour main positive)	Nombre particulier N $N=2n+1$	Réglages millimétriques successifs du fil de suspension les plus avantageux	Angle fondamental au Pendule P.S. Ajouter 90° pour le Schumfell	Nombre caracté- ristique n $n = \frac{N-1}{2}$
1	2	3	4	5	6
Aluminium	Al + 3	3	196,90 — 164,40 — 101,25 — 62,60	128°	1
Antimoine .	Sb -- 3	3	186,40 — 154,85 — 117,25 — 84	30°40	1
Argent	Ag + 3	3	148,65 — 133 — 101,60 — 76,10	90° (Est)	1
Arsenic ...	As — 3	3	192,20 — 160 — 119,30 — 70	229°10	1
Azote	N + 1	3	219,50 — 161 — 131,20 — 108,25 —	293°	1
Baryum ...	Ba + 7	7	212,80 — 190,40 — 152,85 — 116,40 — 95,20	326°20	3
Bismuth ...	Bi — 3	3	189,65 — 164 — 133 — 104,60	58°30	1
Brome	Br — 3	3	203,60 — 156,20 — 140,50 — 131,50 — 110	313°10	1
Bore	B + 2	3	204,50 — 164,45 — 153,50 — 98,60	345°20	1
Cadmium ..	Cd + 7	7	209,15 — 143,35 — 125,50 — 109 — 102,10	196°30	1
Calcium ...	Ca + 3	3	212,65 — 209,20 — 189,15 — 156,70 — 136,40	22°30	1
Carbone ...	C + 3	3	218 — 154,50 — 129,50 — 97,75	336°45	1
Cérium ...	Cé — 7	7	179 — 154,70 — 141,75 — 137 — 121,60	156°50	1
Chrome ...	Cr + 3	3	167,80 — 145,25 — 132,90 — 97,10	227°	1
Chlore	Cl — 3	3	147,30 — 133,50 — 125 — 110 — 108,60	290°50	1

Cobalt	Co	— 7	7	141,75 — 111,20 — 107,85 — 93,90	218°	
Cuivre.....	Cu	+ 5	5	167,90 — 163 — 133,50 — 126,65 — 100,60	41°32	2
Etain	Sn	— 2	3	61,25 — 94 — 140 — 156,25 — 168 — 210	21°	1
Fer	Fe	+ 2	3	95 — 122,50 — 138 — 192,50 — 203,50	180° (Sud)	1
Fluor	F	— 3	3	71,50 — 86,25 — 115,50 — 140,25 — 155	286°	1
Hélium	He	— 1	3	116 — 121,50 — 173 (Réglage des rayons corpusculaires α)	289°20	1
Hydrogène	H	+ 1	3	66,25 — 89 — 112 — 134,50	0° (Nord)	1
Iode	I	— 3	3	76,50 — 109,50 — 147 — 163,50 — 178	320°50	1
Magnésium	Mg	+ 3	3	66,80 — 90,75 — 104 — 131	331°	1
Manganèse .	Mn	— 3	3	76,80 — 86,75 — 106 — 110 — 119 — 148 — 183	233°	5
Mercure ...	Hg	+ 11	11	81,50 — 118 — 148,50 — 167	315°40	
Nickel	Ni	— 3	3	192,60 — 174,75 — 149,30 — 125,15 — 112,60	249°	1
Or	Au	+ 11	11	199 — 171,30 — 160,30 — 134,25 — 108,50	270° (Ouest)	5
Oxygène ..	O	— 1	3	236,40 — 191,40 — 146,85 — 84,80	142°35	1
Phosphore .	P	— 3	3	183 — 146,15 — 135,50 — 97,45	324°40	1
Platine.....	Pt	+ 2	3	171,75 — 149,20 — 138,60 — 123,80	115°30	1
Plomb	Pb	— 13	13	223 — 181,50 — 157,35 — 143 — 120,50	50°	6
Potassium .	K	+ 7	7	239 — 188,85 — 169,15 — 142,19 — 110,75	10°	3
Radium ...	Ra	+ 5	5	169,85 — 160,50 — 110,40 — 102,35	161°15	2
Radon	Rd	+ 3	3	82,75 — 118,25 — 142,25 — 162,10 — 179,75		1
Silicium ...	Si'	+ 5	5	204,80 — 178,90 — 123,75 — 96,40	37°50	2
Sodium	Na	+ 3	3	191,60 — 174,50 — 162,20 — 129,55 — 119,25	16°30	1
Soufre	S	— 3	3	201,65 — 160,50 — 157,15 — 146,35	78°30	1
Tellure	Te	— 3	3	209,10 — 179,90 — 159,75 — 147,55	25°	1
Thorium ..	Th	+ 3	3	210,30 — 186,90 — 159,20 — 110 — 95,30	214°15	1
Thoron ...		+ 1	3	72 — 119,25 — 145 — 195,50		1
Tungstène .	W	— 3	3	220,70 — 182,25 — 151,55 — 134 — 111,35	140°40	1
Zinc.....	Zn	+ 3	3	204,45 — 187,90 — 174,80 — 115,20 — 109,50	36°05	1

Nom des Corps ou Radiations	Polarité et Chiffre de série (pour main positive)	Nombre particulier N $N = 2n + 1$	Réglages millimétriques successifs du fil de suspension (I) les plus avantageux	Angle fondamental au Pendule P.S. Ajouter 90° pour le Schumfell	Nombre caracté- ristique n $n = \frac{N-1}{2}$
1	2	3	4	5	6
Zirconium ..	Zr + 5		190,40 — 141,60 — 109,80 — 105,50 — 102,50	307°10	
Air (Creux) .	+ 2	2	99 — 120 — 161 — 178 — 198	352°	
Eau	H ² O + 2	2	52 — 106 — 132 — 151 — 190 — 221	312°30	
Pétrole brut	— 3	3	63,25 — 94,75 — 117 — 148,60 — 154,75 — 192,40		
Electricité... (Ondes ES)	EI ± 5	5	233,10 — 197,20 — 161,75 — 127 (Réglage des rayons corpusculaires β)	90° ou 270°	2
Magnétisme . (Ondes MS)	Mag ± 5	5	211,20 — 177,20 — 144,25 — 112	Néant	2
Radioactivité (Ondes RS)	Rté + 7	7	115,35 — 131,85 — 149 — 172	62°30	3
Rayons ε ...	Epsilon + 3	3	117,50 — 142,10 — 155,75 — 171,80	198°50	1
Rayons ν ...	Nu — 19	19	97,50 — 125,50 — 170 — 195	42°	9
Rayons θ ...	Théta ± 13	13	101 — 120,75 — 138 — 180	219°30	6
Rayons ζ ...	Dzéta — 1	3	112 — 130,50 — 160,50 — 197	202°10	1
Rayons ω ...	Oméga + 17	17	100 — 136,50 — 167,50 — 191,50	12°30	8
Rayons o ...	Omic. ± 7	7	115 — 158,50 — 172 — 198	49°	3
Rayons π ...	Pi + 11	11	72,50 — 126,40 — 142 — 163		5
Rayons x ...	Kappa				
Rayons ρ ...	Rô				
Rayons τ ...	Tau				

Rayons σ ...	Sigma + 5	5	105 — 148,50 — 168,75 — 203,50	297°10	2
Rayons VO .	— 13	13	104,80 — 127,50 — 138,75 — 166	339°	6
Rayons CL ..	— 3	3	103,75 — 128,75 — 145,25 — 176,50	39°	1
(Calorifiques)					
Rayons CH .	+ 1	3	124,50 — 146 — 161,30	57°30	1
(Chimiques)					
Couleurs :					
Rouge	— 13		181,45		
Orangé ...	— 12		213		
Jaune	— 11		169		
Vert.....	— 10		132,42		
Bleu.....	— 9		103,36		
Indigo.....	— 8		86,60		
Violet	— 7		69,65		

NOTA. — L'indication $\pm$ devant un chiffre de série veut dire que le rayon a une polarité ou + ou —.

Quand une onde est à double polarité, la colonne 5 du tableau n'indique que l'angle fondamental de l'onde positive. Pour avoir celui de l'onde négative, il faut ajouter au premier 180°.

Ainsi : Rayons $\sigma+$ = 49° Rayons $\sigma-$ = 229°

Rayons $\theta+$ = 219°30 Rayons $\theta-$ = 39°30

Les rayons RS, $\theta+$, ν , ζ , sont des rayons γ des physiciens.

Les rayons α et β , rayons corpusculaires (atomes d'Hélium et électrons) ne sont perceptibles pour le radiesthésiste que par l'onde associée (expression de Louis de Broglie) qui les accompagne : rayons spécifiques de l'Hélium pour les premiers ; ondes ES— pour les seconds.

Si l'on règle sur un corps composé, la série de ce corps doit être la somme des séries des corps simples composants, chacune d'elles prise une seule fois, sans considération de signe (Sel marin = $\text{NaCl} = 3 + 3 = 6$) — (Chaux hydratée = CaO , $\text{HO} = \text{Ca} + \text{O} + \text{H} = 3 + 1 + 1 = 5$).

HUITIEME LEÇON

AUTORÉGLAGE DU PENDULE

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 32 à 35)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Un pendule, quel qu'il soit, étant un composé de matières diverses, émet forcément les radiations spécifiques des substances qui le composent. Ainsi, un pendule à sphère de bois émet les radiations du carbone et de l'hydrogène. Le pendule Voillaume, comme le pendule « P.S. », à boule grès, émettent les radiations du silicium. S'ils se trouvent réglés sur le silicium, ils tourneront en permanence. On dit qu'ils sont **autoréglés**. Si, ainsi autoréglés et tournant en permanence, nous présentons l'un ou l'autre, au-dessus d'un corps composé de silicium (verre ou sable), il cessera de tourner et se mettra à osciller.

Un pendule neutre qui a longtemps tourné sur une radiation, finit par s'en imprégner, et devenant autoréglé, tourne en permanence. C'est pourquoi, pour éviter des erreurs, il importe de donner au pendule suspendu, un léger choc, par sa base, sur la table de travail, chaque fois que l'on change de radiation. L'imprégnation peu tenace, s'évanouit immédiatement.

Le pendule coloré : Un pendule plein, coloré, est autoréglé pour la couleur de même nuance que celle de la peinture dont il est revêtu. Si dans la recherche ou l'identification d'un corps on utilise, sans s'en rendre compte un réglage très voisin de celui de cette nuance, on risque de commettre une erreur. (Exemple : orangé, réglage — 181,45 et plomb,

réglage + 181,50). C'est l'une des raisons pour lesquelles il est recommandé de n'employer que des pendules recouverts de couleur noire, aussi neutre que possible. En effet, le noir n'est pas une couleur au point de vue physique ; le blanc par contre représente l'ensemble de toutes les couleurs. Ainsi le pendule blanc serait autoréglé pour toutes les couleurs.

Le pendule creux : Il y a quelquefois avantage pour certaines recherches sur une substance à se servir d'un pendule autoréglé sur cette substance. Prendre un récipient creux, par exemple un pot de pommade de pharmacien. Le munir d'un fil suspenseur attaché à un bâtonnet. Placer à l'intérieur un fragment de la substance intéressée. Modifier expérimentalement la longueur du fil jusqu'à ce que l'instrument se mette à tourner en permanence. Il sera bien autoréglé pour la substance introduite dans le creux du pendule si, présenté au-dessus d'une substance identique, il se met à osciller.

L'autoréglage est intéressant à utiliser, par exemple, par un prospecteur de minerais particulier : la masse de son pendule sera alors faite de ce minerai aggloméré. Bien des « sourciers » professionnels se sont constitué un pendule dont la masse est faite d'un petit flacon de verre blanc bouché, préalablement rempli de l'eau précise qu'ils cherchent : eau potable, eau minérale à tel ou tel degré, eau arsenicale, eau fluorhydrique, etc...

Exercices :

44. Vérifier l'autoréglage sur le silicium, d'un pendule à masse de grès (le pendule sphérique neutre « P.S. ») ou de verre ; celui d'un pendule à sphère de bois pour le carbone et l'hydrogène ; d'un pendule à balle de caoutchouc pour le chlore, etc...

Constater que ce pendule oscille au-dessus des corps de la substance pour laquelle il est autoréglé.

45. Constater que le pendule à boule de caoutchouc est autoréglé pour l'électricité négative.

46. Rechercher les corps dont un des réglages est très voisin de celui de la nuance considérée et constater ce qui se passe.

47. Constater qu'un pendule qui tourne longtemps sur une radiation finit par s'autorégler sur cette radiation et à tourner en permanence.

48. Quand le phénomène se sera produit, désimprégner le pendule par un léger choc sur la table d'exercice, à la base du pendule suspendu entre les doigts.

49. Faire la recherche du creux avec flacon vide. Tout réglage sur l'air, l'oxygène ou l'azote réussit sur le creux (cavité, faille, galerie souterraine, conduite d'eau vide. Mais l'air confiné est radio-actif, il y a intérêt à essayer tout d'abord sur le creux les différents réglages sur la radio-activité, suivant les réglages indiqués au Tableau des mesures millimétriques, page 96. Ceci permettra une première vérification. Ensuite, l'on utilisera, en contre-vérification, le pendule creux autorégulé : petit flacon ou petit pot de grès, vides, remplis d'air, bouchés pour les cavités supposées fermées, ou non pour les cavités ayant une relation avec l'air extérieur. Ne pas se laisser surprendre par un ancien creux qui ultérieurement a été comblé.

La substance qui constitue le pendule creux est indifférente. Elle constitue un simple support du corps pour lequel il est autorégulé.

NEUVIEME LEÇON

LES RAYONS A 45° ET A 135°

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 68 à 70)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Sous l'action de la charge électrique terrestre, un corps quelconque émet deux nappes épaisses de rayons spécifiques **verticaux** (les uns à support ES— dirigés vers le ciel, les autres à support ES+ dirigés vers la terre).

Sous l'action de la charge magnétique terrestre, ce corps quelconque émet deux cônes munis de rayons inclinés, les uns à 45°, les autres à 135° (à support MS+).

Les rayons à 45° sont très utiles pour relever l'existence d'un corps enfoui et apprécier sa profondeur.

Voir figures 8 et 16, pages 7, 14, 62 et 76.

Exercices :

50. Vérifier l'émission à 45° sur des corps de forme simple : cylindre, sphère, prismes verticaux ou inclinés, cube, parallépipède, corps de forme quelconque, en cherchant leur ligne de contour apparent horizontal. (Voir fig. 39, page 76.

Le réglage du pendule peut, dans le but précité, être d'une part effectué sur la substance étudiée elle-même, par un réglage préalable sur les rayons verticaux de cette substance. Ainsi réglé, placer soit le pendule, soit mieux encore l'index de la main libre gauche sur le trajet des rayons à 45°, dont on trouvera le point de départ sur la ligne de contour appa-

rent horizontal de l'objet. Les yeux seront fixés sur ce trajet et dans le second cas, le pendule sera écarté à droite de l'objet et surveillé de temps à autre pour connaître le sens de son mouvement. La rencontre du pendule (ou de l'index gauche, suivant le procédé admis Fig. 39) avec le rayon à 45° ou à 135° provoquera la réaction pendulaire.

51. Pour la recherche plus précise du trajet des rayons à 45° et à 135° l'index de la main libre gauche peut être remplacé par une pointe très fine, tenue entre les doigts ; pointe formée de préférence avec la substance d'un corps mauvais conducteur, mais non un isolant électrique. Utiliser par exemple une aiguille de bois, non verni, effilée à son extrémité, ou un crayon, non verni, bien appointé ; une aiguille à tricoter d'acier, etc... Les points d'origine des différentes émissions seront ainsi reconnus avec plus de précision.

52. Vérifier par l'essai (réglages et série) de l'électricité et du magnétisme que ces rayons à 45° sont à **support magnétique** et qu'en conséquence, ils traverseront les corps isolants de l'électricité : verre, papier, carton, soie, porcelaine, etc..., imperméables aux rayons verticaux, qui ne sont qu'électriques.

53. Vérifier que seule une lame de fer (couteau de cuisine) est capable d'arrêter les rayons à 45° et à 135° .

54. Enfouir un objet dans la terre, d'une profondeur notée, et reconnaître l'émergence des rayons à 45° .

DIXIEME LEÇON

LE PHÉNOMÈNE DES SÉRIES LE NOMBRE PARTICULIER D'UNE ONDE LE NOMBRE CARACTÉRISTIQUE

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 57 à 64)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Le phénomène des séries a été découvert par l'abbé Mermet, qui lui a dès le début attribué une origine objective. Depuis, d'autres radiesthésistes ont nié cette objectivité, mais l'exposé qui va suivre démontre qu'ils sont dans l'erreur.

Procédé de détermination du chiffre de série par les secousses :

Ce procédé est tout indiqué pour l'étude d'un corps caché et éloigné à identifier, mais dont on a déjà trouvé la direction, ou encore qui se trouve à une grande profondeur sous les pieds de l'opérateur. Présentement nous continuerons nos exercices sur des corps visibles et connus.

Le pendule étant réglé avec précision pour un corps simple déterminé, si on le présente au-dessus de ce corps, il se met à tourner (dans le sens positif, si ce corps est positif, dans le sens négatif, s'il est négatif).

Si l'on donne une secousse au pendule, ou si on se contente de l'élever verticalement, il arrête sa giration pour un balancement provisoire vers la poitrine de l'opérateur

(effet de la secousse), puis se remet à tourner. Au bout d'un certain nombre d'interruptions de girations, dont le nombre est constant pour chaque corps, il cesse de tourner et se met à osciller dans une direction fixe qui est celle du rayon fondamental particulier au corps, très près et un peu au-dessus de ce corps.

Le nombre d'interruptions ou secousses qui détermine l'arrêt définitif de la giration est appelé **chiffre de série du corps**. La série est positive si le pendule tourne dans le sens positif, négative dans le sens contraire.

Procédé de détermination du chiffre de série « au doigt » :

Avant de passer de l'opération précédente à la suivante, il convient, pour éviter des erreurs provenant de l'éventuelle imprégnation du pendule, de désimprégner celui-ci, en le cognant légèrement, par sa base, sur la table d'expérimentation, et de se désimprégner soi-même en se frottant vigoureusement les deux mains. Adopter cette habitude avant et après chaque opération.

Le procédé, dit « au doigt » ne convient que pour les exercices sur corps visibles, car il nécessite la possibilité de mettre l'index de la main gauche en contacts successifs avec ce corps.

Vérifier d'abord le réglage rigoureux du pendule sur un objet d'argent, pris en exemple.

Placer l'index de la main gauche, sans contact, au-dessus de l'objet en argent. Suspendre le pendule au-dessus de cet objet : il tournera positivement, l'argent étant un corps positif.

Abaisser alors l'index de la main gauche en le mettant en contact avec l'argent : le pendule oscillera.

Relever le doigt, puis l'abaisser de manière à obtenir une alternative de girations et d'oscillations. Constater que lorsque le nombre de girations aura atteint le chiffre de série, en la circonstance 3 pour l'argent, le pendule refusera de tourner, s'arrêtera et oscillera dans le plan fondamental particulier du corps, très près et un peu au-dessus.

Procédé de détermination du chiffre de série « des carrés de papier colorés » :

Utilisons toujours pour exemple une pièce de monnaie d'argent. Réglons rigoureusement notre pendule sur ce métal : il tournera.

A toute proximité de cet argent, plaçons un carré de papier ou de carton de un centimètre de côté, de couleur rouge : le pendule continuera de tourner. Ajoutons, en les superposant au premier carré, un deuxième, puis un troisième carré de papier rouge.

Dépassant d'une unité le chiffre de série de l'argent, qui est 3, ajoutons un quatrième carré. Constatons alors que le rayonnement vertical de l'argent s'est arrêté et que le pendule oscille.

Ajoutons un cinquième et un sixième carré, le pendule continuera son oscillation.

Mais ajoutons-en encore un septième, c'est-à-dire un de plus que le double du chiffre de série de l'argent, le rayonnement de l'argent renaîtra et le pendule se remettra à tourner.

Le chiffre de série des corps composés : Il convient de vérifier, par leur série propre, la nature des divers éléments constituant un objet. Une pièce de monnaie d'argent, prise en étude, contient, nous le savons, de l'argent, du cuivre et de l'aluminium. Il y aura lieu pour chaque élément constituant cette pièce de régler préalablement le pendule, et successivement, sur chacun de ces éléments. (Voir exemple page 99 : réglage sur un corps composé).

Prise expérimentale du chiffre de série : La détermination expérimentale du chiffre de série exige un réglage absolument parfait. Un léger dérèglage, donnant encore sur le corps, des girations elliptiques, conduit à obtenir soit des multiples du chiffre de série, soit des nombres qui s'en écartent sérieusement.

On trouvera à la deuxième colonne du Tableau de la page 96 le chiffre de série obtenu par ces méthodes pour les corps simples et radiations usuels.

On constatera pour les **corps simples** que chaque fois qu'il est égal ou supérieur à 3, il coïncide exactement avec le chiffre objectif correspondant que nous avons dénommé : **nombre particulier de la radiation**.

Il ne peut pas, et pour cause, exister de nombre particulier inférieur à 3.

Nombre particulier. Etudiant, il y a quelques années, les familles d'images produites sous diverses influences par un corps simple, J. Correnson remarqua que ces familles comprennent un nombre d'individus égal au chiffre expérimental de série, chaque fois que ce chiffre est égal ou supérieur à 3.

Il en tira les conclusions suivantes :

1° Que le chiffre de série et le nombre d'individus des familles d'images étaient déterminés par une cause identique encore inconnue ;

2° Que chaque fois que le chiffre de série était inférieur à 3, il était purement subjectif, ce qui n'empêche pas de l'utiliser tel quel dans les recherches et expériences effectuées avec un réglage de précision.

Détermination du nombre particulier d'une radiation : J. Correnson a observé que si à côté d'une source d'émission de radiation dont le chiffre de série est égal ou supérieur à 3, une pièce de monnaie d'argent, par exemple, on superpose des carrés de carton d'une couleur magnétique (blanc, rouge, orangé, jaune ou vert), en nombre supérieur d'une unité, au chiffre de série de cette radiation, le pendule réglé tournant autour de cette source se met à osciller.

Au lieu de placer les cartons colorés à côté de la source radiante, on peut les tenir dans la main libre. Tant qu'ils sont tenus d'une façon lâche, ils restent sans effet ; mais s'ils sont serrés entre le pouce et l'index, ils produisent sur le pendule tenu dans l'autre main, l'effet prévu.

Si n est le nombre des cartons qui déterminent l'oscillation, $n - 1$ sera le nombre particulier de la radiation.

Dans ces conditions, au lieu de rechercher par des procédés empiriques, un chiffre tout à fait subjectif, il est infiniment plus simple de déterminer le nombre particulier lui-même d'une source d'émission, en superposant un à un, à côté de cette source des carrés de carton colorés. Si n cartons transforment en oscillation la giration du pendule réglé, $n - 1$ sera le nombre particulier de la radiation observée.

A noter que l'oscillation du pendule se produira dans la direction du plan fondamental de cette radiation.

Exercices :

55. Choisir sur le tableau de la page 96 différentes substances et radiations ; prendre la série expérimentalement, c'est-à-dire sans prendre connaissance des indications de la colonne du tableau « Polarité et Chiffre de série ».

56. A l'aide du pendule sphérique neutre « P.S. » de précision, constater qu'on obtient bien les chiffres de cette deuxième colonne du tableau. Constater le même résultat avec le Schumfell.

57. Prendre ensuite le nombre particulier de ces ondes par la méthode des cartons colorés.

58. Les petits cartons de un centimètre de côté conviennent pour les opérations de laboratoire ; mais si on veut utiliser la méthode pour des opérations extérieures, extinction d'ondes nocives, par exemple, on peut user de petites planchettes de bois contre-plaqué de couleur magnétique (blanc, rouge, orangé, ou jaune très clair).

Le nombre caractéristique. On verra plus loin, chapitre VI, page 183, qu'une feuille d'images fluidiques se compose d'une image centrale, qui peut être magnétique, électro-magnétique, électro-radio-magnétique, ou électro-radioactive, entourée de deux groupes identiques d'images toujours radioactives. On comprendra que ce qui est intéressant pour le chercheur, ce n'est pas tant le nombre N des membres de la famille, mais le nombre d'individus de chacun des groupes identiques qui entourent l'image centrale. C'est ce nombre n que nous nommons nombre caractéristique de l'onde EM. Entre le nombre particulier N d'une radiation et son nombre caractéristique n , il existe la relation $N = 2n + 1$.

59. Si on place à côté d'une source d'émission un nombre de cartons colorés égal à son chiffre caractéristique, cette émission s'éteint.

A quoi correspond physiquement le nombre caractéristique ? Mystère, jusqu'à présent. Peut-être sera-t-il possible, un jour, de formuler à son sujet une hypothèse que nous aurons la joie de voir vérifier par les faits !

Pour le moment, il n'est pas invraisemblable de supposer que ce chiffre est déterminé par le rapport d'intensité qui existe entre le vecteur électrique de l'onde EM et le vecteur magnétique correspondant.

L'ANGLE FONDAMENTAL LE PLAN FONDAMENTAL

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 81 à 85)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

L'angle fondamental n'est autre que l'angle que fait avec la direction Nord-Sud magnétique, le plan de vibration magnétique d'une onde EM lorsqu'elle se propage vers le ciel dans une direction verticale. Cette orientation est provoquée pour chaque onde EM, et par suite pour chaque corps simple, par l'action du champ magnétique terrestre. Cette action a pour effet de provoquer pour chaque corps simple une émission de rayons spécifiques à support MS dans un plan vertical théoriquement illimité, appelé **plan fondamental**, et autour duquel se forme, ainsi que nous le verrons plus loin, un champ de dimensions réduites, limité par des plans horizontaux et verticaux.

Ce champ est appelé **champ du plan fondamental** et les rayons spécifiques qui s'y propagent, à longueur très limitée, d'ailleurs, **rayons fondamentaux** de la radiation ou de la substance.

Ces rayons ont été découverts par l'abbé Mermet.

La direction des rayons fondamentaux est fixe et elle caractérise chaque onde et chaque substance ; c'est celle suivant laquelle le pendule oscille après chaque série.

La direction du **plan fondamental du fer** étant celle du Sud magnétique, il y avait tout lieu de penser que le phénomène était dû à l'action du magnétisme terrestre. M. l'Ingénieur Voillaume a vérifié l'exactitude de cette hypothèse en observant les déplacements que subit le plan fondamental lorsqu'on fait varier méthodiquement le champ magnétique terrestre appliqué à ce corps.

Ayant déterminé la direction de ce plan pour un grand nombre de corps dans des conditions de degré d'éclairage fixe, il a résumé le résultat de ses expériences par l'établissement d'une carte de rayons fondamentaux (dont les angles sont donnés en colonne 5, page 96) ayant pour axe la direction Nord-Sud magnétique. En prenant le zéro dans la direction du Nord, et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, il a pu observer ainsi, que les corps diamagnétiques (qui ne sont pas attirés par un aimant) avaient leur angle fondamental situé dans le demi-cercle Nord et les corps magnétiques ou paramagnétiques, dans le demi-cercle Sud de la Carte.

Poursuivant des recherches sur la même question, J. Correnson a pu se rendre compte que l'action du champ électro-magnétique terrestre (EM) s'exerçait, à ce point de vue, non plus sur la substance elle-même, mais sur son émission, et que l'angle fondamental existait non seulement pour les rayonnements spécifiques des corps, mais pour n'importe quelle radiation EM polarisée. C'est cette théorie que nous allons exposer ci-après, persuadés qu'elle intéressera beaucoup de nos lecteurs.

Angle fondamental : L'orientation du plan fondamental (ou angle fondamental) d'une onde électro-magnétique plane, n'est autre que celui du plan de son champ magnétique lorsque cette onde se propage dans une direction rigoureusement verticale. Ce plan, Pf bien entendu, est alors vertical.




Fig. 47

Rayon vertical

On conçoit que si cette définition est exacte, il doit exister, en corrélation avec le Pf et, dans une direction qui lui soit perpendiculaire, un autre plan caractéristique correspondant au champ électrique de l'onde verticale. C'est bien, en effet, ce que révèlent les réactions du pendule. Nous appellerons donc ce second plan : le Plan électro-fondamental (PEf).

Si α est l'orientation du Pf par rapport au Nord magnétique pris pour origine, la direction du PEf sera $\alpha - 90^\circ$ si l'onde est positive ; $\alpha + 90^\circ$ si elle est négative.

L'orientation du Pf étant déterminée par l'action du champ magnétique terrestre, on conçoit que l'action d'un autre champ magnétique puisse la faire dévier et qu'il en soit de même de celle d'un champ électrique influençant celui de l'onde, puisque les deux plans sont solidaires et invariablement liés l'un à l'autre par la condition de perpendicularité. C'est bien

effectivement ce qui se passe puisqu'il a été constaté, depuis longtemps, déjà, que le Pf est dévié par l'action de la lumière qui, si elle est blanche, intervient par l'action des rayons électriques ou

magnétiques qui accompagnent les ondes lumineuses, et si elle est monochromatique, suivant le cas, soit par les uns, soit par les autres.

Quand, donc, on veut déterminer avec précision l'angle fondamental d'une onde EM ou d'une substance, il faut travailler dans une pénombre prononcée.

Le PEf n'ayant qu'un intérêt purement scientifique, nous nous en tiendrons là en ce qui le concerne et nous ne nous occuperons que du Pf dont l'intérêt pratique est considérable.

Le bien-fondé de notre hypothèse sur son origine et son mécanisme se trouve confirmé par les deux faits suivants :

1° Les ondes EM non polarisées n'ont pas de Pf, parce qu'elles en ont en réalité une infinité, ce qui est le cas des ondes lumineuses naturelles ;




Fig. 48

Champ du Plan fondamental d'un disque de cuivre
posé sur une table horizontale

2° Deux ondes EM identiques, mais de polarité inverse, ont leurs Pf orientés respectivement à 180° l'un de l'autre.

Plan fondamental d'une source d'émission : Le Pf d'une source d'émission (électricité, magnétisme, radio-activité, rayons α , rayons humains, etc...) est un plan vertical partant de cette source dans une seule direction et qui, dans toute son étendue, émet le rayonnement de cette source (ondes ES, MS, RS, α , rayon vital, rayon mental, par exemple). Ses dimensions, tant dans le sens vertical que dans le sens horizontal, sont théoriquement illimitées.

Plan fondamental d'une substance : Le faisceau spécifique d'un corps simple se compose de plusieurs radiations de longueur d'onde différente, mais qui ont toutes le même chiffre objectif de série (donc même « nombre particulier », même « nombre caractéristique »), et aussi, même « angle fondamental ». On trouve toutes ces radiations emportées par le support MS, dans le plan fondamental.

Champ du plan fondamental : Le long de ce plan dont la partie active semble, pratiquement, illimitée, il se forme une sorte de caisse à parois verticales ayant pour axe ce plan, pour épaisseur celle de l'objet radiant et limitée, en hauteur par des plans horizontaux, et en longueur par un plan vertical perpendiculaire à sa direction. C'est le champ du plan fondamental dont la propriété principale est d'être un espace dans lequel circulent des ondes spécifiques de l'objet à support magnétique (MS) et une émission filiforme de rayons α , de longueur limitée, que plusieurs radiesthésistes prétendent se propager sous un angle rigoureusement constant pour une substance déterminée. (Fig. 48).

Rayons fondamentaux : Les rayons spécifiques qui se propagent dans le champ du plan fondamental et que l'on a appelés rayons fondamentaux sont à support MS et de longueur limitée. Des expériences sont actuellement en cours pour déterminer leur direction. Sont-ils parallèles entre eux ou obliques ? Verticaux ou Horizontaux ? A trajectoire rectiligne ou courbe ? On le recherche.

Rechercher la direction du Rayon fondamental d'un objet : Nous rappelons que le Rayon fondamental peut être déterminé exactement, soit à l'aide du pendule sphérique neutre P.S., soit à l'aide du pendule « Schumfell », qui est un pendule actif. Toutefois, le Schumfell, développant un champ magnétique, l'orientation normal obtenu par son emploi supportera une déviation de 90° .

Rechercher expérimentalement, donc par tâtonnements, le **rayon fondamental** d'un corps. — Dans ce but, promener




Fig. 49

Conduire le pendule, tout autour, très près de l'objet. Dès que le pendule rencontrera le champ Pf, la giration se transformera en oscillations dans ce plan.

lentement le pendule réglé, autour et aussi près que possible, d'un objet, par exemple une pièce de monnaie d'argent. Regarder l'objet, surveiller le pendule du coin de l'œil. Dès que le pendule pénétrera dans le champ du plan fondamental, l'instrument qui tournait sur les rayons obliques (entre autres à 45°), émis par l'objet, se mettra à osciller fortement dans la direction du Pf. Constaté et noter le degré d'angle fondamental de la direction fixe obtenue. (Celle-ci sera différente pour chaque substance différente ou radiation différente).

Comparer le résultat obtenu avec le chiffre du Tableau des Caractéristiques des substances usuelles, page 96. En cas d'écart, chercher à se rendre compte des raisons qui ont pu le déterminer (réglage imprécis, influences étrangères, chaleur, lumière, magnétisme, champs électriques, etc..., à proximité).

Autre procédé : Promener autour du corps, ou de la pièce de monnaie pris pour étude, un pendule réglé sur rayons MS (c'est-à-dire sur le Magnétisme : sur aimant). Ce pendule oscillera. Dès qu'il entrera dans le champ du plan fondamental du corps, il se mettra à tourner. Cette constatation nous confirme que le rayon fondamental est bien à support magnétique. Noter la direction dans laquelle se produit cette giration.

Constater que le pendule autoréglé pour un corps, oscillera si nous le promenons autour et très près de ce corps dans les mêmes conditions que précédemment ; mais qu'au contraire il se mettra à tourner aussitôt qu'il pénétrera dans le champ du plan fondamental.

Les rayons fondamentaux sont à support MS. Le pendule, réglé sur la substance, oscillant fortement dans le plan du champ fondamental, interposons entre lui et l'objet une lame de fer (lame de couteau) qui sert d'écran aux rayons MS, nous constaterons que la forte oscillation s'arrête instantanément.

Déterminer avec précision l'angle fondamental d'une radiation nouvelle : Procurons-nous, ou construisons nous-mêmes, un cercle gradué de 360° , de 0,10 centimètres environ de rayon. (Fig. 50). Après nous être placés dans la pénombre (salle obscurcie par la fermeture mesurée des




Fig. 50

volets), de manière à éliminer toute influence provenant de la lumière, orientons le grand côté de notre feuille rectangulaire de papier, dans la direction Nord-Sud magnétique (340° environ), de manière à ce que le zéro de la graduation coïncide avec la direction de ce Nord magnétique.

Au centre du cercle, plaçons un fragment aussi petit que possible de la substance à étudier ; et, avec un pendule

réglé sur cette substance, tournons autour et très près de ce point, en opérant très lentement. A un moment donné la giration du pendule se transformera en oscillations très puissantes.

Dégauchissons le plan vertical passant par le fil de suspension du pendule et le centre du cercle et notons le point où ce plan coupe la graduation. Nous obtiendrons ainsi l'angle fondamental de la substance, que nous mesurerons ensuite soigneusement à l'aide d'un rapporteur.

Assurons-nous, avec un pendule réglé sur rayons MS (Magnétisme, aimant), que nous avons bien opéré dans le Pf et que nous n'avons pas mesuré l'orientation du PEf.

Assurons-nous aussi qu'à l'endroit où nous avons opéré, il n'existe pas d'influence électrique ou magnétique, en constatant que si nous opérons sur l'argent nous obtenons bien un angle de 90° .

Si, au lieu de l'angle fondamental d'une substance, nous voulons déterminer celui d'une radiation nouvelle, nous opérerons ainsi : Nous déterminerons sur une feuille de papier blanc neuf, (ou mieux un buvard blanc neuf dans le cas d'imprégnation liquide), une imprégnation de cette radiation. Il suffira d'avoir posé quelque cinq minutes un corps sur la feuille de papier précitée pour qu'ayant ensuite retiré ce corps sa radiation persiste. Dans la partie où ce corps aura pris contact avec la feuille de papier, donc dans cette partie imprégnée, ou imprégnation, nous découperons un fragment de la dimension de la tête d'un petit clou, et nous opérerons comme précédemment, en le plaçant au centre du cercle. Mais, nous souvenant que nous avons opéré sur une onde identique, mais d'une polarité inverse de celle de l'onde étudiée (comme c'est le cas pour toute imprégnation du premier degré), nous retrancherons 180° à l'angle obtenu, de manière à nous mettre dans le prolongement de l'orientation trouvée.

Exercices :

60. Chercher avec le pendule neutre sphérique « P.S. » de précision, soigneusement réglé, le chiffre de série de

différentes substances, et noter la direction dans laquelle il oscille après la dernière secousse.

61. Chercher comme il a été exposé à la page 113 la direction du Pf des mêmes substances et constater que les deux directions coïncident dans chaque cas si les deux opérations ont été bien faites.

62. Rechercher le rayon fondamental d'un corps en tournant autour de ce corps, en ne regardant pas ce corps. Tourner sur les 45° , ceux-ci s'inclinent à l'endroit du Pf.

63. Comparer le résultat obtenu avec l'orientation indiquée par le Tableau, page 96. En cas d'écart, chercher à se rendre compte des raisons qui ont déterminé cet écart (influences étrangères, chaleur, lumière, magnétisme, etc...) mais aussi réglage imprécis.

64. Constater que le rayon fondamental est à support magnétique et que, pour cette raison, il jouit au point de vue des écrans des mêmes propriétés que les rayons à 45° , arrêtés par une lame de fer.

65. Essayer également de rechercher le Pf sur réglage MS.

66. Constater que le pendule autoréglé pour un corps, qui oscille au-dessus de ce corps, tourne au contraire dans son plan fondamental.

DOUZIÈME LEÇON

LES TÉMOINS

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », page 31)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

On appelle **témoin**, un corps identique à celui que l'on cherche et dont on se sert pour s'aider à le trouver. C'est, de toutes, la méthode la plus simple et la plus précise.

La baguette munie d'un témoin **cesse de réagir**, sauf en présence d'un corps de même nature que le témoin.

Il en est de même du pendule, réglé avec une longueur de fil convenant au témoin, et muni d'un témoin tenu de la même main (main qui suspend le pendule), qui ne tourne plus que sur une substance identique au témoin.

Celui-ci joue donc un rôle analogue à celui des dispositifs qui, dans les appareils récepteurs de T.S.F., ne laissent passer que les ondes d'une longueur déterminée. C'est un **filtre de radiations**.

Si, au lieu d'être tenu de la même main que le pendule, le témoin est saisi par la main libre, **main gauche**, les réactions sont inverses et analogues à celles d'un pendule creux **autoréglé**. La masse suspendue tourne alors en permanence, et passe à l'oscillation, dès qu'elle se trouve sur la verticale du corps identique au témoin.

Pour la baguette, le témoin peut se placer soit sur la fourche, soit dans l'une des mains. Ainsi, si l'on enfle l'anneau d'un trousseau de clefs dans le pouce de la main droite, la baguette se relèvera chaque fois que l'on posera le pied au-dessus d'une solive en fer d'un plancher.

Exercices :

67. Vérifier cette propriété de filtre du témoin de quatre façons différentes :

Le témoin est tenu de la main droite appuyé avec le pouce contre le bâtonnet de suspension. Réglé avec une longueur convenant au témoin, le pendule tourne sur la verticale d'un corps identique, mais ne donne aucune réaction sur un autre corps, même si ce corps a, avec le témoin, une longueur de réglage presque commune.

Vérifier ce phénomène avec la longueur de 133 mm. commune au cuivre et à l'argent.

68. Le vérifier avec des corps différents : étain, cuivre, aluminium, nickel, plomb, etc..., en plaçant le pendule réglé muni d'un témoin sur la verticale de ces corps.

69. Le vérifier en plaçant l'index de la main gauche en antenne ou en contact avec ces corps.

70. Si le témoin est tenu de la main gauche, le phénomène est différent. Le pendule réglé pour ce témoin, éloigné de l'objet, tourne en permanence. Il oscille si on le représente au-dessus d'un corps identique.

71. Ses réactions sont les mêmes que celles d'un pendule creux autoréglé. Ainsi un pendule creux, contenant un fragment d'or, suspendu sur la verticale d'un objet en or, tourne. Il oscillera si l'on tient un témoin en or dans la main gauche.

72. Constater que lorsque le pendule tourne, si l'on prend dans la main qui ne porte pas le pendule, un objet de même nature que celui que l'on cherche, le pendule continuera à tourner, mais en sens inverse, si l'on est réellement en présence d'un corps de même substance que le témoin. Il s'agit là d'un excellent contrôle. Et le pendule passera à l'oscillation dès qu'il se trouvera sur la verticale du corps identique au témoin.

Il est recommandable de ne pas regarder le pendule, parce qu'alors l'action du rayon visuel mettrait l'opérateur

dans le même cas que s'il présentait le pendule au-dessus de l'objet.

73. Saisissons une pièce de monnaie d'argent dans la main gauche. Réglé sur l'argent, le pendule tournera en permanence.

74. Présenté au-dessus d'une autre pièce d'argent, il oscillera.

MODE D'EMPLOI DU RÉVÉLATEUR électro-radio-magnétique « SCHUMFELL » DE PRÉCISION, ANTI-IMAGES

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Les caractéristiques essentielles du Révélateur Schumfell ont été exposées à la page 46 de ce Cours.

Les exercices précédents nous ont familiarisés avec l'emploi du pendule sphérique neutre noir P.S. Quelques exercices suffiront pour s'initier rapidement à l'usage constant du Révélateur Schumfell, anti-images, Breveté S.G.D.G.

Ce pendule **amplificateur**, très sensible, aux mouvements amples et profonds, possède des qualités de précision et de sécurité particulières, reconnues par les radiesthésistes professionnels les plus en renom, qu'il s'agisse de radiesthésie ou de téléradiesthésie (Physique ou Mentale).

Position radio-magnétique : Lorsque le plan médian de l'anneau est orienté dans un plan quelconque, autre que celui du méridien magnétique Nord-Sud, le révélateur fonctionne comme un pendule magnétique, propre à la **Méthode Mentale** ; c'est ainsi que nombre de radiesthésistes, opérant suivant la méthode mentale, s'en servent continuellement (1). C'est dire que, dans ces conditions, il ne donne aucune indication au prospecteur qui opère par la méthode exclusivement physique, celle qui fait l'objet du présent cours.

(1) Voir page 229 : « Procédés de la *Méthode Mentale* ».

Position électro-radio-magnétique : Par contre, quand le plan médian vertical de l'anneau coïncide à peu près avec le méridien magnétique Nord-Sud, et que l'on fait osciller l'appareil dans ce plan, l'enroulement est parcouru par un courant électrique induit par le magnétisme terrestre (Expérience de Faraday) ; ainsi le Schumfell devient momentanément électrique, et convient à notre **Méthode Physique**.

Son fonctionnement est le même que celui du pendule sphérique neutre noir P.S. ; même manière de le suspendre, de le régler expérimentalement ou d'après le Tableau des mesures automatiques millimétriques, pages 96 à 99. Toutefois, il exige en plus, en cours de perception, le maintien constant de son anneau dans le sens Nord-Sud magnétique ; c'est ce que l'on appelle « orienter le Schumfell ».

Avant d'orienter le Schumfell par le moyen de sa boussole centrale, dans le sens Nord-Sud magnétique, l'opérateur vérifiera s'il n'y a pas dans le voisinage de masse métallique importante (objets de fer ou un champ magnétique,




Fig. 51

1^{er} TEMPS : Réglage millimétrique de la longueur du fil de suspension.

tel qu'un aimant, ou encore trop à proximité d'un champ électrique constitué par un circuit électrique fermé), susceptible d'influencer fâcheusement l'aiguille de la boussole de l'instrument. On s'en rend aisément compte en se déplaçant en plusieurs endroits dans la même salle ; à chaque vérifi-




Fig. 52

2^{me} TEMPS : Léger balancement du pendule dans l'orientation Nord-Sud magnétique de l'anneau.

cation, l'aiguille de la boussole doit prendre exactement la même orientation. Cette précaution est signalée à titre indicatif, car dans la pratique, le cas se présente rarement.

On orientera ensuite correctement le Schumfell sur le Nord-Sud **magnétique**, c'est-à-dire que l'on placera la pointe bleue de l'aiguille de la boussole à 340° environ du cadran, soit 20° environ à gauche de la lettre N (Nord), qui est à 360° , indiquant le Nord géographique.




Fig. 53

3^{me} TEMPS : Giration positive du pendule, sur l'argent, avec maintien de l'orientation Nord-Sud magnétique de l'anneau.

Ainsi orienté Nord-Sud magnétique, et réglé, par exemple, sur une pièce de monnaie d'argent, le Schumfell tournera positif, si la main de l'opérateur est positive.

S'il tardait à se mettre en mouvement de lui-même, l'aider légèrement en le faisant balancer imperceptiblement dans le plan médian de l'anneau, soit dans le sens A, B, C, D, de la figure 52, qui sera la direction $340^\circ/160^\circ$. Ensuite, tout en conservant cet orientation Nord-Sud magnétique de

l'anneau, il prendra lentement, à son aise, son sens normal de giration, en un laps de temps plus ou moins court, suivant la sensibilité de l'opérateur, et lorsque celui-ci aura obtenu la mesure exacte de réglage du fil.

L'utilisation des réglages automatiques millimétriques du Tableau d'identification est recommandable avant la suspension du Schumfell. Bien réglé préalablement, il prend aussitôt sa giration normale.

En ce qui concerne la précision donnée par le Tableau de mesures automatiques millimétriques, il convient, comme nous l'avons recommandé pour le Pendule neutre sphérique P.S., de toujours compter avec l'équation personnelle de chaque opérateur. Si la rotation franche et large du Schumfell se faisait attendre, il faudrait augmenter ou diminuer, tout au plus d'un millimètre, le chiffre indiqué, jusqu'à ce que l'on ait obtenu une giration maximum.

QUELQUES PHÉNOMÈNES de MICROPHYSIQUE, d'UTILITÉ PRATIQUE

QUATORZIÈME LEÇON

LIGNES ET PLANS FLUIDIQUES

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique »,
pages, 97, 98, 103, 110 et 113)

Nous substituons l'expression **lignes et plans fluidiques** à celle de **lignes et plans radiesthésiques**, employée par beaucoup d'auteurs, parce que nous jugeons cette nouvelle désignation mieux appropriée.

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

1° Plans fluidiques de la croix magnétique. L'action de la charge magnétique terrestre provoque dans chaque objet la formation de deux plans verticaux orthogonaux orientés N.-S. et E.-O. magnétiques, qui se croisent en un point de cet objet qui ne paraît pas être son centre de gravité et qu'il sera intéressant de déterminer un jour. Ces plans qui sont parcourus par des rayons spécifiques de l'objet à support MS sont sensibles à une certaine distance




Fig. 54

tant dans le sens horizontal que dans le sens vertical. Ce sont les plans de la Croix magnétique. La polarité des rayons MS varie dans les diverses branches de la Croix ; elle dépend de la polarité du corps et de la position de son plan fondamental.

Ces plans peuvent être utilisés après le coucher du soleil pour la recherche d'un objet perdu dont on connaît l'emplacement approximatif.

Là où la boussole est déviée par des conditions locales, la Croix magnétique subit une déviation strictement égale.

2° Plans fluidiques d'un aimant ou d'un corps aimanté. L'action de la charge magnétique terrestre développe sur un aimant rectiligne un plan vertical qui, si la charge magnétique de l'aimant est assez puissante, peut




Fig. 55

être sensible à très grande distance : 30, 60, 120 kilomètres. Les rayons spécifiques entraînés sont à support ω . (Se reporter au besoin à l'ouvrage « Radiesthésie Méthode Physique », page 96).

C'est la propriété de ce plan qui a été mise à profit dans le Percepteur Brard et Gorceix. Ce plan passe par chacun des pôles de l'aimant.

Si l'objet, au lieu d'être rectiligne, est d'une forme plus compliquée, le plan peut être double. Exemple : Aimant en fer à cheval, cafetière en nickel.

3° Plan fondamental: Nous ne reviendrons pas sur le Plan fondamental sur lequel nous nous sommes suffisamment étendus à la 11^{me} Leçon, page 110. C'est un plan fluide à direction unique.

4° Plans photogéniques. (Voir « Radiesthésie Méthode




Fig. 56

Physique », pages 110 à 113). Sous l'action électrique et magnétique de la lumière, un corps C éclairé par une source S donne lieu à la formation de trois plans fluidiques, l'un en alignement de la source lumineuse et de l'objet, les deux autres obliques. Ces plans émettent des rayons spécifiques de l'objet à support divers ES et MS, et RS. Le plan central ou plan lumineux (plan solaire, si la source utilisée est le soleil) est beaucoup plus sensible que les plans latéraux.

Exercices :

75. Chercher la **Croix magnétique** d'objets divers, et de formes diverses. A titre d'exemple, disposons un objet quelconque sur une table. Réglons notre pendule sur les rayons spécifiques de cet objet : une pièce de monnaie d'argent. Cherchons à l'aide de la boussole le méridien magnétique Nord-Sud (340° environ), passant par ce corps, et constatons l'existence des **quatre champs** orthogonaux de la **Croix magnétique** (de polarité différente). On se rappellera que ces quatre champs sont dirigés vers les quatre points cardinaux magnétiques Nord, Sud, Est et Ouest.

76. Constater que ces champs s'étendent très loin.

77. En conservant la disposition précédente sur une table de bois, qui est un excellent milieu conducteur, constatons, à l'aide de la pointe-antenne, que la **tache radiesthésique** de l'objet empêche de saisir ses **images** au niveau de cette tache. Constatons aussi qu'il suffit d'élever la pointe-antenne de quelques millimètres pour rencontrer ces images.

78. Se rappeler que si l'on veut tracer commodément le contour de cette tache, il convient de placer l'objet sur une glace de verre, ou une assiette de porcelaine, l'un et l'autre mauvais conducteurs. Pour plus de précision, utiliser toujours la pointe-antenne pour suivre les nappes d'émission.

79. Enterrer un objet dans un pot de fleurs et constater que sa Croix magnétique existe toujours.

80. Faire enterrer un objet par un aide dans un espace restreint de 4 à 5 m², et retrouver son emplacement par la Croix Magnétique.

81. Constater, à l'aide d'un réglage sur rayons « que le plan fluïdique d'un aimant rectiligne s'étend à très grande distance.

82. Rechercher les plans fluïdiques d'un corps aimanté, cafetière de nickel, par exemple.

83. Se rappeler que le rayonnement solaire rejoint tous les corps sur une ligne droite, à support à la fois lumineux, électrique et magnétique. On sait également que lorsque le soleil est caché, le support perd sa propriété lumineuse, mais exerce ses propriétés électriques et magnétiques, sorte de rayons obscurs suffisants pour permettre la prospection radiesthésique.




Fig. 57

Perception du rayonnement solaire entre le soleil et tout objet

84. En un premier procédé, poser une pièce de monnaie d'argent sur une table, de manière que vous puissiez tourner le dos au soleil d'une part, et avoir face à vous, à trois mètres par exemple, la pièce de monnaie. Réglez alors votre pendule sur l'argent, en lui adjoignant comme « témoin » une deuxième pièce d'argent. Essayez de percevoir le rayon-

nement existant entre la pièce et le soleil. Vous y arriverez dès que votre pendule tournera, sans regarder la pièce.

85. Cet alignement acquis, suivre sa direction en cherchant de temps en temps si, sur la ligne perpendiculaire, vous ne rencontrez pas les rayonnements C M et C N, dont les acheminements se rejoignent sur la pièce de monnaie. Constatez que le pendule tournera lorsque vous les percevrez également.

86. Par un **deuxième procédé**, recommencer la même expérience, en plaçant la pièce de monnaie d'argent entre le soleil et votre pendule réglé et comportant « témoin ». Constatez que la giration du pendule se produira lorsque vous serez exactement dans ce prolongement.

87. Réalisons le dispositif « **Rayon photogénique** » et vérifions l'existence des **trois champs** dans lesquels se propagent les rayons spécifiques du corps C.




Fig. 58

Les champs du rayon photogénique

QUINZIEME LEÇON

LES CHAMPS FLUIDIQUES

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique »,
pages 85, 98, 99, 104

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Les **champs fluidiques** sont des espaces limités par des surfaces définies dans lesquels se propagent, en suivant des trajets qui ne sont pas toujours rectilignes, des ondes servant de support aux radiations spécifiques des corps autour desquels ils se forment.

Suivant la nature de leur support, nous classerons ces champs en champs $ES+$ ou $ES-$, en champs $MS+$ ou $MS-$, champs « $\cup$ », champs à support lumineux, champs à support nerveux, etc... Un même phénomène donnant souvent lieu à la production simultanée de champs de plusieurs espèces, nous étudierons successivement, non point tous les champs connus d'une espèce déterminée, mais, au contraire, tous les phénomènes donnant lieu à la production de champs dont nous indiquerons chaque fois l'espèce et la particularité. Toutefois, les champs d'une même catégorie présentant des caractères communs, nous allons, tout d'abord, examiner ces caractères communs, avant de procéder à la description successive des phénomènes eux-mêmes.

Champs ES. : Les rayons spécifiques électro-magnétiques des corps se propageant dans un champ ES sont arrêtés par un isolant électrique (verre, porcelaine, ardoise, papier sec, etc...) sur lesquels ils se réfléchissent pour prendre une direction nouvelle. Celle-ci dépend à la fois de la forme

de la trajectoire qu'ils parcouraient et de celle de la surface réfléchissante.

Champs MS. : Les rayons circulant dans un champ MS paraissent s'éteindre à partir de leur point d'émission si, sur leur parcours, on interpose une plaque de fer. On ne constate aucun phénomène de réflexion. Toutefois, l'action extinctrice de l'écran fer n'est que passagère, et prend fin dès que la plaque est suffisamment saturée de magnétisme, ce qui arrive assez rapidement.




Fig. 59

Croix magnétique d'un disque de cuivre

Ce réglage a été opéré sur le support, c'est-à-dire par réglage sur le Magnétisme.

Si le réglage avait été fait sur le rayon spécifique, la polarité aurait été, pour le cuivre ou l'argent, positive. Elle aurait été négative pour le nickel. Ainsi, le nickel aurait donné : Sud+, Ouest+, Est—, Nord—.

Champs ω : Les rayons se propageant dans un champ ω sont arrêtés, mais, à partir de cet écran seulement, par un barrage en papier cellophane sur lequel ils se réfléchissent.

Citons encore :

1° Le Champ de la Croix magnétique. Ce champ limité par des plans horizontaux et verticaux parallèles se développe sous l'action de la lumière autour des plans de la Croix magnétique d'un corps éclairé. Il disparaît quand le corps tombe dans l'obscurité en même temps que les familles d'images qui s'y forment.

On remarquera que les branches de la Croix de ce champ sont inégales.

2° Le Champ du Plan fondamental. Indiqué ici pour mémoire. (Voir 11^{me} Leçon).

3° Le champ fluide d'un aimant rectiligne. C'est un cône ou une pyramide à angle très peu ouvert qui se développe autour des lignes fluidiques de l'aimant. Ce champ est permanent.

Les rayons ω , qui s'échappent de chacune des extrémités d'un aimant droit, déterminent, du côté de chaque pôle, la formation d'un champ ω de grande distance (1 kilomètre environ pour un aimant de 4 millimètres de section et de 0,10 cm. de longueur), limité par le contour d'un tronc de pyramide quadrangulaire de très faible ouverture, ayant pour base la section droite de l'aimant. A ces deux champs de grande longueur (a et b de la figure 60) s'ajoutent deux autres petits champs très courts, c et d, de même force, mais plus ouverts, de 0,03 à 0,04 centimètres de longueur seulement.

Dans chacun de ces champs étendus (a et b), les rayons ω exportent des rayons MS auxquels ils servent d'ondes porteuses, rayons MS + du côté du pôle positif, MS — du côté du pôle négatif, et, dans chacun des champs latéraux (c et d) des rayons MS de polarité différente dont le signe respectif paraît dépendre de l'orientation de l'aimant.

Ces rayons MS, à leur tour, servent de support aux ondes spécifiques de tout corps inclus dans l'un des champs et dont le rayonnement peut, ainsi, être senti en tout point non seulement de ce champ, mais encore des trois autres.

On conçoit le parti qu'il est possible de tirer de cette propriété pour la perception à grande distance.


La portée du champ étendu d'un aimant est centuple de celle de son champ restreint, dont il va être question en 5°.

Les corps aimantés de forme plus compliquée que celle de l'aimant droit, donnent lieu à la formation autour de leurs lignes fluidiques de champs analogues.

4° Les champs du Rayon d'Union : Indiqués ici pour mémoire. (Voir à la 16^{me} Leçon).

5° Les champs fluidiques restreints d'un aimant droit : Il existe, du côté de chacun des pôles d'un aimant rectiligne, une zone ayant la forme d'un tronc de paraboloïde elliptique aplati dans le sens horizontal, et que nous nommerons zone de sensibilité, dans laquelle se propagent les rayons spécifiques de tout corps tel que A qui y pénètre (Fig. 62).

Ce paraboloïde est d'autant plus allongé que l'aimant a plus de portée. Il s'arrête brusquement à une certaine distance fixe SQ du pôle obturé (Fig. 62). Ce champ existe pour chacun des deux pôles (Fig. 61), et ses parties communes constituent une région neutre dans laquelle le pendule oscille.



Champ étendu et rayons ω exportant des rayons MS+ qui, à leur tour, servent de support aux ondes spécifiques de tout corps inclus dans l'un des champs.

Champ étendu et rayons ω exportant des rayons MS—.

Fig. 60

Champs étendus et latéraux d'un aimant droit.

La formation simultanée autour d'un aimant de deux champs radiesthésiques distincts, champ étendu et champ restreint empiétant l'un sur l'autre, a paru longtemps invraisemblable ; et la perception différente de l'un ou de l'autre, suivant les observateurs, a été, tout d'abord, attribuée à des raisons tout à fait subjectives (1). Elle s'explique parfaitement, aujourd'hui, par le fait que les ondes MS, qui circulent dans les deux champs, n'y jouent que le rôle secondaire d'ondes portées, et que les ondes-supports qui les entraînent, rayons ω dans le champ étendu, rayons ρ dans le champ restreint, sont absolument différentes. Pour un opérateur qui travaille avec un pendule réglé sur rayons MS, la distinction est difficile à observer ; mais, s'il travaille successivement avec un pendule réglé d'abord sur rayons ω , puis sur rayons ρ , il obtiendra avec la plus grande facilité la délimitation successive des deux champs.

Ceci établi, on comprendra que si nous voulons, à l'aide d'un aimant, explorer une direction donnée, celle vers laquelle est orientée l'extrémité correspondant à son pôle Nord, nous devons supprimer la possibilité d'une indication provenant de toute autre direction (arrière, côtés, dessus ou dessous de l'aimant). Nous obturerons donc l'extrémité pôle Sud avec un bouchon de nickel (Fig. 63) et nous entourerons le milieu de l'aimant d'une double ceinture de cuivre (métal positif) et de nickel (métal négatif), afin d'annihiler l'action des champs c et d (Fig. 60).




Fig. 61

Les deux troncs de paraboloides de sensibilité d'un aimant droit

(1) L'existence des deux champs étant connue, on peut, avec un pendule réglé sur les ondes du corps prospecté et, en opérant par sélection mentale, éliminer les indications qui proviennent de l'un d'eux.

A l'occasion de cette étude sur l'aimant droit, rappelons que, d'une part, les pôles de noms contraires s'attirent et ceux de noms semblables se repoussent ; d'autre part, que l'on est convenu d'appeler pôle Nord de la boussole ou d'un aimant droit, l'extrémité qui est attirée vers le pôle Nord Magnétique de la Terre. Cette extrémité émet des rayons $MS+$.




Fig. 62

Tronc de parabolôide de sensibilité d'un aimant droit




Fig. 63

Obturation de l'extrémité et revêtement
du milieu d'un aimant droit

Mais précisément parce qu'il attire le pôle Nord de la boussole, le pôle boréal est négatif et émet des rayons $MS-$. De même, le pôle Sud de la boussole ou d'un aimant droit, qui émet des rayons $MS-$, est attiré vers le Sud de la Terre. Pour la même raison, le pôle Austral de la Terre est positif.

Il en résulte que le pôle Sud de la Terre est positif ; mais le pôle Sud de l'aimant ou de la boussole est négatif.

On pourra vérifier l'exactitude des polarités des extrémités

de l'aiguille d'une boussole, ou des extrémités d'un aimant, en réglant le pendule sur rayons MS.

En cas d'échec, effectuer le contrôle qui pourra se faire à l'aide du « témoin de polarité » qu'offre la pile de poche, même usagée. Le pôle positif d'une pile de poche est, généralement, pour les piles de fabrication française, sur la lame la plus courte.




Fig. 64




Fig. 65




Fig. 66

Le pendule étant réglé sur les rayons MS et suspendu sur le pôle présumé Nord de l'aimant droit, toucher avec le majeur de la main gauche le pôle positif de la pile de poche. Si le pendule se trouve bien sur le pôle Nord de l'aimant, il continuera à tourner ; si, au contraire, on touche le pôle négatif de la pile, il se mettra à osciller.

Le majeur étant le seul doigt neutre au point de vue de l'émission de l'onde sympathique, qui dans les autres doigts est alternativement positive et négative, il est tout indiqué de l'utiliser pour le contrôle de polarité.

6° Auréole d'un corps aimanté. Indiqué ici pour mémoire. (Voir Chapitre I^{er}, § 3).

7° Champ du Triangle Photogénique. Indiqué ici pour mémoire. (Voir Chapitre VI, Images ERM).

Exercices :

88. Se placer, le soir, dans une chambre éclairée à l'électricité et rechercher à l'aide d'un pendule réglé sur les rayons spécifiques d'un objet choisi, placé sur une table, les limites du champ de la Croix magnétique de cet objet.

89. Constater que si on éteint la lumière le champ s'évanouit.

90. Faire la même expérience sur la trace horizontale du plan fondamental de cet objet.

91. Constater que ce champ est permanent et subsiste dans l'obscurité.

92. Constater avec le pendule sphérique neutre P.S. exclusivement (parce que non magnétique), réglé sur MS, la polarité des deux pôles d'un aimant droit ou en fer à cheval. (Voir page 69 : Réglage sur le magnétisme).

93. Constater avec le même pendule, réglé sur ES, la polarité des deux pôles d'une pile de poche, même usagée. (Voir page 69 : Réglage sur l'électricité).

94. Vérifier l'exactitude des polarités des extrémités de l'aiguille d'une boussole, ou des extrémités d'un aimant à l'aide du « témoin de polarité » qu'est la pile pour vérifier l'aimant, et qu'est l'aimant pour vérifier la pile.

95. Rechercher les limites du sextuple champ photogénique d'un objet éclairé.

LE RAYON D'UNION

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Par le fait d'une action réciproque, deux corps de même substance émettent l'un vers l'autre des rayonnements spécifiques interférant (1) en un point particulier de la droite qui les joint. (Fig. 67).

Ce point, très important, est appelé **point neutre**. Si l'on suppose ces deux corps de très petites dimensions, réduits par exemple, à des points matériels A et B, et que l'on promène sans regarder ces corps un pendule réglé le long de la droite A B, on constate qu'il tourne en chacun des points de cette droite, sauf au point N où il oscille normalement à sa direction. On donne à ce phénomène le nom de **rayon d'union**.



Fig. 67

Si les masses des deux corps sont égales, le point neutre se trouve rigoureusement au milieu de leur distance. Si elles sont inégales, il est rejeté vers la plus petite. Entre les masses M et m des points A et B, et les distances D et d qui les séparent du point neutre, il n'y a pas proportionnalité, mais relation plus compliquée représentée graphiquement par une courbe logarithmique. Cette relation, d'ailleurs, est **indépen-**

(1) Nous donnons l'hypothèse de l'interférence qui explique commodément le phénomène, mais qui est loin d'être vérifiée.

dante (1) de la substance des corps et ne dépend que du rapport de leurs masses.

Le rayon d'union a une très grande importance pratique en radiesthésie. Il est utilisé pour l'identification des corps, la recherche des objets cachés, pour le diagnostic médical et vétérinaire, et en particulier le diagnostic microbien, avec la balance pendulaire pour les dosages de précision et avec le perceur BG pour les recherches à distance.

Mais si nous l'examinons en détail, nous constatons que ce phénomène est un peu plus complexe qu'un examen sommaire ne pourrait le faire supposer. Un réglage sur l'électricité nous permet d'observer, par exemple, que le pendule tourne positivement de A à N, et négativement de N à B.

Nous sommes donc en présence de deux champs ES, de polarité différente, ayant le plan neutre comme plan tangent commun.

La figure 39, page 101 de « Radiesthésie Méthode Physique », indique pour deux pièces de monnaie posées sur une table horizontale la forme de la 1/2 section verticale de ces champs.

La forme de la section horizontale est analogue.

En somme, ces champs ont la forme de deux poires réunies par leur base.

Le plan neutre (2) est vertical et sa trace horizontale fait avec la droite AB un angle d'autant plus aigu que le rapport des masses diffère davantage de l'unité.

Les rayons spécifiques des corps A et B paraissent se propager dans chacun des deux champs en deux mouvements indépendants et sans dépasser le plan neutre.

En outre du double champ ES, il se produit entre les deux corps un champ MS limité horizontalement par des plans verticaux et de faible hauteur. Ce champ comporte un double point neutre.

(1) Ce fait n'a rien de surprenant, le rayon d'union, comme on le verra, étant, avant tout, un phénomène d'ordre électrique et magnétique.

(2) Il y a lieu d'observer que le plan neutre est vertical, quelle que soit l'inclinaison de la droite AB. Si cette droite est elle-même verticale, le plan neutre devient horizontal.

Si entre les deux corps A et B nous interposons un isolant électrique, les champs E_S s'éteignent, mais le champ M_S qui, seul, subsiste nous permet encore de percevoir le rayon d'union à faible hauteur.




Fig. 68

Champs ES dans la formation d'un rayon d'union




Fig. 69

Augmentation de la portée du rayon d'union par un aimant




Fig. 70

Rayon d'union le long d'un conducteur

Les champs du rayon d'union ont la forme de deux poires accolées et séparées par le plan neutre. La figure 68 représente la section horizontale de ces champs ; la verticale est analogue.

Exercices :

96. Etablir le rayon d'union entre deux pièces de monnaie d'argent de même masse, c'est-à-dire de même poids, et chercher le point neutre, le pendule étant dans la circonstance réglé sur l'argent.

97. Chercher le point neutre entre deux pièces de monnaie d'argent de grandeurs, donc de poids différents. Observer alors où se place le point neutre. Constater qu'il se rapproche de la plus petite pièce, qui représente le plus petit poids.

98. Constater au moyen de réglage sur l'électricité (sur pile de poche) (1) l'existence et la polarité différente des champs électriques (ES), séparés par le plan neutre unique.

99. Constater, après réglage sur le magnétisme (sur aimant), l'existence du champ magnétique (MS) reliant les deux corps.

100. Chercher les deux points neutres de ce champ magnétique.

101. Constater que l'interposition d'un écran isolant vertical électrique (verre par exemple) supprime les deux champs ES, mais laisse subsister le champ MS à double point neutre.

102. Constater que l'interposition d'un écran métallique (plaque de cuivre par exemple) laisse subsister le double champ électrique et son point neutre unique, mais qu'il ne s'y propage aucun rayon spécifique des corps étudiés (l'argent dans la circonstance).

1) Voir page 69 les particularités concernant l'électricité et le magnétisme.

103. Constater que si cet écran métallique de cuivre est remplacé par une plaque de fer, le champ MS disparaît.


104. Fixer au besoin au moyen de pinces en bois de blanchisseuse, sur une règle plate de dessinateur (dont le milieu aura été indiqué par un trait transversal) deux pièces de monnaie d'argent de même poids, également écartées du trait. Constater que le pendule oscillera sur le trait, c'est-à-dire sur le plan neutre. Mettre ensuite ce trait sur la verticale d'un objet en argent (3^{me} pièce d'argent de même poids), autrement dit glisser ce troisième objet d'argent sous la règle plate, à l'endroit de ce trait. Constater que le pendule, réglé sur argent, tournera en ce point, au lieu d'osciller, le point neutre disparaissant par suite du phénomène du **triangle d'union**. Cette particularité apporte un grand intérêt dans la prospection.

105. Prenons la même règle plate, ayant toujours les pièces de même poids à leur extrémité. Sur le milieu de cette règle, le pendule réglé sur l'argent, oscillera, comme nous l'avons constaté. Elevons-la verticalement jusqu'à ce qu'elle se trouve au niveau d'un 3^{me} objet, par exemple en cuivre (pièce de monnaie en cuivre). Constater que lorsque le trait horizontal rencontrera l'objet, le point neutre réapparaîtra et que le pendule se mettra à osciller. L'essentiel est que le 3^{me} objet soit d'une substance différente des deux substances semblables aux deux extrémités de la règle plate. Cette autre particularité constitue un autre grand intérêt pratique.

106. Plaçons deux pièces de monnaie de nickel dans deux boîtes d'aluminium identiques (boîtes d'aluminium pour savon de toilette de voyage, par exemple) et réalisons avec un fil de coton (ou de cuivre) le dispositif **rayon d'union le long d'un conducteur**, et cherchons le point neutre le long de ce fil qui peut être disposé en serpent.

107. Tracer à l'aide du pendule la trace horizontale des champs du rayon d'union de deux pièces de nickel de grandeur différente, placées sur une table, aux deux extrémités d'une grande feuille de papier blanc.

108. Chercher sur la même feuille de papier, les limites du champ magnétique du rayon d'union à double point neutre à l'aide d'un pendule réglé sur rayons MS (magnétisme). Ce champ a la forme d'un rectangle. Il est de faible hauteur. (Fig. 71).



Champs MS dans la formation du rayon d'union

Pour rendre, pour ainsi dire, plus visibles, les nappes d'émission et les champs ainsi perçus soit au pendule, soit au doigt en antenne, il y a intérêt à se familiariser avec l'emploi d'une **pointe-antenne**. Il s'agit, comme nous l'avons déjà dit, simplement d'une tige le plus souvent métallique, très finement appointée, que l'on promène par la pointe, de la main libre gauche, très verticalement, dans les champs en question. Le pendule, toujours suspendu par la main droite, opère ses réactions un peu à l'écart, sa masse devant être loin du corps de l'opérateur, et maintenue à la hauteur de la pointe de la pointe-antenne. Ainsi le débutant se rendra un compte plus exact des modalités des divers phénomènes et sera contraint à prendre l'habitude de la précision.

LE RAYONNEMENT RADIO-ACTIF DES CORPS L'AXE SPÉCIFIQUE DES CORPS SIMPLES

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique » pages 92 et 95)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Ainsi que nous l'avons rappelé au Chapitre 1^{er}, § 5, page 15, les corps radioactifs émettent trois sortes de rayons, des rayons corpusculaires α (atomes d'hélium), des rayons corpusculaires β (électrons), et des ondes électro-magnétiques γ . Les deux premiers sont de longueur limitée. On reconnaît les rayons α à l'aide du pendule réglé sur l'hélium (onde associée au corpuscule), et pour la même raison les rayons β à l'aide du pendule réglé sur rayons ES (onde associée à l'électron).

Parmi les rayons γ , seuls les rayons RS sont le produit de la désintégration des corps; les rayons θ v. ζ sont l'émanation du champ électrique négatif qui se produit à l'intérieur de tout corps radioactif.

Livré à lui-même, le faisceau de ces trois radiations se présente de façon très variable. Mais si nous faisons agir, sur un fragment de corps radioactif, un champ magnétique négatif, les trois radiations se séparent.

Les rayons α s'échappent dans le plan fondamental de la substance radioactive, dévié par le champ magnétique; les rayons β dans le PFE (voir 11^{me} Leçon) correspondant.

Les rayons RS sont analogues à la chaleur (rayons CL); jusqu'à une certaine intensité, ils sont bienfaisants. Ce n'est qu'à partir d'un certain chiffre qu'ils sont nuisibles. Ils sont émis par les êtres vivants et accompagnent l'onde vitale, ce qui semble prouver qu'ils sont produits par le travail cellulaire. Ils jouent un rôle important dans la vie végétale et la santé.

Emis par un champ électrique négatif, les rayons θ , à double polarité, devraient être négatifs. Le fait qu'ils sont positifs, θ^+ , constitue une anomalie, dont on n'a pu encore découvrir la raison.

Corps non radio-actifs. Ainsi que les physiciens l'ont signalé depuis longtemps, les corps dits non radioactifs, le sont à un degré infinitésimal. Ils émettent eux aussi des rayons α , β , γ , mais à une intensité tellement faible que le pendule a de la peine à les saisir. Pour séparer ces rayons, point n'est besoin d'un champ magnétique négatif étranger. Le champ magnétique terrestre négatif y suffit.

Sous l'action de ce champ, les rayons α s'échappent dans le plan fondamental du corps, les rayons β dans le PFE. Pour nos lecteurs pourvus d'un bagage scientifique, nous ajouterons que c'est dans le plan prolongeant le PFE que s'échappent, sous l'action de la lumière, les électrons mis en mouvement par le phénomène photoélectrique.

Les rayons α , de longueur limitée, s'échappent en un seul faisceau filiforme que nous nommons provisoirement l'axe spécifique du corps. De quelques expériences il semble résulter que cet axe, dirigé vers le ciel pour les corps positifs, et vers la terre pour les corps négatifs, fait, pour chaque substance, un angle constant avec la verticale. Mais le nombre des expériences faites par nous est encore trop faible pour que nous puissions en déduire une loi et l'identité de cet axe avec l'axe Baradat.

Le rayonnement radioactif joue un rôle primordial dans la production des images RA sous l'action de la lumière.

Exercices :

109. L'argent a son plan fondamental (Pf) orienté à l'Ouest magnétique. Son angle fondamental est donc 90° . Par suite, son PFE est orienté vers le Nord.




Fig. 72

Champ du Pf d'une pièce d'argent

110. Constater avec un pendule réglé sur l'Hélium qu'une pièce de monnaie d'argent, par exemple, émet des rayons α dans la direction de l'Ouest magnétique. Avec le pendule réglé sur rayons ES, qu'elle émet ces rayons dans la direction du Nord, et si elle est éclairée, également dans la direction du Sud (phénomène photoélectrique) (Fig. 72).

111. Ajoutons que les rayons β sont toujours accompagnés de rayons θ^+ , γ , ζ , ce qui fait que les physiciens les considèrent comme nocifs.

DIX-HUITIEME LEÇON

AMPLIFICATION PAR L'ACTION DE LA RADIO-ACTIVITÉ

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 92 et 95)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Si, sur une pièce de monnaie d'argent, par exemple, posée sur une table, nous plaçons un fragment d'un corps quelconque radioactif (petit morceau de pechblende), nous constatons que les rayons spécifiques verticaux d'argent, émis par la pièce, la dépassent de beaucoup et que, à ce point de vue la pièce d'argent semble avoir pris les dimensions d'une assiette.




Fig. 73

Pièce de monnaie d'argent surmontée
d'un morceau de minéral de pechblende

C'est que, par le contact d'un corps radioactif, la pièce d'argent est, elle-même, devenue radioactive ; il s'agit d'un phénomène de radioactivité par influence, ou mieux, par induction.

Cette expérience montre que réciproquement lorsqu'un objet repose sur un terrain radiactif, son poids, au point de vue radiesthésique s'entend, se trouve multiplié et il paraît beaucoup plus important qu'il n'est en réalité. Il en est de même de ses dimensions.

Ainsi, dans la prospection pratique, le périmètre d'un gisement de phosphates situé en terrain radioactif, se trouverait considérablement agrandi, et, pour n'avoir pas de mécompte, le prospecteur aura toujours intérêt à faire ses premiers sondages au centre plutôt qu'à la périphérie.

Nous savons que l'air enfermé dans une enceinte close s'ionise et devient radioactif. Tout objet enfermé dans une telle enceinte devient radioactif et se trouve amplifié (grotte souterraine, cavité profonde).

En faisant l'expérience sur le même objet enfermé successivement dans des boîtes de dimensions différentes, on constatera ce fait assez curieux que l'amplification est identique, quelles que soient les dimensions de l'enceinte.

Pour les expériences sur la radioactivité, utiliser un petit morceau de pechblende, minerai dont l'étude a conduit P. Curie, Mme Curie et G. Bémont à la découverte du radium. Ce minerai est parfois appelé péchurane. A défaut de ce minerai utiliser la bêtafite, autre minerai de radium, ou encore les granulites et serpentines du Limousin, ou des solutions titrées de sels de radium.

A défaut d'un de ces minerais radioactifs, un flacon vide bouché depuis quelque temps suffira. Le vide ou creux est, en effet, radioactif. Il en est de même pour une pile électrique de poche. Si vous utilisez pour pendule le Révélateur Schumfell, il convient de se rappeler que le plomb arrête les rayons radioactifs, et d'exercer de constants contrôles des réglages de fil adoptés. Voir au Tableau d'identification, page 98, les réglages au Pendule neutre P.S. et au Révélateur Schumfell, sur la radioactivité (rayons RS). Ces rayons toujours positifs font partie du groupe des rayons γ des physiciens.

Exercices :

112. Poser sur une pièce de monnaie d'argent un morceau de minéral de pechblende (ou péchurane, ou de bêtatite, ou granulites ou serpentines du Limousin, ou des solutions titrées de sels de radium, etc...) et constater l'amplification des rayons spécifiques de la pièce d'argent, qui normalement devraient être limités au périmètre de cette pièce.

112^{bis}. Le même résultat peut être atteint comme suit : Placer la pièce de monnaie d'argent, qui est de polarité positive, sur une large plaque de cuivre (épaisse ou mince, peu importe), d'environ 30X30 centimètres, carrée de préférence, et poser votre médus gauche sur la branche positive d'un aimant, ou sur le pôle positif d'une pile de poche. Si le corps étudié (pièce d'argent, en la circonstance) était de polarité négative, le médus gauche serait, au contraire, posé sur la branche négative d'un aimant, ou sur le pôle négatif d'une pile de poche, même usagée.

113. Le vide ou creux étant radioactif, constater en enfermant la pièce de monnaie d'argent dans une boîte de carton hermétiquement fermée depuis quelques minutes, que les rayons spécifiques de cette pièce se trouvent également considérablement agrandis, élargis.

114. Faire la même expérience avec plusieurs boîtes semblables de dimensions différentes, pour constater que dans chaque cas, l'amplification demeure identique.

LES ONDES DE FORME

DOCUMENTATION

Si nous ne faisons pas erreur, l'existence des **ondes de forme** a été signalée pour la première fois au public dans l'ouvrage de M. H. Chrétien : « Le Monde invisible des ondes ». La question a été ensuite développée avec ampleur dans l'ouvrage de MM. Chaumery et Belizal : « La Physique radiesthésique ».

Chaque objet d'une forme géométrique bien déterminée émet une onde spéciale, toujours la même, quelle que soit la substance dont il est composé. C'est l'**onde de forme**, attachée à la forme géométrique.

Ainsi, une boule, qu'elle soit en bois, en fer, en grès ou en ivoire, émettra l'onde de forme de la sphère ou rayons SPH. Il en sera de même du cube, du parallépipède rectangle, de l'ellipsoïde, de l'œuf, etc...

L'onde de forme a ceci de particulier qu'elle est généralement très puissante, mais très courte et le plus souvent nuisible à la santé. Les Egyptiens ont utilisé cette dernière propriété pour défendre le tombeau des Pharaons ; les objets émetteurs s'étant déformés, les ondes ont perdu une partie de leur nocivité au cours des siècles.

L'onde de forme du plan (parallépipède rectangle aplati) a cela de particulier qu'elle diffère suivant que le plan est coloré d'une couleur électrique ou d'une couleur magnétique (1). Les propriétés des dernières ont été utilisées pour la recherche du nombre particulier des substances.

(1) Les couleurs électriques sont le bleu, le violet. Les couleurs magnétiques, sont le blanc, le rouge, l'orangé ou le jaune, le vert.

On peut se demander pourquoi un pendule à masse sphérique, genre de notre pendule sphérique neutre noir P.S., n'est pas autoréglé. La raison en est bien simple, c'est que l'onde PSH est trop courte (7 à 8 millimètres) pour parvenir au récepteur humain. Cette onde s'amortit au bout de quelques millimètres.

Les figures planes, de forme régulière bien déterminée, donnent aussi lieu à l'émission d'ondes de forme, tel que le Pa-Koua et son Yn-Yang.




Fig. 74

Le Yn-Yang

Il en est de même lorsque ces figures sont appliquées sur des surfaces non planes.

L'onde de forme du disque (rayon D_q) a la propriété d'éteindre certaines images à la condition d'en être très proche. (Voir chapitre VI).

Nous donnons ci-après, à titre de curiosité, quelques caractéristiques des rayons SPH, D_q et Yn-Yang.

Rayons SPH. Série : —11. $N=11$ $n=5$.

Réglages : 83,75 — 103,75 — 141,25 — 104,50.

Rayons Dq. Série : —1. $N=3$ $n=1$.

Réglages : 108 — 121,50.

Rayons du Yn-Yang. Série : +5.

Réglages : 88,50 — 106,75 — 144,50 — 180,50.

La question présentant peu d'intérêt pratique pour le débutant, nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet.

Exercices :

115. Une intéressante étude du rayonnement d'une onde de forme en surface peut être faite sur un dessin qui fut probablement le fondement de la radiesthésie chinoise antique : le Yn-Yang.

Si même vous n'avez pas ce dessin sous la main, vous pouvez le reproduire de mémoire sur n'importe quoi, même au crayon. Il représente comme deux poissons accolés, l'un noir et l'autre blanc, chacun possédant un œil.

Régalez avec précision expérimentalement sur l'œil du poisson blanc ci-dessus et constatez la giration négative.

Passez ensuite sur l'œil du poisson noir et constatez l'oscillation.

LES RAYONS TELLURIQUES NOCIFS

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique ».
pages 141 à 151, 96 et 97)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Depuis la publication de l'ouvrage « La Radiesthésie expliquée et pratiquée par la Méthode Physique », en 1938, il est survenu au sujet des rayons telluriques une découverte de grande importance. M. François Orcel a révélé que les ruisseaux souterrains sont de deux catégories bien distinctes : les ruisseaux arsénicaux et les ruisseaux fluorhydriques. Sauf exception, l'arsenic et le fluor sont dans les deux cas présents à une dose infinitésimale, que l'analyse chimique est incapable de révéler. On trouvera le sujet développé dans les ouvrages de M. Orcel.

Après s'être rappelé l'avertissement de Pasteur : « Avec l'eau nous buvons 90 % de nos maladies », notons que le rayonnement vertical des premiers (arsénicaux) est favorable à la santé des êtres vivants. Celui des seconds (fluorhydriques) quand il se prolonge pendant des années, amène des troubles très graves, chez les organismes les plus résistants. Les ruisseaux arsénicaux sont les plus près du sol ; les ruisseaux fluorhydriques coulent généralement à une assez grande profondeur (80 à 120 mètres au maximum). Ils sont extrêmement répandus ; on les trouve partout. Ils coulent de l'Est vers l'Ouest.

Dans l'état actuel de la science, les rayons telluriques nocifs sont donc de deux espèces, les rayons γ engendrés par des milieux radioactifs et les rayons fluorhydriques, pro-

venant de ruisseaux chargés de fluor ; les uns et les autres n'étant d'ailleurs dangereux que lorsqu'ils atteignent une certaine intensité.

Les rayons γ (c'est-à-dire les rayons RS, β , ν et ζ) peuvent provenir :

1° D'un sol renfermant des minéraux radioactifs, comme certaines marnes ou ocres, tels que sels de radium, d'uranium, de thorium.

On doit bien se garder de construire sur de tels terrains qui émettent aussi des rayons α .

2° De failles ou de cavités souterraines naturelles. L'air confiné de ces cavités devenant radioactif par ionisation, ces cavités émettent des rayons γ et par endroits des rayons α .

Si leurs parois ou leur fond renferme des sels de radium ou de thorium, elles émettent en outre des rayons β et τ , également nocifs.

3° De souterrains construits par l'homme, galeries ou salles ; ces souterrains n'émettent, sauf exception, que des rayons γ (ν , ν , ζ).

4° De rectangles Peyré ; même émission. (Voir page 19).

5° De ruisseaux souterrains radioactifs. Il s'agit de ruisseaux ayant traversé des terrains radioactifs et imprégnés de leur émission. Comme pour 2°, ces rayons peuvent émettre en sus des rayons γ , des rayons β et τ .

Le sang des personnes ayant séjourné dans une zone irradiée étant imprégné de son émission, on sera averti de leur existence en présentant au-dessus de leur main successivement un pendule réglé sur rayons β ou sur le fluor.

Si l'épreuve est positive, on recherchera la zone, en cherchant à capter l'émission de la zone avec la main libre en antenne et un pendule réglé sur celle des deux radiations supposées (β ou fluor). Une fois l'emplacement découvert, il s'agira d'éliminer son émission au moins aux points les plus dangereux.

Il y a toujours intérêt à installer les dispositifs éliminateurs

de rayons nocifs dans une cave ou un sous-sol, parce que là, ils ne peuvent généralement gêner personne et la protection profite à tous les étages de la maison.

Les procédés d'élimination sont, à notre connaissance, au nombre de trois : la pointe, l'antenne et les écrans.

1° La pointe verticale dirigée vers le sol. Elle a pour effet de capter, dans un certain rayon et jusqu'à sa limite d'action verticale, toutes les radiations qu'elle rencontre et de les éliminer par sa tête.




Fig. 75

Pièce de monnaie surmontée d'un bouchon et d'un clou

Si, au-dessus d'une pièce de monnaie d'argent (Fig. 75) nous plaçons un clou enfoncé dans un bouchon de liège permettant de le maintenir vertical, nous constatons que la pièce d'argent n'émet plus de rayons spécifiques de l'argent et que ceux-ci s'échappent en totalité par la tête du clou. Si, au lieu de rayons inoffensifs, la pointe capte des rayons nocifs, il y a intérêt à les diriger vers le sol en entourant la tête du clou d'un morceau de fil de fer passant au-dessus de cette tête et dont les extrémités sont dirigées vers le sol. On évite ainsi l'effet nocif des nombreuses images que la tête du clou émet pendant

le jour s'il n'est pas entoncé dans un lieu obscur (cave). (Fig. 76).

S'il s'agit de protéger une pièce d'appartement et quand les circonstances ne permettent pas d'enfoncer le clou dans le sol, ce qui préserve les étages supérieurs, on peut se contenter de le planter dans une petite planchette carrée, de 0,15×0,15 centimètres.

2° L'antenne. Celle-ci est une tige métallique entourée d'un fil de fer enroulé en spirale dont il y a intérêt à diriger les deux extrémités vers le sol.

Le pouvoir attractif de l'antenne agit jusqu'à la limite des rayons « horizontaux » qu'elle émet. C'est pour cette raison que l'antenne horizontale paraît plus avantageuse que

l'antenne verticale, contrairement à ce qui est dit à la page 46 de « Radiesthésie Méthode Physique ». (Voir aussi dans « Radiesthésie Méthode Physique », page 67, Fig. 22 et pages 96 et 97).




Fig. 76

3° Les écrans. Les écrans sont, suivant les cas, ou des réflecteurs ou des extincteurs de radiations. Ainsi, les corps noirs éteignent tous les rayons lumineux ; les corps opaques les réfléchissent.




Fig. 77

Barrage protecteur contre les effets d'un ruisseau nocif

Les rayons RS sont arrêtés par le plomb et la couleur bleue ou jaune.

Les rayons η par les couleurs verte ou noire.

Les rayons γ par un isolant électrique et les couleurs orangé ou noire.

Les rayons ζ par un isolant électrique et les couleurs jaune, verte ou noire.

Les rayons α par le plomb, l'aluminium pur (ou par un sel de ce métal, tel que le carreau en terre argileuse cuite).

On sait que l'argile est un silicate d'alumine hydraté. Il en est de même du ciment et, par suite, d'un dallage en ciment.

Nous n'avons pas encore trouvé d'écran pour les rayons β et γ .

Dans chaque cas particulier, l'opérateur choisira le procédé d'élimination le plus pratique.

La Pointe conviendra aux zones peu étendues (Rectangles Peyré, ruisseaux fluorhydriques ou radioactifs).

Sur la verticale d'un ruisseau nocif, enfoncer des pointes (gros clous) de 0,15 centimètres de longueur, à 0,30 centimètres les unes des autres. Le barrage ainsi constitué protège une zone AB, en amont du dispositif, mais pas en aval ; c'est très important à savoir. Au delà des pointes A et B, le rayonnement indésirable continue (Fig. 77). Si le ruisseau a moins d'un mètre de largeur, une seule pointe suffira généralement dans les deux cas.

Dans d'autres cas, l'antenne que l'on peut allonger comme on veut pourra être préférable. Il faudra l'orienter N.-E., S.-O. ou N.-O., S.-E. pour lui donner son maximum d'effet. Dans les directions N.-S. et E.-O. son pouvoir attractif est nul, parce qu'elle n'émet pas de rayons α dans ces directions.

Dans le cas d'une pièce d'une maison construite en terrain radioactif, il faudra daller le sol en ciment sans joints, pour arrêter les rayons α puis la recouvrir d'un tapis de linoléum ou de balatum, isolant électrique, qui arrêtera les rayons γ et ζ . Sous ce tapis, disposer une couche de papier bleu pour arrêter les rayons RS, surmontée d'une couche de papier vert pour arrêter les rayons β .

L'efficacité du procédé prouve qu'un corps coloré n'est pas seulement un corps qui élimine certaines couleurs de la lumière blanche pour donner à notre rétine l'impression de nuance, mais qu'il possède encore d'autres propriétés qui persistent dans l'obscurité, et ce n'est pas l'une des moindres surprises que l'étude de la microphysique réserve aux physiciens.

Il ne faudrait pas croire que la suppression de la cause suffise à supprimer ses effets. Ceux-ci, quand ils se sont

prolongés pendant plusieurs années, sont profonds et déconcertent les médecins. Leur guérison nécessite des soins longs et continus.

Tout d'abord, l'organisme paraît résister et les malaises sont peu fréquents et passent inaperçus. Au bout de 7 ou 8 ans, se manifestent pour la première fois des troubles sérieux ; l'année suivante ils deviennent plus graves, puis, tous les organes étant atteints, c'est, en quelques semaines, la débâcle rapide et le médecin se trouve parfois en face de problèmes inattendus.

Lorsque ce qui précède sera connu et appliqué pendant plusieurs années, les trois quarts des maladies qui affligent notre pauvre humanité disparaîtront, la moyenne de la vie sera prolongée et c'est sans doute la compensation que la Providence réserve pour l'avenir aux épreuves du temps présent.

A l'appui de ce que nous venons d'écrire, citons quelques cas que nous certifions authentiques, de personnes victimes de rayons nocifs.

M. A..., fonctionnaire dans une ville de la région parisienne, y occupait, en 1923, une chambre dans un des angles de laquelle se trouvait un rectangle Peyré. La malchance voulut qu'il installât son lit précisément dans cet angle ; en sorte que chaque nuit il dormait sur un oreiller traversé par des rayons γ . Les premières années, il ne ressentit pas de troubles apparents, du moins à sa souvenance ; mais à partir de 1926 il dut se faire opérer régulièrement tous les deux ans d'une excroissance assez volumineuse à l'oreille gauche, qui fut qualifiée de bouchon épidermique par le spécialiste.

En 1930, s'étant rendu dans le Midi, il éprouva chaque fois qu'il s'exposa au soleil d'août des troubles sérieux, vertiges, évanouissements, nausées, etc..., au point qu'il dut s'astreindre à rester perpétuellement à l'ombre. En 1931, les troubles du cerveau devinrent très graves, au point de causer de sérieuses alarmes au médecin traitant. Celui-ci, après diverses analyses, diagnostique la maladie dont les symptômes se rapprochaient le plus de ceux qu'il constatait, et fit au malade une ponction de liquide céphalo-rachidien qui le sauva.

Enfin, en 1934, M. A... ayant fait connaissance d'un radiesthésiste qui le renseigne sur la véritable cause de son mal, changea son lit de place. Mais la maladie de l'oreille gauche avait continué à se développer, et, en 1936, il dut être opéré de la mastoïdite. Depuis, sa santé n'a plus rien laissé à désirer.

Autre exemple. M^{lle} B..., rentière dans une petite ville du Midi, jouissait d'une excellente santé lorsqu'elle eut la fâcheuse idée de

changer de chambre. Celle qu'elle adopta se trouvait balayée par des rayons nocifs obliques provenant d'une cavité souterraine voisine. Au bout de quelques années elle mourut d'un cancer au sein gauche, dont elle avait refusé de se faire opérer.

M^{me} C..., épicière dans un village du Sud-Est, avait, ce dont elle ne se doutait pas, son comptoir traversé par la verticale d'un ruisseau souterrain véhiculant des rayons γ . Après quelques années, elle fut atteinte d'une phlébite. Presque en même temps, son fils, habitant l'étage au-dessus, dont le lit était traversé longitudinalement par la verticale du même cours d'eau, fut atteint de la même maladie. Le médecin traitant trouva le cas tellement extraordinaire qu'il crut devoir le signaler par un rapport à l'Académie de Médecine.

Un radiesthésiste ayant eu vent du cas, éteignit le rayonnement pernicieux par la méthode des clous enfoncés verticalement dans le sol. Huit mois après, les deux malades furent définitivement guéris et la maladie ne reparut plus.

M. D..., fermier, avait reçu dans l'estomac la ruade d'un cheval dont des soins intelligents et assidus guérissent complètement les effets. Il avait complètement oublié cette fâcheuse aventure depuis plusieurs années, lorsqu'il changea de ferme. Le malheur voulut que dans la chambre qu'il choisit dans sa nouvelle habitation son lit suivit longitudinalement les effluves d'un ruisseau souterrain imprégné de rayons γ . Au bout de quatre années, il mourut d'un cancer à l'estomac dans d'atroces souffrances.

Dans une petite ville du Vaucluse, deux familles se succédèrent dans le même appartement, que la première occupa pendant trois ans et la seconde pendant six ans. Cet appartement se trouvait longé par la verticale d'un ruisseau fluorhydrique à 120 mètres de profondeur. Dans la composition de chacune des deux familles se trouvait une fillette, l'une de dix, l'autre de onze ans. Chacun des deux enfants fut pris de troubles de croissance dont le médecin n'arriva pas à se rendre maître. Ces troubles ne prirent fin chaque fois que lorsque chaque famille eut quitté l'appartement.

Entre autres méfaits, le rayonnement vertical du fluor, produit sur les personnes qu'il atteint pendant plusieurs années, la destruction des globules rouges, l'anémie, la faiblesse musculaire, un amaigrissement extraordinaire, des troubles hépatiques et le ralentissement du cœur. Ces ravages sont ensuite très longs à réparer. Heureusement que rien n'est plus facile que de s'en préserver à la condition de s'y prendre à temps.

Exercices :

116. Pour rechercher la présence des rayons nocifs, le plus simple est de régler le pendule sur le rayon γ (le réglage

le plus commode est celui de 138 mm.). Si le pendule tourne au-dessus de la zone soupçonnée, il y a beaucoup de chances pour qu'elle émette des rayons nocifs. Pour le contrôler, essayer les rayons γ (réglage : 125 mm. 50) et les rayons ζ (réglage : 160 mm. 50). Essayer enfin la radiation Fluor (réglage : 155 mm.).

117. Recherches sur les personnes : Présenter au-dessus de l'une de leurs mains le pendule réglé successivement sur rayons η , γ , ζ , ainsi que sur la radiation Fluor. Si une de ces personnes a séjourné dans une zone de rayons nocifs, son sang en étant imprégné, le pendule tournera sur l'une de ces quatre radiations.



Fig. 78

Tracé sur le terrain
d'un rectangle Peyré




Fig. 79



Fig. 80

118. Recherches sur les lieux nocifs : Renouveler l'expérience sur le terrain ou la salle à étudier. Le pendule réglé sur l'une des radiations nocives supposées (η ou Fluor), rechercher la zone en captant l'émission nocive avec la main libre en antenne.

Tracer les limites de cette zone, en marquant sur le sol les points où le pendule cesse de tourner. S'il s'agit d'un Rectangle Peyré, la réunion de tous ces points formera un rectangle. (Fig. 78).

119. Elimination : Procéder à la neutralisation d'une onde nocive Peyré en enfonçant un gros clou de charpentier (ou placer un gros clou dans un bouchon stabilisateur) vers le centre du rectangle tracé.

120. Si la zone nocive est proche d'un endroit où l'on a l'habitude de stationner, il convient d'éviter que les « images » des rayons nocifs, qui se concentrent sur la tête

du clou, ne puissent elles aussi incommoder (images de la Croix magnétique, du rayon solaire du clou, etc...). Pour cela, enrouler un fil de fer sous la tête du clou, le faire passer au-dessus de la tête de ce clou, et l'enterrer dans le sol. Ce fil de fer captera les rayons nocifs qui s'échappent de la tête du clou et les conduira vers le sol.

121. S'il s'agit d'un ruisseau imprégné de rayons nocifs, reconnus suivant l'un des réglages précités, opérer comme il est dit à la page 157 en se rappelant que la défense ne vaut que pour la partie du ruisseau en amont des clous. Se protéger contre les « images » de la tête de ces clous, comme indiqué précédemment.

122. S'il s'agit d'une zone de grande dimension, cavité, faille, souterrain, opérer avec une antenne horizontale que l'on déplace de façon à ce que l'irradiation soit complètement captée.

VINGT ET UNIÈME LEÇON

LA RECHERCHE D'UN COURS D'EAU SOUTERRAIN

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », page 160)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Notions de géologie-hydrologie : Pour mieux comprendre les réactions de son pendule, qui ne peuvent qu'être logiques et toutes naturelles, l'opérateur gagnera d'abord à se rendre compte de l'aspect extérieur de la région à prospector. Quelques notions de géologie-hydrologie ne peuvent qu'être utiles à l'égard de la succession et de la perméabilité des couches du sol.

L'origine des courants d'eau est le plus souvent pluviale, ou la conséquence de la fonte des neiges. Ces eaux s'infiltrant dans la terre deviennent souterraines. Dès qu'elles rencontrent une couche imperméable (calcaire ou argileuse), elles s'accumulent en poches ou nappes, ou encore, glissant sur cette couche imperméable, s'écoulent en de nombreux courants plus ou moins importants. Les poches d'eau en stagnation sont difficiles à capter. Par contre, les eaux souterraines en mouvement émettent leurs ondes avec une plus grande intensité, et s'échappent en sources à la surface du sol. Ce sont ces eaux en mouvement qui intéressent particulièrement le sourcier.

Dans certaines régions côtières du sud de la France, il est à remarquer, par exemple, que les eaux de surface, c'est-à-dire celles rapprochées de la surface du sol, suivent un cours du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Il suffit alors de recouper perpendiculairement ces courants invisibles, c'est-

à-dire de marcher Sud-Ouest-Nord-Est, ou vice-versa, pour faire relever la baguette ou tourner le pendule, soit sur la grande première parallèle (rayons à 45°) soit à la verticale de ces eaux (courant proprement dit). La boussole fixée au Révélateur Schumfell renseignera l'opérateur sur la position des points cardinaux.

Pour ce qui est des **eaux profondes**, les meilleures, nous constaterons que leurs courants suivent la moindre résistance. De ce fait ils ne suivent pas nécessairement la déclivité du sol ; c'est pourquoi ils ne vont pas à la rencontre les uns des autres, mais se croisent souvent, soit en se mélangeant, soit en s'évitant, à des niveaux différents.

En tout cas, les vraies sources intarissables et copieuses proviennent principalement des montagnes, non des vallées. On trouve des sources à l'état libre (véritables courants d'eau souterrains), parfois considérables, jaillissant des flancs ou du sommet des montagnes. Ce sont celles-ci qu'il convient de capter de préférence, en les canalisant, au besoin, jusqu'aux habitations.

On prospectera moins, si on le peut, les vallons, le pied des collines, où l'on ne trouvera le plus souvent que de l'eau à l'état **pelliculaire**, formant des terres humides, ne présentant que de faibles ruissellements ou des eaux inconstantes.

On se rappellera, en outre, que :

1° Un terrain **synclinal** (voir « Radiesthésie Méthode Physique », page 161) est formé par l'effondrement de couches géologiques inclinées vers le fond d'une vallée. On a les plus grandes chances de trouver de l'eau dans cette vallée, surtout en surface ; cette eau sera cependant de moins bonne qualité, en général, qu'en terrain anticlinal.

2° Un terrain **anticlinal** est formé par une sorte de pli convexe de la surface du sol, dont les couches géologiques divergent, entraînant l'eau reçue loin du fond de la vallée. Cependant, à une certaine profondeur, un terrain anticlinal peut fournir des sources siphonantes intéressantes par leur abondance et leur qualité de potabilité très filtrée.

3° Dans une vallée où les couches sont inclinées d'un seul côté, il ne peut y avoir de l'eau que du côté plongeant.

4° Quatre mètres, c'est le minimum de profondeur que l'on puisse exiger d'une source.

**

De ce qui précède, nous pouvons nous trouver en présence : ou d'une capillarité peu intéressante, ou d'un cours d'eau souterrain (ruisseau ou rivière) de débit plus ou moins important, ou d'une eau siphonante (griffon ou puits artésien naturel), ou d'un croisement de deux cours d'eau superposés.

Et dans les cas les plus intéressants, le cours d'eau retenu sera à considérer des points de vue : potabilité (breuvage, arrosage) ou nocivité (eau polluée, colibacillaire, etc...), ou encore des points de vue minéral, thermal, etc... S'inspirer également des récentes constatations, révélées par M. Orcel, à l'égard des cours d'eau radiesthésiquement arsénicaux ou fluorhydriques (page 23).

Nous désirons dissuader le débutant, qui a acquis des notions théoriques suffisantes de radiesthésie, de s'exercer sur les cours d'eau apparents, à la surface du sol, même avec un instrument exactement réglé. En effet, il serait vite découragé : il constaterait qu'à l'air libre les rayons verticaux et ceux à 45° de ces ruisseaux et même de ces fortes rivières sont difficilement perceptibles pour un opérateur encore peu exercé. Tout au contraire, des ruisseaux ou courants souterrains, émanent des ondes bien plus puissantes, qu'avec un peu d'entraînement, il percevra de plus en plus nettement.

Exercices :

123. Détection à distance sur le terrain : Régler le Schumfell ou la baguette sur la qualité d'eau recherchée : eau potable, par exemple, en présentant l'instrument choisi sur la verticale d'un récipient quelconque, rempli de la même qualité d'eau que celle désirée.

Munir l'instrument d'un témoin, également de la même eau. C'est sur le témoin que le réglage se fera le plus exactement.

Il ne saurait être question de parcourir mètre carré par mètre carré, un terrain de plusieurs hectares, pendule ou

baguette en main. S'appuyant donc sur les renseignements géologiques connus, estimer d'abord s'il peut exister de l'eau dans la direction où la découverte d'un tel courant d'eau pourrait être le plus utile. Marcher lentement dans cette direction, mais de manière à **couper perpendiculairement** ce courant en plusieurs points. Puis, reconnaître le sens du courant (l'**aval** étant le côté vers lequel descend le cours d'eau ; l'**amont**, le côté d'où il descend) ; percevoir les **rives** souterraines en les délimitant sur une certaine longueur ; enfin, déterminer les points de plus grand débit.

Mais l'opérateur peut être privé de toute indication géologique. Dans ce cas, il se portera à la limite du terrain à prospecter, à un endroit d'où il pourra englober, dans le meilleur angle, toute la surface utile à fouiller. De cet endroit, il pourra, en pivotant sur place, étudier successivement des **bandes de terrain angulaires** différentes, prenant point de départ à ses pieds et s'éloignant de 25 mètres en 25 mètres. Il fera poser des marques par un aide, à chaque réaction de son détecteur. Ainsi, rapidement, le sourcier se donnera une connaissance du sens général des différents courants souterrains en présence.

Certains sourciers, habiles à la baguette, estiment préférable de dégrossir préalablement le terrain avec celle-ci, quitte à employer ensuite le Schumfell pour l'étude plus précise des points d'eau trouvés.

Quoi qu'il en soit, ce dégrossissement obtenu, il leur paraît nécessaire de contrôler au Schumfell anti-image les résultats acquis à la baguette, pour éliminer les erreurs possibles dues aux éventuelles images.

Ce contrôle s'effectuera de la manière suivante : S'aider :

- du **rayon digital** (index de la main gauche en antenne) ;
- du **réglage** du Schumfell orienté Nord-Sud magnétique ;
- du **témoin** (petit tube de verre bouché, rempli d'eau potable, accolé parallèlement au bâtonnet de suspension du pendule).

Un deuxième contrôle consistera à opérer de loin des recoupements sur le meilleur point d'eau trouvé. Se déplaçant successivement en deux endroits différents, on opérera

deux autres « visées » semblables sur ce point d'eau. L'intersection de ces trois recoupements marquera d'une façon certaine la position du point d'eau en question.

Détection sur le point d'eau même : Le sourcier, s'étant alors transporté sur la verticale de ce point d'eau, déterminera s'il s'agit d'un courant ou d'un griffon.

Pour le cas d'un courant, il délimitera d'abord les rives en les jalonnant sur une distance de 50 ou 100 mètres.

Pour percevoir le mieux les rayons verticaux de chaque rive, il convient de se baisser ou encore de s'accroupir, la base du Schumfell à 5 centimètres environ du sol, l'index




Fig. 80 bis

de la main libre en antenne, cherchant en effleurant le sol ; on peut encore, pour plus de commodité, se servir d'une canne-antenne pour éviter de se baisser.

Les rives étant jalonnées, la reconnaissance du sens du courant en sera une confirmation ; le Schumfell tournera en aval, il oscillera en amont. La baguette se relèvera vers l'amont et s'abaissera vers l'aval.

Dans de nombreux cas, la délimitation des rives peut être facilitée par la reconnaissance préalable des **parallèles**, plus ou moins perceptibles, et surtout par les deux **grandes parallèles**, dont les émissions sont plus puissantes, lorsque les courants perçus ont quelque importance. Il peut arriver que les grandes parallèles se montrent plus puissantes que le

courant lui-même. Parfois, on remarquera que les grandes parallèles et surtout les parallèles ne sont pas toujours perceptibles lorsqu'il s'agit de petits ruisseaux souterrains ; seuls les rayons verticaux des rives, et du courant, l'étant. Vérifier l'exactitude des réactions diverses ainsi obtenues en marchant devant soi, en les renouvelant en marchant à reculons et les yeux fermés lorsque l'on opère à la baguette.

Un point d'eau étant connu, et le sourcier s'étant rendu sur place, il reculera de 20 à 30 pas ou plus, et reviendra, pendule en main, vers ce point, marchant lentement et perpendiculairement au courant, en faisant balancer le Schumfell dans le plan du méridien magnétique Nord-Sud, et se rendant vers le courant. Le pendule s'arrêtera brusquement au passage de la grande parallèle, et peut-être aussi des six autres parallèles, reprenant son balancement entre chacune d'elles, pour aboutir aux rayons verticaux de la première rive, sur laquelle le pendule oscillera parallèlement. Sur le courant même, le pendule tournera avec plus de force, réagissant de la même manière que précédemment sur la deuxième rive et les parallèles et grande parallèle de l'autre côté du courant.

Ce sera alors le moment de contrôler le chiffre de série de l'eau qui doit être +2, suivant la méthode des secousses au réglage précis.

Toutes ces opérations devront avoir été effectuées continuellement avec le témoin. Après chaque réaction de la baguette ou du pendule, désimprégner ces instruments, ainsi que les mains. (Voir page 40).

A la lecture du mode opératoire qui précède, le débutant peut croire à une certaine complexité, mais, dans la pratique, ce processus devient un jeu d'enfant après plusieurs essais.

Nous venons d'indiquer, pour la bonne règle, les détails du procédé de recherche sur le terrain, nous devons cependant ajouter que tout radiesthésiste exercé, simplifie et accélère considérablement ces opérations de prospections, alors même qu'il se trouve sur le terrain, en recourant au travail sur plan (téléradiesthésie). Il est, en effet, beaucoup plus facile et plus rapide de parcourir, à la pointe-antenne, une fraction de feuille de papier, posée sur une planchette

de campagne, que d'arpenter lentement le terrain, dont elle représente les dimensions réduites et la disposition. Un rapide croquis, même au crayon, pourvu qu'il garde les proportions et soit orienté Nord-Sud magnétique, permettra de fouiller et refouiller plusieurs fois tous les coins et recoins, évitant toute fatigue par la marche si l'on se trouve en campagne, et sans déplacer un meuble si la recherche se fait dans une pièce d'habitation.

Le débit

124. Ayant procédé comme il est dit ci-dessus, le sourcier sera certain de pouvoir, en toute sécurité, faire forer un excellent puits. Toutefois, avant de faire effectuer ce travail, il devra chercher à l'obtenir aux moindres frais, par la connaissance du plus gros débit et de la moindre profondeur.

Il devra donc se demander si cet endroit trouvé a un débit suffisant d'abord, et s'il ne pourrait, à côté, ou un peu plus loin, le long du cours d'eau ainsi délimité sur une certaine longueur, repérer un endroit de plus fort débit. C'est en descendant le sens du courant qu'il se rendra compte de la plus ou moins grande intensité de giration de son pendule, le renseignant, par la méthode physique, sur les points successifs de plus grand débit.

Pourtant le procédé du « calcul mental » est trop couramment employé pour ne pas le rappeler. Il consiste simplement en une convention mentale préalable de mesure, faite par le pendule, avec le subconscient, que l'on questionne. Ayant convenu que chaque giration sur la verticale du point d'eau représentera un litre, ou un décalitre, ou même un hectolitre, vous élèverez verticalement votre pendule en giration. Il se mettra d'abord à osciller, puis à tourner. Vous compterez alors combien de girations s'effectueront jusqu'à l'arrêt. Ce chiffre obtenu vous donnera le débit.

Le griffon. — Cette question du débit et de la pression nous amène à considérer le cas du griffon, ou du puits artésien naturel. Quand une eau souterraine est sous pression, cela veut dire qu'elle reçoit par vases communicants, des pesées qui la poussent à monter. Mais elle en est empêchée

par le toit imperméable d'argile, de rocher, etc..., qui la comprime.

Le pendule signale cet état sous forme d'une colonne de force, appelée griffon, qui s'élève verticalement au-dessus de l'eau réelle, et monte jusqu'au niveau où montera l'eau dès qu'un forage lui aura ouvert un passage et rendu la liberté.

Le captage des eaux siphonantes est délicat et souvent décourageant ; il vaut mieux s'attacher à la recherche des courants d'eau plus ou moins horizontaux.

La profondeur

125. Sur une longueur de 50 mètres, nous avons donc jaloné un courant d'eau souterrain. Mais le niveau de l'eau de celui-ci peut se trouver à des hauteurs très différentes, suivant les couches imperméables de terrain suivies par ce courant. Pour forer au moindre coût de revient, il convient donc de déterminer l'endroit sur ces 50 mètres, où l'eau captable sera la plus proche du sol.

Le sourcier aura, dans ce but, à apprécier la profondeur de l'eau tous les 5 ou 10 mètres le long du parcours. Mais la moindre profondeur ainsi trouvée pourra n'être encore qu'approximative, et il suivra le bon conseil de l'Abbé Bouly, qui suggère de ne donner de mesure au puisatier que de la façon suivante : « Vous creuserez à une profondeur de 40 mètres, plus l'épaisseur des terres compactes ». Si donc le puisatier rencontre quelques mètres de terre glaise au cours de son travail, il devra ajouter ceux-ci aux 40 mètres indiqués par le sourcier.



La prospection en général, que ce soit d'un filon minéralogique, d'un objet égaré, ou de toute autre radiation, se faisant, à quelques détails près, de la même manière que celle d'un courant d'eau, nous ne nous étendrons pas ici sur ces sujets différents, invitant le lecteur à se reporter, pour les détails particuliers, aux chapitres correspondants de l'ouvrage de « Radies.hésie Méthode Physique ».

CHAPITRE V

LE RAYONNEMENT DES ÊTRES VIVANTS

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 203 à 211)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Pendant longtemps on a cru que le corps humain n'émettait qu'une radiation d'une seule espèce et M. Henri avait attribué une longueur d'onde de 10 microns à ce qu'il appelait l'onde humaine. C'est à l'ingénieur Voillaume que revient l'honneur d'avoir révélé que le rayonnement n'est pas unique, mais multiple, et que plusieurs de ces éléments sont communs aux animaux et aux végétaux. Il en précisa même les caractéristiques.

Parmi ces rayons humains, certains sont à double polarité, aussi bien chez l'homme que chez la femme ; d'autres sont positifs chez l'homme (H+) et négatifs chez la femme (F—). C'est par ces signes qu'ils sont désignés sur le tableau ci-après de leurs caractéristiques.

(Voir pages 65 et 66 des précisions sur la Polarité Humaine).

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES ONDES HUMAINES
 permettant d'établir leur carte d'identité à l'aide du pendule sphérique neutre de précision P.S.
 ou du pendule Voillaume, ou du pendule Schumfell

Désignation de l'onde	Symboles	Polarité et Chiffre d : série	Nombres Particuliers N	Nombres Caractéristiques n	Longueur d'onde en microns	Réglages millimétriques successifs du fil de suspension	Angle Fondamental (1)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rayon nerveux ... (digital, visuel)		$\pm$ 5	5	2	0,790	204,80 — 173,90 — 144 — 114,50 — 87,10	142°50
Onde vitale		$+$ 11	11	5	10,515	201 — 184,50 — 168 — 152 — 135,90	326°50
Onde sexuelle	H + F —	$\pm$ 3	3	1	9,954	179,75 — 149,10 — 134 — 118,85	26°00
Onde humaine ...		$\pm$ 19	19	9	9,934	184,80 — 165,50 — 146,60 — 123	311°30
Onde d'espèce ...						A établir expérimentalement, sur chaque sujet	
Rayon mental		$+$ 7	7	3	10,360	195 — 178,75 — 162,75 — 147	28°00
Rayon sympathique		$\pm$ 19	19	9	9,915	178,25 — 158 — 137,80 — 99,25	273°30
Onde personnelle .	H + F —	Caractéristiques variables suivant les personnes. A établir expérimentale- ment sur chaque sujet					

(1) L'angle fondamental ne peut se mesurer exactement qu'avec les pendules neutres sphériques P.S. ou Voillaume, seuls, à l'exclusion du pendule actif Schumfell. Le signe $\pm$ veut dire plus ou moins ; il s'applique aux ondes à double polarité, tantôt positives, tantôt négatives.

VINGT-DEUXIEME LEÇON

LES RAYONS NERVEUX L'ONDE VITALE — L'ONDE SEXUELLE L'ONDE HUMAINE LES ONDES D'ESPÈCES

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique »
pages 204 à 205)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Rayons nerveux : Les rayons nerveux s'échappent des extrémités des filets nerveux (rayons digitaux, rayons visuels). Ils se propagent à une très grande distance. Les uns sont positifs, les autres négatifs. Ils sont identiques chez les animaux. Ils sont accompagnés de rayons ω . Les rayons digitaux provoquent l'émission du rayon d'antenne et leur servent de support.

Leur intensité varie avec les individus.

Au point de vue électrique, les cinq doigts de la même main sont de même polarité. Au point de vue magnétique, ils sont tous négatifs, quelle que soit la main, et cela aussi bien chez l'homme que chez la femme.

Mais au point de vue de l'émission des ondes nerveuses et des ondes sympathiques (qui intéressent essentiellement l'étudiant), leur polarité varie, comme nous le verrons, et parfois, d'une façon différente, suivant les individus.

En effet, les doigts de la main sont le point de départ à la fois de rayons nerveux et de rayons sympathiques de polarité différente. Les premiers s'étendent très loin ; les seconds sont courts.

Si, chez un homme à main opérative positive (celle qui tient le pendule), on présente un pendule, réglé sur l'onde sympathique, successivement au-dessus de chacun des cinq doigts, nous constatons généralement les polarités et intensités de mouvement suivantes :

Mains positive homme : Pouce	+50 %
Index	—25 %
Médius	—50 %
Annulaire	+50 %
Auriculaire	—25 %
Main négative homme : Pouce	—50 %
Index	+25 %
Médius	+50 %
Annulaire	—50 %
Auriculaire	+25 %

Il s'ensuit que, théoriquement, pour obtenir le maximum de force dans la giration maxima, il conviendrait, généralement, de tenir le pendule par deux doigts de même polarité, contrôlée, soit, dans l'exemple ci-dessus, pouce et annulaire.

Pourtant, dans la pratique, nous avons constaté chez de nombreux élèves, plus de sûreté de mouvement du pendule, en adoptant, pour la main opératrice positive, soit le pouce et l'index, soit le pouce et le médius. Chaque étudiant fera à cet égard une étude personnelle, dès qu'il sera quelque peu exercé à la pratique du pendule.

Il est recommandé, dans la recherche de polarité des doigts, d'éviter le phénomène de l'imprégnation en ayant soin, en principe, après chaque opération, de donner une secousse au pendule.

Onde vitale : L'onde vitale, toujours positive, est identique chez l'homme, les animaux et les végétaux. Elle n'est émise que par les organes sains. (C'est ce qui trompe souvent les personnes qui cherchent les décès sur photographies : leur pendule, non réglé sur l'onde vitale, tournant positivement, elles en déduisent la vie, d'où l'erreur. Pour les recherches sur photographies ou l'écriture, régler sur l'onde nerveuse, l'onde humaine, ou l'onde personnelle, étu-

diées plus loin). L'onde vitale s'éteint avec la mort apparente. Son intensité varie avec la vitalité des individus.

Onde sexuelle : L'onde sexuelle, à double polarité, est identique chez les animaux et les végétaux. Elle s'échappe des organes de reproduction, positive chez le mâle, négative chez la femelle. Dans l'être humain, son émission se fait en deux cônes très peu ouverts, l'un presque horizontal, le second dont l'axe tombe à 0,25 centimètres, à 0,35 centimètres en avant des pieds. Chez l'homme, les deux cônes sont pleins ; chez la femme, ils sont creux.

Onde humaine : L'onde humaine est une onde d'espèce, qui caractérise l'espèce humaine. Elle persiste après la mort, même dans les ossements et les cendres des cadavres incinérés.

Onde d'espèce : Chez les animaux, l'onde d'espèce correspond à l'onde humaine. Elle est commune à tous les animaux d'une même espèce : onde canine, porcine, galline, etc... Les animaux, tels que le mulet, la poule-dinde, émettent les ondes de la double espèce à laquelle ils appartiennent.

Exercices :

126. Rayons nerveux digitaux : (Rayon d'antenne) : Constater la polarité différente des ondes qui sortent des extrémités des cinq doigts de la main libre gauche, horizontalement allongée, le pendule étant réglé sur le rayon nerveux.

127. Placer le pendule (réglé sur le rayon nerveux) sur le trajet du regard d'un animal et constater que le pendule tourne. De préférence, mettre la main en antenne sur ce trajet.

128. Plaçons-nous à 5 ou 6 mètres d'un objet en cuivre, en tenant dans la main droite un pendule réglé sur ce métal.

Etendons la main gauche vers l'objet, le pendule tournera. Rabattons le bras, la giration cessera.

129. Etendons le bras quelques mètres au-dessus de l'objet afin de rencontrer sa nappe verticale, le pendule tournera.

130. De même que, à une certaine distance sur le trajet des rayons à 45° .

131. Demandons à un aide de réfléchir au moyen d'une assiette de porcelaine la nappe verticale, tendons le bras dans la direction de la nappe réfléchie, le pendule tournera.

132. Réglons le pendule sur l'électricité et tendons le bras vers un nuage. Si ce nuage est chargé d'électricité positive, le pendule tournera dans le sens $+$; s'il est chargé d'électricité négative, il tournera dans le sens $-$.

133. Rayons nerveux visuels : Plaçons-nous dans la même position que tout à l'heure et regardons l'objet, le pendule tournera ; cessons de le regarder, il oscillera.

Mais il tournera aussi, si nous regardons sa ligne verticale à une certaine distance au-dessus de lui, ainsi que les rayons à 45° qui en partent. Fermons les yeux, la giration cessera ; ouvrons-les, elle recommencera.

134. Onde vitale : Présenter au-dessus d'une plante le pendule réglé sur l'onde vitale, et constater qu'il tourne.

135. Onde sexuelle : Rechercher le sexe des œufs à l'aide du pendule réglé sur l'onde sexuelle et d'un « témoin de polarité ». Avoir soin de désimprégner fréquemment le pendule après chaque opération.

136. Constater qu'il existe des œufs non fécondés.

137. Constater l'émission de l'onde sexuelle par la fleur.

138. Ondes d'espèces : Rechercher par sélection mentale, sur une imprégnation sur papier au second degré, les caractéristiques de l'onde d'espèce des divers animaux.

139. Constater que le mulet émet à la fois l'onde de l'âne et celle du cheval.

VINGT-TROISIEME LEÇON

LE RAYON MENTAL

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 56 et 204)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Rayon mental : Comment l'âme, principe immatériel, peut-elle agir sur le cerveau, organe matériel ? Voilà un problème qui sera sans doute longtemps caché à l'homme. Ne cherchons pas à percer ce mystère. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la pensée provoque un mouvement du cerveau, phénomène physiologique, et que ce mouvement déclenche une onde EM, phénomène physique. Cette onde, c'est le rayon mental. Le rayon mental est identique chez l'homme et chez les animaux supérieurs susceptibles de penser.

Si nous le recueillons par imprégnation sur papier placé en face des tempes d'un animal, nous constatons qu'il est identique et en toute l'espèce animale capable de penser : animaux supérieurs et insectes.

Lorsque deux fourmis se rencontrent et mettent leurs antennes en contact, le rayon mental de l'une pénètre dans le cerveau de l'autre et y détermine le mouvement qui, par un mécanisme inverse de celui que nous avons mentionné, provoque la pensée.

Le rayon mental s'étend à des distances considérables. Nous ne lui connaissons qu'un seul écran : la porcelaine.

Lorsque nous pensons à un objet, l'onde électro-magnétique consécutive au mouvement du cerveau produit par l'action de l'intelligence se dirige automatiquement vers cet objet et en ramène les ondes spécifiques.

Réglons, par exemple, notre pendule sur l'argent, et plaçons une pièce de monnaie de ce métal sur une table. Nous tenons la pendule à la main, donc éloigné de la pièce de monnaie, tournons le dos à cette table et fermons les yeux. Nous constaterons que chaque fois que nous pensons à la pièce, le pendule tourne, et qu'au contraire, il oscille, avant de s'arrêter, dès que nous pensons à un autre objet.

M. Voillaume, qui a étudié spécialement ce rayon, en a déterminé les points de départ qui varient suivant la position du corps étudié par rapport à celle de l'opérateur et dont l'un est, dans la plupart des cas, un point spécial de sa tempe la plus proche de ce corps.

Il a pu réfléchir, réfracter et polariser ce rayon, dont les propriétés ne font plus aucun doute aujourd'hui.

Si nous pensons à un objet enfermé dans une enceinte imperméable aux rayons spécifiques, mais accessibles aux rayons infra-rouges, le pendule réglé sur cet objet tournera. Si nous masquons, au contraire, l'objet par un écran de porcelaine, le rayon mental ne pouvant l'atteindre, le pendule oscillera pour s'arrêter ensuite.

L'utilisation du rayon mental est le principe sur lequel reposent la radiesthésie par la Méthode mentale et la Télé-radiesthésie.

Les rayons mentaux sont toujours accompagnés de rayons «).

Exercices :

140. Rayon mental : Plaçons une pièce de monnaie d'argent par exemple sur une table et tournons le dos à la table. Réglons ensuite notre pendule sur l'argent. Puis pensons à la pièce, le pendule tournera. Cessons d'y penser, il oscillera avant de s'arrêter.

141. Plaçons sur la pièce un écran de verre, de papier, de carton, de soie naturelle, etc... Cet écran sera sans effet sur le phénomène.

142. Plaçons la pièce de monnaie sous une assiette de porcelaine, nous aurons beau y penser, le pendule ne tournera pas. Et si nous prolongeons l'expérience, nous ressen-

tirons bientôt un mal de tête déterminé par la réflexion prolongée du rayon mental, qui n'aura pu parvenir à son objectif.

143. Faire des exercices de **sélection mentale** d'ondes. Sur une sphère, par exemple, distinguer, au besoin par étude sur une imprégnation sur papier, au deuxième degré, l'onde de forme des diverses ondes spécifiques émises par les divers éléments constitutifs de cette sphère, qui peut être de bois, de marbre, d'un alliage métallique.

144. Rechercher les caractéristiques de l'onde de forme.

VINGT-QUATRIÈME LEÇON

LE RAYON SYMPATHIQUE L'ONDE PERSONNELLE

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 204 à 206)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

Rayon sympathique : Se reporter à l'ouvrage « Radiesthésie Méthode Physique » : Les Aliments et les Remèdes, pages 217 à 219.

Onde personnelle : Chaque individu humain émet un rayonnement spécial qui lui est personnel et le caractérise. Sa longueur d'onde, de l'ordre d'une dizaine de microns, varie avec chaque personne, obligeant ainsi à rechercher le réglage pour chacune. On obtient ce réglage expérimental, donc par tâtonnement sur cette radiation, en présentant le pendule au-dessus, soit de cette personne, soit d'objets ayant été un certain temps en contact avec elle (vêtements, objets de literie, porte-plume, etc...).

En portant le pendule ainsi réglé au-dessus d'une lettre écrite par une personne, on constate que cette lettre émet la même radiation, le papier en ayant été imprégné un certain temps par le contact de ses mains.

En raison de sa persistance, l'onde personnelle peut servir à rechercher les personnes disparues, à identifier des objets qui leur ont appartenu, et à trouver, soit par des procédés physiques, soit à l'aide de l'orientation mentale, des objets qu'elles ont perdus.

L'onde personnelle paraît être le résultat de l'action sur le corps humain du champ électrique terrestre. Ses carac-

téristiques peuvent ne pas être absolument constantes et varier aux divers âges de la vie. Sa polarité diffère suivant le sexe de la personne examinée.

Un objet imprégné émet non seulement l'onde personnelle de la personne qui s'en sert habituellement, mais encore toutes les autres radiations de son rayonnement qui ont pu le rencontrer : onde nerveuse, onde sympathique, onde humaine, onde sexuelle, onde vitale, ondes de maladies, électricité, magnétisme, radioactivité, etc... Ce n'est donc que par une **sélection mentale**, dans laquelle intervient la volonté, que l'on peut discriminer une onde personnelle des autres radiations qui l'accompagnent.

Positive chez l'homme, l'onde personnelle est négative chez la femme.

Pour les animaux, l'onde individuelle correspond à notre onde personnelle.

Quant aux **végétaux**, ceux-ci ont également une onde personnelle. C'est pourquoi, si nous réglons expérimentalement notre pendule sur une plante, en mettant le doigt en antenne ou en contact avec une partie malade du végétal, le pendule se met à osciller.

L'onde personnelle possède un plan fondamental (Pf) et dans ce plan fondamental émet un axe spécifique que nous nommerons **axe individuel de la personne**. Le point de départ de cet axe paraît être un point du sommet de l'os iliaque (os de la saillie de la hanche).

S'agit-il de l'axe de Baradat auquel les astrologues attachent une grande importance ? Nous ne saurions encore l'affirmer.

Pour le reste de cette étude, nous vous demandons de vous reporter aux pages 207 à 211 et 217 à 219 de l'ouvrage « Radiesthésie Méthode Physique ».

Exercices :

145. Onde sympathique : Adoptons l'un des réglages indiqués pour cette onde au Tableau des réglages et identification des corps et radiations, pages 171. Avec le réglage choisi, le pendule tourne positif (pour une main

positive) au-dessus du dos, ou négatif sur le creux, de la main gauche.

D'autre part, ainsi réglé sur l'onde sympathique, lorsque l'on met l'index gauche en face ou en contact avec une partie saine du corps humain, le pendule tournera positif également. Si, au contraire, l'index gauche est en contact avec une partie malade, qui émet donc des radiations pour lesquelles le pendule n'est pas réglé, il oscillera ou s'arrêtera. Faisons l'expérience sur une écorchure, une lésion connue du poumon, une entorse, un mal de gorge, une contusion, une névralgie, une bronchite, un épanchement de synovie, etc..., et nous constaterons l'oscillation ou l'arrêt.

146. Réglons expérimentalement le pendule sur un remède ou un aliment. Sa réaction positive ou négative, sur le dos de notre main gauche (main libre qui ne suspend pas le pendule), nous indiquera ensuite si ces éléments nous conviennent ou non.

La concordance des sens de giration nous fixera sur la convenance et, au contraire, sur la contre-indication, ou nuisibilité. En cas d'oscillation persistante, c'est à l'indifférence qu'il faut conclure.

147. Faire la contre-épreuve en réglant le pendule sur l'onde sympathique (positif) du dos de la main gauche, et présenter ensuite le pendule au-dessus de l'aliment ou du remède à examiner. Constater le sens de réaction. Giration positive : bon ; giration négative : mauvais ; oscillation : indifférent.

148. Opérons de même sur l'eau, pour savoir si elle est potable (positif) ou polluée (négatif). Réglons d'abord expérimentalement le pendule sur une eau réputée potable (positif). Pour de l'eau polluée, colibacillaire, le pendule tournera en sens opposé, nuisible.

149. Onde personnelle : Rechercher sur une page d'écriture et par sélection mentale les caractéristiques de l'onde personnelle d'une personne.

150. Constatons que la feuille de papier écrite émet toutes les radiations ci-dessus, mais avec polarité inversée. (Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique », pages 205 et 206).

LES IMAGES EN RADIESTHÉSIE

VINGT-CINQUIÈME LEÇON

LES DIVERSES CATÉGORIES D'IMAGES

(Se reporter à « Radiesthésie Méthode Physique »,
pages 114 à 140)

DOCUMENTATION RÉSUMÉE ET PRÉCISÉE

L'image constitue pour le chercheur un obstacle des plus redoutables. Par l'illusion qu'elle lui donne de la présence d'un corps réel, en un point dont celui-ci est parfois très éloigné, elle l'égare et le détourne de la voie sur laquelle il trouverait le couronnement de ses efforts.

Il s'ensuit que la recherche de l'emplacement d'un corps caché se présente généralement dans des conditions très ardues. Chaque objet, en effet, détermine la formation d'un grand nombre d'images, mères elles-mêmes d'autres images secondaires. Il convient donc d'éliminer ces multiples images afin de parvenir à l'objet réel qu'elles masquent.

En combinant les divers procédés anti-images décrits dans les dernières leçons suivantes, il sera possible d'éliminer méthodiquement les images qui se présenteront. Mais ce sera s'attaquer souvent à un travail délicat et très long. Il est donc préférable à tous points de vue d'avoir recours au Révélateur Electro-Magnétique Schumfell, pendule de précision, **anti-image parfait**, conçu essentiellement dans le but

d'éliminer les images, que ce soit en travaillant sur le terrain, ou par téléradiesthésie, et à tout moment du jour et de la nuit. C'est l'appareil idéal pour le praticien.

Toutefois, les théoriciens de la radiesthésie ne manqueront pas de trouver dans les leçons 25, 26, 27, 28 et 29, sur les images, intérêt et même profit pratique. C'est à leur intention que nous avons établi les trois tableaux synoptiques sur les images, page 216 bis.

*
**

On ne saurait mieux se représenter le nombre incalculable de foyers radiants que peut produire indirectement le rayonnement propre d'un objet, qu'en le comparant à la quantité considérable d'images sonores que peut déterminer sur des récepteurs pourvus de l'énergie nécessaire à leur formation et ajustés à la longueur d'onde adéquate, la voix d'une seule personne transformée et propagée par un puissant poste d'émission.

De même que les vibrations de ces images sonores sont généralement plus puissantes que celle de la voix originelle, de même, le plus souvent, le rayonnement de certaines images est plus intense que celui de l'objet qui leur a donné naissance, en sorte que, fascinés par l'émission d'une puissante image très proche du corps radiant que nous cherchons, nous passons parfois à côté de lui sans le sentir.

Il importe donc au premier chef de pouvoir reconnaître les images et de savoir les éliminer.

L'existence des images a été signalée par les radiesthésistes les plus experts et plusieurs d'entre eux ont proposé plusieurs procédés pour les déceler et se préserver de leur action déconcertante. Prétendre qu'on n'en a jamais rencontré dans ses recherches, c'est avouer ingénument qu'on n'a jamais su distinguer leur rayonnement de celui d'un objet réel et que, en conséquence, on a commis sans s'en douter de nombreuses erreurs de diagnostic...

C'est aux recherches et expériences des colonels Correnson et Camps poursuivies avec ténacité pendant ces cinq dernières années que l'on doit l'acquisition de données précises sur cette question passionnante et primordiale.

Espèces d'images

Les images que l'on rencontre en radiesthésie sont de deux espèces très différentes. On les a, tout d'abord, distinguées entre elles par les dénominations d'images « physiques » et d'images « radiesthésiques » ; mais ces qualificatifs ayant été pour de multiples raisons reconnus impropres, il convient de leur substituer des expressions plus adéquates. Nous appellerons donc images directes celles qui se forment avec le prolongement même du rayonnement de la source radiante, et images indirectes celles qui ne sont que reliées à ce rayonnement et dont toute la vigueur rayonnante est fournie par une énergie extérieure.

Images directes

Les images directes sont le résultat d'une déviation accidentelle partielle ou totale du rayonnement propre d'un objet ou d'une source d'émission. Elles peuvent naître à la suite d'un accident absolument identique à l'un de ceux qui déterminent la formation des images lumineuses (réflexion, réfraction, dispersion, par exemple) et, par conséquent, obéir aux mêmes lois. Mais elles peuvent aussi être l'effet d'une cause dont nous ne trouvons aucune analogie en optique. Nous citerons pour ce dernier cas, les images quadruples d'un objet situé près du sommet d'un angle dièdre (images directes du phénomène des coins) ; les images quadruples d'un objet suspendu par un fil ou par une chaîne, etc., etc...

Images indirectes

Ces images sont engendrées et entretenues par l'intervention d'une ou de plusieurs énergies extérieures au corps générateur ou à la source radiante, et absolument indépendantes d'eux. Ces forces créent, ainsi, de nouvelles sources d'émission possédant une énergie propre mais rattachée à celle de la source génératrice dont le rayonnement se trouve ainsi multiplié et, suivant les cas, renforcé, réduit ou modifié.

Ce sont ces forces extérieures : magnétisme, électricité, lumière, qui déterminent l'émission des ondes Electro-Magnétiques (E. M.) particulières qui servent d'ossature à l'image et de support à son rayonnement spécifique qu'elles véhiculent. Quand ce support est multiple, il suffit d'éteindre une seule, quelle qu'elle soit, des radiations qui le composent, pour faire évanouir l'image.

La nature différente des supports engendre des catégories différentes d'images ayant des propriétés physiques distinctes. C'est pour cette raison que nous avons divisé les images indirectes (appelées antérieurement images radiesthésiques) en deux classes : les images diurnes engendrées et entretenues par l'action de la lumière (solaire ou artificielle) et les images permanentes engendrées et entretenues par l'une des trois causes que nous avons citées (magnétisme, électricité, lumière) et, notamment par le champ électro-magnétique terrestre.

Images indirectes diurnes. — Il existe trois catégories d'images diurnes connues : les images magnétiques (imago M) à support MS, les images électro-radio-magnétiques (images ERM) à triple support ES, MS, RS et les images radioactives (images RA) à simple support RS.

Images indirectes permanentes. — Il existe trois catégories d'images permanentes actuellement connues : les images électro-magnétiques (images EM) à double support ES et MS, les images électro-radioactives (images E.R.A.) à double support ES et RS et l'imprégnation mentale (image I.M.) à triple support ES, MS, et ω .

Familles (1) d'images. — Les images indirectes diurnes et permanentes ne sont jamais isolées, mais réunies en groupes de famille. La rémanence, qui est une image RA, et l'imprégnation, qui est une image EM, sont liées à des groupes de familles dont il est aisé de déterminer l'emplacement exact à l'aide du pendule.

Chaque famille se compose d'une image mère centrale (qui peut être M, ERM, EM ou ERA, ou IM), flanquée de deux groupes égaux d'images RA, en sorte que le nombre des individus que comprend une famille est toujours impair et égal au chiffre objectif de série de la radiation (Fig. 81).



Famille d'images d'or (Onze)



Fig. 81

Famille d'images de plomb (Treize)

Le nombre d'individus que comprend chacun des deux groupes jumelés d'images R.A. qui flanquent l'image centrale dépend d'une propriété particulière de l'onde de la source radiante et est appelé nombre caractéristique de cette onde.

Dans chaque groupe de familles, l'image centrale de la famille la plus proche de l'objet générateur, est directement liée à cet objet. Celle de la famille suivante est reliée à cette première image-mère centrale, et ainsi de suite.

Si on détruit une image-mère centrale d'un groupe de familles, toutes les images-mères qui lui sont subordonnées disparaissent en même temps.

Dans chaque famille c'est l'image-mère centrale qui donne naissance aux deux images radioactives qui lui sont contiguës; celles-ci engendrent les suivantes et ainsi de suite, suivant la forme d'un chandelier. Quand, dans une famille, on détruit une image radioactive, sa symétrique subsiste; mais toutes celles qui sont subordonnées à l'image détruite disparaissent avec elle.

L'image-mère centrale, qui est toujours la plus brillante du groupe familial, peut être, suivant les cas, de même polarité que le corps générateur, ou de polarité inverse; les images radioactives sont toujours d'une polarité inverse de celle de l'image centrale.

(1) C'est M. Charles De'pon de Vaux qui a observé le premier que le nombre des individus d'une famille d'images était toujours impair et que l'image centrale, beaucoup plus intense que ses compagnes, jouissait de propriétés physiques très différentes.

Les images radioactives (images diurnes) disparaissent, soit au coucher du soleil, soit à l'extinction d'une lumière artificielle. Il s'ensuit que lorsque l'image centrale est permanente, le groupement familial se réduit, dans l'obscurité, à un simple peuplement d'images centrales. Si l'image centrale est elle-même diurne, le peuplement s'évanouit en totalité.




Fig. 82

Image bigame de cuivre

Images polygames. — Une même image centrale peut appartenir à plusieurs groupes familiaux. Dans ce cas, elle engendre dans chacun des groupes distincts le même nombre de filles radioactives qu'elle aurait possédées si elle n'avait appartenu qu'à ce seul groupe (Fig. 82).




Fig. 83

Images radioactives
autour d'un objet de cuivre

Images radio-actives autour d'un objet. — Un objet engendre autour de lui le même nombre d'images radioactives qu'une image-mère centrale à laquelle il aurait donné naissance. Un objet produisant des

groupes d'images radioactives dans chacune des quatre branches de la croix magnétique, on peut à ce point de vue l'assimiler à une image polygame (Fig. 83).

Les quatre images électro radioactives qui sont appelées « gardes du corps de l'objet » et qui sont beaucoup plus petites que lui, sont intercalées entre cet objet et la première image radioactive à laquelle il donne naissance.

Un objet éclairé fournit également six groupes d'images radioactives : un dans chacun des six plans de son rayonnement photogénique.

Rayonnement des images

Les images émettent, soit avec la même polarité, soit avec une polarité inversée, le rayonnement spécifique de l'objet générateur, ce qui donne l'illusion de sa présence ; mais ce rayonnement est véhiculé par des supports différents. Trois catégories d'images, images M, images EM, images RA, rayonnent exclusivement vers le ciel et n'ont aucun rayon ni vertical, ni oblique dirigé vers le sol. Au contraire, les images des catégories ERM et ERA rayonnent comme le corps générateur dans les deux directions.

Le groupement des six croquis de la Fig. 84 permet de comparer le rayonnement d'une boîte aluminium avec celui d'une image de chacune des cinq catégories différentes à laquelle elle peut donner naissance.

Diverses catégories d'images indirectes

Les catégories d'images indirectes se distinguent par la nature des supports qui transportent les rayons spécifiques de l'image, supports indiqués sur la figure n° 84 de la page 189.

1^{re} Classe : IMAGES DIURNES

Il existe trois catégories, actuellement connues, d'images diurnes : les images magnétiques (M), les images électro-radio-magnétiques (ERM), et les images radioactives (RA).

Images magnétiques. — Les images magnétiques (images M) à simple support MS sont produites par l'action de la lumière sur le rayonnement de la charge magnétique propre du corps générateur. Pour le démontrer, il suffit d'éteindre artificiellement ce rayonnement et l'on constate l'évanouissement immédiat de toutes les images M qu'il a formées.

Les familles d'images à mère centrale M se rencontrent principalement dans chacune des branches de la Croix magnétique d'un objet et, en files ascendantes et descendantes sur la verticale de chaque objet.

Images électro-radio-magnétiques. — Ces images (images ERM) à triple support ES, MS, RS sont produites par l'action de la lumière sur le rayonnement des charges électriques et magnétiques propres du




Fig. 84

RAYONNEMENT DES SUPPORTS DIVERS

du Rayonnement Spécifique d'un Corps réel et des diverses images qu'il peut former.

On a supposé ces images positives

corps ainsi que sur son rayonnement radioactif. Si nous éteignons un seul de ces trois rayonnements, l'image ERM s'évanouit.

Des groupes de familles d'images à mère centrale ERM se produisent dans chacun des six champs radiants d'un objet éclairé (rayonnement du double triangle photogénique ou du plan solaire).

Dans les deux cas d'images qui précèdent, nous avons constaté l'intervention de la lumière dans leur formation, mais les recherches faites pour déterminer avec précision le mécanisme de cette action n'ont pas encore abouti.

Images radio-actives : Ces images (images RA) à support unique RS, sont engendrées et entretenues par l'action magnétique de la lumière sur le rayonnement radioactif propre du corps générateur (ou d'une image de l'une des quatre autres catégories). Si, en effet, nous éteignons ce rayonnement par des moyens artificiels ou si nous éclairons le corps à la lumière bleue, l'image s'évanouit.

Ces images qui, pendant le jour, sont en nombre considérable, se rencontrent exclusivement comme satellitos immédiats d'un corps ou d'une image de l'une des quatre autres catégories (images M, ERM, EM, ERA), images mères dont elles sont les filles. Elles se présentent de part et d'autre de cet objet ou de cette image-mère en un double groupe d'un nombre d'unités rigoureusement constant pour la même substance ou la même radiation. Ce nombre est désigné sous le nom de nombre caractéristique de la substance ou de la radiation. Par exemple, deux groupes de deux images RA de part et d'autre d'une image de cuivre, deux groupes de 5 images RA, de part et d'autre d'une image d'or, de 6 images de part et d'autre d'une image mère de plomb, substances dont les nombres caractéristiques sont respectivement 2, 5, 6.

La rémanence est une image radioactive.

Propriétés générales communes des images diurnes : Les images diurnes sont les seules qui, à l'instar des objets, produisent autour d'elles des Croix magnétiques complètes (avec leur 4 champs radiants et leurs quatre groupes de familles d'images). Ce sont aussi les seules qui donnent naissance à des colonnes verticales ascendantes et descendantes de familles d'images.

Elles paraissent insensibles au rayon d'antenne, au rayon visuel et au rayon mental.

2^{me} Classe : IMAGES PERMANENTES

Il existe deux grandes classes d'images permanentes connues, les images électro-magnétiques (images EM) et les images électro-radio-actives (images ERA).

Images électro-magnétiques : Ces images à double support ES et MS sont engendrées et entretenues par l'action d'un champ électrique ou magnétique sur le rayonnement spécifique d'un corps. Si on

éteint le rayonnement propre de la charge électrique ou magnétique d'un corps, l'image continue à subsister. Ce ne sont donc pas ces charges qui entrent en jeu dans la formation de l'image EM, mais une énergie de même nature extérieure au corps générateur.

On trouve des familles d'images à mère centrale E.M. à proximité d'un pont métallique, d'une voiture automobile, d'une rampe d'escalier, d'une machine à coudre, et, en général, de toute masse magnétique ou de tout corps chargé d'électricité.

Le champ électro-magnétique terrestre peut aussi produire des images EM. Tel est le cas de l'image-imprégnation.

Images électro-radio-actives : Ces images (images ERA) à double support ES et RS, sont engendrées et entretenues par l'action du champ EM terrestre sur le rayonnement de la charge électrique propre ou le rayonnement radioactif d'un corps. Pour le démontrer, il suffit d'éteindre l'un ou l'autre de ces deux rayonnements et l'on voit immédiatement l'image disparaître. Ces images sont de petites dimensions.

On trouve des images ERA aux quatre points cardinaux magnétiques de chaque objet et très près de cet objet. Dans chacune des quatre branches du champ de la Croix magnétique cette première image ERA est surmontée verticalement d'une double colonne ascendante et descendante de familles d'images à mère centrale ERA. La polarité de ces images centrales n'est autre que celle de la branche correspondante de la Croix et leur intensité est d'autant plus élevée qu'elles sont plus éloignées verticalement du plan horizontal sur lequel repose l'objet.

Les images ERA sont les seules images qui persistent dans les champs de la Croix magnétique d'un objet qui a cessé d'être éclairé.

Si les images ERA sont engendrées par le champ EM terrestre, il doit être possible de les produire artificiellement en soumettant un objet à l'action d'un champ E.M. quelconque. C'est bien ce qui se passe, en effet.

A côté d'une pièce d'argent P, disposons, comme l'indique la figure 85, un aimant droit. Au-dessus de la partie négative de cet aimant, plaçons un condensateur (1).

Nous réalisons ainsi un champ EM. Dès lors, il nous sera facile de constater que, dans le prolongement de l'aimant, et très près de la pièce, il s'est formé une image ERA, point de départ de colonnes ascendantes et descendantes de familles d'images à mère centrale de cette catégorie.

Si nous plaçons l'objet au-dessus du condensateur, il se forme non plus une, mais quatre files verticales d'images ; deux dans la direction

(1) Le condensateur utilisé pour cette expérience est un petit objet que l'on trouve chez les marchands de matériel pour T.S.F. Il se compose en principe de deux lames de tôles vernies et séparées par un isolant électrique celluloïd ou carton. Les trois pièces sont réunies par des œillets de chaussure




Fig. 85

de l'aimant et deux dans la direction perpendiculaire. Cette expérience démontre que c'est bien au champ électro-magnétique terrestre qu'est due la formation des « gardes du corps permanents » d'un objet.




Fig. 86

Deux types d'images particulièrement intéressants :

La Rémanence et l'Imprégnation

Rémanence (1) : Lorsqu'un corps a séjourné un certain temps dans un milieu déterminé, il impressionne l'éther de ce milieu, et, après qu'on l'en a retiré, il y laisse une image temporaire qui donne l'illusion de sa présence. C'est le phénomène de la rémanence.

Si nous déplaçons la table sur laquelle elle s'est formée, l'image rémanente ne suivra pas le meuble, mais elle subsistera aux points de l'espace que l'objet avait momentanément occupés.

(1) C'est le colonel Camps qui a reconnu le premier l'identité absolue de la rémanence avec une image radio-active. C'est à lui, également, que l'on doit la découverte des images E.M.

La rémanence, engendrée et entretenue par la lumière, est une image radioactive temporaire d'une polarité inverse de celle de l'objet générateur et de même forme que cet objet.

Elle s'évanouit momentanément si l'objet cesse d'être éclairé, ou si l'objet continuant à être éclairé, on la place elle-même dans l'ombre ou la pénombre.

Aucune rémanence ne se produit dans une pièce éclairée à la lumière bleue ou violette.

La durée du rayonnement d'une rémanence est exactement égale à celle de la présence de l'objet aux points de l'espace qu'il a impressionnés. Si elle s'éteint momentanément dans l'obscurité, le temps de son éclipse ne compte pas dans celui de son rayonnement total dont la durée est toujours égale au temps que l'objet a passé aux points où elle s'est formée.

La rémanence n'est pas une image isolée, elle appartient à un groupe de familles à mère centrale EM dont il est très aisé de reconnaître l'emplacement.

Imprégnation : Le phénomène de l'imprégnation fluïdique que certains confondent à tort avec celui de la rémanence, en est absolument distinct.

Si nous plaçons une pièce d'argent sur une feuille de papier disposée sur une table, et si, après avoir tracé au crayon les limites de l'emplacement qu'elle y occupe, nous enlevons la pièce et retirons la feuille de papier, nous constatons que la surface du papier sur laquelle a reposé la pièce continue à émettre les radiations de l'argent, comme d'ailleurs, celles des autres métaux de l'alliage.

Nous aurons réalisé une imprégnation fluïdique qui n'est autre qu'une image électro-magnétique de même forme que le corps imprégnant, mais de polarité inverse.

Cette image n'est, d'ailleurs, pas isolée, et il est très facile de retrouver les groupes de famille auxquels elle est rattachée et qui se déplacent en même temps que la feuille de papier.

Engendrée par le champ électro-magnétique terrestre, l'image imprégnation est permanente sur certaines substances telles que le papier ou certains tissus, tant qu'elle n'a pas été détruite par une cause accidentelle ou par des moyens artificiels appropriés. Sur d'autres substances, au contraire, bois sec, pierres, cuir, métal, elle est absolument éphémère et s'éteint en quelques secondes.

Imprégnation mentale : Si, après avoir tracé sur une feuille de papier un contour fermé et après avoir pensé très fortement à de la poudre de cuivre par exemple, nous supposons que la surface délimitée par ce tracé est remplie de cette poudre, nous projetons à l'intérieur du contour des rayons de cuivre à support mental.

Le papier s'imprègne de ces radiations et finit par les émettre d'une façon permanente. On a ainsi créé une imprégnation mentale de cuivre sur papier.

L'imprégnation mentale est une image permanente à triple support

ES, MS et (1) de même polarité que la substance génératrice ; l'extinction d'un seul de ses trois supports la fait évanouir. Elle est engendrée et entretenue par l'action du champ EM terrestre sur le rayonnement spécifique propre de la substance imprégnante et sur son rayonnement à support (1) qui accompagne le rayon mental. Elle émet ce dernier rayon ainsi qu'on peut le constater à l'aide d'un pendule réglé sur cette radiation.

C'est une image tenace qui, évanouie temporairement par l'action d'une pointe, reprend vie instantanément aussitôt que cette action a cessé.

Le phénomène de l'imprégnation mentale jette la lumière sur un fait qui a paru longtemps inexplicable et que certains, même, ont qualifié d'absolument fantaisiste : le rayonnement propre d'un tableau peint, et, notamment, celui d'un portrait.

Il permet, en outre, de comprendre comment il est possible à un radiesthésiste expérimenté de distinguer un tableau original d'une copie, l'imprégnation mentale ne comportant pas d'imprégnation au second degré.

L'imprégnation mentale est une image quadrigame, jouant le rôle d'objet et qui ne se reproduit pas, elle donne naissance, dans deux directions perpendiculaires, à quatre familles d'images à mère centrale E.M.

Ces deux directions sont celles Nord-Sud et Est-Ouest magnétiques. Elles restent invariables si l'on déplace le papier.

ÉLIMINATION DES IMAGES

Certains opérateurs affirment que, de même qu'il leur est possible de soustraire leur odorat à la perception de certains parfums, de même, ils ont la faculté, par la seule action de leur volonté, de se rendre insensibles à la perception d'une image. Il y a là une application de l'opération de la sélection des ondes dont il a été parlé page 82. Le rayonnement spécifique d'une image différant de celui de l'objet générateur, non seulement par la nature de ses supports, mais encore par celle des radiations accessoires qui l'accompagnent, on conçoit qu'il soit possible à une perception très délicate de le discerner. Mais nous pensons que, sauf pour des sujets particulièrement bien doués, le procédé n'est pas à recommander, surtout au débutant. Nous avons trouvé, d'ailleurs, ces résultats en défaut chez des opérateurs qui prétendaient pouvoir s'y fier entièrement.

Il paraît infiniment plus sûr de recourir à un procédé physique.

Nous ne rappellerons pas ici les procédés d'extinction énumérés aux pages 118-128 de l'ouvrage « Radiesthésie Méthode Physique », et dont on trouvera un résumé dans les tableaux synoptiques des pages 216 bis et suivantes.

Nous nous contenterons de conclure qu'une première solution du problème a été donnée par M. Discry, dans son ouvrage « La science des sourciers à la portée de tous ». L'onde de forme du disque éteignant certaines images, la couleur noire faisant évanouir les autres, nous nous rendrons théoriquement insensibles à la perception d'une image en tenant dans la main positive un pendule complété d'un témoin et en saisissant dans la main négative libre, entre le pouce et l'index, les autres doigts allongés en antenne, un disque de couleur noire.

Nous avons dit : théoriquement, parce qu'il y a en pratique un très gros écueil à éviter. Il peut se faire qu'au moment où nous présentons le pendule au-dessus de l'ancien emplacement d'une image effacée, nous pensions par distraction à l'objet qui lui avait donné naissance. L'instrument se mettra alors à tourner non plus sur le rayonnement d'une image qui n'existe plus, mais sur le rayonnement spécifique de l'objet lui-même que nous aura ramené le rayon mental. Il importera donc, quand nous procéderons à nos opérations de contrôle définitif, de chasser la distraction et d'adopter une attitude entièrement passive.

Un autre procédé, préconisé par M. Chouteau, dans son traité de radiesthésie, consiste à retenir sa respiration pendant la giration du pendule réglé. Si le pendule tourne sur un corps réel, sa giration diminuera d'intensité, mais persistera quand même ; s'il tourne sur une « image » indirecte de n'importe quelle catégorie, sa giration se transformera en oscillation.

Pour mettre de notre côté toutes les chances possibles, ce contrôle devra se faire au Révélateur Electro-radio-magnétique Schumfell, anti-image, muni du témoin approprié, contre le bâtonnet suspenseur.

LES IMAGES DIURNES

DOCUMENTATION ET EXERCICES

I. — Images magnétiques

1° Plaçons à l'un des angles d'une table rectangulaire une petite boîte d'aluminium ; et, après avoir réglé un pendule sur l'aluminium, portons-le au point symétrique de la boîte par rapport au centre de la table. Le pendule se mettra à tourner dans le sens positif. C'est qu'il s'est formé en ce point une image de la boîte d'aluminium et une image de même polarité. Entre l'image et le pendule, interposons à une hauteur supérieure à celle de la boîte une lame de fer ; le pendule s'arrêtera. Cela nous prouve que les rayons spécifiques d'alu-




Fig. 87

Images d'un objet au bord
d'une table rectangulaire

minium émis par l'image sont à support MS. Enlevons la lame de fer, présentons successivement au-dessus de l'image un pendule réglé sur rayons MS, puis un pendule réglé sur rayons ES, enfin un pendule réglé sur rayons RS. Nous constaterons que, seul, le premier pendule entrera en giration. Il s'agit donc d'une image à support exclusivement MS, donc une image magnétique.

2° Refaisons la même expérience le soir, dans une pièce éclairée :

nous obtiendrons les mêmes réactions. Eteignons la lumière (1) ; la giration du pendule s'arrêtera. L'image magnétique est donc engendrée par l'action de la lumière ; c'est, par conséquent, une image diurne.

3° Nous avons dit, page 188, que l'image magnétique est produite par l'action de la lumière sur le rayonnement de la charge magnétique propre du corps. Ce rayonnement n'est autre que le rayon MS dont le chiffre objectif de série est 5. Plaçons à côté et très près de la boîte cinq petits cartons carrés de couleur jaune ou rouge superposés, nous éteindrons les rayons MS qu'elle émet. Reportons-nous à l'emplacement de notre image magnétique. Nous constaterons qu'elle s'est évanouie.




Fig. 88

Images sur la
verticale d'un
objet en ar-
gent.




Fig. 89

Pénétration avec l'index
des images RA et M

4° Images M sur la verticale des corps. Constatons au-dessus et au-dessous de chaque objet éclairé, l'existence sur sa verticale d'une double colonne ascendante et descendante de familles d'images à mère centrale M. Constatons, en les comptant avec l'index de la main négative que le nombre de ces familles est, dans chaque colonne,

(1) C'est M. Oh, De'pon de Vaux qui a signalé le premier l'existence sur la verticale de chaque objet éclairé d'une double colonne (ascendante et descendante) de familles d'images.

égal au chiffre objectif de série (ou nombre particulier de la substance) soit 3 pour l'aluminium. (Fig. 88).

La pointe, détruisant les images RA et l'image M étant insensible au rayon d'antenne, nous serons, si nous voulons les sentir les unes et les autres, dans l'obligation de les pénétrer avec l'index. (Fig. 89).

Distinguons, en tenant une pièce de monnaie dans la main négative (bien la serrer) les images M qui résistent au rayonnement du disque, des images RA que ce rayonnement éteint. Constatons que les images de la colonne ascendante sont droites et celles de la colonne descendante renversées (la base en l'air, le sommet en bas).




Fig. 90

Les quatre champs de la Croix magnétique
d'un objet en aluminium
et, dans chaque branche, groupe de 3 familles d'images

5° Images des quatre champs de la Croix magnétique. Régions notre pendule sur l'aluminium et constatons la présence, autour de notre boîte, de chacun des quatre champs de la Croix magnétique, dans lesquels se propagent des rayons d'aluminium à support MS et de longueur limitée (inégaie dans chacune des quatre branches). Constatons que la polarité des rayons MS varie suivant l'orientation des champs et efforçons-nous de découvrir la loi qui régit ce phénomène.

Pour distinguer le rayonnement spécifique des champs de celui des images qui s'y forment, nous sommes obligés de faire une opération

de sélection mentale avec laquelle nous serons très vite familiarisés et cette sélection sera d'autant plus facile que l'émission d'une image diffère sur de nombreux points de celle d'un objet réel. (Voir tableau n° 2 et figure 84 pages 216 ter et 189).

Le chiffre objectif de série de l'aluminium étant 3, constatons qu'il se forme dans chaque branche de la croix un groupe de trois familles d'images d'aluminium ($4 \times 3^2 = 36$) à mère centrale M auxquelles s'ajoutent les quatre images radioactives engendrées directement par l'objet, soit 40 en tout (si nous négligeons les quatre colonnes d'images électro-radioactives qui s'intercalent entre la boîte et la première image RA qu'elle engendre dans chaque branche).

6° Rayonnement des images M. — Constatons, en plaçant l'index de la main négative au-dessous de l'image, qu'elle ne rayonne vers le sol ni dans le sens vertical, ni dans des directions divergentes.

II. — Images électro-radio-magnétiques

1° Cherchons dans la direction de l'ombre portée par un objet et sur son prolongement, une des images ERM déterminée par son faisceau d'éclairement et marquons-la. Il nous sera facile de la




Fig. 91

Image ERM

dans l'ombre portée d'un objet

que nous interposerons à hauteur convenable entre un pendule réglé sur l'aluminium et l'image soit un isolant électrique (lame de verre ou feuille de papier) soit une feuille de tôle, soit une étoffe ou un carton bleu, la giration du pendule s'arrêtera.

2° Mode de formation. — Dans les mêmes conditions que pour l'image M, constatons par l'apposition contre la boîte soit de cinq soit de sept cartons superposés et l'extinction qu'elle provoque, que la formation de l'image ERM est bien due à l'action de la lumière sur le rayonnement simultané des charges électriques et magnétiques et de la radioactivité propre de l'objet.

3° Production artificielle d'une image E.R.M. — Plaçons à côté de notre boîte d'aluminium, ainsi qu'il est indiqué sur la figure ci-contre, un aimant droit et à côté de lui, une pile de poche, les

pôles de même nom juxtaposés, nous constaterons, si ces pôles sont positifs, la formation d'un groupe de trois familles d'images d'aluminium à mère centrale ERM+.




Fig. 92

Nous distinguerons l'image ERM de l'une de ses filles radioactives en saisissant de la main négative un disque de couleur noir, ce qui déterminera son évanouissement.




Fig. 93

Nous constaterons le même fait si nous remplaçons le dispositif précédent par un simple flacon bien bouché, dont l'air, devenu radioactif, déterminera un double champ El— et Mag—; mais alors l'image ERM sera négative. Si nous éteignons la lumière de notre laboratoire nous constaterons que l'image ERM disparaît, ce qui prouve bien que la lumière est indispensable à sa formation.

4° Images du sextuple champ photogénique ou images des champs du double triangle photogénique : Le faisceau de lumière
(Suite page 203).

Les six champs radiants du Rayonnement Photogénique d'un Disque d'aluminium avec leurs six groupes de familles d'images.




Fig. 94

Les contours hachurés figurent des images centrales ERM— du disque d'aluminium; les contours vides figurent les images RA+ de la même famille.

Le rayonnement spécifique de l'aluminium étant positif, les images RA onondrées directement par le disque sont négatives.

Lorsque la source lumineuse est très rapprochée de l'objet éclairé, ce qui est le cas dans un laboratoire éclairé par une lampe électrique, fixée au plafond, les doux triangles formés par les axes des six champs radiants ne sont ni isocèles ni semblables.




Fig. 95

Images obtenues par la réflexion sur une surface plano du rayonnement d'un disque d'aluminium éclairé

Lorsque le faisceau d'éclairement d'un objet rencontre une surface réfléchissante plane, il détermine d'abord une image DIRECTE (ou physique) quadrigame à son point d'incidence sur cette surface, puis quatre groupes de familles à image-mère centrale ERM d'une polarité inverse de celle de l'objet dans la direction du rayon réfléchi et de son prolongement, et de même polarité dans les deux sens perpendiculaires à cette direction.

La figure ci-devant représente le cas d'un disque d'aluminium (une image directe et 40 images indirectes dans le plan horizontal du disque). Toutes ces images déterminent des Croix Magnétiques avec colonnes ascendantes et descendantes.

Le rayonnement de l'aluminium étant positif, les quatre images RA engendrées par l'image directe sont négatives.

qui éclaire un objet détermine autour de lui la formation d'un sextuple champ dans lequel des rayons spécifiques de l'objet de longueur limitée, sont exportés dans la direction du faisceau d'éclairement par un double support ES et MS et dans les quatre autres directions par un triple support ES, MS et RS. (Fig. 94).

Dans les mêmes conditions que pour la Croix magnétique, nous constaterons :

1° Les polarités différentes de ces champs.

2° La formation dans chacun d'eux d'un groupe de familles d'images à mère centrale E.R.M. et une polarité conforme à celle du champ correspondant.

5° **Images par réflexion :** Lorsque le faisceau d'éclairement d'un objet rencontre une surface réfléchissante plane, il détermine d'abord une image directe quadrigame de cet objet à son point d'incidence sur cette surface, puis quatre groupes de familles à imago mère centrale ERM d'une polarité inverse de celle de l'objet dans la direction du faisceau réfléchi et dans celle de son prolongement, et, au contraire, de même polarité dans chacun des deux sens perpendiculaires à cette direction.

La figure 95 représente le cas d'un disque d'aluminium (corps positif) produisant par réflexion directe sur le miroir une image directe positive accompagnée de ses 4 images RA négatives et 36 images indirectes dans le plan horizontal du disque. Chacune de ces 40 images produit une Croix magnétique avec ses 40 images et une double colonne verticale ascendante et descendante avec ses 20 images.

III. — Images radio-actives

1° Reportons-nous à l'expérience de la page 196. Plaçons notre boîte d'aluminium à l'un des angles de notre table rectangulaire. En diagonale de l'objet nous trouverons, ainsi qu'il a été dit, une image M de même polarité que cet objet ; mais aux deux autres angles nous constaterons la formation d'une image RA de polarité inverse, que nous pourrons, ainsi, étudier sans crainte de confusion avec la première.

Constatons d'abord qu'elle est à support RS. Si nous plaçons à proximité de son emplacement un objet de plomb, ou si nous saisissons de la main négative, soit ce même objet, soit une étoffe de couleur bleue, la giration de notre pendule s'arrêtera. Ce support est unique, car si nous présentons au-dessus de l'image un pendule réglé sur aucun autre support connu, il n'éprouvera aucune réaction.

Il en sera de même si entre lui et l'image nous interposons un écran formé soit d'une lame de plomb, soit d'un carton de couleur bleue.

2^o Constatons que, si notre laboratoire est éclairé à la lumière bleue, nous trouvons bien, en diagonale de l'objet, une image M ; mais qu'aux deux autres angles, les images RA de l'expérience précédente ne se forment pas. Il en est de même avec un éclairage violet, indigo, vert foncé, c'est-à-dire avec une lumière d'une couleur à accompagnement électrique.

3^o Constatons que le nombre d'individus d'une famille d'images est bien égal au chiffre objectif de série, ou, mieux, au nombre particulier de la substance qui lui a donné naissance, c'est-à-dire à 3 pour l'argent, le fer, l'aluminium, etc..., à 5 pour le cuivre, à 11 pour l'or, à 13 pour le plomb, etc..., etc... Déposons sur une table, un objet de chacune de ces différentes substances et faisons la vérification sur la seconde famille d'images de sa Croix magnétique dont nous rechercherons tout d'abord l'image-mère centrale.

Cette vérification, répétée sur un grand nombre de substances, nous permettra de conclure qu'il existe dans toute onde E.M. un élément particulier dont la nature nous échappe encore et qui intervient dans la détermination du nombre d'individus dont se compose une famille d'images engendrées par l'une de ses sources d'émission.

Observons que les images diurnes de toutes catégories émettent des rayons calorifiques CL et des rayons chimiques CH, en constatant la giration d'un pendule, réglé sur ces radiations, au moment où on le présente au-dessus de ces images.


VINGT-SEPTIEME LEÇON

LES IMAGES PERMANENTES

DOCUMENTATION ET EXERCICES

I. — Images électro-radio-magnétiques (E.M.)

1° Production artificielle. — Si nous plaçons devant un objet, en argent, par exemple, l'un des côtés d'une pile de poche ou le pôle d'un aimant, nous obtiendrons dans le prolongement de leur direction un groupe de familles d'images d'argent à mère centrale EM d'une polarité correspondant à celle du champ qui a imprégné l'objet.



Pile de poche

Fig. 96

Constatons par des procédés analogues à ceux précédemment décrits que les images centrales de ces familles sont à supports ES et MS. Pour les distinguer de leurs filles radioactives, il nous suffira de serrer dans la main négative un petit objet de plomb qui nous rendra insensibles à la perception des images RA.

Constatons que l'image EM est permanente et que la lumière n'intervient en rien dans sa formation, en observant que cette image continuera toujours à subsister après que nous aurons éteint la lampe qui éclaire notre laboratoire.

2° Elimination. — Constatons que cette image est volatilisée par une pointe dirigée contre elle et placée à distance convenable, qu'elle

est éteinte aussi par un disque très rapproché ainsi que par un champ électrique ou magnétique de même polarité, alors que le champ de polarité inverse est sans action. Constatons aussi que nous pouvons nous rendre insensibles à sa perception en saisissant dans la main négative soit un isolant électrique (verre ou papier sec, objet d'ébonite, etc...) soit une lame de fer, soit une pièce de monnaie (disque).

3° **Ecrans.** — Constatons que le rayonnement de cette image est arrêté par un isolant électrique (verre ou feuille de papier) par une feuille de tôle ; enfin, que l'image EM ne rayonne pas vers le sol.

II. — Images électro-radio-actives (images ERA)

1° **Description.** — Constatons à l'aide de la pointe-antenne, et dans les environs immédiats d'un objet placé sur une table, qu'il existe très près de cet objet, et dans chacune des quatre directions de ses points cardinaux magnétiques, une image de même forme, mais beaucoup plus petite que lui. Constatons que de chacune de ces quatre images partent deux colonnes, l'une ascendante, l'autre descendante de familles d'images à mère centrale ERA. Constatons que les images des colonnes descendantes sont renversées (base en l'air, sommet en bas). Constatons que ces images sont intercalées entre l'objet et la première image radioactive qu'il forme dans chacune des quatre branches de la Croix magnétique. Enfin, observons que les images ERA sont permanentes en constatant qu'elles continueront à subsister après que nous aurons éteint la lampe de notre laboratoire et que ce sont, par conséquent, les seules images de la Croix magnétique qui subsistent dans l'obscurité.

2° **Rayonnement :** Constater que, comme les images ERM, les images ERA rayonnent soit verticalement, soit obliquement aussi bien dans la direction du ciel que dans celle du sol.

3° **Supports-Ecrans :** Constater par les procédés précédemment décrits que les images ERA sont à double support ES et RS, que leur rayonnement est arrêté, soit par un isolant électrique, soit par une lame de plomb, enfin qu'on se rend insensible à leur perception en saisissant de la main négative : soit un isolant électrique, soit un objet de plomb, soit un objet de couleur bleue.

4° **Production artificielle :** Produire artificiellement des images ERA par le procédé décrit page 192. (Fig. 85 et 86).

VINGT-HUITIÈME LEÇON

LA RÉMANENCE ET L'IMPRÉGNATION

DOCUMENTATION ET EXERCICES

I. — Rémanence

1° Formation : A 10 heures, plaçons une boîte d'aluminium sur une table. A 10 h. 15, retirons-la et présentons à l'emplacement que cette boîte avait occupé, un pendule réglé sur l'aluminium. Nous constaterons la giration de ce pendule. Retirons la table ; il est possible que nous trouvions au point où nous avons déposé la boîte, une image-imprégnation sur bois qui, tout à fait éphémère, disparaîtra très rapidement. Revenons à l'emplacement que la boîte avait occupé dans l'espace ; nous constaterons une giration du pendule qui s'arrêtera définitivement à 10 h. 30. Nous aurons réalisé une rémanence d'un quart d'heure.

2° La rémanence est une image diurne. — Au moment où notre pendule tourne sur une rémanence, demandons à un aide de fermer le commutateur de la lampe éclairante, nous constaterons l'arrêt de la giration. Demandons-lui, ensuite, de nous rendre la lumière, et nous verrons la giration reprendre presque immédiatement.

3° La rémanence est une image radio-active (1). — Pour nous en rendre compte, il suffit d'observer que la rémanence est volatilisée par l'action d'une pointe placée à distance convenable, que son rayonnement est arrêté par le plomb ou par une étoffe ou un carton de couleur bleue et que, pour nous rendre insensibles à sa perception, il nous suffit, le pendule réglé étant tenu de la main positive, de saisir, de l'autre main, un objet de plomb ou un objet de couleur bleue ; enfin que, dans un laboratoire éclairé à la lumière bleue, le phénomène de la rémanence ne se produit pas.

4° Durée : la durée d'une rémanence est limitée, mais régie par une loi. Sur la table de notre laboratoire, éclairée à l'électricité, déposons, encore une fois, notre boîte d'aluminium en un point déterminé

(1) Cette découverte est due au colonel Camps.

où nous la laisserons de 20 h. à 20 h. 15. A 20 h. 15, retirons-la et constatons la rémanence que son ancienne présence a déterminée. A 20 h. 20, éteignons la lumière de notre laboratoire. A 20 h. 25, ouvrons le commutateur : nous constaterons que la rémanence ne disparaîtra qu'à 20 h. 35. Interrompue pendant cinq minutes, qui n'auront pas compté dans le temps de son existence, elle aura duré exactement un quart d'heure. On peut comparer le phénomène de la rémanence au dévidage d'une bobine qui se produirait dans un temps rigoureusement exact à celui de son embobinage, mais s'arrêterait momentanément dans l'obscurité.

5° La rémanence n'est pas une image isolée. Elle fait partie d'une famille rattachée à un ensemble de quatre groupes de familles à mère centrale EM et alignées suivant des directions Nord-Sud et Est-Ouest magnétiques passant par l'ancien emplacement de l'objet. Il s'agit, en somme, d'une transformation de l'ancienne Croix magnétique de l'objet disparu.

II. — Imprégnation fluidique

Ne confondons pas l'imprégnation physique avec l'imprégnation fluidique. Si nous imbibons de salive, d'urine ou de sang un fragment de coton hydrophile ou de carton, ce coton et ce carton émettront, en plus de leur rayonnement propre, celui de la substance à laquelle




Fig. 97

Objet posé sur une
feuille de papier
horizontale




Fig. 98

Imprégnation
sur le papier
après enlèvement
de l'objet




Fig. 99

Position
de l'imprégnation
quand on incline
le papier

on leur aura demandé de servir de support, et il n'y aura aucune différence entre le rayonnement de cette substance et celui qu'elle aurait émis si on l'avait placée dans une coupelle. Nous aurons réalisé une imprégnation physique dont le rayonnement est celui d'un corps réel et qui, par conséquent, ne présente aucune particularité au point de vue radiesthésique.

1° Production de l'imprégnation fluidique. Plaçons une feuille de papier sur une table ; au milieu, déposons notre boîte cylindrique

d'aluminium à section circulaire et traçons au crayon la circonférence qui la limite. Laissons-la quelque temps, puis retirons-la. Tant que nous ne déplacerons pas la feuille de papier, nous constaterons à l'intérieur de la circonférence une rémanence image RA— dont la durée sera égale au temps du séjour de la boîte à son emplacement.

Mais, si nous déplaçons la feuille de papier, nous constaterons que le cercle tracé continue à impressionner un pendule réglé sur l'aluminium et qu'il s'est formé, à l'intérieur du cercle, une image que nous appellerons image-imprégnation, qui semble solidement accrochée au papier et qui le suit dans tous ses déplacements.

2° La formation de l'imprégnation fluidique est quasi instantanée. — Nous avons laissé notre boîte en place un certain temps afin de mieux saisir le passage du phénomène de la rémanence à celui de l'imprégnation ; mais, pour mieux nous rendre compte de ce second phénomène, traçons sur une feuille de papier une circonférence d'un diamètre un peu supérieur à celui de la boîte. Posons pendant un quart de seconde la boîte à l'intérieur de cette circonférence et nous constaterons que le cercle rayonne l'aluminium. La formation de l'image-imprégnation a été instantanée.

3° L'imprégnation fluidique est un image EM dont la polarité (de premier degré) est inverse de celle du corps générateur. Constatons d'abord dans notre expérience la formation d'une image négative, en observant (au besoin avec l'aide d'un témoin de polarité) que, présenté au-dessus de ce cercle et tenu par une main positive, un pendule réglé sur l'aluminium tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre. Constatons ensuite que cette image est une image EM en observant que, si nous dirigeons une pointe vers cette image, le pendule s'arrête, qu'il en est de même si nous plaçons le cercle dans le champ négatif d'un aimant, qu'il en est de même aussi si nous approchons de l'image une pièce de monnaie, enfin que son rayonnement, arrêté, soit par une lame de fer (plaque de tôle) soit par un isolant électrique (lame de verre ou feuille de carton), est absolument insensible à l'action du plomb. De ce qui précède, nous concluons que la recherche des remèdes doit se faire sur une imprégnation physique : urine, sang, salive, cheveux, mouchoir usagé (1) et non sur une imprégnation fluidique au premier degré, qui donnerait des contre-indications de polarité, mais elle peut se faire sur une imprégnation fluidique au second degré à l'aide de l'écriture du malade par exemple, ou sur une empreinte Chaney.

Constatons, au sujet de la polarité de l'imprégnation soit du premier degré, soit du second degré, qu'une imprégnation du premier degré sur papier émet le rayonnement d'une source radiante avec une polarité

(1) Le mouchoir qui renferme les mucosités du malade et qui a été fréquemment en contact avec son nez contient à la fois une imprégnation physique et une imprégnation fluidique ; mais en raison des frottements perpétuels dont elle est l'objet, cette dernière est très vite effacée. L'imprégnation fluidique est, d'ailleurs, très peu tenace sur la toile.

l'image-imprégnation est absolument éphémère, son décrochage se produisant au bout de quelques secondes seulement. Constatons (en faisant l'essai avec un pendule réglé, successivement sur chacune d'elles) qu'une page d'écriture constitue une image-imprégnation de tous les rayonnements de la personne qui l'a écrite et en particulier de son onde personnelle. Si nous en avons la possibilité, constatons la permanence de l'image-imprégnation en examinant des manuscrits sur papier datant de plusieurs centaines d'années. (Fig. 100).



Fig. 101



Fig. 102



Fig. 103

Constatons que si on fait une boulette d'une page d'écriture, on aura beau la redresser à la presse, on ne fera pas réapparaître l'image-imprégnation qui aura disparu pour jamais.

Constatons qu'après la combustion du papier, les cendres d'une page d'écriture continuent à émettre les rayonnements de son autour tant qu'elles restent en bloc aggloméré. Pulvérisons le bloc, nous verrons le rayonnement s'éteindre.

5° Supports liquides : Les liquides peuvent servir de substance-support à une image-imprégnation. Constatons que, si après l'avoir laissée séjourner quelques secondes dans un verre d'eau, nous en retirons une cuillère d'argent, l'eau continuera à émettre les radiations de l'argent. Constatons par les procédés rappelés au deuxième alinéa qu'il s'agit bien d'une image EM— de la cuillère d'argent. Constatons que l'image est assez persistante et qu'il faut changer plusieurs fois l'eau du verre avant de la voir disparaître. Constatons quo, pour pou

qu'il reste au fond du verre une mince lame de liquide, l'image s'y accroche, alors qu'elle ne tiendrait pas sur le verre sec.

Constatons que, par suite des innombrables images diurnes que forme un objet d'or ou de plomb, la sève de nombreuses essences d'arbres se trouve imprégnée de ces radiations jusqu'à une assez grande distance. Constatons par les procédés indiqués et notamment par la pointe qu'il s'agit bien d'une image-imprégnation EM—. Constatons le même fait pour le liquide des fosses d'aisance.

Si la sève des arbres s'imprègne, il en est de même du sang des animaux. Etant assis, plaçons une boîte d'aluminium sur une de nos cuisses, nous constaterons au bout de peu de temps qu'un pendule réglé sur l'aluminium tourne au-dessus de notre main. De cette expérience on peut déduire d'importantes conséquences pour la métallothérapie et aussi pour les précautions que doivent prendre les personnes qui s'occupent de radiesthésie médicale, même par la méthode mentale. Pour ne pas devenir un jour victimes de leur dévouement, ces personnes ont intérêt, après chaque séance de travail, à se désimprégner, comme il est dit plus loin à l'aide d'un champ électrique ou magnétique.

6° L'image imprégnation n'est pas une image isolée. — Elle fait partie d'un ensemble de quatre groupes de familles orientés respectivement suivant les directions Nord-Sud et Est-Ouest magnétiques. C'est, en somme, la Croix magnétique de l'image-imprégnation qui se déplace avec le papier, mais en pivotant autour de cette image qui lui sert d'axe de rotation, de manière à rester invariablement dans sa direction normale. Mais, créées par le champ EM terrestre, les images-mères qui s'y forment sont des images EM permanentes, au lieu d'être comme dans la Croix magnétique d'un objet des images M diurnes.

7° Imprégnations d'images : Si, à l'emplacement d'une image nous portons une feuille de papier blanc, nous constatons qu'il s'est formé au point impressionné une image-imprégnation de cette image. L'imprégnation fluide d'une image, même diurne, est une image EM permanente de polarité inverse, sauf pour les images ERA.

L'imprégnation d'une image M+ est une image E.M.—

L'imprégnation d'une image ERM+ est une image E.M.—

L'imprégnation d'une image RA— est une image E.M.+

L'imprégnation d'une image ERA+ est une image E.M.+

L'imprégnation d'une image EM+ est une image E.M.—

8° Imprégnation au second degré : Si l'imprégnation d'une image est une image E.M., il doit en être de même de l'imprégnation d'une image-imprégnation. Il doit donc exister des imprégnations au second degré. C'est bien, ainsi, en effet, que les choses se passent. Si, au-dessus du cercle, que nous avons tracé pour matérialiser notre imprégnation au premier degré de la boîte d'aluminium, nous posons une pièce de papier blanc, nous observons qu'il s'y imprime une

nouvelle image identique à la précédente, de même forme, de même intensité, mais, de polarité inverse. Ce sera l'image-imprégnation au second degré de la boîte, l'image II^2 . Nous obtiendrons de la même façon des images-imprégnations de degré supérieur II^3 , II^4 , etc..., toutes de même intensité, le champ E.M. terrestre se chargeant d'entretenir les foyers que nous aurons ainsi allumés ; les images de degré pair étant de même polarité que le corps, les images de degré impair de polarité inverse.

9° Imprégnation du Pendule : Un pendule qui a reçu pendant quelque temps le rayonnement spécifique d'une substance, l'émet à son tour et tourne quand on le présente sur n'importe quel corps. Il s'agit là d'un fait d'autoréglage temporaire par imprégnation qui peut nous faire commettre bien des erreurs si nous ne prenons soin de désimprégner le pendule chaque fois que nous changeons de substance. L'imprégnation sur surface sphérique étant peu stable, un léger choc sur la table ou une simple secousse suffiront pour restituer à l'instrument toutes ses qualités initiales. Faire l'expérience.

10° Mécanisme du passage de la rémanence à l'imprégnation fluïdique. — Reportons-nous à l'expérience du 1° de la page 208. Sur une feuille de papier blanc posée sur notre table, portons notre boîte d'aluminium. Traçons au crayon la circonférence qui on limite le contour et laissons, sans y rien toucher, le dispositif en place pendant deux minutes. Puis, enlevons l'objet, et sans rien déplacer portons au-dessus du cercle le pendule réglé sur l'aluminium. Tenu par une main positive, il commencera à tourner dans le sens négatif sur l'image RA— qui constitue la rémanence. Au bout de deux minutes, nous verrons la giration s'arrêter. Puis, après quelques secondes de balancement, le pendule se remettra à tourner dans le même sens, pour ne plus s'arrêter. C'est que l'image RA— s'est déplacée et a été remplacée par une image E.M.—, image centrale d'une famille de polarité différente de celle à laquelle appartient la rémanence. Il y a eu déplacement de la Croix magnétique, puisque l'on sait que deux branches de cette croix, situées sur le même alignement, sont de polarité différente. Un travail à la lumière bleue permettrait de trouver les modalités rigoureusement exactes de ce phénomène. Sans vouloir les fixer, contentons-nous, pour le moment, de noter que le phénomène du dévidage a eu pour effet de déterminer un déplacement momentané de cette croix, déplacement qui a pris fin avec l'arrêt de ce dévidage.

11° Empreinte Chaney : Un dispositif indiqué par M. Chanoy, ingénieur des Mines, permet d'obtenir directement sur papier des imprégnations fluïdiques de même polarité que celle de la substance imprégnante, équivalant, pratiquement, par conséquent, à des imprégnations au second degré.

Deux lames de verre constituées, par exemple, par des vieux clichés photographiques 9X12 sont séparées par un tissu très fin (mouchoir de moussoline plié en huit) sous lequel on dispose la feuille de

papier à imprégner fluidiquement ; les quatre éléments sont ensuite serrés par des élastiques qui les maintiennent bien fixes.

On place le dispositif sur le trajet de la radiation à étudier, de manière à ce que celle-ci ne rencontre le papier qu'après avoir traversé le mouchoir, qui, ainsi qu'on peut s'en rendre compte par l'expérience suivante, agit dans ce cas comme inverseur de polarité.

Tenons, en effet, dans la main positive, un pendule réglé sur l'argent, dans le plat de l'autre main plaçons un mouchoir plié en huit sur lequel sera déposé un objet en argent. Nous constaterons qu'au lieu de tourner dans le sens positif, l'instrument se mettra à tourner dans le sens négatif. Ce sont donc des radiations de polarité inversée qui impressionnent le papier.

VINGT-NEUVIEME LEÇON

L'IMPRÉGNATION MENTALE (Image IM)

DOCUMENTATION ET EXERCICES

1° Produire une imprégnation mentale : Sur une feuille de papier blanc, tracer un contour fermé. Penser très fortement à un métal quelconque dont on supposera la poudre entassée à l'intérieur de ce contour. Régler le pendule sur le métal et constater sa giration dès qu'on le présente sur la verticale de la surface tracée. Essayer plusieurs métaux différents et constater qu'il s'agit bien d'un phénomène d'ordre général. Constater à l'aide d'une pile de pocho que la polarité de l'image I.M. ainsi produite est la même que celle du métal.

2° Supports de l'imprégnation mentale : Régler le pendule successivement sur rayons ES, MS, (1) et constater sa giration sur le contour fermé. Constater que si l'on éteint l'un quelconque de ces trois rayons, le pendule réglé sur le métal générateur cesse de tourner. Il s'agit donc bien de radiations support et non de rayons d'accompagnement.

Observer en mettant en œuvre les procédés d'identification indiqués à la page 159 de l'ouvrage « Radiesthésie Méthode Physique », que l'image IM émet le rayon mental et le rayon nerveux.

3° Il n'existe pas d'images IM. au second degré. — Mettre une feuille de papier blanc en contact avec le contour fermé et constater qu'après ce contact aucune partie de cette feuille n'émet les radiations spécifiques du métal choisi ni aucun des autres rayonnements de l'image IM. Il n'existe donc pas d'image I.M. du second degré, ni a fortiori, de degré supérieur.

4° Le Petit Jeu de la carafe : L'essence de ce petit jeu de société qui permet de se rendre compte que l'imprégnation mentale peut se produire sur un support liquide et qui a généralement beaucoup de succès, est la suivante : Un aide remet à un opérateur, à côté de qui a été placée une carafe pleine d'eau, une feuille de papier dont il conserve le double et qui contient une liste de quatre à cinq métaux différents. L'aide, après s'être retiré dans une autre pièce,

souligne le nom de l'un des métaux figurant sur la liste et y pense fortement en le supposant déposé au fond de la carafe. Il s'agit, pour l'opérateur, de découvrir le métal choisi par son partenaire. Cette opération se fait facilement par élimination, après essai de chacun des métaux de la liste, en identifiant le rayonnement qui sort de la carafe à l'aide des procédés indiqués à la page 159 de l'ouvrage « Radiesthésie Méthode Physique ».

5° Rayonnement d'un tableau peint d'après nature : Un tel tableau constitue une imprégnation mentale sur la toile (image IM) du rayonnement de tous les objets que le peintre a voulu représenter, après y avoir pensé longuement et l'avoir capté à l'aide du rayon visuel et du rayon mental. Sur une partie du tableau représentant l'océan, on trouvera tous les rayonnements de l'eau de mer, sur la représentation d'un bâtiment de guerre on rencontrera le rayonnement de nombreux métaux, etc., etc...

6° Rayonnement d'une copie de tableau : Le peintre qui effectue une copie n'a en vue que la reproduction des contours, tons et couleurs de l'original. Ce sont ces éléments qui le préoccupent beaucoup plus que les éléments représentés par le pinceau du maître. La copie rayonne donc surtout les couleurs du tableau original. Si elle émettait le rayonnement des objets, il s'agirait d'une image IM au second degré. Or, cette image, comme il a été dit au 3°, n'existe pas.

Pour nous en rendre encore mieux compte, faisons l'expérience complémentaire suivante :

Le contour de l'imprégnation au premier degré d'un métal ayant été tracé sur une feuille de papier, traçons un second rond sur la même feuille et essayons d'y projeter mentalement le rayonnement du premier. Autant nous aurons réussi facilement dans le premier cas, autant nous échouerons dans le second, ainsi que nous pourrions nous en assurer à l'aide du pendule.

Il ne sera donc pas téméraire d'affirmer qu'on distingue un tableau original d'une copie par ce fait que, contrairement à ce qui se passe dans le premier cas, la copie n'émet pas le rayonnement des objets représentés.

7° Rayonnement d'un portrait d'après nature : Pour les raisons exposées au 5°, un portrait exécuté d'après nature émettra tous les rayonnements de la personne représentée, y compris celui des maladies dont elle était affectée au moment où elle a posé. Si le portrait n'émet ni l'onde humaine, ni l'onde nerveuse, ni l'onde vitale, ni l'onde sympathique, etc..., on peut être certain qu'on se trouve en présence d'une copie. Faire l'expérience sur diverses œuvres.

1. Groupement synoptique de GÉNÉRALITÉS

1	2	3	4	5	6	7
VARIÉTÉS	Désignation Abrégée	ORIGINE	SUPPORTS	MÉCANISME DE FORMATION	FORME. STABILITÉ. DURÉE	POLARITÉ
Directes.....	D	Résultat d'une déviation accidentelle, partielle ou totale, du rayonnement propre d'un objet radiant, ou d'une source d'émission.	Divers	Très différent, suivant les cas : réflexion, réfraction, dispersion, ou intervention d'ondes particulières (phénomène des Coins, corps suspendu par un fil).	Variables, suivant la nature de l'accident qui leur donne naissance.	La même que celle du corps ou de la source radiante dont le rayonnement sert à les former.
	M	Engendrées et entretenues par l'action sur la source radiante d'une ou plusieurs énergies extérieures. Ce sont ces forces, lumière, magnétisme, électricité, qui déterminent, au contact de l'objet, l'émission d'ondes électro-magnétiques particulières, qui servent de support au rayonnement spécifique de l'image et qui le véhiculent.	Unique : MS	Images magnétiques : M : produites par l'action de la lumière sur le rayonnement de la charge magnétique propre du corps générateur.	Les images indirectes peuvent être, par rapport à l'objet générateur :	Les images indirectes sont, tantôt de même polarité que le corps générateur ou la source origine radiante, tantôt de polarité inverse. Le plus souvent, la polarité de l'image correspond à celle de l'énergie extérieure qui lui donne naissance ; mais ce n'est pas toujours exact car la loi est assez complexe.
Indirectes (2 classes)	ERM	La nature différente des supports détermine des catégories différentes d'images ayant des propriétés physiques très distinctes.	Triple : ES — MS — RS	Images électro-radio-magnétiques : ERM : produites par l'action de la lumière sur le rayonnement des charges électriques et magnétiques propres du corps, ainsi que sur son rayonnement radioactif propre.	Droites ou inclinées, Semblables ou déformées, Identiques, amplifiées ou réduites, Permanent ou temporaires, Fixes ou mobiles,	
	RA	On fait évanouir une image en éteignant un seul de ses supports.	Unique : RS	Images radioactives : RA : produites par l'action magnétique de la lumière sur le rayonnement radioactif propre du corps générateur.	suivant les conditions particulières de leur formation et, aussi, suivant que l'énergie qui leur donne naissance est elle-même :	
	EM		Double : ES — MS	Images électro-magnétiques : EM : produites par l'action d'un champ électrique ou magnétique sur le rayonnement spécifique d'un corps.	Permanente ou temporaire, Fixe ou mobile.	
	ERA		Double : ES — RS	Images électro-radioactives : ERA : produites par l'action du champ EM terrestre sur la charge électrique et la radioactivité propre d'un corps.	Sauf les images ERM et ERA, qui rayonnent verticalement ou obliquement dans les deux directions, les images indirectes rayonnent exclusivement vers le ciel.	
	IM		Triple : ES — MS — RS	Imprégnation mentale : IM : action du champ EM terrestre sur le rayonnement spécifique d'un corps véhiculé par le rayon mental d'un opérateur.		

Images :
Deux espèces

Diurnes
(3 catégories)

Indirectes
(2 classes)

Permanentes
(3 catégories)

GÉNÉRALITÉS sur les IMAGES

7 POLARITÉ	8 GROUPEMENT DES IMAGES MULTIPLES	9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES GÉNÉRALES	10 OBSERVATIONS pour un opérateur dont la main droite est positive
La même que celle du corps ou de la source radiante dont le rayonnement sert à les former.	Très variable suivant les cas. Le phénomène des coins et celui de la suspension donnent naissance à quatre images, symétriques par rapport à l'objet.		
Les images indirectes sont, tantôt de même polarité que le corps générateur ou la source originaire radiante, tantôt de polarité inverse. Le plus souvent, la polarité de l'image correspond à celle de l'énergie extérieure qui lui donne naissance ; mais ce n'est pas toujours exact car la loi est assez complexe.	Jamais isolées, les images indirectes sont toujours réunies en groupes de familles. Chaque famille comprend un nombre d'individus égal au chiffre objectif de série du corps générateur ou de la source radiante. Le groupe comprend un nombre de familles égal au même chiffre. Les groupes sont presque toujours réunis en un groupement de plusieurs groupes. Ainsi, horizontalement, les images de la Croix magnétique forment un peuplement de quatre groupes. Celles du double triangle photogénique, un peuplement de six groupes. Dans chaque famille, l'image centrale, plus brillante que les autres, est de l'une des quatre catégories : M, ERM, EM, ERA. Les autres images sont toutes RA et disparaissent au coucher du soleil ou à l'extinction d'une lumière artificielle. Lorsque l'image centrale est permanente, le groupement se réduit dans l'obscurité à un peuplement d'images centrales qui restent à leur place.	Images diurnes Comme les corps réels, donnent lieu à la formation de colonnes ascendantes ou descendantes de familles d'images analogues à celles que l'on trouve sur la verticale de chaque corps éclairé. Produisent des Croix magnétiques et des triangles photogéniques avec champs radiants et groupements de familles d'images, mais ces familles sont à mère centrale EM au lieu de M. Paraissent insensibles au rayon d'antenne, au rayon visuel et au rayon mental. Emettent des rayons calorifiques et des rayons chimiques.	Avec un « témoin » dans la main droite on ne tourne pas sur une image d'une catégorie autre qu'une image EM. Avec un « témoin » dans la main gauche, le pendule tourne sur toutes les images, sauf sur les images EM. Il oscille donc sur un corps réel et une image EM. Par le contact de deux doigts de la main gauche, de même polarité (par exemple, pour la plupart des opérateurs du pouce et du petit doigt) on se rend généralement insensible à la perception d'une image indirecte quelconque. En saisissant dans la main gauche un disque d'une substance quelconque peint en noir, on se rend insensible à la perception d'une image indirecte de toute catégorie. (Procédé indiqué par M. Discry).
		Images permanentes Il n'y a pas de colonnes verticales sur les images permanentes. Elles ne produisent ni Croix magnétique, ni Triangles photogéniques, mais seulement des familles d'images à mère centrale EM orientées Nord-Sud et Est-Ouest magnétique. Les images ERA ne se rencontrent qu'en files verticales aux quatre points cardinaux magnétiques de l'objet générateur.	Propriétés communes à toutes les images indirectes : Toutes les images forment le rayon d'union soit avec un objet, soit avec une image de n'importe quelle autre catégorie de même rayonnement spécifique. Les six catégories d'images indirectes sont captées par les champs radiants d'un aimant. Si l'on retient sa respiration pendant la giration d'un pendule réglé, cette giration qui, sur un corps réel, persisterait, se transforme en oscillations si l'instrument tourne sur une image indirecte. (Procédé de M. Chouteau). Enfin, le Pendule Schumfell reste insensible à toute image sur laquelle il peut se trouver et ne manifeste son action que sur le corps réel pour lequel il est réglé. C'est la raison pour laquelle son emploi est recommandé.

2. Tableau synoptique des Propriétés Physiques particulières des IMAGES DIURNES

1	2	3	4		5		6	7		8
NOM DE LA CATÉGORIE DE L'IMAGE	NOM du ou des SUPPORTS	MODE DE FORMATION	RAYONNEMENTS DIVERS ÉMIS PAR L'IMAGE		PROCÉDÉS D'EXTINCTION		ÉCRANS PHYSIQUES arrêtant le rayon- nement spécifique de l'image	ÉCRANS RADIESTHÉSQUES rendant l'opérateur insen- sible à la perception de l'image		OBSERVATIONS
			Pos. +	Nég. —	Pos. +	Nég. —		Pos. +	Nég. —	
					Champ El +	Champ El —		Champ Mag. +	Champ Mag. —	
Images magnétiques (M)	Support unique : MS	Action de la lumière sur la charge magnétique du corps générateur.	L C H C L	M C H C L	Champ Mag. +	Champ Mag. —	Lame de fer. Carton de couleur noire.	Champ El +	Champ El —	Résistent au rayonne- ment du Disque noir.
					Rayonnement de la Couleur Noire			Objet en fer ou objet de couleur noire saisi de la main négative.		
					Champ El +	Champ El —				
Images électro-radio- magnétiques (ERM)	Triple support : ES MS RS	Action de la lumière sur le rayonnement des charges électriques et magnétiques propres du corps en même temps que sur son rayonnement radioactif propre.	(α, γ) C H C L	(α, γ) C H C L	Champ Mag. +	Champ Mag. —	Isolant électrique. Lame de fer. Carton de couleur noire ou bleu.	Isolant électrique.	Pointe dirigée vers le sol ou Objet de couleur noire ou bleu tenus de la main négative.	Résistent au rayonne- ment du Disque noir.
					Pointe. Rayonnement du Plomb Rayonnement de la Couleur Noire ou Bleue					
			(α, γ)	(α, γ)						
Images radioactives (RA)	Support unique : RS	Action magnétique de la lumière sur le rayon- nement radioactif propre du corps générateur.	α, β γ, β, γ C H C L	α, β γ, β, γ C H C L	Pointe. Rayonnement du Plomb ou de la Couleur Bleue		Lame de plomb. Etoffe ou Carton de couleur bleue.	Pointe tournée vers le sol. Objet bleu Disque de couleur quelconque		Eteintes par le rayon- nement du Disque noir. Ne se forment pas dans un éclairage à la lumière bleue ou vio- lette. N'existent que comme satellites d'une imago- mère d'une autre caté- gorie.

Propriétés
générales

Les images diurnes de toute catégorie paraissent insensibles au rayon d'antenne, au rayon visuel et au rayon mental.

3. Tableau synoptique des Propriétés Physiques particulières des IMAGES PERMANENTES

1	2	3	4		5		6	7		8
NOM DE LA CATÉGORIE DE L'IMAGE	NOM du ou des SUPPORTS	MODE DE FORMATION	RAYONNEMENTS DIVERS ÉMIS PAR L'IMAGE		PROCÉDÉS D'EXTINCTION		ÉCRANS PHYSIQUES arrêtant le rayonnement spécifique de l'image	ÉCRANS RADIESTHÉSQUES rendant l'opérateur insensible à la perception de l'image		OBSERVATIONS
			Pos. +	Nég. —	Pos. +	Nég. —		Pos. +	Nég. —	
Images électro-magnétiques (EM)	Double support : ES MS	Action d'un champ El ou Mag sur le rayonnement spécifique d'un corps.	ES +	ES —	Champ El +	Champ El —	Isolant électrique. Lame de fer.	Pôle Mag +	Pôle Mag —	
			MS +	MS —	Champ Mag +	Champ Mag —		Pôle El +	Pôle El —	
			J	K	Pointe.			Pointe dirigée vers le sol.		
					Rayonnement d'un Disque rapproché			Disque tenu de la main négative.		
Images électro-radioactives (ERA)	Double support : ES RS	Action du champ EM terrestre sur la charge électrique ou la radio-activité propre d'un corps.	L	M	Champ El +	Champ El —	Lame de plomb.	Charge El +	Charge El —	Toutes les images permanentes sont détruites à la fois par le rayonnement d'un Disque rapproché et par celui de la couleur noire.
			ω. 9 ⁺	ω. 9 [—]				(Pile de poche).		
			ν. 9 ⁺ , ζ	ν. 9 [—] , ζ	Rayonnement d'un Disque rapproché			Disque tenu de la main négative.		
Imprégnation mentale : Image (IM)	Triple : MS ES "	Action du champ EM terrestre sur le rayonnement spécifique d'un corps véhiculé par le rayon mental d'un opérateur.	ES +	ES —	Champ El +	Champ El —	Isolant électrique. Lame de fer. Etoffe ou papier de couleur bleue ou noire.	Pôle Mag +	Pôle Mag —	
			MS +	MS —	Champ Mag +	Champ Mag —		Pôle El +	Pôle El —	
			ω. 9 ⁺	ω. 9 [—]	Pointe.			Pointe dirigée vers le sol.		
			Rayon Mental.		Rayonnement d'un Disque rapproché			Disque tenu de la main négative.		
			Rayon Nerveux.		Rayonnement de la Couleur Bleue ou Noire					

LES ÉCUEILS

DOCUMENTATION

Il faut apprendre à connaître les écueils qui tendent constamment à induire en erreur le débutant. Les radiesthésistes les plus expérimentés enregistrent, malgré toute leur attention, des échecs, parce qu'ils tiennent parfois à des causes insoupçonnables. La recherche de ces causes d'échecs, dans chaque cas particulier, sera donc des plus instructives.

L'opérateur ne devra jamais dire : « Il y a ceci, il y a cela », mais : « Je crois sentir ceci ou cela ».

Voici les principaux écueils à éviter :

L'état physique du radiesthésiste : Le système nerveux jouant un rôle considérable dans l'évolution des phénomènes radiesthésiques, l'opérateur doit se garder de tout ce qui pourrait l'influencer fâcheusement : fatigue excessive, insomnie, repas trop copieux ou trop bien arrosé, etc... L'opérateur doit être bien dispos et opérer de préférence le matin, ou après un frugal repas.

Dans le début, ne consacrer journellement qu'une demi-heure aux exercices pratiques de chaque leçon. Répéter les exercices du jour précédent. S'arrêter dès qu'apparaît l'ennui ou la moindre fatigue, le jeu normal des réflexes en serait contrarié.

On peut opérer debout, le corps droit, sans raideur, le pendule assez éloigné de la poitrine. Pour éviter la fatigue des premiers exercices, disposer l'objet visible à étudier sur un support ou tablette assez basse, facilitant à l'avant-bras.

suspendant le pendule, une tenue horizontale, la main pendante.

Eviter de tenir la main gauche libre en contact avec les hanches ou une autre partie du corps, ce qui aurait pour effet de faire tourner le pendule avec des longueurs d'ondes voisines de celles qui conviendraient. Fermer la main gauche pour éviter que son index soit dirigé vers le sol, ce qui empêcherait parfois le pendule de se mettre régulièrement en mouvement.

On peut également opérer assis, devant une table assez basse pour permettre à l'avant-bras de ne pas s'élever au-dessus de l'horizontale, ce qui engendrerait plus rapidement la fatigue. Ne pas croiser les jambes. Avoir les pieds bien à plat au sol.

L'auto-suggestion : Ce qui s'oppose souvent aux premiers succès, c'est d'abord le « manque de confiance en soi », c'est-à-dire la crainte de ne pas réussir. Le débutant se met ainsi en état d'infériorité absolue.

Pour certains, par contre, ce qui les mène à l'échec, c'est une « suggestion spontanée », par trop d'assurance. Ces débutants sont sous l'emprise de l'autosuggestion, en se laissant dominer par la pensée que leur pendule tournera ou oscillera, ou encore qu'il tournera positif, ou négatif. Leur imagination s'oppose ainsi aux libres mouvements de leur pendule.

Le débutant doit donc combattre à tout moment son imagination. Il s'efforcera, au contraire, d'obtenir de son esprit un état neutre, une attitude passive, physiquement et mentalement, comme le réclame la méthode physique.

En effet, il constatera qu'avec un peu d'habitude, il est aisé d'inspirer au pendule le mouvement que l'on désire, que l'on veut. Notre volonté peut donc agir sur lui à sa guise. Il convient donc de « neutraliser notre volonté », notre cerveau, et d'en évincer toute idée préconçue. Au besoin, penser à tout autre chose qu'à ses recherches, afin de laisser les réflexes se produire librement.

La communication de la pensée : Si, pendant qu'il travaille sur votre terrain, vous êtes aux côtés du sourcier,

vous disant sans cesse intérieurement : « Ah ! s'il pouvait trouver de l'eau juste à cet endroit, comme ce serait commode, comme cela ferait mon affaire ! », vous risquez de l'induire en erreur et de lui faire proclamer un résultat inexact.

Mais l'action envisagée est encore plus préjudiciable si l'opérateur travaille sous les yeux d'un observateur hostile ou simplement sceptique qui épie tous ses mouvements et les commente. Il a de nombreuses chances, dans ce cas, d'encaisser un échec.

Pour conclure, nous dirons que s'il veut se soustraire à la tacheuse influence de la communication de pensée, le radiesthésiste doit s'astreindre à **travailler seul**. S'il ne peut éviter quelques personnes, que celles-ci s'écartent de lui au moins de quatre à cinq mètres.

L'influence des rayons nerveux : Si nous recouvrons une pièce de monnaie d'un verre transparent à boire, retourné, les rayons verticaux, à support électrique, ne traverseront pas l'isolant, et le pendule réglé sur le métal de cette pièce, présenté au-dessus du verre, ne réagira pas. Mais si nous regardons la pièce, par transparence, ou même, si nous nous contentons d'y penser, sous l'action du rayon nerveux visuel, ou du rayon mental, le pendule se mettra à tourner.

Plaçons le même objet sur une table, et recouvrons-le d'une teuille de papier convenablement placée et orientée. Les rayons verticaux ne traversant pas l'isolant électrique qu'est le papier, nous ne pourrions tracer que le lieu des points d'émergence des rayons à 45° qui s'échappent de la pièce de monnaie. Mais si nous regardons l'emplacement de la position de la pièce, ou si, même, nous nous bornons à y penser, les rayons nerveux visuels, ou le rayon mental, ramèneront à travers le papier les rayons spécifiques de ses ondes verticales et nous les percevrons sur toute la surface de la tache radiesthésique de la pièce, comme si le papier était perméable à l'électricité.

Ces phénomènes montrent combien, si nous n'y prenons garde, nous pouvons être induits en erreur, dans les expé-

riences, et proclamer, par exemple, que le carton, la soie ou le caoutchouc sont traversés par les nappes verticales des corps. Etant prévenus, nous éviterons l'influence des rayons nerveux, ou du rayon mental, en cessant de penser à l'expérience que nous faisons et, en fermant les yeux, afin de laisser les réflexes se produire librement.

L'imprégnation du pendule : Nous savons que lorsqu'un pendule a reçu, pendant un certain temps, les radiations d'un corps, il en est comme imprégné et subit une sorte d'autoréglage temporaire. Il tourne en permanence, même quand il a cessé d'être au-dessus de ce corps.

Si donc nous avons à faire une discrimination entre des objets différents sur la foi de la seule réaction du pendule (par exemple détermination du sexe des œufs), il importe de nous assurer que cette réaction est bien le fait de l'objet sur lequel le pendule a été présenté, et non de l'objet précédent.

Pour cela, après chaque opération, nous donnerons au pendule une ou plusieurs secousses jusqu'à ce qu'il cesse de tourner automatiquement, ou encore nous donnerons au pendule, par sa base, un léger choc sur la table d'expériences, puis nous frotterons la main droite sur la main gauche afin d'annuler l'effet des opérations précédentes.

Fading : D'après l'abbé Mermet, les ondes de la radiesthésie présentent parfois des zones d'évanouissement, phénomène analogue au fading de la T.S.F., et qui n'est que temporaire. De ce qu'une prospection dans une zone où le succès paraissait très probable n'a pas donné de résultat, il ne convient pas de l'abandonner sans avoir fait d'autres tentatives dans des conditions un peu différentes, ou dans un autre moment.

• L'abbé Mermet recommande encore de diriger votre regard et votre bras gauche vers le soleil, ou dans sa direction s'il est invisible, en prolongeant vos doigts gauches d'une pointe allongée et fine : dans bien des cas le phénomène disparaît alors au bout de peu de temps.

Les négatifs : Certaines personnes, heureusement en nombre assez rare, ont la propriété, par leur seule présence, de désaxer toutes celles qu'elles approchent et de les rendre incapables de toute perception radiesthétique. C'est une raison de plus pour opérer seul...

La syncope radiesthésique : L'absorption d'un médicament agissant sur le système nerveux suffit à empêcher momentanément le réflexe radiesthésique.

Pour l'aspirine, par exemple, la durée de la syncope est, chez la plupart des sujets, d'environ trois heures. Il va sans dire que, jusqu'au rétablissement de l'état normal, il convient de s'abstenir de toute opération.

Lieux perturbateurs : S'écarter, autant que possible, dans le local où l'on opère, des masses métalliques (cuivre, aluminium, étain, nickel, argent, or, etc..., qui se trouvent parfois aussi dans des tiroirs) pouvant produire des rayons d'union avec la substance étudiée. Se méfier aussi, à ce point de vue, des étages supérieurs ou inférieurs à celui où l'on opère. L'idéal serait, pour les premiers essais, le plein air. Par la suite, toutes ces précautions n'ont plus le même intérêt ; un radiesthésiste entraîné peut opérer en tous temps et en tous lieux, sans aucune gêne, ni fatigue.

Mais pour le débutant, le courant électrique, alternatif (lumière et force), le corps de l'opérateur et la substance étudiée constituent trois circuits oscillants, dont la triple action réciproque peut produire des effets perturbateurs. En conséquence, dans les débuts, on évitera le travail le soir, à la lumière électrique. Certains auteurs condamnent le port de semelles en caoutchouc et de chaussettes de soie.

Avec un peu d'attention, d'observation et surtout d'entraînement, il sera facile d'évincer toutes ces causes d'écueils.

Il est possible que vos débuts soient plus lents que vous ne le pensiez, que vous trouviez même, parfois, fatigants et décourageants vos exercices du début. Il vous faudra persévérer, méthodiquement, et vous entraîner régulièrement. L'habileté toute naturelle est acquise à la longue pour quelques-uns ; par contre, la plupart l'obtiennent très rapidement.

AVIS AU LECTEUR

La pénurie de papier et sa mauvaise qualité nous obligent à nous limiter, en cette année 1943, à la **Première Partie** de l'ouvrage que nous avons projeté : **INSTRUCTION GÉNÉRALE et DEVELOPPEMENT DE LA SENSIBILITÉ DU DÉBUTANT**, en 30 Leçons et plus de 150 Exercices.

Nous nous en excusons auprès de nos Lecteurs et nous les prions momentanément de se reporter à l'ouvrage : « **LA RADIESTHÉSIE expliquée et pratiquée par la MÉTHODE PHYSIQUE** », notamment aux Chapitres V et suivants, qui comportent déjà de nombreuses applications essentielles et des développements sur la prospection pratique.

MÉTHODE MENTALE



APPENDICE

NOTIONS ESSENTIELLES

de

RADIESTHÉSIE

suivant la

MÉTHODE MENTALE

(PSYCHO-PHYSIOLOGIE CLASSIQUE ET MÉTAPSYCHIE)

par

Pierre BÉASSE

Technicien-Conseil

Visa de contrôle de la Consuro Scientifique, Secrétariat Général
de l'Information : N° 8.089, du 30 Septembre 1943

Copyright by Pierre BÉASSE, Editeur, 1943

Droits de reproduction, de traduction et d'adaptation
réservés pour tous pays

TABLE DES MATIÈRES DE L'APPENDICE

sur la Radiesthésie MENTALE

	Pages
GÉNÉRALITÉS	231

CHAPITRE PREMIER

Les Instruments	238
-----------------------	-----

CHAPITRE II

Le « Sens mental »	240
Le mécanisme du Sens mental.....	243
Processus de la recherche mentale	244

CHAPITRE III

Le « désir mental » ou « orientation mentale » .	245
La « sélection mentale »	246
La « convention mentale » ..	247
L' « interrogation mentale »	248

CHAPITRE IV

Moyens d'identification ...	250
Observations générales	251

CHAPITRE V

Les éléments de perception ..	254
-------------------------------	-----

GÉNÉRALITÉS

S'il est exact que la **Méthode Physique** (attitude passive) n'exige ni don spécial, ni initiation mystérieuse ou compliquée, qu'elle ne propose que des procédés simples et rationnels, qui la mettent immédiatement à la portée de la grande majorité des chercheurs, et qu'à ce titre, elle doit être conseillée à tous les débutants, il n'est pas moins recommandable, s'ils y trouvent avantage, d'inviter, par la suite, ces mêmes chercheurs initiés à la méthode physique, à essayer la **Méthode Mentale** (attitude sélective ou attitude intuitive), répondant parfois mieux à leur sensibilité spéciale ou à leurs aptitudes particulières.

C'est à l'intention de ces personnes supérieurement douées au point de vue psychique, et parce que cet exposé de la **Méthode Mentale** nous a été très souvent demandé, que nous avons été amenés à constater aussi le fait intérieur subjectif (physiologique et psychique) qui caractérise la méthode mentale et qui est tout aussi indiscutable que le fait extérieur, physique ou biologique.

Notre but est d'en exposer dans ces quelques pages les principes essentiels en coordonnant les connaissances acquises à ce jour dans ce domaine. Ce sera, à un degré supérieur dans la pratique, un complément à notre méthode physique vers laquelle vont cependant nos préférences, dans l'initiation des débutants.

*
**

Il a été dit par des auteurs qui préconisent la **Méthode Mentale**, que les opérateurs de la **Méthode Physique** font du psychisme sans le savoir. Il a été dit également que les opérateurs exclusivement mentaux, procédant uniquement

suivant la Méthode Mentale, font aussi intervenir sans le savoir, les rayons lumineux, azimuraux, l'influence magnétique, etc..., ou adoptent les méthodes physiques de calcul de profondeur, de débit, etc... et pénètrent ainsi dans le domaine physique à leur insu.

C'est pourquoi, il peut être sage de conclure que l'opérateur radiesthésique agit plus ou moins physiquement et mentalement suivant les aptitudes de son composé humain : ainsi les deux méthodes se rejoignent pour la captation des radiations. Le docteur Andrée Besson, président de l'Association des Médecins Radiesthésistes de France, a écrit : « Coordonner la triple éducation physique, physiologique et psychique, tel est le but fondamental de l'enseignement radiesthésiste, s'il veut être rationnel et complet ».

Ceci revient à confirmer que la Radiesthésie est « Une », quelle que soit la manière de la pratiquer.

Ce serait donc un tort de vouloir établir une « dissociation » sous forme de deux radiesthésies, l'une physique, l'autre mentale. La nécessité des différences à adopter ne provient que des possibilités des opérateurs, de leur degré de sensibilité, des dons psychiques très différents qui leur sont dévolus d'un sujet à l'autre. Car il faut toujours envisager la Radiesthésie dans le composé humain en soi, et l'étude de la méthode physique doit précéder celle de la méthode mentale, celle-ci étant moins à la portée de tout le monde.



Rappelons-nous qu'il existe pour un opérateur trois attitudes possibles :

1° L'attitude passive (celle qui convient spécialement aux procédés physiques) ;

2° L'attitude sélective (dans laquelle la volonté intervient dans le choix des ondes à capter), procédé mental ;

3° L'attitude intuitive (qui ne convient qu'aux personnes douées de voyance), procédé mental.

Nous conservons une parfaite unité de doctrine, en exposant dans les pages ci-après une Méthode Mentale, basée sur la sélection des ondes, qui n'est autre que ce que M. Christophe appelle l'« orientation mentale », et le Frère Padey le « fluide d'intention ».

**

Les opérateurs physiques s'astreignent à des règles ; par contre, les mentaux ne se préoccupent le plus souvent ni des images, ni des séries, ni des longueurs d'ondes, ni de réglage, ni d'élec.romagnétisme, etc... et pourtant, mieux que les physiques, ils pénètrent psychiquement dans des domaines immenses à explorer, malgré la complexité des matières à analyser. L'Abbé Mermet disait : « Il sera possible de prospector l'âme humaine, comme on prospecte les métaux ». Et M^{me} de Mersseman, virtuose de la Radiesthésie mentale, nous écrivait, en 1940 : « Vous avez bien fait de rééditer votre ouvrage sur « la Radiesthésie Méthode Physique », car il est clair et pratique pour bien des gens. A mon avis, la Radiesthésie « Physique » doit se continuer par la « Mentale ». Celle-ci n'est pas à la portée de tout le monde ; cependant, quelles joies complémentaires elle donne ! »

Un peu plus tard, M^{me} de Mersseman nous écrivait encore :

« Notre confrère, Pierre Béasse, m'a demandé d'exposer mon point de vue sur la Radiesthésie Mentale. Certains pensent que celle-ci se distingue complètement de la Radiesthésie Physique. Je ne le crois pas, puisque les habitués de la méthode mentale peuvent réaliser facilement les expériences de leurs confrères physiciens.

« Ainsi, je lis dans l'ouvrage de Pierre Béasse sur la Méthode Physique, des pages sur les travaux de MM. les Ingénieurs Voillaume et Correnson, sur le réglage du pendule, préconisé par M. de France, sur les ondes, les harmoniques, les interférences, etc... C'est clairement expliqué. Mais dans la pratique, un téléradiesthésiste laissera là les raisonnements, les recherches de causes à effets pour

se servir surtout de la méthode mentale, autant qu'il le peut.

« Voici pourquoi : Quand il détecte, les plans d'ondes, d'abord rémanents, se succèdent rapidement. L'opérateur doit les observer avec attention, orienter son esprit pour les avoir dans le sens des recherches et changer vivement les longueurs de fil du pendule afin d'obtenir des girations dans les champs d'influences pressentis. A la longue, parfois, le détecteur paraît dominer la pensée du chercheur, l'éclaire par certaines évolutions inattendues, qui forment, par exemple, l'image des choses observées. C'est pourquoi certains rhabdologues s'interrogent par le pendule. Ils peuvent avoir de bonnes réponses s'ils savent maîtriser leur imagination.

« Nous ne conseillons la méthode mentale qu'aux plus doués, aux virtuoses du pendule. Il en est beaucoup qui s'ignorent. Comme les grands violonistes, ils font corps avec leur instrument, déjà à la suite d'un court entraînement. Ils le connaissent vite à fond et savent ce qu'il peut donner. Ils vibrent ensemble dans l'astral, qui finit par leur livrer les secrets de la Nature, ses lumières, ses formes, ses conseils.

« En apparence, il semble y avoir désaccord entre le « physique » et le « psychique ». Le physique veut suivre pas à pas les expériences possibles, comme dans un laboratoire, et ne pas aller au delà de ce qui est physiquement contrôlable. Le « psychique » peut être aussi un scientifique, mais sentant dans son subconscient et dans son système nerveux, bien entraînés, qu'il existe d'autres données, veut observer plus loin. Alors il cherche dans l'inconnu et s'élance jusqu'aux étoiles pour savoir si elles ne connaissent pas le sujet qui l'intéresse.

« Je lis à ce sujet dans la « Revue d'Astrologie » du distingué ingénieur des Mines Dom Neroman, en constant rapport avec de sérieux radiesthésistes, que les étoiles connaissent ce que l'homme cherche souvent, le secret de son destin. Elles le lui révèlent avec une logique, un enchaînement qui émerveille. La Nature, quand elle nous montre ses beautés, le fait avec science !

« C'est pourquoi de nombreux Confrères finissent par penser, comme moi, que les études des deux méthodes, physique et mentale, se rapprochent en une conjonction scientifique complète. En somme, tout est science, et la Radiesthésie est le pont qui relie la science des physiciens à celle des occultistes, des psychiques, des téléradiesthésistes.

« Ceux-ci, par le rayonnement de leurs fines sensations, pénètrent dans l'infra-rouge et acquièrent alors des possibilités nouvelles. Ils peuvent ainsi comparer leur travail à celui d'un poste de T.S.F., car ils captent des ondes très lointaines. De là découle la détection, sur plan, de tout ce qui existe sur et dans la croûte terrestre. Quelques « artistes » saisissent même dans l'espace et le temps, des schémas relatifs à tel ou tel personnage décédé. Au moyen d'un « témoin », ils sentent passer en eux les radiations d'un défunt qui leur est cher.

« Les Confrères scientifiques penseront peut-être que je n'ai de paroles enthousiastes que pour la Radiesthésie mentale, c'est pourquoi je terminerai en leur disant tous les espoirs que je mets en eux pour la codification des principes des deux méthodes en une seule science. Aidés des psychiques qui perçoivent très loin, les scientifiques seront vire l'espoir du genre humain. Aussi, c'est bien volontiers que j'envoie un bravo à ces pionniers d'une grande et nouvelle science ».

Ainsi s'exprime M^m de Mersseman, ancien professeur de radiesthésie mentale, très réputé.

*
**

Les procédés de la méthode mentale étant souvent purement personnels, le débutant se rendra compte d'abord de la réaction naturelle de son pendule, en dehors de toute auto-suggestion consciente. Il la notera et en contrôlera de nombreuses fois, à plusieurs jours d'intervalle, la constante régularité, avant de l'adopter comme définitive. Le débutant se rendra compte aussi que, dans de nombreux cas, les mouvements de son pendule ne répondront pas à cette réaction naturelle, mais qu'il sera dans la nécessité d'adopter

une convention préalable mentale sur les mouvements à attendre de son pendule. Ainsi, son pendule répondra à une réaction conventionnelle.

Autant que faire se peut, il aura avantage à admettre la codification des conventions les plus généralement admises dans les milieux radiesthésistes de la méthode mentale, afin d'éviter une nouvelle Tour de Babel. Ce sera, dans cette limite, la seule auto-suggestion conventionnelle admissible, en raison de ses avantages positifs et pour le progrès de la radiesthésie.

Recommandons aussi au débutant de pénétrer dans la difficulté en adoptant deux paliers progressifs d'études : 1^o les Exercices sur objets visibles, donc certains ; 2^o les Exercices sur objets différents connus, mais recouverts à l'insu du débutant, par un aide ; donc objets invisibles.

Dans ces deux cas, qui constitueront l'étude personnelle de sa propre sensibilité, le débutant notera, au jour le jour, sur un carnet, ses moindres observations qu'il comparera les unes aux autres avec persévérance. Il se fera ainsi une expérience personnelle, indispensable, qu'aucun professeur, si excellent soit-il, ne saurait lui inculquer.

D'aléatoires, ses progrès deviendront certains, incontestables. Long travail et discipline sévère, notations personnelles constantes, auront été à la base de ces résultats prodigieux.



Une définition qui semblerait se rapporter le mieux à la Radiesthésie mentale serait : « la sensation par le système nerveux et le subconscient des rayonnements des êtres et des choses ».

Vis-à-vis de cet art étonnant, l'esprit indépendant ne rejettera pas les faits. Tout au contraire, il les contrôlera, les analysera, les questionnera pour démasquer les préjugés de bonne ou de mauvaise foi, et se rendra à l'évidence.

Le corps humain ne saurait-il être infiniment sensible ? Enregistrant des sensations, ne saurait-il être émetteur et récepteur d'ondes électro-magnétiques, d'énergie radio-

active, de fluide vital ? Assigner des limites à cette mécanique sublime qu'est l'homme, serait manquer d'initiative scientifique.

Tout rayonne dans la nature inerte ou vivante. Or, certains sujets ont une disposition exceptionnelle, « un don » plus ou moins accentué, pour capter les radiations suivant la méthode mentale. Et comme en musique, nous y remarquons des virtuoses. Puisque de nombreuses personnes sont des « sourciers nés » qui s'ignorent, pourquoi ne pas faciliter leur découverte ? Leur « composé numain » est favorable à la détection mentale. Il leur suffit d'un peu d'entraînement pour qu'ils en retirent les plus précieux avantages dans tous les domaines de la vie quotidienne.

On remarquera cependant que l'organisme humain étant un des principaux éléments en cours de la prospection, ses réactions seront toujours liées à l'état psychologique plus ou moins favorable dans lequel l'opérateur se trouvera à ce moment-là.

Le but de ce court exposé est, avant tout, de préciser les bases essentielles de la méthode mentale, pour que quiconque le pourra, puisse s'en servir utilement.

Nous engageons vivement nos lecteurs, après une courte initiation à la Méthode Physique, à essayer graduellement leurs aptitudes à la Méthode Mentale sélective, et même intuitive : ils se découvriront peut-être des possibilités naturelles — ce que l'on appelle le « don » —, qui leur feront gagner un temps précieux dans la pratique de cet art étonnant. Très nombreux sont les radiesthésistes doués qui s'ignorent.

LES INSTRUMENTS

À l'encontre de la plupart des animaux et surtout des insectes, les centres nerveux de l'homme ont besoin, dans la majorité des cas, pour sentir et sélectionner mentalement les ondes extérieures, de l'intervention d'un « support », diront certains, d'un « amplificateur », diront d'autres ; la baguette et le pendule seront tout indiqués. Nous utiliserons donc les mêmes instruments qu'en méthode physique.

La baguette : Nous reportons le lecteur à ce qui a été écrit sur sa construction et sa tenue, page 34 de cet ouvrage.

Le pendule : Nous ne reviendrons pas davantage sur l'exposé fait à son sujet, page 39. Nous préconiserons cependant : — soit un pendule sphérique neutre noir, du type P.S., réglé mentalement sur l'onde ou radiation à recevoir, dont le procédé est décrit page 81.

— Soit, de préférence, un pendule magnétique, tel que le Révélateur Schumfell, sans réglage.

En effet, dans la méthode mentale, il n'est pas question, en principe, comme cela est essentiel dans la méthode physique, d'accorder avec précision le pendule sur la longueur d'onde de la radiation ou du corps à détecter. Pour beaucoup d'opérateurs, la longueur de fil de suspension demeure approximativement à 10 centimètres, d'une manière définitive, pour tous les corps et radiations. Pour certains, la longueur de fil est d'environ un demi-centimètre, c'est-à-dire une longueur de fil des plus courtes. Pour d'autres, cependant, la giration maximum est plus franche s'ils

recherchent, sans précision d'ailleurs, la meilleure longueur de fil pour un corps ou une radiation donnés.

Comme on le voit, chacun décidera suivant ses convenances individuelles, en se rappelant que l'Abbé Ferran parlait simplement de « favorabilités », de longueur de fil, alors que l'Abbé Mermet était venu au réglage précis, qu'il estimait « très important pour faire du bon travail ».

En méthode mentale, l'orientation Nord-Sud magnétique de l'anneau du pendule Schumfell (voir page 121), n'est pas nécessaire dans les exercices d'assouplissement sur objets visibles. Cette orientation sera pourtant une excellente précaution, plus tard, lors de la prospection pratique, dans la lutte contre les « images » ; elle évitera ainsi bien des erreurs, pour les opérateurs qui se sentent plus ou moins sensibles aux images, dont une description complète a été donnée pages 183 et suivantes.

LE « SENS MENTAL »

Nous avons toujours pensé, avec de nombreux auteurs, que la radiesthésie, vue dans son ensemble, appartenait à la psycho-physiologie classique, d'une part, en raison de l'action mentale obligatoire dans la recherche, comme elle appartient à la physique, d'autre part, puisque sa préoccupation est, entre autre, la perception du rayonnement de la matière. Mais nous n'excluerons pas l'examen de ses attaches à la métapsychique, lorsqu'elle met en œuvre les intéressants phénomènes de la « convention et de l'interrogation mentales ».

Dans le cours de radiesthésie par la méthode physique, qui précède cet appendice, nous nous sommes surtout attachés à percevoir ce rayonnement de la matière qui est le domaine propre et limité de cette méthode. Dans les pages qui suivront, notre attention se portera davantage sur la partie de l'action mentale du radiesthésiste, dont le domaine s'étend non seulement à la perception mentale des corps invisibles, mais aussi aux recherches d'ordre intellectuel, immatériel.

Et chacun, suivant ses dispositions spéciales, ou l'entraînement de sa sensibilité, choisira, en définitive, la méthode répondant le mieux à ses aptitudes, ou les utilisera toutes les deux, suivant les circonstances.



Nous avons signalé que la plupart des animaux, et surtout les insectes, possédaient un instinct leur permettant de sélectionner et de sentir. Nous avons dit que chez l'homme

civilisé, cet instinct, éclairé par l'intelligence, se trouvait, de nos jours, bien à tort, délaissé, au seul profit de l'intelligence et, de ce fait, s'était atrophié ; qu'il suffirait cependant de l'éveiller et de le développer, ce qui est facile avec un peu d'entraînement.

Mais qu'est, au fond, cet instinct humain ? On en est encore réduit à des hypothèses imprécises, bien que nombre d'auteurs pensent avec nous que ce **sens mental** du radiesthésiste est entièrement sous la dépendance de son **subconscient**.

Les métapsychistes estiment que ce subconscient, appelé encore inconscient, est une « personne seconde » en nous, ayant une activité à côté de la conscience et de la volonté. Nous nous rangeons volontiers à cet avis. Comme il y a en nous, le « moi subconscient », ou « moi inconscient », il y a également en nous le « moi conscient », intelligence et raisonnement. C'est d'ailleurs par notre « moi conscient », c'est-à-dire par notre pensée intelligente, que nous sollicitons l'activité de notre « moi subconscient ».

Ce subconscient, ou sens intérieur, ou sixième sens mental, comme on voudra l'appeler, nous seconde dans ce qui ne peut être vu, reconnu, senti par nos cinq autres sens extérieurs.

Ce subconscient est un véritable **guide** dans l'ordre immatériel, comme le sont, dans l'ordre matériel, les cinq autres sens extérieurs. Il nous guide, tout en étant une sorte d'agent de liaison entre les différentes facultés de notre pensée, créatrice ou d'idées ou de mouvement.

On se rend compte, dès lors, de tout le parti que l'on peut tirer de cette « personne seconde », de ce subconscient qui est en nous, que la plupart des gens ignorent, ou s'ils en ont une vague connaissance, délaissent comme absolument inutile...

La vérité, c'est que pour se servir du subconscient, il faut faire un effort de pensée concentré et soutenu, peu plaisant au début de l'initiation, et que l'on rencontre plus facilement des gens disposés à faire un effort physique, promenade, chant, etc..., qu'à faire l'effort plus délicat d'attention et de volonté pour la solution d'un problème

intellectuel abstrait, dans l'exercice d'un art, qui du fait de l'état d'empirisme où il s'est trouvé longtemps, ne dépasse guère, à tort, le cadre de l'amateurisme, à part quelques milliers de professionnels entraînés et expérimentés.

La vérité est aussi que l'on ne saurait taire appel à son subconscient, — et cela est absolument reconnu par tous les praticiens, — que pour des motifs louables et honnêtes. Dans le cas contraire, le subconscient, réprouvant tout ce qui va à l'encontre de la conscience, de l'altruisme, du bien, ou ne répond pas, ou laisse le provocateur s'enliser dans l'échec et l'erreur.

Par contre, lorsque l'on considère sérieusement le prodigieux profit matériel et intellectuel que l'on peut tirer du subconscient, dans toutes les circonstances les plus ordinaires même de la vie, si peu que l'on veuille le solliciter, on reste contondu à la pensée qu'un tel trésor ait été ainsi délaissé, abandonné.



Comment expliquer que l'on se soit ainsi écarté si longtemps d'une source aussi grande de précieux avantages ? C'est que, d'une part, la radiesthésie, dernière trace des secrets de la plus haute antiquité, végétait jusqu'à nos jours dans un certain empirisme ; c'est aussi que la science considérant que les pouvoirs anormaux (métapsychiques) ne sont pas scientifiquement explicables, évite de les introduire dans son domaine. Devant leur évidence, elle ne les conteste pas, ces pouvoirs de la métapsychique (terme créé par elle d'ailleurs), mais elle les considère comme scientifiquement inexistants. Nous n'avons pas à discuter ici une telle attitude, mais dans de telles conditions de réticence, parfois d'hostilité marquée, la radiesthésie ne pouvait progresser.

En résumé, si les spiritualistes donnent les explications que l'on sait, les matérialistes se contentent de demeurer dans le scepticisme scientifique. Et cependant, de par le monde, des esprits cultivés, de grandes intelligences continuent de parler de « subconscient, de conscience, d'âme, de personnalité intérieure dépassant les frontières du corps matériel, etc... ».

Quoi qu'il en soit, ne contestant pas, quant à nous, l'existence du spirituel, entraînant l'existence de l'âme, nous appuyons, avec de nombreux autres auteurs, la théorie de la méthode mentale en radiesthésie, sur son fondement essentiel : le subconscient.

Le mécanisme du sens mental

Tout notre entraînement contribuera donc à développer en nous l'activité de notre subconscient, notre moi inconscient, notre personne seconde.

Dans ce but, nous nous rappellerons toujours que dans la sollicitation de notre subconscient, nous devons absolument écarter l'action de la volonté, de l'intelligence, de la mémoire ou de la raison, toutes facultés conscientes, que le subconscient est cependant disposé à aider.

Nous verrons plus loin que la volonté interviendra pourtant, mais tout au plus pour soutenir notre attention et notre désir, dans la recherche radiesthésique.

En tout cas, notre subconscient répondra à l'appel de notre désir, dès que nous aurons réuni les conditions requises, pour nous seconder dans nos difficultés journalières, matérielles ou intellectuelles, et ceci dans les seules limites de l'exercice du bien.

Par **difficultés d'ordre matériel**, nous entendons la multitude des découvertes qui nous intéressent, de ce qui est caché, invisible, et que nous ne pourrions, sans l'intervention du subconscient, nous procurer, pour satisfaire nos besoins naturels ou nous protéger ; recherche d'objets perdus, d'eau, de métaux ou produits précieux, analyses matérielles, etc... La réponse du subconscient se traduira, dans ce premier cas, par une réaction neuro-musculaire transmise par les mains à l'amplificateur qu'est le pendule ou la baguette.

Par **difficultés d'ordre intellectuel**, nous entendons le vaste champ des questions de tous genres qui se posent à nous au cours de la vie courante, y compris des vues sur l'avenir : recherches sur plan, photo, écriture, témoins, concernant la vitalité, la profession, les qualités et défauts, l'état de santé, etc... La réponse du subconscient se traduit

dans ce second cas par l'éclosion spontanée, dans notre esprit, d'idées ou de pensées se rapportant avec précision et perfection à la question posée. Ici encore cette pensée est créatrice des manifestations du pendule et de la baguette. Il va de soi que ce dernier genre de radiesthésie mentale, qui s'apparenterait plutôt à la métapsychie, demande un développement spirituel plus intense que dans les recherches d'ordre matériel du domaine de la psychophysiologie classique.

Processus de la recherche mentale

Le succès sera d'autant plus parfait que l'on aura réussi à réunir au mieux les conditions suivantes :

1° Etat physique, physiologique et psychique résumé dans une attitude de calme, de maîtrise absolue de soi, d'isolement matériel et mental, et enfin de confiance en soi ;

2° Mise en œuvre attentive des principes mentaux qui font l'objet du chapitre suivant.

LE « DÉSIR MENTAL » OU « ORIENTATION MENTALE »

C'est un fait purement psychologique, dépendant des phénomènes de l'âme humaine, du subconscient, et non des sens organiques.

Ce moyen de détection des radiations est appelé, suivant les auteurs, « désir mental », ou « orientation mentale », ou encore « fluide d'intention ».

Il ne demande, dans l'appel adressé au subconscient, que l'intervention de deux facultés : l'attention et la volonté.

L'attention :

1° En concentrant toute sa pensée uniquement sur l'objet ou le problème de la recherche ; faisant le vide autour de soi, au point de voir l'objet en imagination et d'être insensible à toute distraction extérieure ;

2° En désirant se rendre réceptif à l'activité du subconscient ;

3° En évitant toute émotion, toute modification du rythme normal de la respiration.

La volonté :

1° En renforçant le désir ou l'intention formelle d'être réceptif aux radiations visibles ou invisibles de tel ou tel objet, si celui-ci existe, ou d'être éclairé sur telle ou telle question, si la solution de celle-ci existe ;

2° En intervenant dans la sélection des radiations à capter, interdisant la réception de toute autre radiation (attitude sélective) ;

3° En se rendant neutre quant aux résultats à survenir.

Ainsi le « désir mental », sous le contrôle de l'attention et de la volonté, provoque la détection mentale des radiations de l'objet de la recherche.

Ce désir doit encore être exprimé sous une certaine forme, simple, courte et claire. Il faut encore que ce désir mental soit exprimé au subconscient sous la forme particulièrement souple de l'invitation, de la prière, excluant donc toute exigence, toute volonté, à plus forte raison toute violence. Et, comme une prière est plus « sentie », plus parfaite, lorsqu'elle est dite à haute voix, qu'à mi-voix, ou intérieurement, la forme orale entendue clairement par l'opérateur lui-même sera la plus indiquée.

C'est ainsi que tous les praticiens de la méthode mentale ont adopté la formule devenue classique : « Je désire me rendre sensible à telle radiation, de tel corps, ou objet, de telle écriture, de telle personne, etc... ».

Se livrer à quelques exercices.

Notons en passant que ce même désir mental, fortement soutenu sur tel ou tel objet de la recherche, suffit, pour de nombreux opérateurs exercés de la méthode mentale — par une sorte d'appropriation ou d'accord mental — à ne plus rendre nécessaire le réglage de leur pendule sur l'objet en question. En effet, cette facilité s'offre tout naturellement au radiesthésiste mental, dès qu'il acquiert une certaine habitude opératoire.

LA SÉLECTION MENTALE

Le subconscient est à la base de la sélection mentale. De même qu'il est possible à notre oreille de discerner plus particulièrement tel ou tel instrument de musique dans un orchestre, de même qu'il est facile à nos yeux de s'accommoder visuellement sur des plans successivement plus éloignés, jusqu'à percevoir tel détail insignifiant dans un vaste et lointain paysage, de même il est possible à notre subconscient de sélectionner parmi les innombrables émissions d'ondes qui nous assaillent de toutes parts et à tous moments, la seule onde ou radiation que nous recherchons et qui nous intéresse.

Autrement dit, quand la pensée a fait son choix sur une

radiation, parmi la multitude des radiations qui nous traversent et nous environnent de toutes parts, celle-ci ne sera retenue par notre subconscient qu'à partir du moment où notre pensée s'en occupera avec attention et volonté, dans le désir intense d'être réceptif à cette onde.

Alors qu'en méthode physique, la sélection des ondes et radiations se fait par un réglage précis du fil de suspension du pendule et par l'adjonction au pendule d'un « témoin » (filtre de radiations), le pendule ne réagissant plus qu'en présence d'un corps identique à ce témoin, en méthode mentale la sélection se fait par une adaptation mentale de notre subconscient à l'onde ou radiation recherchée.

S'y exercer.

LA CONVENTION MENTALE

Assez difficile à analyser, la « convention mentale » paraît relever de la métapsychique, c'est-à-dire de la science des phénomènes de l'âme humaine, qui dépasse la psychologie ordinaire. C'est ce qui la rend (comme « l'interrogation mentale ») si différente du « désir mental ». Nous paraissions être alors dans le domaine très spécial de la « psychesthésie » (attitude intuitive), appelé aussi, peut-être improprement, « radiesthésie psychique », parce que le pendule qui est utilisé dans la convention mentale, semble ne l'être que comme accessoire, à défaut de tout autre dispositif employé par les occultistes ou les personnes douées de voyance.

La « convention mentale » établit une règle générale, admise par soi seul ou un groupe d'usagers. Elle résulte, non pas de la nature des choses, mais d'un accord tacite, conventionnel, préalable et précis avec notre subconscient pour comprendre et interpréter les mouvements du pendule. Celui-ci adopte alors exactement les mouvements qui conviennent aux circonstances, mouvements étudiés d'avance.

En effet, si l'opérateur base les mouvements de son pendule sur des conventions mentales préalables, les résultats sont d'autant plus compréhensibles et certains, que ces conventions auront été plus précises et que son attention aura été plus soutenue.

Donnons comme exemple de convention mentale l'adoption arbitraire d'une unité d'évaluation quelconque pour mesurer le débit d'une source, par ce que l'on appelle couramment « le calcul mental ». Il consiste en une convention de mesure, préalable, avec le subconscient, qui répond par le pendule. Ainsi, ayant découvert une source, vous vous portez sur la verticale du courant, où le pendule tourne à son maximum. Ayant convenu que chaque giration représentera un litre, ou un décalitre, ou hectolitre, etc..., vous élevez verticalement votre pendule en giration ; il se met alors à osciller, puis à tourner. Vous comptez combien de nouvelles girations s'effectuent ainsi jusqu'à l'arrêt, déterminé par votre subconscient, pour vous faire connaître le nombre d'unités à retenir, c'est-à-dire la mesure du débit.

Les cas les plus embarrassants peuvent être ainsi résolus par la convention mentale.

Pour certains opérateurs, il convient absolument (comme nous l'avons vu déjà dans le cas de l'expression du désir mental), que la convention mentale soit exprimée à haute voix, sans quoi, pour eux, le pendule ne réagit pas convenablement, ou pas du tout. C'est dire que dans de pareils cas, la concentration intérieure de la pensée est insuffisante.

Effectuer quelques exercices de ce genre et les répéter.

L'INTERROGATION MENTALE

Autant que la « convention mentale », l'« interrogation mentale » paraît relever de la métapsychique, dépassant la psychologie ordinaire. Étant en plein domaine de la « psychesthésie », elle permet de poser, avec succès, au subconscient, des questions à l'infini, dans les domaines les plus différents, dans le cadre du bien et de l'honnêteté.

C'est dire que l'opérateur, ainsi supérieurement doué, devra s'enrouer, dans le contrôle des résultats, de la plus grande prudence et de beaucoup de modestie.

Ces opérations, que nous estimons de clairvoyance, ne peuvent d'ailleurs être entreprises avec succès qu'après un certain entraînement à des recherches matérielles (d'attitude sélective).

De l'avis de nombreux auteurs, la recherche sur plan, photographie, écriture, etc..., peut être considérée parmi les recherches immatérielles conduisant directement à l'interrogation mentale.

Signalons d'abord que les mêmes conditions d'attention, et de volonté, requises vis-à-vis de la concentration de la pensée, du désir de se rendre réceptif, de la sélection mentale, et de la convention mentale, doivent précéder l'interrogation mentale.

La question doit être formulée calmement, simplement, avec clarté. Plus elle sera intelligemment posée, plus l'enquête sera rapide et précise. L'opérateur aura la plus grande confiance dans le sentiment que la réalité, la vérité peut être ainsi connue.

La formule classique est celle-ci : « Je désire me rendre sensible à la vérité sur telle question », suivie de : « Est-ce vrai que... » ; ou « Je désire me rendre sensible aux radiations de l'eau », suivi de « Y a-t-il de l'eau ici ? » ; ou « Je désire me rendre sensible aux radiations de tel objet égaré », suivi de « Cet objet est-il ici ? », « Est-il dans cette direction ? », etc...

Prenons le cas d'un fruit inconnu, devant nous : Est-il bon ou mauvais pour la santé de l'homme ? Je concentre ma pensée sur ce fruit (attention et volonté, sélection) je formule à haute voix mon désir de me rendre réceptif à ses radiations (désir), excluant toutes autres radiations extérieures (sélection), et je fixe à l'avance que la réponse de mon subconscient sera positive (oui, si mon pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ; ou que cette réponse sera négative (non) si la giration se fait dans le sens contraire ; que cette réponse sera, enfin, douteuse, ou indifférente, dans le cas de balancement (oscillations) de mon pendule. Dans la pratique, la succession de ces opérations mentales est très rapide.

L'application de tels principes est donc aisée dans d'innombrables cas. Il s'en présente à tout moment au cours d'une journée. C'est l'occasion de nombreux essais et exercices.

MOYENS D'IDENTIFICATION

Nous avons étudié, dans notre « Cours de Méthode Physique », les procédés **physiques** d'identification des corps qui sont le **réglage**, la **série** ou **nombre particulier objectif**, le **rayon fondamental objectif**, le **témoin matériel** et le **rayon d'union**. Il suffira, par contre, en méthode mentale, d'établir, préalablement à la prospection, une **représentation mentale** de l'image du corps avec la sensation de perception que l'on s'est fixée par une convention mentale personnelle.

La plupart des radiesthésistes mentaux estiment comme suffisants les trois seuls contrôles que constituent le **témoin mental**, le **rayon fondamental subjectif**, la **série subjective**.

L'association d'idée qu'ils ont ainsi appliquée mentalement, une fois pour toutes et particulièrement à chaque corps ou radiation, leur donne, à l'entraînement, une maîtrise telle de leur sensibilité, qui — compte tenu de l'état psychologique plus ou moins favorable dans lequel ils se trouvent au moment de leur activité — leur assure une sécurité d'opération remarquable.

Devant une telle commodité qui leur est offerte par leur « don » très spécial, nous n'hésions pas à préconiser aux nouveaux débutants de la méthode mentale d'adopter, pour la facilité des rapports entre les adeptes de la méthode physique et eux-mêmes, les résultats objectifs obtenus par les procédés physiques en matière de polarité des corps ou de rayon fondamental, ou de nombre particulier de série. Ils n'auront pas ainsi à se fixer eux-mêmes une représentation mentale au hasard de leur inspiration, mais adopteront des données précises physiquement établies et figurant au Tableau d'identification des Corps simples, page 96.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

En principe, la Méthode Mentale requiert les conditions suivantes :

1° S'efforcer de laisser le pendule se mouvoir de lui-même ; en conséquence, la main et les doigts seront astreints à une passivité physique maximum.

2° S'obliger à une neutralité d'esprit absolue quant aux résultats qui s'ensuivront ; en conséquence l'auto-suggestion à l'égard de ces résultats devra être évitée.

3° Par contre, s'astreindre à une activité d'esprit poussée dans le désir que l'on a de voir le subconscient répondre à telle question du présent, ou du passé, ou même de l'avenir, par le pendule ou la baguette, ou du désir de percevoir les radiations émises par tel corps bien défini dans la pensée, si celui-ci existe, et à l'exclusion de tout autre corps. Puis, attendre que le pendule ou la baguette soient entrés en liaison, par le subconscient, avec ce corps.

Avoir la ferme opinion, l'assurance même, croire enfin, avec plus de résolution que n'en persuadent les raisons, que le « fait » radiesthésique se produira alors fatalement, si les conditions naturelles existent, tel doit être l'état d'esprit. Ainsi obstinée, la pensée suivra son chemin avec intrépidité, méprisant tous obstacles. Elle ne pourra être déçue par les manifestations toujours exactes du subconscient par le pendule.

Les diverses manifestations du pendule (oscillations, girations, séries, etc...) ou de la baguette (redressement, immobilité, abaissement) se révéleront alors en fonction du code que nous nous serons préalablement et personnellement établi ; ou en fonction de règles collectivement admises pour former une méthode générale, assurant une interprétation uniforme désirable pour tous les radiesthésistes, quelle que soit la méthode qu'ils exercent.

Par contre, il y a lieu d'éviter trois écueils :

1° Vouloir obtenir ou s'attendre à tel résultat, à ce point que le subconscient **commandé** ou **poussé** en quelque sorte à faire tourner ou osciller le pendule obéisse pour ainsi dire à notre volonté. Ce serait tomber dans la grave erreur d'une fâcheuse **auto-suggestion**.

Au contraire, il convient de rester impartial, mais attentif, et questionner, par exemple : « Y a-t-il de l'eau ici ? Est-elle potable ? », etc...

L'auto-suggestion consiste encore à **avoir l'impression**, à croire même spontanément, qu'un corps invisible existe sous notre pendule et dans ces conditions illusoires, estimer que le pendule ou la baguette doit logiquement réagir sur ce corps imaginaire. Cela revient en quelque sorte à « commander » par déduction apparemment logique, à son pendule, et celui-ci s'exécute. En effet, en raison d'une telle influence mentale sur le pendule, il est à constater que l'action du cerveau produit malencontreusement le réflexe musculaire qui entraîne fatalement le mouvement du pendule.

Quoi qu'il en soit, l'action néfaste de l'auto-suggestion consciente, ou inconsciente, ou désordonnée, étant ainsi dévoilée, il est facile au débutant de l'éviter.

Dans le doute, il sera très sage et commode de contrôler par le pendule les réactions de la baguette, et vice-versa.

2° Craindre exagérément l'auto-suggestion : Ainsi, s'imaginer que le moindre mouvement de la main, communiqué au pendule, est le résultat d'un réflexe nerveux incompatible avec le réflexe radiesthésique et, pour cela, raidir, à tort, bras, main et doigts.

3° Mal interpréter les manifestations constatées, faute d'une **convention préalablement bien définie**. Cette convention préalable ne doit pas être établie au hasard. Elle dépend soit de vos propres observations antérieures sur le comportement du pendule à votre égard, soit encore des observations réunies de radiesthésistes professionnels.

Du choix entre le pendule « Schumfell » et la baguette

Grâce à sa sensibilité particulière dans un grand nombre de cas, le pendule « Schumfell » présente l'avantage, en méthode mentale, de pouvoir être manié assez facilement, **sans réglage précis, ni orientation**, et d'être plus précis que la baguette dont l'usage exige souvent plus d'expérience. Le Schumfell est également plus lent dans ses manifestations que le pendule sphérique neutre noir P.S. d'étude, ce qui permet de mieux interpréter les résultats.

De plus, en orientant Nord-Sud magnétique (par le moyen de la boussole) le grand anneau du Schumfell, on simplifie considérablement les opérations de prospection en éliminant les multiples « images » de toute nature, qui guettent à tout moment le radiesthésiste le plus averti, et qui sont autant de « mirages » par rapport à la réalité. Une description complète du Schumfell est donnée page 46. Les radiesthésistes professionnels l'utilisent couramment, le considérant comme un instrument de contrôle de tout premier ordre.

Par contre, sur le terrain, tout pendule est plus facilement contrarié par la marche, le vent et la pluie, que la baguette. Celle-ci est également plus commode pour « déblayer » rapidement le terrain à prospecter, en dégagant de suite les points les plus intéressants à travailler ensuite au pendule. Celui-ci convient aussi mieux à l'intérieur et pour le travail sur carte, photo, plan, etc...

Il se trouve encore que certains radiesthésistes, excellents au pendule, ne sont pas sensibles à la baguette ou inversement, faute, le plus souvent, de s'être exercés suffisamment avec l'un ou l'autre instrument.

LES ÉLÉMENTS DE PERCEPTION

Comme en méthode physique, nous pourrons utiliser, en méthode mentale, les moyens suivants, pour renforcer notre action et la rendre plus efficace :

Le rayon visuel : Ce rayon nerveux sort des yeux pour se diriger vers l'objet recherché et provoque la réaction du pendule. Il correspond à la dénomination de « rayon capital », chez certains auteurs.

Le rayon digital : Appelé également « rayon d'antenne », cet autre rayon nerveux sort de l'index, ou du bras, en antenne, pour se diriger vers l'objet recherché.

Le rayon mental : Étudié page 176, il est le résultat de notre pensée sur notre subconscient qui déclenche la réaction du pendule dès que ce rayon mental rencontre l'objet recherché. Ce rayon est le plus important en méthode mentale, et le plus commode également. En effet, il relie instantanément le subconscient de l'opérateur au corps recherché, à tout moment, et de n'importe quel endroit où l'opérateur se trouve.

1° Etant sur le terrain, il suffit de pivoter sur place, pendule suspendu aux doigts, bras et index en antenne, et d'effectuer des tours circulaires autour de soi, tours s'éloignant successivement de 10, 50 ou 100 mètres, etc..., suivant les besoins, pour prospector ainsi des bandes de terrain de plus en plus éloignées, jusqu'à ce que l'on rencontre la réaction du pendule sur un point éloigné, visé des yeux et de l'index, et dès que le rayon mental a rencontré l'objet recherché.

Lorsque l'on a acquis ainsi un point éloigné, dans une direction quelconque, il est nécessaire de préciser ce point par le recoupement de deux ou trois autres investigations semblables. On se rend alors à deux ou trois autres endroits de départ, et c'est au point d'intersection de ces autres « visées » avec la première, que l'on obtient un point précis.

Il conviendra ensuite de se porter sur ce point recoupé pour percevoir les rayons verticaux, soit de l'objet recherché, soit la limite de tel gisement, soit la ou les rives de tel courant d'eau recherchés. Le mieux est, souvent, de se baisser, ou encore de s'accroupir, la base du pendule à 5 centimètres environ du sol, l'index de la main libre en antenne, effleurant le sol. Ainsi s'obtiennent les meilleurs résultats.

L'emploi des rayons visuel, digital et mental combinés constitue, à lui seul, un des meilleurs procédés de perception.

2° Travaillant sur plan, ou sur photo, ou carte géographique, ou carte anatomique, nos impressions seront exactement les mêmes que si nous étions sur le terrain. Nous procéderons de la même manière. Il suffira de suspendre le pendule par la main droite, base du pendule à la hauteur et écarté de la carte, orientée Nord-Sud magnétique, et de promener par exemple un crayon très pointu et tenu très verticalement par la main libre gauche, sur cette carte, pour déclencher la réaction du pendule, dès que notre rayon mental et la pointe verticale du crayon se trouveront sur le point où se trouve l'objet recherché. Ce travail de télé-radiesthésie exigera, il va de soi, beaucoup plus de volonté et d'attention, de désir et de sélection que le travail sur le terrain.

Il y a toujours intérêt à ne prospecter que sur des cartes géographiques de la plus grande échelle possible, donnant le plus possible de détails ; ainsi le télé-radiesthésiste se rend mieux compte de l'ambiance du lieu. Un croquis, même au crayon, mais très précis, est suffisant.

Comme on le constate, il n'y a guère de différence de procédé entre le travail sur le terrain jusqu'à un cercle d'horizon visible, et le travail sur carte géographique qui

revient à prospecter un cercle d'horizon invisible, se situant à des milliers de kilomètres parfois de l'opérateur. Dans le travail sur le terrain, l'opérateur se rend compte « de visu » du détail du terrain, alors que sur la carte il se « représente » par les détails précis de celle-ci la véritable configuration du terrain, ce qui revient au même.

En matière de profondeur, soit sur le terrain, soit sur la carte, l'opérateur imagine qu'une sorte de décamètre glisse de la surface du sol à l'intérieur de la terre jusqu'à la surface ou le fond de la source repérée, ou jusqu'à l'objet enfoui, et mesure ainsi la profondeur. Quant au débit, il lui suffit de compter combien de battements (ou girations suivant la convention mentale préalablement adoptée) effectuera le pendule, chaque battement ou giration « représentant » pour lui soit un mètre, soit dix mètres, suivant sa convention préalable.

Avec un peu d'entraînement, on parvient ensuite, en « questionnant » par oui ou par non le subconscient, à obtenir des renseignements de tous genres. Ces faits sont continuellement vérifiés chez les radiesthésistes mentaux très doués.

Le rayon photogénique : Étudié page 128, il est émis par toute source lumineuse (soleil, lumière artificielle, lune). Il se dirige directement vers le corps recherché. A la rencontre de ce rayon par le pendule, celui-ci réagit.

L'utilisation de ce rayon photogénique, du rayon mental et du rayon fondamental constitue encore pour d'autres radiesthésistes un ensemble suffisant pour assurer le contrôle de la prospection.

Les lignes ou zones d'influence : Il s'agit des rayons verticaux, ou à inclinaisons fixes, ou à 45° ou 135°. Étudiés page 62, ces rayons sont autant d'émissions (verticales, horizontales ou à 45°), partant du corps recherché, sur lesquelles le pendule réagit successivement.

Dans le cas de la recherche d'une source, les rayons à 45° proviennent de chacune des deux rives de ce courant. La réunion avec le sol de chaque côté du courant de ces deux rayons à 45° constitue ce que les sourciers appellent

communément les deux **grandes parallèles**. Entre ces rayons inclinés à 45° et les rayons verticaux émis par le courant, se trouvent six autres lignes provenant de rayons à inclinaisons fixes, appelés **parallèles**, plus ou moins perceptibles. La distance sur le sol entre le rayon vertical d'une rive et le rayon à 45° de cette rive, donne la mesure de la profondeur. (Voir page 169).

La série subjective : Tout le monde n'est pas sensible aux séries. Contrairement à la **série objective**, étudiée page 105, le chiffre de série subjectif est le résultat soit d'une constatation toute personnelle, soit d'une pure convention personnelle préalable.

Après une giration normale sur les rayons verticaux d'un corps, il suffit de relever légèrement, d'un coup de poignet, le pendule, qui se met à osciller. A partir de ce moment, constater d'abord une ou deux ou trois ellipses, puis une première giration, puis une deuxième, une troisième et ainsi de suite jusqu'à une nouvelle ou plusieurs ellipses. C'est le total (ou chiffre) de ces girations qui constitue la série subjective. Ce chiffre est personnel, si vous n'avez pas convenu préalablement avec vous-même d'un chiffre de série conventionnel et constant, pour un corps donné.

Si vous n'adoptez pas un tableau de conventions tel qu'il en existe un page 96, il conviendra d'en établir un vous-même. Vous rechercherez alors la série subjective de nombreux corps usuels, et en noterez le résultat. Ce travail terminé, et contrôlé plusieurs fois, il se produira que vous pourrez utiliser désormais la série subjective comme moyen de contrôle pour l'identification des corps enfouis. En effet, si vous désirez alors être réceptif à la série de tel corps que vous croyez être enfoui, le nombre de girations que vous obtiendrez sera effectivement celui que vous aurez obtenu pour ce corps lors de l'établissement de votre tableau des séries ; ou celui, connu par vous, que vous aura fait adopter le tableau d'identification de la page 96.

En effet, votre subconscient a reçu, lors des premières expérimentations sur chaque corps ou radiation, une sorte d'éducation définitive, et vous l'aurez chargé une fois pour

toutes de faire réagir votre pendule de la même manière (polarité, série, rayon fondamental) en présence de chacun de ces corps ou radiations.

Le rayon fondamental subjectif : Étudié page 113, il fut découvert par l'Abbé Mermet. Il est émis par tout corps ou radiation dans une direction fixe, qui lui est propre. A sa rencontre, le pendule oscille dans cette direction fixe, notamment à la fin d'une série.

Le témoin mental : Il est évidemment très commode, lorsque l'on recherche un corps, de concentrer son désir d'être réceptif aux radiations de ce corps sur un exemplaire de ce corps que l'on a sous les yeux et que l'on peut, en tant que « facteur de recherche », placer entre le pouce et l'index, accolé au bâtonnet de son pendule.

Mais il est encore plus commode, surtout si l'on n'a pas un corps identique à la portée de la main, de se le « représenter » fortement dans l'esprit et d'une façon précise. Tel est le « témoin mental ».

Les images : Rares sont les radiesthésistes qui ne se trouvent en butte avec les multiples images qui se déplacent autour d'un corps. Ces images orientent parfois les recherches vers une ou plusieurs positions fausses du corps réel. Parfois encore l'image se présente sous la forme de la rémanence, sorte de trace immatérielle du corps qui a séjourné à cet endroit antérieurement. Enfin, la masse d'un corps peut imprégner tout le terrain qui l'entoure de ses propres ondes ; le pendule réagit alors loin du corps sur tout l'entourage, parfois avec une intensité plus grande que sur le corps lui-même.

Il y a donc lieu d'évincer ces images diverses, causes de tant d'échecs et d'erreurs. L'emploi systématique du pendule Schumfell rend à cet égard les plus précieux services.

Mais certaines images peuvent devenir très utiles. C'est le cas de l'image-imprégnation pour la recherche, par exemple, du corps d'un noyé, dont on se servira du linge de corps utilisé par lui, pour en capter les ondes person-

nelles. Ce sera encore le cas pour l'étude d'une écriture qui a reçu l'image-imprégnation, par la main de l'écrivain, des ondes personnelles de celui-ci, ondes sur lesquelles on pourra questionner le subconscient.

L'imprégnation, étudiée page 208, qu'elle soit sur papier, sur vêtement, dans le sol, sur liquide, ou dans l'air, est bien une image. On peut la comparer à une vibration donnée par un archet à un diapason, et entretenue. Ce phénomène est complètement différent de celui de la rémanence avec lequel il est parfois confondu.

La rémanence, étudiée page 207, a une influence trompeuse sur le pendule sphérique neutre noir. Il faut une longue pratique pour arriver, avec ce pendule, à distinguer le rayonnement d'un corps réel, de celui de l'une des images auxquelles ce rayonnement a donné naissance. La rémanence consiste dans l'impression factice laissée dans le milieu où un corps a séjourné, au point de produire sur le pendule neutre sphérique noir, les mêmes réactions que le corps réel lui-même.

Le pendule électro-magnétique Schumfell, breveté S.G. D.G., a été justement conçu pour l'élimination des images de toutes catégories, y compris la rémanence et l'imprégnation. Son emploi enlève à l'opérateur le souci provenant de cette délicate question, à laquelle, hors de lui, on se butte à tout moment.

*
**

Tels sont les procédés de la méthode mentale.

Nous nous sommes efforcés de résumer, aussi clairement que possible, les procédés particuliers de cette méthode, de manière à ne pas embarrasser le débutant, tout en l'instruisant suffisamment pour qu'il progresse ensuite, de lui-même, rapidement.

Nous serons surtout heureux si nous réussissons, après avoir développé la sensibilité de nombreux lecteurs, grâce aux exercices progressifs d'assouplissement de la Méthode Physique, à les conduire à la pratique, plus commode et

supérieure, de la Méthode Mentale, qui leur aurait été le plus souvent décourageante et impraticable s'ils s'y étaient lancés sans cette judicieuse préparation.

Constatons, en effet, qu'innombrables sont les admirateurs de la radiesthésie ; mais ils sont restés de simples « pendulants » amateurs, parce que leur élan du début fut brisé par des échecs inévitables. Légion seront, par contre, désormais, les véritables radiesthésistes ; ceux-là se seront astreints à une préparation méthodique physique, dont les résultats seront déjà considérables. Mais ils pourront ensuite bénéficier, avec foi et succès, des prodigieuses possibilités de la Pensée.

**Imprimerie
de « L'Éclaireur du Nice »
21, Rue Meyerbeer, 21**