

**Composition:**

Each 1ml ampoule contains:

- Piroxicam 20mg

**Properties:**

INFLACAM (piroxicam) is a non-steroidal anti-inflammatory agent (NSAID) that also possesses analgesic and antipyretic properties.

INFLACAM interacts at several steps in the immune and inflammation responses through inhibition of prostanoid synthesis, including prostaglandins, through a reversible inhibition of cyclo-oxygenase enzyme.

INFLACAM is well absorbed following oral or rectal administration. With food there is a slight delay in the rate, but the plasma half-life is approximately 50 hours in man and stable plasma concentrations are maintained throughout the day on once-daily dosage.

INFLACAM is extensively metabolized in the liver and less than 5% of the daily dose is excreted unchanged in urine and faeces.

**Indications:**

In cases of rheumatoid arthritis, osteoarthritis, acute musculoskeletal disorders, acute gout,, post traumatic and post operative pain.

**Dosage And Administration:****Rheumatoid arthritis; Osteoarthritis:**

The recommended starting dose is 20 mg given as a single daily dose. The majority of patients will be maintained on 20 mg daily for 7-14 days

**Acute musculo skeletal disorders:**

Therapy should be initiated with 40 mg daily for the first two days given in single or divided doses. For the remainder of the treatment period, the dose should be reduced to 20 mg daily.

**Acute gout:**

Therapy should be initiated by a single dose of 40 mg followed on the next 4 to 6 days by 40 mg given in a single or divided daily dosage.

**Contraindications:**

- Active peptic ulceration.
- INFLACAM (piroxicam) should not be used in those patients who have previously shown hypersensitivity to the drug, aspirin & NSAIDs.
- Safety in children has not been established.
- Porphyria

**Side Effects:**

- Gastro-intestinal symptoms : stomatitis, anorexia, nausea, constipation, abdominal discomfort, flatulence, abdominal pain and indigestion, gastro-intestinal bleeding, perforation and ulceration may rarely occur .
- CNS effects: dizziness, headache, insomnia, depression, nervousness.
- Hypersensitivity reactions have been occasionally reported.
- Reversible elevation of blood urea nitrogen and creatinine have been reported
- Dermal hypersensitivity reactions, usually in the form of skin rash, have been reported. Onycholysis and alopecia have been reported.

**Drug interactions:**

- Aspirin** Plasma levels of piroxicam are depressed to approximately 80% of their normal values when INFLACAM is administered (20 mg/day) in conjunction with aspirin
- Caution should be used when NSAIDs are administered concomitantly with **methotrexate**.
- ACE Inhibitors:** Reports suggest that NSAIDs may diminish the antihypertensive effect of ACE inhibitors.
- Lithium:** NSAIDs have produced an elevation of plasma lithium levels and a reduction in renal lithium clearance.
- Warfarin:** may cause serious GIT bleeding higher than in users of either drug alone.

**Pregnancy And Lactation:**

INFLACAM is not recommended for use during pregnancy and lactation.

**Precaution And Warning:**

- Impairment of renal function, impairment of hepatic function, peptic ulceration or gastrointestinal bleeding.
- INFLACAM decreases platelet aggregation and prolongs bleeding time.
- inflacam Gel Should not be applied over injured or burned skin

**Package:**

Box containing 3 ampoules.

**Storage:**

Store in a dry place at temperature not exceeding 30°C.

**بيان التركيب:**

كل أمبول ١ مللى يحتوي على:

بيروكسيكام

٢٠ مجم

**الخواص:**

**إنفلاكام** ( بيروكسيكام ) هو مستحضر مضاد للالتهابات من الفئة الغير ستيرويدية و التي لها تأثيرات مسكنة و خافضة للحرارة .

يعمل إنفلاكام عن طريق تثبيط بناء البروستا جلاندينز عن طريق تثبيط عكسي لأنزيم السيكلو أوكسيجيناز .

يتم امتصاص إنفلاكام بصورة جيدة بعد استخدامه عن طريق الفم أو عن طريق الشرج أو بالحقن و يتأخر الامتصاص قليلا عند استخدامه مع الطعام .

مع الاستخدام مرة واحدة يوميا يصل معدل العمر النصفى للإنفلاكام إلى حوالى ٥٠ ساعة و يظل معدله فى البلازما ثابتا طوال اليوم .

يتم أيض إنفلاكام فى الكبد و أقل من ٥% من الجرعة اليومية يتم طرحه عن طريق الكلية يوميا .

**دواعي الاستعمال:**

للحالات المرضية التي تتطلب مضادات للالتهابات و مسكنات مثل حالات : الروماتيزم المفصلي ، خشونة الغضاريف ، حالات النقرس الحاد و الألم بعد الحوادث والعمليات .

**الجرعة وطريقة الاستعمال:****الالتهاب المفصلي والتهاب الروماتويد:**

يبدأ العلاج بجرعة ٢٠مجم تعطى مرة واحدة يوميا و يستمر معظم المرضى في تناول ٢٠مجم يوميا لمدة ٧ – ١٤ يوما .

**إضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي الحادة:**

يجب أن يبدأ العلاج بتناول ٤٠مجم يوميا لمدة يومين كجرعة واحدة أو مقسمة و يجب أن تقل الجرعة إلى ٢٠ مجم في فترة العلاج الباقية .

**النقرس الحاد:**

يجب أن يبدأ العلاج بتناول ٤٠مجم جرعة واحدة ثم يتبع ذلك إعطاء ٤٠مجم يوميا كجرعة واحدة أو مقسمة خلال الأربعة إلى الستة أيام التالية .

**نواهي الاستعمال :**

- الإصابة أو سابق الإصابة بقرحة المعدة أو الإثني عشر .
- يجب عدم إستخدام إنفلاكام في للذين لديهم حساسية للمستحضر و أيضاً للأسيرين ومضادات الإلتهاب الغير ستيرويدية الأخرى .
- لا يجب إستخدام إنفلاكام مع الأطفال .
- لا يجب إستخدام إنفلاكام مع المرضى المصابين بمرض بورفيريا .

**الأعراض الجانبية :**

قد تحدث بعض الأعراض الجانبية مع بعض الأشخاص أثناء إستخدام إنفلاكام مثل:

- التهابات الفم ، فقدان الشهية ، غثيان ، آلام بالمعدة ، إمساك . إنتفاخ و عسر هضم ، نادرا ما يحدث نزيف بالجهاز الهضمي، قرحة المعدة، دوار،صداع، أرق، توتر و إكتئاب.
- قد تحدث بعض الزيادات الطفيفة و التي تعود إلى معدلاتها الطبيعية فى مستويات البوريا و الكرياتين بالدم مع بعض المرضى.
- تفاعلات حساسية مثل فرط الحساسية ( الإحوار ) ربو شعبى ، حكة جلدية و هرش .

**التفاعلات الدوائية:**

قد تحدث بعض التفاعلات الدوائية مع الاستخدام المتزامن من الإنفلاكام مع :

- **الأسبرين :** يحدث إنخفاض لمستوى إنفلاكام فى الدم مع إستخدامه المتزامن مع الأسبرين.
- يجب إستخدام مستحضرات مضاد الإلتهابات الغير ستيرويدية بحرص مع مادة **الميثوتريكسيت** .
- **مثبطات أنزيم الأنجيوتنسين :** يحدث تثبيط لتأثيراتها فى علاج ضغط الدم .
- **الليثيوم :** يحدث إرتفاع فى مستويات الليثيوم بالدم.
- **الورافارين :** قد يحدث نزيف فى قناة الجهاز الهضمى عند استخدام الورافارين مع كل مضادات الإلتهاب الغير ستيرويدية.

**الاحتياطات الخاصة:**

- يجب إستخدام إنفلاكام بحرص مع مرضى تدهور و وظائف الكلى.
- يجب إستخدام إنفلاكام بحرص مع مرضى تدهور و وظائف الكبد.
- يجب إستخدام إنفلاكام بحرص مع مرضى إضطرابات تجلط الدم و كذلك المرضى المستخدمين لعقار الكومارين و مضادات التجلط.
- يجب إستخدام إنفلاكام بحرص مع مرضى نزيف الجهاز الهضمى و قرحة المعدة حيث يمكن حدوث نزيف مع هواء المرضى.
- إنفلاكام جل لا يستخدم علي الجلد المجروح أو المحروق .

**العبرة :**

علية تحتوي على ٣ أمبولات.

**التخزين:**

يحفظ فى مكان جاف فى درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ ٥ م .

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

إنتاج الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية  
(ميباكو- ميدي فود)- مصر

**Keep all medications out of reach of children**

Produced By

Arab Co. For Pharmaceuticals & Medicinal Plants  
(MEPACO-MEDIFOOD)- EGYPT

