

Reelle Zahlen

$(K, +, \cdot)$ angeordneter Körper, $X \subset K$ nicht leer

- Sup, Inf, Max, Min**
- $s \in K$ **sup(X)** \Leftrightarrow s kleinste obere Schranke
- $s \in K$ **inf(X)** \Leftrightarrow s größte untere Schranke
- $s \in K$ **max(X)** $\Leftrightarrow s = \sup(X) \wedge s \in K$
- $s \in K$ **min(X)** $\Leftrightarrow s = \inf(X) \wedge s \in K$

ε –**Charakterisierung des Supremums**
 $s = \sup(X) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists x \in X : s - \varepsilon < x \leq s$
Entsprechendes gilt für das Infimum

- Rechenregeln für sup** $X, Y \subset \mathbb{R}$ nach oben beschränkt:
- $\sup(X + Y) = \sup(X) + \sup(Y)$
- $\lambda > 0 \Rightarrow \sup(\lambda X) = \lambda \sup(X)$
- $X, Y \subset [0, \infty) \Rightarrow \sup(X) \cdot \sup(Y)$
- $X \subset Y \Rightarrow \sup(X) \leq \sup(Y)$

- Archimedische Anordnung**
- \mathbb{R} archimedisch angeordnet $\Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \ \exists n \in \mathbb{N} : n > x$
- $\forall \varepsilon > 0 \ \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$
- $\forall a, b \in \mathbb{R} : a < b : \exists q \in \mathbb{Q} : a < q < b$

Folgen

- Def: 2.2 - Grenzwert einer reellen Folge**
- $a \in \mathbb{R}$ Grenzwert von (a_n) $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$
- Existiert $a \in \mathbb{R}$ Grenzwert $\Rightarrow (a_n)$ konvergent, sonst (a_n) divergent

- Nullfolge** $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \rightarrow 0$

- Satz 2.3 - Rechenregeln für Grenzwerte**
 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reelle Folgen, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$
- Folge $(a_n + b_n)$ konvergiert gegen $a + b$
- Folge $(a_n \cdot b_n)$ konvergiert gegen $a \cdot b$
- $b \neq 0 \Rightarrow (\frac{a_n}{b_n})_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen $\frac{a}{b}$
- $a_n \leq b_n$ für fast alle $n \in \mathbb{N} \rightarrow a \leq b$
- Einschließungskriterium**
 $a = b \wedge a_n \leq c_n \leq b_n$ für fast alle $n \in \mathbb{N} \Rightarrow c_n \rightarrow a$
Spezialfall des Einschließungskriteriums:
 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *Folge*, $x \in R, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Nullfolge, sodass $|x_n - x| \leq y_n$ für fast alle $n \Rightarrow (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen x

- Satz 2.4 - Eigenschaften konvergenter Folgen**
- Sei a_n konvergente reelle Folge
- (a_n) beschränkt
- (a_n) besitzt genau einen Grenzwert

- Def: 2.5 - Uneigentliche Konvergenz**
- $(a_n)_{a \in \mathbb{N}}$ konvergiert uneigentlich gegen $\infty \Leftrightarrow \forall K > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_0 : a_n > K$
- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert uneigentlich gegen $-\infty \Leftrightarrow (-a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert uneigentlich gegen ∞

- Satz 2.6 - Rechenregeln für uneigentliche Konvergenz**
 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reelle Folgen
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)_{n \in \mathbb{N}} = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, a \in \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$
- $a \neq -\inf \Rightarrow (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \infty$
- $a \neq 0 \Rightarrow (a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert
- $a > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \infty$
- $a < 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = -\infty$
- $a \notin \{-\infty, \infty\} \vee (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt $\Rightarrow (\frac{a_n}{b_n})_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$

- Def 2.7 - Monotone Folgen** $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reelle Folge heißt
- monoton wachsend, falls $a_{n+1} \geq a_n, \forall n \in \mathbb{N}$
- streng monoton wachsend, falls $a_{n+1} > a_n, \forall n \in \mathbb{N}$
- monoton fallend, falls $a_{n+1} \leq a_n, \forall n \in \mathbb{N}$
- streng monoton fallend, falls $a_{n+1} < a_n, \forall n \in \mathbb{N}$

- Monotoniesatz** $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend \wedge nach oben beschränkt $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$

- Def 2.9 Häufungspunkt** $a \in \mathbb{R}$ Häufungspunkt $\Leftrightarrow \exists (a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ Teilfolge von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die gegen a konvergiert.

- Satz v. Bozano-Weierstraß**
Jede beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ besitzt eine konvergente Teilfolge und hat min. einen Häufungspunkt

- Def 2.11 - Limes superior, limes inferior** $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nach oben (unten) beschränkt \Rightarrow größter (kleinster) Häufungspunkt: *Limes superior (inferior)*

Komplexe und mehrdimensionale Folgen

- Grenzwert komplexer Folgen**
 z GW von (z_n) $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_0 : |z_n - z| < \varepsilon$.
Existiert $z \Rightarrow (z_n)$ konvergent gegen z .

- Konvergenz komplexer Folgen**
- $z_n = a_n + ib_n$ konvergiert $\Leftrightarrow a_n$ und b_n konvergieren
- z_n konvergent $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + i \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- z_n konvergent $\Rightarrow |z_n|$ konvergent

- Grenzwert mehrdimensionaler Folgen**
- z_n konvergent $\Leftrightarrow \forall i \in [0, n] : z_i$ konvergent
- $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = v \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|v_n - v\|_2 = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|v_n - v\|_\infty = 0$

Reihen

- Konvergenz** $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent gg. $s \in \mathbb{C} \Leftrightarrow$ Folge der Partialsummen gg. s konvergiert

- Teilfolge, Häufungspunkte** $(a_n)_{a \in \mathbb{N}}$ reelle Folge:
- $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ streng monoton wachsend in \mathbb{N}
 $\Rightarrow (a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ Teilfolge von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$
- $a \in \mathbb{R}$ Häufungspunkt von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \Leftrightarrow \exists$ Teilfolge, die gg. a konvergiert

- Majoranten- & Minorantenkriterium**
 $b_n := \sum_{k=0}^\infty b_k; (b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ relle Folge
 $a_s := \sum_{k=0}^\infty a_k, |(a_n)_{n \in \mathbb{N}}| \leq b_k$ für fast alle $k \in \mathbb{N}$
- b_k konvergiert $\Rightarrow a_s$ konvergiert absolut
- a_s divergiert $\Rightarrow b_s$ divergiert

- Quotientenkriterium**
 $\sum_{k=0}^\infty a_k, a \neq 0$ für fast alle $k \in \mathbb{N} \wedge \lim_{n \in \mathbb{N}} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| := q$ existiert $\Rightarrow \otimes$

- Wurzelkriterium**
 $\sum_{k=0}^\infty a_k; a_k \in \mathbb{C} : q := \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} \Rightarrow \otimes$

- \otimes
- $q < 1 \Rightarrow$ Reihe konvergiert absolut
- $q > 1 \Rightarrow$ Reihe divergiert

- Leibnitz-Kriterium** $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ relle, monoton fallende Nullfolge $\Rightarrow \sum_{k=0}^\infty (-1)^k a_k \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} | \sum_{k=0}^\infty (-1)^k a_k - s_n | \leq a_{n+1}$

- Umordnungssatz**
- Jede Umordnung einer konvergenten Reihe konvergiert gegen den-selben Wert
- Konvergiert eine Reihe aus reellen Summanden, aber nicht absolut $\Rightarrow \forall s \in \mathbb{R} \exists$ bijektive Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$: die umgeordnete Reihe konvergiert gegen s

- Potenzreihe** $P(z) := \sum_{k=0}^\infty c_k z^k; c_k \in \mathbb{C}; z \in \mathbb{C}$
 $R := \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} :=$ Konvergenzradius

- Cauchy-Produkt**
- Seien $\sum_{k=0}^\infty a_k, \sum_{k=0}^\infty b_k$ absolut konvergent $\in \mathbb{C} \Rightarrow (\sum_{k=0}^\infty a_k)(\sum_{k=0}^\infty b_k) = (\sum_{m=0}^\infty c_m)$ mit $c_m = (\sum_{k=0}^m a_k b_{m-k})$ mit c_k absolut konvergent.
- Seien $\sum_{k=0}^\infty a_k z^k, \sum_{k=0}^\infty b_k z^k$ zwei Potenzreihen mit Konvergenzra-dien R_a und $R_b \Rightarrow (\sum_{k=0}^\infty a_k z^k)(\sum_{k=0}^\infty b_k z^k) = (\sum_{m=0}^\infty c_b z^m)$ mit $c_m = \sum_{k=0}^m a_k b_{m-k}$ und Konvergenzradius $\min\{R_a, R_b\}$

- Natürliche Exponentialfunktion**
 $exp(z) := \sum_{k=0}^\infty \frac{z^k}{k!} = \sum_{K=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}$

- Eigenschaften von exp** $\forall z, w \in \mathbb{C}, x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$
- $\exp(z + w) = \exp(z) \cdot \exp(w)$
- $\exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)}, \exp(z) \neq 0 \wedge \exp(\overline{z}) = \exp(z)$

- $|e^{ix}| = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{z}{n})^n = \exp(z)$
- $|\exp(z) - \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!}| \leq 2 \cdot \frac{|z|^{n+1}}{(n+1)!}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{-n} e^x = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$
- $e^{i\pi} = -1$
- $e^{z+2\pi i} = e^z$
- $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$

- Trigonometrische Funktionen**
- $\sin(z) := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$
- $\cos(z) := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}$
- $\arctan(x) := \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$
- $\sinh(x) := \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^{2k+1}}{(2n+1)!}$
- $\cosh(x) := \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^{2k}}{(2n)!}$
- $\tanh(x) := \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)}$

- Eigenschaften von sin, cos, tan** $\forall z, w \in \mathbb{C}, x \in \mathbb{R}$
- $\exp(iz) = \cos(z) + i \sin(w)$
- $(\sin(z))^2 + (\cos(z))^2 = 1$
- $\sin(z + w) = \sin(z) \cos(w) + \cos(z) \sin(w)$
- $\sin(2z) = 2\sin(z)\cos(z)$
- $\cos(z + w) = \cos(z) \sin(w) - \sin(z) \sin(w)$
- $\cos(x) = Re(e^{ix}) \ \sin(x) = Im(e^{ix})$
- $\cos(2z) = \cos^2(z) - \sin^2(z)$
- $\arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$
- $z = \tan(c) : \arctan'(z) = \frac{1}{\tan^2(c)} = \frac{1}{1+(\tan(c))^2} = \frac{1}{1+z^2}$
- $\cosh^2(x) = \frac{1}{2} \cosh(x) + \frac{1}{2}$
- $\cosh^2(z) - \sinh^2(z) = 1$

- | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|
| | 0 | $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$ | $\frac{\pi}{4} = 45^\circ$ | $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ | $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$ |
| sin | $\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$ | $\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$ |
| cos | $\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$ |

Stetigkeit

- Definition**
stetig in $c \Leftrightarrow \forall (x_n)$ mit $\lim_{x \rightarrow 0} x_n = c$ gilt $\lim_{x \rightarrow 0} f(x_n) = f(c)$

- Rechenregeln** $D \subseteq \mathbb{R}; f, g : D \rightarrow \mathbb{R}; f, g$ stetig in c
 $\Rightarrow f + g, f \cdot g, \frac{f}{g} \ (g \neq 0)$ stetig in c

- Komposition** $D, D' \subseteq \mathbb{R}, f : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in c
- $y := f(c) \in D' \wedge g$ stetig in $y \Rightarrow (g \circ f) : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in c
- f, g stetig $\wedge f(D) \subseteq D' \Rightarrow (g \circ f) : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig

- ε - δ -**Charakterisierung** $D \subseteq \mathbb{R}, f : D \rightarrow \mathbb{R}, c \in D \Rightarrow f$ stetig in $c \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in D : |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$

- Zwischenwertsatz** $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow \forall y \in \mathbb{R}$ mit $\min\{f(a), f(b)\} \leq y \leq \max\{f(a), f(b)\} : \exists x \in [a, b] : f(x) = y$

- Satz v. Max. und Min.** $[a, b]$ beschränkt, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig
- f beschränkt
- $\exists x_{\max}, x_{\min} \in [a, b] : f(x_{\max}) = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\} \wedge f(x_{\min}) = \inf\{f(x) : x \in [a, b]\}$

- Stetigkeit in \mathbb{C} & \mathbb{R}^n** wörtlich übertragbar
 $D \subseteq \mathbb{C}$ oder $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen: $\forall f$ stetig $: D \rightarrow \mathbb{C}$ bzw. $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ beschränkt und nimmt auf D Maximum und Minimum an

- Stetigkeit von Potenzreihen** $f(z) = \sum_{k=0}^\infty c_k z^k$ mit Konvergenzradi-us $R \Rightarrow f : \{z : |z| < R\} \rightarrow \mathbb{C}$ stetig

- Differenziation**
Definition $I \subseteq \mathbb{R}, f : I \rightarrow \mathbb{R}$
 $f'(c) := \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$

- Diff’barkeit \Rightarrow Stetigkeit** f diffbar in $c \Rightarrow f$ in \mathbb{C} stetig

- Monotonie & Umkehrbarkeit**
- f stetig: f injektiv $\Leftrightarrow f$ streng monoton wachsend oder fallend
- f außerdem surjektiv $\Rightarrow f^{-1}$ stetig \wedge monoton wachsend / fallend

- Differentiation v.** f^{-1} f bijektiv, $f'(c) \neq 0 \Rightarrow z := f(c)$ diff’bar, $(f^{-1})'(z) = \frac{1}{f'(c)}$

- Logarithmus** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

- Diff. v. Potenzreihen**
 $f(x) = \sum_{k=0}^\infty c_k x^k \in \mathbb{R} : f'(x) = \sum_{k=1}^\infty k c_k x^{k-1}, D = |R|$

- Höhere Ableitungen** $\mathcal{C}^n(I)$: Vektorraum aller n-mal stetig diff’baren Funktionen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$

- Extrema**
- lokales Maximum** $\Leftrightarrow \varepsilon > 0 : f(c) \geq f(x) \forall x \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \cap I$
- lokales Minimum** $\Leftrightarrow \varepsilon > 0 : f(c) \leq f(x) \forall x \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \cap I$
- isoliertes lok. Max/Min** $\Leftrightarrow \text{Max/min} \wedge x \neq c$
- globales Max (Min)** $f(x) \geq (\leq) f(c)$

- Satz von Rolle** $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$

- Hinreichend für Extrema** f diff’bar, $\exists c : f'(c) = 0$
- f streng monoton wachsend um $c \Rightarrow$ f in c isol. lok. Min.
- $f \in \mathcal{C}^2, f''(c) = 0 \Rightarrow f$ in c isol. lok. Min.
- f’ um c str. monoton fallend $\Rightarrow f$ in c isol. lok. Max.
- $f \in \mathcal{C}^2, f''(c) < 0 \Rightarrow f$ in c isol. lok. Max.

- Taylor**
- $n \in \{\mathbb{N} \cup \infty\} : T_n f(x; c) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x - c)^k$
- $T_n(f \cdot g) = T_n f \cdot T_n g$
- Potenzreihen: Das n-te Taylorpolynom (im Nullpunkt) von Potenz-reihen ist deren n-te Partialsumme

Integration

- Riehmann-Integral**
 $\varphi \in \tau[a, b] : \int_a^b \varphi dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$

- Stetigkeit & Monotonie** \Rightarrow integrierbar $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
- f stetig $\Rightarrow f$ integrierbar
- f monoton $\Rightarrow f$ integrierbar
- \exists Unterteilung v. $[a, b]$ stetig oder monoton $\Rightarrow f$ integrierbar

- Mittelwertsatz d. Int.-R.** $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $\exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$

- Partielle Integration** $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig: $\int_a^b f(x) g'(x) dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$

- Substitution** $\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(y) dy$

- Majorantenkriterium f. Int.**
 f über $[a, b]$ absolut integrierbar \Leftrightarrow
- f in jedem Teilintervall $\in [a, b]$ integrierbar
- $|f(x)| \leq g(x) \forall x \in [a, b]$
- g über $[a, b)$ uneig. integrierbar

- Folgerung z. uneig. Integrierbarkeit**
- $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf allen Teilintervallen $\in (a, b]$ integrierbar, $f(x) = \mathcal{O}(\frac{1}{|x-a|^s})$ für $x \rightarrow a$ mit $s \in [0, 1) \Rightarrow f$ über $(a, b]$ uneig. integrierbar
- $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, a < b$ integrierbar, $f(x) = \mathcal{O}(\frac{1}{x^s})$ mit $x \rightarrow \infty, s > 1 \Rightarrow f$ über $[a, \infty]$ uneig. integrierbar

- Integralvergl.krit.** $f : [1, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton fallend , $\forall x : f(x) > 0, f$ über $[1, \infty]$ uneig. integr. $\Rightarrow \sum_{k=1}^\infty f(k)$ konvergiert

Potenzreihen

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \Rightarrow \int f(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} c_k x^{k+1}$$

Kurven**Diff'bare Kurven**

- k regulär in $t \Leftrightarrow k'(t) \neq 0$, sonst singulär
- k singulär in $t \Rightarrow \nexists$ Tangentialvektor
- $k'(t) = (k_1'(t), \dots)$ Tangentialvektor

- $T_k(t) = \frac{k'(t)}{\|k'(t)\|_2}$ Tangentialeinheitsvektor in t

- $N(t) = \begin{pmatrix} -y'(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$ Normalenvektor (2D)

Rektifizierbarkeit, Bogenlänge

$$k:[a,b]\rightarrow\mathbb{R}^n \text{ rektifizierbar} \Leftrightarrow \{\sum_{k=1}^N\|\gamma(t_k)-\gamma(t_{k+1})\|_2:$$

$$a=t_0<t_1<\ldots<t_N=b \text{ Unterteilung v. } [a,b]\}$$

Bogenlänge stetig diff'barer Kurven

$$k:[a,b]\rightarrow\mathbb{R}^n \text{ stückweise stetig diff'bar} \Rightarrow L(k)=\int_a^b\|k'(t)\|_2dt$$

Parametertransformation

- $f:J\rightarrow I$ Parametertransformation \Leftrightarrow bijektiv und stetig
- f, f^{-1} k-mal stetig diff'bar $\Rightarrow \mathcal{C}^k$ Parametertransformation
- \mathcal{C}^1 -Par.transf. f orientierungstreu wenn $f'(t)>0\;\forall t$; orientierungsumkehrend für $<$

- k und $\tilde k$ äquivalente Kurven wenn mit Par.transf. $f:k=k\circ f$ äquivalente Kurven \Rightarrow gleiche Bogenlänge

Bogenlänge/Umparametrisierung

- $k:[a,b]\rightarrow\mathbb{R}^n$ stetig diff'bare Kurve; $f:[c,d]\rightarrow[a,b]$ \mathcal{C}^1 -Par.transf.; k und $k\circ f$ gleiche Länge
- k regulär $\Rightarrow \exists$ orientierungserhaltende \mathcal{C}^1 -Parametertransformation $f:[a,L(k)]\rightarrow[a,b]$, sodass diese Kurve $k:J\rightarrow\mathbb{R}, k:=k\circ f$ “mit Einheitsgeschwindigkeit läuft“, also $\|k'(t)\|=1\;\forall t\in[0,L(k)]$
- Man erhält dieses f als Umkehrfunktion von $s\rightarrow\int_a^s\|k'(t)\|dt$

Krümmung

- $k:I\rightarrow\mathbb{R}^2$ regulär in $t\in I\Rightarrow\kappa(t)$ **Krümmung** im Punkt t
- $R(t)=\frac{1}{\kappa(t)}$ Krümmungsradius
- $k:I\rightarrow\mathbb{R}^2$ regulär, zweimal stetig diff'bar, k die dazugehörige unparametrisierte Kurve \Rightarrow Krümmung von k in t als $\tilde k$ an $\tilde t$: $k(t)=\tilde k(\tilde t)$
- $k:I\rightarrow\mathbb{R}^2$ zweimal stetig diff'bar, $t\in I:k$ in t regulär:
- k nach Bogenlänge parametrisiert $\Rightarrow\kappa(t)=\langle k''(t),N(t)\wedge|\kappa(t)|=\|T'(t)\|=\|k''(t)\|$
- $k(t)=\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}\Rightarrow\kappa(t)=\frac{x'(t)y''(t)-y'(t)x''(t)}{\sqrt{(x'(t)^2+y'(t)^2)^3}}$

Mehrdimensionale Differentialrechnung

$$M\subseteq\mathbb{R}^n \text{ offen, } f:M\rightarrow\mathbb{R}, x\in M$$

Richtungsableitung

$$v\in\mathbb{R}^n\backslash\{0\} \text{ Richtungsvektor} \Rightarrow \text{Richtungsableitung von } f \text{ in Richtung } v=\partial_v f(x)=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{f(x+tv)-f(x)}{t}$$

Totale Differenzierbarkeit

$$f \text{ in } x \text{ (total) diff'bar} \Leftrightarrow \exists \text{ lineare Abbildung } L:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}^n, h\in\mathbb{R}^n\backslash\{0\}:\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(x+h)-f(x)-Lh}{\|h\|}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(x+h)-f(x)-\langle w,h\rangle}{\|h\|}=0$$

Diff'barkeit im Mehrdimensionalen

$$f \text{ (total) diff'bar} \Leftrightarrow \forall x\in M \text{ alle partiellen Ableitungen existieren und stetig sind} \Rightarrow f \text{ stetig diff'bar,}$$

$$w=\begin{pmatrix} \partial_1 f(x) \\ \vdots \\ \partial_n f(x) \end{pmatrix}=: \nabla f(x), \; \partial_v f(x)=\langle \nabla f(x), v\rangle$$

Hesse-Matrix

$$\nabla^2 f(x)=\begin{pmatrix} \partial_{11} f(x) & \cdots & \partial_{1,n} f(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{n1} f(x) & \cdots & \partial_{nn} f(x) \end{pmatrix}$$

Taylor in höheren Dimensionen

$$T_n f(\binom{x}{y},\binom{a}{b})=\sum_{j+k=n}^n\frac{\partial_x^j\partial_y^k f(\binom{a}{b})}{j!k!}(x-a)^j(y-b)^k$$

Extrema/Kritische Punkte

- kritischer Punkt: $\nabla f(c)=0$
- lokales Min.: $\nabla^2 f(c)$ pos. semidefinit
- lokales Max.: $\nabla^2 f(c)$ neg. semidefinit
- $\nabla f(c)=0$ und $\nabla^2 f(c)$ pos. definit \Rightarrow isoliertes lok. Min.
- $\nabla f(c)=0$ und $\nabla^2 f(c)$ neg. definit \Rightarrow isoliertes lok. Max.
- $\nabla f(c)=0$ und $\nabla^2 f(c)$ pos. und neg. EW \Rightarrow Sattelpunkt

Jacobi-Matrix

$$F:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}^m; F(x)=\begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix}$$

$$f \text{ in } c \text{ (total) diff'bar wenn lin. Abb. (oder Matrix) } L \text{ existiert mit:}$$

$$\lim_{\substack{h\rightarrow 0 \\ h\in\mathbb{R}^n\backslash\{0\}}}\frac{F(x+h)-F(x)-Lh}{\|h\|}=0$$

$$\text{Alle } \partial_j f_k(x) \; (j=1\ldots n, k=1\ldots m) \text{ in } c \text{ stetig} \Rightarrow$$

$$f \text{ in } c \text{ stetig diff'bar und Jacobi-Matrix}$$

$$DF(c):=\begin{pmatrix} \partial_1 f_1(c) & \cdots & \partial_n f_1(c) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f_m(c) & \cdots & \partial_n f_m(c) \end{pmatrix}$$

Mehrdimensionale Kettenregel

$$D(G\circ F)(c)=DG(F(c))\cdot DF(c)$$

Mehrdimensionale Integralrechnung

$$\textbf{Transformationssatz} \quad T:M_2\rightarrow M_1; f:M_1\rightarrow\mathbb{R}$$

$$\int\cdots\int_{M_1}f(x)dx=\int\cdots\int_{M_2}f(T(y))\;|\det(DT(y))|\;dy$$

Differentialgleichungen**Rezepte**

1	$y'(t)=f(t)\cdot g(y(t))$	Funkt. f, g
2	$y'(t)+a(t)\cdot y(t)=0$	Funkt. a
3	$y'(t)+a(t)\cdot y(t)=f(t)$	Funkt. a, f
4	$y''(t)+ay'(t)+by(t)=0$	Konst. a, b
5	$y''(t)+ay'(t)+by(t)=p(t)$	Konst. a, b ; Polyn. p
6	$y''(t)+ay'(t)+by(t)=e^{\alpha t}(a_1\cos(\beta t)+a_2\sin(\beta t))$	Konst. $\alpha, \beta, a_1, a_2, b\neq 0$

$$\textbf{Meth. 1} \quad F(t)=\int f(t)dt; \; G(t)=\int\frac{1}{g(t)}dt$$

$$\text{Jede allgemeine Lsg für } y(t) \text{ erfüllt die Gleichung } G(y(t))=F(t)+c$$

$$\text{Mit Anfangsbedingung erfüllt jede Lsg. } \int_{y_0}^{y(t)}\frac{1}{g(u)}du=\int_{x_0}^t f(u)du$$

$$\textbf{Meth. 2} \quad A(t)=\int a(t)dt; \text{ allgemeine Lsg. } y(t)=ce^{-A(t)}$$

$$\text{Für } \textbf{AWP}: y(t_0)=y_0:y(t)=y_0e^{A(t_0)-A(t)}$$

$$\textbf{Meth. 3} \quad A(t)=\int a(t)dt; B(t)=\int e^{A(t)}\cdot f(t)dt$$

$$\text{Allg. Lsg. } y(t)=e^{-A(t)}\cdot (c+B(t))$$

$$\text{Für } \textbf{AWP}: y(t_0)=y_0:y(t)=e^{A(t_0)-A(t)}(y_0+\int_{t_0}^t e^{A(s)-A(t_0)}\cdot f(s)ds)$$

Meth. 4

- $a^2>4b$: Löse $\lambda_{1,2}=\lambda^2+a\lambda+b=0$ allg. Lsg.: $y(t)=c_1e^{\lambda_1t}+c_2e^{\lambda_2t}$
- $a^2=4b$: $\lambda=-\frac{a}{2}$ allg. Lsg.: $y(t)=(c_1+c_2)e^{\lambda t}$
- $a^2<4b$: $\omega=\sqrt{b-(\frac{a}{2})^2}$ allg. Lsg.: $y(t)=(c_1\cos(\omega t)+c_2\sin(\omega t))e^{-\frac{a}{2}t}$

$$\text{Für } \textbf{AWP}: y(t_0)=y_0, y'(t_1)=y_1 \text{ setze } t=t_1, t=t_2 \text{ in allg. Lösung ein und bestimme } c_1, c_2$$

Meth. 5

- Bestimme allg. Lsg. $y_h(t)$ von $y_h''(t)+ay_h'(t)+by_h(t)=0$
- Stelle Polyn. $q(t)=a_nt^n+\cdots+a_1t+a_0$ mit Grad $n=\deg(p)$ und Param. a_0,\ldots,a_n auf
- $y_p(t)=\begin{cases} q(t) & b\neq 0 \\ tq(t) & a\neq 0, b=0 \\ t^2q(t) & a=0, b=0 \end{cases}$ in Abhängigkeit von $a_0,\ldots,a_n; y_p''(t)+ay_p'(t)+by_p(t)=p(t)$
- Ermittle a_1,\ldots,a_n durch Koeffizientenvergleich
- Allg. Lsg.: $y(t)=y_h(t)+y_p(t)$

$$\text{Für } \textbf{AWP}: y(t_0)=y_0, y'(t_1)=y_1 \text{ setze } t=t_1, t=t_2 \text{ in allg. Lösung ein und bestimme } c_1, c_2$$

Meth. 6

$$\text{1. Bestimme allg. Lsg. } y_h(t) \text{ von } y_h''(t)+ay_h'(t)+by_h(t)=0$$

$$\text{2. Löse } \lambda^2+a\lambda+b=0$$

$$\text{3. In Abhängigkeit von } k:$$

$$y_p(t)=\begin{cases} ke^{ct} & \lambda_1\neq c\neq\lambda_2 \\ kte^{ct} & \lambda_1=c\neq\lambda_2 \text{ oder } \lambda_1\neq c=\lambda_2 \\ kt^2e^{ct} & \lambda_1=c=\lambda_2 \end{cases}$$

$$\text{4. } y_p''(t)+ay_p'(t)+by_p(t)=e^{ct} \text{ ermittle } k$$

$$\text{5. Allg. Lsg.: } y(t)=y_h(t)+y_p(t)$$

$$\text{Für } \textbf{AWP}: y(t_0)=y_0, y'(t_1)=y_1 \text{ setze } t=t_1, t=t_2 \text{ in allg. Lösung ein und bestimme } c_1, c_2$$

$$\textbf{Mehrdimensionale DGLs} \quad \text{Sei } \{v_1,\ldots,v_n\}\subset\mathbb{R}^n \text{ Basis von Eigenvektoren von } A\in\mathbb{R}^{n\times n} \text{ zu EW } \lambda_1,\ldots,\lambda_n$$

$$\text{Lin. unabh. Lösungen v. DGL der Form } y'=Ay: y=e^{\lambda_jt}v_j$$

$$\textbf{Satz von Picard-Lindelöf} \quad f \text{ stetig diff'bar bzgl. y, stetig in t} \Rightarrow \text{AWP } y'=f(t,y), y(t_0)=y_0 \text{ auf } (t_0-\varepsilon, t_0+\varepsilon) \text{ genau eine Lösung (für } \varepsilon>0 \text{ klein genug)}$$

Komplexe Zahlen

$$\mathbb{C}=\{z|z=x+iy, x, y\in\mathbb{R}, i^2=-1\}$$

- $z_1+z_2=(x_1\pm x_2)+i(y_1\pm y_2)$
- $z_1\cdot z_2=x_1x_2-y_1y_2+i(x_1y_2+x_2y_1)$
- $\frac{z_1}{z_2}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2}+i\frac{x_2y_1-x_1y_2}{x_2^2+y_2^2}=\frac{z_1\overline{z_2}}{|z_2|^2}$
- $|z|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{z\cdot\overline{z}}$
- $\varphi=\arctan(\frac{z}{y}), \; r=|z|, \; x=r\cdot\cos(\varphi), \; y=r\cdot\sin(\varphi)$
- $\overline{z}=x-iy$
- $z=r(\cos(\varphi)+i\sin(\varphi))=r\cdot e^{i\varphi}$

Koordinatentransformation**2D - Kreiskoordinaten**

$$\binom{x}{y}\mapsto r\binom{\cos(\varphi)}{\sin(\varphi)}, \quad dxdy\mapsto r\cdot drd\varphi$$

3D - Kugelkoordinaten

$$\binom{x}{y}{z}\mapsto r\binom{\sin(\theta)\cos(\varphi)}{\sin(\theta)\sin(\varphi)}{\cos(\theta)}, \quad dxdydz\mapsto r^2\sin(\theta)drd\theta d\varphi$$

3D - Zylinderkoordinaten

$$\binom{x}{y}{z}\mapsto\binom{r\cdot\cos(\varphi)}{r\cdot\sin(\varphi)}{z}, \quad dxdydz\mapsto r\cdot drd\varphi dz$$

Sonstiges**Bekannte Abl. und Integrale**

$\frac{d}{dx}(f(x))$	$f(x)$	$\int(f(x))\,dx$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$	$\sqrt{1-x^2}+x\sin^{-1}(x)$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x)$	$x\arccos^{-1}(x)-\sqrt{1-x^2}$
$\frac{1}{x^2+1}$	$\arctan(x)$	$x\tan^{-1}(x)-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{arsinh}(x)$	$x\sinh^{-1}(x)-\sqrt{x^2+1}$
$\frac{1}{\sqrt{x-1}\sqrt{x+1}}$	$\operatorname{arcosh}(x)$	$x\cosh^{-1}(x)-\sqrt{x-1}\sqrt{x+1}$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\operatorname{arctanh}(x)$	$\frac{1}{2}\ln(1-x^2)+x\tanh^{-1}(x)$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x)$	$-\ln(\cos(x))$
$\frac{1}{\cosh^2(x)}$	$\tanh(x)$	$\ln(\cosh(x))$
$\cos(2x)$	$\sin(x)\cos(x)$	$-\frac{1}{2}\cos^2(x)$
$-2\sin(x)\cos(x)$	$\cos^2(x)$	$\frac{1}{2}(x+\sin(x)\cos(x))$
$\sin(2x)$	$\sin^2(x)$	$\frac{1}{2}(x-\sin(x)\cos(x))$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$	$x\cdot\ln(x)-x$
$\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$	$\sqrt{1-x^2}$	$\frac{1}{2}(\sqrt{1-x^2}x+\sin^{-1}(x))$

Landau-Notation

- $f\in\mathcal{O}(g)\Leftrightarrow\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{|f(x)|}{g(x)}<\infty$
- $f\in o(g)\Leftrightarrow\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{|f(x)|}{g(x)}=0$
- $f\in\Omega(g)\Leftrightarrow\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{g(x)}{|f(x)|}<\infty$
- $f\in\omega(g)\Leftrightarrow\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{g(x)}{|f(x)|}=0$

Bekannte Reihen

$$\begin{array}{ll} \text{Harmonische Reihe} & \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^a}=+\infty \\ & \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^a}\text{ div. f. } a\leq 1\text{ , konv. sonst} \\ \text{Potenzreihe} & \sum_{k=1}^{\infty}a_0q^k=\frac{a_0}{1-q}\;\;\forall|q|<1 \\ \text{Logarithmusreihe} & \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{x^k}{k}=\ln(1+x) \\ \text{Arcus-Tangens-Reihe} & \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{2k+1}=\arctan(x)\text{ in }[-1,1] \\ \text{Exponentialreihe} & \sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^k}{k!}=\exp(z) \\ & \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}=e \end{array}$$

Allgemeines

- $k!\geq 2^{n+1}$
- $x>0\Rightarrow e^x>\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$
- $||a|-|b||\leq|a-b|\leq|a|+|b|, |a+b|\leq|a|+|b|$
- $\frac{1}{e}=\lim_{x\rightarrow\infty}(\frac{k}{k+1})^k$
- $\forall n>0:(1+x)^n\geq 1+nx$ (Bernoulli-Ungleichung)