

Appunti di Geometria e Algebra Lineare

Francesco Sermi



Al mio amico e compagno di banco Giulio

Indice

Introduzione	7
1 Spazi vettoriali	11
1.1 Definizioni e proprietà	11
1.2 Sottospazi	15
1.3 Vettori linearmente indipendenti	16
1.4 Base di uno spazio vettoriale	18
1.5 Somma di sottospazi	25
2 Matrici e applicazioni lineari	29
2.1 Sistemi lineari e metodo di Gauss-Jordan	29
2.2 Rango di una matrice	35
2.3 Matrici simmetriche e antisimmetriche	41
2.4 Applicazioni lineari	45
2.5 Isomorfismo delle coordinate	48
3 Prodotti scalari	55
3.1 Dimensioni del radicale	60
4 Soluzioni agli esercizi	61
4.1 Spazi vettoriali	61
4.2 Prodotti scalari	66
4.2.1 Esercizio 3.1	66
A Logica	69
B Basi a dimensione infinita	71

Introduzione

Queste note nascono come appunti di Geometria e Algebra Lineare redatte per il mio amico Giulio. Le ho riscritte partendo dai miei appunti del corso, integrandoli con il materiale e le spiegazioni del professore, pertanto potrebbero esserci qualche piccolo errore di battitura o di comprensione. Se doveste trovarne, vi prego di segnalarmeli in modo da poterli correggere tempestivamente scrivendomi all'indirizzo email:

francesco291104 (**dot**) gmail.com

oppure fermandomi direttamente in dipartimento. Prima di libervi dal mio yapping infinito, voglio spendere due parole sull'approccio che ho seguito nello scrivere questo libro: la "formulazione" hilbertiana (ovvero basata sul concetto di vettore e spazio vettoriale) ha una grandissima potenza poiché consente di sviluppare un formalismo che ci permette di trattare degli spazi n -dimensionali. In virtù di questo, ho cercato di ridurre al meno possibile le illustrazioni presenti in questo libro, oltre a questioni di tempestiche, siccome preferirei che l'eventuale lettore apprezzasse la potenza "algebrica" di questo formalismo, che ci conduce ben oltre i limiti dell'impostazione puramente visiva della geometria ed è ancora valido a dimensione infinita.

Anche se sarete in disaccordo con questo mio modo di vedere la disciplina e verso la (quasi) totale assenza di illustrazioni, spero vivamente che voi riusciate ad appassionarvi allo studio di questa materia.

Buono studio a tutti!

Pisa, 23 novembre 2025

Francesco Sermi

Notazioni

Riporto all'inizio del libro le notazioni adottate all'interno di questo documento:

$\underline{v}$ vettore

$\underline{0}$ vettore nullo

$\times$ prodotto cartesiano

$\oplus$ somma diretta di sottospazi vettoriali

$+_V$ somma vettoriale su V (il pedice è omissso solitamente)

$\cdot_V$ prodotto per scalare su V (il pedice è omissso solitamente)

$\mathbb{K}$ campo generico

$+_{\mathbb{K}}$ operazione di "somma" sul campo $\mathbb{K}$

$0_{\mathbb{K}}$ elemento neutro rispetto a $+_{\mathbb{K}}$

$\cdot_{\mathbb{K}}$ operazione di "prodotto" sul campo $\mathbb{K}$

$1_{\mathbb{K}}$ elemento neutro rispetto a $\cdot_{\mathbb{K}}$

A^i colonna i -esima di una matrice A

A_j riga j -esima di una matrice A

$\bigtimes_i$ prodotto cartesiano multiplo

$\sum_i$ sommatoria

$\varphi(\cdot, \cdot)$ prodotto scalare/hermitiano

$\|\cdot\|, |\cdot|$ norma

$a \times b, a \wedge b$ prodotto vettoriale

$(\iota_+, \iota_-, \iota_0)$ segnatura di un prodotto scalare/hermitiano

ι_+ segnatura positiva di un prodotto scalare/hermitiano

ι_- segnatura negativa di un prodotto scalare/hermitiano

ι_0 segnatura nulla di un prodotto scalare/hermitiano

Σ_n gruppo (rispetto all'operazione di composizione di funzioni) delle permutazioni $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ bigettive.

$\sim$ relazione d'equivalenza

$X/\sim$ insieme quoziente di X rispetto alla relazione d'equivalenza

Il cuore del corso di Geometria e Algebra Lineare è sicuramente lo studio degli spazi vettoriali. In questa sezione vedremo le definizioni, le proprietà e i teoremi fondamentali che riguardano gli spazi vettoriali, i sottospazi, il concetto di base e di dimensione.

1.1 Definizioni e proprietà

La definizione di spazio vettoriale è strettamente legata alla definizione di campo, che può essere così definito

Definizione 1.1 (Campo). Un **campo** è un insieme $\mathbb{K}$ dotato di due operazioni $+\mathbb{K} : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ e $\cdot\mathbb{K} : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ tali che:

- $(\mathbb{K}, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a +\mathbb{K} b) +\mathbb{K} c = a +\mathbb{K} (b +\mathbb{K} c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a +\mathbb{K} b = b +\mathbb{K} a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 0_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : \forall a \in \mathbb{K}, 0_{\mathbb{K}} +\mathbb{K} a = a +\mathbb{K} 0_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K}, \exists (-a) \in \mathbb{K} : a +\mathbb{K} (-a) = (-a) +\mathbb{K} a = 0$ (esistenza dell'elemento inverso).
- $(\mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \cdot)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $\cdot$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a \cdot\mathbb{K} b) \cdot\mathbb{K} c = a \cdot\mathbb{K} (b \cdot\mathbb{K} c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a \cdot\mathbb{K} b = b \cdot\mathbb{K} a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : 1_{\mathbb{K}} \cdot\mathbb{K} a = a \cdot\mathbb{K} 1_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \exists a^{-1} \in \mathbb{K} : a \cdot\mathbb{K} a^{-1} = a^{-1} \cdot\mathbb{K} a = 1$ (esistenza dell'elemento inverso).

Oss.: Fare attenzione ai pedici sulle operazioni e sugli elementi: infatti, nel corso di questi appunti avremo a che fare spesso con delle operazioni che sono definite su insiemi diversi ma che vengono preservate dai morfismi; tuttavia, per evitare confusione, cercherò il più possibile di denotare le operazioni e gli elementi con pedici che tolgano ogni dubbio sull'insieme di appartenenza.

Esempio 1.1. L'esempio più lampante e semplice di campo è chiaramente l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ (e chiaramente anche il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$). Un esempio di campo meno noto è sicuramente $\mathbb{Z}_2$, ovvero l'insieme dei numeri interi modulo 2, che contiene solo due elementi, 0 e 1, e le operazioni di somma e prodotto sono definite come segue:

- $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0$;
- $0 \cdot 0 = 0, 0 \cdot 1 = 0, 1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 1 = 1$.

e si può verificare che tale insieme è effettivamente un campo, in quanto le due operazioni possiedono tutte le proprietà richieste dalla definizione data in 1.1.

Definizione 1.2 (Spazio vettoriale). Sia dato un insieme V , un campo $\mathbb{K}$ e siano date due operazioni $+: V \times V \rightarrow V$ e $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$. Diremo che $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale (o più semplicemente uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$) se le due operazioni soddisfano le seguenti proprietà:

- $(V, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{z} \in V, (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{z} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{z})$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \underline{v} + \underline{w} = \underline{w} + \underline{v}$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists \underline{0} \in V : \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V : \underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$ (esistenza dell'elemento inverso).
- l'operazione $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \alpha \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \alpha \cdot \underline{v} + \alpha \cdot \underline{w}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+$);
 - ② $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha +_{\mathbb{K}} \beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \underline{v} + \beta \cdot \underline{v}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+_{\mathbb{K}}$);
 - ③ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha\beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot (\beta \underline{v})$ (proprietà associativa della $\cdot$);
 - ④ $\exists \underline{1} \in \mathbb{K} : \forall \underline{v} \in V, \underline{1} \cdot \underline{v} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro per $\cdot$).

Le due operazioni $+$ e $\cdot$ vengono dette, rispettivamente, **somma** (o legge di composizione interna) e **prodotto per scalare** (o legge di composizione esterna).

Oss.: Concettualmente, sebbene siano simili, la definizione di spazio vettoriale è diversa da quella di campo: infatti, sul campo abbiamo due operazioni che sono definite sul prodotto cartesiano del campo con sé stesso e restituiscono un elemento del campo; mentre nel caso dello spazio vettoriale si ha un insieme V su cui sono definite due operazioni, una che è definita sul prodotto cartesiano di V con sé stesso e restituisce un elemento di V , e l'altra che è definita sul prodotto cartesiano del campo con l'insieme V e restituisce un elemento di V .

Oss.: Si noti che uno spazio vettoriale è definito completamente solamente se definiamo le due operazioni $+$ e $\cdot$, oltre al campo. E' possibile, come vedremo in un esempio, andare a fornire la struttura di spazio vettoriale ad un medesimo insieme definendo le due operazioni in modo opportuno.

Tramite questa definizione, possiamo andare a mostrare alcuni risultati validi nei campi che sono altrettanto validi negli spazi vettoriali.

Proposizione 1.1 (l'elemento neutro rispetto a $+$ è unico). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ è unico, ovvero

$$\exists! \underline{0} \in V : \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}.$$

Proposizione 1.2. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = \underline{0}.$$

Proposizione 1.3. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-\underline{v}).$$

Esercizio 1.1. *Mostrare le tre proposizioni precedenti. (Suggerimento: per la prima si può procedere per assurdo, negando la tesi; per la seconda si può mostrare direttamente usando il fatto che $0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}$ e la terza si può mostrare direttamente usando la seconda.)*

Vediamo adesso qualche esempio di spazio vettoriale per fissare meglio i concetti.

Esempio 1.2 ($\mathbb{R}^2$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Consideriamo l'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: gli elementi di questo insieme sono coppie ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, v_2)$ con $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$. Possiamo definire le due operazioni $+$ e $\cdot$ come segue:

$$\underline{v} + \underline{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \end{pmatrix} \quad \alpha \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \alpha v_2 \end{pmatrix}$$

ed è possibile verificare che queste due operazioni soddisfano sempre le proprietà richieste dalla definizione 1.2

Esempio 1.3 ($\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Partendo dall'idea dell'esempio precedente, possiamo iterare il ragionamento e definire l'insieme $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}}$: gli elementi di questo

insieme sono n -tuple ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, \dots, v_n)$ con $v_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Possiamo definire la somma e il prodotto per scalare come fatto prima, sommando componente per componente e moltiplicando componente per componente:

$$\underline{v} + \underline{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}$$

$$\alpha \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \vdots \\ \alpha v_n \end{pmatrix}.$$

Esempio 1.4 ($\mathbb{C}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$). Analogamente a quanto fatto per $\mathbb{R}^n$, possiamo riadattare il ragionamento fatto per $\mathbb{R}^n$ ammettendo che le componenti delle n -tuple

ordinate siano numeri complessi, ovvero $\mathbb{C}^n \ni \underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ con $v_i \in \mathbb{C} \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Esempio 1.5 (le soluzioni di un'equazione differenziale lineare sono uno spazio vettoriale). Sia data un'equazione differenziale lineare di ordine n del tipo

$$\sum_i^n a_i y^{(i)}(x) = 0 \text{ con } a_i \in \mathbb{R}$$

allora possiamo mostrare che l'insieme delle soluzioni di questa equazione, denotato con V gode della struttura di spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ definendo le due operazioni come segue: prese due soluzioni $y_1, y_2 \in V$ allora poniamo

$$(y_1 + y_2)(x) = y_1(x) + y_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha y_1)(x) = \alpha y_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

e osserviamo che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono un elemento che è ancora una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Infatti

$$\sum_i^n a_i(y_1 + y_2)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i y_1^{(i)} + \sum_i^n a_i y_2^{(i)} = 0 + 0 = 0,$$

dove abbiamo usato il fatto che l'operazione di derivata è distributiva rispetto alla somma e il fatto che y_1, y_2 fossero soluzioni dell'equazione differenziale lineare, ovvero $\sum_i^n a_i y_j^{(i)} = 0$, con $j = 1, 2$. Similmente, per quanto riguarda il prodotto per scalare, si usa il fatto che le costanti non sono coinvolte nel processo di derivazione, dunque

$$\sum_i^n a_i(\alpha y_1)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i \alpha y_1^{(i)}(x) = \alpha \sum_i^n a_i y_1^{(i)}(x) = 0,$$

dove si è sempre usato il fatto che y_1 fosse una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Le proprietà richieste dalla definizione 1.2 sono banalmente verificabili.

Esempio 1.6 (spazio dei polinomi a coefficienti reali di grado $\leq n$ è uno spazio vettoriale). Sia dato l'insieme dei polinomi a coefficienti reali con grado $\leq n$ $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ su $\mathbb{R}$, allora possiamo definire le due operazioni come segue: presi due polinomi $p_1, p_2 \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ possiamo definire il seguente polinomio

$$(p_1 + p_2)(x) = p_1(x) + p_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha p_1)(x) = \alpha p_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Si può verificare che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono sempre un polinomio a coefficienti reali di grado $\leq n$: infatti se $p_1(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ e $p_2(x) = \sum_{i=1}^n b_i x^i$ con $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ allora

$$\begin{aligned} (p_1 + p_2)(x) &= \sum_{i=1}^n a_i x^i + \sum_{i=1}^n b_i x^i = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) x^i \\ (\alpha p_1)(x) &= \alpha \sum_{i=1}^n a_i x^i = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) x^i \end{aligned}$$

Esempio 1.7 (Uno spazio vettoriale è definito solamente conoscendo la legge interna ed esterna). Fissiamo come spazio vettoriale $V = \mathbb{R}^n$, che è chiaramente uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$, e definiamo le due operazioni $\oplus$ e $\odot$ come

$$\begin{aligned} \underline{v} \oplus \underline{w} &= \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 + 2 \\ \vdots \\ v_n + w_n + 2 \end{pmatrix} \\ \alpha \odot \underline{v} &= \alpha \odot (v_1, \dots, v_n) = \begin{pmatrix} \alpha v_1 - 2(1 - \alpha) \\ \alpha v_2 - 2(1 - \alpha) \\ \vdots \\ \alpha v_n - 2(1 - \alpha) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Si può verificare che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono sempre un elemento di V , e soddisfano le proprietà richieste dalla definizione 1.2 di spazio vettoriale. Ne deduciamo che uno spazio vettoriale è completamente determinato **solo** conoscendo le due operazioni $+$: $V \times V \rightarrow V$ e $\cdot$: $\mathbb{K} \times V \rightarrow V$, sebbene in questo spazio vettoriale non è il vettore $(0, \dots, 0)$ ad essere

l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$, ma il vettore $(-2, \dots, -2)$; tuttavia, è interessante notare come comunque valgano le proprietà dimostrate nella proposizione 1.2 (infatti, $0 \odot \underline{v} = \begin{pmatrix} 0v_1 - 2(1-0) \\ \vdots \\ 0v_n - 2(1-0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ \vdots \\ -2 \end{pmatrix}$) e nelle due successive mostrate.

1.2 Sottospazi

Siamo ora interessati a studiare dei sottoinsiemi di uno spazio vettoriale che siano a loro volta degli spazi vettoriali rispetto all'operazione di somma e di prodotto per scalare. I sottospazi più comuni che possiamo immaginare, come vedremo, sono le rette e i piani che abbiamo in $\mathbb{R}^3$ (le rette anche in $\mathbb{R}^2$): la potenza dell'approccio che svilupperemo è il fatto che potremo trattare oggetti, come gli iperpiani, come se fossero oggetti i nostri usuali piani.

Definizione 1.3 (sottospazio). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $W \subseteq V$ un sottoinsieme di V . Diremo che W è un **sottospazio vettoriale** se esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ rispetto alle operazioni $+$ e $\cdot$ definite su V .

Oss.: Ogni spazio vettoriale è un sottospazio di sé stesso, siccome è chiaro che $V \subseteq V$.

Proposizione 1.4. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale se e solo se

- ① $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, (\underline{v}, \underline{w} \in W) \implies \underline{v} + \underline{w} \in W;$
- ② $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\underline{v} \in W) \implies (\alpha \underline{v} \in W).$

Dimostrazione. Mostriamo le due implicazioni.

$\implies$: se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, allora per definizione esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, dunque le due implicazioni

$$\underline{v}, \underline{w} \in W \implies \underline{v} + \underline{w} \in W; \quad \underline{v} \in W \implies \alpha \underline{v} \in W;$$

sono sempre vere.

$\Leftarrow$: se valgono le due implicazioni, allora è chiaro che le due operazioni $+$ e $\cdot$ sono chiuse su W , dunque è sufficiente mostrare che valgono le proprietà richieste dalla definizione 1.2 di spazio vettoriale. Tuttavia, siccome queste valgono per ogni elemento di V , è chiaro che varranno anche per ogni elemento di W siccome $W \subseteq V$; dunque possiamo concludere che W è un sottospazio vettoriale di V . $\square$

Attenzione: da adesso in poi, per comodità di scrittura, non scriverò più esplicitamente l'operazione $\cdot$ per indicare il prodotto per scalare, ma mi limiterò a scrivere direttamente $\alpha \underline{v}$ sottintendendo il prodotto per scalare.

Definizione 1.4. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$, definiamo l'insieme delle combinazioni lineari di $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ come

$$\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n) = \left\{ \underline{v} \in V \mid \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \right\}$$

Proposizione 1.5. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Allora $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è un sottospazio vettoriale di V .

Proposizione 1.6. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Allora

$\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$.

Esercizio 1.2. *Mostrare le due proposizioni qua sopra.*

Possiamo generalizzare la definizione di Span di vettori ad insiemi di vettori arbitrari, ovvero

Definizione 1.5 (Span di un insieme). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$ un insieme, allora definiamo lo Span di A come

$$\text{Span}(A) = \left\{ \underline{v} \in V \mid \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \right\}.$$

Proposizione 1.7 (Span di un insieme è un sottospazio vettoriale). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$ un insieme. Allora $\text{Span}(A)$ è un sottospazio vettoriale.

Proposizione 1.8. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Se $A \subseteq V$ un sottospazio vettoriale di V , allora

$$\text{Span}(A) = A.$$

Proposizione 1.9. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Siano $A, B \subseteq V$ insiemi, allora

$$A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B).$$

Proposizione 1.10. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Siano $A, B \subseteq V$ insiemi, allora

$$A \subseteq B \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B).$$

Esercizio 1.3. *Mostrare le quattro proposizioni qua sopra.*

1.3 Vettori linearmente indipendenti

Un concetto fondamentale che ci aiuterà a capire meglio gli spazi vettoriali è il concetto di **vettori linearmente indipendenti**, che possiamo definire come segue:

Definizione 1.6 (vettori linearmente indipendenti). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Diremo che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti se l'equazione

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

ha come **unica** soluzione quella banale, ovvero $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = 0$

Perché siamo interessati a lavorare con i vettori linearmente indipendenti? La motivazione è semplice: le coordinate rispetto a tali vettori sono univoche, come mostriamo adesso

Proposizione 1.11. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ dei vettori linearmente indipendenti, allora se si ha che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \alpha'_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}_n \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = \alpha'_i$$

Dimostrazione. Portando tutti i termini a sinistra otteniamo una relazione equivalente,

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \alpha'_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}_n \iff (\alpha_1 - \alpha'_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n - \alpha'_n) \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma, per ipotesi, abbiamo che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti, dunque l'unica soluzione a quest'ultima equazione è quella banale, ovvero deve risultare che

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i - \alpha'_i = 0 \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = \alpha'_i,$$

ovvero la tesi. $\square$

Oss.: Essere vettori linearmente indipendenti **non** è una proprietà dei singoli vettori, ma una proprietà che hanno i vettori come insieme. Consiglio di guardare il prossimo esempio per chiarire meglio questo concetto

Esempio 1.8 ($\mathbb{R}^3$ "chiarificatore" di tutto il creato). Fissiamo $V = \mathbb{R}^3$ e consideriamo i vettori

$\underline{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\underline{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\underline{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$: si osserva che i vettori $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti siccome l'equazione

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_1 + 0 = 0 \\ 0 + \alpha_2 = 0 \\ 0 + 0 = 0 \end{cases},$$

dove abbiamo riscritto l'equazione trovata nel sistema di equazioni equivalente, da cui si vede che l'unica soluzione è $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. Similmente possiamo procedere osservando che $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_3$ ha come unica soluzione $\alpha_1 = \alpha_3 = 0$: questo ci dice che $\underline{v}_1, \underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti fra loro, così come $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_3$. Studiando anche $\underline{v}_2$ e $\underline{v}_3$ si osserva che anche questi sono linearmente indipendenti; deducendo così che i vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3$ sono *mutualmente* linearmente indipendenti (ovvero presi a due a due sono linearmente indipendenti). Tuttavia studiando la lineare indipendenza di tutti e tre i vettori assieme

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_1 + 0 + \alpha_3 = 0 \\ 0 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ 0 + 0 + \alpha_3 = 0 \end{cases},$$

da cui si consegue che

$$\begin{cases} \alpha_3 = -\alpha_1 \\ \alpha_2 = \alpha_1 \end{cases}$$

quindi se indichiamo l'incognita (ovvero i coefficienti $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) in maniera vettoriale, abbiamo

che i vettori appartenenti allo Span di $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ risolvono questa equazione (si parla di Span siccome

anche $\begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix}$ risolve l'equazione: inserite nell'equazione questi coefficienti se non ci credete!).

Oss.: Un vettore $\underline{v} \in V$ è linearmente indipendente se e solo se $\underline{v} \neq \underline{0}$ siccome la relazione

$$\alpha_1 \underline{0} = \underline{0}$$

è una relazione non banale che è vera $\forall \alpha_1 \in \mathbb{K}$. Se $\underline{v} \neq \underline{0}$ allora è chiaro che

$$\alpha \underline{v} = \underline{0} \implies \alpha = 0$$

siccome se procediamo per assurdo supponendo che $\alpha \neq 0$ e $\alpha \underline{v} = \underline{0}$, allora possiamo vedere che $\underline{v} = 1_{\mathbb{K}} \underline{v} = (\alpha^{-1} \alpha) \underline{v} = \alpha^{-1} (\alpha \underline{v}) = \alpha^{-1} \underline{0} = \underline{0}$, che è un assurdo con l'ipotesi che $\underline{v} \neq \underline{0}$.

Come fatto nel caso dell'insieme delle combinazioni lineari di un insieme, possiamo andare a parlare di insiemi linearmente indipendenti.

Definizione 1.7 (insieme linearmente indipendente). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$. Diremo che A è un insieme linearmente indipendente se presi $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A$, allora $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti. Diremo, invece, che A è linearmente dipendente se $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A$ linearmente dipendenti.

Oss.: Questa definizione è estendibile anche a insiemi di vettori infiniti, oggetto che tratteremo brevemente nel momento in cui parleremo degli spazi a dimensione infinita.

1.4 Base di uno spazio vettoriale

Definizione 1.8 (insieme di generatori). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che un insieme di vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$ è un insieme di generatori se $\forall \underline{v} \in V \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n,$$

oppure equivalentemente diremo che $\text{Span}(\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}) = V$.

Definizione 1.9 (spazio vettoriale finitamente generato). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che questo è finitamente generato se contiene un numero finito di generatori.

Come fatto prima possiamo estendere la nozione appena data ad insiemi infiniti di vettori.

Definizione 1.10. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che $A \subseteq V$ è un insieme di generatori di V se $\text{Span}(A) = V$.

Possiamo adesso parlare di basi di uno spazio vettoriale, che adesso andiamo a definire e, successivamente, andremo a mostrare che ogni spazio vettoriale finitamente generato possiede una base. Tutte le nozioni che abbiamo dato finora servono per poter arrivare a parlare di basi: queste ultime sono in grado di agevolare notevolmente lo studio degli spazi vettoriali siccome, fissandone una, vedremo che è sufficiente lavorare sulle coordinate dei vettori per trattare gli spazi vettoriali.

Definizione 1.11 (Base di uno spazio vettoriale). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che $\mathcal{B} \subseteq V$ è una base di V se

- ① $\mathcal{B}$ è un insieme di generatori di V ;
- ② $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente.

Esempio 1.9. Di notevole importanza sono le basi canoniche in $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ della forma

$$\underline{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \underline{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \underline{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esercizio 1.4. *Mostrare che $V = \mathbb{R}[x]$ non può avere una base finita (dove $\mathbb{R}[x]$ è lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali dove la somma è definita come $(a+b)(x) = a(x) + b(x)$ e $(\alpha \cdot a)(x) = \alpha a(x)$)*

Abbiamo visto nella proposizione 1.11 che le coordinate rispetto a dei vettori linearmente indipendenti sono univoche, quindi rispetto ad una base possiamo dire che ogni vettore appartenente allo spazio vettoriale studiato ha delle coordinate univoche. Osserviamo nel dettaglio questo fatto: considerando $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ e presa $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ base di V abbiamo, per quanto detto, che $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ quindi ad ogni vettore $\underline{v}$ possiamo assegnare **biuni-**

vocamente il vettore $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = [\underline{v}]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ (si è introdotta la notazione $[\underline{v}]_{\mathcal{B}}$ per indicare il vettore contenente le coordinate) e notiamo che vale la seguente proposizione

Proposizione 1.12. Le coordinate rispetto ad una base $\mathcal{B}$ di uno spazio vettoriale V sul campo $\mathbb{K}$ si comportano "bene" rispetto alla legge interne ed esterna, ovvero

$$\begin{aligned} \forall \underline{v}, \underline{w} \in V, [\underline{v} + \underline{w}]_{\mathcal{B}} &= [\underline{v}]_{\mathcal{B}} + [\underline{w}]_{\mathcal{B}} \\ \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, [\alpha \underline{v}]_{\mathcal{B}} &= \alpha [\underline{v}]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Dimostrazione. Siano $\underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n$ e $\underline{w} = y_1 \underline{v}_1 + \dots + y_n \underline{v}_n$ e osserviamo che

$$\underline{v} + \underline{w} = (x_1 + y_1) \underline{v}_1 + \dots + (x_n + y_n) \underline{v}_n \implies [\underline{v} + \underline{w}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = [\underline{v}]_{\mathcal{B}} + [\underline{w}]_{\mathcal{B}}.$$

Preso $\alpha \in \mathbb{K}$ allora osserviamo che $\alpha \underline{v} = \alpha x_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha x_n \underline{v}_n \implies [\alpha \underline{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \alpha [\underline{v}]_{\mathcal{B}}$ □

Definizione 1.12 (isomorfismo di spazi vettoriali). Presi $(V, \mathbb{K}, +_V, \cdot_V)$ e $(W, \mathbb{K}, +_W, \cdot_W)$ spazi vettoriali sul campo $\mathbb{K}$, chiamiamo isomorfismo di spazio vettoriale V, W una corrispondenza biunivoca $f : V \rightarrow W$ che sussiste fra i due spazi vettoriali che rispetta la legge di composizione interna ed esterna, ovvero

$$\begin{aligned} \forall \underline{v}, \underline{w} \in V, f(\underline{v} +_V \underline{w}) &= f(\underline{v}) +_W f(\underline{w}) \\ \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, f(\alpha \cdot_V \underline{v}) &= \alpha \cdot_W f(\underline{v}). \end{aligned}$$

Con la proposizione precedente, possiamo affermare quindi che fissata una base $\mathcal{B}$ di V esiste un isomorfismo di spazi vettoriali fra V e $\mathbb{K}^n$.

Come accennato, adesso mostreremo che per gli spazi vettoriali finitamente generati è sempre possibile trovare una base.

Teorema 1.1 (Esistenza di una base). Ogni spazio vettoriale finitamente generato ha una base

E' necessario enunciare e dimostrare qualche risultato preparatorio: per snellire gli enunciati, assumeremo sempre di essere in un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ finitamente generato.

Definizione 1.13 (insieme linearmente indipendente massimale). Sia $A \subseteq V$, diremo che A è linearmente indipendente massimale se $\forall B \subseteq V$ con $A \subset B \implies B$ è linearmente dipendente.

Lemma 1.1.1. $A \subseteq V$ è una base $\iff A$ è un insieme linearmente massimale

Dimostrazione.

$\implies$: è chiaro che se A è base allora preso $\underline{v} \in V = \text{Span}(A)$ (per definizione di base) ma $\underline{v} \notin A$ allora sappiamo che $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, ma allora

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n - \underline{v} = \underline{0},$$

che si tratta di una relazione non banale dell'insieme $B = A \cup \{\underline{v}\}$, che pertanto è linearmente dipendente. Dall'arbitrarietà di $\underline{v}$ segue che ogni insieme B tale che $A \subset B \subseteq V$ è linearmente dipendente, quindi A è linearmente indipendente massimale.

$\impliedby$: supponiamo per assurdo che A sia linearmente indipendente massimale ma non sia una base. In tal caso, siccome A per ipotesi è linearmente indipendente, vuol dire che $\text{Span}(A) \neq V$, quindi $V \setminus \text{Span}(A) \neq \emptyset$: preso $\underline{v} \in V \setminus \text{Span}(A)$ allora se consideriamo l'insieme $A \cup \{\underline{v}\}$ si ha che dev'essere ancora linearmente indipendente, siccome altrimenti avrei una relazione non banale che mi porterebbe ad un assurdo: infatti, se studiamo l'equazione nel caso non banale

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \alpha \underline{v} = \underline{0}$$

distinguiamo due possibili casi:

$\alpha = 0$: in tal caso

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma ciò è un assurdo perché implicherebbe che A è linearmente dipendente.

$\alpha \neq 0$: in tal caso

$$\begin{aligned} \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \alpha \underline{v} = \underline{0} &\iff \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = -\alpha \underline{v} \iff \underline{v} = -\frac{\alpha_1}{\alpha} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha} \underline{v}_n \\ &\iff \underline{v} \in \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n). \end{aligned}$$

ma ciò è un assurdo siccome avevamo preso $\underline{v} \in V \setminus \text{Span}(A)$.

Segue allora che $A \cup \{\underline{v}\}$ è ancora linearmente indipendente, quindi A non era linearmente indipendente massimale, siccome abbiamo trovato un insieme $B = A \cup \{\underline{v}\}$ tale che $A \subset B \subseteq V$ che è ancora linearmente indipendente. $\square$

Definizione 1.14 (insieme di generatori minimale). Sia $A \subseteq V$, diremo che A è un insieme minimale di generatori se $\forall B \subseteq V$ con $B \subset A \implies \text{Span}(B) \neq V$.

Lemma 1.1.2. A è base $\iff A$ è un insieme minimale di generatori

Per mostrare questo risultato avremo bisogno del seguente lemma

Lemma 1.1.3. Se $\underline{v} \in A$ ma $\underline{v} \in \text{Span}(A) \setminus \{\underline{v}\}$ (ovvero possiamo scrivere $\underline{v}$ come combinazione lineare di altri vettori di A diversi da $\underline{v}$) allora

$$\text{Span}(A) = \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$$

Dimostrazione. Come fatto per altre dimostrazioni, è sufficiente mostrare che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$ e che $\text{Span}(A) \supseteq \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$. Ora l'inclusione $\supseteq$ è ovvia: è sufficiente usare la proposizione 1.10 (lasciata per esercizio), osservando che $A \setminus \{\underline{v}\} \subseteq A \implies \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\}) \subseteq \text{Span}(A)$, mentre per l'altra inclusione è sufficiente osservare che, per ipotesi, abbiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque preso $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ abbiamo che $\exists \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K} : \underline{w} = \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m + \beta \underline{v}$ (se $\underline{v}$ non è necessario per "generare" $\underline{w}$, si può chiaramente porre $\beta = 0$ nell'espressione qua di fianco, quindi la costruzione fatta per $\underline{w}$ rimane valida per ogni vettore in $\text{Span}(A)$). Ma allora

$$\underline{w} = \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m + \beta \underline{v} = \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m + \beta(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) \in \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\}),$$

e dall'arbitrarietà di $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ segue che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$ $\square$

Dimostrazione del lemma 1.1.2.

$\Leftarrow$: per ipotesi abbiamo che A è un insieme minimale di generatori, quindi è sufficiente mostrare che A è linearmente indipendente: per fare questo procediamo per assurdo supponendo che A non sia linearmente indipendente, pertanto sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ con $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ non tutti uguali a $0_{\mathbb{K}}$ tali che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0} \implies \underline{v}_n = -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \underline{v}_{n-1},$$

dove abbiamo supposto, senza perdita di generalità¹, che $\alpha_n \neq 0$. Ma allora abbiamo espresso $\underline{v}_n \in A$ in funzione di altri vettori di A , quindi usando il risultato del lemma precedente abbiamo che

$$\text{Span}(A) = \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}_n\}) \stackrel{\text{per ip.}}{=} V$$

ma questo è un assurdo perché abbiamo trovato un insieme $B = A \setminus \{\underline{v}_n\} \subset A$ che genera tutto lo spazio vettoriale, quindi A non è un insieme minimale di generatori e dunque otteniamo un assurdo.

$\Rightarrow$: dobbiamo mostrare che A è un insieme minimale di generatori. Procedendo per assurdo, se neghiamo la definizione di insieme minimale di generatori abbiamo che $\exists B \subset A : \text{Span}(B) = V$, pertanto se consideriamo $\underline{v} \in A \setminus B$ abbiamo che $\underline{v} \in \text{Span}(B)$ (siccome B insieme di generatori), quindi abbiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in B : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, pertanto

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \implies \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n - \underline{v} = \underline{0}$$

e questa si tratta di una relazione non banale di vettori appartenenti in $A \implies A$ non è linearmente indipendente, che rappresenta un assurdo! $\square$

Siamo pronti per mostrare che ogni spazio vettoriale a dimensione finita possiede una base.

Dimostrazione del teorema 1.1. Il caso banale della dimostrazione è chiaramente rappresentato da $V = \{\underline{0}\}$. Supponendo che $V \neq \{\underline{0}\}$, abbiamo che esiste $A = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \subseteq V$ tale che $\text{Span}(A) = V$. Consideriamo il seguente insieme

$$\mathcal{M} = \{B \subseteq A : B \text{ è linearmente indipendente}\},$$

dove è chiaro che $\mathcal{M} \neq \emptyset$ siccome A contiene sicuramente un vettore $\underline{v} \neq \underline{0}$ e chiaramente $\{\underline{v}\}$ è un insieme linearmente indipendente. Consideriamo $B \in \mathcal{M}$ linearmente indipendente "massimale" (di fatto l'insieme in $\mathcal{M}$ con cardinalità massima) dentro A , ovvero preso $\underline{v}' \in A \setminus B$ abbiamo che

¹infatti è chiaro che ci deve essere un qualche vettore con coefficiente diverso da 0 siccome stiamo supponendo che A non sia linearmente indipendente

$B \cup \{\underline{v}'\}$ è linearmente dipendente. Mostriamo che B genera lo spazio vettoriale: supponiamo, senza perdita di generalità², che $B = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ con $k \leq n$ e facciamo vedere che tutti gli altri vettori in A appartengono allo $\text{Span}(B)$, distinguendo due casi possibili che analizziamo separatamente.

$k = n$: in tal caso $B = A \implies \text{Span}(A) = \text{Span}(B) = V$.

$k < n$: in tal caso mostriamo che $\underline{v}_i \in \text{Span}(B)$, notando che se

- $i \leq k$: è ovvio;
- $i > k$: sappiamo, per costruzione di B , che $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ è linearmente indipendente; mentre $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k, \underline{v}_i$ è linearmente dipendente, dunque $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_i \in \mathbb{K}$ non tutti uguali a 0 tali che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \alpha_i \underline{v}_i = \underline{0} \iff \alpha_i \underline{v}_i = -\alpha_1 \underline{v}_1 - \dots - \alpha_n \underline{v}_n.$$

Osserviamo che si deve avere chiaramente che $\alpha_i \neq 0$: se così non fosse l'equazione risulterebbe

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

ovvero una relazione non banale fra i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ che, per costruzione, sono linearmente indipendenti. Ne segue allora che

$$\underline{v}_i = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_i} \underline{v}_n \implies \underline{v}_i \in \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n),$$

dunque $A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$ (in virtù della proposizione 1.9), dunque $\text{Span}(B) = V \implies B$ è una base.

□

Oss.: Osserviamo che l'esistenza di B massimale in $\mathcal{M}$ è assicurata dall'esercizio 1.7.

Esercizio 1.5. Sia A un insieme linearmente indipendente, mostrare che $\forall A' \subseteq A, A'$ è linearmente indipendente.

Esercizio 1.6. Sia A un insieme di generatori, allora $\forall A' \supseteq A, A'$ è insieme di generatori

Vogliamo adesso mostrare che due basi possiedono lo stesso numero di elementi, consentendoci quindi di caratterizzare la "finitezza" di uno spazio in base al numero di elementi che possiede una base³

Teorema 1.2. Due basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ hanno lo stesso numero di elementi

Oss.: La dimostrazione proposta sotto è "valida" (con qualche piccolo riarrangiamento e prendendo per buono l'assioma della scelta, a cui si rimanda l'appendice B) anche per spazi vettoriali non finitamente generati, tuttavia la tesi è diversa: non si parla più di stesso numero di elementi, bensì diremo che le basi hanno la medesima cardinalità.

Per effettuare questa dimostrazione abbiamo bisogno di qualche lemma preparatorio

Lemma 1.2.1 (algoritmo dello scambio). Sia $A = \{\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_k\}$ linearmente indipendente e sia $\underline{w} \in \text{Span}(A)$, dunque

$$\underline{w} = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n,$$

e, supponendo che $\alpha_n \neq 0$, poniamo l'insieme $A' = (A \setminus \{\underline{u}_n\}) \cup \underline{w}$. Allora abbiamo che

²a meno di riarrangiare i vettori

³non è tanto diverso da come si procede a definire la cardinalità per insiemi finiti: preso un insieme A diciamo che ha cardinalità n se è possibile individuare una bigezione con $\mathbb{E}_n = \{1, \dots, n\}$; in questo caso diremo che uno spazio ha dimensione n se le sue basi hanno n vettori.

- ① A' è linearmente indipendente;
- ② $\text{Span}(A) = \text{Span}(A')$.

Dimostrazione. Mostriamo la ①: per ipotesi abbiamo che

$$\underline{w} = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n,$$

dunque se studiamo l'equazione per l'indipendenza lineare fra i vettori $\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_{n-1}, \underline{w}$ abbiamo che

$$\beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_{n-1} \underline{u}_{n-1} + \beta_n \underline{w} = \underline{0} \iff \beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_{n-1} \underline{u}_{n-1} + \beta_n (\alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n) = \underline{0},$$

ma allora abbiamo che

$$(\beta_1 + \beta_n \alpha_1) \underline{u}_1 + \dots + (\beta_{n-1} + \beta_n \alpha_{n-1}) \underline{u}_{n-1} + \beta_n \alpha_n \underline{u}_n = \underline{0},$$

da cui la lineare indipendenza dei vettori $\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_n$ ci dice che tutti i coefficienti devono essere nulli, portandoci al seguente sistema

$$\begin{cases} \beta_i + \beta_n \alpha_i = 0_{\mathbb{K}} \quad \forall i \in \{1, \dots, n-1\} \\ \beta_n \alpha_n = 0_{\mathbb{K}} \end{cases}.$$

Soffermandoci sull'ultima equazione del sistema, sappiamo per la legge di annullamento del prodotto, che gli unici casi possibili sono:

- $\alpha_n = 0_{\mathbb{K}}$, ma ciò va contro l'ipotesi che α_n fosse diverso da 0;
- $\beta_n = 0_{\mathbb{K}}$, e qua non abbiamo problemi.

Riprendendo il sistema, allora segue che

$$\beta_i + \beta_n \alpha_i = \beta_i = 0_{\mathbb{K}} \quad \forall i \in \{1, \dots, n-1\},$$

quindi l'equazione

$$\beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_{n-1} \underline{u}_{n-1} + \beta_n \underline{w} = \underline{0}$$

ha solo soluzioni banali.

Mostriamo adesso la ②: è chiaro che $A' = (A \setminus \{\underline{u}_k\}) \cup \{\underline{w}\} \subseteq \text{Span}(A) \implies \text{Span}(A') \subseteq \text{Span}(A)$ e siccome $\underline{u}_k \in \text{Span}(A')$ allora $A \subseteq \text{Span}(A') \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A')$, dove abbiamo usato la proposizione 1.9. $\square$

Lemma 1.2.2. Sia $A = \{\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_k\}$ linearmente indipendente e sia $B = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_h\}$ linearmente indipendente con $B \subseteq \text{Span}(A)$, allora $\exists \mathcal{B}' \subseteq A$ con $\#\mathcal{B}' = \#B = h$ tale che

- ① $A' = (A \setminus \mathcal{B}') \cup B$ è ancora linearmente indipendente;
- ② $\text{Span}(A) = \text{Span}(A')$

Dimostrazione. Posso applicare il lemma precedente a $\underline{w}_1$ (che sappiamo essere $\neq \underline{0}$ siccome B è linearmente indipendente) visto che $B \subseteq \text{Span}(A)$: osserviamo che

$$\underline{w}_1 = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_k \underline{u}_k \quad (\text{dove chiaramente si deve avere che qualche } \alpha_i \neq 0 \text{ siccome } \underline{w}_1 \neq \underline{0}).$$

Per semplicità (e senza perdita di generalità⁴) supponiamo che $\alpha_1 \neq 0 \implies$ posso scambiare $\underline{u}_1$ con $\underline{w}_1$. Quindi $A \rightarrow A_1 = \{\underline{w}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_k\}$ e itero nuovamente il procedimento, scambiando un vettore di A_1 con un altro di $\bar{B}$ (diverso da $\underline{w}_1$ chiaramente): questo è possibile siccome

$$\underline{w}_2 = \alpha'_1 \underline{w}_1 + \alpha'_2 \underline{u}_2 + \dots + \alpha'_n \underline{u}_n,$$

e deve risultare che almeno uno fra gli $\alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ sia diverso da zero siccome altrimenti la relazione appena scritta diverrebbe

$$\underline{w}_2 = \alpha'_1 \underline{w}_1 \implies \alpha'_1 \underline{w}_1 - \underline{w}_2 = \underline{0}$$

quindi i vettori $\underline{w}_1, \underline{w}_2$ sarebbero linearmente dipendenti, contro l'ipotesi che B fosse linearmente indipendente. Sempre per semplicità e senza perdita di generalità, possiamo scambiare $\underline{w}_2$ con $\underline{u}_2$, ottengo così $A_2 = \{\underline{w}_1, \underline{w}_2, \dots, \underline{u}_n\}$: posso così iterare il ragionamento come fatto sopra con $\underline{w}_1$ e $\underline{w}_2$, sostituendo alcuni vettori ("opportuni") in A con quelli di B . $\square$

Corollario 1.2.1. Dalle ipotesi del lemma precedente segue che $\#B \leq \#A$.

Dimostrazione del teorema 1.2. Prese due basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$, se usiamo il corollario appena mostrato con $A = \mathcal{B}$ e $B = \mathcal{B}'$ abbiamo che $\#\mathcal{B}' \leq \#\mathcal{B}$ e, scambiando il ruolo di $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$, si ottiene che $\#\mathcal{B} \leq \#\mathcal{B}'$, da cui $\#\mathcal{B} = \#\mathcal{B}'$. $\square$

Oss.: Se le basi fossero infinite, l'ultimo passaggio appena effettuato (eguagliare le cardinalità) richiederebbe il teorema di Cantor-Bernstein-Schröder che richiede l'assioma della scelta.

Possiamo adesso "caratterizzare" la dimensione di uno spazio, siccome abbiamo appena mostrato che tutte le basi hanno lo stesso numero di elementi.

Definizione 1.15 (dimensione). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Chiamo dimensione di V su $\mathbb{K}$ il numero di elementi posseduti da una base.

Oss.: La dimensione di uno spazio vettoriale dipende anche dal tipo di campo su cui viene definito (e da qui il motivo per cui sopra ho specificato "dimensione di V su $\mathbb{K}$ "). Per fare un esempio: $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale 1-dimensionale se visto come uno spazio vettoriale sul campo dei numeri complessi, se invece visto come uno spazio vettoriale sul campo reale è 2-dimensionale.

Esercizio 1.7. Mostrare che da ogni insieme di generatori $A \subseteq V$ è possibile estrarre una base

Esercizio 1.8. Mostrare che ogni insieme di vettori linearmente indipendenti può essere esteso a base di V

Esercizio 1.9. Mostrare che se $Z \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, allora

$$\dim(Z) \leq \dim(V)$$

e se $\dim(Z) = \dim(V) \iff V = Z$.

Alla luce di quanto mostrato, possiamo concludere che se lavoriamo in uno spazio vettoriale V sul campo $\mathbb{K}$ di dimensione n valgono i seguenti fatti:

- ① $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ sono linearmente indipendenti $\iff k \leq n$;
- ② ogni sistema di n vettori linearmente indipendenti è una base;
- ③ ogni sistema con $\geq n$ vettori è linearmente dipendente;
- ④ $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_h$ genera V se $h \geq n$;
- ⑤ $n - 1$ (o meno) vettori non generano V ;
- ⑥ ogni sistema di n vettori che generano V è una base.

⁴sempre a meno di riarrangiare i termini

1.5 Somma di sottospazi

In questa sezione ci soffermiamo nuovamente sui sottospazi: in particolar modo vogliamo studiare come si comporta la "somma" (che dobbiamo ancora definire) di questi in termini di dimensioni e altre proprietà. L'esempio di sottospazio per eccellenza è chiaramente un piano: la bellezza di Geometria è che svilupperemo un modo per trattare ugualmente sia dei piani "veri e propri" (ovvero quelli euclidei, su cui insistiamo fin da quando siamo piccoli) fino a "piani" di polinomi.

Esercizio 1.10. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ di dimensione n e sia $W \subseteq V$ uno spazio vettoriale. Mostrare che $\dim(W) \leq \dim(V)$ e $\dim(W) = \dim(V) \iff V = W$.

Dati 2 sottospazi vettoriali U e W di $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ spazio vettoriale ci poniamo due domande:

- ① $U \cap W$ è un sottospazio vettoriale?
- ② $U \cup W$ è un sottospazio vettoriale?

Possiamo rispondere alla prima in maniera abbastanza semplice: si osserva che $\underline{0} \in U \cap W$ (quindi è sicuramente un insieme non vuoto), inoltre preso $\underline{v} \in U \cap W$ abbiamo che $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha \underline{v} \in U$ e $\alpha \underline{v} \in W$, quindi $\alpha \underline{v} \in U \cap W$; ragionando similmente abbiamo che $\forall \underline{v}, \underline{w} \in U \cap W, \underline{v} + \underline{w} \in U$ e $\underline{v} + \underline{w} \in W$, dunque $\underline{v} + \underline{w} \in U \cap W$. Si conclude, tramite la proposizione 1.4, che $U \cap W$ è un sottospazio vettoriale.

Per quanto riguarda la seconda cosa possiamo dire? Vale la seguente proposizione

Proposizione 1.13. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano U e W due sottospazi vettoriali di V , allora si ha che

$$U \cup W \text{ è un sottospazio vettoriale } \iff U \subseteq W \text{ (o viceversa)}$$

Dimostrazione.

$\Leftarrow$: è chiaro siccome se $U \subseteq W$ allora $U \cup W = W$.

$\Rightarrow$: supponiamo per assurdo che uno non sia contenuto nell'altro, allora preso $\underline{u} \in U \setminus W$ e $\underline{w} \in W \setminus U$ poniamo $\underline{v} = \underline{u} + \underline{w}$. Mostriamo che tale vettore non può appartenere a $U \cup W$: si osserva che per definizione $\underline{v} \in U$ oppure $\underline{v} \in W$ ma se $\underline{v} \in U \implies \underline{v} - \underline{u} \in U$ (siccome stiamo usando la legge di composizione interna prendendo vettori di U), ma $\underline{v} - \underline{u} = \underline{w} \in W \implies$ assurdo! Se invece $\underline{v} \in W \implies \underline{v} - \underline{w} \in W$ (sempre per il solito motivo, ma stavolta usando vettori di W), ma $\underline{v} - \underline{w} = \underline{u} \in U \implies$ assurdo! $\square$

Quindi non ha senso lavorare su $U \cup W$ siccome gli strumenti che abbiamo sviluppato valgono solo per spazi vettoriali. Sappiamo però qual'è il più piccolo sottospazio che contiene $U \cup W$ (vedere esercizio 1.2), ovvero $\text{Span}(U \cup W)$. Per ovviare a questo problema, si definisce la "somma" di sottospazi nella seguente maniera

Definizione 1.16 (Somma di sottospazi). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia U, W due sottospazi vettoriali; definiamo la somma di U e W nella seguente maniera

$$U + W = \{ \underline{v} \in V \mid \underline{v} = \underline{u} + \underline{w} \mid \underline{u} \in U, \underline{w} \in W \}$$

Proposizione 1.14. $U + W$ è un sottospazio vettoriale ed è uguale a $\text{Span}(U \cup W)$

Dimostrazione. Prendiamo $\underline{v}, \underline{v}' \in U + W$: per ipotesi sappiamo che $\exists \underline{u}, \underline{u}' \in U, \underline{w}, \underline{w}' \in W$ tali che $\underline{v} = \underline{u} + \underline{w}, \underline{v}' = \underline{u}' + \underline{w}'$, da cui si ha che

$$\underline{v} + \underline{v}' = (\underline{u} + \underline{w}) + (\underline{u}' + \underline{w}') = (\underbrace{\underline{u} + \underline{u}'}_{\in U}) + (\underbrace{\underline{w} + \underline{w}'}_{\in W}) \in U + W$$

dove l'appartenenza a $U + W$ nell'ultimo passaggio è dovuta al fatto che abbiamo trovato 2 vettori appartenenti, rispettivamente, a U e W che "danno" $\underline{v} + \underline{v}'$. Abbiamo mostrato che $\forall \underline{v}, \underline{v}', (\underline{v}, \underline{v}' \in U+W) \implies \underline{v} + \underline{v}' \in U+W$ e, similmente, si mostra che $\underline{v} = \underline{u} + \underline{w} \implies \alpha \underline{v} = \alpha \underline{u} + \alpha \underline{w} \in U+W$. Concludiamo allora, per la proposizione 1.4, che $U + W$ è sottospazio.

Per quanto riguarda l'ultima cosa da mostrare, è chiaro che il sottospazio dato da $\text{Span}(U \cup W)$ deve contenere tutti i vettori della forma $\underline{u} + \underline{w}$, con $\underline{u} \in U$ e $\underline{w} \in W$, quindi è chiaro che contiene $U+W$, dunque abbiamo che $U + W \subseteq \text{Span}(U \cup W)$. Ma è altrettanto chiaro che $U \cup W \subseteq U + W$ (infatti ogni vettore di U può essere scritto come $\underline{u} = \underline{u} + \underline{0}$) dunque, in virtù dell'esercizio 1.3, abbiamo

che $\text{Span}(U \cup W) \subseteq \text{Span}(U + W)$; quindi, in definitiva, si ha che $\text{Span}(U \cup W) = \text{Span}(U + W)$. Sempre dall'esercizio 1.3 sappiamo che nel caso di un sottospazio W abbiamo che $W = \text{Span}(W)$, pertanto $\text{Span}(U + W) = U + W = \text{Span}(U \cup W)$, ottenendo così l'asserto che intendevamo dimostrare. $\square$

Definizione 1.17 (Somma diretta di sottospazi). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $U, W \subseteq V$ sottospazi vettoriali; diremo che il sottospazio Z è la somma diretta di U, W se

$$\textcircled{1} \quad Z = U + W$$

$$\textcircled{2} \quad U \cap W = \{\underline{0}\}$$

e si scrive $Z = U \oplus W$.

Proposizione 1.15. se $Z = U \oplus W$ allora ogni vettore $\underline{v} \in Z$ si scrive in maniera univoca, ovvero

$$\forall \underline{v} \in Z, \exists! \underline{u}, \underline{w} : \underline{v} = \underline{u} + \underline{w}$$

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista un vettore $\underline{v}$ che non può essere scritto in maniera univoca, ovvero $\exists \underline{u}, \underline{u}' \in U, \underline{w}, \underline{w}' \in W$ tali che

$$\underline{v} = \underline{u} + \underline{w} = \underline{u}' + \underline{w}', \implies \underline{u} + \underline{w} = \underline{u}' + \underline{w}',$$

ma allora

$$\frac{\underline{u} - \underline{u}'}{\in U} = \frac{\underline{w} - \underline{w}'}{\in W},$$

quindi abbiamo necessariamente (siccome a sinistra abbiamo "qualcosa" che appartiene a U e a destra "qualcosa" che appartiene a W) che i due membri siano uguali ad un vettore appartenente a $U \cap W$, che sappiamo contenere solo il vettore nullo $\underline{0}$, permettendoci quindi di dire che

$$\begin{cases} \underline{u} - \underline{u}' = \underline{0} \\ \underline{w} - \underline{w}' = \underline{0} \end{cases} \implies \begin{cases} \underline{u} = \underline{u}' \\ \underline{w} = \underline{w}' \end{cases} ,$$

ottenendo così l'asserto. $\square$

Esercizio 1.11. Vale anche il viceversa della proposizione, ovvero se $Z = U + W$ e $\forall \underline{v} \in Z, \exists! \underline{u} \in U, \underline{w} \in W : \underline{v} = \underline{u} + \underline{w}$ allora

$$Z = U \oplus W$$

Suggerimento: è chiaro che la nostra tesi, siccome Z è già somma di U e W , è equivalente a far vedere che $U \cap W = \{\underline{0}\}$, da cui si può procedere per assurdo facendo vedere che la scrittura non è più univoca.

Esercizio 1.12. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e consideriamo $A = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \subseteq V$ linearmente indipendente. Mostrare che decomponendo $A = A' \cup A''$ con $A' \cap A'' = \emptyset$ allora

$$\text{Span}(A) = \text{Span}(A') \oplus \text{Span}(A'')$$

Mostriamo adesso il seguente teorema che ci permette di quantificare le dimensioni della somma di un sottospazio con un altro. Questo ci consente, in linea di principio, di rispondere alla domanda "Quand'è che la somma diretta di due sottospazi generano tutto lo spazio?", siccome questo teorema permette di determinare la dimensione dello spazio risultante

Teorema 1.3 (formula di Grassmann). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, sia $Z, U \subseteq V$ due sottospazi vettoriali. Allora

$$\dim(Z + U) = \dim(Z) + \dim(U) - \dim(Z \cap U).$$

Dimostrazione. Sappiamo che esiste una base di $U \cap Z$ (siccome è uno spazio vettoriale, essendo sottospazio) dunque siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m$ una base di tale spazio. Possiamo allora completarla a base di Z (essendo dei vettori linearmente indipendenti), pertanto sia $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m, \underline{v}'_{m+1}, \dots, \underline{v}'_q\}$ una base di Z ; similmente, possiamo completare gli stessi vettori come base di $\bar{Z}$, dunque sia $\mathcal{B}' = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m, \underline{v}''_{m+1}, \dots, \underline{v}''_n\}$. Consideriamo quindi $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}'$ e mostriamo che sono linearmente indipendenti: sia

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i + \sum_{i=m+1}^q \alpha'_i \underline{v}'_i + \sum_{i=m+1}^n \alpha''_i \underline{v}''_i = \underline{0}, \quad (*)$$

poniamo $\underline{x} = \underbrace{\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i}_{\in U \cap Z \subseteq U} + \underbrace{\sum_{i=m+1}^q \alpha'_i \underline{v}'_i}_{\in U}$ dunque $\underline{x} \in U$ (siccome combinazione lineare di vettori di U).

Osserviamo che

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i + \sum_{i=m+1}^q \alpha'_i \underline{v}'_i = \underline{x} = - \sum_{i=m+1}^n \alpha''_i \underline{v}''_i$$

dove si è usata la (*) e osserviamo che l'ultimo termine è una combinazione di termini $\in Z$, pertanto segue che $\underline{x} \in Z \cap U$ necessariamente. Tuttavia la combinazione di coefficienti in U è unica e, siccome appartiene all'intersezione, si deve avere che i coefficienti α'_i devono essere nulli (siccome appartiene all'intersezione fra $U \cap Z$) e, ripetendo lo stesso ragionamento ponendo

$\underline{y} = \underbrace{\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i}_{\in U \cap Z \subseteq Z} + \underbrace{\sum_{i=m+1}^n \alpha''_i \underline{v}''_i}_{\in Z}$, si ottiene che i coefficienti α''_i sono tutti nulli, pertanto:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i = \underline{0},$$

ma essendo i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m$ linearmente indipendenti si ottiene che i coefficienti α_i siano tutti nulli, dunque sono linearmente indipendenti. Segue che $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}'$ è linearmente indipendente ed è chiaro che generi lo spazio $U + Z$: se prendiamo $\underline{v} \in U + Z$ allora $\exists \underline{u} \in U, \underline{z} \in Z : \underline{v} = \underline{u} + \underline{z}$, ma $\underline{u} \in \text{Span}(\mathcal{B}), \underline{z} \in \text{Span}(\mathcal{B}')$. Abbiamo che la dimensione di questo spazio è dunque pari a

$$\dim(U + Z) = q + n - m = \dim(U) + \dim(Z) - \dim(U \cap Z),$$

dove abbiamo sottratto m perché viene già contato una volta all'interno di q o n . □

Corollario 1.3.1. Se U e Z sono in somma diretta allora

$$\dim(U + Z) = \dim(U) + \dim(Z)$$

Dimostrazione. Si ha che $U \cap Z = \{\emptyset\}$, dunque

$$\dim(U \cap Z) = 0,$$

pertanto

$$\dim(U + Z) = \dim(U) + \dim(Z).$$

□

Matrici e applicazioni lineari

Vogliamo adesso introdurre le matrici: queste risultano molto utili per le loro incredibili applicazioni. In primis, come possiamo caratterizzare le matrici? In primo luogo possiamo dire che sono un "modo" per organizzare dei numeri: infatti se consideriamo la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$$

si può "visualizzare" come il vettore colonna $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix}$. Andiamo tuttavia con ordine: soffermiamoci

sulle matrici di dimensione 2×2 a coefficienti reali, osservando che possiamo introdurre sullo spazio delle matrici la struttura di spazio vettoriale introducendo la seguente legge di composizione interna

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 \\ \beta_3 & \beta_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 & \alpha_2 + \beta_2 \\ \alpha_3 + \beta_3 & \alpha_4 + \beta_4 \end{pmatrix}$$

e la seguente legge di composizione esterna:

$$\alpha \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha_1 & \alpha\alpha_2 \\ \alpha\alpha_3 & \alpha\alpha_4 \end{pmatrix}.$$

E' facile vedere che tutte le proprietà di spazio vettoriale sono rispettate in virtù del fatto che le stiamo definendo a partire dalle operazioni definite sui numeri reali.

2.1 Sistemi lineari e metodo di Gauss-Jordan

La domanda che ogni essere umano si chiede almeno una volta nella propria esistenza è, senza ombra di dubbio, "*Perché viviamo?*" e, con grande dispiacere, vi annuncio che nemmeno Geometria è in grado di fornirci una risposta e, se ti sta venendo voglia di piangere leggendo queste risposte, sappi che non è nemmeno in grado di rispondere alla domanda "*Perché mi sono iscritto a Fisica?*". Riesce però a rispondere alla domanda "*Perché ci servono le matrici?*": in un certo senso, scrivere A matrice 2×2 è, in un certo senso, equivalente a scrivere un vettore in 4 dimensioni (non a caso,

mostreremo che la dimensione dello spazio vettoriale delle matrici 2×2 è proprio 4) e, a priori, le matrici ci consentono di studiare i sistemi lineari.

Definizione 2.1. Un sistema di m equazioni lineari con $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ incognite del tipo

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0 \\ \alpha_{21}x_1 + \dots + \alpha_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \dots + \alpha_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

si dice sistema lineare.

Proposizione 2.1. Verificare che l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare è un sottospazio vettoriale.

Esercizio 2.1. *Mostrare la proposizione qua sopra.*

Questo sistema può essere rappresentato dalla matrice A con m righe e n colonne:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

siccome il nostro sistema di equazioni può essere scritto come

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n \\ \alpha_{21}x_1 + \dots + \alpha_{2n}x_n \\ \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \dots + \alpha_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

dove si è introdotta un'operazione chiamata *prodotto righe colonne*: presa una matrice A $n \times m$ e B $m \times l$ abbiamo che tale operazione produce una matrice C (che indicheremo anche come AB) $n \times l$ il cui elemento c_{ij} alla riga i -esima e colonna j -esima è pari a

$$c_{ij} = \sum_{k=0}^m a_{ik}b_{kj}.$$

Per fissare meglio come funziona questo particolare prodotto, consideriamo le due matrici

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

abbiamo che il *prodotto righe per colonne* per ricavare l'elemento nella matrice risultante alla prima riga e alla prima colonna consiste nel prendere la prima riga della matrice A e moltiplicarla elemento per elemento ad ogni elemento della prima colonna della matrice B ; per trovare invece l'elemento alla prima riga e nella seconda colonna dobbiamo prendere la prima riga della matrice A e moltiplicarla elemento per elemento con la seconda colonna della matrice B ; per trovare l'elemento alla seconda riga e alla prima colonna bisogna invece prendere la seconda riga della matrice A e moltiplicarla elemento per elemento per la prima colonna della matrice B ; infine per l'ultimo elemento (siccome questa operazione produce una matrice 2×2) dobbiamo prendere la seconda

riga della matrice A e moltiplicarla elemento per elemento per la seconda colonna della matrice B . Abbiamo quindi che

$$C = AB = \begin{pmatrix} -31 & 2 \\ 40 & 40 \end{pmatrix}.$$

Vedremo poi come le matrici abbiano un profondissimo legame con le applicazioni lineari. Ora, osserviamo che, se A rappresenta un sistema lineare di equazioni, allora

Proposizione 2.2 (invarianza per mosse di riga).

- ① Moltiplicare per un coefficiente $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}}$ una riga del sistema non modifica l'insieme delle soluzioni;
- ② Sommare ad una riga un'altra riga non modifica l'insieme delle soluzioni;
- ③ (corollario dalla ① e ②) Indicando con r_i e r_j due righe del sistema allora sostituire a r_i la riga $\alpha r_i + \beta r_j$ con $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}}$ non cambia l'insieme delle soluzioni.

Esercizio 2.2. *Mostrare la proposizione 2.2*

Questa dei sistemi lineari per righe ci conduce a definire un'equivalenza fra sistemi lineari

Definizione 2.2 (sistemi lineari equivalenti). Sia

$$S = \begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0 \\ \alpha_{21}x_1 + \dots + \alpha_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \dots + \alpha_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

un sistema lineare di m equazioni in n incognite. Preso un altro sistema lineare

$$S' = \begin{cases} \alpha'_{11}x_1 + \dots + \alpha'_{1n}x_n = 0 \\ \alpha'_{21}x_1 + \dots + \alpha'_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ \alpha'_{l1}x_1 + \dots + \alpha'_{ln}x_n = 0 \end{cases},$$

diremo che questo sistema S è equivalente a S' se hanno lo stesso insieme di soluzioni.

Come possiamo usare questa proposizione qua sopra per risolvere i sistemi lineari? Supponiamo di avere una matrice A della forma

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

allora effettuando operazioni di righe possiamo fare in modo che la nostra matrice si riduca a

$$\begin{pmatrix} * & \dots & \dots & \dots & * \\ 0 & * & * & \dots & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0 \\ \alpha_{21} + \dots + \alpha_{2n} \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ \alpha m 1 + \dots + \alpha_{nn} \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} \text{è equivalente per mosse di riga} \\ \rightarrow \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \alpha'_{11}x_1 + \dots + \alpha'_{1n}x_n = 0 \\ 0 + \alpha'_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ 0 + \dots + 0 + \alpha'_{nn}x_n = 0 \stackrel{\alpha'_{nn} \neq 0}{\implies} x_n = 0 \end{array} \right.$$
$$x + y - z = 0.$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y + z \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Span} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Il metodo di risoluzione che sfrutta le mosse di riga per semplificare le matrici si chiama *eliminazione di Gauss-Jordan*. Dal punto di vista matriciale la proposizione 2.2 si interpreta nella seguente maniera: ad ogni operazione di riga sancita da questa proposizione, stiamo moltiplicando la matrice per una *matrice elementare*. Illustriamo quali sono queste matrici:

- [illegible]

che equivale ad una matrice identità dove al posto del termine i -esimo sulla diagonale mettiamo uno 0 e mettiamo un 1 invece alla posizione j -esima della stessa riga i -esima, mentre al termine j -esimo della diagonale mettiamo uno 0 e mettiamo un 1 nella posizione i -esima della stessa riga i -esima. Per fissare le idee (siccome questo matricione non rende benissimo l'idea), consideriamo la seguente matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

e osserviamo che moltiplicare per la matrice

$$E_{1,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

scambia la prima riga con la terza, siccome

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2. **Moltiplicazione per uno scalare $\lambda \neq 0$.** Se stiamo moltiplicando la i -esima riga, stiamo moltiplicando la nostra matrice A per una matrice di questo tipo

$$E_{\lambda,i} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \lambda & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \ddots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. **Somma di una riga per λ volte una riga distinta.** Se stiamo sommando alla riga i -esima la riga j -esima moltiplicata per uno scalare λ si ha che la matrice elementare è del tipo

$$E_{\lambda,i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \vdots & \ddots & \vdots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \lambda & \dots & 1 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

che equivale ad una matrice elementare dove alla riga i -esima mettiamo λ all'entrata j -esima. Per fissare le idee consideriamo sempre la solita matrice di prima

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

e osserviamo che se voglio sommare alla terza riga (quindi $i = 3$) la prima riga (quindi $j = 1$ e $\lambda = 1$) in questo caso devo considerare la matrice elementare

$$E_{1,3,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e infatti facendo il conto si vede che

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

Vorremmo anche trattare il caso dei sistemi lineari della forma

$$A\underline{x} = \underline{b} \text{ dove } \underline{b} \text{ non è necessariamente il vettore nullo,}$$

che sono molto utile nel caso in cui noi vorremmo, per esempio, trovare le equazioni cartesiane del piano generato da alcuni vettori. Questi sistemi sono rappresentati dalla matrice A a cui aggiungiamo una colonna che contiene il vettore $\underline{b}$, quindi

$$A\underline{x} = \underline{b} \text{ è rappresentato da } \left(A \quad \left| \begin{array}{c} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{array} \right. \right)$$

Si osservi che nel caso dei sistemi con

$$A\underline{x} = \underline{b} \text{ con } \underline{b} \neq \underline{0},$$

e, indicando con pivot gli elementi sulla diagonale di A nella matrice $(A|\underline{b})$ quando quest'ultima è ridotta in forma di pivot, abbiamo che questi ci indicano se un sistema è risolubile o meno: consideriamo il seguente sistema lineare non omogeneo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

e osserviamo che accorpare tutto nella matrice

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

e risolvendo per operazioni di riga, sottraendo, per esempio, 1 volta la prima riga alla seconda riga, si ha che

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

e i pivot qua sarebbero 1 e 0. Si vede che il sistema lineare di partenza sarebbe equivalente ad un sistema del tipo

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 0x + 0y = 2 \end{cases}$$

che è impossibile per la seconda riga. Quindi nella forma ridotta a scala della matrice $(\tilde{A}|\tilde{\underline{b}})$ (che indichiamo mettendo una tilde su A e $\underline{b}$) si ha che nelle righe in cui la componente i -esima del

vettore $\tilde{b}$ non è nulla, non ci possono essere pivot nulli. Questo è alla base del procedimento per cui è possibile trovare le equazioni di un piano cartesiano partendo dai vettori che lo generano: per semplicità consideriamo il caso già trattato del piano $x = -y + z$, che abbiamo visto essere

coincidere con lo Span dei vettori $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Illustriamo il procedimento: supponiamo che il

vettore $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ appartenga allo Span dei vettori $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, quindi il sistema

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

ovvero $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ per cui vale l'uguaglianza appena scritta. Se procediamo con le operazioni di riga, tuttavia, andiamo a cambiare lo Span delle colonne: noi non vogliamo questo, siccome è come se cambiassimo le "coordinate" (la base) in cui ci troviamo, ottenendo delle equazioni che valgono in base diversa da quella "cartesiana" (canonica). Quindi, si lavora con lo Span delle colonne per ovviare a questo problema (più avanti sarà possibile rispondere in maniera più accurata al motivo): osserviamo che

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & x \\ 1 & 0 & y \\ 0 & 1 & z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & x \\ 1 & 0 & y \\ 0 & 1 & z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & y \\ 0 & 1 & z - x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & z - x - y \end{pmatrix}$$

affinché il sistema abbia soluzione è necessario che il pivot finale sia nullo: si ha allora che $z - x - y = 0 \implies x + y - z = 0$.

2.2 Rango di una matrice

Abbiamo capito il motivo per cui il procedimento di Gauss-Jordan funziona per i sistemi omogenei, tramite la proposizione 2.2, tuttavia non sappiamo perché funzioni per sistemi del tipo $A\underline{x} = \underline{b}$. Attacchiamo il problema introducendo il *rango* di una matrice

Definizione 2.3 (rango per righe e per colonne). Sia A una matrice $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, definiamo rango per colonne di A come

$$\text{rank}_C(A) = \dim(\text{Span}(A^1, \dots, A^n)) \text{ dove } \text{Span}(A^1, \dots, A^n) \subseteq \mathbb{K}^n,$$

mentre il rango per colonne di A come

$$\text{rank}_B(A) = \dim(\text{Span}(A_1, \dots, A_m)) \text{ dove } \text{Span}(A_1, \dots, A_m) \subseteq \mathbb{K}^m.$$

Notazione: se A matrice, allora A^i è la colonna i -esima di A , mentre A_j è la riga j -esima di A . Tramite questa notazione possiamo scrivere che

$$(AB)_{ij} = A_i \cdot B^j$$

dove $\cdot$ è il prodotto scalare euclideo. Valgono anche le seguenti uguaglianze

$$(AB)^j = AB^j$$

e

$$(AB)_j = A^j B$$

dove si sottointende il prodotto matriciale (e non quello scalare).

Si può mostrare che vale il seguente teorema

Teorema 2.1. Sia A una matrice $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, allora

$$\text{rank}(A) = \text{rank}_C(A) = \text{rank}_R(A) = \text{numero di pivot non nulli riducendo la matrice}$$

Dimostrazione. Innanzitutto abbiamo che se $r = 0$ allora le righe sono necessariamente tutte nulle, quindi anche $c = 0$; pertanto supponiamo che $r > 0$. Sia A una matrice del tipo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Si osserva che una relazione di dipendenza lineare fra le colonne di A è una soluzione del sistema

$$A\underline{x} = \underline{0},$$

siccome, come abbiamo già fatto notare più volte, questo sistema è equivalente a dire che

$$A\underline{x} = x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = \underline{0},$$

con $x_i \in \mathbb{K}$ non tutti nulli. Osserviamo che le operazioni di righe non vanno a cambiare l'insieme delle soluzioni del sistema (ovvero la determinazione del vettore $\underline{x}$), in virtù della proposizione 2.2, e ciò vuol dire che non cambiano le dimensioni dello spazio delle colonne (nonostante le operazioni di riga cambino lo spazio delle colonne!); pertanto, possiamo supporre che le prime r righe siano linearmente indipendenti e considerare la matrice A^* , ottenuta limitandosi alle prime r A di A , e considerare il sistema lineare omogeneo associato

$$A^* \underline{x} = \underline{0} \tag{*}$$

Osserviamo che se $\underline{x}$ è soluzione di (*), allora si ha che annulla anche le righe $i > r$ della matrice A , in quanto combinazioni lineari delle prime r righe linearmente indipendenti

$$\begin{aligned} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n &= \alpha_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n) + \dots + \alpha_r(a_{r1}x_1 + \dots + a_{rn}x_n) = \\ &= 0 + \dots + 0 = 0 \end{aligned}$$

per opportuni $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ tali che $A_i = \alpha_1 A_1 + \dots + \alpha_r A_r$. Abbiamo quindi che $\underline{x}$ è soluzione anche del sistema "originale", mentre è chiaro che ogni soluzione originale del sistema è anche soluzione del sistema (*). I due sistemi sono, quindi, equivalenti e il rango per colonne di A^* è c , ma siccome le colonne sono vettori di $\mathbb{K}^r$ (perché ci siamo limitati alle prime r righe), allora $c \leq r$. Ripetendo il medesimo ragionamento con A^T otteniamo invece che $r \leq c$, quindi in definitiva abbiamo che $c = r$. $\square$

Corollario 2.1.1.

$$\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$$

Teorema 2.2 (di Rouché-Capelli). Sia dato un sistema lineare della forma a coefficienti nel campo $\mathbb{K}$

$$\begin{cases} \alpha_{1,1}x_1 + \dots + \alpha_{1,n} = b_1 \\ \alpha_{2,1}x_1 + \dots + \alpha_{2,n} = b_2 \\ \vdots \\ \alpha_{m,1}x_1 + \dots + \alpha_{m,n} = b_m \end{cases}.$$

con $b_i \in \mathbb{K} \forall i \in \{1, \dots, m\}$. Tale sistema è rappresentato dalla matrice

$$(A|\underline{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} \alpha_{1,1} & \alpha_{1,2} & \dots & \alpha_{1,n} & b_1 \\ \alpha_{2,1} & \alpha_{2,2} & \dots & \alpha_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{m,1} & \alpha_{m,2} & \dots & \alpha_{m,n} & b_m \end{array} \right)$$

e si ha che il sistema lineare ha soluzione unica se $\text{rank}(A)$ è uguale a $\text{rank}(A|\underline{b})$. In tal caso le soluzioni all'equazione


$$A\underline{x} = \underline{b} \text{ dove } \underline{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

formano uno spazio affine di $\mathbb{K}^n$ di dimensione $n - \text{rank}(A)$. In particolare si ha che se $\text{rank}(A) = n$ allora la soluzione è unica, altrimenti ve ne sono infinite e sono delle forma

$$\underline{x}_0 + \underline{v}$$

dove $\underline{x}_0$ è una possibile soluzione all'equazione, mentre $\underline{v}$ è un generico vettore nel kernel di A .

Oss.: Per capire bene il significato di questo teorema, si pensi ad una retta non passante per l'origine, ma passante in $P = (0, 1)$ per esempio. Ogni punto della retta (non passante per l'origine) può essere scritto come somma del vettore $\vec{OP}$ e un vettore di un sottospazio vettoriale (immaginate di ritraslare la retta non passante nell'origine, riportandola nell'origine: abbiamo che ogni punto della retta è identificato adesso da un vettore, siccome, riportandolo nell'origine, l'abbiamo resa nuovamente uno spazio vettoriale, quindi prendendo un vettore qualunque e sommandolo al vettore $\vec{OP}$ si descrive il generico punto della retta non passante per l'origine). Questo procedimento è illustrato nella figura di sotto: se consideriamo il vettore $\underline{v}$ che appartiene alla retta non traslata e consideriamo il suo "traslato" sulla retta non passante per l'origine $\underline{v}'$ si osserva che il vettore che appartiene alla retta $y = 2x + 3$ è ottenuto sommando $\vec{OP}$ con $\underline{v}$ o $\underline{v}'$, il cui risultato in figura sarebbe la linea tratteggiata.



Per effettuare la dimostrazione bisogna prima soffermarci su una piccola questione: rappresentare un sistema lineare come

$$A\underline{x} = \underline{0}$$

è equivalente a scrivere

$$x_1 A^1 + \dots + x_n A^n = \underline{0}$$

dove A^i è la colonna i -esima della matrice A . Questo si vede col prodotto matriciale siccome

$$A\underline{x} = \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \dots & \alpha_{1,n} \\ \alpha_{2,1} & \dots & \alpha_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m,1} & \dots & \alpha_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} \\ \vdots \\ \alpha_{m,1} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} \alpha_{1,n} \\ \vdots \\ \alpha_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Se queste colonne sono linearmente indipendenti (infatti possono essere immaginate come vettori in $\mathbb{K}^m$), allora l'unica soluzione possibile è per $\underline{x} = \underline{0}$. Ragionando come fatto in precedenza, è facile convincersi che ciò è possibile **solo** se la matrice può essere messa in forma di pivot con questi ultimi tutti non nulli (infatti se avessimo un pivot nullo, per assurdo, avremmo che una delle x_i soddisfa un'equazione del tipo $0 \cdot x_i = 0$ che è vera per qualunque valore di x_i). Anche nel caso in cui stessimo studiando il sistema

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

possiamo sempre procedere come sopra e vedere che

$$x_1 A^1 + \dots + x_n A^n = \underline{b},$$

dunque $\underline{b}$ è combinazione lineare delle colonne.

Dimostrazione del teorema 2.2. Affinché $\underline{b}$ sia soluzione del sistema si deve avere che appartiene allo Span delle colonne della matrice siccome il sistema

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

è equivalente a scrivere

$$x_1 A^1 + \dots + x_n A^n = \underline{b}$$

dove A^i è l' i -esima colonna di A . Ma se appartiene allo Span delle colonne, l'aggiunta del vettore $\underline{b}$ non modifica la dimensione dello Span delle colonne (siccome è ridondante), dunque la dimensione dello spazio delle colonne della matrice $(A|\underline{b})$ è la stessa. Per mostrare l'ultima affermazione, sul fatto che le soluzioni formano uno spazio affine, possiamo osservare che se $\underline{x}_0$ è una soluzione del sistema $A\underline{x} = \underline{b}$, allora si ha che, preso un $\underline{v}$ soluzione del sistema $A\underline{x} = \underline{0}$, il vettore $\underline{x}_0 + \underline{v}$ è ancora soluzione del sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ siccome

$$A(\underline{x}_0 + \underline{v}) = A\underline{x}_0 + A\underline{v} = \underline{b} + \underline{0} = \underline{b}.$$

Si vede che se le dimensioni dello spazio delle colonne è uguale a n , allora il sistema omogeneo ($A\underline{x} = \underline{0}$) ha solo soluzione nulla (ovvero si può ridurre in forma triangolare con pivot tutti non nulli), quindi avremo che la soluzione è unica. $\square$

Dal teorema qua sopra si evince subito che è sempre utile sapere le soluzioni del sistema $A\underline{x} = \underline{0}$, anche quando si sta studiando il sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ (siccome le soluzioni a questo sistema sono date da una soluzione $\underline{x}_0$ che risolve il sistema a cui possiamo aggiungere un qualunque vettore che invece soddisfa il sistema omogeneo $A\underline{x} = \underline{0}$). Se consideriamo sempre la solita matrice A vorremmo trovare la *matrice inversa*, così definita

Definizione 2.4 (matrice inversa). Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (ovvero le matrici quadrate $n \times n$ a coefficienti sul campo $\mathbb{K}$), la matrice inversa $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ è quella matrice tale che

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

dove I è la matrice identità $n \times n$.

Tramite il metodo di Gauss-Jordan è possibile descrivere un algoritmo con cui individuarla: se consideriamo la matrice ottenuta aggiungendo ad A la matrice identità, ovvero

$$(A|I)$$

se effettuiamo delle mosse di riga contemporaneamente su questa nuova matrice e riusciamo a trasformare la parte sinistra (dove inizialmente c'è la matrice A) nella matrice diagonale, abbiamo trovato una serie di matrici elementari (tutte moltiplicate fra loro) per cui risulta che

$$E_n \dots E_1 A = I$$

quindi le $E_n \dots E_1 = A^{-1}$, tuttavia avendo moltiplicato anche la parte destra (che è la diagonale) per queste matrici si ha che sulla destra abbiamo proprio la matrice inversa di A !

Per fissare le idee consideriamo sempre la matrice A di prima: vi garantisco io che questa matrice è invertibile (e nella prossima sezione affronteremo anche la questione su quando è possibile invertire una matrice) e costruiamo la matrice come spiegato qua sopra

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 4 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 4 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 22 & | & 0 & -6 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -\frac{6}{22} & \frac{1}{22} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & \frac{4}{22} & \frac{3}{22} \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -\frac{6}{22} & \frac{1}{22} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -\frac{14}{22} & -\frac{5}{22} \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & \frac{4}{22} & \frac{3}{22} \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -\frac{6}{22} & \frac{1}{22} \end{pmatrix}$$

Segue che la matrice inversa di A è pari a

$$A^{-1} = \frac{1}{22} \begin{pmatrix} 22 & -14 & -5 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

Oss.: Per formalizzare il motivo per cui questo metodo funziona bisognerebbe mostrare (ma non è stato fatto nel corso) che ogni matrice invertibile possa essere scritta come prodotto di matrici elementari. Si può facilmente mostrare (esercizio!) che il prodotto di due matrici invertibili è invertibile.

dove ho raccolto $\frac{1}{22}$ dalla matrice.

Un altro modo per interpretare il metodo di Gauss-Jordan per l'inversa è il seguente: se consideriamo il sistema non omogeneo

$$A\underline{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

e anche gli altri due sistemi non omogenei

$$A\underline{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad A\underline{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

abbiamo che accorpendo i vettori $\underline{x}_1$, $\underline{x}_2$ e $\underline{x}_3$ per formare una matrice le cui colonne sono questi vettori, si ottiene che

$$A(\underline{x}_1|\underline{x}_2|\underline{x}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

quindi possiamo interpretare

$$(A|I)$$

come un sistema lineare "multiplo" la cui soluzione è rappresentata dalla matrice A^{-1} . Tramite questo procedimento è possibile mostrare la seguente proposizione

Proposizione 2.3. Sia A una matrice $n \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, allora

$$A \text{ è invertibile} \iff \text{rank}(A) = n$$

Per fare questa dimostrazione è necessario questo lemma particolarmente rognoso da mostrare

Lemma 2.2.1. Se A e B sono matrici allora

$$\text{rank}(AB) \leq \min \{ \text{rank}(A), \text{rank}(B) \}$$

Dimostrazione. Osserviamo che se $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ e $B \in \mathcal{M}_{n \times s}(\mathbb{K})$, allora si ha che $(AB)_i = A_i B$, da cui facendo il conto

$$\begin{aligned} (AB)_i &= \\ &= (a_{i1}b_{11} + a_{i2}b_{21} + \dots + a_{in}b_{n1}, a_{i1}b_{12} + a_{i2}b_{22} + \dots + a_{in}b_{n2}, \dots, a_{i1}b_{1s} + \dots + a_{in}b_{ns}) = \\ &= (a_{i1}b_{11}, a_{i1}b_{12}, \dots, a_{i1}b_{1s}) + (a_{i2}b_{21}, a_{i2}b_{22}, a_{i2}b_{23}, \dots, a_{i2}b_{2s}) + \dots + \\ &+ (a_{in}b_{n1}, a_{in}b_{n2}, \dots, a_{in}b_{ns}) = a_{i1}B^1 + a_{i2}B^2 + \dots + a_{in}B^n \end{aligned}$$

quindi ogni riga di (AB) è combinazione lineare delle righe di B , quindi è chiaro che lo Span delle righe di AB è contenuto nello Span delle righe di B , dunque

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B),$$

ma siccome il rango è invariante per trasposizione, abbiamo che

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(AB)^T = \text{rank}(B^T A^T)$$

e ragionando come fatto prima abbiamo che le righe di $B^T A^T$ sono combinazioni lineari delle righe di A , dunque si ha che

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(B^T A^T) \leq \text{rank}(A^T) = \text{rank}(A),$$

dunque

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}.$$

□

Dimostrazione della proposizione 2.3.

$\Rightarrow$: se A è invertibile, allora abbiamo, usando il lemma di prima, che

$$n = \text{rank } I_n = \text{rank}(AA^{-1}) \leq \text{rank}(A),$$

tuttavia è chiaro che $\text{rank } A \leq n$ per definizione, quindi $\text{rank } A = n$.

$\Leftarrow$: se la matrice A ha rango pari a n , le righe formano una base di $\mathbb{K}^n$ e, dunque, abbiamo che esistono dei coefficienti $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})$ per cui

$$\underline{e_j} = x_{i1}A_1 + x_{i2}A_2 + \dots + x_{in}A_n$$

dunque costruendo la matrice $B = \{x_{ij}\}$ si ottiene che

$$BA = I,$$

dunque A è invertibile.

□

2.3 Matrici simmetriche e antisimmetriche

Vogliamo introdurre un'altra classe di matrici molto importanti: per fare questo è necessario introdurre l'operazione di trasposta

Definizione 2.5 (trasposizione di una matrice). Sia $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ una matrice, la trasposta della matrice A , che indicheremo con A^T , è la matrice C tale che

$$(C)_{ij} = A_{ji}$$

Esempio 2.1. Per fissare le idee, consideriamo la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix},$$

la matrice trasposta ha dimensioni invertite (dunque siccome A è una matrice 3×2 avremo che la tua trasposta è la matrice 2×3) ed è la seguente matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

quindi per costruire la matrice trasposta basta scambiare le righe con le colonne: le righe della matrice originale diventeranno le colonne e viceversa.

Notiamo, tuttavia, che esistono delle matrici che sono uguali alla loro simmetrica: l'esempio per eccellenza è la matrice identità, siccome

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

che si vede essere uguale alla sua trasposta, tuttavia anche la seguente matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & 0 \\ 3 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

è uguale alla sua trasposta. La classe di matrici che hanno questa proprietà sono dette matrici simmetriche

Definizione 2.6 (matrici simmetriche). Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, diremo che è simmetrica se

$$A = A^T$$

Oss.: Osserviamo che questa definizione ha senso solamente se consideriamo lo spazio delle matrici quadrate, altrimenti non è in alcun modo possibile che una matrice non quadrata sia uguale alla sua trasposta (siccome le dimensioni vengono invertite).

Un'altra classe di matrici molto importanti sono le matrici antisimmetriche, così definite

Definizione 2.7 (matrici antisimmetriche). Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, diremo che è antisimmetrica se

$$A = -A^T$$

Oss.: Un esempio di matrice antisimmetrica è la seguente

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 6 \\ -1 & 0 & 5 \\ -6 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

Dall'esempio qua sopra possiamo vedere che gli elementi della diagonali li ho messi a zero. Perché? La risposta è semplice: passando alle componenti della matrice, abbiamo che una matrice antisimmetrica A deve soddisfare sulla diagonale la relazione

$$A_{ii} = -A_{ii} \implies 2A_{ii} = 0 \implies A_{ii} = 0.$$

Possiamo mostrare che questi due spazi sono, rispettivamente, dei sottospazi vettoriali. Per far vedere ciò bisogna far vedere che

Lemma 2.2.2.

$$\textcircled{1} (A + B)^T = A^T + B^T \quad \forall A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$$

$$\textcircled{2} (\alpha A)^T = \alpha A^T \quad \forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}), \forall \alpha \in \mathbb{K}$$

Dimostrazione. Per la $\textcircled{1}$ abbiamo che $((A+B)^T)_{ij} = (A+B)_{ji} = (A)_{ji} + (B)_{ji} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij} \implies (A+B)^T = A^T + B^T$. Per la $\textcircled{2}$ si ha che $((\alpha A)^T)_{ij} = (\alpha A)_{ji} = \alpha A_{ji} = \alpha (A^T)_{ij} \implies (\alpha A)^T = \alpha A^T$. $\square$

Proposizione 2.4. Lo spazio delle matrici simmetriche $S_n(\mathbb{K})$ e delle matrici antisimmetriche $A_n(\mathbb{K})$ sono, rispettivamente, due sottospazi vettoriali.

Dimostrazione. Mostriamo per primo che lo spazio delle matrici simmetriche è un sottospazio vettoriale: usiamo sempre la proposizione 1.4. Tuttavia è chiaro che se $A, B \in S_n(\mathbb{K})$, allora si ha, usando il lemma appena mostrato, che

$$(A + B)^T = A^T + B^T \stackrel{A, B \text{ matrici simm.}}{=} A + B$$

e chiaramente $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ si ha che

$$(\alpha A)^T = \alpha A^T = \alpha A.$$

Per quanto riguarda le matrici antisimmetriche abbiamo che, prese due matrici $A, B \in A_n(\mathbb{K})$, abbiamo che la loro somma

$$(A + B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A + B),$$

e preso $\alpha \in \mathbb{K}$ abbiamo che

$$(\alpha A)^T = \alpha A^T = -\alpha A.$$

□

Mostriamo quali sono le dimensioni di questi due sottospazi: nel caso di $V = \mathbb{K}$, le matrici che agiscono in questo spazio sono matrici 1×1 , quindi l'unica matrice simmetrica in questo spazio è della forma

$$(\alpha) \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{K},$$

e non ci sono chiaramente matrici antisimmetriche. Per quanto riguarda invece lo spazio $V = \mathbb{K}^2$ abbiamo che le matrici simmetriche sono della forma

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \delta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1_{\mathbb{K}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1_{\mathbb{K}} \\ 1_{\mathbb{K}} & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1_{\mathbb{K}} \end{pmatrix} \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K},$$

da cui segue che le matrici simmetriche appartengono allo Span delle matrici $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Per quanto riguarda invece le matrici antisimmetriche osserviamo che queste sono tutte della forma (ricordando che sulla diagonale hanno necessariamente solo zeri)

$$\begin{pmatrix} 0 & \delta \\ -\delta & 0 \end{pmatrix} = \delta \begin{pmatrix} 0 & 1_{\mathbb{K}} \\ -1_{\mathbb{K}} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{con } \delta \in \mathbb{K},$$

quindi le matrici antisimmetriche appartengono allo Span della matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Studiando anche il caso per $V = \mathbb{K}^3$ e qualche altro, si osserva che un possibile formula per le dimensioni delle matrici simmetriche è

$$\dim(S_n) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad (2.1)$$

mentre per quelle antisimmetriche abbiamo la seguente formula possibile

$$\dim(A_n) = \frac{n(n-1)}{2}. \quad (2.2)$$

Oss.: Un possibile modo per ricavare questa formula è osservare, innanzitutto, che le matrici quadrate hanno dimensione n^2 : questo si vede mostrando che le matrici $e_{i,j}$ che hanno un 1 solo in posizione (i, j) e zero altrove formano una base. Successivamente si osserva che, per quanto riguarda le matrici antisimmetriche, vanno tolte le matrici $e_{1,1}, e_{2,2}$ e $e_{3,3}, \dots, e_{n,n}$, siccome sulla diagonale non posso avere elementi; successivamente il numero che otteniamo va diviso per 2 perché gli elementi sotto la diagonale sono l'opposto di quelli sopra la diagonale, quindi sono "fissati", ottenendo così che $\dim(A_n) = \frac{n^2-n}{2}$. Per quanto riguarda le simmetriche, si osserva che dobbiamo considerare il numero di elementi sopra la diagonale (che mi fissano anche quelli sotto la diagonale) e aggiungerci il numero di elementi sulla diagonale: ripetendo il ragionamento fatto per le antisimmetriche, abbiamo che $\frac{n^2-n}{2}$ rappresenta il numero di elementi sopra la diagonale, quindi abbiamo che $\frac{n^2-n}{2} + n = \frac{n^2-n+2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.

Mostriamo formalmente¹ (tramite il metodo di induzione) la dimensione di questi due sottospazi usando come ipotesi induttiva le equazioni (2.1) e (2.2)

Proposizione 2.5. Lo spazio delle matrici simmetriche a coefficienti nel campo $\mathbb{K}$ ha dimensioni pari a

$$\frac{n(n+1)}{2},$$

mentre le dimensioni dello spazio delle matrici antisimmetriche a coefficienti nel campo $\mathbb{K}$ ha dimensione pari a

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

Dimostrazione. Osserviamo che il caso per $n = 1$ è già stato analizzato sopra e abbiamo che $\dim(S_1) = \frac{1(1+1)}{2} = 1$ e $\dim(A_1) = \frac{1(1-1)}{2} = 0$. Mostriamo che $n \implies n+1$ usando come ipotesi induttiva che $\dim(S_n) = \frac{n(n+1)}{2}$ e $\dim(A_n) = \frac{n(n-1)}{2}$: si ha che se consideriamo una matrice $n+1 \times n+1$ abbiamo che

$$S_{n+1} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{n+1} \\ \alpha_2 & & & \\ \vdots & & S_n & \\ \alpha_{n+1} & & & \end{pmatrix}$$

dove S_n è una matrice $n \times n$. Siccome gli elementi sulla prima colonna (a parte α_1) sono fissati dagli elementi sulla prima riga, è sufficiente osservare che alle dimensioni dello spazio delle matrici S_n bisogna aggiungere $n+1$ elementi, quindi

$$\dim(S_{n+1}) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

dove riconosciamo la formula (2.1) in cui $n \xrightarrow[\text{mandato in}]{\text{viene}} n+1$. Per le matrici antisimmetriche si osserva che sono della forma

$$A_{n+1} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{n+1} \\ -\alpha_2 & & & \\ \vdots & & A_n & \\ -\alpha_{n+1} & & & \end{pmatrix}$$

¹in realtà l'osservazione fatta sopra è più che sufficiente per concludere, tuttavia vi voglio abituare all'induzione in cui si potrebbe, a priori, congetturare formule senza alcun significato e mostrare, per induzione, che in realtà queste formule sono effettivamente valide

dunque è sufficiente ripetere il ragionamento fatto sopra (sul fatto che gli elementi sulla colonna sono fissati dagli elementi sulla prima riga) e aggiungere alla dimensioni delle matrici A_n il numero di elementi non nulli nella prima riga, pari a n , pertanto

$$\dim(A_{n+1}) = \frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{n(n-1) + 2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

dove vediamo che questa è esattamente la formula (2.2) dove $n \xrightarrow[\text{mandato in}]{\text{viene}} n+1$. $\square$

Si osserva che $\dim(S_n) + \dim(A_n) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2$ e $S_n \cap A_n = \{\underline{0}\}$ (dove $\underline{0}$ è la matrice nulla): se per assurdo $\exists S_n \cap A_n \ni A \neq \underline{0}$ allora

$$\begin{cases} \textcircled{1} A_{ij} = A_{ji} \\ \textcircled{2} A_{ij} = -A_{ji} \end{cases} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Tuttavia si osserva dalla $\textcircled{1}$ si ha che $A_{ji} = A_{ij}$ quindi inserendola nella seconda abbiamo che $A_{ij} = -A_{ji} = -A_{ij} \implies A_{ij} = -A_{ij} \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$; che ci porta a concludere che $A_{ij} = 0 \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$. Si ha quindi che i due sottospazi hanno intersezione banale.

Abbiamo, quindi, mostrato la seguente proposizione

Proposizione 2.6. Lo spazio delle matrici quadrate $n \times n$ a coefficienti nel campo $\mathbb{K}$ è dato dalla somma diretta dello spazio delle matrici simmetriche e dello spazio delle matrici antisimmetriche.

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = S_n \oplus A_n. \quad (2.3)$$

Presa una matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, possiamo costruire esplicitamente le matrici simmetriche e antisimmetriche la cui somma ci dà la matrice M , infatti osserviamo che la matrice $(M + M^T)$ è simmetrica, siccome

$$(M + M^T)^T = M^T + (M^T)^T = M^T + M = M + M^T$$

e la matrice $(M - M^T)$ è antisimmetrica, siccome

$$(M - M^T)^T = M^T - (M^T)^T = M^T - M = -(M - M^T),$$

e si osserva che $M = \frac{1}{2}(M + M^T) + \frac{1}{2}(M - M^T)$.

2.4 Applicazioni lineari

Arriviamo finalmente a trattare il cuore di Geometria, ovvero le applicazioni lineari. Queste sono molto importanti perché ci permettono di descrivere tutte le operazioni geometriche che possiamo fare in uno spazio.

Definizione 2.8. Siano V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, diremo che f è una funzione $f : V \rightarrow W$ è detta applicazione lineare se

- ① $\forall \underline{v}, \underline{u} \in V, f(\underline{v} +_V \underline{u}) = f(\underline{v}) +_W f(\underline{u})$;
- ② $\forall \underline{v} \in V, \forall \alpha \in \mathbb{K}, f(\alpha \cdot_V \underline{v}) = \alpha \cdot_W f(\underline{v})$

Proposizione 2.7. $\forall f$ applicazione lineare da $V \rightarrow W$, allora $f(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$

Dimostrazione. Si osserva infatti che $f(\underline{0}_V) = f(\underline{0}_V + \underline{0}_V) = f(\underline{0}_V) + f(\underline{0}_V) \implies f(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$. $\square$

Visto che le applicazioni lineari rimangono comunque delle funzioni, vogliamo vedere se possiamo riscrivere in termini "geometrici" il concetto di iniettività di una funzione. A questo scopo, introduciamo i due seguenti sottospazi

Definizione 2.9 (kernel di un'applicazione lineare). Siano V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, definiamo il kernel di f , che denoteremo con $\text{Ker}(f)$, come

$$\text{Ker}(f) = \{\underline{v} \in V : f(\underline{v}) = \underline{0}_W\}$$

Oss.: Dalla proposizione precedente abbiamo che sicuramente $\underline{0}_V \in \text{Ker}(f)$.

Definizione 2.10 (immagine di un'applicazione lineare). Siano V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, definiamo l'immagine di f , che denoteremo con $\text{Im}(f)$, come

$$\text{Im}(f) = \{\underline{w} \in W \mid \exists \underline{v} \in V : f(\underline{v}) = \underline{w}\}.$$

Proposizione 2.8. $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$ sono due sottospazi vettoriali.

Esercizio 2.3. *Mostrare la proposizione qua sopra.*

Mostriamo che vale la seguente

Proposizione 2.9. Siano V e W due spazi vettoriali, sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, allora si ha che

$$f \text{ è iniettiva} \iff \text{Ker}(f) = \{\underline{0}\}.$$

Dimostrazione.

$\Rightarrow$: se f è iniettiva, allora si ha che $f(\underline{x}) = f(\underline{y}) \implies \underline{x} = \underline{y}$, quindi se $f(\underline{v}) = f(\underline{0}) \implies \underline{v} = \underline{0}$, quindi $\text{Ker}(f) = \{\underline{0}_V\}$.

$\Leftarrow$: si ha che $f(\underline{x}) = f(\underline{y}) \iff f(\underline{x}) - f(\underline{y}) = \underline{0}_W \iff f(\underline{x} - \underline{y}) = \underline{0}_W$ (dove abbiamo usato la linearità), ma allora, siccome il $\text{Ker}(f) = \{\underline{0}_V\}$, ciò è vero se $\underline{x} - \underline{y} = \underline{0}_V \iff \underline{x} = \underline{y}$. Abbiamo quindi mostrato che $f(\underline{x}) = f(\underline{y}) \implies \underline{x} = \underline{y}$, quindi f è iniettiva. $\square$

Vale il seguente risultato

Teorema 2.3 (delle dimensioni). Siano V, W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$ e sia $f : V \rightarrow W$, allora abbiamo che

$$\dim(V) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Dimostrazione. Sappiamo che $\text{Ker}(f)$ è un sottospazio vettoriale contenuto in V e, dunque, sappiamo che possiede una base $\mathcal{B}' = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m\}$ che può essere estesa a base di V : indichiamo quindi $\mathcal{B}'' = \{\underline{v}_{m+1}, \underline{v}_{m+2}, \dots, \underline{v}_n\}$ l'insieme che contiene che vanno aggiunti a $\mathcal{B}'$ per ottenere una base di V e poniamo $\mathcal{B} = \mathcal{B}' \cup \mathcal{B}''$ base di V . Dobbiamo mostrare allora che $f(\underline{v}_{m+1}), \dots, f(\underline{v}_n)$ è una base di $\text{Im}(f)$: per fare ciò osserviamo che preso $\underline{w} \in \text{Im}(f)$ per definizione $\exists \underline{v} \in V : f(\underline{v}) = \underline{w}$, ma allora

$$\begin{aligned} \underline{w} = f(\underline{v}) &= f(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_m \underline{v}_m + \alpha_{m+1} \underline{v}_{m+1} + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = \\ &= \alpha_1 \cdot_W f(\underline{v}_1) + \dots + \alpha_m \cdot_W f(\underline{v}_m) + \alpha_{m+1} \cdot_W f(\underline{v}_{m+1}) + \dots + \alpha_n \cdot_W f(\underline{v}_n) = \\ &= \alpha_1 \cdot_W \underline{0}_W + \dots + \alpha_m \cdot_W \underline{0}_W + \alpha_{m+1} \cdot_W f(\underline{v}_{m+1}) + \dots + \alpha_n \cdot_W f(\underline{v}_n) = \\ &= \alpha_{m+1} \cdot_W f(\underline{v}_{m+1}) + \dots + \alpha_n \cdot_W f(\underline{v}_n) \end{aligned}$$

quindi si ha che se $\underline{w} \in \text{Im}(f) \implies \underline{w} \in \text{Span}(f(\underline{v}_{m+1}), \dots, f(\underline{v}_n))$. Mostriamo che questi vettori sono linearmente indipendenti: osserviamo che dobbiamo verificare che l'equazione

$$\begin{aligned} \alpha_{m+1} \cdot_W f(\underline{v}_{m+1}) +_W \dots +_W \alpha_n \cdot_W f(\underline{v}_n) &= \underline{0}_W \quad \xLeftrightarrow{\text{usando la lin.}} \\ \iff f(\alpha_{m+1} \cdot_V \underline{v}_{m+1} +_V \dots +_V \alpha_n \cdot_V \underline{v}_n) &= \underline{0}_W, \end{aligned}$$

ma allora abbiamo che tutto ciò che si trova all'interno delle parentesi di f deve appartenere a $\text{Ker}(f)$ per definizione: si ha allora che $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\begin{aligned} \alpha_{m+1} \cdot_V \underline{v}_{m+1} +_V \dots +_V \alpha_n \cdot_V \underline{v}_n &= \alpha_1 \cdot_V \underline{v}_1 + \dots + \alpha_m \cdot_V \underline{v}_m \iff \\ \iff -\alpha_1 \cdot_V \underline{v}_1 - \dots - \alpha_m \cdot_V \underline{v}_m + \alpha_{m+1} \cdot_V \underline{v}_{m+1} + \dots + \alpha_n \cdot_V \underline{v}_n &= \underline{0}_V, \end{aligned}$$

tuttavia essendo i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ una base di V , si ha che questa equazione ha soluzione solo banale; pertanto $\alpha_i = 0_{\mathbb{K}} \forall i \in \{1, \dots, n\}$, dunque i vettori $f(\underline{v}_{m+1}), \dots, f(\underline{v}_n)$ sono linearmente indipendenti. $\square$

Le ultime due proprietà molto utili per quanto riguarda le applicazioni lineari sono le due prossime proposizioni:

Proposizione 2.10. Siano $f : V \rightarrow W$ una funzione (non applicazione lineare!) fra spazi lineari con V e W due spazi lineari sul campo $\mathbb{K}$ e sia $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ una base di V . Allora

- ① se $f : V \rightarrow W$ è lineare, allora essa è determinata dalla conoscenza dei $\underline{w}_1 = f(\underline{v}_1), \dots, \underline{w}_n = f(\underline{v}_n)$.
- ② viceversa, assegnata una lista ordinata di vettore $\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n \in W \exists! f : V \rightarrow W$ lineare tale che $\underline{w}_1 = f(\underline{v}_1), \dots, \underline{w}_n = f(\underline{v}_n)$.

Dimostrazione. Mostriamo la ①: $\underline{v} \in V, \underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + x_2 \underline{v}_2 + \dots + x_n \underline{v}_n$ dove gli $x_i \in \mathbb{K}$ sono determinati in modo univoco (per la proposizione 1.11) e osserviamo che

$$f(\underline{v}) = f(x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n) = x_1 f(\underline{v}_1) + \dots + x_n f(\underline{v}_n) = x_1 \underline{w}_1 + \dots + x_n \underline{w}_n.$$

Mostriamo la ②. Definiamo $f : V \rightarrow W$ in questa maniera: se $\underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n$ allora $f(\underline{v}) = x_1 \underline{w}_1 + \dots + x_n \underline{w}_n$ (in particolare abbiamo che $f(\underline{v}_1) = \underline{w}_1, \dots, f(\underline{v}_n) = \underline{w}_n$). Mostriamo che è lineare: osserviamo che preso $\underline{v}$ come prima definito e $\underline{w} = y_1 \underline{v}_1 + \dots + y_n \underline{v}_n$ allora $\underline{v} + \underline{w} = (x_1 + y_1) \underline{v}_1 + \dots + (x_n + y_n) \underline{v}_n$, dunque

$$f(\underline{v} + \underline{w}) = (x_1 + y_1) \underline{w}_1 + \dots + (x_n + y_n) \underline{w}_n = (x_1 \underline{w}_1 + \dots + x_n \underline{w}_n) + (y_1 \underline{w}_1 + \dots + y_n \underline{w}_n) = f(\underline{v}) + f(\underline{w}),$$

e similmente si procede per mostrare che $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$. L'unicità è garantita dal fatto che se esistesse una funzione g lineare per cui $\underline{w}_1 = g(\underline{v}_1), \dots, \underline{w}_n = g(\underline{v}_n)$ e $g \neq f$ per cui $\underline{w}_1 = g(\underline{v}_1), \dots, \underline{w}_n = g(\underline{v}_n)$ si ha che preso un vettore $\underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n$ si ha che

$$\begin{aligned} f(\underline{v}) &= f(x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n) = x_1 f(\underline{v}_1) + \dots + x_n f(\underline{v}_n) = x_1 \underline{w}_1 + \dots + x_n \underline{w}_n = \\ &= x_1 g(\underline{v}_1) + \dots + x_n g(\underline{v}_n) = g(x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n) = g(\underline{v}) \end{aligned}$$

ma questo ragionamento non dipende da qualunque $\underline{v} \in V$ preso; quindi $g = f$. $\square$

Proposizione 2.11. Sia $f : V \rightarrow W$ è un'applicazione lineare **iniettiva** fra due spazi vettoriali V e W sul medesimo campo $\mathbb{K}$, allora se $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \subset V$ sono vettori linearmente indipendenti allora $f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)$ sono linearmente indipendenti.

Dimostrazione. Si procede con la contronominale²: se $f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)$ sono vettori linearmente dipendenti in W , allora esiste una relazione non banale

$$\alpha_1 f(\underline{v}_1) + \dots + \alpha_n f(\underline{v}_n) = \underline{0}_W, \quad \text{con } \alpha_i \in \mathbb{K} \forall i \in \{1, \dots, n\} \text{ non tutti nulli } (= 0_K)$$

tuttavia usando la linearità di f si ha che

$$f(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = \underline{0}_W,$$

dunque per definizione abbiamo che $\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \in \text{Ker}(f)$; tuttavia, abbiamo che $\text{Ker}(f) = \{\underline{0}_V\}$, quindi si ha che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}_V$$

dove gli α_i non sono tutti nulli, quindi abbiamo ottenuto una relazione non banale fra i vettori di V , mostrando quindi che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente dipendenti. $\square$

2.5 Isomorfismo delle coordinate

Tramite la proposizione 1.11 sappiamo che le coordinate rispetto ad una base sono univoche. Preso quindi uno spazio vettoriale V sul campo $\mathbb{K}$ e fissata una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ di V , possiamo pensare di costruire una funzione $\phi : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ tale che se $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ allora

$$\underline{v} \mapsto \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

Possiamo far vedere che

Proposizione 2.12. Se V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e $\dim(V) = n$, allora la $\phi : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ sopra definita è lineare.

Dimostrazione. Presi due vettori $\underline{v}, \underline{w} \in V$ allora sappiamo che $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \quad \underline{w} = \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n,$$

abbiamo che $\underline{v} + \underline{w} = (\alpha_1 + \beta_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) \underline{v}_n$ e

$$\phi(\underline{v} + \underline{w}) = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_2 + \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \phi(\underline{v}) + \phi(\underline{w}).$$

Similmente si può mostrare che $\phi(\lambda \underline{v}) = \lambda \phi(\underline{v})$. $\square$

Possiamo fare molto di più, ovvero possiamo mostrare che in realtà la ϕ sopra definita è un *isomorfismo di spazi vettoriali*:

²se stiamo mostrando $A \implies B$ possiamo far vedere che questa implicazione, dal punto di vista logico, è equivalente a far vedere che $\neg B \implies \neg A$, quindi in questo caso dobbiamo mostrare che se $f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)$ sono linearmente dipendenti allora i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente dipendenti

Definizione 2.11 (isomorfismo di spazi vettoriali). Sia V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, diciamo che $f : V \rightarrow W$ è un isomorfismo di spazi vettoriali se f è un'applicazione lineare bigettiva. Diremo che due spazi vettoriali V e W sul medesimo campo $\mathbb{K}$ sono isomorfi se $\exists f$ isomorfismo di spazio vettoriale fra i due.

Oss.: Si noti che due spazi vettoriali non possono essere isomorfi se non hanno la medesima dimensione, siccome se per assurdo esistesse tale isomorfismo ϕ abbiamo che

- ① $\dim(\text{Ker}(\phi)) = 0$; siccome, essendo isomorfismo, ϕ è iniettiva dunque, per la proposizione 2.9, abbiamo che $\text{Ker}(\phi) = \{\underline{0}\} \implies \dim(\text{Ker}(\phi)) = 0$
- ② $\text{Im}(\phi) = W$; siccome ϕ è un isomorfismo, dunque suriettivo.

Se $\dim(W) > \dim(V)$ allora avremmo dal teorema 2.3

$$\dim(W) = \dim(\text{Im}(\phi)) \leq \dim(V) < \dim(W),$$

che è assurdo. Se $\dim(W) < \dim(V)$ allora si deve avere, sempre per il teorema 2.3, che

$$\dim(W) < \dim(V) = \dim(\text{Im}(f)) = \dim(W).$$

il che è assurdo.

Proposizione 2.13. Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $n = \dim(V) < +\infty$. Fissando una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$, allora la $\phi : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ definita come in (2.4) è un isomorfismo fra V e $\mathbb{K}^n$

Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che ① la ϕ è iniettiva e ② la ϕ è suriettiva: per mostrare la ① osserviamo che l'unico vettore $\underline{v} \in V$ tale che

$$\phi(\underline{v}) = \underline{0}_{\mathbb{K}^n}$$

è solo il vettore nullo (che ha coordinate rispetto a questa base). Per quanto riguarda la ② possiamo usare il teorema 2.3 (formula delle dimensioni) osservando che $\dim(V) = \dim(\mathbb{K}^n)$, dunque

$$\dim(\mathbb{K}^n) = \dim(V) = \underbrace{\dim(\text{Ker}(f))}_{=0 \text{ per quanto mostrato}} + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Im}(f)).$$

□

Questo isomorfismo semplifica un sacco le cose, siccome ci consente di prendere qualcosa che "vive" nello spazio vettoriale V , mandarlo in $\mathbb{K}^n$ e studiarlo e poi ritornare a V . In figura:

$$\begin{array}{ccc} V & \xleftrightarrow{\varphi} & \mathbb{K}^n \\ \Psi & & \Psi \\ x & \longleftrightarrow & \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\ \parallel & & \\ \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n & & \end{array}$$

Figura 2.1: Diagramma commutativo tra V e $\mathbb{K}^n$: fissando una base, è possibile studiare un qualunque spazio vettoriale supponendo di trovarci in $\mathbb{K}^n$.

Notazioni: adesso in poi indicheremo quest'azione di prendere le coordinate rispetto ad una base $\mathcal{B}$ con $[\cdot]_{\mathcal{B}}$.

Non solo, tramite questo isomorfismo, possiamo studiare il comportamento delle applicazioni lineari. Fissando una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ di V e una base $\mathcal{B}' = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ di W , come rappresentiamo l'azione di un'applicazione lineare? Osserviamo che, se consideriamo un vettore $\underline{v} \in V$, allora abbiamo che

$$f(\underline{v}) = f(\alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = \alpha_1 f(\underline{v}_1) + \alpha_2 f(\underline{v}_2) + \dots + \alpha_n f(\underline{v}_n)$$

allora le coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}'$ di W sono

$$[f(\underline{v})]_{\mathcal{B}'} = [\alpha_1 f(\underline{v}_1) + \alpha_2 f(\underline{v}_2) + \dots + \alpha_n f(\underline{v}_n)]_{\mathcal{B}'} = \alpha_1 [f(\underline{v}_1)]_{\mathcal{B}'} + \dots + \alpha_n [f(\underline{v}_n)]_{\mathcal{B}'}$$

In quest'ultima espressione, siccome i $\phi_{\mathcal{B}'}(f(\underline{v}_i))$ sono vettori colonna di $\mathbb{K}^n$, possiamo scriverlo sotto forma di matrice (infatti vi ricordo che abbiamo fatto questa medesima cosa nei sistemi lineari, per esempio, siccome si era visto che $A\underline{x} = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$ dove A_i sono le colonne della matrice A), dunque

$$\alpha_1 \phi_{\mathcal{B}'}(f(\underline{v}_1)) + \dots + \alpha_n \phi_{\mathcal{B}'}(f(\underline{v}_n)) = \left([f(\underline{v}_1)]_{\mathcal{B}'} \mid [f(\underline{v}_2)]_{\mathcal{B}'} \mid \dots \mid [f(\underline{v}_n)]_{\mathcal{B}'} \right) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Definizione 2.12 (matrice associata ad un'applicazione lineare f con $\mathcal{B}$ in partenza e $\mathcal{B}'$ in uscita). Siano V, W due spazi vettoriali sul campo $\mathbb{K}$ e sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Fissata $\mathcal{B}$ base di V (base in entrata) e $\mathcal{B}'$ base di W (base in uscita), diremo che la matrice le cui colonne contengono le coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}'$ dell'applicazione lineare f applicata ai vettori della base $\mathcal{B}$

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f) = \left([f(\underline{v}_1)]_{\mathcal{B}'} \mid [f(\underline{v}_2)]_{\mathcal{B}'} \mid \dots \mid [f(\underline{v}_n)]_{\mathcal{B}'} \right)$$

è la matrice associata ad f con $\mathcal{B}$ in entrata e $\mathcal{B}'$ in uscita.

Le potenzialità di questo isomorfismo sono riassunte nel diagramma qua sotto: possiamo studiare l'azione di un'applicazione lineare utilizzando gli isomorfismi, rispettivamente, fra V e $\mathbb{K}^n$ e W e $\mathbb{K}^m$ e rappresentare l'azione di f tramite la matrice associata.

$$\begin{array}{ccccc} x & \in V & \xrightarrow{f} & W & \ni y \\ \updownarrow & \updownarrow \varphi_n & & \updownarrow \varphi_m & \updownarrow \\ (\alpha_1, \dots, \alpha_n) & \in \mathbb{K}^n & \xrightarrow{[f]} & \mathbb{K}^m & \ni (\mu_1, \dots, \mu_m) \end{array} \quad \text{dove } [f] = \underbrace{(a_{ij})}_{n \text{ colonne}} \} m \text{ righe}$$

Figura 2.2: Diagramma non commutativo fra V, W e gli spazi vettoriali ad esso isomorfi $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$: possiamo studiare l'azione di un'applicazione lineare f tramite la matrice associata $[f]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.

Il problema che adesso ci poniamo è capire che relazione esiste fra $[f]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ e $[f]_{\mathcal{B}'''}^{\mathcal{B}''}$ dove $\mathcal{B}, \mathcal{B}''$ e $\mathcal{B}'''$ sono, rispettivamente, basi distinte di V e di W : per rispondere a questa domanda introduciamo la *matrice di cambiamento di base*

Definizione 2.13 (matrice di cambiamento di base fra $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$). Sia V uno spazio vettoriale con $\dim(V) < +\infty$ e siano $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ e $\mathcal{B}' = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ due basi distinte di V , allora diremo che la matrice di cambiamento di base fra $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ è la matrice

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V) = \left([\underline{v}_1]_{\mathcal{B}'} \mid [\underline{v}_2]_{\mathcal{B}'} \mid \dots \mid [\underline{v}_n]_{\mathcal{B}'} \right)$$

dove $[\underline{v}_i]_{\mathcal{B}'}$ sono le coordinate del vettore $\underline{v}_i \in \mathcal{B}$ rispetto alla base $\mathcal{B}'$.

Il motivo di questo nome è chiaro: se noi consideriamo il vettore $\underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n$ come combinazione lineare dei vettori in $\mathcal{B}$, allora le coordinate di tale vettore rispetto alla base $\mathcal{B}'$ sono date osservando che

$$\begin{aligned} [\underline{v}]_{\mathcal{B}'} &= [x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n]_{\mathcal{B}'} = x_1 [\underline{v}_1]_{\mathcal{B}'} + \dots + x_n [\underline{v}_n]_{\mathcal{B}'} = \\ &= \left([\underline{v}_1]_{\mathcal{B}'} \mid [\underline{v}_2]_{\mathcal{B}'} \mid \dots \mid [\underline{v}_n]_{\mathcal{B}'} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Oss.: Le matrici di cambiamento di base sono invertibili, in quanto rappresentano le coordinate dei vettori di una base rispetto ad un'altra base quindi sono linearmente indipendenti (quindi il rango è uguale ad $n = \dim(V)$).

Per rispondere alla domanda che ci stiamo prefiggendo, dobbiamo mostrare il seguente teorema

Teorema 2.4. Sia V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, siano

$$V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{g} Z$$

applicazioni lineari e siano fissate la base $\mathcal{B}$ di V , la base $\mathcal{B}'$ di W e la base $\mathcal{B}''$ di Z . Allora la matrice associata a $g \circ f$ in base $\mathcal{B}$ in entrata e $\mathcal{B}''$ in uscita è

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}}(g \circ f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g) \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f).$$

Dimostrazione. Per definizione di matrice associata, la matrice associata a $g \circ f$ con base in entrata $\mathcal{B}$ e base in uscita $\mathcal{B}''$ contiene le coordinate dei vettori della base $\mathcal{B}$ rispetto alla base $\mathcal{B}''$, dunque la colonna j -esima di questa matrice è data da

$$[g(f(\underline{v}_j))]_{\mathcal{B}''} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g)[f(\underline{v}_j)]_{\mathcal{B}'},$$

dove l'uguaglianza segue dal fatto che stiamo pensando il vettore $[f(\underline{v}_j)]_{\mathcal{B}'}$ come vettore che viene applicato a $\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g)$, tuttavia sappiamo che per definizione $[f(\underline{v}_j)]_{\mathcal{B}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f)_j$, quindi

$$[g(f(\underline{v}_j))]_{\mathcal{B}''} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g)(\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f))^j$$

ma per come è definito il prodotto matriciale abbiamo che la colonna j -esima di una matrice C ottenuta dal prodotto di due matrici A e B è pari a $C^j = AB^j$, quindi si ha che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}}(g \circ f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g) \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f).$$

□

Si può mostrare che

Proposizione 2.14. Se $V_1, \dots, V_n$ sono spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$ e se

$$V_1 \xrightarrow{f_1} V_2 \xrightarrow{f_2} V_3 \xrightarrow{f_3} \dots \xrightarrow{f_{k-2}} V_{k-1} \xrightarrow{f_{k-1}} V_k$$

sono applicazioni lineari e abbiamo fissato le basi $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_k$ rispettivamente di $V_1, \dots, V_k$; allora

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}_k}^{\mathcal{B}_1}(f_{k-1} \circ f_{k-2} \circ \dots \circ f_1) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_k}^{\mathcal{B}_{k-1}}(f_{k-1}) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_{k-1}}^{\mathcal{B}_{k-2}} \dots \mathcal{M}_{\mathcal{B}_3}^{\mathcal{B}_2} \mathcal{M}_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}(f_1)$$

Esercizio 2.4. *Mostrare la proposizione 2.14. Suggerimento: procedere per induzione su k .*

Proposizione 2.15. $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V) = (\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}(\text{Id}_V))^{-1}$.

Dimostrazione. Abbiamo che le coordinate dei vettori di $\mathcal{B}$ rispetto a $\mathcal{B}$ è una matrice diagonale (banalmente perché $\underline{v}_i = 1_{\mathbb{K}} \underline{v}_i$), pertanto si ha, per il teorema 2.4, che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(\text{Id}_V) \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$$

dove l'uguaglianza segue dal fatto che il vettore delle componenti di un vettore $\underline{v}$, applicandovi $\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$, viene mandato nel vettore delle coordinate di $\underline{v}$ rispetto alla base $\mathcal{B}'$ e poi viene riportato nel vettore delle coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}$, quindi dobbiamo riottenere il vettore iniziale. Ma allora segue che, moltiplicando da entrambe le parti per la matrice inversa di $\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$, si ha che

$$(\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V))^{-1} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(\text{Id}_V).$$

□

Utilizzando la proposizione 2.14 segue immediatamente il seguente teorema

Teorema 2.5 (formula del cambiamento di base per matrici associate ad applicazioni lineari). Sia V e W spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e siano fissate $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ basi di V e $\mathcal{B}', \mathcal{C}'$ due basi di W . Allora

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{C}'}(\text{Id}_W) \mathcal{M}_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}}(f) \mathcal{M}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$$

Dimostrazione. Posso immaginare tutte queste come la composizione di applicazioni lineari

$$\mathbb{K}^n \xrightarrow{\text{Id}_V} \mathbb{K}^n \xrightarrow{f} \mathbb{K}^m \xrightarrow{\text{Id}_W} \mathbb{K}^m$$

dove la prima Id_V va intesa come l'identità con cambio di coordinate su V e la terza applicazione Id_W come cambio di coordinate su W . Segue dalla proposizione 2.14 che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}}(f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{C}'}(\text{Id}_W) \mathcal{M}_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}}(f) \mathcal{M}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$$

□

Esercizi proposti

1. Sia $\mathcal{L}(V)$ lo spazio degli endomorfismi di V , si consideri $\mathcal{F} = \{f \in \mathcal{L}(V) : \text{Ker}(f) \subseteq \text{Im}(f)\}$ e sia $\mathcal{A} = \{f \in \mathcal{L}(V) : V = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)\}$.

- (a) Trovare un A appartenente a $\mathcal{F}$ e B non appartenente. Mostrare che $\mathcal{F}$ è un sottospazio oppure dimostrare che non lo è.
 (b) Trovare un A appartenente a $\mathcal{A}$ e B non appartenente.

Svolgimento. Ricordiamo che $\text{Ker}(f) = \{\underline{v} \in V : f(\underline{v}) = \underline{0}\}$ e $\text{Im}(f) = \{\underline{w} \in W \mid \exists \underline{v} \in V : f(\underline{v}) = \underline{w}\}$, quindi si ha che una possibile funzione è isomorfa a questa matrice qua

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vediamo che il kernel di questa matrice qua è rappresentata da vettori che appartengono a $\text{Span}(\underline{e}_1)$, quindi preso un vettore $\underline{v} = \alpha \underline{e}_1 + \beta \underline{e}_2$, quindi si ha che $f(\underline{v}) = f(\alpha \underline{e}_1 + \beta \underline{e}_2) = \alpha f(\underline{e}_1) + \beta f(\underline{e}_2) = \beta f(\underline{e}_2) = \beta \underline{e}_1$, dunque abbiamo che $\text{Ker}(f) \subseteq \text{Im}(f)$. La matrice B che non appartiene invece a $\mathcal{F}$ è invece la matrice nulla, per esempio, siccome si ha che $\text{Ker}(f) = V$ e, chiaramente, $\text{Im}(f) = \{\underline{0}\}$, dunque non abbiamo che $V = \text{Ker}(f) \not\subseteq \text{Im}(f)$. Segue necessariamente che $\mathcal{F}$ non è un sottospazio.

Un esempio di matrice A che appartiene a $\mathcal{A}$ è invece pari a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

siccome abbiamo che $\underline{e}_2$ in $\text{Ker}(A)$ e preso un vettore $\underline{v} \in \text{Im}(f)$ abbiamo che esso sarà della forma $\underline{v} = \alpha \underline{e}_1 + \beta \underline{e}_2$. Per quanto riguarda B abbiamo che la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

non appartiene a $\mathcal{A}$ siccome si ha che $\text{ker}(B) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ mentre, presa la base $\mathcal{B} = \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ abbiamo che

$$B(\underline{v}) = B\left(\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \alpha B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \underline{0} + \beta \underline{0} = \underline{0} \in \text{Ker}(B).$$

Si ha quindi che $\text{Im}(f) = \text{Ker}(B)$, dunque abbiamo che non possono essere in somma diretta, dunque $B \notin \mathcal{A}$. Questo insieme non è un sottospazio: infatti, se prendiamo due applicazioni "invertite" (ovvero prese A, B se B mi manda tutti i vettori nel kernel di A in loro stessi allora $A + B$ mi rompe la somma diretta), siccome

$$A + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = B,$$

quindi questo insieme non è chiuso rispetto alla somma. □

2. Trovare la matrice inversa

Vogliamo adesso introdurre il prodotto scalare: quest'ultimo fornisce una "metrica" al nostro spazio vettoriale, ovvero un modo per quantificare le lunghezze all'interno del nostro spazio vettoriale.

Definizione 3.1 (applicazione bilineare simmetrica). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diciamo che un'applicazione $\phi : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ che soddisfa le seguenti proprietà:

① è lineare nella prima componente, ovvero

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \underline{v}, \underline{w}, \underline{z} \in V, \phi(\alpha \underline{v} + \beta \underline{w}, \underline{z}) = \alpha \phi(\underline{v}, \underline{z}) + \beta \phi(\underline{w}, \underline{z})$$

② è lineare nella seconda componente, ovvero

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \underline{v}, \underline{w}, \underline{z} \in V, \phi(\underline{z}, \alpha \underline{v} + \beta \underline{w}) = \alpha \phi(\underline{z}, \underline{v}) + \beta \phi(\underline{z}, \underline{w})$$

③ è simmetrica, ovvero

$$\forall \underline{v}, \underline{w}, \phi(\underline{v}, \underline{w}) = \phi(\underline{w}, \underline{v})$$

è una forma bilineare simmetrica.

Oss.: In questo caso la proprietà ② è ridondante, siccome segue dalla ① unita alla ③: infatti abbiamo che

$$\phi(\underline{z}, \alpha \underline{v} + \beta \underline{w}) \stackrel{③}{=} \phi(\alpha \underline{v} + \beta \underline{w}, \underline{z}) \stackrel{①}{=} \alpha \phi(\underline{v}, \underline{z}) + \beta \phi(\underline{w}, \underline{z}) \stackrel{③}{=} \alpha \phi(\underline{z}, \underline{v}) + \beta \phi(\underline{z}, \underline{w}).$$

Definizione 3.2 (prodotto scalare). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$, diremo che $\phi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare simmetrica è un prodotto scalare.

Il nostro prototipo di prodotto scalare per eccellenza è il prodotto scalare euclideo in $\mathbb{R}$: presi i vettori $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ e $\underline{w} \in \mathbb{R}^n$ sappiamo che questi sono delle forma

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \qquad \underline{w} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

dove chiaramente $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i \in \mathbb{R}$ e $\beta_i \in \mathbb{R}$. Il loro prodotto scalare euclideo (che indicheremo con $(\cdot, \cdot)$) si ha che

$$(\underline{v}, \underline{w}) = \underline{v}^T \underline{w} = (\alpha_1 \dots \alpha_n) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \dots + \alpha_n \beta_n,$$

dove $(\alpha_1 \dots \alpha_n) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ è da effettuare con il prodotto righe per colonne. E' facile mostrare che $(\cdot, \cdot)$ è effettivamente un prodotto scalare

Esercizio 3.1. *Mostrare che $(\cdot, \cdot)$ è un prodotto scalare: è chiaro che è a valori in $\mathbb{R}$, mostrare che soddisfa le proprietà ①, ② e ③*

Come fatto per le applicazioni lineari, vogliamo sviluppare un modo per lavorare con le *coordinate* (rispetto ad una base fissata) dei vettori, piuttosto che lavorare effettivamente con i vettori. Per fare questo osserviamo che, presi due vettori, e fissando una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$, usando la bilinearità, si ha che

$$\begin{aligned} \phi(\underline{v}, \underline{w}) &= \phi(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n, \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n) = \phi(\alpha_1 \underline{v}_1, \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n) + \dots + \\ &+ \phi(\alpha_n \underline{v}_n, \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n) = \phi(\alpha_1 \underline{v}_1, \beta_1 \underline{v}_1) + \phi(\alpha_1 \underline{v}_1, \beta_2 \underline{v}_2) + \dots + \phi(\alpha_1 \underline{v}_1, \beta_n \underline{v}_n) + \\ &+ \phi(\alpha_2 \underline{v}_2, \beta_1 \underline{v}_1) + \dots + \phi(\alpha_2 \underline{v}_2, \beta_n \underline{v}_n) + \dots + \phi(\alpha_n \underline{v}_n, \beta_1 \underline{v}_1) + \dots + \phi(\alpha_n \underline{v}_n, \beta_n \underline{v}_n) = \\ &= \alpha_1 \beta_1 \phi(\underline{v}_1, \underline{v}_1) + \alpha_1 \beta_2 \phi(\underline{v}_1, \underline{v}_2) + \dots + \alpha_1 \beta_n \phi(\underline{v}_1, \underline{v}_n) + \dots + \alpha_n \beta_1 \phi(\underline{v}_n, \underline{v}_1) + \dots + \\ &+ \alpha_n \beta_n \phi(\underline{v}_n, \underline{v}_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \phi(\underline{v}_i, \underline{v}_j). \end{aligned}$$

Osserviamo, quindi, che è necessario conoscere solamente il valore che il prodotto scalare assume sui vettori della base per poter determinare il suo valore. Possiamo quindi pensare di "ereditare" l'impostazione del prodotto scalare canonico, siccome vediamo dalla formula sopra che

$$\begin{aligned} \phi(\underline{v}, \underline{w}) &= ([\underline{v}]_{\mathcal{B}})^T \begin{pmatrix} \phi(\underline{v}_1, \underline{v}_1) & \phi(\underline{v}_1, \underline{v}_2) & \dots & \phi(\underline{v}_1, \underline{v}_n) \\ \phi(\underline{v}_2, \underline{v}_1) & \phi(\underline{v}_2, \underline{v}_2) & \dots & \phi(\underline{v}_2, \underline{v}_n) \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ \phi(\underline{v}_n, \underline{v}_1) & \phi(\underline{v}_n, \underline{v}_2) & \dots & \phi(\underline{v}_n, \underline{v}_n) \end{pmatrix} [\underline{w}]_{\mathcal{B}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \phi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \\ &= ([\underline{v}]_{\mathcal{B}})^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi) [\underline{w}]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Definizione 3.3 (matrice associata ad un prodotto scalare). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ munito di un prodotto scalare ϕ . Fissata una base $\mathcal{B}$, abbiamo che la matrice associata a ϕ in base $\mathcal{B}$ è la matrice

$$\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi) = \begin{pmatrix} \phi(\underline{v}_1, \underline{v}_1) & \phi(\underline{v}_1, \underline{v}_2) & \dots & \phi(\underline{v}_1, \underline{v}_n) \\ \phi(\underline{v}_2, \underline{v}_1) & \phi(\underline{v}_2, \underline{v}_2) & \dots & \phi(\underline{v}_2, \underline{v}_n) \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ \phi(\underline{v}_n, \underline{v}_1) & \phi(\underline{v}_n, \underline{v}_2) & \dots & \phi(\underline{v}_n, \underline{v}_n) \end{pmatrix},$$

ovvero la matrice che in posizione (i, j) contiene il valore del prodotto scalare fra il vettore i -esimo e il vettore j -esimo

$$(\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi))_{ij} = \phi(\underline{v}_i, \underline{v}_j).$$

Osserviamo che tale matrice dev'essere una matrice simmetrica, siccome nella posizione (i, j) abbiamo che

$$(\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi))_{ij} = \phi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) \stackrel{(3)}{=} \phi(\underline{v}_j, \underline{v}_i) = (\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi))_{ji},$$

Mostriamo il seguente teorema

Teorema 3.1 (cambio di base per le matrici associate ad un prodotto scalare). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ munito di un prodotto scalare ϕ , sia $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ una base fissata di V e sia $\mathcal{C} = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ un'altra base di V . Allora si ha che

$$\mathcal{M}^{\mathcal{C}}(\phi) = (\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi) \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V).$$

Dimostrazione. Osserviamo che

$$(\mathcal{M}^{\mathcal{C}}(\phi))_{ij} = \phi(\underline{w}_i, \underline{w}_j) =$$

ma per definizione abbiamo che $[\underline{w}_i]_{\mathcal{B}} = (\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^i$ e $(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^i = ((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^T)_i$, dunque

$$(\mathcal{M}^{\mathcal{C}}(\phi))_{ij} = ((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^i)^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi) (\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^j = ((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi) \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))_{ij},$$

dove siamo autorizzati a sostituire le operazioni siccome, per definizione di prodotto matriciale, abbiamo che se $C = AB$ allora $C^j = AB^j$ dunque riconosciamo in $\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi)(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^j$ la colonna j -esima del loro prodotto, mentre per quanto riguarda il resto abbiamo che $((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^i)^T = ((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^T)_i$, dunque, ricordando che $C_{ij} = A_i B^j$, abbiamo che l'elemento in posizione (i, j) della matrice $(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\phi) \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V)$ è proprio $\phi(\underline{w}_i, \underline{w}_j)$. $\square$

Cerchiamo adesso di indagare alcune proprietà geometriche che nascono dal valore che assume un prodotto scalare: spinti dalla valenza geometrica che diamo al prodotto scalare euclideo, diamo la seguente definizione

Definizione 3.4 (vettori ortogonali). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ e sia ϕ un prodotto scalare, allora diremo che $\underline{v}, \underline{w}$ sono ortogonali se

$$\phi(\underline{v}, \underline{w}) = 0$$

Le cose per prodotti scalari qualunque, però, diventano abbastanza peculiari: per esempio, se consideriamo la quantità $\phi(\underline{v}, \underline{v}) = \|\underline{v}\|^2$, detta **norma**, si ha che, nel caso del prodotto scalare euclideo, ci fornisce la nozione di "lunghezza" di un vettore, infatti

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \implies \phi(\underline{v}, \underline{v}) = x_1^2 + \dots + x_n^2,$$

che altro non è che la generalizzazione n -dimensionale del teorema di Pitagora. Si osserva, tuttavia, che la norma euclidea di un vettore è sempre maggiore o uguale di 0, dove l'uguaglianza si ha se e solo se $\underline{v} = \underline{0}$. Per un prodotto scalare qualunque, tuttavia, è possibile che ci siano dei vettori la cui "lunghezza" sia pari a 0: per esempio, si consideri il seguente prodotto scalare in $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi} x_1 y_1 - x_3 y_3,$$

da cui è chiaro che questa funzione sia effettivamente un prodotto scalare (se non siete convinti, mostratelo per esercizio). Si osserva che, preso per esempio il vettore $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, possiamo ottenere delle norme uguali a 0, visto che

$$\phi\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 1^2 - 1^2 = 0,$$

mentre se consideriamo il vettore $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, abbiamo che

$$\phi\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 0 - 1 = -1.$$

Interessante, no? Facciamo un'ultimo esempio, un esempio concreto, *fisico*: uno dei prodotti scalari più utilizzati in fisica (metrica di Minkowski, ovvero quella della relatività ristretta) è caratterizzata dalla seguente matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

dove si osserva che, sebbene la norma non rappresenti più la nostra nozione geometrica di "lunghezza", ci consente di categorizzare i vettori in 3 categorie:

- di tipo tempo, ovvero quelli per cui $\phi(\underline{v}, \underline{v}) > 0$;
- di tipo luce, ovvero quelli per cui $\phi(\underline{v}, \underline{v}) = 0$;
- di tipo spazio, ovvero quelli per cui $\phi(\underline{v}, \underline{v}) < 0$.

Tramite questa distinzione, è possibile determinare quali siano gli eventi che possono essere stati causalmente connessi oppure no. Morale: possono esistere dei prodotti scalari, anche fisicamente rilevanti, che hanno un "tipo" di norma diverso da quello "usuale"; proprio per questo, motiviamo la seguente definizione

Definizione 3.5 (vettori isotropi). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ e sia ϕ un prodotto scalare, diremo che $\underline{v} \in V$ è isotropo se

$$\phi(\underline{v}, \underline{v}) = 0.$$

Sempre per un prodotto scalare qualsiasi, può capitare che ci siano dei vettori che risultano ortogonali a tutto lo spazio: si consideri per esempio il seguente prodotto scalare in $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi} x_1 y_1,$$

e si vede che i vettori del tipo $\begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ sono ortogonali ad ogni altro vettore dello spazio, siccome preso

$\underline{v} = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \\ \epsilon \end{pmatrix}$ si ha che

$$\phi\left(\begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \\ \epsilon \end{pmatrix}\right) = 0,$$

e ciò rappresenta una situazione che nel caso euclideo non si era mai presentato. Siamo così motivati ad introdurre la seguente definizione

Definizione 3.6 (radicale). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ e sia ϕ un prodotto scalare, allora l'insieme

$$V^\perp = \{\underline{v} \in V \mid \forall \underline{w} \in V, \phi(\underline{w}, \underline{v}) = 0\}.$$

è detto radicale di V .

La definizione appena data può essere chiaramente generalizzata ai sottospazi

Definizione 3.7 (radicale di un sottospazio). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ e sia ϕ un prodotto scalare. Preso $W \subset V$ sottospazio vettoriale, l'insieme

$$W^\perp = \{\underline{v} \in V \mid \forall \underline{w} \in W, \phi(\underline{v}, \underline{w}) = 0\}$$

è detto radicale di W

Esercizio 3.2. *Mostrare che*

- ① se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, allora $W^\perp$ è un sottospazio vettoriale;
- ② se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, allora $V^\perp \subseteq W^\perp$.

Gli obiettivi che ci prefiggiamo adesso sono i seguenti:

1. esiste un modo per quantificare quanto è grande questo radicale? E' un sottospazio vettoriale e, come tale, può essere messo in somma (diretta o meno) con altri sottospazi vettoriali, quindi sapere la dimensione non fa mai male, no?
2. esiste una base ortogonale? Ovvero, esiste una base i cui elementi siano a due a due ortogonali (proprietà che spesso viene indicata dicendo che i vettori di questa base sono *mutualmente ortogonali*)? Il motivo per cui vorremo una tale base è rappresentata dal fatto che; guardando il bruttissimo conto che ci aveva portato a concludere che

$$\phi(\underline{v}, \underline{w}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \phi(\underline{v}_i, \underline{v}_j),$$

dove $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{R}$ rappresentano rispettivamente le coordinate dei vettori $\underline{v}$ e $\underline{w}$ per la base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$; diventa, in base ortogonale, molto più semplice, siccome, se $\mathcal{B}$ fosse una base ortogonale, allora si ha che

$$\phi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \begin{cases} \phi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases},$$

dunque una sommatoria va via siccome contribuiscono solamente le $j = i$, quindi

$$\phi(\underline{v}, \underline{w}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \phi(\underline{v}_i, \underline{v}_i).$$

3.1 Dimensioni del radicale

Soluzioni agli esercizi

In questo capitolo sono riportate le soluzioni agli esercizi proposti nei vari capitoli del libro. E' chiaro che ci possano essere dei modi alternativi per risolvere gli esercizi, ma le soluzioni che propongo qua sono quelle che mi sono sembrate più semplici e dirette.

4.1 Spazi vettoriali

Esercizio 1.1

Per quanto riguarda la dimostrazione che il vettore nullo è unico, possiamo procedere per assurdo: negando la tesi, si ha che esistono due elementi distinti $\underline{0}, \underline{0}' \in V$ tali che

$$\forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v} = \underline{0}' + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0}'.$$

Ma, osservando che queste due relazioni devono valere per ogni $\underline{v}$, si ha che

$$\begin{aligned} \underline{0}' &= \underline{0}' + \underline{0} && \text{(perché } \underline{0} \text{ è l'elemento neutro)} \\ &= \underline{0} + \underline{0}' && \text{(perché } \underline{0}' \text{ è un elemento neutro rispetto a } +) \\ &= \underline{0} && \text{(perché } \underline{0} \text{ è un elemento neutro rispetto a } +). \end{aligned}$$

Ma questo è una contraddizione, in quanto abbiamo assunto che $\underline{0}$ e $\underline{0}'$ fossero distinti. Segue la tesi.

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\forall \underline{v} \in V$ il vettore nullo è $\underline{0} \cdot \underline{v}$, si osserva che

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v},$$

dove si è usato il fatto che $0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}$ (essendo l'elemento neutro rispetto all'operazione $+_{\mathbb{K}}$ definita sul campo $\mathbb{K}$) e la proprietà distributiva di cui gode $\cdot$ rispetto a $+_{\mathbb{K}}$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V$ tale che $\underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}$ che possiamo aggiungere a destra di ogni membro¹

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}).$$

¹esplicito questa cosa di aggiungere a sinistra perché, a priori, queste dimostrazioni si potrebbero fare anche su spazi dove non è garantita la proprietà commutativa della somma, ottenendo dei risultati simili, ma in questo caso non sarebbe necessario. La faccio per pura pedanteria e perché alcune di queste dimostrazioni potrebbero esseri riviste a Teoria dei Gruppi

Ma, essendo $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = \underline{0}$, si ha che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + \underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v},$$

dove si è usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi.

Per quanto riguarda l'ultima proposizione da mostrare abbiamo, per quanto visto nella proposizione 1.2, che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (1_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} (-1_{\mathbb{K}})) \cdot \underline{v} = \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove si è usata la proprietà distributiva di cui gode l'operazione $\cdot$ rispetto all'operazione $+$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{w} \in V, \exists (-\underline{w}) \in V$ tale che $\underline{w} + (-\underline{w}) = (-\underline{w}) + \underline{w} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $\underline{v}$ che denoteremo sempre con $(-\underline{v})$ e che possiamo aggiungere a sinistra di ogni membro

$$(-\underline{v}) + \underline{0} = (-\underline{v}) + \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} \implies (-\underline{v}) = \underline{0} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove abbiamo sempre usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi

Esercizio 1.2

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è un sottospazio vettoriale, osserviamo che possiamo usare la proposizione 1.4, dunque è sufficiente mostrare che $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V$ e $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ valgono le implicazioni $\underline{v}, \underline{w} \in W \implies \underline{v} + \underline{w} \in W$ e $\underline{v} \in V \implies \alpha \underline{v} \in V$ (dove ho sottointeso il prodotto per scalare).

Per quanto riguarda la prima implicazione, è chiaro che se $\underline{v}, \underline{w} \in V$, allora per definizione esistono $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tali che $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ e $\underline{w} = \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n$, dunque se sommiamo i due vettori otteniamo che

$$\begin{aligned} \underline{v} + \underline{w} &= (\alpha_1 +_{\mathbb{K}} \beta_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n +_{\mathbb{K}} \beta_n) \underline{v}_n \implies \exists \gamma_1 = \alpha_1 + \beta_1, \dots, \gamma_n = \alpha_n + \beta_n \in \mathbb{K} \text{ tali che} \\ \underline{v} + \underline{w} &= \gamma_1 \underline{v}_1 + \dots + \gamma_n \underline{v}_n \implies \underline{v} + \underline{w} \in W. \end{aligned}$$

Per quanto riguarda la seconda implicazione, è chiaro che se $\underline{v} \in V$, allora per definizione esistono $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque

$$\begin{aligned} \alpha \underline{v} &= \alpha(\alpha_1 \underline{v}_1 +_{\mathbb{K}} \dots +_{\mathbb{K}} \alpha_n \underline{v}_n) = (\alpha \alpha_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \underline{v}_n \implies \exists \beta_1 = \alpha \alpha_1, \dots, \beta_n = \alpha \alpha_n \in \mathbb{K} \\ \text{tali che } \alpha \underline{v} &= \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n \implies \alpha \underline{v} \in W. \end{aligned}$$

Si osservi che in entrambe le implicazioni abbiamo usato il fatto che le operazioni $+$ e $\cdot$ godessero delle proprietà distributive rispetto a $+$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale contenente $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$, osserviamo che, per definizione di spazio vettoriale, ogni sottospazio vettoriale W di V che contiene gli elementi $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$, contiene anche le combinazioni lineari di questi elementi, ovvero contiene $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$. Segue la tesi.

Esercizio 1.3

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(A)$ è un sottospazio vettoriale, osserviamo che possiamo sempre usare la proposizione 1.4, dunque è sufficiente mostrare che valgono le due implicazioni come fatto nell'esercizio precedente.

Osserviamo che preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ e, similmente, se $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$; dunque sommandoli insieme

$$\begin{aligned} \underline{v} + \underline{w} &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \underline{v}_i \right) + \left(\sum_{i=1}^m \beta_i \underline{w}_i \right) = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m \implies \\ \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K} : \underline{v} &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \underline{v}_i + \sum_{i=1}^m \beta_i \underline{w}_i \implies \\ \implies \underline{v} + \underline{w} &\in \text{Span}(A). \end{aligned}$$

Mostriamo la seconda implicazione: come prima, se $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque preso $\alpha \in \mathbb{K}$ abbiamo che

$$\begin{aligned} \alpha \underline{v} &= \alpha(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = (\alpha \alpha_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \underline{v}_n \implies \\ \implies \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \beta_1 = \alpha \alpha_1, \dots, \beta_n = \alpha \alpha_n \in \mathbb{K} : \alpha \underline{v} &= \sum_{i=1}^n \beta_i \underline{v}_i \implies \alpha \underline{v} \in \text{Span}(A). \end{aligned}$$

Si osservi che in entrambe le implicazioni abbiamo usato il fatto che le operazioni $+$ e $\cdot$ godano delle proprietà distributive rispetto a $+\mathbb{K}$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda il dimostrare che se A è un sottospazio vettoriale allora $A = \text{Span}(A)$, è sufficiente mostrare che $A \subseteq \text{Span}(A)$ (che è banale) e che $\text{Span}(A) \subseteq A$, da cui segue che $A = \text{Span}(A)$.

$\subseteq$: preso $\underline{v} \in A$, allora per definizione di $\text{Span}(A)$ dobbiamo mostrare $\exists \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, ma possiamo direttamente prendere $\underline{v}_1 = \underline{v}$ e $\alpha_1 = 1_{\mathbb{K}}$ (la definizione di Span non ci vieta di farlo). Dunque $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ e, per l'arbitrarietà di $\underline{v}$, segue che $A \subseteq \text{Span}(A)$.

$\supseteq$: preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$, abbiamo per definizione di $\text{Span}(A)$ che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ ma $\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \in A$ (essendo un sottospazio vettoriale), dunque $\underline{v} \in A$ e, per l'arbitrarietà di $\underline{v}$, segue che $\text{Span}(A) \subseteq A$.

Segue allora che $A = \text{Span}(A)$, ovvero la tesi.

Mostriamo adesso che se $A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$: è chiaro che se $A \subseteq \text{Span}(B)$, allora $\forall \underline{v} \in A, \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in B : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque se consideriamo un vettore $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ abbiamo per definizione che $\exists \underline{v}'_1, \dots, \underline{v}'_n \in A : \exists \alpha'_1, \dots, \alpha'_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{w} = \alpha'_1 \underline{v}'_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}'_n.$$

Ma, per quanto detto sopra, si ha che $\forall \underline{v}'_i, \exists \underline{v}_1^{(i)}, \dots, \underline{v}_m^{(i)} \in A : \exists \beta_1^{(i)}, \dots, \beta_n^{(i)} \in \mathbb{K} : \underline{v}'_i = \beta_1^{(i)} \underline{v}_1^{(i)} + \dots + \beta_n^{(i)} \underline{v}_n^{(i)}$, dunque sostituendo nella definizione di $\underline{w}$ si ottiene una combinazione lineare di vettori di B , dunque $\underline{w} \in \text{Span}(B)$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda l'ultima proposizione da mostrare, è sufficiente ricondursi a mostrare che se $A \subseteq B \implies A \subseteq \text{Span}(B)$ e, per quanto visto nella proposizione precedente, ciò implica che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$. Ma è chiaro che $B \subseteq \text{Span}(B)$, dunque $A \subseteq B \subseteq \text{Span}(B) \implies A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$.

Esercizio 1.4

Possiamo far vedere che presa una collezione finita di polinomi non è possibile generare tutto lo spazio: consideriamo i polinomi $p_1(x), \dots, p_n(x)$ e consideriamo lo Span di $p_1, \dots, p_n$. Osservia-

mo che $\deg(\alpha_1 p_1(x) + \dots + \alpha_n p_n(x)) \leq \max(\deg(p_1), \deg(p_2), \dots, \deg(p_n))$ dove $\deg$ indica il grado del polinomio; tuttavia è chiaro che $\mathbb{R}[x] \ni x^{1+\max(\deg(p_1), \deg(p_2), \dots, \deg(p_n))} \notin \text{Span}(p_1, \dots, p_n)$.

Esercizio 1.5

Supponiamo per assurdo che $\exists A' \subseteq A : A'$ non è linearmente indipendente, allora sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A' : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ non tutti uguali a $0_{\mathbb{K}}$ tali che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma questa si tratta anche di una relazione di vettori appartenenti anche ad A , quindi A sarebbe linearmente dipendente ottenendo così un assurdo.

Esercizio 1.6

Preso $\underline{v} \in A' \setminus A$ abbiamo che, per ipotesi, $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ (siccome A insieme di generatori), dunque $A' \subseteq \text{Span}(A) \implies \text{Span}(A') \subseteq \text{Span}(A) = V$, ma è chiaro che $A \subseteq A' \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A')$ (dove si è usato, nei due casi, la proposizione 1.9 e 1.10 rispettivamente). Concludiamo allora che $\text{Span}(A) = \text{Span}(A') = V$, dunque anche A' è un insieme di generatori.

Esercizio 1.7

Supponiamo che $A = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ insieme di generatori e osserviamo che possiamo sempre procedere come fatto nella dimostrazione dell'esistenza di una base, ricavandoci un insieme linearmente indipendente massimale: se A è linearmente indipendente, chiaramente, non c'è niente da fare. Se A invece non lo è possiamo considerare la relazione non banale

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

e supponendo, senza perdita di generalità, che $\alpha_n \neq 0$ allora

$$\underline{v}_n = -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \underline{v}_{n-1},$$

quindi si ha, in virtù del lemma 1.1.3, che $\text{Span}(A) = \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}_n\})$, quindi possiamo limitarci a considerare l'insieme $A \setminus \{\underline{v}_n\}$ e iterare il ragionamento finché non si ottiene un insieme linearmente indipendente: questo lemma ci assicura che lo Span rimane invariato.

Esercizio 1.8

Se considero un insieme di vettori linearmente indipendenti B è chiaro che se generano V non c'è niente da fare siccome rappresentano già una base dello spazio vettoriale. Se così non è, abbiamo mostrato che è sempre possibile trovare una base $\mathcal{B}$ nel nostro spazio vettoriale e, usando il lemma 1.2.2, sappiamo che è possibile trovare $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$ tale che $(\mathcal{B} \setminus \mathcal{B}') \cup B$ è ancora linearmente indipendente e ha lo stesso Span dell'insieme iniziale, dunque è effettivamente una base del nostro spazio vettoriale.

Esercizio 1.9

Sappiamo che W essendo sottospazio vettoriale, quindi pur sempre uno spazio vettoriale, ammette una base $\mathcal{W} = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m\}$: tale insieme rimane comunque un insieme linearmente indipendente di vettori di V , pertanto possiamo applicare il lemma 1.2.2 ad una base $\mathcal{B}$ di V (che sappiamo

esistere) per dedurre che $\#W \leq \#B$, ovvero $\dim(W) \leq \dim(V)$. Per quanto riguarda l'ultima richiesta dell'esercizio, osserviamo che l'implicazione verso sinistra $\boxed{\Leftarrow}$ è ovvia: se $V = W$ allora le dimensioni di V e W coincidono siccome una base di uno è base anche dell'altro; ma è altrettanto banale l'implicazione verso destra $\boxed{\Rightarrow}$ siccome si vede che se $\dim(W) = \dim(V)$ e $W \subseteq V$ allora una base di $n = \dim(W)$ vettori di W è anche una base di V (siccome si parla di $n = \dim(W) = \dim(V)$ vettori linearmente indipendenti di W e, dunque, di V).

Esercizio 1.10

Siccome $Z \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, dunque uno spazio vettoriale allora esiste una base $B = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ che possiamo completare a base di $B' = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k, \underline{v}_{k+1}, \dots, \underline{v}_n\}$, dunque $k \leq n$. Se $k = n$ allora estendendo vettori non aggiungo nulla, quindi $V = W$.

Esercizio 1.11

Supponiamo per assurdo che $U \cap W \neq \{0\}$: preso $\underline{v} \in U \cap W$, si ha, per definizione di intersezione, che $\underline{v} \in U$ e $\underline{v} \in W$: preso a questo punto un vettore $\underline{z} \in Z$ sappiamo per ipotesi che $\exists! \underline{u}' \in U, \underline{w}' \in W$ tali che $\underline{z} = \underline{u}' + \underline{w}'$ ma

$$\underline{z} = \underline{u}' + \underline{w}' = \underbrace{\underline{u}' + \underline{v} - \underline{v}}_{\in U} + \underbrace{\underline{w}' + \underline{v} - \underline{v}}_{\in W} = (\underline{u}' + \underline{v}) + (\underline{w}' - \underline{v}),$$

dove abbiamo il fatto che la legge di composizione interna produce vettori appartenenti sempre al sottospazio considerato. Segue allora che ogni vettore non può più essere scritto in maniera univoca, ottenendo così un assurdo. Segue così la tesi.

Esercizio 1.12

Supponiamo, senza perdita di generalità, che $A' = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ e $A'' = \{\underline{v}_{k+1}, \dots, \underline{v}_n\}$ (a meno di riarrangiare i termini), osserviamo che preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\begin{aligned} \underline{v} &= \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = (\underbrace{\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_k \underline{v}_k}_{\in \text{Span}(A')}) + (\underbrace{\alpha_{k+1} \underline{v}_{k+1} + \dots + \alpha_n \underline{v}_n}_{\in \text{Span}(A'')}) \implies \\ &\implies \text{Span}(A) = \text{Span}(A') + \text{Span}(A''). \end{aligned}$$

Rimane da mostrare che $\text{Span}(A') \cap \text{Span}(A'') = \{0\}$: se per assurdo non fosse così allora preso $\underline{v} \in \text{Span}(A') \cap \text{Span}(A'')$ sappiamo che $\underline{v} \in \text{Span}(A')$ e $\underline{v} \in \text{Span}(A'')$, dunque $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ non tutti nulli tali che

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_k \underline{v}_k = \alpha_{k+1} \underline{v}_{k+1} + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \implies \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots - \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0},$$

che rappresenta una relazione non banale fra vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ che si erano supposti linearmente indipendenti, ovvero un assurdo!

Esercizio 2.*

Osserviamo che la dimensione dello spazio delle matrici simmetriche U è pari a $\frac{n(n+1)}{2}$ e la dimensione dello spazio delle matrici antisimmetriche Z è pari a $\frac{n(n-1)}{2}$. E' chiaro che $U \cap Z = \{0\}$ e vediamo che

$$\dim(U) + \dim(Z) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2 + n + n^2 - n}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2 = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})),$$

e da qua possiamo concludere. Possiamo trovare esplicitamente tali matrici: abbiamo infatti che $U = A + A^t$ è simmetrica, siccome $U^t = (A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t = U$ mentre la matrice $Z = A - A^t$ è antisimmetrica, siccome $Z^t = (A - A^t)^t = A^t - (A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t) = -Z$ e

$$U + Z = A + A^t + A - A^t = 2A \implies A = \frac{U}{2} + \frac{Z}{2} = \frac{1}{2}(A + A^t) + \frac{1}{2}(A - A^t).$$

4.2 Prodotti scalari

4.2.1 Esercizio 3.1

E' chiaro che $(\cdot, \cdot)$ è simmetrica, siccome il prodotto fra numeri reali è commutativo, dunque presi

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \text{ e } \underline{w} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (\underline{v}, \underline{w}) &= (\alpha_1 \dots \alpha_n) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \beta_1 + \dots + \alpha_n \beta_n \stackrel{\text{prop. commutativa}}{=} \beta_1 \alpha_1 + \dots + \beta_n \alpha_n = \\ &= (\beta_1 \dots \beta_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = (\underline{w}, \underline{v}). \end{aligned}$$

Per quanto riguarda le proprietà ① e ②, osserviamo che, in virtù della proprietà di simmetria che abbiamo appena mostrato, è sufficiente mostrare che vale la ①. Per fare ciò, è necessario fare il

$$\text{conto prendendo } \underline{v} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}, \underline{w} = \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \vdots \\ \zeta_n \end{pmatrix} \text{ e } \underline{z} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \phi(\alpha \underline{v} + \beta \underline{w}, \underline{z}) &= \begin{pmatrix} \alpha \xi_1 + \beta \zeta_1 \\ \dots \\ \alpha \xi_n + \beta \zeta_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix} = (\alpha \xi_1 + \beta \zeta_1) \epsilon_1 + (\alpha \xi_2 + \beta \zeta_2) \epsilon_2 + \dots + (\alpha \xi_n + \beta \zeta_n) \epsilon_n = \\ &= (\alpha \xi_1 \epsilon_1 + \dots + \alpha \xi_n \epsilon_n) + (\beta \zeta_1 \epsilon_1 + \dots + \beta \zeta_n \epsilon_n) = \\ &= \alpha (\xi_1 \dots \xi_n) \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix} + \beta (\zeta_1 \dots \zeta_n) \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix} = \alpha (\underline{v}, \underline{z}) + \beta (\underline{w}, \underline{z}). \end{aligned}$$

Abbiamo quindi mostrato che, effettivamente, il prodotto scalare euclideo è una forma bilineare simmetrica.

function
 mathematicians despise art
 men deride mathematics
 mathematicians have similar feelings
 wholeheartedly, than that of the
 tion, criticism, appreciation, is worth
 point once in one of the few
 his Leslie Stoppard
 y that
 way,
 realize
 y-two
 has
 gift
 carried
 . And
 and developed in others, but I have not so
 so much deteriorated as to fancy that I
 e that a great scholar and a fine
 him in
 ad said
 emed to
 through
 a dialectic
 entirely
 there r
 m as c
 d I sha
 ics, it i
 er and
 mather
 the pati
 for math.
 ore genera
 y. This may be
 stellar astronomy and atomic physics are the only
 lar estimation. A mathematician need not now consi
 s not have to meet the sort of opposition describe b
 of metaphysics which forms the introduction to A
 ows Bradley, will be told that 'metaphysical knowi
 t is a contradiction. It is practically i
 , the sa
 worth
 natics
 is, the
 ginati
 s. All t
 nately, genuin
 matician must feel that it is r
 hematics rests, that the p
 e and confusion, and t
 try to make c

APPENDICE A

Logica

La logica è la parte della matematica che si occupa di studiare in maniera del tutto formale i sistemi logico-deduttivi, ovvero i sistemi che si appoggiano su un insieme di proposizioni che si *suppongono* vere e che vengono utilizzate per dedurre altre, dette *teoremi*. Definire che cosa sia una proposizione non è semplice: noi diremo che una proposizione è un'affermazione *sensata* per cui ha senso parlare di verità o falsità.

Basi a dimensione infinita

Abbiamo dimostrato che ogni spazio vettoriale a dimensione finita possiede una base. La dimostrazione da noi effettuata non è, tuttavia, valida quando si passa a dimensione infinita.

Si può recuperare, tramite l'assioma della scelta, il concetto di base che si ha a dimensione finita (ovvero di insieme di vettori linearmente indipendenti massimale) anche per spazi a dimensione infinita; sebbene sia poco pratica negli spazi infinito-dimensionali che solitamente si incontrano (ovvero spazi di Hilbert separabili). Enunciamo innanzitutto l'assioma della scelta

Assioma B.1 (Assioma della scelta). Sia X un insieme non vuoto e $\mathcal{P}^*(X) = \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$ l'insieme delle parti non vuote di X , allora esiste una funzione, detta funzione della scelta, $f : \mathcal{P}^*(X) \rightarrow X$ tale che $f(A) \in A \forall A \in \mathcal{P}^*(X)$

Questo è un assioma particolarmente controverso della matematica moderna, siccome comporta una serie di conseguenze paradossali come il paradosso di Banach-Tarski e la costruzioni di insiemi non misurabili secondo Lebesgue, ovvero l'insieme di Vitali; tuttavia, è necessario per garantire la possibilità di costruire un insieme scegliendo un elemento da ciascuno degli insiemi: quando abbiamo una famiglia finita di insiemi, la possibilità di fare ciò è garantita dagli assiomi della teoria ZF¹; mentre quando abbiamo un numero infinito di insiemi nulla ci assicura, dal punto di vista assiomatico, la possibilità di farlo. Tale assioma, tuttavia, non crea alcuna contraddizione con gli altri che regolano la teoria insiemistica: è stato, infatti, dimostrato che tale assioma è indipendente da quelli di ZF.

E' possibile dimostrare, ma non lo riporteremo, che l'assioma della scelta è equivalente al *lemma di Zorn*

Lemma B.0.1 (Lemma di Zorn). Ogni insieme induttivo ha un elemento massimale

Per capire bene che cosa questo lemma rappresenta, dobbiamo chiaramente andare a sviscerare il concetto di insieme induttivo e di elemento massimale, quindi riporto una serie di definizioni necessarie

Definizione B.1 (relazione). Sia A, B due insiemi, definiamo relazione $\mathcal{R}$ un sottoinsieme di $A \times B$. Due elementi $x \in A$ e $y \in B$ sono messi in relazione da $\mathcal{R}$ se

$$(x, y) \in \mathcal{R}$$

¹ZF, che sta per Zermelo-Frankel, è una sigla che si usa per indicare gli assiomi alla base della teoria degli insiemi, che necessiterebbero di un approfondimento troppo sostanzioso per essere inseriti in una mera appendice. Riassumendo parecchio, questi affermano che esiste l'insieme vuoto, è possibile effettuare l'unione e l'intersezione di insiemi ottenendo nuovamente degli insiemi, esiste l'insieme singoletto, ogni insieme non può contenere sé stesso e così via

e, in tal caso, si scrive $x\mathcal{R}y$.

Definizione B.2 (relazione d'ordine parziale). Sia A un insieme e sia $\leq \subseteq A \times A$ una relazione. Diremo che $\leq$ è una relazione d'ordine se

- $x \leq x \ \forall x \in A$ (proprietà riflessiva);
- $x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$ (proprietà antisimmetrica);
- $x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$ (proprietà transitiva).

L'esempio più semplice di relazione d'ordine è il $\leq$ che abbiamo su $\mathbb{Q}$, tuttavia è una relazione d'ordine totale, ovvero soddisfa una quarta proprietà (di totalità) secondo cui $\forall x, y \in A, x \leq y \vee y \leq x$. Una relazione d'ordine parziale non necessariamente è definita per tutti gli elementi, ovvero presi $x, y \in A$ non è detto che risulti sempre che $x \leq y$ oppure $y \leq x$: un esempio di relazione d'ordine parziale ma non totale è la relazione $\subseteq$ che si può introdurre studiando i sottoinsiemi di un insieme X : presi due elementi $x, y \in \mathcal{P}(X)$ **non** è detto che $x \subseteq y$ oppure $y \subseteq x$ (si pensi a $X = \{0, 1, 2\}$ e ai sottoinsiemi $\{1\}$ e $\{0\}$).

Definizione B.3 (insieme parzialmente ordinato). Un coppia $(A, \leq)$ si dice insieme parzialmente ordinato se $\leq$ è una relazione d'ordine parziale definita su A .

Definizione B.4 (catena). Sia $(A, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato, diremo che $C \in \mathcal{P}(A)$ è una catena se è totalmente ordinato dalla relazione d'ordine.

Definizione B.5 (elemento massimale). Sia $(A, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato, diremo che $x \in A$ è un elemento massimale se $\nexists y \in A : y > x$.