

Espansione in multipoli della gravità

Francesco Sermi

6 settembre 2026

A mia mamma, che mi ha cresciuto senza mai dubitare delle mie capacità.

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Gravitazione newtoniana	5
1.1.1	Deduzione dell'equazione di Poisson	7
2	Deviazioni dalla simmetria sferica	11
2.1	Sistema a simmetria sferica	11
2.2	Decomposizione in armoniche sferiche	12
2.2.1	Sviluppo dalla soluzione integrale	15
2.2.2	Momenti di multipolo	18
2.2.3	Corpi assialmente simmetrici	19
2.3	Decomposizione in tensori simmetrici tracefree	22
3	Ringraziamenti	25

Capitolo 1

Introduzione

Il campo gravitazionale generato da un corpo racchiude informazioni fondamentali sulla sua struttura interna. Risulta quindi essenziale studiare i contributi derivanti dalle deviazioni dalla simmetria sferica, i quali permettono di rispondere a numerosi interrogativi sulle caratteristiche del pianeta osservato. In questa breve dissertazione descriveremo l'espansione in multipoli nella gravità newtoniana, strumento cardine per lo studio di tali perturbazioni, applicandone i risultati a un sistema soggetto a interazioni mareali. Illustreremo infine come queste stesse configurazioni vengano modellate nel formalismo della Relatività Generale, in cui la gravità perde lo status di forza per divenire espressione della curvatura dello spaziotempo. È lecito domandarsi perché affrontare l'argomento in regime newtoniano. Sebbene da un secolo sia noto che non rappresenti la teoria definitiva della gravità, essa costituisce ancora oggi un'approssimazione eccellente in una grande varietà di contesti pratici e astrofisici. Descrive con accuratezza la struttura terrestre e le maree provocate dal Sole e dalla Luna; persino le simulazioni numeriche che tracciano l'evoluzione degli ammassi galattici, la cui formazione è dominata dall'influenza della materia oscura, si basano sulla gravitazione newtoniana. I limiti di questo approccio classico emergono solo quando ci si scontra con la sua incapacità di spiegare la precessione del perielio di Mercurio o la deflessione della luce, fenomeni confermati sperimentalmente e perfettamente coerenti con le previsioni della Relatività Generale. Il criterio fondamentale per stabilire quando sia valido ricorrere all'approssimazione newtoniana è dettato dal fattore di correzione relativistico:

$$\epsilon \sim \frac{GM}{rc^2} \sim \frac{v^2}{c^2}, \quad (1.1)$$

dove G è la costante di gravitazione universale, c è la velocità della luce, mentre M , r e v rappresentano rispettivamente la massa caratteristica, la dimensione (o distanza di separazione) e la velocità del sistema studiato.

1.1 Gravitazione newtoniana

Muoviamo i nostri primi passi nella teoria newtoniana partendo dal secondo principio della dinamica e dalla legge di gravitazione universale:

$$m_I \vec{a} = \vec{F}, \quad (1.2)$$

$$\vec{F} = -Gm_G M \frac{\vec{r}(t)}{|\vec{r}(t)|^3}. \quad (1.3)$$

Nella prima equazione, $\vec{F}$ è la forza agente sul corpo di massa inerziale m_I situato in posizione $\vec{r}(t)$ e $\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$ è la sua accelerazione. Nella seconda equazione, la forza $\vec{F}$ è di natura gravitazionale ed

è diretta lungo la retta che congiunge i due corpi. Queste rappresentano le equazioni del moto di un corpo in $\vec{r}(t)$ soggetto al campo di una massa M posta nell'origine del sistema di riferimento. La quantità G è la costante di gravitazione universale, il cui valore misurato è circa:

$$G = (6.6743 \pm 0.0001) \times 10^{-11}, \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}. \quad (1.4)$$

Si noti come l'intensità di questa forza decresca col quadrato della distanza e sia sempre attrattiva.

Una formulazione equivalente di queste leggi si ottiene esprimendo la forza come gradiente di una funzione scalare, il *potenziale newtoniano*, definito come:

$$U = \frac{GM}{r}. \quad (1.5)$$

Calcolandone il gradiente, sfruttando il fatto che $\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r}$, risulta banalmente che

$$(\nabla U)_i = \frac{\partial U}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x_i} = -\frac{GM}{r^2} \frac{x_i}{r} = -\frac{GM}{r^3} x_i, \quad (1.6)$$

da cui, riscrivendo l'espressione in forma vettoriale, si ottiene che

$$\vec{F} = m_G \nabla U. \quad (1.7)$$

Sostituendo nella (1.2) otteniamo

$$m_I \vec{a} = m_G \nabla U. \quad (1.8)$$

Nel caso in cui $m_I = m_G$, l'equazione si semplifica in

$$\vec{a} = \nabla U. \quad (1.9)$$

L'assunzione che la massa gravitazionale e la massa inerziale coincidano prende il nome di *principio di equivalenza debole*. Come conseguenza diretta, evidente nella (1.9), l'accelerazione subita da un corpo in un campo gravitazionale è indipendente dalla sua massa. Nel corso della trattazione assumeremo la validità di questo principio¹, il quale rappresenta il fondamento logico che ha condotto Einstein alla formulazione della Relatività Generale. Allo stato attuale, le leggi che governano il moto di un corpo in un campo gravitazionale newtoniano si riassumono nel sistema

$$\vec{a} = \nabla U, \quad (1.10)$$

$$U = \frac{GM}{r}. \quad (1.11)$$

Tuttavia, queste equazioni descrivono esclusivamente l'interazione tra punti materiali. Per i nostri scopi è necessario generalizzare la teoria a corpi estesi: distribuzioni continue di materia (solidi, liquidi o gas) di forma e dimensioni arbitrarie, capaci di evolvere dinamicamente. Un sistema del genere è descritto da un campo di densità $\rho(\vec{x}, t)$, un campo di pressione $p(\vec{x}, t)$ e un campo di velocità $\vec{v}(\vec{x}, t)$, vincolati dalle seguenti equazioni della fluidodinamica

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (\text{Equazione di continuità});$$

$$\textcircled{2} \quad \rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \rho \nabla U - \nabla p \quad (\text{Equazione di Eulero, con } \frac{D}{Dt} \text{ derivata materiale}).$$

L'equazione che lega il campo gravitazionale alla distribuzione spaziale della massa è l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U = -4\pi G \rho. \quad (1.12)$$

In questa sede non deriveremo le equazioni di continuità e di Eulero; ci concentreremo esclusivamente sulla deduzione dell'equazione di Poisson. Assumeremo pertanto di lavorare con configurazioni fisicamente sensate, in cui ρ e $\vec{v}$ soddisfino le suddette leggi di conservazione.

¹Recenti test sperimentali, come la missione satellitare MICROSCOPE, hanno verificato l'uguaglianza tra massa inerziale e gravitazionale con una precisione di una parte su 10^{15} .

1.1.1 Deduzione dell'equazione di Poisson

Uno dei principi cardine della meccanica newtoniana è la sovrapposizione degli effetti. Assumendo la validità di tale principio per il campo gravitazionale, il potenziale generato da un sistema discreto di N masse puntiformi nel punto $\vec{x}$ è la somma dei singoli contributi

$$U(\vec{x}) = \sum_{i=1}^N U_i = G \sum_{i=1}^N \frac{M_i}{|\vec{x} - \vec{x}_i|}, \quad (1.13)$$

dove $\vec{x}_i$ indica la posizione della massa i -esima. La generalizzazione al continuo è immediata: data una distribuzione di massa $\rho(\vec{x}', t)$, l'elemento infinitesimo di volume d^3x' situato in $\vec{x}'$ produce il potenziale di una massa puntiforme

$$dU(\vec{x}, t) = G \frac{dm}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = G \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'. \quad (1.14)$$

Integrando su tutto il dominio occupato dalla massa, si ottiene:

$$U(\vec{x}, t) = G \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'. \quad (1.15)$$

La (1.15) esprime il potenziale U come funzionale della densità ρ : essendo formulata come equazione integrale, il calcolo diretto del potenziale può risultare ostico. Possiamo tuttavia trasformarla in un'equazione differenziale sfruttando la seguente identità nel senso delle distribuzioni:

$$\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -4\pi\delta^3(\vec{x} - \vec{x}'), \quad (1.16)$$

che dimostreremo nella prossima sezione. Applicando l'operatore laplaciano ad ambo i membri della (1.15) e portandolo sotto il segno di integrale, ricaviamo istantaneamente l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U = G \int \rho(\vec{x}', t) \nabla^2 \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) d^3x' = G \int \rho(\vec{x}', t) [-4\pi\delta^3(\vec{x} - \vec{x}')] d^3x' = -4\pi G \rho(\vec{x}, t). \quad (1.17)$$

Inversamente, usando il formalismo delle funzioni di Green, è immediato verificare che la (1.15) è la soluzione dell'equazione di Poisson: sappiamo infatti che $\nabla^2 U = -4\pi G \rho$ ammette soluzione nella forma

$$U(\vec{x}, t) = \int \mathcal{G}(\vec{x} - \vec{x}') \rho(\vec{x}') d^3x', \quad (1.18)$$

dove il nucleo risolvete $\mathcal{G}(\vec{x})$ soddisfa $\nabla^2 \mathcal{G}(\vec{x}) = -4\pi G \delta^3(\vec{x})$. Confrontando con la (1.16), si identifica banalmente $\mathcal{G}(\vec{x} - \vec{x}') = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$.

Dimostrazione della (1.16)

Per dimostrare l'identità (1.16), occorre premettere i teoremi di Green.

Lemma 1.0.1 (Identità di Green).

Sia $V \subset \mathbb{R}^3$ un dominio compatto con frontiera sufficientemente regolare ∂V . Siano $\varphi \in C^2(V)$ e $\psi \in C^1(V)$. Allora valgono

①

$$\int_V (\psi \nabla^2 \varphi + \nabla \varphi \cdot \nabla \psi) d^3x = \oint_{\partial V} \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS, \quad (1.19)$$

dove $\frac{\partial}{\partial n} = \hat{n} \cdot \nabla$ denota la derivata direzionale normale e $\hat{n}$ è il versore normale uscente dalla superficie.

②

$$\int_V [\psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi] d^3x = \oint_{\partial V} \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) dS. \quad (1.20)$$

Dimostrazione. ① Sia $\vec{F} = \psi \nabla \varphi$. Applicando il teorema della divergenza

$$\int_V \nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) d^3x = \oint_{\partial V} (\psi \nabla \varphi) \cdot \hat{n} dS. \quad (1.21)$$

Sviluppando la divergenza a primo membro otteniamo $\nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) = \nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \psi \nabla^2 \varphi$. Sostituendo si ottiene immediatamente la prima identità di Green.

② Scriviamo la prima identità di Green invertendo i ruoli di φ e ψ :

$$\int_V (\varphi \nabla^2 \psi + \nabla \psi \cdot \nabla \varphi) d^3x = \oint_{\partial V} \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} dS. \quad (1.22)$$

Sottraendo questa espressione dalla prima identità, il termine simmetrico $\nabla \varphi \cdot \nabla \psi$ si elide, restituendo la tesi. $\square$

Dimostrazione della (1.16). Per $\vec{x} \neq \vec{x}'$, la funzione $f(\vec{x}) = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$ è regolare. Si calcola facilmente il suo laplaciano:

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_i - x'_i}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} \right) = \sum_{i=1}^3 \left[-\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} + \frac{3(x_i - x'_i)^2}{|\vec{x} - \vec{x}'|^5} \right] = 0$$

Poiché nell'origine ($\vec{x} = \vec{x}'$) la funzione diverge, non possiamo calcolare il laplaciano classicamente. Valutiamolo nel senso delle distribuzioni applicandolo a una funzione di test $\phi(\vec{x})$ a decadimento rapido, ovvero $\phi(\vec{x}) \in S(\mathbb{R}^3)$. L'azione del laplaciano distribuzionale è definita da:

$$\left\langle \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}, \phi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \nabla^2 \phi(\vec{x}) d^3x$$

Isoliamo la singolarità integrando su un dominio $V_{\varepsilon, R}$ definito come il volume compreso tra una sferetta S_ε di raggio ε centrata in $\vec{x}'$ e una sfera S_R di raggio $R \rightarrow \infty$. Sfruttando la seconda identità di Green nel dominio $V_{\varepsilon, R}$ (dove la funzione è regolare e il suo laplaciano è nullo):

$$\int_{V_{\varepsilon, R}} \left[\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \nabla^2 \phi(\vec{x}) - \underbrace{\phi(\vec{x}) \nabla^2 \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right)}_{=0} \right] d^3x = \oint_{\partial V_{\varepsilon, R}} \left[\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \frac{\partial \phi}{\partial n} - \phi \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) \right] dS$$

Essendo ϕ a decadimento rapido, nel limite $R \rightarrow \infty$ il contributo sulla frontiera esterna si annulla. Resta l'integrale sulla superficie sferica interna ∂S_ε : si osservi che, poiché la normale $\hat{n}$ uscente dal

dominio $V_{\varepsilon,R}$ punta verso $\vec{x}'$, sulla sferetta si ha $\hat{n} = -\hat{r}$, dunque, calcolandola su $r = |\vec{x} - \vec{x}'| = \varepsilon$, si ottiene che

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) = \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot (-\hat{r}) = \left(-\frac{1}{r^2} \hat{r} \right) \cdot (-\hat{r}) = \frac{1}{\varepsilon^2}$$

Esprimendo l'elemento d'area in coordinate sferiche $dS = \varepsilon^2 d\Omega$, il calcolo si riduce a

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{\partial S_\varepsilon} \left[\frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \phi}{\partial n} - \phi(\vec{x}) \frac{1}{\varepsilon^2} \right] \varepsilon^2 d\Omega = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\varepsilon \oint_{\partial S_\varepsilon} \frac{\partial \phi}{\partial n} d\Omega - \oint_{\partial S_\varepsilon} \phi(\vec{x}) d\Omega \right)$$

Poiché le derivate di ϕ sono limitate, il primo termine al tendere di $\varepsilon \rightarrow 0$ fa zero per via del fattore ε ; il secondo termine, invece, per la continuità di ϕ , fa in modo che la funzione valutata sulla sfera collassi nel suo valore al centro $\phi(\vec{x}')$. L'integrale sull'angolo solido dà banalmente 4π . Tenendo conto dell'orientazione del bordo, otteniamo

$$\left\langle \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}, \phi \right\rangle = -4\pi \phi(\vec{x}')$$

Per definizione di delta di Dirac, $\langle \delta^3(\vec{x} - \vec{x}'), \phi \rangle = \phi(\vec{x}')$, e dunque si conclude che

$$\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}').$$

□

Capitolo 2

Deviazioni dalla simmetria sferica

Nel capitolo precedente abbiamo visto che un sistema caratterizzato da una densità $\rho(\vec{x}, t)$ soddisfa l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U(\vec{x}, t) = -4\pi G \rho(\vec{x}, t) \quad (2.1)$$

che in questo capitolo ci prefiggiamo di risolvere nel caso in cui vi siano deviazioni dalla simmetria sferica. È istruttivo studiare inizialmente il caso con simmetria sferica perfetta per poi passare al caso più generale.

2.1 Sistema a simmetria sferica

Riscriviamo il laplaciano in coordinate sferiche e lo inseriamo nell'equazione di Poisson:

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] U = -4\pi G \rho. \quad (2.2)$$

Se il sistema gode di simmetria sferica, il potenziale dipende esclusivamente dalla coordinata radiale r ; pertanto l'equazione si riduce a

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) = -4\pi G \rho(r, t), \quad (2.3)$$

da cui si ottiene

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{4\pi G}{r^2} \int_0^r \rho(r', t) (r')^2 dr' + \frac{C(t)}{r^2}. \quad (2.4)$$

La costante di integrazione $C(t)$ va posta a zero. Fisicamente, infatti, $\frac{\partial U}{\partial r}$ rappresenta il campo gravitazionale radiale. Nell'origine ($r = 0$) la direzione radiale non è definita: una forza netta non nulla in quel punto punterebbe in una direzione preferenziale, rompendo la simmetria sferica del sistema. Inoltre, se $C(t)$ fosse diversa da zero, il termine divergerebbe. In definitiva si ha:

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{4\pi G m(r, t)}{r^2}, \quad (2.5)$$

dove abbiamo definito la massa contenuta entro il raggio r :

$$m(r, t) = \int_0^r \rho(r', t) (r')^2 dr'. \quad (2.6)$$

Assumendo che il corpo sia confinato nello spazio, esiste un raggio R tale per cui $\rho(r) = 0$ per ogni $r > R$. Pertanto, la massa totale

$$M \equiv m(R, t) = \int_0^R \rho(r', t) (r')^2 dr' \quad (2.7)$$

è una costante nel tempo. Lo si dimostra facilmente:

$$\frac{dM}{dt} = \int_0^R \frac{\partial \rho(r', t)}{\partial t} (r')^2 dr' = \int_0^R -\frac{1}{(r')^2} \nabla_r (\rho(r', t) v_r) (r')^2 dr' = 0, \quad (2.8)$$

dove abbiamo usato l'equazione di continuità in coordinate sferiche e il fatto che la densità e la velocità radiale v_r siano nulle sul bordo del volume di integrazione. Abbiamo quindi mostrato che la massa totale del sistema si conserva. Inoltre, poiché per $r > R$ la densità si annulla, il campo gravitazionale all'esterno del corpo è dato da:

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{4\pi G M}{r^2} \implies U(r) = \frac{4\pi G M}{r}. \quad (2.9)$$

Il potenziale all'esterno coincide con quello generato da una massa puntiforme M posta nel centro del sistema: integrando l'equazione di Poisson abbiamo ottenuto una dimostrazione molto più diretta del teorema del guscio sferico di Newton.

2.2 Decomposizione in armoniche sferiche

La simmetria sferica è una semplificazione utile, ma è raro che i corpi celesti siano perfettamente simmetrici. La rotazione attorno a un asse, l'interazione con altri corpi e le tensioni interne (come gli stress crostali delle stelle di neutroni) causano deviazioni da questa configurazione ideale. Quando tali deviazioni sono piccole, si procede tramite un'espansione in multipoli. Poiché il contributo dei momenti di ordine superiore tende a decrescere rapidamente, un troncamento dello sviluppo ai primi termini offre una buona descrizione del potenziale gravitazionale per la maggior parte dei problemi di interesse. Nel caso della Terra, la misurazione dei momenti di multipolo fino a $l = 360$ (che quantificano le variazioni del campo gravitazionale su scale di centinaia di chilometri) ha permesso di studiare fenomeni come la deriva dei continenti, il vulcanismo e la struttura interna del pianeta. Questo approccio analitico, tuttavia, è limitato a sistemi approssimativamente sferici: le galassie a spirale, ad esempio, si discostano marcatamente da tale geometria, obbligando a ricorrere a metodi analitici differenti o a simulazioni numeriche per ricavarne il potenziale.

Ricordiamo che le armoniche sferiche Y_{lm} sono autofunzioni dell'operatore differenziale angolare:

$$\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] Y_{lm} = -l(l+1) Y_{lm}, \quad (2.10)$$

con l intero non negativo e $m \in \{-l, \dots, l\}$ e riconosciamo, nel termine a sinistra, la parte angolare del laplaciano. Dalla teoria di Sturm-Liouville sappiamo che queste funzioni costituiscono una base ortogonale e completa per lo spazio $L^2(S^2)$, ossia lo spazio delle funzioni a quadrato integrabile definite sulla sfera. Pertanto, vale la relazione di ortonormalità:

$$\int_{S^2} Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{l'm'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}, \quad (2.11)$$

e per ogni funzione $f \in L^2(S^2)$ si ha:

$$f(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.12)$$

con i coefficienti dati da:

$$f_{lm} = \int_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) f(\theta, \phi) d\Omega. \quad (2.13)$$

Possiamo quindi sviluppare sia la densità che il potenziale in serie di armoniche sferiche, ottenendo

$$\rho(r, \theta, \phi, t) = \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l \rho_{lm}(r, t) Y_{lm}(\theta, \phi), \quad U(r, \theta, \phi, t) = \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l U_{lm}(r, t) Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.14)$$

dove i coefficienti dipendono da r e t , poiché la proiezione viene effettuata su superfici sferiche a raggio e tempo fissati, e sono dati da

$$\rho_{lm}(r, t) = \int_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) \rho(r, \theta, \phi, t) d\Omega, \quad U_{lm}(r, t) = \int_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) U(r, \theta, \phi, t) d\Omega. \quad (2.15)$$

Inserendo questi sviluppi nell'equazione di Poisson si ottiene:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l U_{lm} Y_{lm} = \\ & = -4\pi G \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l \rho_{lm} Y_{lm}. \end{aligned} \quad (2.16)$$

Poiché le Y_{lm} sono linearmente indipendenti, l'uguaglianza deve valere termine a termine per ogni coppia (l, m) , portando a:

$$\left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - l(l+1) \right] U_{lm}(r, t) = -4\pi G r^2 \rho_{lm}(r, t). \quad (2.17)$$

In questo modo abbiamo ricondotto un'equazione alle derivate parziali a un sistema infinito di equazioni differenziali ordinarie disaccoppiate. Per risolvere queste equazioni utilizziamo il metodo delle funzioni di Green, definendo l'operatore differenziale

$$\mathcal{L} = \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - l(l+1), \quad (2.18)$$

cerchiamo una funzione $g_l(r, r')$ che soddisfi

$$\mathcal{L} g_l(r, r') = -4\pi \delta(r - r'). \quad (2.19)$$

Una volta determinata g_l , ogni coefficiente U_{lm} potrà essere calcolato come

$$U_{lm}(r, t) = G \int_0^\infty g_l(r, r') \rho_{lm}(r', t) (r')^2 dr'. \quad (2.20)$$

L'operatore $\mathcal{L}$ e, di conseguenza, la funzione di Green dipendono dall'indice l ma non da m . Per $r \neq r'$, l'equazione per g_l si riduce a quella omogenea:

$$\mathcal{L} g_l(r, r') = 0. \quad (2.21)$$

Cercando soluzioni della forma r^γ , si ha

$$\left[\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - l(l+1) \right] r^\gamma = 0 \implies \gamma(\gamma+1) - l(l+1) = 0. \quad (2.22)$$

La combinazione lineare delle due radici indipendenti fornisce:

$$g_l(r, r') = A(r')r^l + B(r')r^{-(l+1)}. \quad (2.23)$$

I coefficienti A e B dipendono da r' poiché tale variabile gioca il ruolo di parametro per l'equazione differenziale in r . Affinché il potenziale sia fisicamente accettabile, non deve presentare divergenze spurie. Per $r < r'$, richiediamo che la soluzione sia regolare nell'origine ($r \rightarrow 0$); pertanto imponiamo $B = 0$:

$$g_<(r, r') = A(r')r^l. \quad (2.24)$$

Analogamente, per $r > r'$, richiediamo che il potenziale si annulli all'infinito ($r \rightarrow \infty$); pertanto imponiamo $A = 0$:

$$g_>(r, r') = B(r')r^{-(l+1)}. \quad (2.25)$$

Combinando i risultati mediante il gradino di Heaviside, si ottiene:

$$g_l(r, r') = A(r')r^l \theta(r' - r) + B(r')r^{-(l+1)} \theta(r - r'). \quad (2.26)$$

Imponendo infine la continuità della funzione di Green in $r = r'$, si ricava la condizione

$$A(r')(r')^l = B(r')(r')^{-(l+1)}, \quad (2.27)$$

dunque possiamo riscrivere nella seguente forma

$$g_l(r, r') = C(r') \left[\frac{r^l}{(r')^l} \theta(r' - r) + \frac{r^{-(l+1)}}{(r')^{-(l+1)}} \theta(r - r') \right]. \quad (2.28)$$

ed integrando l'equazione differenziale fra $[r' - \varepsilon, r' + \varepsilon]$ con $\varepsilon \rightarrow 0$ si ottiene che

$$\int_{r'-\varepsilon}^{r'+\varepsilon} \left[\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right] g_l(r, r') = -4\pi. \quad (2.29)$$

Si noti che il termine proporzionale all'integrale di $g_l(r, r')$ si annulla per continuità nel limite di $\varepsilon \rightarrow 0$: rimane dunque

$$\int_{r'-\varepsilon}^{r'+\varepsilon} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial g_l(r, r')}{\partial r} \right) \right] = -4\pi, \quad (2.30)$$

in cui si ottiene che

$$C(r') [(-l+1)(r') - (l+2)(r')] = -4\pi \implies C(r') = \frac{4\pi}{2l+1} \frac{1}{r'}. \quad (2.31)$$

La funzione di Green dell'operatore $\mathcal{L}$ risulta, dunque, essere

$$g_l(r, r') = \frac{4\pi}{2l+1} \left[\frac{r^l}{(r')^{l+1}} \theta(r' - r) + \frac{(r')^l}{r^{l+1}} \theta(r - r') \right], \quad (2.32)$$

che può essere riscritta in forma più compatta introducendo $r_> = \max\{r, r'\}$ e $r_< = \min\{r, r'\}$, ottenendo

$$g_l(r, r') = \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}. \quad (2.33)$$

Sostituendo nella (2.20) si ottiene che

$$\begin{aligned} U_{lm}(r, t) &= \frac{4\pi G}{2l+1} \int_0^{+\infty} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} \rho_{lm}(r', t) dr' = \\ &= \frac{4\pi G}{2l+1} \left[r^l \int_r^{+\infty} \frac{\rho_{lm}(r', t)}{(r')^{l+1}} (r')^2 dr' + \frac{1}{r^{l+1}} \int_0^r (r')^l \rho_{lm}(r', t) (r')^2 dr' \right]. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Risulta quindi che il potenziale newtoniano è quindi dato da

$$U(r, t, \theta, \phi) = G \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \left[q_{lm}(r, t) \frac{Y_{lm}(\theta, \phi)}{r^{l+1}} + p_{lm}(r, t) r^l Y_{lm}(\theta, \phi) \right], \quad (2.35)$$

dove abbiamo posto

$$q_{lm}(r, t) \equiv \int_0^r (r')^l \rho_{lm}(t, r') (r')^2 dr', \quad (2.36)$$

e

$$p_{lm}(r, t) \equiv \int_r^R \frac{\rho_{lm}(t, r')}{(r')^{l+1}} (r')^2 dr'. \quad (2.37)$$

All'interno del corpo, abbiamo che $\rho_{lm}(r, t) \neq 0$, dunque nella definizione di $p_{lm}(t, r)$ abbiamo troncato il risultato fino a quello di una sfera di raggio R che circonda tutta la distribuzione di massa. Per quanto riguarda l'esterno del corpo, invece, abbiamo che $p_{lm} = 0$, in quanto per $r > R$ abbiamo che $\rho_{lm}(r, t) = 0$, pertanto

$$U_{\text{ext}}(r, t, \theta, \phi) = G \sum_{lm} \frac{4\pi}{2l+1} q_{lm}(R, t) \frac{Y_{lm}(\theta, \phi)}{r^{l+1}}, \quad (2.38)$$

dove l'integrale di q_{lm} viene troncato fino ad R sempre per le ragioni esposte sopra.

2.2.1 Sviluppo dalla soluzione integrale

Tutti questi risultati potevano, in realtà, essere ottenuti direttamente dalla soluzione integrale (1.15), esprimendo $\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$ in termini delle armoniche sferiche: per farlo, si osserva che la decomposizione rispetto ad una base ortogonale e completa di funzioni è unica; pertanto possiamo utilizzare la conoscenza del potenziale newtoniano in una regione limitata (dove qua si intende che non è tutto lo spazio $\mathbb{R}^3$, ma può essere anche una regione illimitata) in cui sappiamo esprimere esattamente il potenziale per ricostruire la forma esatta in tutto il resto dello spazio. Se indichiamo con $\vec{x}'$ la posizione della massa, allora su tutto l'asse identificato da $\hat{x}'$ sappiamo scrivere il potenziale, che assume una forma molto semplice, ponendo con x' la distanza radiale dall'origine, allora nel punto $x\hat{x}'$ abbiamo che

$$U(\vec{x}, t) = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{|x - x'|}, \quad (2.39)$$

da cui, distinguendo i casi

① se $x > x'$, allora si ha che

$$\frac{1}{|x - x'|} = \frac{1}{x(1 - \frac{x'}{x})} = \frac{1}{x} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{x'}{x}\right)^l = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(x')^l}{x^{l+1}}, \quad (2.40)$$

② se $x < x'$, allora si ha che

$$\frac{1}{|x - x'|} = \frac{1}{x'(1 - \frac{x}{x'})} = \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{x^l}{(x')^{l+1}}\right). \quad (2.41)$$

Con le $r_<$ e $r_>$ già introdotte, possiamo compattificare la notazione in

$$\frac{1}{|x - x'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}, \quad (2.42)$$

poiché lungo l'asse $\hat{x}'$ abbiamo simmetria azimutale, ci aspettiamo che la nostra soluzione sia esprimibile come

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} [A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \gamma), \quad (2.43)$$

da cui, confrontando la forma della (2.43) con la (2.42), si ottiene che

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} P_l(\cos \gamma), \quad (2.44)$$

dove γ è l'angolo fra $\vec{x}$ e $\vec{x}'$: abbiamo che

$$\begin{aligned} \cos \gamma &= \frac{\vec{x} \cdot \vec{x}'}{xx'} = \cos \phi \cos \phi' \sin \theta \sin \theta' + \sin \phi \sin \phi' \sin \theta \sin \theta' + \cos \theta \cos \theta' = \\ &= \sin \theta \sin \theta' (\cos \phi \cos \phi' + \sin \phi \sin \phi') + \cos \theta \cos \theta' = \\ &= \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi') + \cos \theta \cos \theta'. \end{aligned} \quad (2.45)$$

A questo punto, si utilizza il seguente risultato matematico, che prende il nome di *teorema di addizione* delle armoniche sferiche, per cui risulta che

$$P_l(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.46)$$

da cui otteniamo che

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (2.47)$$

Sostituendo ρ decomposta nelle armoniche sferiche, si riottiene esattamente la (2.34)

Dimostrazione del teorema di addizione delle armoniche sferiche

Vogliamo adesso dimostrare formalmente che

$$P_l(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.48)$$

dove ricordiamo che

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos \phi - \phi', \quad (2.49)$$

e rappresenta l'angolo fra il vettore $\vec{x}$ e il vettore $\vec{x}'$.

Per fare questa dimostrazione supporremo che $\vec{x}'$ sia fissato nello spazio: vediamo che se tramite una rotazione andiamo ad allineare i nostri assi in maniera tale che $\vec{x}' \parallel \hat{z}$, allora abbiamo che $\gamma = \theta$, ovvero l'angolo γ diventa semplicemente l'angolo polare a cui siamo abituati. Conseguentemente, ricordando che ∇^2 è invariante rispetto a rotazioni: si può vedere facilmente osservando che

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x'_j} \frac{\partial x'_j}{\partial x_i} = \sum_j (R)_{ji} \frac{\partial}{\partial x'_j}, \quad (2.50)$$

pertanto

$$\nabla \cdot \nabla = \sum_j \sum_m (R)_{ji} (R)_{mi} \frac{\partial}{\partial x'_j} \frac{\partial}{\partial x'_m}, \quad (2.51)$$

da cui, usando la relazione di ortogonalità che soddisfano le rotazioni, sappiamo che

$$RR^T = \mathbf{1} \iff (R)_{ij} (R^T)_{jl} = (R)_{ij} (R)_{lj} = \delta_{il}, \quad (2.52)$$

permettendoci, così, di concludere, in quanto si ha che

$$\nabla \cdot \nabla = \sum_j \sum_m \delta_{jm} \frac{\partial^2}{\partial x_j'^2 \partial x_m'} = \sum_j \frac{\partial^2}{\partial x_j'^2} = \nabla' \cdot \nabla'. \quad (2.53)$$

Ne consegue, allora, che il polinomio di Legendre $P_l(\cos \gamma)$ soddisfa la seguente equazione differenziale

$$(\nabla')^2 P_l(\cos \gamma) + \frac{l(l+1)}{r^2} P_l(\cos \gamma) = 0, \quad (2.54)$$

in quanto se prendiamo $\vec{x}' \parallel \hat{z}$ (con una rotazione), allora, nelle nuove coordinate, solamente il termine con le derivate in $\frac{\partial}{\partial \theta}$ andrà ad “interagire” con il polinomio di Legendre, ma in virtù dell'invarianza sotto rotazioni, questa equazione differenziale sarà vera anche se $\vec{x}' \nparallel \hat{z}$. Supponendo, allora, che

$$P_l(\cos \gamma) = \sum_{l'=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{l'm}(\theta', \phi') Y_{l'm}(\theta, \phi), \quad (2.55)$$

si vede dall'equazione qua sopra che viene soddisfatta dai polinomi di Legendre che ciò è possibile se e solo se $\forall l' \neq l, A_{l'm} = 0$, dunque

$$P_l(\cos \gamma) = \sum_{m=-l}^l A_m(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (2.56)$$

I coefficienti A_m sono, ovviamente, dati da

$$A_{lm} = \int_{S^2} Y_{lm}^*(\theta, \phi) P_l(\cos \gamma) d\Omega, \quad (2.57)$$

tuttavia, ricordando che per $m = 0$ si ha che

$$P_l(\cos \gamma) = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{l0}, \quad (2.58)$$

possiamo vedere che i coefficienti altro non sono che lo sviluppo della funzione $\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{lm}^*$ nella base delle armoniche sferiche con gli assi primati

2.2.2 Momenti di multipolo

Le quantità $q_{lm}(R, t)$ vengono chiamate *momenti di multipolo* della distribuzione di massa: in virtù di quanto fatto nella precedente sezione, vediamo che questi sono dati da

$$I_{lm}(t) = \int_V \rho(\vec{x}, t) r^l Y_{lm}^*(\theta, \phi) d^3x, \quad (2.59)$$

dove il volume di integrazione V si estende oltre il volume occupato dalla materia. Abbiamo, dunque, che il potenziale fuori dalla distribuzione di massa è dunque dato da

$$U_{\text{ext}}(\vec{x}, t) = G \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} I_{lm}(t) \frac{Y_{lm}(\theta, \phi)}{r^{l+1}}. \quad (2.60)$$

Il momento corrispondente a $l = m = 0$ è il momento di monopolio, legato alla massa del corpo, in quanto

$$I_{00} = \int_V \rho Y_{00} d^3x = \frac{M}{\sqrt{4\pi}}, \quad (2.61)$$

mentre per $l = 1$ e $m = -1, 0, 1$ prendono il nome di momenti di dipolo. Questi sono tutti nulli se piazziamo l'origine del nostro sistema di coordinate nel centro di massa della distribuzione di massa che stiamo studiando, in quanto per un tale sistema abbiamo che

$$\vec{x}_{\text{CM}} = \int_V \rho(\vec{x}) \vec{x} d^3x = \vec{0}, \quad (2.62)$$

ovvero, in maniera più esplicita, si ha che

$$\int_V \rho(\vec{x}) (\vec{x})_i d^3x = 0. \quad (2.63)$$

Computando i momenti di dipolo, si ottiene che

$$I_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \int_V \rho r \cos \theta d^3x = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \int_V \rho z d^3x = 0, \quad (2.64)$$

$$I_{1\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \int_V \rho r \sin \theta e^{\pm i\phi} d^3x = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \int_V \rho (x \pm iy) d^3x = 0, \quad (2.65)$$

come già annunciato.

Per $l = 2$ abbiamo i momenti di quadrupolo, per $l = 3$ quelli di ottopolo e così via: in generale,

questi coefficienti che moltiplicano le armoniche sferiche corrispondono a delle configurazioni di massa abbastanza semplici, come il potenziale dovuto ad una singola massa, a due masse e così via. Fisicamente, stiamo vedendo il potenziale come sovrapposizione di potenziali di tante configurazioni di massa diverse: concettualmente, questi momenti di multipolo che abbiamo introdotto qua sono virtualmente equivalenti a quelli normalmente utilizzati in elettrodinamica, dove chiaramente al posto della densità di massa si parla di densità di carica in un dato volume. In generale, si osservi che i momenti di multipolo di ordine l scalano come MR^l , dove con R intendiamo la scala caratteristica del corpo.

2.2.3 Corpi assialmente simmetrici

Un caso di particolare interesse è quello dei corpi assialmente simmetrici, ossia quei corpi la cui distribuzione di massa è invariante rispetto a rotazioni attorno ad un asse, che diremo *asse di simmetria*. In questo caso, prendendo l'asse z allineato con l'asse di simmetria, vediamo che la densità non dipende dall'angolo azimutale ϕ , ovvero $\rho(\vec{x}, t) = \rho(r, \theta, t)$. Si osservi che per $m \neq 0$ l'integrale su ϕ si annulla, in quanto sappiamo che

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad (2.66)$$

e poiché

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi} d\phi = \frac{1}{m} e^{im\phi} \Big|_0^{2\pi} = 0, \quad (2.67)$$

si conclude che i momenti di multipolo di un corpo assialmente simmetrico sono tutti nulli per $m \neq 0$. In questo caso, il potenziale gravitazionale esterno si riduce a

$$U_{\text{ext}}(r, \theta) = G \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2l+1} I_{l0} \frac{Y_{l0}(\theta)}{r^{l+1}}. \quad (2.68)$$

Oltre a questo, per i corpi a simmetria assiale, è conveniente introdurre le seguenti quantità adimensionali, dette *momenti di multipolo adimensionali*, così definite:

$$\mathcal{J}_l \equiv -\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \frac{I_{l0}}{MR^l}, \quad (2.69)$$

In questo moto, possiamo riscrivere il potenziale osservando che per $l = 1$, se posiziamo l'origine nel centro di massa, abbiamo che $I_{10} = 0$, quindi il primo termine non nullo dopo $l = 0$ è ovviamente quello per $l = 2$, dunque

$$U_{\text{ext}}(r, \theta) = -\frac{GM}{r} \left[1 - \sum_{l=2}^{\infty} \mathcal{J}_l \left(\frac{R}{r} \right)^l P_l(\cos \theta) \right]. \quad (2.70)$$

Si osservi che il momento di multipolo adimensionale per $l = 2$ può essere espresso in termini dei momenti principali di inerzia: prima di procedere a vedere come questo possa essere fatto, richiamiamo alcuni fatti sui momenti di inerzia di un corpo. Ricordiamo che, in generale, i momenti di inerzia di un corpo rispetto al centro di massa sono dati da

$$I_{ij}(t) = \int_V \rho(\vec{x}', t) (\vec{r}'^2 \delta_{ij} - x'_i x'_j) d^3x', \quad (2.71)$$

dove con $\vec{r} \equiv \vec{x}_{CM} - \vec{x}'$ si intende la distanza del frammentino infinitesimo di massa dal centro di massa. Noi, per comodità, ci siamo già messi nel sistema di riferimento in cui $\vec{x}_{CM} = \vec{0}$, ovvero coincide con l'origine, dunque $\vec{r} = -\vec{x}'$.

In generale, come si può vedere dalla definizione qua sopra, il tensore di inerzia è una matrice reale 3×3 simmetrica, dunque diagonalizzabile in virtù del teorema spettrale, i cui autovalori sono i momenti principali di inerzia: per un corpo assialmente simmetrico, prendendo l'asse z allineato con l'asse di simmetria, si osserva che i termini fuori diagonale sono nulli, in quanto

$$\begin{aligned} \int_V \rho(r', \theta', t) x' y' d^3 x' &\propto \int_0^{2\pi} \sin(2\phi') d\phi' = 0, \\ \int_V \rho(r', \theta', t) x' z' d^3 x' &\propto \int_0^{2\pi} \cos(\phi') d\phi' = 0, \\ \int_V \rho(r', \theta', t) y' z' d^3 x' &\propto \int_0^{2\pi} \sin(\phi') d\phi' = 0. \end{aligned} \quad (2.72)$$

e in virtù della simmetria si conclude che la matrice di un corpo assialmente simmetrico è già diagonale, dunque gli autovalori sono semplicemente dati da

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int_V \rho(\vec{x}', t) ((y')^2 + (z')^2) d^3 x', \\ I_{yy} &= \int_V \rho(\vec{x}', t) ((x')^2 + (z')^2) d^3 x', \\ I_{zz} &= \int_V \rho(\vec{x}', t) ((x')^2 + (y')^2) d^3 x'. \end{aligned} \quad (2.73)$$

Si osservi che $I_{xx} = I_{yy}$, in quanto

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int_V \rho(\vec{x}', t) ((y')^2 + (z')^2) d^3 x' = \\ &= \int_V \rho(r', \theta', t) ((r')^2 \sin^2 \theta' \sin^2 \phi' + (r')^2 \cos^2 \theta') (r')^2 \sin \theta' dr' d\theta' d\phi' \\ &\stackrel{\phi' \rightarrow \phi' + \frac{\pi}{2}}{=} \int_V \rho(r', \theta', t) ((r')^2 \sin^2 \theta' \cos^2 \phi' + (r')^2 \cos^2 \theta') (r')^2 \sin \theta' dr' d\theta' d\phi' = I_{yy}. \end{aligned} \quad (2.74)$$

Dunque, ponendo $I_{xx} = I_{yy} = I$ il momento di inerzia è della forma

$$I = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix} \quad (2.75)$$

A questo punto, si ricordi che

$$Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1), \quad (2.76)$$

dunque

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_2 &= -\frac{1}{MR^2} \int_V \rho(r', \theta', t) (r')^2 \frac{3 \cos^2 \theta' - 1}{2} d^3 x' = \int_V \rho(r', \theta', t) \frac{(r')^2 - 3z'^2}{2} d^3 x' = \\ &= \frac{1}{MR^2} \int_V \rho(r', \theta', t) \frac{[x'^2 + y'^2 - 2z'^2]}{2} d^3 x' = \\ &= \frac{1}{MR^2} \int_V \rho(r', \theta', t) \left[(x')^2 + (y')^2 - \frac{1}{2}((x')^2 + (z')^2) - \frac{1}{2}((y')^2 + (z')^2) \right] d^3 x' = \\ &= \frac{I_{zz} - \frac{1}{2}(I_{xx} + I_{yy})}{MR^2} = \frac{I_{zz} - I}{MR^2}, \end{aligned} \quad (2.77)$$

dove abbiamo usato il fatto che $I_{xx} = I_{yy} = I$. Nel caso di un corpo non assialmente simmetrico, sebbene compaiano anche le armoniche sferiche con $m \neq 0$, il momento di multipolo adimensionale è comunque

Momenti di multipolo del campo gravitazionale terrestre

I momenti di multipolo della Terra quantificano quanto questa devia dalla simmetria sferica. In maniera generale, i pianeti e le stelle ruotano così lentamente che le loro deviazioni sono molto piccole e, tendenzialmente, le altre sorgenti di asimmetria sono ancora più piccole.

I momenti di multipolo della Terra sono stati determinati attraverso lo studio del modo dei satelliti che orbitano attorno ad essa: i coefficienti delle armoniche sferiche misurati indirettamente sono stati poi raccolti all'interno di un grandissimo *dataset* con cui è possibile andare a ricostruire il campo gravitazionale della Terra: una raffigurazione di questo è dato nell'immagine 2.1




Figura 2.1: Raffigurazione del campo gravitazionale terrestre. Le differenze di esso fra le diverse regione del globo sono evidenziate tramite il colore e l'elevazione

Si osserva che il momento adimensionale $\mathcal{J}_2 = 1.083 \times 10^{-3}$ e per $l > 2$ i momenti adimensionali successivi sono ancora più piccoli, all'incirca 3 ordini di grandezza più piccoli. Le deviazioni dalla simmetria assiale sono ancora più piccole: in buona approssimazione, dunque, la terra può essere quindi considerata come un corpo sferico per la maggior parte dei fenomeni studiati; tuttavia è bene tenere presente, in eventuali applicazioni in cui è richiesto un elevato grado di precisione, che la Terra non gode né di simmetria sferica né di simmetria assiale, sebbene, anche in quest'ultimo caso, i coefficienti delle armoniche sferiche con $m \neq 0$ sono ancora più piccoli di quelli relativi alle armoniche assialmente asimmetriche.

L'immagine 2.1, può essere ricreata, tramite il dataset, tenendo a mente che è stato introdotto un fattore moltiplicativo di circa 10^4 nei coefficienti delle armoniche sferiche per evidenziare “visivamente” il contributo date dalle armoniche per $m \neq 0$; inoltre, viene trascurato anche il termine di quadrupolo ($l = 2$), che è dominante: questo corrisponderebbe al campo gravitazionale generato

da due masse poste una di fronte all'altra (in piena analogia all'elettrostatica) con la congiungente ortogonale all'asse di simmetria (ovvero l'asse di rotazione della Terra), quindi visivamente, ci aspetteremo un'allargamento all'equatore e uno schiacciamento ai poli.

Un problema che sorge, tuttavia, nel cercare di ricreare l'immagine 2.1 è la computazione delle armoniche sferiche di grado l elevato, a causa delle grandissime variazioni che queste subiscono in corrispondenza di $\theta = 0$ e $\theta = \pi$, che eccedono di parecchio il formato di memorizzazione definito dalla standard *IEEE 754*. Un modo per risolvere questo è l'implementazione algoritmica dovuta a S.A. Holmes e W.E. Featherstone della sommatoria di Clenshaw per la computazione delle armoniche sferiche, che rende il processo numericamente stabile fino a $l = 2700$: una spiegazione dell'algoritmo viene fornito nelle appendici e i più interessati trovare maggiori informazioni in [1].

2.3 Decomposizione in tensori simmetrici tracefree

Un'altra decomposizione molto utile del campo gravitazionale coinvolge le combinazioni tensoriali del vettore unitario $\vec{n} \equiv \frac{\vec{x}}{r}$, piuttosto che le armoniche sferiche. Ogni tensore che costruiremo da esso avrà la proprietà di essere simmetrico sotto lo scambio di ognuno dei suoi indici e di avere traccia nulla, pertanto in letteratura sono noti come *symmetric tracefree tensors* o, più brevemente, *STF tensors*.

Anche questi tensori, così come le armoniche sferiche, prendono come mattoncini fondamentali le rappresentazioni irriducibili del gruppo delle rotazioni, andandole ad etichettare con l'indice di multipolo l . E' bene tenere a mente una distinzione fondamentale: le armoniche sferiche dipendono dalle coordinate sferiche, tenendo le variabili angolari (θ, ϕ) separate dalla componente radiale r ; i tensori *STF* invece fanno affidamento alle coordinate cartesiane originali, che si mescolano fra di loro indistamente.

Partiamo dall'espansione del potenziale esterno ad una distribuzione di massa, che è dato da

$$U(\vec{x}, t) = G \int_V \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3 x', \quad (2.78)$$

e consideriamo un punto $\vec{x}$ che sta al di fuori della distribuzione di massa. Chiaramente, se $|\vec{x}'| \ll |\vec{x}|$ possiamo effettuare un'espansione in serie di Taylor, data da

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{r} - \sum_{j=1}^3 x'^j \partial_j \left(\frac{1}{r} \right) + \sum_{j=1, k=1}^3 \frac{1}{2} x'^j x'^k \partial_j \partial_k \left(\frac{1}{r} \right) + o\left(\frac{1}{r}\right) \quad (2.79)$$

Per facilità nella trattazione, da ora in poi useremo la convenzione di Einstein per scrivere le formule e, indicando con $x^{j_1 j_2 \dots j_n}$ il prodotto $x^{j_1} x^{j_2} \dots x^{j_n}$ e con $\partial_{j_1 j_2 \dots j_n} = \partial_{j_1} \dots \partial_{j_n}$, possiamo scrivere che

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!} x'^L \partial_L \left(\frac{1}{r} \right), \quad (2.80)$$

dove con L intendiamo una collezione di l indici. Inserendo questo risultato nella (2.78) si ottiene che

$$\begin{aligned} U(\vec{x}, t) &= G \int_V \rho(\vec{x}', t) \left[\sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!} x'^L \partial_L \left(\frac{1}{r} \right) \right] d^3 x' = \\ &= G \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!} \left(\int_V \rho(\vec{x}', t) x'^L d^3 x' \right) \partial_L \left(\frac{1}{r} \right). \end{aligned} \quad (2.81)$$

Andiamo, adesso, a calcolare le derivate di $\frac{1}{r}$: si osserva che

$$\partial_j \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{n_j}{r^2}, \quad (2.82)$$

$$\partial_{jk} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{3n_j n_k - \delta_{jk}}{r^3}, \quad (2.83)$$

$$\partial_{jkn} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{15n_j n_k n_n - 3(n_j \delta_{kn} + n_k \delta_{jn} + n_n \delta_{jk})}{r^4}, \quad (2.84)$$

e così via. Si osserva che tutti i tensori che abbiamo sulla destra sono simmetrici per scambio di indici e prendendo la traccia di due qualunque degli indici, si annullano fra loro: questi sono degli esempi di tensori STF. Si può facilmente mostrare quanto detto osservando il lato sinistro di queste equazioni qua sopra: si ha, infatti, che le derivate parziali (per $r \neq 0$) commutano (in virtù del teorema di Schwartz, valido in quanto $\frac{1}{r}$ è C^∞ per $r \neq 0$) ed è tracefree, in quanto

$$\delta^{j_1 j_2} \partial_{j_1 j_2 \dots j_l} r^{-1} = \nabla^2 \partial_{j_3 \dots j_l} r^{-1} = \partial_{j_3 \dots j_l} \nabla^2 r^{-1} = 0, \quad (2.85)$$

e il risultato si può facilmente estendere a indici generici. La formula generale per questi tensori STF è data da

$$n^{\langle j_1 j_2 \dots j_l \rangle} = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{l}{2} \rfloor} (-1)^p \frac{l!(2l-2p-1)!!}{(l-2p)!(2l-1)!!(2p)!!} [\delta^{j_1 j_2} \dots \delta^{j_{2p-1} j_{2p}} n^{j_{2p+1}} n^{j_{2p+2}} \dots n^{j_l} + \text{sym}(q)], \quad (2.86)$$

dove $\text{sym}(q)$ sono i termini che otteniamo attraverso permutazioni simmetriche degli indici e con $\lfloor \frac{l}{2} \rfloor$ intendiamo l'intero più piccolo $\leq \frac{l}{2}$. Osserviamo che, in generale, la contrazione di L indici di un tensore A^L con un tensore $B_{\langle L \rangle}$ soddisfa la seguente identità

$$A^L B_{\langle L \rangle} = A^{\langle L \rangle} B_{\langle L \rangle}, \quad (2.87)$$

la cui dimostrazione, per semplicità, viene fatta nel caso di tensore a 2 indici, ma può essere generalizzata, con qualche accortezza, anche al caso di tensori ad l indici: prendendo A_{ij} sappiamo che

$$A_{(ij)} = \frac{1}{2}(A_{ij} + A_{ji}), \implies A_{\langle ij \rangle} = A_{(ij)} - \delta^{ij} A_{aa}, \quad (2.88)$$

dunque

$$A^{ij} B_{\langle ij \rangle} = (A^{\langle ij \rangle} + \delta^{ij} A_{aa} + A^{[ij]}) B_{\langle ij \rangle} = A^{\langle ij \rangle} B_{\langle ij \rangle} + \delta^{ij} A_{aa} B_{\langle ij \rangle} + A^{[ij]} B_{\langle ij \rangle}. \quad (2.89)$$

Si ha che il secondo termine è nullo poiché $B_{\langle ij \rangle}$ ha traccia nulla e il terzo termine invece è nullo per antisimetria di $A^{[ij]}$. Quindi, se ne conclude, visto che $\partial_L r^{-1}$ è simmetrico per scambio degli indici, ovvero $\partial_L \left(\frac{1}{r} \right) = \partial_{\langle L \rangle} \left(\frac{1}{r} \right)$, che

$$I^L \partial_{\langle L \rangle} \left(\frac{1}{r} \right) = I^{\langle L \rangle} \partial_{\langle L \rangle} \left(\frac{1}{r} \right). \quad (2.90)$$

Si ottiene, quindi, che

$$U(\vec{x}, t) = G \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!} I^{\langle L \rangle} \partial_{\langle L \rangle} \left(\frac{1}{r} \right). \quad (2.91)$$

2.3.1 Corrispondenza con le armoniche sferiche

Si osserva che preso un tensore STF ad l indici, il numero di tensori indipendenti è dato da

Capitolo 3

Ringraziamenti

Questo rappresenta per me il capitolo più difficile da scrivere: non tanto per il contenuto, ma perché nemmeno fiumi e fiumi di parole riusciranno a mettere per iscritto il mio stato d'animo.

Vorrei ringraziare, innanzitutto, il mio relatore, il professore Leonardo Gualtieri, per la sua disponibilità ad essere il mio relatore, oltre ad aver rappresentato, almeno per me, un docente fantastico, di cui ho avuto l'immensa fortuna di averlo sia come esercitatore del corso di Fisica 1 e sia come docente titolare del corso di Meccanica Quantistica, che ritengo essere il corso che ho apprezzato di più, sia per argomenti trattati e sia per la trattazione, nel percorso triennale di Fisica.

Subito dopo, vorrei ringraziare la mia famiglia, che mi ha supportato costantemente in questi anni, senza mai dubitare delle mie capacità: ringrazio i miei genitori, Antonietta (perdonami mamma se ti chiamo col nome intero) ed Enrico, per tutto il supporto morale che mi avete dato in questi anni; in particolar modo la mamma, che fra le mie numerose sfide e le sue numerose sfide e responsabilità, è sempre stata lì, nei momenti di bisogno, ad ascoltarmi nei (numerosi) momenti di sconforto e disperazione. Successivamente, non posso non ringraziare la zia Adele e lo zio Maurizio, che mi hanno sempre supportato quasi come se fossi figlio loro, e mia cugina Giada, che ha sempre creduto nel suo cuginetto (anche se, purtroppo, i "compiti" di matematica che faccio adesso non puoi più correggerli facilmente come facevi un tempo). Infine, ringrazio la nonna Enrica, a cui ho realizzato il grande sogno di far vedere entrambi i nipoti laureati, e ringrazio sempre per la grande mano che ha dato a me e mia mamma in questi tre anni.

Non sarei riuscito a farcela senza le grandi amicizie che ho fatto in questi anni, di cui, ovviamente, devo ringraziare i "quarratini" OG, ovvero Carmine, Dario e Ale, che ormai conosco da tempo immemore, che hanno avuto modo di sperimentare la mia grandissima pazzia già prima di Fisica e hanno visto il suo andamento esponenziale in questi anni di "cattività pisana" in ogni chiamata su Discord. Ringrazio (fra virgolette anche se spero non me ne abbiate a male) i quarratini "aggiunti", Matteo, Sam, Michael e Tommaso, qua presenti, che ho conosciuto dopo, ma non di meno (in particolar modo Matteo che a Ferragosto di ritorno da Lavagna mi ha salvato la vita) che sto piano piano corrompendo verso la lega dei campioni

E ora iniziano i ringraziamenti dei "pisani": ringrazio Riccardo, che mi ha supportato e sopportato ogni giorno di questa triennale e ogni santo giorno subiva i miei grandissimi psicologichal damage "alla 6pek" modellizzabili forse da un bellissimo vettore di Poynting (forse saranno stati anche i miei danni psicologici ad averlo convinto a fare teorica insieme ahah). Ringrazio Ismaele Bartolucci, il mio "daddy" topologico che mi ha messo sotto la sua ala nello studio delle branche della matematica più disparate e che mi ha, letteralmente, raccattato, in questi ultimi sei mesi, nei punti in cui quest'anno ho letteralmente toccato il fondo; ringrazio Alessandro Terranova, che rimarrà il mio presidentissimo, per avermi sostenuto più e più volte nei momenti in cui ero più vulnerabile, oltre a farmi conoscere il meraviglioso mondo di AI-SF (non Associazione Italiana Studio del Fegato obv) che, ad entrambi, rappresenta una grande famiglia estesa (sia per le grandissimi emozioni che ci procura e sia per i grandi momenti di tribolazione che ci ha procurato); ringrazio

il mitico Francesco Zeno Costanzo (o più brevemente il Gen) per avermi preso, a suon di insulti per le assenze di DOCSTRING e per l'interlinea assente alla Bolognesi, sotto la sua ala pythonica;

Bibliografia

- [1] S. A. Holmes and W. E. Featherstone. A unified approach to the clenshaw summation and the recursive computation of very high degree and order normalised associated legendre functions. *Journal of Geodesy*, 76(5):279–299, May 2002.
- [2] John David Jackson. *Classical electrodynamics / John David Jackson*. Wiley, Hoboken, N. J, 3. ed. edition, ©2021.
- [3] Eric Poisson and Clifford M. Will. *Gravity: newtonian, post-newtonian, relativistic / Eric Poisson, Clifford M. Will*. Cambridge University press, Cambridge, ©2014.
- [4] Paolo Pani Valeria Ferrari, Leonardo Gualtieri. *General relativity and its applications : black holes, compact stars and gravitational waves / Valeria Ferrari, Leonardo Gualtieri, Paolo Pani*. CRC Press, Boca Raton, 2 ed. edition, ©2026.