

Espansione in multipoli della gravità

Francesco Sermi

9 agosto 2026

*A mia mamma, che mi ha cresciuto senza mai dubitare
delle mie capacità.*

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Gravitazione newtoniana	5
1.1.1	Deduzione dell'equazione di Poisson	7
2	Corpi non sferici	11
2.1	Sistema a simmetria sferica	11
2.2	Deviazioni dalla simmetria sferica	12
2.2.1	Decomposizione in armoniche sferiche	12

Capitolo 1

Introduzione

Il campo gravitazionale generato da un corpo racchiude informazioni fondamentali sulla sua struttura interna. Risulta quindi essenziale studiare i contributi derivanti dalle deviazioni dalla simmetria sferica, i quali permettono di rispondere a numerosi interrogativi sulle caratteristiche del pianeta osservato. In questa breve dissertazione descriveremo l'espansione in multipoli nella gravità newtoniana, strumento cardine per lo studio di tali perturbazioni, applicandone i risultati a un sistema soggetto a interazioni mareali. Illustreremo infine come queste stesse configurazioni vengano modellate nel formalismo della Relatività Generale, in cui la gravità perde lo status di forza per divenire espressione della curvatura dello spaziotempo. È lecito domandarsi perché affrontare l'argomento in regime newtoniano. Sebbene da un secolo sia noto che non rappresenti la teoria definitiva della gravità, essa costituisce ancora oggi un'approssimazione eccellente in una grande varietà di contesti pratici e astrofisici. Descrive con accuratezza la struttura terrestre e le maree provocate dal Sole e dalla Luna; persino le simulazioni numeriche che tracciano l'evoluzione degli ammassi galattici, la cui formazione è dominata dall'influenza della materia oscura, si basano sulla gravitazione newtoniana. I limiti di questo approccio classico emergono solo quando ci si scontra con la sua incapacità di spiegare la precessione del perielio di Mercurio o la deflessione della luce, fenomeni confermati sperimentalmente e perfettamente coerenti con le previsioni della Relatività Generale. Il criterio fondamentale per stabilire quando sia valido ricorrere all'approssimazione newtoniana è dettato dal fattore di correzione relativistico:

$$\epsilon \sim \frac{GM}{rc^2} \sim \frac{v^2}{c^2}, \quad (1.1)$$

dove G è la costante di gravitazione universale, c è la velocità della luce, mentre M , r e v rappresentano rispettivamente la massa caratteristica, la dimensione (o distanza di separazione) e la velocità del sistema studiato.

1.1 Gravitazione newtoniana

Muoviamo i nostri primi passi nella teoria newtoniana partendo dal secondo principio della dinamica e dalla legge di gravitazione universale:

$$m_I \vec{a} = \vec{F}, \quad (1.2)$$

$$\vec{F} = -Gm_G M \frac{\vec{r}(t)}{|\vec{r}(t)|^3}. \quad (1.3)$$

Nella prima equazione, $\vec{F}$ è la forza agente sul corpo di massa inerziale m_I situato in posizione $\vec{r}(t)$ e $\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$ è la sua accelerazione. Nella seconda equazione, la forza $\vec{F}$ è di natura

gravitazionale ed è diretta lungo la retta che congiunge i due corpi. Queste rappresentano le equazioni del moto di un corpo in $\vec{r}(t)$ soggetto al campo di una massa M posta nell'origine del sistema di riferimento. La quantità G è la costante di gravitazione universale, il cui valore misurato è circa:

$$G = (6.6743 \pm 0.0001) \times 10^{-11}, \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}. \quad (1.4)$$

Si noti come l'intensità di questa forza decresca col quadrato della distanza e sia sempre attrattiva.

Una formulazione equivalente di queste leggi si ottiene esprimendo la forza come gradiente di una funzione scalare, il *potenziale newtoniano*, definito come:

$$U = \frac{GM}{r}. \quad (1.5)$$

Calcolandone il gradiente, sfruttando il fatto che $\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r}$, risulta banalmente che

$$(\nabla U)_i = \frac{\partial U}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x_i} = -\frac{GM}{r^2} \frac{x_i}{r} = -\frac{GM}{r^3} x_i, \quad (1.6)$$

da cui, riscrivendo l'espressione in forma vettoriale, si ottiene che

$$\vec{F} = m_G \nabla U. \quad (1.7)$$

Sostituendo nella (1.2) otteniamo

$$m_I \vec{a} = m_G \nabla U. \quad (1.8)$$

Nel caso in cui $m_I = m_G$, l'equazione si semplifica in

$$\vec{a} = \nabla U. \quad (1.9)$$

L'assunzione che la massa gravitazionale e la massa inerziale coincidano prende il nome di *principio di equivalenza debole*. Come conseguenza diretta, evidente nella (1.9), l'accelerazione subita da un corpo in un campo gravitazionale è indipendente dalla sua massa. Nel corso della trattazione assumeremo la validità di questo principio¹, il quale rappresenta il fondamento logico che ha condotto Einstein alla formulazione della Relatività Generale. Allo stato attuale, le leggi che governano il moto di un corpo in un campo gravitazionale newtoniano si riassumono nel sistema

$$\vec{a} = \nabla U, \quad (1.10)$$

$$U = \frac{GM}{r}. \quad (1.11)$$

Tuttavia, queste equazioni descrivono esclusivamente l'interazione tra punti materiali. Per i nostri scopi è necessario generalizzare la teoria a corpi estesi: distribuzioni continue di materia (solidi, liquidi o gas) di forma e dimensioni arbitrarie, capaci di evolvere dinamicamente. Un sistema del genere è descritto da un campo di densità $\rho(\vec{x}, t)$, un campo di pressione $p(\vec{x}, t)$ e un campo di velocità $\vec{v}(\vec{x}, t)$, vincolati dalle seguenti equazioni della fluidodinamica

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (\text{Equazione di continuità});$$

¹Recenti test sperimentali, come la missione satellitare MICROSCOPE, hanno verificato l'uguaglianza tra massa inerziale e gravitazionale con una precisione di una parte su 10^{15} .

$$\textcircled{2} \quad \rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \rho \nabla U - \nabla p \quad (\text{Equazione di Eulero, con } \frac{D}{Dt} \text{ derivata materiale}).$$

L'equazione che lega il campo gravitazionale alla distribuzione spaziale della massa è l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U = -4\pi G \rho. \quad (1.12)$$

In questa sede non deriveremo le equazioni di continuità e di Eulero; ci concentreremo esclusivamente sulla deduzione dell'equazione di Poisson. Assumeremo pertanto di lavorare con configurazioni fisicamente sensate, in cui ρ e $\vec{v}$ soddisfino le suddette leggi di conservazione.

1.1.1 Deduzione dell'equazione di Poisson

Uno dei principi cardine della meccanica newtoniana è la sovrapposizione degli effetti. Assumendo la validità di tale principio per il campo gravitazionale, il potenziale generato da un sistema discreto di N masse puntiformi nel punto $\vec{x}$ è la somma dei singoli contributi

$$U(\vec{x}) = \sum_{i=1}^N U_i = G \sum_{i=1}^N \frac{M_i}{|\vec{x} - \vec{x}_i|}, \quad (1.13)$$

dove $\vec{x}_i$ indica la posizione della massa i -esima. La generalizzazione al continuo è immediata: data una distribuzione di massa $\rho(\vec{x}', t)$, l'elemento infinitesimo di volume d^3x' situato in $\vec{x}'$ produce il potenziale di una massa puntiforme

$$dU(\vec{x}, t) = G \frac{dm}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = G \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'. \quad (1.14)$$

Integrando su tutto il dominio occupato dalla massa, si ottiene:

$$U(\vec{x}, t) = G \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'. \quad (1.15)$$

La (1.15) esprime il potenziale U come funzionale della densità ρ : essendo formulata come equazione integrale, il calcolo diretto del potenziale può risultare ostico. Possiamo tuttavia trasformarla in un'equazione differenziale sfruttando la seguente identità nel senso delle distribuzioni:

$$\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}'), \quad (1.16)$$

che dimostreremo nella prossima sezione. Applicando l'operatore laplaciano ad ambo i membri della (1.15) e portandolo sotto il segno di integrale, ricaviamo istantaneamente l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U = G \int \rho(\vec{x}', t) \nabla^2 \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) d^3x' = G \int \rho(\vec{x}', t) [-4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}')] d^3x' = -4\pi G \rho(\vec{x}, t). \quad (1.17)$$

Inversamente, usando il formalismo delle funzioni di Green, è immediato verificare che la (1.15) è la soluzione dell'equazione di Poisson: sappiamo infatti che $\nabla^2 U = -4\pi G \rho$ ammette soluzione nella forma

$$U(\vec{x}, t) = \int \mathcal{G}(\vec{x} - \vec{x}') \rho(\vec{x}') d^3x', \quad (1.18)$$

dove il nucleo risolvete $\mathcal{G}(\vec{x})$ soddisfa $\nabla^2 \mathcal{G}(\vec{x}) = -4\pi G \delta^3(\vec{x})$. Confrontando con la (1.16), si identifica banalmente $\mathcal{G}(\vec{x} - \vec{x}') = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$.

Dimostrazione della (1.16)

Per dimostrare l'identità (1.16), occorre premettere i teoremi di Green.

Lemma 1.0.1 (Identità di Green).

Sia $V \subset \mathbb{R}^3$ un dominio compatto con frontiera sufficientemente regolare ∂V . Siano $\varphi \in C^2(V)$ e $\psi \in C^1(V)$. Allora valgono

①

$$\int_V (\psi \nabla^2 \varphi + \nabla \varphi \cdot \nabla \psi) d^3x = \oint_{\partial V} \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS, \quad (1.19)$$

dove $\frac{\partial}{\partial n} = \hat{n} \cdot \nabla$ denota la derivata direzionale normale e $\hat{n}$ è il versore normale uscente dalla superficie.

②

$$\int_V [\psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi] d^3x = \oint_{\partial V} \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) dS. \quad (1.20)$$

Dimostrazione. ① Sia $\vec{F} = \psi \nabla \varphi$. Applicando il teorema della divergenza

$$\int_V \nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) d^3x = \oint_{\partial V} (\psi \nabla \varphi) \cdot \hat{n} dS. \quad (1.21)$$

Sviluppando la divergenza a primo membro otteniamo $\nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) = \nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \psi \nabla^2 \varphi$. Sostituendo si ottiene immediatamente la prima identità di Green.

② Scriviamo la prima identità di Green invertendo i ruoli di φ e ψ :

$$\int_V (\varphi \nabla^2 \psi + \nabla \psi \cdot \nabla \varphi) d^3x = \oint_{\partial V} \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} dS. \quad (1.22)$$

Sottraendo questa espressione dalla prima identità, il termine simmetrico $\nabla \varphi \cdot \nabla \psi$ si elide, restituendo la tesi. $\square$

Dimostrazione della (1.16). Per $\vec{x} \neq \vec{x}'$, la funzione $f(\vec{x}) = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$ è regolare. Si calcola facilmente il suo laplaciano:

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_i - x'_i}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} \right) = \sum_{i=1}^3 \left[-\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} + \frac{3(x_i - x'_i)^2}{|\vec{x} - \vec{x}'|^5} \right] = 0$$

Poiché nell'origine ($\vec{x} = \vec{x}'$) la funzione diverge, non possiamo calcolare il laplaciano classicamente. Valutiamolo nel senso delle distribuzioni applicandolo a una funzione di test $\phi(\vec{x})$ a decadimento rapido, ovvero $\phi(\vec{x}) \in S(\mathbb{R}^3)$. L'azione del laplaciano distribuzionale è definita da:

$$\left\langle \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}, \phi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \nabla^2 \phi(\vec{x}) d^3x$$

Isoliamo la singolarità integrando su un dominio $V_{\varepsilon, R}$ definito come il volume compreso tra una sferetta S_ε di raggio ε centrata in $\vec{x}'$ e una sfera S_R di raggio $R \rightarrow \infty$. Sfruttando la

seconda identità di Green nel dominio $V_{\varepsilon,R}$ (dove la funzione è regolare e il suo laplaciano è nullo):

$$\int_{V_{\varepsilon,R}} \left[\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \nabla^2 \phi(\vec{x}) - \underbrace{\phi(\vec{x}) \nabla^2 \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right)}_{=0} \right] d^3x = \oint_{\partial V_{\varepsilon,R}} \left[\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \frac{\partial \phi}{\partial n} - \phi \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) \right] dS$$

Essendo ϕ a decadimento rapido, nel limite $R \rightarrow \infty$ il contributo sulla frontiera esterna si annulla. Resta l'integrale sulla superficie sferica interna ∂S_ε : si osservi che, poiché la normale $\hat{n}$ uscente dal dominio $V_{\varepsilon,R}$ punta verso $\vec{x}'$, sulla sferetta si ha $\hat{n} = -\hat{r}$, dunque, calcolandola su $r = |\vec{x} - \vec{x}'| = \varepsilon$, si ottiene che

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) = \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot (-\hat{r}) = \left(-\frac{1}{r^2} \hat{r} \right) \cdot (-\hat{r}) = \frac{1}{\varepsilon^2}$$

Esprimendo l'elemento d'area in coordinate sferiche $dS = \varepsilon^2 d\Omega$, il calcolo si riduce a

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{\partial S_\varepsilon} \left[\frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \phi}{\partial n} - \phi(\vec{x}) \frac{1}{\varepsilon^2} \right] \varepsilon^2 d\Omega = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\varepsilon \oint_{\partial S_\varepsilon} \frac{\partial \phi}{\partial n} d\Omega - \oint_{\partial S_\varepsilon} \phi(\vec{x}) d\Omega \right)$$

Poiché le derivate di ϕ sono limitate, il primo termine al tendere di $\varepsilon \rightarrow 0$ fa zero per via del fattore ε ; il secondo termine, invece, per la continuità di ϕ , fa in modo che la funzione valutata sulla sfera collassi nel suo valore al centro $\phi(\vec{x}')$. L'integrale sull'angolo solido dà banalmente 4π . Tenendo conto dell'orientazione del bordo, otteniamo

$$\left\langle \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}, \phi \right\rangle = -4\pi \phi(\vec{x}')$$

Per definizione di delta di Dirac, $\langle \delta^3(\vec{x} - \vec{x}'), \phi \rangle = \phi(\vec{x}')$, e dunque si conclude che

$$\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}').$$

□

Capitolo 2

Corpi non sferici

Nel capitolo precedente abbiamo visto che un sistema caratterizzato da una densità $\rho(\vec{x}, t)$ soddisfa l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U(\vec{x}, t) = -4\pi G \rho(\vec{x}, t) \quad (2.1)$$

che in questo capitolo ci prefiggiamo di risolvere nel caso in cui vi siano deviazioni dalla simmetria sferica. È istruttivo studiare inizialmente il caso con simmetria sferica perfetta per poi passare al caso più generale.

2.1 Sistema a simmetria sferica

Riscriviamo il laplaciano in coordinate sferiche e lo inseriamo nell'equazione di Poisson:

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] U = -4\pi G \rho. \quad (2.2)$$

Se il sistema gode di simmetria sferica, il potenziale dipende esclusivamente dalla coordinata radiale r ; pertanto l'equazione si riduce a

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) = -4\pi G \rho(r, t), \quad (2.3)$$

da cui si ottiene

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{4\pi G}{r^2} \int_0^r \rho(r', t) (r')^2 dr' + \frac{C(t)}{r^2}. \quad (2.4)$$

La costante di integrazione $C(t)$ va posta a zero. Fisicamente, infatti, $\frac{\partial U}{\partial r}$ rappresenta il campo gravitazionale radiale. Nell'origine ($r = 0$) la direzione radiale non è definita: una forza netta non nulla in quel punto punterebbe in una direzione preferenziale, rompendo la simmetria sferica del sistema. Inoltre, se $C(t)$ fosse diversa da zero, il termine divergerebbe. In definitiva si ha:

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{4\pi G m(r, t)}{r^2}, \quad (2.5)$$

dove abbiamo definito la massa contenuta entro il raggio r :

$$m(r, t) = \int_0^r \rho(r', t) (r')^2 dr'. \quad (2.6)$$

Assumendo che il corpo sia confinato nello spazio, esiste un raggio R tale per cui $\rho(r) = 0$ per ogni $r > R$. Pertanto, la massa totale

$$M \equiv m(R, t) = \int_0^R \rho(r', t) (r')^2 dr' \quad (2.7)$$

è una costante nel tempo. Lo si dimostra facilmente:

$$\frac{dM}{dt} = \int_0^R \frac{\partial \rho(r', t)}{\partial t} (r')^2 dr' = \int_0^R -\frac{1}{(r')^2} \nabla_r (\rho(r', t) v_r) (r')^2 dr' = 0, \quad (2.8)$$

dove abbiamo usato l'equazione di continuità in coordinate sferiche e il fatto che la densità e la velocità radiale v_r siano nulle sul bordo del volume di integrazione. Abbiamo quindi mostrato che la massa totale del sistema si conserva. Inoltre, poiché per $r > R$ la densità si annulla, il campo gravitazionale all'esterno del corpo è dato da:

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{4\pi G M}{r^2} \implies U(r) = \frac{4\pi G M}{r}. \quad (2.9)$$

Il potenziale all'esterno coincide con quello generato da una massa puntiforme M posta nel centro del sistema: integrando l'equazione di Poisson abbiamo ottenuto una dimostrazione molto più diretta del teorema del guscio sferico di Newton.

2.2 Deviazioni dalla simmetria sferica

La simmetria sferica è una semplificazione utile, ma è raro che i corpi celesti siano perfettamente simmetrici. La rotazione attorno a un asse, l'interazione con altri corpi e le tensioni interne (come gli stress crostali delle stelle di neutroni) causano deviazioni da questa configurazione ideale. Quando tali deviazioni sono piccole, si procede tramite un'espansione in multipoli. Poiché il contributo dei momenti di ordine superiore tende a decrescere rapidamente, un troncamento dello sviluppo ai primi termini offre una buona descrizione del potenziale gravitazionale per la maggior parte dei problemi di interesse. Nel caso della Terra, la misurazione dei momenti di multipolo fino a $l = 360$ (che quantificano le variazioni del campo gravitazionale su scale di centinaia di chilometri) ha permesso di studiare fenomeni come la deriva dei continenti, il vulcanismo e la struttura interna del pianeta. Questo approccio analitico, tuttavia, è limitato a sistemi approssimativamente sferici: le galassie a spirale, ad esempio, si discostano marcatamente da tale geometria, obbligando a ricorrere a metodi analitici differenti o a simulazioni numeriche per ricavarne il potenziale.

2.2.1 Decomposizione in armoniche sferiche

Ricordiamo che le armoniche sferiche Y_{lm} sono autofunzioni dell'operatore differenziale angolare:

$$\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] Y_{lm} = -l(l+1) Y_{lm}, \quad (2.10)$$

con l intero non negativo e $m \in \{-l, \dots, l\}$ e riconosciamo, nel termine a sinistra, la parte angolare del laplaciano. Dalla teoria di Sturm-Liouville sappiamo che queste funzioni costituiscono una base ortogonale e completa per lo spazio $L^2(S^2)$, ossia lo spazio delle funzioni a quadrato integrabile definite sulla sfera. Pertanto, vale la relazione di ortonormalità:

$$\int_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{l'm'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}, \quad (2.11)$$

e per ogni funzione $f \in L^2(S^2)$ si ha:

$$f(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.12)$$

con i coefficienti dati da:

$$f_{lm} = \int_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) f(\theta, \phi) d\Omega. \quad (2.13)$$

Possiamo quindi sviluppare sia la densità che il potenziale in serie di armoniche sferiche, ottenendo

$$\rho(r, \theta, \phi, t) = \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l \rho_{lm}(r, t) Y_{lm}(\theta, \phi), \quad U(r, \theta, \phi, t) = \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l U_{lm}(r, t) Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.14)$$

dove i coefficienti dipendono da r e t , poiché la proiezione viene effettuata su superfici sferiche a raggio e tempo fissati, e sono dati da

$$\rho_{lm}(r, t) = \int_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) \rho(r, \theta, \phi, t) d\Omega, \quad U_{lm}(r, t) = \int_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) U(r, \theta, \phi, t) d\Omega. \quad (2.15)$$

Inserendo questi sviluppi nell'equazione di Poisson si ottiene:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l U_{lm} Y_{lm} = \\ & = -4\pi G \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l \rho_{lm} Y_{lm}. \end{aligned} \quad (2.16)$$

Poiché le Y_{lm} sono linearmente indipendenti, l'uguaglianza deve valere termine a termine per ogni coppia (l, m) , portando a:

$$\left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - l(l+1) \right] U_{lm}(r, t) = -4\pi G r^2 \rho_{lm}(r, t). \quad (2.17)$$

In questo modo abbiamo ricondotto un'equazione alle derivate parziali a un sistema infinito di equazioni differenziali ordinarie disaccoppiate. Per risolvere queste equazioni utilizziamo il metodo delle funzioni di Green, definendo l'operatore differenziale

$$\mathcal{L} = \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - l(l+1), \quad (2.18)$$

cerchiamo una funzione $g_l(r, r')$ che soddisfi

$$\mathcal{L} g_l(r, r') = -4\pi \delta(r - r'). \quad (2.19)$$

Una volta determinata g_l , ogni coefficiente U_{lm} potrà essere calcolato come

$$U_{lm}(r, t) = G \int_0^\infty g_l(r, r') \rho_{lm}(r', t) (r')^2 dr'. \quad (2.20)$$

L'operatore $\mathcal{L}$ e, di conseguenza, la funzione di Green dipendono dall'indice l ma non da m . Per $r \neq r'$, l'equazione per g_l si riduce a quella omogenea:

$$\mathcal{L} g_l(r, r') = 0. \quad (2.21)$$

Cercando soluzioni della forma r^γ , si ha

$$\left[\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - l(l+1) \right] r^\gamma = 0 \implies \gamma(\gamma+1) - l(l+1) = 0. \quad (2.22)$$

La combinazione lineare delle due radici indipendenti fornisce:

$$g_l(r, r') = A(r')r^l + B(r')r^{-(l+1)}. \quad (2.23)$$

I coefficienti A e B dipendono da r' poiché tale variabile gioca il ruolo di parametro per l'equazione differenziale in r . Affinché il potenziale sia fisicamente accettabile, non deve presentare divergenze spurie. Per $r < r'$, richiediamo che la soluzione sia regolare nell'origine ($r \rightarrow 0$); pertanto imponiamo $B = 0$:

$$g_<(r, r') = A(r')r^l. \quad (2.24)$$

Analogamente, per $r > r'$, richiediamo che il potenziale si annulli all'infinito ($r \rightarrow \infty$); pertanto imponiamo $A = 0$:

$$g_>(r, r') = B(r')r^{-(l+1)}. \quad (2.25)$$

Combinando i risultati mediante il gradino di Heaviside, si ottiene:

$$g_l(r, r') = A(r')r^l\theta(r' - r) + B(r')r^{-(l+1)}\theta(r - r'). \quad (2.26)$$

Imponendo infine la continuità della funzione di Green in $r = r'$, si ricava la condizione

$$A(r')(r')^l = B(r')(r')^{-(l+1)}, \quad (2.27)$$

dunque possiamo riscrivere nella seguente forma

$$g_l(r, r') = C(r') \left[\frac{r^l}{(r')^l} \theta(r' - r) + \frac{r^{-(l+1)}}{(r')^{-(l+1)}} \theta(r - r') \right]. \quad (2.28)$$

ed integrando l'equazione differenziale fra $[r' - \varepsilon, r' + \varepsilon]$ con $\varepsilon \rightarrow 0$ si ottiene che

$$\int_{r'-\varepsilon}^{r'+\varepsilon} \left[\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right] g_l(r, r') = -4\pi. \quad (2.29)$$

Si noti che il termine proporzionale all'integrale di $g_l(r, r')$ si annulla per continuità nel limite di $\varepsilon \rightarrow 0$: rimane dunque

$$\int_{r'-\varepsilon}^{r'+\varepsilon} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial g_l(r, r')}{\partial r} \right) \right] = -4\pi, \quad (2.30)$$

in cui si ottiene che

$$C(r')[(-l+1)(r') - (l+2)(r')] = -4\pi \implies C(r') = \frac{4\pi}{2l+1} \frac{1}{r'}. \quad (2.31)$$

La funzione di Green dell'operatore $\mathcal{L}$ risulta, dunque, essere

$$g_l(r, r') = \frac{4\pi}{2l+1} \left[\frac{r^l}{(r')^{l+1}} \theta(r' - r) + \frac{(r')^l}{r^{l+1}} \theta(r - r') \right], \quad (2.32)$$

che può essere riscritta in forma più compatta introducendo $r_> = \max r, r'$ e $r_< = \min r, r'$, ottenendo

$$g_l(r, r') = \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}. \quad (2.33)$$