

1 Uwagi:

Jako oznaczenie współrzędnej w n -tym wymiarze jest użyta notacja taka jak do ciągów (m_n) .

Niezależnie od wyboru wiadomości da się skonstruować l wymiarową hipers-

fery o takim promieniu $(\sqrt{\sum_{i=0}^l m_i^2})$ by punkt m leżał na niej.

Szyfrowanie zadziała jeśli $\exists n(p_{n \bmod k} \neq m_n)$.

2 Wyprowadzenie t ze wzoru:

m - punkt leżący na hipersferze

p - wektor kierunkowy prostej przechodzącej przez punkt m

k - liczba wymiarów przestrzeni, w której jest punkt p

l - liczba wymiarów hipersfery leżącej w $l+1$ wymiarowej przestrzeni

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^l (m_i + tp_{i \bmod k})^2 &= \sum_{i=0}^l m_i^2 & / - \sum_{i=0}^l m_i^2 \\ \sum_{i=0}^l (2m_i tp_{i \bmod k} + t^2 p_{i \bmod k}^2) &= 0 & / : t \\ \sum_{i=0}^l (2m_i p_{i \bmod k} + t p_{i \bmod k}^2) &= 0 & / - \sum_{i=0}^l 2m_i p_{i \bmod k} \\ -2 \sum_{i=0}^l m_i p_{i \bmod k} &= t \sum_{i=0}^l p_{i \bmod k}^2 & / : \sum_{i=0}^l p_{i \bmod k}^2 \\ t &= -2 \frac{\sum_{i=0}^l m_i p_{i \bmod k}}{\sum_{i=0}^l p_{i \bmod k}^2} \end{aligned}$$

3 Szyfrowanie:

Do reszt z dzielenia dodawane jest $w_n \bmod k$ na wypadek, gdy $a_n = 0$ i by zamaskować promień hipersfery.

Wejście:

m - wiadomość

p - pierwsza część klucza

w - druga część klucza

k - długość pierwszej części klucza

d - długość drugiej części klucza

l - indeks ostatniego elementu wiadomości

Wyjście:

q - zaszyfrowana wiadomość

b - mianownik do użycia przy odszyfrowywaniu

$$b = \sum_{i=0}^l p_i^2 \bmod k$$

$$c = 2 \sum_{i=0}^l m_i p_i \bmod k$$

$$e_n = b m_n - c p_n \bmod k$$

$$q_{n_0} = \lfloor \frac{e_n}{b} \rfloor$$

$$q_{n_1} = e_n - b q_{n_0} + w_n \bmod d$$

4 Odszyfrowywanie:

Wejście:

q - zaszyfrowana wiadomość

b - mianownik do użycia przy odszyfrowywaniu

p - pierwsza część klucza

w - druga część klucza

k - długość pierwszej części klucza

d - długość drugiej części klucza

l - indeks ostatniego elementu zaszyfrowanej wiadomości

Wyjście:

m - wiadomość

$$e_n = bq_{n_0} + q_{n_1} - w_n \bmod d$$

$$f_n = bp_{n \bmod k}$$

$$g = \sum_{i=0}^l f_i^2$$

$$h = 2 \sum_{i=0}^l e_i f_i$$

$$o = gb$$

$$m_n = \frac{ge_n - f_n h}{o}$$