

Rapport établissement - Sanitaire - CHU ROUEN

Type:

Rapport établissement — Rapport définitif

Période:

Année complète 2024

Périmètre:

Sanitaire SPARES (hospitalisation complète, de semaine et bloc)

Téléchargement:

13/11/2025

Sommaire

Indicateurs de la stratégie nationale	4
Consommations	5
Antibiotiques	5
Antifongiques	11
Résistances bactériennes.....	15
<i>Staphylococcus aureus</i>	15
<i>Escherichia coli</i>	16
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	17
<i>Enterobacter cloacae complex</i>	18
Enterobacterales productrices de BLSE (EBLSE).....	18
Enterobacterales productrices de carbapénémase (EPC)	21
<i>Enterococcus faecium</i>	22
<i>Enterococcus faecalis</i>	23
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	23
<i>Acinetobacter baumannii</i>	24
Évolution des densités d'incidence	24

Dans les différents tableaux présents dans ce rapport, la colonne "Variation" correspond à la comparaison entre la période du rapport et la période précédente (variable en fonction de votre rythme d'import trimestriel ou annuel).

Cette variation peut être exprimée en pourcentage (%) ou en point de pourcentage (pp).

Le point de pourcentage correspond à la différence entre deux pourcentages.

1 – Indicateurs de la stratégie nationale

Indicateur de la stratégie nationale	Cible	Valeur Année 2023	Valeur Année 2024
Bon usage des antibiotiques			
Consommation d'antibiotiques en nombre de DDJ/1000 journées d'hospitalisation (JH)	Réduction > 10% entre 2019 et 2025		526,9
Indicateur ECDC: part d'antibiotiques à large spectre* au sein de la classe ATC J01 (%)	Réduction > 10% entre 2019 et 2025		38,5
Résistances des bactéries aux antibiotiques			
Proportion de SARM** chez <i>Staphylococcus aureus</i> isolé d'hémocultures (%)	< 10%		6,9
Densité d'incidence SARM / 1000 JH	Réduction > 10% entre 2019 et 2025		0,16
Proportion de souches résistantes à la vancomycine chez <i>Enterococcus faecium</i> isolé d'hémocultures (%)	< 1%		0,0
Densité d'incidence <i>Klebsiella pneumoniae</i> produisant une BLSE*** / 1000 JH	Réduction d'au moins 10% entre 2019 et 2025, au national et dans toutes les régions		0,22
Proportion de souches produisant une carbapénémase chez <i>K. pneumoniae</i> isolée d'hémocultures (%)	Maintien valeur 2019		3,6
Densité d'incidence Enterobacterales produisant une carbapénémase / 1000 JH	Maintien valeur 2019		0,056
Densité d'incidence Enterobacterales produisant une BLSE / 1000 JH	Réduction > 10% entre 2019 et 2025		0,83

* Céphalosporines de 3ème et de 4ème générations, association pipéracilline-tazobactam, aztréonam, carbapénèmes, fluoroquinolones, glycopeptides, linézolide, tédizolide, daptomycine et colistine.

** SARM: *S. aureus* résistant à la méticilline.

*** BLSE: Bêta-lactamase à spectre étendu.

2 – Consommations


2.1 Antibiotiques

Consommation par secteur d'activité : nb de doses définies journalières / 1000 journées d'hospitalisation (DDJ/1000 JH) et variation (%)

Secteur d'activité	Nb de DDJ/1 000 JH		Variation	National Année 2024	CHU
	Année 2023	Année 2024			
Chirurgie		880,1			680,4
Gynécologie-obstétrique		375,7			279,8
Médecine		686,6			540,5
Pédiatrie		329,6			304,2
Psychiatrie		275,0			58,3
Réanimation		1117,3			1187,2
SLD		82,7			73,3
SMR		239,7			216,2
Urgence*					257,5
Total		526,9			463,5

* Urgence : hospitalisation de très court séjour.

Comparaison de la consommation avec les établissements de type CHU: nb de DDJ/
1000 JH



Consommation par regroupements d'antibiotiques d'intérêt et par molécule: nb de DDJ/1000 JH et variation (%)

Famille d'antibiotique	Nb de DDJ/1 000 JH		Variation
	Année 2023	Année 2024	
Pénicillines		246,0	
Amoxicilline		72,9	
Amoxicilline Injectable		19,0	
Amoxicilline Orale		53,8	
Amoxicilline-ac. clavulanique		102,3	
Amoxicilline-ac. clavulanique Injectable		34,7	
Amoxicilline-ac. clavulanique Orale		67,6	
Pénicillines M		29,8	
Pénicillines anti- <i>P. aeruginosa</i> ^a		34,3	
Pipéracilline tazobactam		33,4	
Témocilline		1,6	
Céphalosporines		58,5	
C1G et C2G		7,9	
Céfoxitine		0,8	
C3G-C4G		50,4	
C3G Orales		1,5	
C3G Injectables sans activité sur <i>P. aeruginosa</i>		32,0	
Céfotaxime		8,2	
Ceftriaxone		23,8	
C3G-C4G actives sur <i>P. aeruginosa</i> ^b		16,2	
Ceftazidime		3,1	
Céfépime		12,4	
Ceftolozane tazobactam		0,7	
Ceftazidime avibactam		0,6	
Ceftobiprole		0,0	
Ceftaroline		0,1	
Cefiderocol		0,2	
Monobactames		2,1	
Aztreonam		1,9	
Aztreonam-avibactam		0,2	
Carbapénèmes		11,1	
Imipénème		1,2	
Imipénème+relebactam		0,0	
Méropénème		8,9	
Méropénème+vaborbactam		0,0	
Ertapénème		0,9	

Famille d'antibiotique	Nb de DDJ/1 000 JH		Variation
	Année 2023	Année 2024	
Fluoroquinolones		27,2	
Ciprofloxacin Injactable		0,4	
Ciprofloxacin Orale		5,0	
Lévofoxacin Injactable		2,5	
Lévofoxacin Orale		15,8	
Ofloxacin Injactable		0,2	
Ofloxacin Orale		2,5	
Delafoxacin Injactable			
Delafoxacin Orale			
MLS		33,0	
Macrolides		21,2	
Azithromycine		10,0	
Spiramycine seule		5,2	
Spiramycine+métronidazole		0,1	
Lincosamides		8,9	
Streptogramines		3,0	
Antibiotiques autres^c		97,4	
Fosfomycine Injactable		0,3	
Daptomycine		44,6	
Colistine		1,9	
Colistine Injactable		0,0	
Linézolide		4,3	
Tédizolide		0,0	
Glycopeptides		21,4	
Vancomycine		3,9	
Teicoplanine		17,4	
Dalbavancine		0,1	
Oritavancine			
Imidazolés ^d		21,3	
Imidazolés Injactable		13,5	
Imidazolés Orale		7,7	
Métronidazole		21,2	
Anti Cocci Gram+ résistants (ou anti cocci Gram positifs résistants)^e		70,4	
Sulfamides et triméthoprime		15,3	
Cotrimoxazole (Sulfaméthoxazole et triméthoprime)		15,0	
Triméthoprime		0,0	
Aminosides		6,9	

Famille d'antibiotique	Nb de DDJ/1 000 JH		Variation
	Année 2023	Année 2024	
Rifampicine		7,5	
Cyclines		20,3	
Tigécycline		0,0	
Phénicolés			
J01		510,0	
Fidaxomicine		1,7	
Tous les antibiotiques		526,9	

^a Pénicillines anti-*P. aeruginosa*: pipéracilline, ticarcilline, ticarcilline+acide clavulanique, pipéracilline+tazobactam.

^b C3G-C4G injectables actives sur *P. aeruginosa*: ceftazidime, céfépime, ceftolozane tazobactam.

^c Antibiotiques classés en J01X regroupant glycopeptides, imidazolés injectables, acide fusidique, fosfomycine, linézolide, colistine, nitrofurantoïne, daptomycine et tédizolide.

^d Imidazolés par voie injectable (J01XD) et per os (P01AB).

^e Anti-CG+R (Anti Cocci Gram+ résistants): glycopeptides, acide fusidique, ceftaroline, ceftobiprole, daptomycine, délafloxacine, linézolide, tédizolide.

Indicateur ECDC: part d'antibiotiques à large spectre au sein de la classe ATC J01 (%)

	Nb de DDJ/1 000 JH		Part
	Année 2024 ECDC	Année 2024 J01	
	196,6	510,0	38,5

Indicateur OMS AWaRe: nb de DDJ/1000 JH et part de la consommation totale (%)

Catégorie	Année 2024	Part
Access*	287,6	54,6
Watch**	184,4	35,0
Reserve***	54,9	10,4

* Access : antibiotiques utilisés pour le traitement d'infections courantes.

** Watch : antibiotiques à utiliser pour des pathologies spécifiques, de façon contrôlée.

*** Reserve : antibiotiques de « dernier recours ».

Indicateur SPILF ES: nb de DDJ/1000 JH et part de la consommation totale (%)


Catégorie	Année 2024	Part
Groupe 1*	344,9	65,5
Groupe 2**	166,9	31,7
Groupe 3***	15,1	2,9

* Groupe 1 : molécules à utilisation préférentielle.

** Groupe 2 : molécules à indications restreintes, ayant un impact plus important sur la résistance bactérienne.

*** Groupe 3 : molécules réservées pour préserver leur efficacité.

Évolution de la consommation: nb de DDJ/1000 JH



* C3G – C4G sans inhibiteurs (Céphalosporines de 3ème et de 4ème générations sans inhibiteurs): céfotaxime, ceftazidime, ceftriaxone, céfixime, cefpodoxime, céfépime.

** Anti-CG+R (Anti Cocci Gram+ résistants): glycopeptides, acide fusidique, ceftaroline, ceftobiprole, daptomycine, délafloxacine, linézolide, tédizolide.

Top 10 des consommations de l'établissement: nb de DDJ/1000 JH et variation (%)

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Amoxicilline-acide clavulanique		102,3	
Amoxicilline		72,9	
Daptomycine		44,6	
Pipéracilline-tazobactam		33,4	
Cloxacilline		29,8	
Ceftriaxone		23,8	
Métronidazole		21,2	
Doxycycline		19,1	
Lévofloxacine		18,3	
Teicoplanine		17,4	

Les 10 antibiotiques les plus consommés par les établissements de type CHU: nb de DDJ/1000 JH et variation (%)

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Amoxicilline-acide clavulanique		83,9	
Amoxicilline		65,2	
Pipéracilline-tazobactam		31,2	
Daptomycine		26,9	
Ceftriaxone		23,6	
Sulfaméthoxazole-triméthoprim		20,7	
Métronidazole		18,2	
Céfotaxime		17,8	
Lévoﬂoxacine		15,6	
Céfazoline		15,6	


2.2 Antifongiques

Consommation par secteur d'activité : nb de DDJ/1000 JH et variation (%)

Secteur d'activité	Nb de DDJ/1 000 JH		Variation	National	Année 2024 CHU
	Année 2023	Année 2024			
Chirurgie		40,2			36,7
Gynécologie-obstétrique					1,7
Médecine		29,6			53,7
Pédiatrie		41,8			29,0
Psychiatrie		5,9			0,8
Réanimation		121,9			166,4
SLD		5,1			1,9
SMR		14,2			9,4
Urgence*					4,0
Total		28,4			39,0

* Urgence : hospitalisation de très court séjour.


Comparaison de la consommation avec les établissements de type CHU: nb de DDJ/
1000 JH



Consommation en antifongiques par classes et par molécules: nb de DDJ/1000 JH et variation (%)

Famille d'antifongiques	Nb de DDJ/1 000 JH		Variation
	Année 2023	Année 2024	
Amphotéricine B		1,2	
Amphotéricine B non lipidique		0,4	
Amphotéricine B liposomale		0,7	
Triazolés		21,1	
Fluconazole		12,7	
Itraconazole		1,8	
Voriconazole		3,4	
Posaconazole		1,0	
Isavuconazole		2,1	
Flucytosine		0,1	
Echinocandines		6,0	
Caspofungine		5,9	
Micafungine		0,1	
Anidulafungine			
Rezafungine			
Tous les antifongiques		28,4	

Évolution de la consommation: nb de DDJ/1000 JH



3 – Résistances bactériennes

3.1 *Staphylococcus aureus*

S. aureus: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Méticilline		7,9 (95/1201)	
Kanamycine		5,3 (63/1198)	
Tobramycine		4,8 (21/439)	
Gentamicine		3,1 (37/1198)	
Fluoroquinolones		94,9 (94/99)	
Erythromycine		30,2 (357/1181)	
Pristinamycine		0,0 (0/4)	
Sulfaméthoxazole-triméthoprine		3,4 (41/1189)	
Rifampicine		0,7 (8/1200)	
Fosfomycine			
Acide fusidique		5,6 (67/1201)	
Vancomycine		0,0 (0/792)	
Linézolide		0,0 (0/805)	
Daptomycine		0,0 (0/788)	

S. aureus résistant à la méticilline (SARM): % par type de prélèvement et variation (pp)

Type de prélèvement	Année 2023	Année 2024	Variation
Dispositif intravasculaire		3,6 (1/28)	
Hémoculture		6,9 (14/203)	
Liquide céphalorachidien		16,7 (1/6)	
Prélèvement profond		9,1 (48/530)	
Prélèvement respiratoire non protégé		4,3 (4/92)	
Prélèvement respiratoire protégé ou distal		4,7 (6/129)	
Urine		16,5 (16/97)	

SARM: densité d'incidence (DI): nombre de souches pour 1000 JH et variation (%)

	Année 2023	Année 2024	Variation
Bactériémie		0,024 (14/589397)	
Total		0,16 (95/589397)	
Bactériémie national		0,022 (1276/59217496)	
Total national		0,13 (7545/59217496)	

3.2 *Escherichia coli*

E. coli: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Amoxicilline/Ampicilline			
Amoxicilline-acide clavulanique			
Amoxicilline-acide clavulanique – cystite		23,2 (497/2142)	
Pipéracilline-tazobactam		9,8 (268/2728)	
C3G		9,6 (268/2785)	
Céfotaxime		16,7 (255/1524)	
Ceftriaxone		0,4 (5/1283)	
Ceftazidime		8,2 (226/2748)	
Céfépime		12,5 (178/1421)	
Ertapénème		0,4 (10/2778)	
Imipénème		0,2 (4/1642)	
Amikacine		1,0 (28/2764)	
Gentamicine		6,9 (179/2591)	
Fluoroquinolones		14,6 (404/2773)	
Ciprofloxacine		13,0 (190/1457)	
Lévofloxacine		13,3 (190/1428)	
Ofloxacine		15,6 (394/2528)	
Sulfaméthoxazole-triméthoprine		30,8 (842/2731)	
Nitrofurantoïne			
Fosfomycine			

3.3 *Klebsiella pneumoniae*

K. pneumoniae: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Amoxicilline-acide clavulanique			
Amoxicilline-acide clavulanique – cystite		27,5 (105/382)	
Pipéracilline-tazobactam		29,2 (165/566)	
C3G		29,0 (171/590)	
Céfotaxime		30,8 (142/461)	
Ceftriaxone		3,0 (4/133)	
Ceftazidime		28,5 (163/572)	
Céfépime		26,7 (115/431)	
Ertapénème		4,8 (28/588)	
Imipénème		2,8 (13/463)	
Amikacine		3,9 (23/587)	
Gentamicine		9,5 (54/568)	
Fluoroquinolones		25,5 (150/589)	
Ciprofloxacine		23,6 (102/433)	
Lévofloxacine		23,5 (100/426)	
Ofloxacine		26,7 (150/561)	
Sulfaméthoxazole-triméthoprine		23,4 (134/572)	
Nitrofurantoïne			
Fosfomycine			

3.4 *Enterobacter cloacae* complex

E. cloacae complex: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)


Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Pipéracilline-tazobactam		36,4 (160/439)	
C3G		41,5 (183/441)	
Céfotaxime		41,2 (181/439)	
Ceftriaxone		0,0 (0/1)	
Ceftazidime		40,8 (179/439)	
Céfépime		21,5 (88/410)	
Ertapénème		24,0 (106/442)	
Imipénème		1,2 (5/427)	
Amikacine		3,8 (17/442)	
Gentamicine		16,7 (73/438)	
Fluoroquinolones		21,3 (94/442)	
Ciprofloxacin		17,6 (75/425)	
Lévoﬂoxacin		16,0 (68/424)	
Ofloxacin		21,6 (93/431)	
Sulfaméthoxazole-triméthoprime		22,6 (96/425)	
Nitrofurantoïne			
Fosfomycine			

3.5 Enterobacterales productrices de BLSE (EBLSE)

EBLSE: % par type de prélèvement et variation (pp)

Type de prélèvement	Année 2023	Année 2024	Variation
Dispositif intravasculaire		11,5 (7/61)	
Hémoculture		9,6 (59/617)	
Liquide céphalorachidien		16,7 (1/6)	
Prélèvement profond		6,7 (65/965)	
Prélèvement respiratoire non protégé		8,8 (15/171)	
Prélèvement respiratoire protégé ou distal		6,7 (26/388)	
Urine		10,1 (332/3293)	

EBLSE: répartition des espèces bactériennes (%)



EBLSE: évolution du % des principales espèces bactériennes

	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Enterobacterales					9,0 (487/5425)
Enterobacterales région					7,1 (2015/28285)
Enterobacterales national					8,2 (33176/405148)
<i>E. coli</i>					8,2 (229/2791)
<i>E. coli</i> région					5,7 (937/16480)
<i>E. coli</i> national					6,5 (14599/223770)
<i>K. pneumoniae</i>					21,9 (129/590)
<i>K. pneumoniae</i> région					19,3 (538/2788)
<i>K. pneumoniae</i> national					20,2 (10327/51181)
<i>E. cloacae</i> complex					19,6 (87/444)
<i>E. cloacae</i> complex région					22,0 (391/1778)
<i>E. cloacae</i> complex national					20,1 (5596/27815)

EBLSE: densité d'incidence: nombre de souches pour 1000 JH et variation (%)

	Année 2023	Année 2024	Variation
Bactériémie		0,100 (59/589397)	
Total		0,83 (487/589397)	
Bactériémie national		0,076 (4341/57256039)	
Total national		0,58 (33176/57256039)	

E. coli BLSE: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Aztréonam-avibactam			
Céfidérol		100,0 (1/1)	
Ceftazidime-avibactam		1,8 (4/227)	
Ceftolozane-tazobactam		8,5 (18/213)	
Imipénème		1,3 (3/223)	
Méropénème-vaborbactam			

E. coli BLSE: densité d'incidence: nombre de souches pour 1000 JH et variation (%)

	Année 2023	Année 2024	Variation
Bactériémie		0,053 (31/589397)	
Total		0,39 (229/589397)	
Bactériémie national		0,033 (1895/57256039)	
Total national		0,25 (14599/57256039)	

K. pneumoniae BLSE: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Aztréonam-avibactam			
Céfidérol		12,5 (1/8)	
Ceftazidime-avibactam		11,7 (15/128)	
Ceftolozane-tazobactam		26,1 (30/115)	
Imipénème		9,7 (12/124)	
Méropénème-vaborbactam		0,0 (0/1)	

***K. pneumoniae* BLSE: densité d'incidence: nombre de souches pour 1000 JH et variation (%)**

	Année 2023	Année 2024	Variation
Bactériémie		0,024 (14/589397)	
Total		0,22 (129/589397)	
Bactériémie national		0,025 (1418/57256039)	
Total national		0,18 (10327/57256039)	

***E. cloacae* complex BLSE: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)**

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Aztréonam-avibactam			
Céfidérol		50,0 (1/2)	
Ceftazidime-avibactam		4,6 (4/87)	
Ceftolozane-tazobactam		39,5 (30/76)	
Imipénème		3,7 (3/81)	
Méropénème-vaborbactam			

***E. cloacae* complex BLSE: densité d'incidence: nombre de souches pour 1000 JH et variation (%)**


	Année 2023	Année 2024	Variation
Bactériémie		0,022 (13/589397)	
Total		0,15 (87/589397)	
Bactériémie national		0,014 (803/57256039)	
Total national		0,10 (5596/57256039)	

3.6 Enterobacterales productrices de carbapénémase (EPC)

EPC: % total et variation (pp)

	Année 2023	Année 2024	Variation
Total		0,6 (33/5425)	

EPC: répartition des espèces bactériennes (%)



EPC: densité d'incidence: nombre de souches pour 1000 JH et variation (%)

	Année 2023	Année 2024	Variation
Total		0,056 (33/589397)	
Total national		0,037 (1997/54561810)	

3.7 Enterococcus faecium

E. faecium: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Amoxicilline/Ampicilline			
Daptomycine		37,5 (6/16)	
Linézolide		0,0 (0/16)	
Nitrofurantoïne			
Teicoplanine		0,7 (1/152)	
Vancomycine		0,3 (1/311)	

***E. faecium* résistant à la vancomycine (ERV): densité d'incidence: nombre de souches pour 1000 JH et variation (%)**

	Année 2023	Année 2024	Variation
Total		0,002 (1/589397)	
Total national		0,003 (182/58571012)	

3.8 *Enterococcus faecalis*

***E. faecalis*: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)**

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Amoxicilline/Ampicilline			
Nitrofurantoïne			
Teicoplanine		0,0 (0/233)	
Vancomycine		0,0 (0/616)	

3.9 *Pseudomonas aeruginosa*

***P. aeruginosa*: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)**

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Ticarcilline		100,0 (154/154)	
Pipéracilline-tazobactam		100,0 (135/135)	
Ceftazidime		98,5 (133/135)	
Ceftazidime-avibactam		7,9 (46/581)	
Ceftolozane-tazobactam		3,0 (18/592)	
Céfépime		99,0 (95/96)	
Céfidérol		9,1 (1/11)	
Imipénème		100,0 (108/108)	
Imipénème-relebactam		60,0 (6/10)	
Méropénème		8,6 (48/555)	
Amikacine		5,2 (31/594)	
Ciprofloxacine		100,0 (60/60)	

3.10 *Acinetobacter baumannii*

A. baumannii: % de résistance aux antibiotiques et variation (pp)

Molécule	Année 2023	Année 2024	Variation
Ticarcilline		31,6 (6/19)	
Pipéracilline-tazobactam		38,5 (5/13)	
Ceftazidime		33,3 (6/18)	
Céfépime		20,0 (4/20)	
Imipénème		18,2 (4/22)	
Méropénème		18,2 (4/22)	
Amikacine		17,4 (4/23)	
Gentamicine		27,3 (6/22)	
Ciprofloxacine		100,0 (5/5)	

3.11 Évolution des densités d'incidence

Évolution des densités d'incidence (nombre de souches pour 1000 JH) des SARM, EBLSE et EPC

