

A cura di:
Leonardo James Vinco
Luigi Bertocchi
Francesca Fusi
Giovanna Trambajolo



Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DEL BENESSERE
ANIMALE NELLE GALLINE
OVAIOLE: MANUALE
ESPLICATIVO CONTROLLO
UFFICIALE**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Riferenza
Nazionale per
il Benessere Animale



Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE NELLE
GALLINE OVAIOLE: MANUALE ESPLICATIVO
CONTROLLO UFFICIALE**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Riferenza Nazionale per
il Benessere Animale



BRESCIA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

“Bruno Ubertini”

ANNO 2024

A cura di:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”
Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale
Ministero della Salute

Con il contributo del gruppo di lavoro:

Regione Abruzzo
Regione Emilia-Romagna
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Sardegna
Regione Valle d'Aosta

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”
Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia – ITALY

Responsabile CReNBA

Dr. Luigi Bertocchi

Email: luigi.bertocchi@izsler.it

Referente CReNBA per gli avicoli

Dr. Leonardo James Vinco

Email: leonardojames.vinco@izsler.it

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



Versione:		Data
	1.0	Gennaio 2022
	2.0	Gennaio 2024

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE.....	5
LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO	8
AREE DEL BENESSERE ANIMALE SECONDO IL SISTEMA CLASSYFARM (AUTOCONTROLLO)	13
AREA A. Management aziendale.....	13
AREA B. Strutture ed attrezzature.....	13
AREA Grandi rischi e sistemi di allarme	13
AREA C. Animal-based measures.....	14
LA CHECK LIST PER IL CONTROLLO UFFICIALE	15
CRITERI DI VALUTAZIONE PER I REQUISITI DEL CONTROLLO UFFICIALE	15
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE ANIMAL-BASED MEASURES (ABMs).....	19
APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA	20
I PERSONALE.....	21
1. Numero di addetti che si occupano degli animali	21
2. Formazione degli addetti.....	23
II ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI.....	26
3. Numero di ispezioni.....	26
4. Illuminazione per l'ispezione.....	28
5. Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento.....	29
6. Consultazione del Medico Veterinario	31
7. Dispositivi di ispezione.....	32
III TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati).....	34
8. Tenuta delle registrazioni dei dati.....	34
9. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici	36
IV LIBERTA' DI MOVIMENTO	38
10. Spazio disponibile.....	38
V EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	41
11. Rimozione degli animali morti	41
12. Rimozione delle deiezioni.....	42
13. Condizioni generali di pulizia.....	44
14. Fabbricati e locali di stabulazione.....	45

15. Sistemi di allevamento	47
16. Dimensioni delle gabbie e loro aperture	48
17. Infermeria.....	49
18. Temperatura e umidità relativa	50
19. Presenza di gas nocivi.....	53
20. Polverosità dell'aria	55
21. Nido (Gabbie Modificate).....	57
22. Lettieria (Gabbie Modificate)	60
23. Posatoi (Gabbie Modificate).....	62
25. Dispositivi di accorciamento unghie (Gabbie Modificate).....	65
26. Nido (Sistemi alternativi).....	67
27. Posatoi (Sistemi alternativi).....	69
28. Lettieria (Sistemi alternativi)	71
29. Pavimentazione (Sistemi alternativi)	73
30. Numero di livelli sovrapposti (Sistemi alternativi VOLIERE).....	76
31. Altezza dei livelli (Sistemi alternativi VOLIERE).....	78
32. Mangiatoie e abbeveratoi (Sistemi alternativi VOLIERE).....	79
33. Protezione dalle deiezioni (Sistemi alternativi VOLIERE).....	80
34. Dimensione degli accessi agli spazi esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)	82
35. Disponibilità di spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO)	84
36. Ripari esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)	86
37. Utilizzi ulteriori dello spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO)	88
VI ILLUMINAZIONE MINIMA.....	89
38. Illuminazione	89
39. Programma di luce	91
40. Periodo di penombra	92
41. Uniformità di illuminazione (Allevamenti ad illuminazione naturale).....	93
VII ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	94
42. Ispezione degli impianti automatici e meccanici e gestione delle situazioni di emergenza	94
43. Sistema di allarme.....	95
44. Presenza di un impianto di riserva	97
45. Rumore.....	98
VIII ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE	98
46. Gestione dell'alimentazione.....	99

47. Tipologia di alimentazione	100
48. Qualità dell'acqua	103
49. Disponibilità di mangiatoie	105
50. Disponibilità di abbeveratoi	107
51. Somministrazione di sostanze illecite	111
IX MUTILAZIONI.....	112
52. Mutilazioni	112
X PROCEDURE D'ALLEVAMENTO	115
53. Disposizioni generali	115
XI ABMs	117
54. Mortalità settimanale media.....	117
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE SULLA BASE DEL RISCHIO IN CLASSYFARM: ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE NELLE OVAIOLE.....	120
RIFERIMENTI NORMATIVI	121
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	122

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO

I veterinari ufficiali hanno il compito di tutelare il benessere degli animali allevati non solo garantendo, attraverso i controlli, che gli allevatori osservino le disposizioni vigenti, ma anche fornendo indicazioni sulle corrette pratiche di allevamento.

Gli animali, infatti, devono essere allevati tenendo conto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche: solo in questo modo il benessere animale può essere garantito.

Questo aspetto è ben affrontato anche nel nostro Codice penale, dove in tema di maltrattamento degli animali, si fa chiaro riferimento alle loro caratteristiche etologiche: *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori **insopportabili per le sue caratteristiche etologiche** è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”* (Codice penale, Libro II, Titolo IX bis, Articolo 544-ter “Maltrattamento di animali”).

Analogamente, *“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali **in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze**”* (Codice penale, Libro III, Titolo I, Capo II, Sezione I, Articolo 727 “Abbandono di animali”).

Tuttavia, stabilire a priori quale sia “la natura” o “la presenza di gravi sofferenze” negli animali allevati, è senz'altro un esercizio complesso, che non può esimersi dal considerare il *grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento della specie, nonché le proprie esigenze fisiologiche ed etologiche, grazie all'esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche finora disponibili* [come da Decreto Legislativo 146/2001 articolo 4, paragrafo 1, lettera a)], evitando il più possibile di confondere la loro reale condizione di vita con le aspettative e specifiche conoscenze che ognuno di noi ha nel campo dell'allevamento zootecnico.

Dal punto di vista medico-scientifico, infatti, la “diagnosi del livello di benessere” di un animale allevato deve necessariamente basarsi sull'analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell'animale, il rispetto dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all'ambiente. Tutte queste condizioni devono essere registrate e valutate attraverso specifici indicatori e i risultati devono essere

analizzati attraverso un metodo il più possibile obiettivo e scientifico. In definitiva, la valutazione del benessere animale è un difficile esercizio di astrazione dal consueto e quotidiano approccio sanitario, zootecnico o affettivo che ogni persona può mettere in atto quando a vario titolo si relaziona con gli animali da reddito.

Per i motivi appena illustrati e per facilitare il soddisfacimento di quanto già previsto dalla normativa relativa alla protezione degli animali negli allevamenti [Decreto Legislativo 146/2001, articolo 2, paragrafo 1, lettera a)], ovvero *“Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili”*, il Ministero della Salute, con il supporto del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), basandosi non solo sulla norma citata ma anche sulle più recenti e autorevoli conoscenze scientifiche ha reso disponibile per gli allevatori e i veterinari aziendali un sistema di valutazione e categorizzazione del rischio per il benessere animale e la biosicurezza negli allevamenti (suini e bovini per ora ma che verrà esteso anche all'allevamento delle galline ovaiole), basato su una raccolta di dati in autocontrollo attraverso specifiche check list di autovalutazione e sulla successiva elaborazione e validazione degli stessi attraverso una piattaforma informatica denominata ClassyFarm.

Al fine di rendere confrontabile la valutazione effettuata in autocontrollo dal veterinario aziendale incaricato dall'allevatore (inserita in ClassyFarm) rispetto a quella effettuata durante i controlli ufficiali per le ispezioni previste dalla programmazione del Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) o dall'extra piano, si rende necessario formalizzare ed inserire in “Vetinfo – controlli” una nuova check list per il controllo ufficiale, costruita sui medesimi criteri di categorizzazione del rischio come da sistema ClassyFarm e completata, rispetto ai documenti precedentemente utilizzati, dal manuale esplicativo per gli ispettori.

Per questo motivo, a disposizione dei veterinari ufficiali, è stata sviluppata la nuova check list per il controllo del benessere animale negli allevamenti di galline ovaiole (con il relativo manuale esplicativo, costituito dal presente documento), per rendere agevole, autorevole, omogenea e validata la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani.

Tale attività ricade a pieno titolo in quanto il Decreto Legislativo 146/2001 ha già previsto laddove si legge che *“Le autorità sanitarie territorialmente competenti: a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attività, **la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche***

secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche” [Decreto Legislativo 146/2001, articolo 4, paragrafo 1, lettera a)].

L'obiettivo finale dell'applicazione del nuovo protocollo, oltre a consentire l'individuazione di situazioni non conformi e pericolose per le condizioni di benessere animale, sarà altresì quello di poter categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti e di potersi confrontare con le medie nazionali, regionali e provinciali.

In dettaglio, la procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base delle nuove check list a disposizione dei veterinari ufficiali, tiene conto delle indicazioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito, del Decreto Legislativo 267/2003 per la protezione delle galline ovaiole (e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento) e delle numerose raccomandazioni presenti nei report e nelle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

La check list si basa sull'analisi di due gruppi di dati: 1) quelli previsti dai Decreti Legislativi 146/2001 e 267/2003 collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche) e 2) quelli derivati dalla rilevazione di un importante indicatore diretto di benessere o animal-based measure (ABM). I primi parametri sono suddivisi nella check list secondo le categorie di non conformità previste dalla Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14-11-2006 relativa ai *“requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali”* [art.3 punto c) ed allegato II].

Al riguardo, si fa presente che la suddetta Decisione è stata abrogata con l'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri, che prevede alcune modifiche nelle modalità di rendicontazione in Commissione Europea delle non conformità.

Questi dati sono ulteriormente classificati dal sistema informativo ClassyFarm in 3 aree di rischio: Area A - “Management aziendale e personale”; Area B - “Strutture ed attrezzature” ed Area - “Grandi rischi e sistemi di allarme”. Il parametro appartenente al secondo gruppo di dati (ABMs), relativi all'analisi della presenza o meno di effetti avversi riscontrabili sugli animali, viene invece convogliato dal sistema informativo in una quarta area (Area C), che riporta i risultati delle principali “animal-based measures”. La valutazione delle ABMs è senza dubbio un valido ausilio al lavoro dell'autorità competente al fine di valutare eventuali effetti negativi sulle condizioni e lo stato di salute e benessere

degli animali e per dimostrare quanto sancito dal Decreto Legislativo 146/2001: “nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere” (Decreto Legislativo 146/2001, allegato, punto 21).

La possibilità di distinguere i parametri rilevati nelle aree previste dal sistema ClassyFarm consentirà, non solo di categorizzazione in fasce di rischio gli allevamenti, ma anche di indirizzare in modo appropriato gli interventi preventivi sui principali fattori di debolezza del sistema zootecnico di ogni singola azienda, migliorando di conseguenza le condizioni di vita degli animali.

Nel presente manuale sono riportate tutte le osservazioni contenute nella nuova check list, ognuna preceduta dalla citazione della disposizione normativa che la prescrive. Infine, ogni osservazione è seguita da una breve spiegazione sull’argomento, con lo scopo di illustrare più a fondo la condizione da valutare ed aiutare il veterinario pubblico ufficiale a prendere la decisione migliore.

Il risultato finale dell’applicazione del sistema di valutazione, qui illustrato, è identificare non solo le non conformità legislative, ma anche classificare gli allevamenti tramite un indice numerico globale di benessere, in linea con il sistema ClassyFarm e con il rilievo in autocontrollo, che esprima il livello di rischio dell’allevamento, ad esempio come di seguito esposto:

- livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile/non conforme alla normativa/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incorrere in una situazione negativa (“distress”), dovuta all’impossibilità di godere a pieno di una o più delle 5 libertà (FAWC; 1979)¹;
- livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile/conforme alla normativa, compatibile con la possibilità che tutti gli animali del gruppo possano soddisfare le proprie 5 libertà (FAWC; 1979)¹ e non subire condizioni di stress;
- livello 3 = rischio basso o condizione ottimale/superiore alla normativa, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà (FAWC; 1979)¹, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Il risultato parziale di ogni area (A, B, C e Grandi rischi) fornisce invece un’indicazione circa il peso e l’importanza che ognuna di esse ha nella composizione finale dell’indice di rischio per il benessere animale indipendentemente dalle non conformità legislative.

¹ 1) Libertà dalla sete, fame e malnutrizione; 2) Libertà dai disagi ambientali; 3) Libertà da dolore, ferite e malattie; 4) Libertà di poter manifestare il proprio repertorio comportamentale specie-specifico; 5) Libertà dalla paura e dallo stress. Fonte: Farm Animal Welfare Council (FAWC), 1979. Farm Animal Welfare Council Press Statement. <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http://www.fawc.org.uk/pdf/fivefreedoms1979.pdf>.

Alla fine dell'intero processo di valutazione, nel sistema ClassyFarm, è prodotto un documento finale di elaborazione dei dati e riepilogo dei punti critici nel quale sono presenti:

- l'elenco dei punti critici, ovvero i criteri con risposta non conforme o insufficiente;
- il livello di rischio complessivo, relativo alle condizioni di benessere degli animali presenti in allevamento;
- il livello di rischio degli animali in relazione ad ognuna delle 4 aree di valutazione.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

AREE DEL BENESSERE ANIMALE SECONDO IL SISTEMA CLASSYFARM (AUTOCONTROLLO)

AREA A. Management aziendale

Il management aziendale è fondamentale per il benessere animale e comprende tutte quelle operazioni che coinvolgono gli addetti agli animali. Sebbene le caratteristiche strutturali di un allevamento, istintivamente, possano sembrare più importanti in termini di effetti sulle condizioni di benessere degli animali, quest'ultime in realtà sono maggiormente influenzate dalla gestione quotidiana delle principali attività routinarie eseguite dal personale. Le azioni e le scelte degli operatori, sia dirette sull'animale che indirette, possono favorire condizioni di benessere anche in strutture apparentemente poco adeguate, oppure al contrario, possono provocare situazioni di malessere in strutture moderne e all'avanguardia.

AREA B. Strutture ed attrezzature

Le strutture e le attrezzature zootecniche, così come il management e l'igiene ambientale, rappresentano una potenziale fonte di rischio per il benessere animale e per il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali. Per questo, numerosi studi, raccomandazioni e pareri scientifici, ai fini della valutazione del rischio per il benessere animale si focalizzano prevalentemente sull'adeguatezza delle strutture di stabulazione.

Tra una corretta condizione ambientale ed il benessere dell'animale, si interpone la capacità delle galline ovaiole di adattarsi alle strutture. Pertanto, è necessario, ai fini dell'individuazione delle condizioni migliori per ogni allevamento, ricercare tra i punti critici strutturali individuati quelli più incidenti in modo da migliorarli per ridurre il rischio di sviluppare lesioni o comportamenti anomali.

AREA Grandi rischi e sistemi di allarme

Come il management, l'igiene ambientale e le attrezzature zootecniche, anche i grandi rischi e i relativi sistemi d'allarme rappresentano un pericolo per il benessere animale. La presenza o assenza di detti presidi di prevenzione, infatti, non ha un impatto diretto sul benessere di un animale ma, qualora si verificassero delle importanti situazioni di pericolo (es. guasti all'impianto elettrico), potrebbero fare la differenza nel salvaguardare la salute, il benessere e la vita stessa di animali e uomini, impedendo o limitando il verificarsi di estremi effetti avversi. Pertanto, l'operatore deve valutare la prevenzione dei grandi rischi a tutela del benessere animale.

I criteri che rientrano in questa area dovrebbero prevedere, come buona prassi, delle procedure scritte a livello aziendale o quantomeno dimostrare l'effettiva preparazione agli eventi avversi contemplati dal criterio.

AREA C. Animal-based measures

L'analisi degli effetti avversi in tema di benessere animale, riconducibili a strutture e procedure gestionali non adeguate, è possibile attraverso la valutazione di indicatori di benessere (animal-based measures - ABMs) misurabili direttamente sull'animale (es. zoppia) oppure indirettamente, mediante la raccolta di dati disponibili in azienda (es. prevalenza di mortalità annuale o settimanale), e per i quali è stata scientificamente dimostrata la correlazione con il benessere animale. L'animale che non è in condizioni di benessere manifesta, infatti, precisi segnali fisici che si possono cogliere, interpretare e valutare al fine di comprenderne lo stato di disagio.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRONPA

LA CHECK LIST PER IL CONTROLLO UFFICIALE

Il documento da utilizzare in corso di ispezione o audit sul benessere animale è suddiviso in diverse sezioni, al fine di consentire la verifica della conformità o non conformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla normativa (valevole anche per la verifica del rispetto dei criteri di condizionalità). Inoltre, come già specificato precedentemente, questa raccolta di dati sul benessere animale, integrandosi con le informazioni presenti in BDN, le valutazioni inserite dai veterinari aziendali in corso di autocontrollo con la check list ClassyFarm e le informazioni di ritorno dai macelli, concorre a definire il livello di rischio complessivo dell'azienda oggetto del controllo. Il livello di rischio, supportato da un'analisi accurata per ogni area tematica, permette un confronto con la media provinciale, regionale e nazionale.

La parte iniziale della check list è costituita da una raccolta di informazioni, non vevoli per il giudizio finale sulla conformità o non conformità, relative ai:

- Presenza di un manuale di buone pratiche, a livello generale questo dato, pur non costituendo non conformità in caso di mancata presenza, è importante per concorrere a definire un minore livello di rischio; inoltre, a livello di singoli requisiti può aiutare nella definizione di requisiti superiori al livello minimo (ottimali).
- Informazioni rilevabili dalle registrazioni effettuate nel sistema dell'anagrafe (es. numero capi totali presenti in BDN), che vengono ottenute in automatico nel momento della compilazione della check list in Vetinfo con inserimento del codice di allevamento e della data del controllo; Inoltre è presente una tabella per la raccolta dei "Dati aziendali", che vengono riportati sulla check list sulla base delle dichiarazioni raccolte dal proprietario/detentore o dall'addetto alla custodia degli animali presente al momento dell'ispezione, necessari al sistema per la categorizzazione del rischio.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I REQUISITI DEL CONTROLLO UFFICIALE

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario ufficiale per i parametri sanciti dalle norme sono prevalentemente suddivise nelle opzioni di scelta riportate in Tabella 1.

Tabella 1 Legenda non conformità

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SÌ (Conforme)	Nessuna

no - categoria A (Non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no - categoria B (Non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO - categoria C (Non conformità maggiore)	Sanzione amministrativa o penale immediata
NA (Non applicabile)	–
OTTIMALE* - superiore al requisito previsto	Facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

***Fondamentale per ottenere una corretta valutazione del rischio sul portale ClassyFarm.**

Fra le risposte conformi dovrà essere facoltativamente indicato il livello ottimale, quando presente. Il livello ottimale sarà esclusivamente utilizzato ai fini della categorizzazione del rischio nell'ambito del Sistema ClassyFarm del Ministero della Salute. Nel report della check list ufficiale comparirà solamente il giudizio CONFORME e NON CONFORME (A, B, C)², mentre l'esito della valutazione del rischio sarà disponibile in ClassyFarm.

La parte centrale della check list contiene tutte le categorie di non conformità stabilite dalla Decisione della Commissione del 14 novembre 2006², relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali (personale, ispezione e controllo degli animali, tenuta dei registri, libertà di movimento, edifici e locali di stabulazione, illuminazione minima, attrezzatura automatica e meccanica, alimentazione abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze, mutilazioni e procedure d'allevamento). Ciascuna di queste categorie è riconducibile da parte del sistema informativo di raccolta dei dati alle Aree di indagine del sistema ClassyFarm precedentemente descritte (Area A -

² In relazione alle categorie di non conformità, si è ritenuto opportuno mantenerne la suddivisione in A, B e C, nonostante l'abrogazione della Decisione n. 778 della Commissione del 14 novembre 2006 da parte del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (che prevede alcuni cambiamenti nelle modalità di rendicontazione in Commissione Europea delle non conformità), per non modificare il metodo di lavoro consolidato negli anni nel nostro Paese. Si precisa che le informazioni richieste dal Regolamento per la rendicontazione sono comunque assicurate.

management aziendale , Area B - strutture e attrezzature , Area - Grandi rischi e sistemi di allarme e Area C – ABMs), in modo che i dati raccolti nel corso dei controlli ufficiali possano confluire nel sistema generale di categorizzazione.

Per ciascuna di esse viene definito il requisito specifico (es. personale – numero di addetti che si occupano degli animali), il/i riferimento/i normativo/i espresso/i in maniera estesa e tra virgolette, la linea guida sintetica per le modalità con le quali eseguire la valutazione e, infine, la descrizione del livello di conformità, non conformità o requisito superiore al livello minimo.

A questa sezione, che rappresenta la sintesi di quanto verrà esposto in maniera dettagliata nel presente manuale, fa seguito, evidenziata in apposito box, la sezione contenente la domanda relativa al requisito specifico (es. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti), a cui corrispondono le diverse risposte che evidenziano conformità, non conformità o livello ottimale. **La sezione relativa alle evidenze deve essere compilata obbligatoriamente in caso di riscontro di non conformità, per finalità di trasparenza.** Tuttavia, dovrebbe essere comunque compilata per quanto possibile anche negli altri casi, per documentare le modalità del controllo.

Come noto, per la valutazione del rispetto delle condizioni di benessere negli allevamenti di galline ovaiole, è possibile fare riferimento ad una normativa generica ed orizzontale, rappresentata dalla Direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 e ad una normativa verticale rappresentata dalle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, relative alla protezione delle galline ovaiole e alla registrazione dei relativi stabilimenti, recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267.

In particolare, il D. Lgs. 146/2001, all'art. 4 cita: *“Le autorità sanitarie territorialmente competenti dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasioni di altri controlli; in tale attività la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato (vedi Allegato, punto 21) deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza e le conoscenze scientifiche”*; quindi, in ogni caso occorre sempre tenere presente il principio generale, sancito dal punto 21 dell'allegato del Decreto Legislativo 146/2001, secondo cui *“Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere”* e agire come previsto dall'art 4 *“...secondo l'esperienza e le conoscenze scientifiche”*.

A ciò, va aggiunto quanto previsto dalla normativa sul maltrattamento degli animali, che punisce chi li sottopone a *“sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le loro*

caratteristiche etologiche” (art. 544 ter c.p.), ovvero a chi li “detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze” (art. 727 c.p.).

In base a quanto sopra definito, benché la normativa verticale (D. Lgs. 267/2003) affronti estesamente i requisiti per la protezione delle galline ovaiole, è comunque necessario che il Veterinario Ispettore faccia ricorso ai numerosi pareri scientifici, raccomandazioni, pubblicazioni e altro materiale divulgativo, che costituiscono la base interpretativa ed applicativa per alcuni requisiti che la normativa, in alcuni casi, ha definito in maniera generica.

Proprio per agevolare l’attività del Veterinario Ispettore, nonché uniformare l’approccio tra operatori diversi, all’interno della check list per il controllo ufficiale e nel presente manuale, sulla base di quanto ritrovato in letteratura, sono stati definiti alcuni parametri specifici per le specie animali di cui si tratta (ovaiole), che non rappresentano un’indicazione normativa limitante in senso stretto, ma che possono essere di ausilio per il valutatore che, per esprimere il giudizio finale, dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento. Altresì, il giudizio non potrà prescindere dalla valutazione degli animali, attraverso le ABMs, per verificare se l’adattamento all’ambiente si sia completato o se siano presenti effetti negativi sulla salute o sul benessere. In tutti questi casi, quindi, il valutatore ritroverà sulla check list la frase ***“I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio”***.

Si chiarisce che il valutatore, in caso di scostamenti dai valori riportati nella check list, potrà esprimere un giudizio conforme anche se i parametri stabiliti (solo) da indicazioni e pareri scientifici non sono completamente rispettati, a condizione che la valutazione complessiva dell’allevamento e degli animali non faccia emergere condizioni di rischio. Analogamente, potrà esprimere un giudizio non conforme qualora i parametri chiaramente definiti da atti normativi siano rispettati, ma la valutazione dell’allevamento e degli animali mettano in chiara luce situazioni di mancato benessere o gravi sofferenze.

Attenzione: il presente manuale, raccogliendo (oltre alle indicazioni normative) le più importanti evidenze scientifiche sul benessere delle galline ovaiole, rappresenta una linea guida che - per sua natura - non ha caratteristiche cogenti, ma rappresenta un imprescindibile ausilio al Veterinario Ufficiale per applicare i limiti previsti dai Decreti Legislativi 146/2001 e 267/2003. Il fatto che determinati pareri o interpretazioni scientifiche sul benessere animale siano oggi disponibili, condivisi e riconosciuti dalla comunità scientifica, deve esortare il Veterinario Ufficiale alla loro conoscenza e al rispetto di quanto prevedono. L’utilizzo del manuale, in affiancamento alla check list, di cui è documento inscindibile, rappresenta una maggiore garanzia per verificare il rispetto del benessere animale, ma costituisce anche una forma di tutela del Veterinario stesso che, attraverso la

loro applicazione, potrà ragionevolmente sostenere di avere tenuto in considerazione, nel corso della sua attività ispettiva, le più importanti evidenze scientifiche attualmente disponibili, per la valutazione del rischio applicata al benessere animale in allevamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE ANIMAL-BASED MEASURES (ABMs)

Per quanto riguarda le ABMs, si tratta di valutazioni effettuate direttamente sugli animali (ABMs dirette) o dedotte da alcune registrazioni aziendali (ABMs indirette), allo scopo di verificare se elementi strutturali o gestionali dell'allevamento stiano producendo su di essi stati di sofferenza più o meno gravi e comunque per valutare il loro grado di adattamento all'ambiente in cui vivono. Il rilievo delle ABMs è in grado di identificare condizioni di malessere anche quando non si ravvisano condizioni ambientali negative. Ciò è possibile perché la condizione di scarso benessere può essere collegata all'incapacità dell'animale di adattarsi all'ambiente in cui vive, anche se risulta tutto idoneo dal punto di vista normativo. Questo concetto vale per tutti gli animali, comprese le galline ovaiole. In questa specie, però, viste le condizioni di allevamento (es. grandi capannoni, presenza di gabbie, voliere, ecc.), l'elevata numerosità dei gruppi (migliaia di animali), e la ridotta praticabilità/fattibilità sul campo delle ABMs dirette suggerite da Welfare Quality® (ad es. per necessità di manipolare le galline una ad una o, per certi indicatori, di osservare le carcasse post-mortem), hanno determinato la scelta – per le finalità di questa checklist – di prediligere un'unica ABM indiretta (mortalità) che funga da indicatore iceberg delle oggettive condizioni di vita degli animali. In presenza, infatti, di pericoli per la salute ed il benessere delle galline ovaiole, il parametro mortalità, di facile reperibilità ed esecuzione, è altamente in grado di mettere in luce condizioni non conformi, rappresentando l'ultimo evento avverso più nefasto. Il futuro, soprattutto alla luce della prossima normativa sul benessere animale in scrittura a Bruxelles, non esclude che altre ABMs entrino a far parte del controllo ufficiale. Ciononostante, se il Controllore dovesse ritenerlo opportuno, può raccogliere altre e più approfondite osservazioni sulle galline ovaiole (es. condizioni del piumaggio, presenza di lesioni, ecc.) da descrivere nel campo "Evidenze", che possano aiutarlo nell'assegnazione del giudizio di non conformità o meno.

Per i motivi descritti, **la valutazione della mortalità è parte integrante della check list, dovrà essere sempre compilata** per avere una adeguata categorizzazione del rischio e servirà come supporto per avvalorare una decisione relativa a conformità o non conformità.

La valutazione (insufficiente, adeguato e ottimale) non influenzerà in modo diretto l'esito complessivo del controllo al fine della condizionalità.

Come per le altre checklist già pubblicate, le attività di osservazione e rilevazione del veterinario ufficiale per i parametri basati sugli animali sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta:

- “inaccettabile” o “insufficiente”: ossia condizioni che potrebbero impedire a uno o più animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale ad una conferma o meno di una o più potenziali “non conformità legislative”, ove prevista nei parametri sanciti dalla norma, o nei casi in cui i parametri stabiliti (solo) da indicazioni e pareri scientifici siano palesemente disattesi.
- “adeguato” o “migliorabile”: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale ad un livello di potenziale conferma di “conformità legislativa”, ove prevista nei parametri sanciti dalla norma o da indicazioni e pareri scientifici.
- “ottimale” o “superiore ai requisiti previsti”: ossia la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di vivere in condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti dalla legge; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale al livello “superiore ai requisiti previsti”.
- “NA”: non applicabile.

ESITO DEL CONTROLLO UFFICIALE

La parte finale e conclusiva della check list contiene gli esiti del controllo ufficiale, i provvedimenti adottati, le eventuali prescrizioni con l'esito finale del controllo (il tutto comprensivo del diritto alla difesa del proprietario/detentore).

APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA

Questo protocollo di lavoro serve ai fini della valutazione delle conformità rispetto ai requisiti normativi in materia di benessere animale negli allevamenti di galline ovaiole. Inoltre, l'applicazione di questo sistema risulta necessaria per valutare il livello di rischio, relativamente agli aspetti manageriali e strutturali dell'allevamento, per quanto riguarda il benessere animale.

La possibilità di accedere al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista per i veterinari ufficiali ed è disponibile sulla sezione cruscotti di ClassyFarm accessibile dal portale Vetinfo. Tale elaborazione sarà disponibile dal giorno successivo a quello di invio dei dati da parte del sistema informativo veterinario nazionale presente in “controlli”.

I PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali”. (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 1					
NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI					
<i>(Categoria di non conformità: Personale) 146/2001 All. Personale Punto 1.</i>					
<i>"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti".</i>					
Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti – n. animali.					
Vista la variabilità dei sistemi di allevamento e del livello di automazione degli impianti (gabbie modificate, sistemi alternativi in voliera o a terra), la valutazione dovrà essere fatta considerando i singoli casi.					
I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore, che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Numero non sufficiente di addetti: SIST. ALTERNATIVI: indicativamente un operatore per più di 35.000 animali GABBIE MODIFICATE: indicativamente un operatore per più di 50.000 animali					no; NO
Numero sufficiente di addetti: SIST. ALTERNATIVI: indicativamente un operatore per 15.000 - 35.000 animali GABBIE MODIFICATE: indicativamente un operatore per 30.000 - 50.000 animali					SI
Numero ottimale di addetti: SIST. ALTERNATIVI: indicativamente un operatore per meno di 15.000 animali GABBIE MODIFICATE: indicativamente un operatore per meno di 30.000 animali					Ottimale
1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare il numero degli addetti					

Gli addetti sono coloro che lavorano in allevamento a tempo pieno o parziale per svolgere le operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti. Un numero adeguato di addetti consente ad essi di individuare più rapidamente e tempestivamente eventuali segnali di scarso benessere degli animali. Data la variabilità dei sistemi di allevamento e il livello di automazione degli impianti, non è sempre possibile definire un numero preciso di addetti, quindi ogni valutazione dovrà essere effettuata prendendo in considerazione il singolo caso. Si considera

sufficiente un addetto ogni 15.000-30.000 animali se si tratta di sistemi alternativi (più complessi da gestire e da ispezionare) o un addetto ogni 30.000-50.000 animali in caso di sistemi in gabbia. La situazione ottimale prevede un addetto per meno di 15.000 animali (sistemi alternativi) o 30.000 animali (sistemi in gabbia).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

2. Formazione degli addetti

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 2					
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI					
(Categoria di non conformità: Personale) 146/2001 All. Personale Punto 1.					
"Gli addetti devono avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".					
Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio). Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori), il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale. Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni). Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto). I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale					no; NO
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale (o combinazione opposta)					SI
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni					Ottimale
2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.					

Poiché il benessere animale è un argomento relativamente recente, necessita tuttora di essere divulgato adeguatamente tra gli operatori del settore zootecnico. In particolare, il concetto di benessere animale e la capacità degli animali di provare sensazioni non devono essere confusi con le tecniche e l'ambiente di allevamento in senso lato, anche se spesso il miglioramento delle condizioni

di vita del pollaio comporta un aumento delle performance produttive e del livello di benessere generale. Per questo il personale deve essere competente e ben motivato ed è fondamentale che sia informato e formato relativamente ai bisogni degli animali in modo da poter prevenire e gestire i problemi.

Il rapporto con l'uomo è infatti fondamentale per il benessere animale, atteggiamenti di tipo negativo causati da comportamenti bruschi, aggressivi o violenti, determinano uno stato di paura e di stress nelle galline ovaiole. È stato dimostrato (Mench and Rodenburg, 2018) che una manipolazione appropriata degli animali non solo riduce lo stress e la probabilità di ferirsi delle galline ma può migliorarne la qualità e ridurre i costi di produzione, caratteristiche importanti per le filiere italiane.

È importante che il personale, nei momenti di contatto, non così rari con questi animali (es. durante le ispezioni giornaliere e le operazioni di scarico e carico, movimentazione, rimescolamento, esecuzione di trattamenti sanitari ecc.), mantenga una routine di lavoro costante, trattando gli animali con calma e tranquillità.

Per rispondere a questo quesito, è necessario valutare attentamente le competenze, le capacità e le conoscenze complessive del personale addetto agli animali [proprietario o detentore ovvero custode, cioè la persona che, anche temporaneamente, ne è responsabile e se ne occupa - D. Lgs. 146/2001, art.1, par. 2, lett. b)], considerando che esse possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio).

Per questo, si considera accettabile la presenza di una lunga esperienza pratica nel settore (es. almeno 10 anni) oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori) il conseguimento di titolo di studio inerente o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale.

I titoli di studio inerenti ritenuti idonei sono: diploma o laurea in agraria, medicina veterinaria e lauree brevi o magistrali in produzioni animali o aree tematiche inerenti.

I corsi di formazione per proprietari, custodi o detentori dovrebbero essere strutturati prevedendo, ad esempio, una durata di almeno 8 ore (2 mezze giornate o 2 incontri serali) con argomenti riguardanti il benessere animale e i principali fattori di rischio, identificando chiaramente le principali esigenze della gallina ovaiole e illustrando i principi elementari del loro comportamento. Inoltre, il programma dovrebbe prevedere una formazione specifica e adeguata in tema di norme minime di protezione degli animali in allevamento in relazione all'abbattimento degli animali.

I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Per assegnare un giudizio ottimale, invece, è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica.

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di

formazione anche di un solo addetto (sia esso il proprietario/detentore o il custode degli animali)

Una condizione ottimale è rappresentata anche dalla presenza di istruzioni pratiche impartite a tutti gli addetti sulla gestione e sul benessere degli animali, evidenziata da documenti raccolti (ad es. in un manuale di buone prassi) che ne dimostrano il contenuto, a condizione che le procedure di formazione e/o le istruzioni operative rivolte al personale presente in allevamento siano state diffuse.

Si ricorda che per quanto riguarda gli addetti al carico, qualora questi facciano parte di una cooperativa, il responsabile della loro formazione è la cooperativa stessa, il detentore deve comunque assicurarsi che essi siano stati adeguatamente formati, ad esempio sulle corrette modalità di gestione/manipolazione degli animali.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CROMBA

II ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.” (D. Lgs 146/2001, allegato, punto 2).

“Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o detentore almeno una volta al giorno.” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 1).

Elemento di verifica 3	
NUMERO DI ISPEZIONI	
(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) D. Lgs. 146/2001 All. Controllo Punto 2 – D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 1	
<i>“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.”</i> <i>“Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o detentore almeno una volta al giorno”</i> Il numero di ispezioni che gli addetti compiono giornalmente è importante da valutare in quanto indicativo dell’attenzione che essi prestano al gruppo di animali e quindi della tempestività con cui eventuali problemi (anche di benessere) possono essere individuati. Il detentore o gli addetti dovrebbero effettuare un’attenta osservazione di tutti gli animali almeno una volta al giorno. L’operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell’individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo. La situazione ottimale si ha quando, oltre ad osservare, il proprietario o detentore scrive e registra i segni clinici o le lesioni riscontrate, oppure verifica sistematicamente i dati forniti dai sistemi automatici di misurazione delle attività dell’animale registrati su supporto informatico. Per assegnare il giudizio conforme, il veterinario ufficiale potrà avvalersi di quanto riportato dalle Procedure Operative Standard aziendali o di quanto riferito dall’allevatore. Il giudizio ottimale verrà invece assegnato in presenza di registrazioni scritte/computerizzate delle problematiche eventualmente riscontrate durante le ispezioni.	
Meno di 1 ispezione/giorno	no; NO
1 o più ispezioni/giorno	SI
2 o più ispezioni/giorno e registrazione scritta o computerizzata delle eventuali problematiche riscontrate	Ottimale

3) Gli animali presenti nello stabilimento sono ispezionati almeno una volta al giorno					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto					

Tutte le galline ovaiole presenti nello stabilimento devono essere ispezionate, prestando particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali. Il proprietario, il detentore o gli addetti dovrebbero effettuare un'attenta osservazione di tutti gli animali almeno una volta al giorno, concentrandosi in particolare su situazioni critiche riferibili a salute e benessere degli animali, e dedicando altre ispezioni al controllo degli aspetti meramente gestionali. La situazione ottimale si ha con un'ispezione attenta degli animali almeno due volte al giorno, ma è preferibile un'ispezione più frequente, soprattutto per i soggetti che si trovano in infermeria. La valutazione di tale attività diventa particolarmente positiva quando, oltre ad osservare, il proprietario o detentore scrive e registra i segni clinici o le lesioni riscontrate, oppure verifica sistematicamente i dati forniti dai sistemi automatici di misurazione delle attività dell'animale registrati su supporto informatico.

Per assegnare il giudizio accettabile, il veterinario ufficiale potrà avvalersi di quanto riportato dalle Procedure Operative Standard aziendali o di quanto riferito dall'allevatore. Il giudizio ottimale verrà invece assegnato in presenza di registrazioni scritte/computerizzate delle problematiche eventualmente riscontrate durante le ispezioni.

4. Illuminazione per l'ispezione

“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile”. (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 3).

Elemento di verifica 4					
ILLUMINAZIONE PER L'ISPEZIONE					
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2001 All. Controllo Punto 3.</i>					
<i>"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile".</i>					
L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.					
Illuminazione per l'ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione					no; NO
Illuminazione per l'ispezione sufficiente: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante					SI
4) E' disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne					

L'ispezione quotidiana degli animali da parte dell'allevatore andrebbe condotta impostando un'intensità luminosa leggermente superiore a quella di una normale situazione di allevamento, per consentirgli di riconoscere facilmente animali o attrezzature che presentino problematiche da risolvere immediatamente. Altrettanto, le ispezioni condotte da Veterinari Pubblici o da enti privati di certificazione devono poter disporre di un'illuminazione adeguata ai propri scopi. Il giudizio accettabile viene assegnato qualora l'impianto di illuminazione sia tale (per intensità luminosa e caratteristiche) da consentire agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata ed eventualmente durante la notte. Consigliabile è la presenza di dispositivi di illuminazione mobile che consentano una pronta e puntuale ispezione degli animali in caso di necessità, in qualunque momento.

5. Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4).

“La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale” (Reg. CE 1099/2009, considerando 12).

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile. (Reg. CE 1099/2009, Capo IV Articolo 19).

Elemento di verifica 5					
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI MALATI O FERITI E ABBATTIMENTO					
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2001 All. Controllo Punto 4</i>					
<i>“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.”</i>					
<i>“La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale”.</i>					
Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato, il veterinario ufficiale deve verificare, tramite intervista, che gli addetti siano stati adeguatamente istruiti su come gestire i casi di malattia e la presenza di ferite.					
La verifica dell'immediato trattamento si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale malato o ferito sia spostato nel reparto infermeria (eventualmente isolato), la seconda è che l'animale malato rimasto all'interno del gruppo (perché non necessita di infermeria) abbia ricevuto un trattamento appropriato (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza).					
Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera non adeguata					no; NO
Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera adeguata					SI
5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato, anche in caso sia necessario ricorrere all'abbattimento					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)
(*) Indicare se sono presenti animali mal gestiti, ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati o feriti.

Unitamente all'ispezione giornaliera degli animali, è di fondamentale importanza che il detentore e gli addetti si accorgano precocemente della presenza di eventuali segni di malattia o di malessere in uno o più soggetti e che si adoperino prontamente per porvi rimedio. Le azioni correttive poste in essere dal detentore o dagli addetti possono contemplare: la consultazione del veterinario aziendale, l'isolamento dell'animale malato/ferito in un zona infermeria (soluzione applicabile ad esempio a soggetti deboli che subiscono *feather-pecking* da parte di individui dominanti), oppure, qualora non esista alcuna altra soluzione economicamente valida e praticabile, l'abbattimento con metodi consentiti dal Reg. CE 1099/2009 (generalmente dislocazione cervicale) del soggetto in questione.

6. Consultazione del Medico Veterinario

"[...]qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario". (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4).

Elemento di verifica 6					
CONSULTAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO					
(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2001 All. Controllo Punto 4					
"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli."					
Nello specifico dell'allevamento avicolo, tale riferimento legislativo dev'essere inteso come problematica sanitaria di gruppo e non del singolo animale					
Il veterinario ufficiale potrà verificare la rispondenza al requisito attraverso l'ispezione documentale di: - registro delle presenze - ricette veterinarie e registro dei trattamenti o registrazioni in Vetinfo - eventuali verbali di intervento rilasciati dal veterinario.					
Non viene consultato un medico veterinario in caso di necessità					no; NO
Viene consultato un medico veterinario in caso di necessità					SI
6) Un medico veterinario viene consultato in caso di necessità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Annotare l'eventuale documentazione visionata, in grado o meno di confermare la conformità al requisito (registro presenze, verbali di intervento ecc.).					

Se un animale presenta segni di malattia o malessere (individuati durante le ispezioni quotidiane), e gli interventi o trattamenti messi in atto dall'allevatore non sortiscono l'effetto desiderato, è assolutamente necessario consultare un medico veterinario, che darà le opportune disposizioni.

Per avere evidenza che gli animali malati o feriti che non reagiscono alle cure impartite dagli addetti ricevano un trattamento adeguato, è possibile verificare tramite intervista se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda, nonché visionare eventuali ricette, registrazioni dei trattamenti o verbali di intervento rilasciati a seguito della visita.

7. Dispositivi di ispezione

“Gli impianti che comportano più piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline.” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 6).

Elemento di verifica 7					
DISPOSITIVI DI ISPEZIONE					
(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 267/2003 All. A Punto 6					
“Gli impianti che comportano più piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline.” In caso di locali di allevamento che ospitano più piani di gabbie, il veterinario ufficiale deve verificare che siano presenti dei dispositivi adeguati per permettere l'ispezione di ogni parte dell'allevamento, incluse le gabbie collocate sui piani più alti.					
Non sono presenti dispositivi o misure adeguate per ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitino il ritiro delle galline					no; NO
Sono presenti dispositivi o misure adeguate per ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitino il ritiro delle galline					SI
7) Sono presenti adeguati dispositivi che consentono di ispezionare tutti i piani					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Annotare le caratteristiche degli eventuali dispositivi utilizzati					

L'ispezione degli animali collocati nei piani di gabbie più alti (e delle strutture stesse) può risultare difficoltosa sia per l'allevatore che per il veterinario ufficiale incaricato di verificare la conformità ai requisiti legislativi anche nelle gabbie poste a quel livello.

Esistono in commercio carrelli o scalette su ruote che scorrono all'interno di guide. In questo modo, sarà possibile ispezionare tutti i piani di gabbie, lungo tutta la lunghezza del capannone. La movimentazione di queste strutture può essere elettrica o manuale. Nel caso di impianti disposti su due livelli separati da una pavimentazione grigliata, ciascuno dei livelli deve essere dotato di tali dispositivi. Se i dispositivi non possono essere spostati da un corridoio tra gabbie e l'altro, ogni corridoio deve esserne provvisto.



MINISTERO DELLA SALUTE - IZSL

III TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)

8. Tenuta delle registrazioni dei dati

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta." (D. Lgs. 146/2001, allegato, punti 5-6).

NB: I riferimenti al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, attualmente abrogato, si intendono fatti ai corrispondenti articoli dei decreti legislativi 5 agosto 2022, n.134 e n.136.

"L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali." (D. lgs 134/2022 art. 9 comma 10).

Per quanto riguarda il D. Lgs. 136/2022 si vedano:

- articolo 6: *"Notifica e comunicazione delle malattie all'Autorità competente";*
- articolo 11 comma 4 *"gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto";*
- Allegato 3 *"Individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalità anomale".*

Elemento di verifica 8

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI DEI DATI

(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri)

146/2001, punti 5-6; 134/2022, art. 9, comma 10; 136/2022, art. 6, art. 11, comma 4, e Allegato 3

D. Lgs. 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

(i riferimenti al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, attualmente abrogato, si intendono fatti ai corrispondenti articoli dei decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134 e n. 136)

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta."

D. Lgs. 134/2022 art.9, comma 10

"L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali."

D. Lgs. 136/2022

Art. 6 "Notifica e comunicazione delle malattie all'Autorità competente"; **art. 11 comma 4** "gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto"; **Allegato 3** "Individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalità anomale."

Verificare in BDN la presenza del registro di carico e scarico e la corretta registrazione delle informazioni, al fine di valutare se si siano verificate eventuali mortalità anomale.

Nel caso si siano verificate mortalità anomale, verificare che siano state correttamente individuate, registrate e segnalate.

Si considera non conforme: assenza in BDN del registro di carico e scarico o mancata o non corretta registrazione delle informazioni e/ o evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136

NO

Si considera conforme: presenza in BDN del registro di carico e scarico e corretta registrazione delle informazioni e mancata evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136

SI

8) In BDN è presente il registro di carico e scarico, le informazioni vengono correttamente registrate e non sono presenti episodi di mortalità anomale non registrate

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
	-----	-----			

EVIDENZE (*)

(*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non registrate o di mancanza delle registrazioni delle informazioni in BDN

9. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punti 5-6).

Elemento di verifica 9					
TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI					
<i>(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri) 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.</i>					
“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.” Sono presenti le registrazioni informatizzate dei trattamenti su Vetinfo Farmacosorveglianza, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.					
Si considera non conforme: assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o non corretta registrazione dei trattamenti					NO
Si considera conforme: corretta registrazione dei trattamenti in Vetinfo farmacosorveglianza					SI
9) Le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza vengono effettuate nei tempi stabiliti e i trattamenti sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione					

Le registrazioni devono essere effettuate sul sistema informativo Vetinfo dalle figure munite delle relative autorizzazioni, secondo quanto già descritto nel Manuale Operativo della Ricetta Veterinaria Elettronica. Dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei trattamenti in formato esclusivamente elettronico sono obbligatorie. Pertanto, vengono meno gli obblighi di presenza cartacea del registro e di conseguenza le verifiche dovranno riguardare esclusivamente le registrazioni in Vetinfo dei trattamenti farmacologici. Il valutatore verifica la presenza e la corretta compilazione del registro

informatizzato, effettuando un controllo a campione su almeno due trattamenti, dei quali annota gli estremi nel campo “evidenze”. La presenza dei trattamenti eseguiti su Vetinfo è necessaria anche per garantire la verifica relativa al corretto e tempestivo trattamento degli animali malati o feriti.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

IV LIBERTA' DI MOVIMENTO

10. Spazio disponibile

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 7).

“Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi.

[...] c) avere un coefficiente di densità non superiore a 9 galline ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile.” (D.M. 20.04.2006, allegato I, punto 1.c).

“Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:

a) consentire alle galline ovaiole di disporre:

1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia, diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 centimetri quadrati;” (D.M. 20.04.2006, allegato III, punto 1.a.1).

“Qualsiasi definizione di spazio minimo deve includere sia la superficie orizzontale che l'altezza, che influiscono entrambe sul comportamento degli uccelli. Quando possibile, dovrebbero avere uno spazio sufficiente per consentire loro di camminare da una risorsa all'altra, indagare su ciò che li circonda, sbattere le ali e avere accesso sicuro ai posatoi.” (FAWC, 1997).

Elemento di verifica 10**SPAZIO DISPONIBILE***(Categoria di non conformità: Libertà di movimento) 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7.*

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.”

“Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi.

[...]

c) avere un coefficiente di densità non superiore a 9 galline ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile.”

“Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:

a) consentire alle galline ovaiole di disporre:

1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia per ogni gallina ovaiole, di cui 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia, diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 centimetri quadrati;”

Lo spazio a disposizione di ogni gallina deve essere sufficiente per consentirle un'adeguata libertà di movimento e deve essere tale da non causarle inutili sofferenze o lesioni, in tutte le tipologie di allevamento, ovvero:

GABBIE MODIFICATE - ogni gallina ovaiole dispone di almeno 750 cm² di superficie della gabbia, di cui 600 cm² di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm².

SISTEMI ALTERNATIVI - il coefficiente di densità non è superiore a 9 galline ovaiole per m² di zona utilizzabile.

Superficie disponibile per ogni gallina inadeguata / Densità superiore ai limiti previsti

no; NO

Superficie disponibile per ogni gallina adeguata / Densità pari o inferiore ai limiti previsti

SI

10) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni

SI

no cat. A

no cat. B

NO cat. C

N.A.

XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. densità non conforme ai limiti previsti; animali senza adeguato spazio). Riportare la metratura del capannone rispetto al numero di animali presenti.

Per “zona utilizzabile” si intende, come descritto nel D. Lgs. 267/2003, una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14%, sovrastata da uno spazio libero avente un’altezza minima di 45 cm, che non comprende gli spazi destinati a nido. Non sono da considerarsi “zona utilizzabile” le superfici esterne non coperte (per le quali è prescritta una diversa densità di animali nell’item specifico).

Lo spazio disponibile necessario per ciascun animale è strettamente connesso ad altri fattori, come la ventilazione, la temperatura ambientale e la qualità della lettiera e, se questi fattori non sono modificati in funzione dell’aumento di densità, il benessere animale può venir seriamente compromesso.

Se l’animale non ha un sufficiente spazio a disposizione si muoverà con maggiore difficoltà, non riuscirà ad evitare fenomeni aggressivi da altri conspecifici e non riuscirà a riposare tranquillamente. Le densità elevate hanno anche un impatto avverso sulla salute degli animali: sono state correlate infatti allo sviluppo di patologie delle zampe e degli arti, allo sviluppo di vesciche sternali e patologie respiratorie (Mench, 2018).

A questo proposito, la normativa sul benessere delle galline ovaiole in allevamento risulta essere molto specifica, in quanto fornisce la densità necessaria, indicando anche la tipologia di allevamento (vedi tabella).

	TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ
Sistemi alternativi	Superficie utilizzabile	9 galline / 10000 cm ²
Gabbie modificate*	Superficie gabbia	1 gallina / 750 cm ²
	Superficie utilizzabile	1 gallina / 600 cm ²

* I valori indicati presuppongono che sia garantito comunque che l’altezza della gabbia delle zone diverse dalla superficie utilizzabile sia superiore ai 20 cm in ogni punto e che la superficie totale della gabbia sia superiore a 2000 cm².

V EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

11. Rimozione degli animali morti

“Occorre eliminare quotidianamente le galline morte” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 4).

Elemento di verifica 11					
RIMOZIONE DEGLI ANIMALI MORTI					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 267/2003 All. A Punto 4.					
“Occorre eliminare quotidianamente le galline morte.”					
La rispondenza al requisito può essere verificata dal veterinario ufficiale attraverso l’osservazione di animali morti da tempo (più di un giorno) all’interno dell’allevamento.					
Le galline morte non sono rimosse quotidianamente					no; NO
Le galline morte sono rimosse quotidianamente					SI
11) Le galline morte sono rimosse quotidianamente.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. numero e stato di decomposizione di animali morti da tempo all’interno del capannone)					



Esempio di animale morto da diversi giorni, che rappresenta una non conformità

12. Rimozione delle deiezioni

“Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni” (D. Lgs. 267/2003, all. A, punto 4).

Elemento di verifica 12					
RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 267/2003 All. A Punto 4.					
“Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni.”					
La rimozione non regolare delle deiezioni può essere un pericolo per il benessere dell'animale, in grado di peggiorare la qualità dell'aria e favorire la diffusione di patologie. La normativa definisce in modo generale la necessità di eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni: tale prescrizione deve essere interpretata sulla base della tecnologia di allevamento presente. È necessario chiedere all'allevatore quante volte effettui la rimozione delle feci mediante l'utilizzo del nastro o del raschiatore e confrontarlo con la quantità di feci effettivamente presenti e soprattutto con la qualità dell'aria. In caso di allevamenti su lettiera permanente, essendo normalmente rimossa a fine ciclo, è necessario valutare le condizioni ambientali (qualità dell'aria) e la gestione della stessa (es. lettiera eccessivamente umida) al momento della valutazione. Prima di assegnare il giudizio, il valutatore dovrà considerare la tecnologia di allevamento (lettiera, nastri, raschiatori...) in uso nel capannone e le condizioni ambientali al momento della valutazione (es. odore di ammoniaca, lettiera eccessivamente bagnata...)					
Le deiezioni non sono rimosse/gestite con la frequenza necessaria					no; NO
Le deiezioni sono rimosse con la frequenza necessaria / Lettiera permanente					SI
12) Le deiezioni sono rimosse/gestite con regolarità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere la tecnologia presente in allevamento. In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. frequenza di rimozione della lettiera, condizioni igieniche degli animali, qualità dell'aria, condizioni della lettiera)					

Le deiezioni possono essere diversamente gestite in base alla tipologia di allevamento di galline ovaiole. Comunemente, i sistemi che si sviluppano su più piani, prevedono, tra un piano e l'altro, nastri trasportatori che allontanano con frequenza prestabilita le deiezioni degli animali. In queste situazioni, per verificare la conformità al requisito è necessario verificare che la frequenza con cui i nastri vengono fatti scorrere sia coerente con il numero di animali accasati e che gli animali, al momento dell'ispezione, non risultino eccessivamente sporchi o imbrattati. Laddove sia presente la lettiera permanente (voliera e sistemi a terra), il veterinario ufficiale dovrà verificare la sua corretta

gestione. Per garantire il benessere e la salute degli animali infatti, la lettiera non deve essere eccessivamente umida. Laddove la ventilazione, da sola, non risultasse sufficiente a garantire una buona asciugatura della lettiera, l'allevatore dovrà mettere in pratica altri accorgimenti per la sua corretta gestione, quali l'aggiunta di nuovo materiale asciutto o il rimescolamento del materiale presente ("fresatura") al fine di facilitarne l'asciugatura.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

13. Condizioni generali di pulizia

“[...] Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti.” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 4)

Elemento di verifica 13					
CONDIZIONI GENERALI DI PULIZIA					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 267/2003 All. A Punto 4					
“[...] Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti.”					
Il veterinario ufficiale dovrà osservare le condizioni di pulizia generali del capannone e delle strutture e attrezzature eventualmente presenti (mangiatoie, abbeveratoi, posatoi, nidi...).					
Le superfici e le attrezzature non presentano uno stato di pulizia soddisfacente					no; NO
Le superfici e le attrezzature presentano uno stato di pulizia soddisfacente					SI
13) Le superfici e le attrezzature sono mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	NA	XXXXXXXXXX
EVIDENZE					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione). Le valutazioni ABM (pulizia animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

I capannoni devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e pulizia al termine di ogni ciclo d'allevamento. Considerando i sistemi di allevamento della gallina ovaioia, è impossibile impedire durante il ciclo l'accumularsi di un certo grado di polvere e residui organici (es. penne, ragnatele...); tuttavia le superfici ed i locali di stabulazione devono essere mantenuti in condizioni tali da non rappresentare un rischio per la salute o il benessere dell'animale.

Il veterinario ufficiale, prima di esprimere il giudizio, dovrà considerare il complessivo stato di pulizia delle strutture, la presenza di ragnatele evidentemente datate sui soffitti e sulle pareti, l'accumulo di un'eccessiva quantità di polvere e di residui organici sulle superfici. Anche l'osservazione dello stato di pulizia degli animali può riflettere la condizione igienica generale dell'allevamento.

14. Fabbricati e locali di stabulazione

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 8)

“I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali” (D. Lgs. 146/2001 allegato, punto 9).

Elemento di verifica 14					
FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione					
Punti 8 e 9					
<i>“8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.</i> <i>9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.”</i> Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare traumi o lesioni. Per verificare ciò, il veterinario ufficiale dovrà osservare e verificare l'eventuale presenza di superfici o attrezzature taglienti o possibilmente nocive, oltre che di animali con lesioni compatibili con superfici taglienti o sporgenti. Contemporaneamente tutte queste attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate.					
Presenza di un solo requisito non sufficiente					no; NO
Tutti i requisiti sono sufficienti					SI
14) Le superfici e le attrezzature con cui gli animali possono entrare in contatto non devono determinare traumi o lesioni e possono essere pulite e disinfettate					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	NA	XXXXXXXXXX
EVIDENZE					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. spigoli taglienti o sporgenze potenzialmente lesivi per gli animali). Le valutazioni ABM (lesioni, ferite compatibili con le					

caratteristiche nocive delle strutture/attrezzature) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità

Il veterinario ufficiale verifica che le strutture siano integre e che non possano recare danno agli animali. La presenza di lesioni cutanee riconducibili a strutture nocive (graffi, soluzioni di continuità, simili lesioni traumatiche riscontrate su più soggetti ecc.), possono supportare eventuali non conformità, tuttavia è necessario valutare approfonditamente i tipi di lesione e le cause ipotizzate. Nel caso di un numero elevato di lesioni cutanee è necessario approfondire la possibile eziologia al fine di relazionare correttamente le cause.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CREMBA

15. Sistemi di allevamento

“I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare.” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 5).

Elemento di verifica 15					
SISTEMI DI ALLEVAMENTO					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 267/2003 All. A Punto 5.					
“I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare.”					
A seconda della tipologia di allevamento, devono essere prese misure efficaci per evitare che gli animali scappino. A tal proposito, il valutatore dovrà assicurarsi che non vi siano gabbie con parti rotte o porte aperte e che le recinzioni siano integre.					
I sistemi di allevamento consentono alle galline di scappare					no; NO
I sistemi di allevamento non consentono alle galline di scappare					SI
15) I sistemi di allevamento sono concepiti in modo tale che le galline non possano scappare					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es.gabbie con parti rotte o danneggiate, recinzioni non integre...)					

La fuga degli animali dalle gabbie verso le diverse parti del locale di stabulazione o dal capannone verso l'esterno va prevenuta per evitare che gli animali possano ferirsi o subire lesioni. Il veterinario può ispezionare a campione una serie di gabbie per verificare che non vi siano parti danneggiate o aperture che consentano alle galline di uscire, oppure ispezionare il perimetro interno del capannone per evidenziare eventuali vie di fuga. La presenza di diversi animali al di fuori dei locali di stabulazione può essere segno di mancata conformità.



16. Dimensioni delle gabbie e loro aperture

“La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita.” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 7).

Elemento di verifica 16					
DIMENSIONI DELLE GABBIE E LORO APERTURE					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 267/2003 All. A Punto 7.					
“La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita.” Per verificare la rispondenza al requisito è necessario, in caso di dubbio, provare far estrarre qualche animale dalla gabbia, controllando inoltre che le aperture non presentino superfici taglienti o sporgenti in grado di ferire gli animali. Come ausilio si possono osservare le galline all'interno delle gabbie, verificando che non presentino segni o lesioni compatibili con una difficile estrazione dalla gabbia stessa.					
La gabbia e la relativa apertura non consentono di ritirare facilmente una gallina senza ferirla e/o causarle sofferenza					no; NO
La gabbia e la relativa apertura consentono di ritirare facilmente una gallina senza ferirla e/o causarle sofferenza					SI
16) L'apertura delle gabbie è concepita in modo tale che una gallina possa essere ritirata senza essere ferita e senza sofferenze					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*)In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. aperture delle gabbie inadeguate per dimensioni o per presenza di parti che possano ferire gli animali). Le valutazioni ABM (lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità					

La normativa non prescrive una dimensione minima per quanto riguarda l'apertura delle gabbie. Tuttavia essa deve essere di dimensione sufficiente per garantire all'operatore di ritirare un animale agevolmente e senza generargli dolore o lesioni conseguentemente allo sfregamento contro le strutture. Se le aperture risultano evidentemente più ampie rispetto alla dimensione media degli animali accasati, la conformità può essere assegnata senza ricorrere ad ulteriori indagini. Tuttavia, in caso di dubbio, si consiglia al valutatore di verificare l'effettiva adeguatezza delle aperture provando a far estrarre alcuni animali a campione. Eventuali lesioni degli animali riconducibili a manipolazione attraverso aperture troppo piccole (es. sulla superficie esterna delle ali), possono essere di ausilio nell'espressione del giudizio.

17. Infermeria

“[...] Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4, comma 2).

Elemento di verifica 17					
INFERMERIA					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Controllo Punto 4.					
“Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.” Devono essere presenti settori dedicati agli animali malati o feriti, facilmente raggiungibili o allestibili nell'immediato in caso di necessità; essi devono essere chiaramente identificati, con presenza se del caso di lettiera asciutta e acqua e alimento in quantità sufficiente (possibilmente ad libitum). Per garantire un adeguato comfort agli animali, all'interno di questi spazi la densità dev'essere ridotta.					
Nessuno spazio facilmente allestibile e identificabile					no; NO
Spazio facilmente allestibile e identificabile					SI
17) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE					
(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche dello spazio di isolamento-infermeria					

Gli animali malati, feriti o in condizioni di sofferenza devono tempestivamente essere identificati ed assistiti e, se necessario, separati dal resto del gruppo. Per questo motivo, devono essere presenti dei settori separati, facilmente raggiungibili o allestibili nell'immediato in caso di bisogno. Nel caso di allevamento a terra o in voliera, il reparto infermeria può essere ricavato separando con una rete o altro materiale idoneo una porzione del capannone da adibire a tale scopo (permanentemente o al bisogno). In allevamenti in gabbia, possono essere presenti una o più gabbie in cui isolare gli animali che necessitino di tale trattamento.

La separazione fra i settori deve essere chiara e, se necessario, la sua superficie deve poter essere ampliata. Per garantire adeguato comfort e assistenza agli animali, la densità all'interno di questo locale, deve essere bassa.

Il valutatore deve osservare direttamente lo spazio infermeria qualora presente o verificare l'area predisposta all'allestimento.

18. Temperatura e umidità relativa

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 18					
TEMPERATURA E UMIDITÀ RELATIVA					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione					
Punto 10.					
“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” Temperatura e umidità relativa sono parametri strettamente correlati al sistema di ventilazione, pertanto il veterinario ufficiale dovrà considerare la presenza e l’adeguatezza di quest’ultimo nell’esprimere il giudizio. La ventilazione di un ricovero può essere naturale o forzata; nel primo caso la circolazione dell’aria all’interno della struttura è assicurata dai movimenti convettivi di aria calda. Le aperture possono essere collocate sul tetto (cupolini, camini) o direttamente nelle pareti. Detto sistema di ventilazione può essere utilizzato convenientemente solo nei climi temperati e in presenza di basse densità di animali. Con la ventilazione forzata e il condizionamento ambientale è possibile controllare in modo più efficace le condizioni microclimatiche, anche in presenza di elevate densità e di temperature esterne non perfettamente conformi alle necessità degli animali. Il giudizio sarà insufficiente in caso di mancanza di un sistema di ventilazione adeguato di qualsiasi tipo; si ritiene invece accettabile la presenza di sistemi di ventilazione naturale che si avvalgono eventualmente di agitatori, o ventole, oppure sistemi di ventilazione forzata con estrattori longitudinali: sistemi a tunnel, giudicata ottimale se coadiuvata da specifici sistemi di raffrescamento (ad esempio il cooling) e di riscaldamento (ad esempio i bruciatori a gas).					
Assenza di ventilazione adeguata					no; NO
Ventilazione adeguata, naturale o forzata					SI
Ventilazione meccanica (tunnel) e presenza di sistemi di raffrescamento e riscaldamento					Ottimale
18) Il sistema di ventilazione è adeguato a mantenere idonee condizioni microclimatiche					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*)Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche					

Il controllo di parametri ambientali è di fondamentale importanza nell’allevamento di galline ovaiole per prevenire lo stress da calore, la cui conseguenza è dannosa per lo stato di salute e benessere degli

animali; si possono verificare calo di peso e di riserve di calcio, diminuzione notevole del numero e della taglia delle uova, scarsa qualità del guscio (poiché calano l'assunzione e l'assorbimento di calcio) e aumento del numero di uova rotte, rallentamento del transito intestinale con alterato assorbimento dei nutrienti e scarsa conversione dell'alimento. Oltre a questo, anche le feci risultano più bagnate e sporcano maggiormente le uova e la lettiera nei sistemi alternativi; infine si può verificare un aumento della mortalità, accompagnato da atteggiamenti di beccaggio e cannibalismo. Lo stress da calore può anche causare un aumento dei livelli di corticosterone plasmatico e alterare il sistema immunitario.

Le galline ovaiole possono compensare l'aumento di temperatura fino a 28°C- 32°C, al di sopra dei quali l'effetto dello stress da calore aumenta esponenzialmente; l'azione di altri fattori ambientali, quali polvere, ammoniaca, rumore e lettiera bagnata può aggravare il danno provocato dalle alte temperature. Per quanto riguarda i sistemi di allevamento in gabbia, è risaputo che gli animali presenti nelle file di gabbie più alte soffrono maggiormente lo stress da calore, rispetto al resto del capannone, mentre nei sistemi alternativi l'effetto dipende soprattutto dalla densità.

Lo stress da freddo è un problema decisamente meno importante, in quanto le galline sopportano più facilmente le basse temperature.

Per quanto riguarda l'umidità relativa, un tasso troppo elevato (superiore al 70%) potrebbe determinare problemi di lettiera bagnata.

Per verificare che gli animali siano in condizioni di comfort termico, una volta misurate temperatura ed umidità relativa con uno strumento specifico ad altezza animale (o, in mancanza dello strumento, osservati questi parametri nella centralina), è consigliabile confrontare i dati ottenuti con la seguente tabella, che mostra, attraverso il THI (temperature-humidity index), le aree di comfort/discomfort termico.

- **area verde:** il THI è inferiore a 70, non è richiesta alcuna azione correttiva sulle condizioni microclimatiche;

- **area gialla:** THI tra 70 e 75: allerta. È necessario che l'allevatore inizi a mettere in atto soluzioni per ridurre lo stress da caldo, come ad esempio aumentare il flusso d'aria regolando i ventilatori e utilizzare i sistemi di raffrescamento ad acqua. Dovrà inoltre prestare particolare attenzione, in questa fase, al corretto funzionamento di abbeveratoi e sistemi di ventilazione;

- **area arancione:** THI tra 76 e 81: pericolo. Sono necessarie misure correttive immediate per ridurre lo stress da calore: aumento della velocità dell'aria, utilizzo di sistemi di cooling o di raffrescamento ad acqua etc.. In caso di ridotto consumo di alimento da parte degli animali, l'allevatore dovrebbe modificare il contenuto energetico della razione di conseguenza. Altre buone pratiche di allevamento

possono essere la fornitura periodica di acqua più fresca nelle linee di abbeveratoi e un monitoraggio più stringente dei comportamenti del gruppo;

- **area rossa:** THI superiore a 81: emergenza. Si tratta della condizione estrema di stress da caldo per gli animali, per cui l'allevatore dovrà evitare loro stress o manipolazioni (per interventi vaccinali etc.), evitare di somministrare alimento durante le ore più calde e ridurre la luminosità degli ambienti per cercare di ridurre l'attività motoria degli animali e, conseguentemente, la produzione di calore corporeo.

TEMPERATURE AND HUMIDITY STRESS INDEX FOR COMMERCIAL LAYING HENS
(HEAT STRESS INDEX = 0.6 X DRY BULB TEMPERATURE + 0.4 X WET BULB TEMPERATURE)

Relative Humidity (%)

Temperature	°F	°C	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	68	20	63	63	63	64	64	64	64	65	65	65	66	66	66	66	67	67	67	67	68	68
	72	22	64	65	65	66	66	66	67	67	67	68	68	69	69	69	70	70	70	71	71	72
	75	24	66	67	67	68	68	69	69	70	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75
	79	26	68	69	69	70	70	71	71	72	73	73	74	74	75	75	76	77	77	78	78	79
	82	28	70	70	71	72	72	73	74	74	75	76	76	77	78	78	79	80	80	81	82	82
	86	30	71	72	73	74	74	75	76	77	78	78	79	80	81	81	82	83	84	84	85	86
	90	32	73	74	75	76	77	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88	89	90
	93	34	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
	97	36	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	93	94	95	96	97
100	38	78	79	81	82	83	84	85	86	88	89	90	91	92	93	95	96	97	98	99	100	

Bird Comfort Zone (heat index < 70): No action needed; a good time to prepare for future hot weather.

Alert (heat index 70–75): Begin taking heat stress reduction measures in the flock; increase ventilation rate; increase fan speed and use foggers (run foggers based on relative humidity). Monitor bird behavior for signs of heat stress; ensure drinker and ventilation systems are functioning properly.

Danger (heat index 76–81): Heat stress conditions exist; take immediate measures to reduce heat stress in the flock. Increase ventilation rate in closed houses and use evaporative cooling based on relative humidity; in open houses run stir fans and misters. Adjust nutrient density of bird's diet to match any reduction in feed consumption. Move air over the birds at a minimum velocity of 1.8–2.0 meters/second. Periodically flush water lines with cooler water. Closely monitor flock behavior. Maximize nighttime cooling.

Emergency (heat index > 81): Extreme heat stress conditions exist; avoid handling birds for transfer or vaccination. Do not feed during the hottest part of the day. Decrease light intensity to reduce bird activity and body heat production.

Adattato da: Temperature and Humidity Stress Index for Laying Hens. Xin, Hongwei and Harmon, Jay D., "Livestock Industry Facilities and Environment: Heat Stress Indices for Livestock" (1998) Agriculture and Environment Extension Publications. Book 163, Iowa State University.

Il veterinario ufficiale dovrà quindi valutare la tipologia dei sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffrescamento presenti, e giudicarne l'idoneità in funzione del tipo/dimensioni dell'allevamento, delle condizioni climatiche locali e di altri fattori di rischio. La valutazione potrà essere integrata e supportata dalla raccolta del dato puntuale (temperatura e umidità) e calcolo del THI per verificare se effettivamente tali sistemi di controllo microclimatico risultino efficaci nel garantire comfort termico agli animali.

19. Presenza di gas nocivi

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 19					
PRESENZA DI GAS NOCIVI					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione					
Punto 10.					
“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”.					
Durante la valutazione dell’allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. $\text{NH}_3 > 20 \text{ ppm}$) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal veterinario ufficiale, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro del capannone all’altezza degli animali. Qualora non si abbia a disposizione questo strumento, nel caso di allevamenti che non presentano particolari odori o segnali che possano indicare una cattiva qualità dell’aria, si ritiene possibile assegnare il giudizio “accettabile” senza necessariamente provvedere alla misurazione dei gas. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio.					
La concentrazione dei gas è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: $\text{NH}_3 > 20 \text{ ppm}$; $\text{CO}_2 > 3000 \text{ ppm}$)					no; NO
La concentrazione dei gas non è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: $\text{NH}_3 < 20 \text{ ppm}$; $\text{CO}_2 < 3000 \text{ ppm}$)					SI
19) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH_3 CO_2 a campione, per confermare un sospetto di condizione inadeguata					

David e collaboratori (2015), riportano che la qualità dell’aria è generalmente peggiore nei sistemi di allevamento su lettiera, in quanto in questi ambienti la quantità di polvere, ammoniaca, batteri ed

endotossine è più alta rispetto ai sistemi in gabbia, soprattutto nei periodi invernali, quando la ventilazione viene ridotta.

È stato dimostrato che un'elevata concentrazione di ammoniaca nell'aria, insieme alla presenza di polvere, può causare negli animali congiuntivite, patologie respiratorie (bronchiti, allergie, asma) e aumentare la suscettibilità delle galline ovaiole nei confronti di eventuali infezioni secondarie.

È quindi fondamentale che la ventilazione sia adeguata e sufficiente per rimuovere polvere e gas nocivi.

Un accorgimento strutturale utile potrebbe essere la presenza di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde, in aggiunta ad aperture di aerazione regolabili manualmente o automaticamente sui lati dei ricoveri, in modo da creare ricircolo d'aria. Ai fini del mantenimento del benessere animale sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

In caso di sospetto di non conformità (conseguente alla percezione, all'interno del ricovero, di odore pungente ammoniacale), il veterinario ufficiale dovrà misurare la concentrazione di gas nocivi con un rilevatore portatile posizionato all'altezza dell'animale, in modo da poter avere un dato reale e non falsato dalla posizione; se non possiede l'apposito strumento, può avvalersi della centralina che solitamente è presente nei ricoveri e registra le concentrazioni dei principali gas nocivi.

20. Polverosità dell'aria

“La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 20					
POLVEROSITA' DELL'ARIA					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 146/2001 All., punto 10. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10.					
“La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”					
Per valutare la polverosità dell'aria si consiglia, in caso di dubbio, l'utilizzo del “Test della polvere sul foglio di carta”, descritto nel protocollo di valutazione del benessere degli avicoli Welfare Quality® (2009). Il metodo prevede l'utilizzo di un foglio formato A4 nero, che verrà posizionato al momento dell'ingresso nel capannone, su una superficie orizzontale sufficientemente alta da evitare il contatto con gli animali, preferibilmente lontano dalla catena di alimentazione. Alla fine della valutazione, il foglio di carta va rimosso e va fatto scorrere un dito sulla sua superficie, per avere l'impressione della quantità di polvere che si è depositata nel frattempo. Il livello di polvere viene poi classificato come segue:					
a. Assenza di polvere b. Lieve presenza di polvere c. Leggera copertura d. Molta polvere e. Il colore della carta è nascosto dalla polvere					
Il giudizio insufficiente è assegnato per condizioni di polverosità d ed e; giudizio accettabile per c e b; ottimale per a.					
I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Quantità di polvere dannosa per gli animali					no; NO
Quantità di polvere non dannosa per gli animali					SI
Assenza di polvere					Ottimale
20) La quantità di polvere è mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

La polvere presente negli allevamenti di galline ovaiole è costituita da residui di pelle, piume e particelle di cibo e particelle di lettiera.

Anderson e collaboratori (1966), sostengono che la polvere contenuta nell'aria di un capannone aumenti all'aumentare dell'attività degli animali; studi più recenti hanno poi dimostrato che il livello di polvere nei sistemi di allevamento su lettiera è 5-15 volte superiore rispetto alle gabbie, così come la carica batterica totale e la concentrazione di endotossine.

La polvere svolge un importante ruolo di disseminatore di patogeni all'interno di un allevamento, causando frequenti infiammazioni dei sacchi aerei e dell'apparato respiratorio in generale.

Le lesioni all'apparato respiratorio sono provocate sia dalle particelle di grandi dimensioni (3.7-7 μm), che si depositano nella parte anteriore dello stesso, sia dalle particelle di piccole dimensioni (1.1- 0.091 μm), che raggiungono i sacchi aerei e si distribuiscono uniformemente nel sistema.

Nella pratica, per valutare la polverosità dell'aria in modo semplice e veloce, si consiglia l'utilizzo del "Test della polvere sul foglio di carta", descritto nel protocollo di valutazione del benessere degli avicoli Welfare Quality® (2009). Il metodo prevede l'utilizzo di un foglio A4 nero, che verrà posizionato al momento dell'ingresso nel capannone, su una superficie orizzontale sufficientemente alta da evitare il contatto con gli animali, preferibilmente lontano dalla catena di alimentazione e da ventilatori/agitatori. Alla fine della valutazione bisognerà rimuovere il foglio di carta e passare un dito sulla superficie per avere l'impressione della quantità di polvere che si è depositata nel frattempo.

Classificare il livello di polvere come segue:

- a. Assenza di polvere;
- b. Lieve presenza di polvere (ne rimane un po' sul dito ma non vi è la scia del passaggio del dito sul foglio di carta);
- c. Leggera copertura (il foglio è coperto da una patina leggera di polvere ma il colore nero del foglio è ben evidente);
- d. Molta polvere (al passaggio del dito si può notare la scia di polvere rimossa, il colore del foglio è visibile sotto la polvere);
- e. Il colore della carta è nascosto dalla polvere.

Il giudizio insufficiente è assegnato per condizioni di polverosità d ed e; giudizio accettabile per c e b; ottimale per a.

21. Nido (Gabbie Modificate)

“Nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così detto nido di gruppo” (D. Lgs. 267/2003, articolo 1, punto 1.d).

“Le galline ovaiole dispongono di un nido (la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile)” (D. Lgs. 267/2003 allegato D. punto 1, a),2 1 ,).

Elemento di verifica 21					
NIDO (GABBIE MODIFICATE)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) . D. Lgs. 267/2003 all. D punto 1, a),2 1					
“Nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così detto nido di gruppo” “Le galline ovaiole dispongono di un nido (la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile)”. La normativa verticale non fornisce un numero specifico di nidi per gabbia; tuttavia affinché le galline possano manifestare il comportamento naturale di cova senza essere disturbate si suggerisce di verificare, come linea guida, che sia presente almeno 1 nido ogni 5 galline. Per valutare l'adeguatezza del il nido, è consigliabile utilizzare le indicazioni riportate nel Welfare Quality® (2009), secondo le quali è necessario osservare che i nidi siano distribuiti uniformemente nello spazio disponibile e che le uova siano ripartite omogeneamente nella barra di raccolta di fronte al posatoio. Si considera quindi accettabile la presenza di almeno un nido per gabbia, coperto su almeno 1 lato, mentre potrà essere assegnato il giudizio migliorativo se il nido risulta essere ben separato ed efficacemente utilizzato.					
Nido assente e/o non idoneo					no; NO
Nido presente e idoneo					SI
Nido presente e ben separato					Ottimale
21) Gli animali dispongono di un nido, la cui superficie non entra a far parte della superficie utilizzabile					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere il numero di nidi e le loro caratteristiche					

L'impossibilità di esprimere il comportamento di cova rappresenta una grande fonte di stress per le galline ovaiole allevate con metodi intensivi.

Tale comportamento è innescato nell'animale da modifiche nei livelli ormonali; a seguito di queste modifiche endocrine, le galline sono spinte a isolarsi in un luogo appartato per deporre le uova.

Per questo motivo, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere l'inserimento di un'area destinata a nido in ciascuno dei sistemi di allevamento, comprese le gabbie modificate. Tale struttura (definita del Dlgs 267/2003 come: *“uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, cosiddetto nido di gruppo”*), deve essere appartata e protetta, e ve ne deve essere un numero appropriato rispetto alla consistenza del gruppo di animali. Infatti, un numero insufficiente di nidi può portare gli animali ad ammassarsi con conseguenti ferimenti (fino a morti per soffocamento). Questo accessorio è stato adattato alle esigenze della produzione intensiva: il nido è diventato una parte della gabbia con pavimento inclinato per consentire il rotolamento dell'uovo nel nastro trasportatore, separata dal resto da una “tenda” di plastica.

La normativa verticale non fornisce un numero specifico di nidi per gabbia; tuttavia affinché le galline possano manifestare il comportamento naturale di cova senza essere disturbate si suggerisce di verificare, come indicazione, che sia presente almeno 1 nido ogni 5 galline (RSPCA, 2017). Si ritiene comunque accettabile la presenza di almeno un nido per gabbia.

Per valutare l'adeguatezza del nido, il veterinario ufficiale può servirsi delle indicazioni riportate nel Welfare Quality® (2009): è necessario osservare che i nidi siano distribuiti uniformemente nello spazio disponibile e che le uova siano ripartite omogeneamente nella barra di raccolta di fronte al posatoio.

Il giudizio accettabile verrà assegnato in caso di presenza di almeno un nido per gabbia, coperto su almeno 1 lato, mentre il giudizio migliorativo sarà assegnato se il nido risulta essere ben separato (coperto su più lati, con una buona schermatura della luce che consenta alle galline di sentirsi “riparate”) ed efficacemente utilizzato (presenza di almeno qualche uovo nella barra di raccolta sotto a ciascuno dei nidi).



Nido presente e ben delimitato



Nido presente, delimitato su un lato

22. Lettieria (Gabbie Modificate)

"Le galline ovaiole dispongono di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare" (D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1, a),3

Elemento di verifica 22					
LETTIERA (GABBIE MODIFICATE)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1, a					
"Le galline ovaiole dispongono di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare."					
L'allevamento in gabbie modificate presenta delle peculiarità strutturali e gestionali che rendono impossibile la presenza uniforme di una lettiera intesa in senso classico. Il Dlgs 267/2003 definisce come lettiera "il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche". Ciò che agli animali è effettivamente fornito nella quasi totalità dei casi è un tappetino o una piccola superficie in gomma o plastica su cui possa cadere una piccola quantità di mangime attraverso un foro praticato sulla mangiatoia. Tale mangime costituisce un materiale manipolabile e razzolabile che gli animali possono sfruttare. Quando gli animali non hanno accesso ad alcuna lettiera, questi comportamenti possono essere ridiretti verso i conspecifici, con atteggiamenti di feather-pecking (situazione in cui le galline beccano il piumaggio delle altre) e di aggressività. Per valutare la rispondenza al requisito si osservi la presenza di dispositivi che permettano agli animali di becchettare e razzolare.					
Assenza di lettiera o lettiera non idonea					no; NO
Presenza di lettiera idonea					SI
22) Gli animali dispongono di una lettiera che consenta loro di becchettare e razzolare					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere le caratteristiche della lettiera presente					

L'allevamento in gabbie modificate presenta delle peculiarità strutturali e gestionali che rendono impossibile la presenza uniforme di una lettiera intesa in senso classico. L'EFSA (2005) riporta la possibilità, nelle gabbie arricchite, di fornire tale "litter area" sotto forma di tappetini. Specifica anche, però, che il materiale fornito (in questo caso mangime che cade al di sopra di questi tappetini attraverso un foro praticato sulla mangiatoia), dev'essere gestito in modo tale da essere friabile e prontamente accessibile agli animali. Inoltre, il decreto 267/2003 definisce la lettiera come "materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche", indicate nei pareri EFSA come comportamenti di dust-bathing ("bagno di sabbia") e foraging (razzolamento). Per

garantire l'espletamento di questi comportamenti si ritiene perciò utile la valutazione della quantità di materiale a disposizione degli animali.

Il giudizio accettabile verrà espresso in caso di presenza ed adeguatezza del materiale manipolabile e razzolabile a disposizione degli animali.



23. Posatoi (Gabbie Modificate)

"Le galline ovaiole dispongono di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole" (D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1, a),4.).

Elemento di verifica 23					
POSATOI (GABBIE MODIFICATE)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1, a),4.					
"Le galline ovaiole dispongono di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole" Per poter assicurare un adeguato livello di benessere è fondamentale che i posatoi garantiscano alle galline stabilità nella seduta e nel riposo, quindi non devono essere scivolosi ma sufficientemente larghi e devono avere una forma tale da essere ben afferrati dai piedi degli animali (EFSA, 2015). La normativa definisce lo spazio minimo a disposizione per ogni gallina ovaiole, ma è importante considerare anche altri parametri. Le indicazioni fornite da EFSA (2015) per quanto riguarda la larghezza dei posatoi sono le seguenti: - all'interno di un range compreso tra 1,5 cm e 10,5 cm il benessere è garantito, pertanto si può considerare accettabile; - un'ampiezza compresa tra 3 e 6 cm è considerata Ottimale, in quanto è preferibile rispetto ad altre ampiezze. Per valutare la rispondenza al requisito si consideri la lunghezza (in cm) dei posatoi all'interno della gabbia in rapporto al numero di animali presenti e le indicazioni riguardanti l'ampiezza come ausilio per formulare una valutazione più completa. Per "posatoi appropriati" si intendono i posatoi che offrono alla gallina una percezione di elevazione, progettati in modo tale da ridurre al minimo le lesioni e massimizzarne l'uso. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Assenza di posatoi o presenza di posatoi non appropriati (indicativamente larghezza < 1,5 cm o >10,5 cm), che non offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole					no; NO
Presenza di posatoi appropriati (indicativamente larghezza compresa tra 1,5 e 3 cm o tra 6 e 10,5 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole					SI
Presenza di posatoi appropriati (indicativamente larghezza compresa tra 3 e 6 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole					Ottimale
23) Gli animali dispongono di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*)In caso di non conformità descrivere i cm di posatoio a disposizione di ciascuna ovaiole					

In natura, le galline utilizzano frequentemente i posatoi, soprattutto per appollaiarsi durante le ore notturne. Questo comportamento deriva da un primordiale istinto per proteggersi dai predatori,

ponendosi in una posizione soprelevata. Oltre ad un vantaggio etologico, tale atteggiamento, se assunto da animali allevati intensivamente, sembrerebbe apportare benefici in termini di salute della zampa e di incremento della robustezza ossea.

La normativa verticale prescrive (oltre alla lunghezza minima di 15 cm a disposizione di ciascun animale), in modo generico che i posatoi per le gabbie modificate siano “adeguati”. Se e in che misura i posatoi possano essere considerati “adeguati” dipende dalle loro caratteristiche, come l’altezza, il materiale e la forma, la larghezza e il diametro trasversale, il colore e la loro disposizione spaziale in relazione ad altri posatoi e ad altre strutture all'interno delle gabbie (EFSA, 2015).

Per poter assicurare un adeguato livello di benessere è fondamentale che i posatoi garantiscano alle galline stabilità nella seduta e nel riposo, quindi devono essere non scivolosi, sufficientemente larghi e avere una forma tale da poter essere ben afferrati dagli animali (EFSA, 2015).

La scelta del materiale è molto importante dal punto di vista del benessere animale, in quanto può avere sulle galline sia effetti positivi (aumentare la frequenza dell'appollaiamento, aumentare il periodo di riposo sul posatoio), sia negativi (accrescere il numero di lesioni ossee, bumblefoot o ipercheratosi): è stato visto infatti che materiali duri come il metallo o la plastica possono essere responsabili di fratture o deformità all'osso sternale, mentre il legno o la gomma (come copertura) sono preferiti dagli animali (Chen et al., 2014), anche se sono più difficili da pulire e disinfettare.

La forma dei posatoi sembra non influenzare particolarmente il benessere delle galline, anche se sono preferibili quelli rotondeggianti; mentre per quanto riguarda l'ampiezza EFSA (2015) riporta che, all'interno di un range da 1,5 cm a 10,5 cm il benessere è comunque garantito, ma 6 cm è preferibile rispetto a 3 cm o 1,5 cm, considerati rispettivamente di ampiezza meno buona e scarsa.

Considerando invece l'altezza dei posatoi da terra, è stato visto che quando una gallina salta ad una distanza maggiore di 80 cm per raggiungere o lasciare un posatoio (in qualsiasi direzione), o salta con un'inclinazione compresa tra i 45° e i 90° (misurati rispetto al piano orizzontale), aumenta molto il rischio che l'atterraggio abbia conseguenze negative o provochi lesioni (EFSA, 2015). La distanza tra i trespoli e la parte superiore della gabbia, la rete o il soffitto del capannone deve essere invece più di 20 cm.

Per le gabbie arricchite la legislazione attuale richiede un minimo di 15 cm di spazio sul posatoio per gallina. Tuttavia, la direttiva non stabilisce un requisito minimo di altezza del posatoio, né la forma o il diametro, consentendo un'ampia variabilità nell'interpretazione di questi aspetti nei vari Paesi.

La conformazione e il posizionamento del posatoio sono comunque importanti per prevenire l'ammassamento delle galline, che può portare a problemi di discesa dal posatoio stesso e a lesioni conseguenti. Per questo motivo i posatoi non dovrebbero sovrastare le zone coperte da lettiera e dovrebbero distare dalle pareti di uno spazio sufficiente per non arrecare disturbo o lesioni agli

animali.

Il veterinario ufficiale deve verificare che lo spazio di posatoio a disposizione di ciascuna ovaia sia sufficiente e che le caratteristiche del posatoio stesso lo rendano sicuro per gli animali e adatto all'espletamento del comportamento naturale di "perching" o appollaiamento.



Posatoio di larghezza ottimale (4 cm), di materiale idoneo a garantire un buon grip (gomma con zigrinature)



Posatoio di larghezza accettabile (1,5 cm) di materiale non ideale ma consentito (metallo)

24. Dimensione degli spazi tra gabbie e tra gabbie e pavimento (Gabbie Modificate)

"Le file di gabbie (per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili), sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori lo spazio è di almeno 35 cm" (D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1.d.).

Elemento di verifica 24					
DIMENSIONE DEGLI SPAZI TRA GABBIE E TRA GABBIE E PAVIMENTO (GABBIE MODIFICATE)					
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1. d.</i>					
"Le file di gabbie (per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili), sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori lo spazio è di almeno 35 cm". Per garantire una pratica ispezione ed estrazione dei volatili è necessario che l'addetto possa muoversi con facilità all'interno del capannone. Per questo motivo le file di gabbie devono essere separate da uno spazio avente una larghezza non inferiore ai 90 cm. Inoltre, le gabbie nella fila più bassa non devono essere direttamente a contatto con il pavimento, ma ad un'altezza di almeno 35 cm. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario misurare la larghezza tra le file di gabbie e lo spazio tra il pavimento e le file inferiori di gabbie.					
Presenza di anche solo un parametro non sufficiente					no; NO
Tutti i parametri sono sufficienti					SI
24) Le file di gabbie sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento e le gabbie inferiori lo spazio è di almeno 35 cm					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Riportare la larghezza minima dei passaggi e lo spazio tra pavimento e gabbie inferiori					

La presenza di un "corridoio" di almeno 90 centimetri tra le file di gabbie serve a garantire uno spazio minimo necessario agli operatori per svolgere le routinarie azioni di cura e controllo degli animali, nonché per la disposizione dei sistemi per l'ispezione dei piani più alti di gabbie. L'altezza minima da terra della prima fila di gabbie è necessaria per permettere un'ispezione adeguata degli animali a quel livello.

25. Dispositivi di accorciamento unghie (Gabbie Modificate)

"Le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie" (D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1,e).

Elemento di verifica 25																	
DISPOSITIVI DI ACCORCIAMENTO UNGHIE (GABBIE MODIFICATE)																	
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1,e																	
"Le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie". Per evitare una crescita eccessiva delle unghie, che potrebbe portare ad un intrappolamento e/o rottura dell'artiglio o essere un rischio per le altre galline all'interno della gabbia in caso di graffi, le gabbie devono essere dotate di dispositivi per l'accorciamento delle unghie. Come riporta l'EFSA (2005), esistono diverse tipologie di dispositivi di accorciamento delle unghie attualmente in uso, tutti generalmente posizionati dietro le mangiatoie: pannelli perforati costituiti da diverso materiale, come ceramica o metallo, oppure paste e strisce abrasive. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario innanzitutto verificare la presenza di tali dispositivi nelle gabbie, e poi valutarne l'adeguatezza attraverso l'osservazione degli animali (presenza di unghie eccessivamente lunghe / rotte)																	
Dispositivi di accorciamento unghie assenti o non adeguati					no; NO												
Dispositivi di accorciamento unghie presenti e adeguati					SI												
25) Le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie <table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>no cat. A</th> <th>no cat. B</th> <th>NO cat. C</th> <th>N.A.</th> <th>XXXXXXXX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX												
EVIDENZE (*)																	
(*) Descrivere il tipo di dispositivo utilizzato e, in caso di rilievi non conformi il numero di animali con unghie molto lunghe o rotte																	

La normativa prevede che i dispositivi di accorciamento delle unghie debbano essere presenti solo nei sistemi di allevamento a gabbie modificate.

Tali dispositivi sono fondamentali per il benessere delle galline ovaiole, in quanto una crescita eccessiva delle unghie può comportarne sia la rottura o la caduta, con lesioni all'animale stesso, sia graffi e ferite ad altri animali o agli operatori che li maneggiano.

Come riporta l'EFSA (2005), esistono diverse tipologie di dispositivi di accorciamento delle unghie attualmente in uso, tutti generalmente posizionati dietro le mangiatoie: pannelli perforati costituiti da diverso materiale, come ceramica o metallo, oppure paste e strisce abrasive.

Il successo di questi dispositivi dipende sia dall'efficacia del materiale sia dalla genetica delle galline stesse, in quanto ad esempio nelle galline marroni dispositivi troppo abrasivi possono causare l'indebolimento delle unghie, mentre nelle galline bianche, caratterizzate da una crescita veloce e massiccia delle unghie, è utile adottare un dispositivo molto abrasivo.

Il veterinario ufficiale deve innanzitutto verificare la presenza di dispositivi per l'accorciamento delle unghie all'interno delle gabbie, per poi comprovarne l'adeguatezza osservando le unghie degli animali in più gabbie ed evidenziando quelle rotte o eccessivamente lunghe; il giudizio finale deriva da una valutazione complessiva.



26. Nido (Sistemi alternativi)

“Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano

di [...]: almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo deve essere presente una superficie di almeno 1 m² per un massimo di 120 ovaiole" (D.Lgs. 267/03 All. B, punto 1, a), 3)).

Elemento di verifica 26					
NIDO (SISTEMI ALTERNATIVI)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/03 All. B, punto 1, a) 3)					
"Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di [...]: almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo deve essere presente una superficie di almeno 1 m² per un massimo di 120 ovaiole". Nell'ambito dei sistemi alternativi di allevamento, i nidi possono essere individuali oppure di gruppo (anche chiamati "familiari"). I primi, come definito dalla normativa vigente, devono essere in numero di massimo 1 ogni 7 galline, mentre i secondi, che possono presentare una sola apertura oppure numerose aperture che consentono l'accesso ad una superficie più ampia, devono essere coperti almeno su due lati. La situazione ideale per il benessere dell'ovaiole si ha quando i nidi individuali siano in un numero non inferiore a 1 ogni 5 galline o quando i nidi di gruppo siano coperti sui quattro lati con tende frontali e possibilmente situati al centro del capannone. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario verificare la congruità del numero di nidi rispetto agli animali presenti.					
Numero/dimensione dei nidi non sufficiente					no; NO
Tutti i parametri sono sufficienti					SI
Presenza di un nido ogni 5 ovaiole o 1 m ² per meno di 120 ovaiole					Ottimale
26) Gli animali dispongono di un nido ogni 7 ovaiole, se sono nidi di gruppo è presente una superficie di di almeno 1 m² per un massimo di 120 ovaiole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere il numero/dimensione dei nidi e le loro caratteristiche					

Vale quanto detto per l'Item Nido (Gabbie Modificate), con la differenza che la normativa prescrive, in caso di sistemi alternativi, un nido ogni 7 ovaiole (o 1 m² per 120 animali in caso di nido di gruppo). Anche in questo caso l'area nido deve essere quanto più possibile appartata e protetta, nonché disposta in modo da essere facilmente accessibile agli animali.

Il giudizio ottimale può essere attribuito in caso di un numero maggiore di nidi presenti: 1 nido ogni 5 galline ovaiole accasate o 1 m² di nido collettivo per meno di 120 galline.



27. Posatoi (Sistemi alternativi)

"Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di [...]: posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera: la distanza orizzontale fra posatoi non è inferiore

a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 20 cm." (D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 1, a), 4)

Elemento di verifica 27					
POSATOI (GABBIE MODIFICATE)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 1 a), 4)					
"Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di [...]: posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera: la distanza orizzontale fra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 20 cm." La normativa prescrive che i posatoi siano adeguati, privi bordi aguzzi e che vi siano almeno 15 centimetri di spazio per ciascuna ovaiole. È stato dimostrato che fornire 15 centimetri di posatoio rialzato riduce paura e aggressività degli animali e migliora la condizione corporea. Per i sistemi alternativi è preferibile avere più di 15 centimetri di spazio per ovaiole, poiché vi è maggiore competizione tra animali rispetto alle gabbie modificate. La conformazione e il posizionamento del posatoio sono importanti per prevenire l'ammassamento delle galline, che può portare a problemi di discesa dal posatoio stesso e a lesioni conseguenti. Per questo motivo i posatoi non devono sovrastare le zone coperte da lettiera e devono distare almeno 30 centimetri l'uno dall'altro e almeno 20 centimetri dalle pareti. Sono da preferirsi posatoi costituiti da materiali morbidi (es. legno tenero) o ricoperti di gomma e quelli a sezione rotonda rispetto a quelli a sezione rettangolare. EFSA (2015) raccomanda una larghezza del posatoio compresa tra i 3 e i 6 centimetri per garantire il comfort del piede e del cuscinetto plantare in particolare. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario verificare che lo spazio di posatoio a disposizione di ciascuna ovaiole sia sufficiente e che le caratteristiche del posatoio stesso lo rendano sicuro per gli animali e adatto all'espletamento del comportamento naturale di "perching" o appollaiamento. Per "posatoi appropriati" si intendono i posatoi che offrono alla gallina una percezione di elevazione, progettati in modo tale da ridurre al minimo le lesioni e massimizzarne l'uso.					
Assenza di posatoi o presenza di posatoi non appropriati (indicativamente larghezza < 1,5 cm o >10,5 cm), che non offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole					no; NO
Presenza di posatoi appropriati (indicativamente larghezza compresa tra 1,5 e 3 cm o tra 6 e 10,5 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole					SI
Presenza di posatoi appropriati (indicativamente larghezza compresa tra 3 e 6 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole					Ottimale
27) Gli animali dispongono di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi, e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera La distanza orizzontale tra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 30 cm					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

(*) Descrivere lo spazio a disposizione sul posatoio per ogni ovaia e in caso di non conformità le caratteristiche non conformi

Vale quanto detto nell'Item Posatoi (Gabbie Modificate) per quanto riguarda le caratteristiche di appropriatezza ed attrattività dei posatoi. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario verificare che lo spazio di posatoio a disposizione di ciascuna ovaia sia sufficiente (15 centimetri per animale) e che le caratteristiche del posatoio stesso lo rendano sicuro per gli animali e adatto all'espletamento del comportamento naturale di "perching" o appollaiamento.



28. Lettieria (Sistemi alternativi)

“Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono:

a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di:

[...]

5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per gallina ovaioia; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo;" (D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 1 a) 5)

Elemento di verifica 28					
LETTIERA (SISTEMI ALTERNATIVI)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 1 a) 5)					
"Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di: [...] 5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per gallina ovaioia; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo;" La presenza di lettiera nell'allevamento della gallina ovaioia è essenziale affinché gli animali esprimano comportamenti specie-specifici quali: dust-bathing (bagni di polvere), razzolamento e becchettamento (pecking). Quando gli animali non hanno accesso ad alcuna lettiera (o quando le condizioni della lettiera sono molto scadenti), questi comportamenti possono essere ridiretti verso i conspecifici, con atteggiamenti di aggressività e di feather-pecking (situazione in cui le galline beccano il piumaggio delle altre). Il veterinario ufficiale deve verificare che la superficie di lettiera presente sia adeguata rispetto al numero di animali, e coperta da uno strato sufficiente di materiale razzolabile e friabile.					
La superficie di lettiera è inferiore ai 250cm ² /ovaioia e/o occupa meno di un terzo della superficie al suolo					no; NO
La superficie di lettiera è pari o superiore a 250cm ² /ovaioia e occupa almeno un terzo della superficie al suolo					SI
28) La lettiera è presente in quantità sufficiente rispetto al numero di animali accasati e alla superficie al suolo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Riportare i dati raccolti per verificare la conformità (superficie coperta da lettiera e numero di animali accasati)					

Nei sistemi alternativi almeno un terzo della superficie al suolo (e almeno 250 cm² per ovaioia), deve essere occupato di lettiera (costituita da materiale friabile es. lolla di riso, truciolo etc.). Tale materiale deve essere collocato all'inizio del ciclo (sebbene sia ancora diffusa la pratica di accasare le pollastre in capannoni privi di lettiera, per consentire che la pollina, seccandosi, costituisca essa stessa un substrato friabile adatto alle esigenze etologiche degli animali. Questa pratica non è conforme con quanto richiesto dalla normativa), e deve costituire uno strato di sufficiente spessore. Spesso infatti gli allevatori tendono a creare uno strato molto sottile, poco apprezzato dalle galline, per contrastare

il fenomeno delle uova deposte a terra anziché nei nidi. Questa pratica non è da considerarsi accettabile per il rispetto delle norme sul benessere animale.




29. Pavimentazione (Sistemi alternativi)

"1. Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: [...]"

b) essere dotati di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;" (D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 1, b)

Elemento di verifica 29					
PAVIMENTAZIONE (SISTEMI ALTERNATIVI)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 1, b)					
"1. Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: [...] b) essere dotati di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;" Il veterinario ufficiale consideri se le dimensioni del fessurato calpestabile dagli animali siano di dimensioni adeguate, tenendo in considerazione le dimensioni delle loro zampe. La pavimentazione fessurata dovrebbe essere in grado sia di permettere il passaggio delle deiezioni al di sotto della superficie calpestabile, sia di sostenere adeguatamente le unghie anteriori delle galline.					
Pavimento non idoneo a sostenere adeguatamente ciascuna unghia anteriore di ciascuna zampa					no; NO
Pavimento idoneo a sostenere adeguatamente ciascuna unghia anteriore di ciascuna zampa					SI
29) la pavimentazione sostiene adeguatamente le unghie anteriori di ciascuna zampa					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere le caratteristiche della pavimentazione					

Il veterinario ufficiale consideri se le dimensioni del fessurato calpestabile dagli animali siano di dimensioni adeguate, tenendo in considerazione le dimensioni delle loro zampe. La pavimentazione fessurata dovrebbe essere in grado sia di permettere il passaggio delle deiezioni al di sotto della superficie calpestabile, sia di sostenere adeguatamente le unghie anteriori delle galline.



MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER

30. Numero di livelli sovrapposti (Sistemi alternativi VOLIERE)

“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:

1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4;” (D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 2 a) 1).

Elemento di verifica 30					
NUMERO DI LIVELLI SOVRAPPOSTI (SISTEMI ALTERNATIVI VOLIERE)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 2 a) 1					
“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:					
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:					
1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4;”					
I sistemi a voliera prevedono diversi livelli di pavimentazione perforata (in rete metallica o plastica). Le piattaforme sono spesso connesse tra loro attraverso rampe o scale. Per garantire una buona gestione di questi sistemi di allevamento (soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento delle deiezioni), la normativa stabilisce che il numero massimo di livelli sovrapposti sia pari a quattro; il veterinario ufficiale dovrà, con eventualmente l’ausilio della planimetria dell’allevamento, verificare che tale requisito sia rispettato.					
Voliere con 5 o più livelli sovrapposti					no; NO
Voliere con un numero massimo di livelli sovrapposti pari a 4					SI
30) Ci sono al massimo 4 livelli sovrapposti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Riportare il numero di livelli presenti					

I sistemi a voliera prevedono diversi livelli di pavimentazione perforata (in rete metallica o plastica). Le piattaforme sono spesso connesse tra loro attraverso rampe o scale. La superficie a terra è parzialmente o totalmente coperta di lettiera. Solitamente i nidi sono localizzati tutti sullo stesso livello, per tutta la lunghezza del capannone, mentre i dispositivi di alimentazione e abbeverata sono distribuiti uniformemente su più livelli. Talvolta ai piani più alti non vengono installate queste

strutture, in quanto le galline tendono a rifugiarsi ai livelli superiori per riposare durante le ore notturne.

Questo sistema di allevamento crea un elevato grado di complessità dell'ambiente, e stimola l'esercizio e il comportamento esplorativo delle galline.

Per garantire una buona gestione dei sistemi di allevamento a più piani (soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento delle deiezioni), la normativa stabilisce che il numero massimo di livelli sovrapposti sia pari a quattro; il veterinario ufficiale dovrà, con eventualmente l'ausilio della planimetria dell'allevamento, verificare che tale requisito sia rispettato.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

31. Altezza dei livelli (Sistemi alternativi VOLIERE)

“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:

1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4;" (D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 2, a), 2)

Elemento di verifica 31					
ALTEZZA DEI LIVELLI (SISTEMI ALTERNATIVI VOLIERE)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 2, a), 2)					
“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1: a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli: [...] 2) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;" L'altezza minima prevista per ciascun livello è di 45 centimetri, tale da consentire agli animali di stare in posizione eretta o di appollaiarsi sui posatoi.					
Voliera con altezza dei livelli minore di 45 cm					no; NO
Voliera con altezza dei livelli pari o maggiore di 45 cm					SI
31) Tra i livelli vi è uno spazio minimo di 45 cm					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Riportare l'altezza dei livelli					

L'altezza minima prevista per ciascun livello è di 45 centimetri, tale da consentire agli animali di stare in posizione eretta o di appollaiarsi sui posatoi. Tuttavia, secondo alcuni studi, tale altezza non consente di espletare alcuni movimenti tipici della specie, quali: estensione della testa, battito delle ali e scuotimento del busto. La possibilità di compiere questi movimenti porterebbe gli animali ad una maggiore robustezza ossea. Alcuni autori riportano che, se ne hanno la possibilità, le galline utilizzano sino a 56 centimetri di spazio in altezza.

32. Mangiatoie e abbeveratoi (Sistemi alternativi VOLIERE)

“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:

[...] 3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;” (D.M. 20/04/2006, allegato I, punto 2.a.3).

Elemento di verifica 32					
MANGIATOIE E ABBEVERATOI (SISTEMI ALTERNATIVI VOLIERE)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D.M. 20/04/2006, all. I, punto 2.a.3.					
“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1: a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli: [...] 3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;” I dispositivi di alimentazione e abbeverata possono essere presenti su tutti i piani o solo su alcuni, ma è importante che ogni gallina abbia facile accesso ad alimento e acqua a qualsiasi livello. Talvolta si preferisce lasciare soltanto l'ultimo livello privo di tali dispositivi, poiché si è visto che gli animali tendono a raggiungere i piani più alti per riposare durante le ore notturne. Saranno perciò conformi sia gli allevamenti che presentano mangiatoie ed abbeveratoi su ogni piano, sia quelli che non presentano queste strutture sull'ultimo piano (purché siano uniformemente distribuite nei piani restanti).					
Impossibilità di garantire agli animali un accesso uniforme ad abbeveratoi e mangiatoie					no; NO
E' garantito agli animali un accesso uniforme ad abbeveratoi e mangiatoie					SI
32) Abbeveratoi e mangiatoie sono correttamente distribuiti tra i piani					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Riportare la localizzazione di abbeveratoi e mangiatoie					



33. Protezione dalle deiezioni (Sistemi alternativi VOLIERE)

“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:

[...] 4) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;” (D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 2, a), 4)

Elemento di verifica 33					
PROTEZIONE DALLE DEIEZIONI (SISTEMI ALTERNATIVI VOLIERE)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 2, a), 4)					
“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1: a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli: [...]4) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;” I livelli della voliera possono essere disposti in modo sfalsato, tale da far sì che le deiezioni cadano in uno spazio sottostante privo di animali, oppure può essere presente al di sotto di ciascun piano un dispositivo di rimozione delle deiezioni. Il veterinario ufficiale deve osservare la disposizione dei piani del sistema a voliera e può aiutarsi nella valutazione osservando lo stato di pulizia generale degli animali.					
Voliere con sistemi che causano la caduta di deiezioni nei livelli inferiori					no; NO
Voliere con sistemi che evitano la caduta di deiezioni nei livelli inferiori					SI
33) Sono impediti le cadute di deiezioni dai livelli superiori a quelli inferiori					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Riportare l'eventuale presenza di dispositivi che evitano la caduta di deiezioni sui piani sottostanti (es. sistemi di rimozione a rullo). Gli ABM (es. pulizia degli animali a livello dorsale) possono essere usati per confermare la conformità o stabilire la non conformità.					



Esempi di sistemi a voliera con soluzioni di rimozione delle feci e piani sfalsati (Da: Compassion in World Farming, 2019)

34. Dimensione degli accessi agli spazi esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)

“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:

1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m;" (D. Lgs. 267/ 2003 All. B, punto 2, b), 1.

Elemento di verifica 34					
DIMENSIONE DEGLI ACCESSI AGLI SPAZI ESTERNI (SISTEMI ALTERNATIVI ALL'APERTO)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) D. Lgs. 267/ 2003 All. B, punto 2, b), 1					
“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1: b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto: 1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m;" In caso di possibilità di accesso ad uno spazio esterno, esso deve essere garantito in egual misura a ciascun animale, in qualunque punto del capannone esso si trovi. Le aperture poi devono avere dimensioni tali da non ostacolare l'uscita delle galline né ferirle durante il passaggio.					
Presenza anche di un solo parametro non sufficiente					no; NO
Tutti i parametri sono sufficienti					SI
35) Le aperture che conducono all'esterno sono in numero sufficiente e di dimensioni adeguate					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere il numero di aperture e le loro caratteristiche					



MINISTERO DELLA SALUTE - IZS

35. Disponibilità di spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO)

“1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

c) la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m². Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m² per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m² per gallina;” (Reg. Delegato (UE) 2168/2017, allegato, punto 1.c).

“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:

2) gli spazi all'aperto devono:

a) avere una superficie adeguata alla densità di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione;” (D.M. 20/04/2006, allegato I, punto 2.b.2.a).

Elemento di verifica 35

DISPONIBILITÀ DI SPAZIO ESTERNO (SISTEMI ALTERNATIVI ALL'APERTO)

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) Reg (UE) 2169/2017, all., punto 1.c.

“1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

b) la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m². Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m² per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m² per gallina;”

“2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:

2) gli spazi all'aperto devono:

a) avere una superficie adeguata alla densità di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione;”

Il veterinario ufficiale deve calcolare, attraverso l'esame della planimetria dell'allevamento e la conoscenza del numero di animali accasati, se la superficie esterna destinata alle ovaiole sia sufficiente e rispondente al requisito normativo.

La superficie esterna non garantisce la corretta densità di animali prevista dalla normativa					no; NO
La superficie esterna garantisce la corretta densità di animali prevista dalla normativa					SI
36) Gli spazi all'aperto hanno una superficie tale da garantire la densità corretta di animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Riportare le dimensioni di spazio aperto e il numero di animali accasati					

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

36. Ripari esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)

“1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

d) gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.” (Reg. Delegato (UE) 2168/2017, allegato, punto 1.d).

D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 2, b).2.b)2 “2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:

2) gli spazi all'aperto devono:

b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati.”

“12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 12).

Elemento di verifica 36

RIPARI ESTERNI (SISTEMI ALTERNATIVI ALL'APERTO)

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) Reg (UE) 2169/2017, all., punto 1.d e D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 2, b). 2. b)2

“1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

d) gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.”

“12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.”

2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:

2) gli spazi all'aperto devono:

b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati.”

Lo spazio all’aperto va correttamente gestito per incoraggiare le galline ad utilizzarlo appieno. Esse infatti manifestano un atteggiamento di timore (nei confronti di possibili predatori), che può essere attenuato dalla presenza di ripari sotto cui possano ripararsi. Quindi, per incoraggiare l’uso delle aree esterne, è necessario fornirle di ripari e zone di ombra (sia naturali che artificiali). Tuttavia, i predatori costituiscono effettivamente un rischio per le galline allevate; è perciò importante adottare appropriate misure a loro tutela (ad esempio una recinzione contro i predatori da terra o una rete sospesa al di sopra degli animali in certe aree contro i grossi rapaci).

Il veterinario ufficiale deve verificare la presenza e l’adeguatezza ai fini della protezione da predatori dei ripari forniti dall’allevatore, nonché se il numero di abbeveratoi presenti è sufficiente e la loro disposizione uniforme.

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente	no; NO
Tutti i parametri sono sufficienti	SI

37) Gli spazi all’aperto sono provvisti di adeguati ripari da intemperie e predatori, e dotati di abbeveratoi in numero adeguato

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere i ripari e le loro caratteristiche, riportare il numero di abbeveratoi esterni



37. Utilizzi ulteriori dello spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO)

“1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

b) gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest'ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità" (Reg. Delegato (UE) 2168/2017, allegato, punto 1.b).

Elemento di verifica 37					
UTILIZZI ULTERIORI DELLO SPAZIO ESTERNO (SISTEMI ALTERNATIVI ALL'APERTO)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) Reg (UE) 2169/2017, all., punto 1.d e D.Lgs. 146/2001, all, punto 12.					
“1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio. In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: b) gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest'ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità" Per stimolare l'utilizzo dello spazio esterno da parte delle galline, esso deve essere coperto prevalentemente di vegetazione (che non dovrebbe però essere eccessivamente fitta per non ostacolare il movimento degli animali). Tale spazio può essere contestualmente utilizzato a scopo agricolo ma esclusivamente in qualità di frutteto, bosco o pascolo.					
Spazi all'aperto non idonei					no; NO
Spazi all'aperto idonei					SI
38) Gli spazi all'aperto sono coperti prevalentemente di vegetazione e, se utilizzati anche ad altro scopo, non sono adibiti ad usi diversi da: frutteto, bosco o pascolo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere gli eventuali usi ulteriori dello spazio esterno					

VI ILLUMINAZIONE MINIMA

38. Illuminazione

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 11).

“3. Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 3).

Elemento di verifica 38					
ILLUMINAZIONE					
<i>(Categoria di non conformità: Illuminazione minima) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11 – 267/2003 All. A Punto 3</i>					
“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.” “3. Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali. Per "illuminazione sufficiente" si intende un'intensità luminosa di almeno 20 lux misurata a livello degli occhi degli animali e in diversi punti (al di sopra della linea di mangiatoia, della lettiera, vicino alla linea di abbeveratoi...) In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale adeguata					no; NO
Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata					SI
39) Gli edifici sono dotati di un'illuminazione adeguata					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					

(*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro.

La ricerca di cibo, il comportamento esplorativo e la comunicazione sono attività basate principalmente sulla vista, che rappresenta il senso più sviluppato nei volatili (Güntürkün, 2000). Il Decreto Legislativo 267/2003 richiede "livelli di luce sufficienti per consentire a tutte le galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente", che può essere interpretata, sulla base dei più recenti studi, su livelli di illuminazione di almeno 20 lux nelle aree deputate alle diverse attività, esclusa l'attività di riposo e ovodeposizione, per le quali sono preferibili livelli più bassi. È stato dimostrato che un'esposizione prolungata a livelli di luminosità bassi (<10 lux) può provocare lesioni agli occhi e anomalie comportamentali (Prescott e Wathes 2002; Prescott et al., 2004).

39. Programma di luce

“11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 11).

“3. [...] Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di evitare problemi di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo di ventiquattro ore comprensivo di un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari.” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 3).

Elemento di verifica 39					
PROGRAMMA DI LUCE					
(Categoria di non conformità: Illuminazione minima) 146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 11 – 267/2003 All. A Punto 3					
<i>“11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.”</i> <i>“3. [...] Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di evitare problemi di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo di ventiquattro ore comprensivo di un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari.”</i> Periodi di luce prolungata sono pericolosi per il benessere della gallina non solo dal punto di vista fisico, ma anche comportamentale; programmi di luce di tipo continuo rendono gli animali più paurosi (Campo e Davila, 2002). Diventa quindi fondamentale assicurare agli animali un ciclo di luce artificiale il più vicino possibile a quello naturale, con alternanza di luce e buio nell'arco di 24 ore, che permetta alle galline di riposare, ridurre lo stress e incentivare il ritmo circadiano (Malleau et al., 2007).					
Il programma di luce non è adeguato					no; NO
Il programma di luce è adeguato					SI
40) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	NA	XXXXXXXX
EVIDENZE					
(*) Registrare il programma di luce messo in atto					

40. Periodo di penombra

“11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 11).

“[...] In concomitanza con la diminuzione della luce deve essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 3).

Elemento di verifica 40					
PERIODO DI PENOMBRA					
(Categoria di non conformità: Illuminazione minima) 146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 11 – 267/2003 All. A Punto 3					
<i>“11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.”</i> <i>“[...] In concomitanza con la diminuzione della luce deve essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.”</i> Nei sistemi ad illuminazione artificiale deve essere previsto un periodo di crepuscolo sufficiente prima del ciclo di buio, in cui l'illuminazione viene gradualmente attenuata, permettendo agli uccelli di individuare i punti di appostamento per il riposo appropriati, senza provocarsi ferite o disturbarsi a vicenda: si considera sufficiente un periodo di penombra di 15-30 minuti. Questo sistema permette di stimolare anche il comportamento alimentare durante le ore diurne per prevenire la fame durante il periodo notturno. In aggiunta, è importante anche la presenza di un periodo di graduale aumento dell'intensità luminosa prima che si accendano le luci, per ridurre la quantità di uova deposte sul pavimento invece che nel nido (ICFAW, 2017). Per "durata sufficiente" si intende un periodo di penombra di almeno 15 minuti. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Il periodo di penombra è assente o di durata insufficiente					no; NO
Il periodo di penombra è presente e di durata sufficiente					SI
41) E' rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	NA	XXXXXXXX
EVIDENZE					
(*) Riportare orari e durata del periodo di penombra applicato dall'allevatore					

41. Uniformità di illuminazione (Allevamenti ad illuminazione naturale)

“[...] In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.” (D. Lgs. 267/2003, allegato A, punto 3).

Elemento di verifica 41					
UNIFORMITÀ DI ILLUMINAZIONE (ALLEVAMENTI AD ILLUMINAZIONE NATURALE)					
<i>(Categoria di non conformità: Illuminazione minima) 146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 11 – 267/2003 All. A Punto 3</i>					
“[...] In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.” Le aperture per l'ingresso della luce naturale devono essere presenti in numero tale e con una disposizione adeguata a garantire che non vi siano zone perpetuamente in ombra (con luminosità inferiore a 5 lux). I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Illuminazione naturale non ripartita uniformemente nei locali di allevamento					no; NO
Illuminazione naturale ripartita uniformemente nei locali di allevamento					SI
42) Le aperture per la luce naturale consentono una distribuzione uniforme della luce nei locali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	NA	XXXXXXXX
EVIDENZE					
(*) In caso di rilievo non conforme, descrivere in che modo la disposizione delle aperture non consente la distribuzione uniforme della luce (con formazione di zone d'ombra)					

VII ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA

42. Ispezione degli impianti automatici e meccanici e gestione delle situazioni di emergenza

“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 42					
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI E MECCANICI E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA					
(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica e meccanica) 146/2001 All. Impianti automatici e meccanici Punto 13.					
"Ogni impianto automatico o meccanico (es. alimentazione, areazione e sistemi di allarme) indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali". Gli impianti automatici o meccanici che possono influenzare il benessere animale (sistemi automatici di alimentazione, ventilazione, ecc.) possono essere considerati indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (danno agli impianti di alimentazione/abbeveraggio, incendi, condizioni climatiche estreme)					
Impianti automatici o meccanici ispezionati meno di 1 volta/giorno					no; NO
Impianti automatici o meccanici ispezionati almeno 1 volta/giorno					SI
Impianti automatici o meccanici ispezionati 1 o più volte/giorno e presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni di emergenza					Ottimale
43) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*)Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni					

43. Sistema di allarme

“In caso di guasto all’impianto [di ventilazione] deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d’allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 43					
SISTEMA DI ALLARME					
(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica e meccanica) 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici					
Punto 13.					
<i>“In caso di guasto all’impianto [di ventilazione] deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d’allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.”</i> Gli impianti fondamentali per la salute ed il benessere animale, come l’impianto di ventilazione, devono essere provvisti di un sistema di allarme; detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli e manutenzioni regolari. Per verificare la rispondenza al requisito è necessario che il detentore possieda un registro dove segnare le date dei controlli al sistema di allarme. Se l’allevamento non necessita di un impianto di ventilazione artificiale il requisito si considera non applicabile. Il giudizio migliorativo può essere assegnato in presenza di un sistema di allarme che riguardi anche altri impianti (oltre a quello di ventilazione) indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali (es. sistema di alimentazione/abbeveraggio)					
Si considera non adeguato: Assenza di un sistema di allarme all’impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di un sistema di allarme all’impianto di ventilazione artificiale controllato regolarmente					SI
Presenza aggiuntiva di un sistema di allarme riguardante altri impianti indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali controllato regolarmente					Ottimale
25) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all’impianto stesso È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall’allevatore					

Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore, nonché un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. apertura d'emergenza di finestre/generatore di corrente, ecc.).

Il sistema di allarme e il sistema sostitutivo devono essere verificati regolarmente, soprattutto se il loro malfunzionamento metterebbe in serio rischio la vita, la salute ed il benessere degli animali.

Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. presenza di aperture verso l'esterno tali da generare circolazione dell'aria; pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CROMBIA

44. Presenza di un impianto di riserva

“13. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.”

Elemento di verifica 44					
PRESENZA DI UN IMPIANTO DI RISERVA					
(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica e meccanica) 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici					
Punto 13					
<i>“13. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.”</i> Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. apertura d'emergenza di finestre/generatore di corrente, ecc.) e che lo stesso sia sottoposto a periodici interventi di verifica e manutenzione.. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (guasto degli impianti di ventilazione artificiale), descritto nei Manuali di corretta prassi operativa.					
Assenza / inadeguatezza dell'impianto di riserva, in caso di ventilazione artificiale					no; NO
Presenza di un impianto di riserva adeguato					SI
Presenza aggiuntiva di un piano di emergenza formalizzato					Ottimale
25) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*)Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

45. Rumore

“2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.” (D. Lgs. 267/2003 Art. 1 Punto 2).

Elemento di verifica 45					
RUMORE					
(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica e meccanica) D. Lgs. 267/2003 Art. 1 Punto 2					
“2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.” Bright and Johnson (2001) riportano che, nonostante le galline ovaiole si adattino e sopportino vari gradi e diverse tipologie di rumore, l'esposizione degli animali a rumori improvvisi e ad alto volume dovrebbe essere ridotta al minimo, per prevenire lo stress paura-indotto e le sue reazioni, come l'ammassamento degli animali in un'unica area. I macchinari devono pertanto essere progettati, collocati e mantenuti in modo da produrre il minimo rumore possibile (Chlouplek et al., 2009). Il veterinario ufficiale deve quindi verificare l'assenza di rumori che possano stressare gli animali e provocarne diminuzione del benessere					
Rumorosità eccessiva					no; NO
Rumorosità accettabile					SI
46) La rumorosità determinata dalle attrezzature non è tale da arrecare danno agli animali.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

VIII ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

46. Gestione dell'alimentazione

“14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.” (D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14).

Elemento di verifica 46

GESTIONE DELL'ALIMENTAZIONE

(Categoria di non conformità: alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

“14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.”

I sistemi di alimentazione devono permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta deve fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli animali.

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, in funzione della fase produttiva in cui le galline si trovano, dispongano di una razione specifica. Tale razione specifica può essere scritta o registrata o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive.

Il veterinario ufficiale deve quindi verificare la qualità e la salubrità degli alimenti che vengono somministrati agli animali, tramite l'osservazione dei cartellini posti sui silos e la valutazione dell'idoneità degli ambienti deputati alla conservazione dei mangimi, per poi verificare l'adeguatezza della razione somministrata ai fabbisogni dell'animale in quello specifico periodo di deposizione, sia per composizione che per quantità e intervalli di somministrazione, tenendo in considerazione il sistema di allevamento; come ausilio si può utilizzare il piano di razionamento utilizzato in azienda.

Oltre a questo è consigliabile, per effettuare una valutazione più completa e accurata, ispezionare visivamente l'alimento contenuto all'interno delle mangiatoie, per verificarne sia la granulometria che l'eventuale presenza di mangime vecchio o contaminato.

L'alimentazione non è adeguata ai fabbisogni e/o non è composta da alimenti sani

no; NO

L'alimentazione è adeguata ai fabbisogni e/ è composta da alimenti sani					SI
47) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*)Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

47. Tipologia di alimentazione

“15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.” (D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15)

Elemento di verifica 47 TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE <i>(Categoria di non conformità: alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15</i>					
<i>“15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.”</i> L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad <i>libitum</i> per garantire ad ogni animale di alimentarsi adeguatamente, secondo le esigenze. Nel caso di alimentazione frazionata gli alimenti devono essere uniformemente distribuiti nell'arco delle ore diurne. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Accesso all'alimento ad intervalli non adeguati: indicativamente alimentazione non garantita uniformemente nelle ore diurne e/o distribuita con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali					no; NO
Accesso all'alimento ad intervalli adeguati: indicativamente alimentazione garantita uniformemente nelle ore diurne e distribuita correttamente con intervalli adeguati alle necessità fisiologiche degli animali					SI
48) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*)Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica dell'animale, soprattutto nella fase di passaggio da pollastra ad ovodeposizione, in cui ad esempio il fabbisogno di calcio aumenta di 4-5 volte. In generale, si ritiene importante la presenza di un alimentarista professionista e di specifici addetti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti.

Il programma alimentare della gallina ovaiole in deposizione è suddiviso in 3 fasi principali:

- 1) dall'inizio dell'ovodeposizione fino al picco di deposizione (36° settimana di vita): in questa fase il consumo di mangime è circa 90-100 grammi/giorno.
- 2) dalla 36° alla 52° settimana: corrisponde al declino della curva di ovo deposizione, in cui il peso dell'uovo aumenta, insieme al fabbisogno di calcio della gallina.

3) dalla 52° settimana a fine ciclo: si osserva un ulteriore incremento del peso dell'uovo, ma più modesto rispetto alla fase precedente.

Le formulazioni del mangime per le fasi 2 e 3 rispondono al minore fabbisogno di nutrienti e alla maggiore richiesta di calcio necessaria, man mano che l'età delle galline aumenta.

Nell'allevamento della gallina ovaioia gli animali vengono alimentati per l'intero ciclo produttivo con mangimi in forma sfarinata, distribuiti in maniera automatizzata e in quantità controllata, almeno due volte al giorno (Ceriolini et al., Avicoltura e Coniglicoltura, 2008). Il valutatore verifica, attraverso l'osservazione del cartellino del mangime e le guide fornite dalle case genetiche, che il mangime sia adatto all'età e alla settimana di deposizione degli animali, sia per quantità somministrata che per composizione.

È importante verificare che le particelle di mangime siano uniformi e omogenee, in quanto un'eccessiva presenza di particelle fini comporta un calo dell'ingestione di cibo e dell'assorbimento di nutrienti, mentre se ci sono troppe particelle grosse l'assunzione di mangime sarà selettiva e l'apporto di nutrienti squilibrato. In tabella si può vedere il profilo ottimale delle particelle di mangime per galline ovaiole in produzione. Il valutatore analizza quindi la granulosità del mangime, meglio se utilizzando un setacciatore portatile per quantificare la distribuzione delle diverse dimensioni delle particelle.

La quantità di alimento somministrato giornalmente varia a seconda della composizione del mangime, della temperatura ambientale (infatti nel periodo estivo è consigliabile suddividere la dose di alimento in più somministrazioni giornaliere, possibilmente nelle ore meno calde), della tecnica di allevamento e della percentuale di deposizione.

Infine, la corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti (es. trincee, silos, magazzini e fienili) idonei per evitare alterazioni e contaminazione con sostanze tossico-nocive.

Per verificare la corretta conservazione del mangime, il valutatore osserva lo stato e la pulizia dei silos.

Per poter garantire una corretta tracciabilità dei mangimi, è una buona prassi quella di lasciare il cartellino del mangime attaccato al silos che lo contiene, in modo da essere facilmente identificabile.

Il valutatore deve quindi verificare la qualità e la salubrità degli alimenti che vengono somministrati agli animali, tramite l'osservazione dei cartellini posti sui silos e la valutazione dell'idoneità degli ambienti deputati alla conservazione dei mangimi, per poi verificare l'adeguatezza della razione somministrata ai fabbisogni dell'animale in quello specifico periodo di deposizione, sia per composizione che per quantità e intervalli di somministrazione, tenendo in considerazione il sistema

di allevamento; come ausilio si consiglia al valutatore di farsi dare il piano di razionamento utilizzato in azienda.

Oltre a questo si consiglia, per effettuare una valutazione più completa e accurata, di ispezionare visivamente l'alimento contenuto all'interno delle mangiatoie, per verificarne sia la granulometria che l'eventuale presenza di mangime vecchio o contaminato.



Figura 3 - Setacciatore portatile

Dimensione particelle	Composizione di un mangime per galline in produzione
<1 mm	< 15%
1-2mm	20-30%
2-3- mm	30- 40%
<3 mm	10-15%

Tabella 1 - Profilo ottimale delle particelle di mangime per galline in produzione (da Guida di gestione Hyline-Brown, modificata)

48. Qualità dell'acqua

“15. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata (..)”(D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16).

Elemento di verifica 48**QUALITA' DELL'ACQUA**

(Categoria di non conformità: alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16

“15. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriate quantità di acqua, di qualità adeguata (...)”

In campo zootecnico non esistono norme specifiche relative alle caratteristiche qualitative delle acque destinate all'abbeverata degli animali, ma è buona pratica accertarsi che l'acqua per abbeverata sia di buona qualità e pulita.

È necessario valutare l'approvvigionamento dell'acqua:

- acqua di acquedotto: si può considerare di qualità adeguata. Verificare l'effettivo consumo dai contatori e/o dalle bollette per assicurarsi che si tratti effettivamente solo di acqua di acquedotto e non sia mescolata con acqua di diverse provenienze
- acqua di pozzo o acque di superficie (es. lago): è necessario condurre verifiche su eventuali trattamenti (clorazione, filtrazione, depurazione) ed eventualmente sulla qualità di tipo microbiologico e chimico (si consiglia una frequenza almeno biennale, salvo eventuali problemi particolari)

Per valutare la rispondenza al requisito, il Veterinario Ufficiale può considerare:

- la tipologia di approvvigionamento
- gli eventuali trattamenti dell'acqua e la loro tipologia
- le caratteristiche chimiche e microbiologiche valutate mediante analisi periodiche
- l'ispezione visiva dell'acqua che fuoriesce dagli abbeveratoi;
- Si considera ottimale la presenza di un controllo annuo sia chimico che microbiologico e la presenza e la completezza di una POS relativa alla gestione della qualità delle acque.

Si valuti la qualità dell'acqua di abbeverata. Per la valutazione della quantità di acqua disponibile, si rimanda all'item "Disponibilità di abbeveratoi".

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Acqua di pozzo o di superficie non sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici	no; NO
Acqua di pozzo o di superficie sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici	SI
Acqua di acquedotto oppure acqua di pozzo o di superficie sottoposta ad almeno un controllo microbiologico e chimico annuo e presenza di una procedura operativa relativa alla gestione dei trattamenti e degli esami	Ottimale

49) L'acqua di abbeverata è di buona qualità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

In campo zootecnico non esistono norme specifiche relative alle caratteristiche qualitative delle acque destinate all'abbeverata degli animali, ma è buona pratica accertarsi che l'acqua per abbeverata sia di buona qualità e pulita. La normativa nazionale che disciplina la qualità delle acque destinate ad uso umano è invece il D. L. vo 2 febbraio 2001, n. 31; in esso vengono considerati parametri:

- microbiologici (E. coli, enterococchi);
- chimici (nitrati, nitriti, metalli pesanti, arsenico, cromo, rame, piombo, mercurio, ecc.);
- “indicatori” (colore, odore, sapore, torbidità, durezza, presenza di alluminio, ammonio, cloruro, ferro, manganese, solfato, sodio, batteri coliformi a 37°C, ecc.).

L'acqua destinata all'abbeverata deve comunque essere di buona qualità, perché acque non idonee possono comportare problemi sanitari, riduzione delle prestazioni produttive, alterazione della qualità dei prodotti e danni alle attrezzature; sarebbe quindi auspicabile che l'allevatore effettuasse, con cadenza regolare (una o due volte all'anno), un controllo analitico sulle caratteristiche dell'acqua (microbiologico in particolare). Per valutare la rispondenza al requisito A.13, il valutatore può considerare:

- gli esiti delle analisi dell'acqua precedenti alla data dell'ispezione;
- l'ispezione visiva dell'acqua che fuoriesce dagli abbeveratoi;
- la presenza e la completezza di una POS relativa alla gestione della qualità delle acque.

49. Disponibilità di mangiatoie

“17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.” (D. L.gs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17)

GABBIE MODIFICATE - "Le galline ovaiole dispongono di mangiatoia utilizzabile senza limitazioni con lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia" (D. Lgs. 267/2003 All. D punto 1, b)

SISTEMI ALTERNATIVI - "Gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano: di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatile".(D. Lgs. 267/2003 All.B, punto 1 a)

"Le galline ovaiole dispongono di mangiatoia utilizzabile senza limitazioni con lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia" (Decreto del Ministero della Salute 20/04/2006, allegato I, punto 1.a.1).

"Gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano: di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatile" (Decreto del Ministero della Salute 20/04/2006, allegato III, punto 1.b).

Elemento di verifica 49

DISPONIBILITÀ DI MANGIATOIE

(Categoria di non conformità: alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

"17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

"Le galline ovaiole dispongono di mangiatoia utilizzabile senza limitazioni con lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia." (Decreto del Ministero della Salute 20/04/200 allegato I, punto 1.a.1).

"Gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano: di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatile." (Decreto del Ministero della Salute 20/04/2006, allegato III, punto 1.b).

D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1, b)

GABBIE MODIFICATE - "Le galline ovaiole dispongono di mangiatoia utilizzabile senza limitazioni con lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia"

D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 1, a).1)

SISTEMI ALTERNATIVI - "Gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano: di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatile"

Verificare se lo spazio disponibile in mangiatoia per ciascun animale è conforme o meno alla normativa vigente					
Le mangiatoie non sono strutturate in maniera adeguata					no; NO
Le mangiatoie sono strutturate in maniera adeguata					SI
50) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione delle galline ovaiole devono essere adeguatamente dimensionate e costruite con materiali idonei, al fine di garantire un facile accesso degli animali, la possibilità di ingerire l'alimento necessario ai propri fabbisogni ed evitare fenomeni di competizione. Il Decreto Legislativo 267/2003 fornisce la superficie necessaria per ciascuna ovaia, specificatamente per le gabbie modificate e i sistemi alternativi (tabella 4). Per assegnare un giudizio accettabile, il valutatore dovrà accertarsi che tali parametri siano rispettati.

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA DI MANGIATOIA	SPAZIO NECESSARIO
Gabbie modificate	Lineari	Almeno 12 cm / capo
Sistemi alternativi	Lineari	Almeno 10 cm / capo
	Circolari	Almeno 4 cm /capo

Tabella 4 Spazio in mangiatoia necessario per ciascuna ovaia

50. Disponibilità di abbeveratoi

"Gli abbeveratoi sono strutturati per evitare la competizione e ridurre al minimo la contaminazione dell'acqua" (D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17)

"Le galline ovaiole dispongono di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in

particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tetterelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiole" (D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1, b)

"Abbeveratoi continui che offrono 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari che offrono 1 cm di lunghezza per ovaiole, in caso di utilizzazione di abbeveratoio a tetterella o a coppetta è prevista almeno una tetterella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tetterelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole" (D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 1, a). 2)).

Elemento di verifica 50

DISPONIBILITÀ DI ABBEVERATOI

(Categoria di non conformità: alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

"Gli abbeveratoi sono strutturati per evitare la competizione e ridurre al minimo la contaminazione dell'acqua."

"Le galline ovaiole dispongono di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tetterelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiole." (Decreto del Ministero della Salute 20/04/2006 allegato I, punto 1.a.2)

"Abbeveratoi continui che offrono 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari che offrono 1 cm di lunghezza per ovaiole, in caso di utilizzazione di abbeveratoio a tetterella o a coppetta è prevista almeno una tetterella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tetterelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole." (DM 20/04/2006, allegato III, punto 1.c)

D. Lgs. 267/2003 All. D, punto 1, c)

GABBIE MODIFICATE - "Le galline ovaiole dispongono di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tetterelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiole"

D. Lgs. 267/2003 All. B, punto 1, a). 2)

SISTEMI ALTERNATIVI - "Abbeveratoi continui che offrono 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari che offrono 1 cm di lunghezza per ovaiole, in caso di utilizzazione di abbeveratoio a tetterella o a coppetta è prevista almeno una tetterella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tetterelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole"

Verificare se lo spazio disponibile di abbeverata per ciascun animale è conforme o meno alla normativa vigente.

Gli abbeveratoi non sono strutturati in maniera adeguata	no; NO
Gli abbeveratoi sono strutturati in maniera adeguata	SI
50) Tutti gli animali hanno accesso all'acqua con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali	

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

Come per le mangiatoie, anche gli abbeveratoi devono essere strutturati in modo da permettere un accesso uniforme degli animali all'acqua e ridurre la competizione.

L'acqua deve essere sempre a disposizione per tutti gli animali presenti in allevamento e gli abbeveratoi devono essere concepiti per facilitare al massimo l'abbeveramento degli animali. L'assenza di acqua può essere imputabile a problemi di malfunzionamento degli abbeveratoi che, pertanto, devono essere tutti controllati, tenendo presente il corretto flusso di riempimento in funzione della tipologia di abbeveratoio utilizzata. L'assenza di acqua può anche verificarsi per problemi al sistema di distribuzione.

Il consumo di acqua varia in relazione alla temperatura ambientale e al consumo di mangime: a temperature comprese tra 20°C e 25°C il rapporto tra consumo di acqua e di mangime è 2:1, mentre con temperature superiori a 25°C la quantità di acqua consumata è il triplo rispetto al mangime e può arrivare fino a 5:1 a temperature superiori ai 30°C.

La somministrazione dell'acqua può avvenire con abbeveratoi automatici basati su sistemi diversi:

- **abbeveratoi continui:** ormai in disuso, costituiti da una canaletta in cui il livello dell'acqua è mantenuto costante grazie ad un galleggiante;
- **abbeveratoi a valvola a pressione, con o senza tazza:** detti anche *nipples*, sono utilizzati provvisti di tazza nell'allevamento a terra, in quanto la presenza della tazza limita gli sprechi e la caduta di acqua sulla lettiera;
- **abbeveratoi circolari.**

Le attrezzature per la somministrazione dell'acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo la rivalità tra gli animali e consentire a tutti i soggetti, di bere secondo le loro necessità.

L'assenza di acqua può essere imputabile a problemi di malfunzionamento degli abbeveratoi (ad es. abbeveratoi otturati) o di scorretto posizionamento (abbeveratoi posizionati troppo in alto) tale per cui le galline non riescono ad accedervi, oppure a problemi al sistema di distribuzione.

Il valutatore dovrà verificare che i parametri stabiliti dalla normativa siano soddisfatti (tabella 5); è consigliabile effettuare un'ispezione attenta degli abbeveratoi per verificare il loro corretto funzionamento.

Gabbie modificate	Almeno due tettarelle o coppette devono essere raggiunte da ciascuna gallina	
Sistemi alternativi	TIPOLOGIA DI ABBEVERATOIO	SPAZIO NECESSARIO
	Continui	Almeno 2,5 cm / capo
	Circolari	Almeno 1 cm /capo
	Tettarelle / coppette*	Almeno 1 / 10 capi

Tabella 5 Abbeveratoi necessari per ciascuna ovaioia

* Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaioia.

Il valutatore potrà utilizzare, come ausilio per verificare l'adeguatezza degli abbeveratoi, le indicazioni seguenti:

- Abbeveratoi continui: misurare il perimetro utilizzabile di un abbeveratoio e moltiplicarlo per il numero di abbeveratoi presenti in azienda, dividendo infine il risultato per il numero di animali accasati.
- Abbeveratoi circolari: calcolare la circonferenza di un abbeveratoio ($C = \text{raggio} \times 2 \times \pi$), moltiplicarla per il numero di abbeveratoi presenti e dividere il risultato per il numero di animali accasati.
- Tettarelle/coppette: nelle gabbie modificate o sistemi alternativi - voliera, contare il numero di abbeveratoi presenti in una gabbia/modulo e moltiplicarli per il numero di gabbie/moduli presenti nel capannone, dividendo poi il risultato per il numero di animali accasati; nei sistemi alternativi a terra misurare la distanza tra una coppetta e l'altra e dividere la lunghezza del capannone (in cm) per tale numero, ottenendo così il numero di abbeveratoi presenti in una linea. Moltiplicare quindi tale risultato per il numero di linee presenti nel capannone e dividerlo poi per il numero di animali accasati.

Nei capannoni che possiedono abbeveratoi a tettarella/coppetta è importante comunque considerare, oltre al numero, anche il fatto che ogni animale deve poter accedere ad almeno 2 coppette o tettarelle.

Si consiglia, prima di effettuare la valutazione in allevamento, di fare questi calcoli sulle planimetrie fornite dall'azienda, in modo da poter poi verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.

51. Somministrazione di sostanze illecite

“18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere”. (D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18).

Elemento di verifica 51					
SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ILLECITE					
(Categoria di non conformità: alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)D. Lgs. 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 18					
“18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere”. Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci.					
Somministrazione di sostanze non consentite					no; NO
Sostanze non consentite non somministrate					SI
52) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

La somministrazione di sostanze farmacologicamente attive vietate (sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste), potenzialmente pericolose sia per la salute degli animali che dell'uomo, potrebbe configurare un trattamento illecito praticato sugli animali (D. L. vo 158/2006, art. 1, par. 3, lett. g).

IX MUTILAZIONI

52. Mutilazioni

È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili se non a fini terapeutici certificati. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda"

(D. Lgs. 267/2003 All. A Punto 8)

"Fatte salve le disposizioni di cui al numero 19 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, è vietato qualsiasi tipo di mutilazione. Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, è consentito il taglio del becco, a condizione che sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a dieci giorni destinati alla deposizione di uova sotto la responsabilità del veterinario" (D. Lgs. 146/2001 All. Mutilazioni Punto 19)

Elemento di verifica 52

MUTILAZIONI

(Categoria di non conformità: mutilazioni) D. Lgs. 146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

D. Lgs. 146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili se non a fini terapeutici certificati. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda"

D. Lgs. 267/2003 All. A Punto 8

"Fatte salve le disposizioni di cui al numero 19 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, è vietato qualsiasi tipo di mutilazione. Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, è consentito il taglio del becco, a condizione che sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a dieci giorni destinati alla deposizione di uova sotto la responsabilità del veterinario"

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso.

Verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. taglio del becco).

Se queste sono eseguite e sono riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico. Tutti i trattamenti, che prevedono

operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria.

Se sono presenti animali con il becco che è stato tagliato in una azienda diversa da quella sottoposta ad ispezione, il requisito si considera applicabile solo per la presenza/assenza di mutilazioni consentite/vietate.

Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione su tutti gli animali.

Presenza di animali con mutilazioni vietate o mutilazioni consentite che non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa					no; NO
Presenza di animali con mutilazioni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa					SI
Tutti gli animali sono integri e non presentano mutilazioni					Ottimale
53) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*)Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

“Il taglio del becco è una pratica che andrebbe progressivamente eliminata, ma solo qualora la sofferenza causata da fenomeni di cannibalismo non sia superiore di quella provocata dall'operazione.” (EFSA, 2005).

Nell'allegato 1 punto 19 del D. L. vo 146/2001 si sottolinea il divieto del taglio delle ali, se non a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati; pertanto, il riscontro di galline ovaiole con tali mutilazioni in assenza di documentazione redatta dal medico veterinario dell'allevamento che, sotto la propria responsabilità, giustifichi tale misura, deve essere valutato negativamente. Stessa valutazione può essere assegnata qualora la documentazione sia giudicata non idonea o non sufficiente a motivare il riscontro di ali tagliate. Il taglio del becco è vietato, se non effettuato nei primi giorni di vita da personale qualificato e solo con l'utilizzo di apparecchiature che riducano al minimo la sofferenza degli animali. Sebbene sia da considerarsi preferibile l'assenza di qualsiasi forma di mutilazione eseguita sugli animali, talvolta esse possono rendersi necessarie anche al fine di tutelare le ovaiole stesse: interventi quali la troncatura del becco infatti possono ridurre l'incidenza di fenomeni di plumofagia e cannibalismo e sono perciò da considerarsi accettabili. Le metodiche attualmente più utilizzate sono: i) a lama calda; ii) a raggi infrarossi, molto utilizzato nelle filiere; iii) laser.

Per un taglio del becco corretto è importante seguire i seguenti accorgimenti (Guida di Gestione Hy-Line Brown, 2016)

- Non tagliare il becco ai pulcini ammalati;
- Non avere fretta;
- somministrare vitamine ed elettroliti con vitamina K nell'acqua da bere 2 giorni prima e 2 giorni dopo il taglio;
- controllare i pulcini con il becco tagliato e aumentare la temperatura per favorire il pieno recupero dei pulcini trattati;
- maneggiare i pulcini con cura;
- aumentare la quantità di mangime fornito nei giorni seguenti al taglio;
- utilizzare abbeveratoi a goccia con attivazione a 360°.

X PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

53. Disposizioni generali

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

146/2001 Art. 2 Comma 1

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

- a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;*
- b) allevare e custodire gli animali [omissis] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.*

146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20

“Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali”.

N. prot. DGSAF 0023052-03/12/2013

Elemento di verifica 53

DISPOSIZIONI GENERALI

(Categoria di non conformità: procedure d'allevamento)

146/2001 ART. 2 Comma, 146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20

146/2001 Art. 2 Comma 1

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali [omissis] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali".

N. prot. DGSAF 0023052-03/12/2013

"Muta forzata: muta indotta attraverso la totale sospensione di alimento (mangime/acqua) e/o mancata applicazione dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale. Tale pratica è vietata. Muta non forzata: indotta senza ricorrere alla sospensione totale di alimento e nel rispetto dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale."

La muta non forzata se applicata deve essere conforme alle disposizioni contenute nelle check list come da nota ministeriale N. prot. DGSAF 23052 del 03/12/2013 e 14833 del 19/06/2017

Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali, in particolare se viene praticata la muta forzata o non forzata e in quest'ultimo caso se è stata inviata comunicazione al Servizio Veterinario.

N. prot. DGSAF 0023052-03/12/2013

Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali	NO
Si considera adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali	SI

54) Non sono praticati procedimenti di allevamento, inclusa la muta forzata, che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni.

Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità. In caso di muta non forzata citare, se presente, gli estremi della comunicazione al servizio veterinario. In caso di muta forzata o non forzata in assenza di comunicazione, descrivere le evidenze sugli animali e sulle produzioni che hanno portato a confermare la non conformità (es. mortalità, diminuzione del consumo di mangime o di acqua, diminuzione o sospensione della deposizione)

XI ABMs

Il seguente parametro rappresenta un utile indicatore per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati.

54. Mortalità settimanale media

Elemento di verifica 54			
MORTALITA' SETTIMANALE MEDIA			
La mortalità settimanale media si ottiene sommando le mortalità settimanali diviso il numero di settimane dall'accasamento. La mortalità settimanale è definita come il numero di morti (inclusi i soppressi) registrati nell'arco di una settimana, diviso il numero di animali presenti il settimo giorno precedente, espresso in percentuale. È equivalente ricorrere al dato di mortalità cumulativa più recente da dividere per il numero delle settimane intercorse dall'accasamento. Il dato è attendibile se valutato su un ciclo di produzione che abbia superato almeno la 45° settimana dall'accasamento delle pollastre, diversamente prendere in considerazione anche il dato di mortalità settimanale media del ciclo precedente.			
Mortalità settimanale media superiore a 0,20%			Insufficiente
Mortalità settimanale media compresa tra 0,10 % e 0,20%			Adeguate
Mortalità settimanale media inferiore a 0,10%			Ottimale
54. Mortalità settimanale media delle galline ovaiole			
Insufficiente	Adeguate	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare la mortalità osservata e le possibili cause di mortalità elevata			

La mortalità è un parametro ABM indiretto in grado di valutare l'efficacia delle pratiche gestionali e delle prassi igienico-sanitarie attuate in allevamento. Gli animali morti in allevamento sono, infatti, la conseguenza estrema di pessime condizioni di benessere animale, di gravi problemi sanitari e di errori nella loro gestione.

Il tasso di mortalità, espresso in percentuale e inteso come il numero di animali morti in un dato periodo rapportato al numero degli animali presenti a inizio di quel periodo, rappresenta così il principale indicatore (detto anche iceberg indicator) di benessere animale.

L'OIE riconosce che qualunque inaspettato incremento di mortalità potrebbe riflettere un problema di benessere animale (OIE Terrestrial Animal Health Code 2021 VOLUME I CHAPTER 7.10) e gli allevatori vengono allarmati da improvvisi picchi di mortalità giornaliera, in base al quale sono sollecitati a richiedere l'intervento del veterinario libero professionista.

Non è semplice fissare dei valori soglia di accettabilità (mortalità standard/fisiologica) in un allevamento di galline ovaiole in quanto le variabili sono molte, dalla genetica ai diversi sistemi di allevamento (soprattutto con accesso all'esterno) e l'integrità del becco.

Numerosi studi hanno evidenziato che l'adozione dei sistemi di allevamento alternativi è stata accompagnata, inizialmente, da un incremento della mortalità in allevamento, che si è progressivamente ridotta negli anni con l'affinamento e l'aggiornamento delle tecniche di allevamento. Schuck Paim e colleghi (2021) hanno svolto un'ampia metanalisi sulla mortalità delle galline ovaiole nei diversi sistemi di allevamento evidenziando che la mortalità si riduce di pari passo con l'incremento dell'esperienza acquisita nella gestione dello specifico tipo di allevamento.

A ciò si aggiunge che il dato di mortalità ha molta variabilità in relazione alla fase e alla settimana del ciclo di allevamento, e per questo deve essere valutata su un arco temporale di più settimane.

Pertanto, ai fini della valutazione del benessere delle galline ovaiole, deve essere presa in considerazione la media delle mortalità settimanali precedenti il giorno dell'ispezione, a partire dai registri di mortalità aziendale.

Il dato può essere ottenuto dalle mortalità calcolate per ogni settimana di allevamento, appurato che si riferiscano al numero di animali morti (trovati morti e soppressi per motivi sanitari o di benessere) registrati nell'arco di una settimana, diviso il numero di animali presenti il settimo giorno precedente. In alternativa, ha lo stesso significato ricorrere al dato di mortalità cumulativa più aggiornato, da dividere per il numero delle settimane intercorse dall'accasamento.

Vista la notevole variabilità dovuta alla fase del ciclo, si considera attendibile il dato di mortalità se valutato su un ciclo di produzione che abbia superato almeno la 45° settimana dall'accasamento. Diversamente, se l'ispezione è condotta prima della settimana 45 del ciclo di produzione corrente, è necessario prendere in considerazione anche il dato di mortalità settimanale media del ciclo precedente.

Se la mortalità così calcolata è superiore a 0,20%, il giudizio è peggiorativo; se inferiore a 0,10%, il giudizio è ottimale.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE SULLA BASE DEL RISCHIO IN CLASSYFARM: ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE NELLE OVAIOLE

Il documento “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella Valutazione del rischio per il benessere animale nella categoria ovaiole” potrà essere utilizzato per le diverse necessità operative e riporterà i seguenti risultati:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario;
- i punti critici riscontrati, (criterio con valutazione non conforme - insufficiente);
- il livello generale di rischio dell'allevamento espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “non-conformi – insufficienti”, “conformi – accettabili” e “conformi – ottimali (requisito superiore)” siglate dal valutatore;
- il livello di rischio relativo ad ogni area che sarà espresso in relazione al rapporto fra osservazioni non conformi, conformi, conformi al livello ottimale per il controllo ufficiale e “insufficienti, “adeguate” e “ottimali” per le ABMs, rilevate dal valutatore nell'ambito di ogni area (management, strutture, grandi rischi e ABMs);

I dati, la forma e la grafica del documento “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella Valutazione del rischio per il benessere animale nella categoria ovaiole” saranno definiti di concerto con il Ministero della Salute e le Regioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001;
2. Decreto Legislativo n. 267 del 29 luglio 2003, “Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2003;
3. Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006, “Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.
4. Decreto Legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 127.
5. Decreto Legislativo n. 134 del 5 agosto 2022, “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.”
6. Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022, “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.”
7. Decreto del Ministero della Salute del 20 aprile 2006, “Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;
8. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. L 125 del 23 maggio 1996.
9. Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N.0014835 del 19/06/2017, “Allevamento galline ovaiole - procedure operative per la vigilanza sull'attuazione della muta effettuata in conformità alle norme vigenti in materia di benessere animale in allevamento (d.lgs. 267/03 – d.lgs. 146/01) – modifica parametri “mortalità” e “perdita di peso”;

10. Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. N. 0023052 del 03 dicembre 2013, “Allevamento galline ovaiole – procedure operative per la vigilanza sull’attuazione della muta effettuata in conformità alle norme vigenti in materia di benessere animale in allevamento (d.lgs. 267/03 – d.lgs. 146/01);
11. Ordinanza del Ministero della Salute del 3 dicembre 2010, “Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010;
12. Regolamento delegato UE n. 2017/2168 del 20 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 306 il 22 novembre 2017.
13. Regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008 del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 163 del 24 giugno 2008.
14. Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 84 del 31 marzo 2016.
15. Regolamento (UE) n.1099/2009 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 303 del 18 novembre 2009.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. Anderson, D.P., Beard, C.W. and Hanson, R.P. (1966). Influences of poultry house dust, ammonia and carbon dioxide on the resistance of chicken to Newcastle disease virus. *Avian Diseases* 10:177-188.
2. Bright, A. and Johnson, E.A. (2011). Smothering in commercial free laying hens: a preliminary investigation. *Veterinary Record* 168: 512-513.
3. Campbell D.L.M., de Haas E.N., Lee C. (2018). A review of environmental enrichment for layinghensduringrearing in relation to their behavioral and physiological development, *Poultry Science*, pey319.
4. Campo, J.L. and Davila, S.G. (2002). Effect of photoperiod on heterophil to lymphocyte

- ratio and tonic immobility duration of chickens, *Poultry Science*, 81: 1637-1639.
5. Ceriolini, Marzoni, Fecia di Cossato, Romboli, Schiavone, Zaniboni (2008). “Avicoltura e Coniglicoltura” 1st ed., Le Point Vétérinaire Italie Srl.
 6. Chen D.H., Bao J., Meng F.Y. and Wei C.B., (2014). Choice of perch characteristics by laying hens in cages with different group size and perching behaviours. *Applied Animal Behaviour Science*, 150, 37–43.
 7. Chloupek, P., Voslarova, E., Chloupek, J., Bedanova, I., Pistekova, V., Vecerek, V. (2009). Stress in broiler chickens due to acute noise exposure. *ACTA VET Brno* 2009, 78:93-98.
 8. Compassion in world farming (CIWF), Higher welfare systems for laying hens – practical options. <https://www.ciwf.com/media/7430353/laying-hen-booklet-final-compressed.pdf>
 9. Council of Europe (2006). Appendix A of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (ETS No. 123). Guidelines for Accommodation and Care of Animals (Article 5 of the Convention).
 10. Cronin Greg M. & Barnett John L. (2008). The importance of nests for the welfare of laying hens.
 11. David, B., Mejdali, C., Michel, V., Lund, V., Moe, R.O. (2015a). Air quality in alternative housing systems may have an impact on laying hen welfare. Part II - ammonia. *Animals*. 5, 886-896
 12. David, B., Moe, R.O. Michel, V., Lund, V., Mejdali, C. (2015b). Air quality in alternative housing systems may have an impact on laying hen welfare. Part I - dust. *Animals* 5, 495 - 511.
 13. European Food Safety Authority (EFSA), (2015). Scientific Opinion on welfare aspects of the use of perches for laying hens.
 14. European Food Safety Authority (EFSA), (2005). The welfare aspects of various systems of keeping laying hens. Annex to The EFSA Journal (2005) 197, 1-23.
 15. Federation of Animal Science Societies (2010). Guide for the care and use of agricultural animals in research and teaching. Champaign (IL): Federation of Animal Science Societies.
 16. FAWC, (1997). Report on the Welfare of Laying Hens. Farm Animal Welfare Council: Tolworth, Surrey.
 17. Güntürkün, O. (2000) Sensory Physiology: Vision. Chapter 1 in Whittow G.C. (ed): *Sturkie's Avian Physiology*, Fifth Edition. Academic Press, San Diego. 557-568.
 18. Hy-line, Guida di gestione di galline ovaiole commerciali Hy-Line Brown, (2016). https://www.hyline.com/userdocs/pages/BRN_COM_ITA.pdf

19. ICFAW, (2017). Recommendations for the on-farm welfare of laying hens submission to the OIE by the international coalition for animal welfare. <http://www.icfaw.org/Documents/Recommendations%20for%20the%20on-farm%20welfare%20of%20laying%20hens.pdf>
20. Lewis, P.D. and Morris, T.R. (1999). Light intensity and performance in domestic pullets. WPS Journal, 55:241-250.
21. Lohmann Tierzucht, ,Guida per l'allevamento di Lohmann Brown-classic galline ovaiole - sistema in gabbia, (2014).<http://alilohmann.com/guida.pdf>
22. Malleau, A.E., Duncan, I.J.H., Widowski, T.W. (2007). The importance of rest in young domestic fowl. Applied Animal Behaviour Science 106: 52-69.
23. Mench Joy A., Rodenburg T.Bas, Sustainability of laying hen housing systems, (2018). Advances in Poultry Welfare, Elsevier Ltd.
24. Merle R., Koesters S., Suerie C., Ovelhey A., Kreienbrock L. (2009). Mortality in Laying Hens – A Comparison Of Different Housing Systems. (1,2)
25. National Research Council. 1984. Nutrient Requirements of Poultry: Eighth Revised Edition, (1984). Washington, DC: The National Academies Press.
26. NRC, Nutrient Requirements of Poultry, 9th Ed.; National Research Council, National Academy Press: Washington, DC, (1994); 15–17.
27. Prescott, N.B. and Wathes, C.M. (2002). Preference and motivation of laying hens to eat under different illuminances and the effect of illuminance on eating behaviour, British Poultry Science, 43: 190-195
28. Prescott, N.B., Jarvis, J.R. and Wathes, C.M. (2004). Vision in the laying hen, In Perry, G.C. (Ed): Welfare of the Laying Hen, CAB International, London, UK pp155-164
29. Regione Piemonte, Buone Pratiche di Veterinaria Preventiva - Campagna informativa della Regione Piemonte per la sicurezza alimentare negli allevamenti: linee guida per gli allevatori.
30. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), (2017). RSPCA Welfare standards for laying hens August 2017. West Sussex, England.
31. <https://www.heatstress.info/heatstressinfo/TemperatureHumidityIndexPoultry/tabid/1233/Default.aspx>
32. Schuck-Paim, C., Negro-Calduch, E. & Alonso, W.J. Laying hen mortality in different indoor housing systems: a meta-analysis of data from commercial farms in 16 countries. Sci Rep 11, 3052 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-81868-3>
33. The Humane Society of the United States, "Understanding Mortality Rates of Laying Hens

- in Cage-Free. Egg Production Systems" (2010). Agribusiness Collection. 3.
https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/acwp_faafp/3
34. Vinco L.J., Giacomelli S., Campana L., Chiari M., Vitale N., Lombardi G., Veldkamp T., Hocking P. (2018). Identification of a practical and reliable method for the evaluation of litter moisture in turkey production. *British Poultry Science*, 59(1):7-12.
35. Welfare Quality®, (2009). Welfare Quality® Assessment protocol for poultry. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
36. Weeks C. A., Nicol C. J. (2006). Behavioural needs, priorities and preferences of laying hens. *World's Poultry. Science Journal*. 62:296–307.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CREMBA