

CLASSYFARM



Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DELLA
BIOSICUREZZA NELLA SPECIE
SUINA: MANUALE ESPLICATIVO
CONTROLLO UFFICIALE
SEMIBRADI AD ELEVATA
CAPACITÀ**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER



Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA NELLA
SPECIE SUINA: MANUALE ESPLICATIVO
CONTROLLO UFFICIALE**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna



BRESCIA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

“Bruno Ubertini”

ANNO 2023

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER

A cura di:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Ministero della Salute

Con il contributo del gruppo di lavoro:

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



SOMMARIO

INTRODUZIONE 1

SEZIONE GENERALE 3

1. L'azienda è dotata di un'area apposita, posta prima della barriera di entrata, per la sosta dei veicoli del personale dell'allevamento e/o visitatori? ● 3
2. Sono presenti e ben visibili all'ingresso cartelli di divieto di accesso per le persone non autorizzate? ●● 4
3. L'azienda dispone di cancelli o sbarre idonee ad evitare l'ingresso diretto e non controllato di automezzi e/o persone? ●● 5
4. L'azienda dispone di una zona filtro, con accesso obbligatorio, per il personale addetto al governo degli animali e dei visitatori? ●● 6
5. Nella zona filtro, esiste una netta separazione tra la zona sporca e la zona pulita? ● 7
6. Il personale/visitatori utilizza vestiario, o tute e calzari monouso, che viene utilizzato esclusivamente in azienda? ●● 8
7. È vietato al personale/visitatori portare in azienda alimenti per uso personale? ●● 9
8. È presente una planimetria, con capannoni e box numerati univocamente, mediante la quale sia possibile verificare il flusso unidirezionale degli spostamenti degli animali nell'azienda e identificare i gruppi di animali? ●● 10
9. I locali e gli edifici degli stabilimenti sono costruiti in modo che nessun altro animale possa entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera? ●● 11
10. I locali in cui sono detenuti i suini e gli edifici in cui sono tenuti mangime e lettiera sono delimitati da una recinzione a prova di bestiame? ●● 12
11. I locali di stabulazione hanno pareti, pavimenti e serramenti a tenuta e in buono stato di manutenzione, senza soluzione di continuità, pulibili e disinfettabili in modo efficace? ●● 13
12. Esiste una prassi di pulizia, lavaggio e disinfezione dei ricoveri, degli ambienti e delle attrezzature dell'azienda e ove necessario, dopo la fine di ogni ciclo produttivo (anche per settori)? ●● 14

13.	L'area tutta intorno ai ricoveri degli animali è mantenuta pulita, coperta da ghiaia o con erba sfalcata, libera da ingombri, oggetti, attrezzature, macchinari, veicoli, ecc. estranei alla funzionalità e gestione dell'allevamento? ●	15
14.	L'allevamento dispone di punti di cambio o disinfezione delle calzature tra i diversi capannoni? ●	16
15.	L'allevamento dispone di punti di disinfezione e lavaggio delle mani tra i diversi capannoni? ●	17
16.	È previsto e documentato un piano di derattizzazione? ●	18
17.	La derattizzazione viene effettuata ad opera di una ditta specializzata esterna?.....	19
18.	È previsto e documentato un piano di disinfestazione? ●●	20
19.	La disinfestazione viene effettuata ad opera di una ditta specializzata esterna?.....	21
20.	Esiste documentazione relativa a corsi di formazione esterna o interna sulla biosicurezza e sui rischi di introduzione di malattie infettive e diffusive degli animali soggette a denuncia? ●●	22
21.	Esiste un piano di profilassi vaccinale documentato? ●	23
22.	Esiste una prassi igienica e sanitaria di gestione delle attrezzature utilizzate per la profilassi vaccinale e i trattamenti terapeutici individuali o di gruppo?.....	24
23.	Sono presenti eventuali risultati delle analisi, ufficiali o effettuate in autocontrollo, su campioni prelevati da animali o da altre matrici che abbiano rilevanza per la salute umana e animale? ●	25
24.	Esiste un sistema di registrazione dei dati aziendali sanitari, di allevamento, di riproduzione e produzione?	26
25.	Il personale addetto al governo degli animali ha contatti con altre aziende suinicole? ●	27
26.	È presente un registro dei visitatori con indicato almeno data, nome e cognome del visitatore, motivo della visita e targa dell'automezzo? ●●	28
27.	È presente una documentazione attestante l'avvenuta disinfezione degli automezzi?	29
28.	L'allevamento dispone di una piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento o, in ogni caso, separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo animali? ●	30

29. Sono presenti apparecchiature fisse a pressione per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione degli automezzi in entrata? ●	31
30. Sono disponibili e utilizzati per la disinfezione dei veicoli prodotti di provata efficacia nei confronti delle malattie vescicolari del suino e PSA? ●●	32
31. Il carico/scarico dei suini vivi avviene all'esterno dell'area di stabulazione e di governo degli animali? ●●	35
32. Esiste una rampa/corridoio di carico/scarico degli animali vivi, fissa o mobile? ●	35
33. Il carico/scarico dei suini vivi avviene con monocarico? ●●	35
34. Il carico degli scarti avviene all'esterno l'area di stabulazione e di governo degli animali? ●●	37
35. Il carico degli scarti avviene con monocarico? ●	37
36. Le carcasse suine morte sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso, conservate in un contenitore coibentato o in una cella frigorifera a tenuta, idonei e funzionanti, posti all'esterno dell'area di governo degli animali, per l'eliminazione delle stesse conformemente alle disposizioni sanitarie? ●	38
37. Il carico dei suini morti avviene all'esterno dell'area di stabulazione e governo degli animali? ●●	39
38. Il contenitore/cella frigorifera dove vengono conservati i morti ha un accesso e un percorso differenziato da quello dell'area di stabulazione e governo degli animali? ●	40
39. L'area sottostante il contenitore/cella frigorifera dei morti, è idonea sia alla raccolta di eventuali materiali o liquidi percolanti sia alla pulizia e disinfezione? ●●	41
40. Qualora le carcasse dei suinetti siano temporaneamente immagazzinate nei locali di allevamento, in attesa del loro allontanamento, i contenitori utilizzati sono adeguatamente sigillati ed idonei alla conservazione? ●	42
41. Lo scarico del mangime avviene in modo da non permetterne il contatto con altri animali? ●●	43
42. I locali, edifici o le aree di stoccaggio dei mangimi e/o delle lettiere, sono coperti da griglie o sigillati per impedire l'ingresso di altri animali, ratti e insetti nocivi? ●●	44

43. Le aree sottostanti i silos dei mangimi consentono una efficace pulizia e il deflusso delle acque di lavaggio?.....	45
44. Sono utilizzati per l'alimentazione degli animali dei prodotti derivati dal latte?	46
45. Se sono utilizzati per l'alimentazione degli animali dei prodotti derivati dal latte è presente il nulla-osta al loro utilizzo ed è garantita la loro tracciabilità? ●	47
46. Il punto di pesa è di esclusivo utilizzo dell'allevamento? ●	48
47. È vietata la somministrazione di rifiuti di ristorazione, mensa o avanzi casalinghi agli animali? ● ●	49
48. Esistono ingressi per le operazioni di trasporto dei liquami differenziati da quelli dell'area di stabulazione e governo degli animali? ●	50
49. I terreni attigui all'azienda sono utilizzati per lo spandimento di liquami provenienti da altre aziende?.....	51
50. Gli animali domestici/da compagnia non possono avere accesso ai locali dove sono stabulati i suini? ●	52
51. Il personale che accudisce e/o può venire a contatto con i suini non pratica attività venatoria o altre attività dove può avere contatto con suidi selvatici nelle 48 ore precedenti l'ingresso in azienda? ● ●	53
52. È presente una autodichiarazione da parte dei lavoratori dipendenti degli allevamenti suini intensivi di non detenzione di suini o cinghiali allevati a carattere rurale? ●	54
53. Divieto di introduzione in allevamento di alimenti a base di carne di suini o cinghiali provenienti dalla filiera rurale ● ●	55
54. Divieto di somministrazione ai suini di alimenti a base di carne di suini o cinghiali provenienti dalla filiera rurale? ● ●	56
SEZIONE QUARANTENA	57
55. La rimonta viene effettuata ad opera di riproduttori esterni?	57
56. L'allevamento dispone di locali separati fisicamente e funzionalmente per la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione? ● ●	58
57. Viene praticato il tutto pieno/tutto vuoto e un idoneo periodo di vuoto sanitario? ●	59

58. Il personale non accudisce altri animali oltre a quelli della quarantena, diversamente è presente una zona filtro specifica per la quarantena? ●●	60
59. I locali di quarantena dispongono di fossa/e separata/e?	61
60. I locali di quarantena dispongono di ingresso/i separato/i? ●●	62
61. Sono disponibili attrezzature destinate esclusivamente alla quarantena? ●●	63
62. Sono disponibili indumenti per il personale o monouso (tute e calzari) destinati esclusivamente alla quarantena? ●●	64
63. È prevista l'esecuzione pianificata di accertamenti diagnostici negli animali in quarantena?	65
64. È richiesta e disponibile alle aziende di provenienza una documentazione che attesti lo stato sanitario degli animali di nuova introduzione?	66
SEZIONE RIPRODUZIONE	67
65. La rimonta dei riproduttori viene effettuata con cadenza superiore ai 3 mesi?	67
66. L'esame ecografico effettuato da operatori esterni?	68
67. Nel caso in cui si pratici la fecondazione artificiale, il materiale seminale proviene da centri di raccolta seme autorizzati?	69
68. Nel caso in cui si pratici la monta naturale i verri sono stati sottoposti agli accertamenti diagnostici previsti per i riproduttori maschi della specie suina?	70
69. I suinetti in sala parto sono destinati a più di due allevamenti?	71
SEZIONE SVEZZAMENTO	72
70. I suini provengono da più di un allevamento?	72
71. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento?	73
72. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per capannone?	75
73. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per stanza? ●●	76
74. I capannoni sono suddivisi in settori da pareti?	77
75. I suini a fine ciclo sono destinati a più di un allevamento?	78
SEZIONE INGRASSO	79
76. I suini provengono da più di un allevamento?	79

77. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento? 80
78. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per capannone?..... 80
79. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per stanza? ●● 80
80. I capannoni sono suddivisi in settori da pareti? 80
81. I suini a fine ciclo sono destinati a solo macelli industriali?..... 81

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER


INTRODUZIONE

A seguito della mutata situazione epidemiologica nazionale per Peste Suina Africana è stato necessario un aggiornamento delle check-list ministeriali per la valutazione della biosicurezza degli allevamenti suinicoli. Il presente manuale ha lo scopo di spiegare in dettaglio tutti i requisiti relativi agli allevamenti semibradi oggetto di valutazione, riportando per ognuno il relativo riferimento normativo.

Le misure previste nel seguente manuale sono suddivise in criteri minimi applicati su tutto il territorio nazionale (marcati in verde ●).

Il principio adottato nella stesura della checklist è stato quello di mantenere una checklist unica e di adattarla in base alla tipologia produttiva e alla capacità degli allevamenti. Le tipologie produttive vengono distinte in allevamenti stabulati e semibradi. In base alla capacità vengono suddivisi in elevata capacità e bassa capacità. Perciò gli allevamenti possono essere suddivisi in allevamenti stabulati ad alta e bassa capacità e allevamenti semibradi ad alta e bassa capacità. La possibilità di detenere animali in numero pari o superiore a 300 capi classifica un allevamento come “ad alta capacità”. Negli allevamenti da riproduzione vengono considerati sia i riproduttori che i suinetti al fine del computo degli animali.

Al fine di uniformare la terminologia adottata nel presente manuale e nelle checklist e di facilitare l'interpretazione dei criteri, viene riportata di seguito una mappa riferita ad un allevamento “ideale”, ossia in possesso di tutti requisiti strutturali previsti.



Qualora un allevamento non disponesse delle caratteristiche strutturali proposte, risultano necessari interventi di tipo gestionale finalizzati a ridurre il rischio di introduzione e diffusione di agenti patogeni. Ulteriori chiarimenti sono descritti nel manuale all'interno del singolo criterio.

Infine, si ritiene fondamentale, comunque, che la valutazione del livello di biosicurezza effettuata sulla base della checklist debba essere fatta sulla base delle caratteristiche di ogni singolo allevamento dal veterinario ufficiale.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER

SEZIONE GENERALE

1. L'azienda è dotata di un'area apposita, posta prima della barriera di entrata, per la sosta dei veicoli del personale dell'allevamento e/o visitatori? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto ii)

Elemento di verifica: L'AZIENDA È DOTATA DI UN'AREA APPOSITA, POSTA PRIMA DELLA BARRIERA DI ENTRATA, PER LA SOSTA DEI VEICOLI DEL PERSONALE DELL'ALLEVAMENTO E/O VISITATORI?		
Minore è il numero di veicoli e automezzi che transitano all'interno dell'allevamento e minore è il rischio di introduzione di patogeni. Per come sono strutturati la maggior parte degli allevamenti suinicoli le attività routinarie come l'approvvigionamento di cibo, il trasporto di animali e lo smaltimento di materiale biologico di scarto, rendono necessario l'ingresso in azienda di <u>automezzi</u> specifici per tali attività, la cui pulizia e disinfezione verrà approfondita in seguito. I veicoli del personale dell'azienda e dei visitatori non devono imprescindibilmente entrare in allevamento, e, poiché anch'essi risultano una potenziale via di ingresso per i patogeni, è necessario restino fuori dall'allevamento. A tal fine, è necessario verificare che sia presente un'area di sosta apposita, debitamente segnalata, localizzata prima della barriera di entrata o in prossimità dell'ingresso. L'area di sosta può essere localizzata all'interno del perimetro dell'azienda, in prossimità dell'ingresso, ma in tal caso i veicoli devono transitare attraverso l'area di disinfezione all'ingresso dell'allevamento stesso.		
<i>L'azienda è dotata di un'area apposita, posta prima della barriera di entrata, per la sosta dei veicoli del personale dell'allevamento e/o visitatori?</i>		
SÌ	NO	N/A

2. Sono presenti e ben visibili all'ingresso cartelli di divieto di accesso per le persone non autorizzate? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. IIII, punto 2 comma e)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto i)

Elemento di verifica:	
SONO PRESENTI E BEN VISIBILI ALL'INGRESSO CARTELLI DI DIVIETO DI ACCESSO PER LE PERSONE NON AUTORIZZATE?	
La presenza all'ingresso dell'allevamento di specifici cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate o della presenza di un limite sanitario, costituisce un importante deterrente per evitare l'accesso di persone o autoveicoli non autorizzati (accidentali o fortuiti). Tali cartelli sono di notevole importanza nel caso in cui la via d'ingresso all'allevamento sia bloccata da sbarre anziché da cancelli o nell'eventualità che questi vengano lasciati erroneamente aperti. Verificare la presenza dei cartelli di divieto di accesso visibili e posizionati correttamente presso tutti i possibili accessi dell'azienda.	
<i>Sono presenti e ben visibili all'ingresso cartelli di divieto di accesso per le persone non autorizzate?</i>	
SÌ	NO

3. L'azienda dispone di cancelli o sbarre idonee ad evitare l'ingresso diretto e non controllato di automezzi e/o persone? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma e)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto i)

Elemento di verifica:	
L'AZIENDA DISPONE DI CANCELLI O SBARRE IDONEE AD EVITARE L'INGRESSO DIRETTO E NON CONTROLLATO DI AUTOMEZZI E/O PERSONE?	
Valutare che tutti gli ingressi (o vie d'accesso) preceduti da strade, asfaltate o meno, da cui entrano il personale, i visitatori e/o gli automezzi, siano provvisti di impedimenti fisici, come cancelli o sbarre. La condizione ideale è rappresentata da cancelli che non permettono l'ingresso di persone o automezzi. La presenza di una sbarra, sebbene facilmente aggirabile dai pedoni, risulta comunque accettabile. Impedimenti meno restrittivi, come ad esempio catene di plastica o metallo, sono considerati insufficienti. È necessario verificare, inoltre, che tali cancelli o sbarre siano costantemente chiusi e aperti solo all'occorrenza.	
<i>L'azienda dispone di cancelli o sbarre idonee ad evitare l'ingresso diretto e non controllato di automezzi e/o persone?</i>	
SÌ	NO

4. L'azienda dispone di una zona filtro, con accesso obbligatorio, per il personale addetto al governo degli animali e dei visitatori? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma b).

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) iv

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) iv)

Elemento di verifica:	
L'AZIENDA DISPONE DI UNA ZONA FILTRO, CON ACCESSO OBBLIGATORIO, PER IL PERSONALE ADDETTO AL GOVERNO DEGLI ANIMALI E DEI VISITATORI?	
Il transito dei dipendenti e dei visitatori dalla zona sporca alla zona pulita dell'allevamento, deve avvenire attraverso il passaggio in una zona filtro. All'interno della zona filtro devono essere indossate calzature dedicate e devono essere indossati guanti dedicati qualora non sia possibile lavarsi le mani. Nella zona filtro dovrebbe esserci un lavandino insieme a idonei detergenti, anche se considerando le realtà più comuni degli allevamenti semibradi, la presenza del lavandino non è molto frequente. In ogni caso, anche negli allevamenti semibradi, prima dell'ingresso nel recinto dove sono presenti gli animali, deve esserci un passaggio obbligato in un locale o area dove sono fornite calzature e guanti dedicati, suddivisa in una zona sporca (dove si lasciano le calzature) e una zona pulita (dove si indossano quelle dedicate). Qualora siano presenti più recinti indipendenti, l'area filtro deve essere presente prima dell'accesso ad ogni recinto al fine di prevenire il più possibile il contatto indiretto con animali distanti. Verificare che in prossimità dell'accesso di ogni recinto dove sono detenuti suini sia presente un locale o un'area filtro con calzature dedicate.	
<i>L'azienda dispone di una zona filtro, con accesso obbligatorio, per il personale addetto al governo degli animali e dei visitatori?</i>	
SÌ	NO

5. Nella zona filtro, esiste una netta separazione tra la zona sporca e la zona pulita? ●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) i

Elemento di verifica: NELLA ZONA FILTRO, ESISTE UNA NETTA SEPARAZIONE TRA LA ZONA SPORCA E LA ZONA PULITA?	
All'interno della zona filtro deve essere chiaramente distinguibile la delimitazione tra la zona sporca e la zona pulita. La zona sporca è posta subito dopo l'entrata e raccoglie indumenti e calzature di personale e/o visitatori provenienti dall'area sporca dell'allevamento. Nella zona pulita, invece, vengono forniti indumenti e calzature specifici per l'azienda che possono essere monouso o puliti e dedicati per tale funzione. Nelle condizioni ottimali, la delimitazione è costituita dalla presenza di una doccia. Alternativamente alla doccia, come delimitazione si può utilizzare una panca. In questo caso vestiti e calzature sporchi vengono lasciati nell'area sporca, si passa dall'altro lato della panca e ci si veste con gli indumenti e calzature specifici per l'allevamento. In assenza di divisione netta tra le due zone, valutare se l'entrata è differente dall'uscita, se la logistica delle zone di disinfezione (lavandini, detergenti, stivali, calzari ecc.) è organizzata in modo da evitare che ci sia calpestio in comune una volta effettuato il cambio calzature. Qualora nessuno degli elementi riportati sia soddisfatto, il criterio è valutato negativamente.	
<i>Nella zona filtro, esiste una netta separazione tra la zona sporca e la zona pulita?</i>	
SÌ	NO

6. Il personale/visitatori utilizza vestiario, o tute e calzari monouso, che viene utilizzato esclusivamente in azienda?

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma b)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto iv)

Elemento di verifica:	
IL PERSONALE/VISITATORI UTILIZZA VESTIARIO, O TUTE E CALZARI MONOUSO, CHE VIENE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA?	
Verificare che vengano fornite ai visitatori delle calzature dedicate all'allevamento o monouso (calzari), e che venga fatto all'ingresso dell'allevamento poiché anche l'accesso in zona sporca deve essere consentito solo con calzature adatte o monouso (calzari). Successivamente, valutare che vengano forniti indumenti dedicati o monouso nella zona pulita della zona filtro. Possono verificarsi situazioni intermedie a seconda della struttura e logistica dell'allevamento, la priorità è sempre quella di evitare che i visitatori possano veicolare patogeni all'interno dell'allevamento. Anche i dipendenti (compresi i tecnici), al loro ingresso in allevamento devono obbligatoriamente cambiarsi ed utilizzare vestiario pulito e/o dedicato specialmente se visitano più aziende.	
<i>Il personale/visitatori utilizza vestiario, o tute e calzari monouso, che viene utilizzato esclusivamente in azienda?</i>	
SÌ	NO

7. È vietato al personale/visitatori portare in azienda alimenti per uso personale?



Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) iv

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto ii)

Elemento di verifica: È VIETATO AL PERSONALE/VISITATORI PORTARE IN AZIENDA ALIMENTI PER USO PERSONALE?	
Il consumo di prodotti di derivazione animale provenienti da zone in cui sono presenti in maniera endemica malattie ad alta contagiosità (es. afta epizootica, pesti suine), in passato, ha permesso l'introduzione di tali malattie in territori indenni e quindi rappresenta un grave fattore di rischio per l'allevamento e il territorio. Il consumo di alimenti in allevamento è consentito unicamente previa autorizzazione del proprietario o detentore degli animali e deve avvenire in locali che non abbiano un contatto diretto (es. apertura) con i locali di stabulazione degli animali. È inoltre necessario, che sia presente una autocertificazione in cui il dipendente si impegna a non consumare alimenti in aree non consentite e a non somministrare scarti di cucina / ristorazione / rifiuti alimentari agli animali.	
<i>È vietato al personale/visitatori portare in azienda alimenti per uso personale?</i>	
SÌ	NO

8. È presente una planimetria, con capannoni e box numerati univocamente, mediante la quale sia possibile verificare il flusso unidirezionale degli spostamenti degli animali nell'azienda e identificare i gruppi di animali? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) vi

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto viii)

Elemento di verifica:

È PRESENTE UNA PLANIMETRIA, CON CAPANNONI E BOX NUMERATI UNIVOCAMENTE, MEDIANTE LA QUALE SIA POSSIBILE VERIFICARE IL FLUSSO UNIDIREZIONALE DEGLI SPOSTAMENTI DEGLI ANIMALI NELL'AZIENDA E IDENTIFICARE I GRUPPI DI ANIMALI?

Questo criterio risulta maggiormente rilevante in allevamenti in cui sono presenti più categorie produttive, come ad esempio i cicli aperti, i cicli chiusi o siti 2 e 3. In allevamenti costituiti da un'unica unità epidemiologica e/o in cui è presente una sola categoria produttiva (siti 2 o siti 3 puri) e, specialmente qualora venga effettuato il tutto pieno/tutto vuoto, il principio del flusso unidirezionale e dell'identificazione dei gruppi animali è facilmente individuabile e applicabile. In allevamento deve essere disponibile una planimetria che individui le diverse unità epidemiologiche e identifichi i locali per finalità di utilizzo.

È presente una planimetria, con capannoni e box numerati univocamente, mediante la quale sia possibile verificare il flusso unidirezionale degli spostamenti degli animali nell'azienda e identificare i gruppi di animali?

SÌ

NO

9. I locali e gli edifici degli stabilimenti sono costruiti in modo che nessun altro animale possa entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) ii

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) i

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma h)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto v)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto vi)

Elemento di verifica:

I LOCALI E GLI EDIFICI DEGLI STABILIMENTI SONO COSTRUITI IN MODO CHE NESSUN ALTRO ANIMALE POSSA ENTRARE IN CONTATTO CON I SUINI DETENUTI O CON IL LORO MANGIME E MATERIALE DA LETTIERA?

Gli edifici di stoccaggio degli alimenti devono essere progettati in modo corretto e mantenuti costantemente. Inoltre, tali edifici andrebbero ispezionati almeno una volta l'anno per identificare eventuali aperture che potrebbero permettere l'ingresso di altri animali (es. la presenza di porte mancanti o divelte. Per quanto riguarda le aree esterne di stabulazione degli animali, deve essere garantita nei limiti del possibile l'assenza di fattori di rischio specifici che possano fungere da attrattivi per la fauna selvatica (es. fonti d'acqua non completamente recintate, danneggiamenti delle recinzioni di cui al punto 10).

I locali e gli edifici degli stabilimenti sono costruiti in modo che nessun altro animale possa entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera?

SÌ

NO

10. I locali in cui sono detenuti i suini e gli edifici in cui sono tenuti mangime e lettieri sono delimitati da una recinzione a prova di bestiame? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) ii

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma h)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto i)

Elemento di verifica:	
I LOCALI IN CUI SONO DETENUTI I SUINI E GLI EDIFICI IN CUI SONO TENUTI MANGIME E LETTIERE SONO DELIMITATI DA UNA RECINZIONE A PROVA DI BESTIAME?	
È fondamentale prevenire contatti diretti con fonti di infezione esterne, specialmente in relazione agli animali selvatici. Ciò è reso possibile isolando l'area tramite recinzioni classificabili come "a prova di bestiame". La recinzione a prova di bestiame deve garantire la delimitazione dei perimetri o confini e non deve presentare soluzioni di continuo tali da creare delle vie di accesso (in particolare dal basso). Le caratteristiche della recinzione devono impedire il contatto tra i suini e altri animali selvatici. I muri di cinta, in mattoni o in cemento, sono considerati "a prova di bestiame" mentre le reti devono obbligatoriamente avere determinate caratteristiche. Nel caso in cui vengano utilizzate le reti come recinzioni in allevamenti semibradi, queste devono essere doppie, di cui almeno una delle due essere interrata (30 cm circa) e devono avere un'altezza minima di 1,5 metri. La rete interna può essere sostituita da uno o più fili elettrificati posti ad un'altezza adeguata alla categoria degli animali allevati. Al fine di ridurre il rischio di contatto, le due recinzioni devono essere distanziate di 1 m. In caso di aree particolarmente declivi o con differenze di pendenze, l'altezza delle reti dovrebbe essere aumentata, valutando caso per caso. Lo spazio tra le reti deve essere tenuto pulito (es. erba incolta o rovi) per facilitare controlli e scoraggiare cinghiali. Infine le barriere naturali (fossi, fiumi, torrenti, alberi, siepi) e le pareti dei capannoni non possono essere considerate come recinzione.	
<i>I locali in cui sono detenuti i suini e gli edifici in cui sono tenuti mangime e lettieri sono delimitati da una recinzione a prova di bestiame?</i>	
SÌ	NO

11. I locali di stabulazione hanno pareti, pavimenti e serramenti a tenuta e in buono stato di manutenzione, senza soluzione di continuità, pulibili e disinfettabili in modo efficace? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) iii

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) vii

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto v)

Elemento di verifica:

I LOCALI DI STABULAZIONE HANNO PARETI, PAVIMENTI E SERRAMENTI A TENUTA E IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, PULIBILI E DISINFETTABILI IN MODO EFFICACE?

I locali di stabulazione devono essere progettati per poter essere lavati e disinfettati efficacemente al fine di diminuire il più possibile la carica infettante dei patogeni e mantenere un livello igienico sanitario accettabile. Le pavimentazioni dei locali di stabulazione non devono presentare crepe, spaccature o rotture di qualsiasi genere che possano permettere un accumulo di feci o altro materiale biologico rendendo così meno efficace o più difficoltosa la pulizia. Qualora il pavimento sia fessurato per l'accumulo delle deiezioni nei vasconi di smaltimento, valutare la presenza di crepe nelle zone di pavimento pieno. È importante verificare che tutte le parti dei locali siano in buono stato di manutenzione, pulibili e disinfettabili: le pareti, le tubature e condutture, i truogoli, le fonti di abbeveraggio e altri materiali e attrezzatura al fine di diminuire la potenziale contaminazione delle zone precedentemente sottoposte al processo di pulizia e disinfezione.

I locali di stabulazione hanno pareti, pavimenti e serramenti a tenuta e in buono stato di manutenzione, senza soluzione di continuità, pulibili e disinfettabili in modo efficace?

SÌ

NO

12. Esiste una prassi di pulizia, lavaggio e disinfezione dei ricoveri, degli ambienti e delle attrezzature dell'azienda e ove necessario, dopo la fine di ogni ciclo produttivo (anche per settori)? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) iii

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) iii

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto ix)

Elemento di verifica: Esiste una prassi di pulizia, lavaggio e disinfezione dei ricoveri, degli ambienti e delle attrezzature dell'azienda e ove necessario, dopo la fine di ogni ciclo produttivo (anche per settori)?	
Nel caso degli allevamenti semibradi il quesito si traduce in prassi di buona gestione e manutenzione dei terreni dove sono detenuti i suini come ad esempio la rotazione di utilizzo tra cicli e rimozione degli eccessi di sporcizia/deiezioni, e pulizia periodica degli alloggiamenti. Risulta alquanto difficoltoso verificare in maniera diretta la corretta applicazione di tale prassi; al fine di valutare questo criterio, si consiglia di chiedere all'allevatore (o al responsabile) di descrivere come vengono svolte le operazioni di pulizia e disinfezione o di verificare la presenza di una procedura scritta completa che includa i disinfettanti utilizzati (laddove possibile). Infine, per la disinfezione devono essere utilizzati dei prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS/PSA secondo quanto specificato nell'elemento di verifica 30.	
Esiste una prassi di pulizia, lavaggio e disinfezione dei ricoveri, degli ambienti e delle attrezzature dell'azienda e ove necessario, dopo la fine di ogni ciclo produttivo (anche per settori)?	
SÌ	NO

13. L'area tutta intorno ai ricoveri degli animali è mantenuta pulita, coperta da ghiaia o con erba sfalciata, libera da ingombri, oggetti, attrezzature, macchinari, veicoli, ecc. estranei alla funzionalità e gestione dell'allevamento?



Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xi)

Elemento di verifica: L'AREA TUTTA INTORNO AI RICOVERI DEGLI ANIMALI È MANTENUTA PULITA, COPERTA DA GHIAIA O CON ERBA SFALCIATA, LIBERA DA INGOMBRI, OGGETTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI, VEICOLI, ECC. ESTRANEI ALLA FUNZIONALITÀ E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO?		
Le aree attorno ai capannoni devono essere mantenute pulite e ordinate: non devono essere posizionati in prossimità dei locali di stabulazione attrezzature, macchinari o materiali di qualsiasi genere estranei alle funzioni e gestione dell'allevamento, che potrebbero fornire un rifugio ad animali infestanti. Inoltre l'erba deve essere tagliata regolarmente per evitare che i suddetti animali possano passare inosservati. Eventuale attrezzatura funzionale alle strutture deve essere posta ordinatamente in un'area apposita e circoscritta. Verificare che le condizioni delle aree attorno ai locali siano conformi a quanto indicato.		
<i>L'area tutta intorno ai ricoveri degli animali è mantenuta pulita, coperta da ghiaia o con erba sfalciata, libera da ingombri, oggetti, attrezzature, macchinari, veicoli, ecc. estranei alla funzionalità e gestione dell'allevamento?</i>		
SÌ	NO	N/A

14. L'allevamento dispone di punti di cambio o disinfezione delle calzature tra i diversi capannoni? ●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma c)

Elemento di verifica: L'ALLEVAMENTO DISPONE DI PUNTI DI CAMBIO O DISINFEZIONE DELLE CALZATURE TRA I DIVERSI CAPANNONI?	
Al fine di evitare di trasportare agenti patogeni sulle calzature (stivali o calzari) è importante che all'ingresso di ogni capannone ci sia un punto di disinfezione o cambio calzature. In caso di cambio calzature la sostituzione dei calzari o l'utilizzo di stivali precedentemente immersi in una soluzione di disinfettante permette di soddisfare il criterio. Una efficiente stazione di disinfezione è composta da un sistema di lavaggio per le calzature per la rimozione del materiale grossolano (canna dell'acqua o spazzole) e da contenitori di disinfezione (bacinelle con dentro il disinfettante). Questi elementi sono efficaci solo se entrambi presenti e correttamente utilizzati, difatti un semplice lavaggio non risulta sufficiente ad azzerare il rischio biologico (es. patogeni a bassa carica infettante); mentre l'impiego del solo disinfettante senza un'adeguata rimozione di sporco risulta scarsamente efficace. È fondamentale che la soluzione contenuta nei contenitori venga cambiata spesso o almeno quando appare visibilmente sporca affinché il processo di pulizia avvenga correttamente; l'immersione delle calzature in soluzioni molto sporche o con disinfettanti poco concentrati, ha il risultato paradossale di aumentare la carica infettante, avendo così l'effetto opposto. Verificare che siano presenti dei punti di cambio calzature o disinfezione all'ingresso di ogni edificio destinato alla stabulazione degli animali, che esse siano utilizzate e mantenute correttamente. In caso si utilizzino stivali o calzari dedicati ad ogni capannone, si giudica soddisfatto il requisito se vengono costantemente puliti e disinfettati a fine giornata.	
<i>L'allevamento dispone di punti di cambio o disinfezione delle calzature tra i diversi capannoni?</i>	
SÌ	NO

15. L'allevamento dispone di punti di disinfezione e lavaggio delle mani tra i diversi capannoni? ●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma c)

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) i

Elemento di verifica: L'ALLEVAMENTO DISPONE DI PUNTI DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO DELLE MANI TRA I DIVERSI CAPANNONI?	
Contestualmente alla stazione di disinfezione delle calzature, deve essere presente anche una postazione di lavaggio per le mani. Un lavandino o una canna dell'acqua insieme a sapone detergente è considerato sufficiente.	
<i>L'allevamento dispone di punti di disinfezione e lavaggio delle mani tra i diversi capannoni?</i>	
SÌ	NO

16. È previsto e documentato un piano di derattizzazione? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xii)

Elemento di verifica:		
È PREVISTO E DOCUMENTATO UN PIANO DI DERATTIZZAZIONE?		
Le infestazioni da roditori rappresentano un importante pericolo biologico, agendo come vettori sia meccanici che biologici. Perciò, risulta fondamentale la messa in pratica di un valido piano di derattizzazione per mantenere alti gli standard di biosicurezza. Gli edifici tipici dell'allevamento suinicolo sono altamente attrattivi per i roditori, fornendo facile accesso al cibo, numerosi ripari e possibilità di rifugio nei periodi climatici ostili. Le principali specie di roditori che infestano gli allevamenti suinicoli italiani sono il ratto nero (<i>Rattus rattus</i>), il ratto marrone (<i>Rattus norvegicus</i>) e il topo comune (<i>Mus musculus</i>). Sono animali ad altissimo tasso riproduttivo, che utilizzano principalmente olfatto e tatto per spostarsi, ad attività crepuscolare o notturna, perciò l'avvistamento di soggetti durante le ore diurne è sintomo di una verosimile infestazione massiva. L'utilizzo di stazioni di controllo, dotate di trappole od esche, è il metodo di controllo della popolazione più frequente, e ne permette anche il monitoraggio. Durante la rilevazione di questo criterio, innanzitutto è fondamentale accertarsi che sia presente ed applicato un piano di derattizzazione opportunamente documentato con schede tecniche e di sicurezza, piantine di distribuzione delle stazioni di controllo e delle esche, registri di controllo con le date e le attività svolte oppure eventuali contratti con ditte esterne. Verificare, inoltre, la reale presenza di tali stazioni e che esse siano chiuse o coperte per evitare una diminuzione di efficacia. Chiedere e verificare la frequenza dei cambi o aggiunte di esche, per evitare che perdano attrattività per i roditori. In caso di derattizzazione eseguita dal proprietario controllare fatture d'acquisto dei rodenticidi. Infine, si sottolinea come l'utilizzo di altri animali predatori (es. gatti) come mezzo alternativo o coadiuvante il piano di derattizzazione, è considerato come una condizione peggiorativa e quindi insufficiente. Infatti, questi ultimi risultano a loro volta un potenziale vettore di patologie.		
È previsto e documentato un piano di derattizzazione?		
SÌ	NO	N/A

17. La derattizzazione viene effettuata ad opera di una ditta specializzata esterna?

Elemento di verifica: LA DERATTIZZAZIONE VIENE EFFETTUATA AD OPERA DI UNA DITTA SPECIALIZZATA ESTERNA?		
La completa adozione e la corretta applicazione del piano di derattizzazione è un punto fondamentale per raggiungere e mantenere alti livelli di biosicurezza in allevamento. A tal fine, il suddetto piano può essere messo in atto sia dal responsabile dell'allevamento o personale, sia da una ditta specializzata esterna. Un piano di derattizzazione preciso, completo ed efficace deve tenere conto di numerosi fattori. Innanzitutto, deve essere specifico per l'allevamento, in cui le condizioni ambientali sono uniche e differenti dalle altre aziende. Il comportamento e l'etologia dei roditori è un altro fattore da tenere fortemente in considerazione. Infatti, la popolazione di roditori tipica della zona, l'attitudine comportamentale tra le diverse specie e l'identificazione dei percorsi dei roditori, devono guidare la scelta della formulazione del rodenticida, nonché la distribuzione delle stazioni di controllo. Infine, una approfondita analisi del rischio di ingresso che contempli eventuali difetti strutturali degli edifici o ammassamento di materiali in prossimità dei capannoni è un punto chiave per la realizzazione di un piano efficace. Tutti questi elementi, sono sicuramente presi in considerazione nel caso di derattizzazione effettuata da una ditta specializzata, perciò nella valutazione, questo fattore viene considerato come migliorativo.		
<i>La derattizzazione viene effettuata ad opera di una ditta specializzata esterna?</i>		
SÌ	NO	N/A

18. È previsto e documentato un piano di disinfestazione?

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) v

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xii)

Elemento di verifica:	
È PREVISTO E DOCUMENTATO UN PIANO DI DISINFESTAZIONE?	
I maiali possono essere infestati da diverse specie di insetti ed altri artropodi. I più frequenti risultano essere le mosche (<i>Musca domestica</i> e <i>Stomoxys calcitrans</i>), le pulci (<i>Ctenocephalides felis</i> e <i>C. canis</i>) e alcune zecche molli appartenenti al genere <i>Ornithodoros</i>, che può fungere da vettore del virus della peste suina Africana. Accumuli di feci e liquami possono rappresentare l'habitat ideale per la riproduzione e il nutrimento di tali parassiti. Durante la rilevazione di questo criterio, innanzitutto è fondamentale accertarsi che sia presente ed applicato un piano di disinfestazione documentato con piantine di distribuzione delle esche, registri di controllo, eventuali contratti con ditte esterne. È opportuno verificare la frequenza dei cambi o aggiunte di esche, per evitare che perdano efficacia. In caso di disinfestazione eseguita dal proprietario controllare fatture d'acquisto.	
È previsto e documentato un piano di disinfestazione?	
SÌ	NO

19. La disinfestazione viene effettuata ad opera di una ditta specializzata esterna?

Elemento di verifica: LA DISINFESTAZIONE VIENE EFFETTUATA AD OPERA DI UNA DITTA SPECIALIZZATA ESTERNA?		
Il ricorso ad una ditta specializzata per la messa a punto e l'applicazione di un piano di disinfestazione può fornire maggior garanzie di efficacia rispetto ad un piano casalingo. Valutare la presenza di contratti con ditte esterne, la frequenza di ricambio delle esche e loro localizzazione.		
<i>L'azienda è dotata di un'area apposita, posta prima della barriera di entrata, per la sosta dei veicoli del personale dell'allevamento e/o visitatori?</i>		
SÌ	NO	N/A

20. Esiste documentazione relativa a corsi di formazione esterna o interna sulla biosicurezza e sui rischi di introduzione di malattie infettive e diffuse degli animali soggette a denuncia? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) v

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xiii)

Elemento di verifica: ESISTE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CORSI DI FORMAZIONE ESTERNA O INTERNA SULLA BIOSICUREZZA E SUI RISCHI DI INTRODUZIONE DI MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI SOGGETTE A DENUNCIA?	
La partecipazione a corsi con tematica specifica su biosicurezza sia esterna che interna, sui rischi biologici e/o sulle vie di trasmissione, è di fondamentale importanza per mantenere un adeguato livello formativo sia per il responsabile degli animali che per il personale che lavora in allevamento. Infatti, la frequenza a corsi specifici su come si trasmettono determinate malattie infettive (es. PSA o MVS), e sulle buone procedure di allevamento (es. corretto contenimento dell'animale e impiego dei corretti strumenti) possono aiutare il personale addetto agli animali a comprendere l'importanza di determinate procedure di biosicurezza ed a stimolarne la messa in pratica. I corsi possono essere organizzati da enti pubblici o privati, società, cooperative, consorzi e associazioni di allevatori o veterinari aziendali - liberi professionisti, al fine di sensibilizzare al meglio la categoria operante nel settore. Verificare che sia presente in allevamento un attestato di un corso di formazione riguardante biosicurezza e la salute del suino rilasciato dall'ente organizzatore o dal veterinario.	
<i>Esiste documentazione relativa a corsi di formazione esterna o interna sulla biosicurezza e sui rischi di introduzione di malattie infettive e diffuse degli animali soggette a denuncia?</i>	
SÌ	NO

21. Esiste un piano di profilassi vaccinale documentato? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xiv)

Elemento di verifica:		
ESISTE UN PIANO DI PROFILASSI VACCINALE DOCUMENTATO?		
L'immunizzazione dei soggetti in allevamento rappresenta una delle misure di biosicurezza più diffuse, efficaci e poco costose per l'allevamento suinicolo. In allevamenti da riproduzione, dove sono presenti animali per cui è fondamentale sviluppare una immunità per introdursi nel ciclo produttivo, i protocolli vaccinali dovrebbero essere utilizzati routinariamente mentre in altre tipologie di allevamento, andrebbero utilizzati in base allo stato sanitario dell'allevamento stesso. Verificare la presenza di un piano vaccinale aziendale che documenti il nome e il tipo di vaccino, la frequenza e la via di somministrazione. La risposta favorevole viene assegnata qualora sia presente almeno un piano di profilassi documentato. Questo è possibile da riscontrare non solo nei siti da riproduzione ma anche da accrescimento. È possibile valutare l'acquisto delle dosi vaccinali anche tramite il sistema della ricetta elettronica.		
<i>Esiste un piano di profilassi vaccinale documentato?</i>		
SÌ	NO	N/A

22. Esiste una prassi igienica e sanitaria di gestione delle attrezzature utilizzate per la profilassi vaccinale e i trattamenti terapeutici individuali o di gruppo?

Elemento di verifica: ESISTE UNA PRASSI IGIENICA E SANITARIA DI GESTIONE DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA PROFILASSI VACCINALE E I TRATTAMENTI TERAPEUTICI INDIVIDUALI O DI GRUPPO?		
È presente una vasta letteratura che evidenzia la diffusione dei patogeni attraverso le attrezzature per iniezioni (aghi e siringhe). Molto spesso in allevamento vengono utilizzati stesse siringhe e/o stessi aghi per le profilassi vaccinali o i trattamenti terapeutici, anche a distanza di tempo, cambiandoli solo quando sono totalmente inutilizzabili. Tale attrezzatura può essere contaminata facilmente dai germi ambientali durante l'uso o la conservazione, per di più durante l'utilizzo su animali malati. La condizione ottimale è rappresentata dall'utilizzo esclusivo di aghi usa e getta. Nel caso che ciò non sia possibile, è necessario utilizzare almeno un ago per box, evitando tassativamente di utilizzare lo stesso ago su animali con età differenti. Qualora l'attrezzatura dell'allevamento sia costituita da siringhe e aghi riutilizzabili (in plastica o alluminio), è necessario che vengano sottoposti a scrupolosi interventi di pulizia e disinfezione prima di essere riutilizzati. Valutare inoltre lo stato di logoramento (es. aghi spuntati o arrugginiti). Verificare, infine, che le condizioni di stoccaggio delle bottiglie di medicinali o vaccini avvenga correttamente in ambiente igienico e alla temperatura adeguata.		
<i>Esiste una prassi igienica e sanitaria di gestione delle attrezzature utilizzate per la profilassi vaccinale e i trattamenti terapeutici individuali o di gruppo?</i>		
SÌ	NO	N/A

23. Sono presenti eventuali risultati delle analisi, ufficiali o effettuate in autocontrollo, su campioni prelevati da animali o da altre matrici che abbiano rilevanza per la salute umana e animale? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xiv)

Elemento di verifica: SONO PRESENTI EVENTUALI RISULTATI DELLE ANALISI, UFFICIALI O EFFETTUATE IN AUTOCONTROLLO, SU CAMPIONI PRELEVATI DA ANIMALI O DA ALTRE MATRICI CHE ABBIANO RILEVANZA PER LA SALUTE UMANA E ANIMALE?		
La programmazione e l'attuazione di un protocollo di monitoraggio sanitario permette di acquisire una completa consapevolezza dello stato sanitario dell'allevamento e, inoltre, permette un precoce intervento medico in risposta ad eventuali variazioni immunologiche specialmente se effettuato in maniera sistematica: fattori fondamentali per mantenere alti gli standard di biosicurezza interna. Verificare la presenza di documenti attestanti specifiche analisi su campioni di matrice biologica (es. sangue, feci, tamponi, carcasse ecc.) o altre matrici (es. tamponi ambientali, acqua di abbeverata, polveri ecc.) rilevanti per la salute umana ed animale e la presenza di antibiogrammi. Le analisi dovrebbero essere eseguite almeno una volta l'anno su campioni prelevati dagli animali e/o da altre matrici.		
<i>Sono presenti eventuali risultati delle analisi, ufficiali o effettuate in autocontrollo, su campioni prelevati da animali o da altre matrici che abbiano rilevanza per la salute umana e animale?</i>		
SÌ	NO	N/A

24. Esiste un sistema di registrazione dei dati aziendali sanitari, di allevamento, di riproduzione e produzione?

Elemento di verifica: ESISTE UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEI DATI AZIENDALI SANITARI, DI ALLEVAMENTO, DI RIPRODUZIONE E PRODUZIONE?		
La presenza di un sistema di registrazione dei dati produttivi di un allevamento rappresenta la base di una visione completa della situazione sanitaria dell'azienda. Il sistema di registrazione può consistere in un registro cartaceo oppure un software gestionale, nel quale possono essere inseriti dati produttivi, riproduttivi e/o sanitari derivanti da analisi effettuate in autocontrollo o ufficiali. Variazioni repentine dei dati presenti in registro, produttivi o sanitari, può far scattare un campanello di allarme sui livelli di biosicurezza dell'azienda. Verificare la presenza di un sistema gestionale di registrazione di dati aziendali cartaceo o informatizzato.		
<i>Esiste un sistema di registrazione dei dati aziendali sanitari, di allevamento, di riproduzione e produzione?</i>		
SÌ	NO	N/A

25. Il personale addetto al governo degli animali ha contatti con altre aziende suinicole? ●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Elemento di verifica: IL PERSONALE ADDETTO AL GOVERNO DEGLI ANIMALI HA CONTATTI CON ALTRE AZIENDE SUINICOLE?	
Il personale che accudisce gli animali può rappresentare un vettore meccanico, in particolar modo se è venuto in contatto con animali infetti e successivamente ha contatti con animali suscettibili senza prendere delle misure preventive. Perciò, il personale che lavora in allevamento non deve avere contatti con altre aziende che allevano suini. Tra le vie di infezione più efficaci, dopo il contatto diretto tra animale infetto e suscettibile, bisogna sicuramente considerare il contatto indiretto tramite materiali contaminati. La trasmissione di patologie avviene solitamente attraverso il contatto con gli escreti degli animali infetti con calzature e vestiario. Inoltre, in letteratura sono presenti studi che evidenziano la possibilità di isolamento di agenti patogeni anche dalle mucose nasali e orali di personale venuto a contatto con animali infetti nelle precedenti 48 ore. Perciò non è sufficiente considerare unicamente i vestiti o le calzature, ma rappresentano un potenziale rischio anche le particelle di polvere e pulviscolo che si depositano tra i capelli o nelle narici. Pertanto, è fondamentale che il personale che accudisce gli animali (allevatore, operatori e tecnici) non abbia nessun contatto con altre aziende suinicole. La condizione ottimale è rappresentata dalla presenza di una dichiarazione firmata dal dipendente. Qualora si debba far entrare in allevamento una persona che ha avuto contatti con aziende suinicole di recente, è necessario prendere delle specifiche misure preventive che prevedano l'utilizzo di indumenti specifici. Inoltre è opportuno che venga effettuata la doccia, oppure, qualora non sia possibile, il lavaggio delle mani e l'utilizzo della mascherina.	
<i>Il personale addetto al governo degli animali ha contatti con altre aziende suinicole?</i>	
SÌ	NO

26. È presente un registro dei visitatori con indicato almeno data, nome e cognome del visitatore, motivo della visita e targa dell'automezzo? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma f)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto vii)

Elemento di verifica:

È PRESENTE UN REGISTRO DEI VISITATORI CON INDICATO ALMENO DATA, NOME E COGNOME DEL VISITATORE, MOTIVO DELLA VISITA E TARGA DELL'AUTOMEZZO?

La presenza di un registro, costantemente e correttamente compilato, che annoti l'ingresso dei visitatori e degli automezzi è di fondamentale importanza per mantenere alto il livello di biosicurezza di un allevamento. L'automatismo della registrazione all'ingresso del visitatore focalizza l'attenzione e favorisce l'attuazione di molte altre misure di biosicurezza (cambio calzature, lavaggio automezzi ecc.). Inoltre permette, in caso di introduzione di un agente patogeno, di individuare il momento del potenziale contagio, ovvero rintracciare tutti i veicoli sospetti e i relativi ingressi negli altri allevamenti. Infine, l'impiego del registro dei visitatori permette di rintracciare il focolaio principale dell'agente patogeno e/o collegare epidemiologicamente altri allevamenti. Questa informazione è di fondamentale importanza in particolar modo per le malattie denunciabili, emergenti, riemergenti e/o di grave impatto sulla salute degli animali. Verificare la presenza di un registro dei visitatori compilato con tutte le informazioni necessarie. La sola presenza del registro non è sufficiente, occorre verificare che esso sia costantemente utilizzato (ultima registrazione verosimile con le attività dell'allevamento). Infine, è fondamentale accertarsi che la registrazione sia richiesta sistematicamente a tutti i visitatori (**voi** compresi).

È presente un registro dei visitatori con indicato almeno data, nome e cognome del visitatore, motivo della visita e targa dell'automezzo?

SÌ

NO

27. È presente una documentazione attestante l'avvenuta disinfezione degli automezzi?

Elemento di verifica: È PRESENTE UNA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI?		
Gli automezzi che trasportano gli animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale. I veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della MVS/PSA. Le operazioni di lavaggio e disinfezione attuate dovranno garantire l'efficacia del disinfettante utilizzato (diluizione del disinfettante, asciugatura del mezzo dopo il lavaggio e il tempo di azione del disinfettante). Ogni automezzo in ingresso in allevamento deve essere pulito e disinfettato. Questo processo deve essere accompagnato da una specifica documentazione. Tale documentazione comprende i dati dell'autotrasportatore, il luogo del contatto più recente con gli animali (carico o scarico), la sua dichiarazione sull'avvenuto lavaggio, il fatto che abbia interessato tutti i comparti dell'automezzo, la rampa di carico e le ruote, il luogo dove si è svolta la disinfezione e il tipo di disinfettante utilizzato.		
<i>È presente una documentazione attestante l'avvenuta disinfezione degli automezzi?</i>		
SÌ	NO	N/A

28. L'allevamento dispone di una piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento o, in ogni caso, separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo animali? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto iii)

Elemento di verifica: L'ALLEVAMENTO DISPONE DI UNA PIAZZOLA PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE AUTOMEZZI LOCALIZZATA IN PROSSIMITÀ DELL'ACCESSO ALL'ALLEVAMENTO O, IN OGNI CASO, SEPARATA DALL'AREA AZIENDALE DESTINATA ALLA STABULAZIONE E GOVERNO ANIMALI?		
L'esecuzione di attività routinarie, come ad esempio l'approvvigionamento di cibo, il trasporto di animali, o lo smaltimento di materiale biologico, prevede, nella maggior parte dei casi, l'ingresso di automezzi in azienda. Sebbene questi ingressi rappresentino una elevata fonte di rischio per la trasmissione di malattie, la disposizione e la struttura di molti allevamenti intensivi non ne può prescindere. Perciò, in questi casi, è obbligatorio che sia presente una piazzola per la disinfezione di tali automezzi, localizzata in concomitanza o in prossimità dell'ingresso in allevamento, o in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione ed al governo di animali (zona pulita). Tale piazzola può essere strutturata in diversi modi, tuttavia è fondamentale che sia costituita da una superficie continua, costruita con un materiale resistente alla corrosione dei disinfettanti e lavabile. Dovrebbe, in più, essere utilizzato un sistema per la raccolta dei reflui derivanti dai liquidi di lavaggio, dal materiale organico e dai disinfettanti utilizzati.		
<i>L'allevamento dispone di una piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento o, in ogni caso, separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo animali?</i>		
SÌ	NO	N/A

29. Sono presenti apparecchiature fisse a pressione per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione degli automezzi in entrata? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto iii)

Elemento di verifica: Sono presenti apparecchiature fisse a pressione per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione degli automezzi in entrata?		
La presenza di apparecchiature a pressione per la pulizia e la disinfezione negli allevamenti suinicoli risulta particolarmente importante per la biosicurezza per gestire correttamente tutti i mezzi in ingresso. Sono ritenute accettabili le operazioni di pulizia condotte sugli automezzi in ingresso tramite archi di disinfezione (con getto a pressione) o tramite l'utilizzo di apparecchiature a pressione mobili (pompe a spalla o a carrello) utilizzando disinfettanti idonei. Non sono ritenuti sufficienti impianti di pulizia tramite tubi di gomma a bassa pressione o semplice acqua. Nel caso degli archi di disinfezione fare opportuna attenzione che siano funzionanti e attivi anche in condizioni di basse temperature. Nel caso delle apparecchiature mobili a pressione, verificare che non siano utilizzate anche per pulizia dei locali ma che restino sempre fisse in prossimità dell'ingresso per la pulizia degli automezzi.		
<i>Sono presenti apparecchiature fisse a pressione per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione degli automezzi in entrata?</i>		
SÌ	NO	N/A

30. Sono disponibili e utilizzati per la disinfezione dei veicoli prodotti di provata efficacia nei confronti delle malattie vescicolari del suino e PSA? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) iii

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto x)

Elemento di verifica: Sono disponibili e utilizzati per la disinfezione dei veicoli prodotti di provata efficacia nei confronti delle malattie vescicolari del suino e PSA?	
Al momento dell'ingresso dei veicoli, sia nel caso in cui vengano utilizzati per la disinfezione archi con getto a pressione o apparecchiature a pressione fisse è obbligatorio utilizzare dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS/PSA, alle relative concentrazioni d'uso e lasciato in azione per il tempo stabilito dalle indicazioni di utilizzo del relativo prodotto impiegato. È importante verificare la composizione del prodotto utilizzato per disinfettare i veicoli e il corretto utilizzo.	
<i>Sono disponibili e utilizzati per la disinfezione dei veicoli prodotti di provata efficacia nei confronti delle malattie vescicolari del suino e PSA?</i>	
SÌ	NO

I principali disinfettanti attivi nei confronti del virus della malattia vescicolare/PSA sono distinti in:

- agenti ossidanti: (perossidi inorganici, sali inorganici, acidi organici e detergenti anionici)
- alcali
- aldeidi

In generale, l'esperienza d'utilizzo dei disinfettanti contro virus dotati di envelope ha portato a consigliare alcuni composti chimici per l'inattivazione del virus della Peste Suina Africana:

- Soluzione di formaldeide all'1%
- Soluzione di ipoclorito di sodio da 0,03% a 0,00075%
- Soluzione di soda caustica al 2%
- Glutaraldeide al 2%

- Idrossido di sodio o calcio all'1% (efficace per l'inattivazione del virus anche a basse temperature)
- Fenoli: lisoformio e creolina
- Composti chimici ad azione solvente per i lipidi
- Composti multipli: Cloruro di sodio, Perossimonosolfato di potassio, Deoform, Lysoformin, Lysol, OD-20, Glicosol

Nell'ultima revisione del “manuale operativo pesti suine” redatto dal CRN Pesti Suine presso IZSUM di Perugia (CEREP), sono elencati i seguenti disinfettanti considerati di provata efficacia nei confronti della Peste Suina Africana:

- Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico+dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato 1%
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
- Idrossido di Sodio (Soda Caustica) 2%
Aspersione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m³, pH 10,4 -12)
- Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C) 40%
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili
- Ortofenilfenolo 1%
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
- Ortofenilfenolo 5%
Camion, divise da lavoro, oggetti vari

Inoltre, vengono anche elencati i principali principi chimici testati in laboratorio per l'**inattivazione** del virus della Peste Suina Africana, di seguito riportati:

- **ALCALI**
Idrossido di Sodio
Idrossido di Calcio
- **ACIDI**
Acido Acetico
Acido Citrico
- **COMPOSTI DEL CLORO**
Sodio Ipoclorito
Acqua Elettrolizzata Acida

- **AGENTI OSSIDANTI**

Acqua Ozonizzata (O3)
Idrogeno di Potassio
Perossido di Idrogeno
Perossido di Idrogeno Vaporizzato

- **ALDEIDI**

Glutaraldeide

- **COMPOSTI FENOLICI**

Fenolo
o-Fenil Fenolo

- **SALI QUATERNARI DI AMMONIO**

Benzalconio Cloruro
Ammonio Quaternario
Cloruro di Didecildimetilammonio

- **COMPOSTI DELLO IODIO**

Povidone-iodine (5% contenuto di Iodio)
Potassio Tetraglicina Triioduro

- **MULTIATTIVI**

Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato
Complesso alchil-benzil-dimetil-ammonio cloruro, didecil-dimetil-ammonio cloruro, glutaraldeide, alcool isopropilico

Viene infine specificato come sia importante ed opportuno verificare l'utilizzo di biocidi registrati come "virucidi" ai sensi del Regolamento (UE) 2012/528 e che ogni prodotto deve essere impiegato secondo le indicazioni del produttore.

L'utilizzo di alcune sostanze efficaci contro il virus della PSA è limitato a causa delle proprietà tossiche o corrosive. Solo alcune delle sostanze sopracitate sono contenute nei prodotti commerciali.

L'APHIS-USDA¹ riporta i prodotti commerciali che associano efficacia e scarsa tossicità per materiali ed ambiente certificati dall'EPA statunitense.

¹ https://www.aphis.usda.gov/animal_health/emergency_management/downloads/asf-virus-disinfectants.pdf

31. Il carico/scarico dei suini vivi avviene all'esterno dell'area di stabulazione e di governo degli animali? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto viii)

32. Esiste una rampa/corridoio di carico/scarico degli animali vivi, fissa o mobile?



Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto viii)

33. Il carico/scarico dei suini vivi avviene con monocarico? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xv)

Elemento di verifica:

- **IL CARICO/SCARICO DEI SUINI VIVI AVVIENE ALL'ESTERNO DELL'AREA DI STABULAZIONE E DI GOVERNO DEGLI ANIMALI?**
- **ESISTE UNA RAMPA/CORRIDOIO DI CARICO/SCARICO DEGLI ANIMALI VIVI, FISSA O MOBILE?**
- **IL CARICO/SCARICO DEI SUINI VIVI AVVIENE CON MONOCARICO?**

Il carico e lo scarico dei suini è il momento cruciale per la trasmissione, legata ai mezzi di trasporto, di malattie tra allevamenti. Infatti, è un potenziale punto di contatto tra allevamenti distanti, con diverse situazioni sanitarie e diversi livelli di biosicurezza. Può, talvolta, rappresentare anche il punto di contatto tra l'allevamento e il macello, il punto nevralgico di contaminazione degli automezzi. L'ingresso di veicoli in allevamento è un fattore di rischio non trascurabile. Qualora l'allevamento sia strutturato nel modo corretto, i veicoli transitano unicamente nella zona sporca dell'allevamento, lontana dalle aree di stabulazione degli animali. Nell'ambito della grande varietà di organizzazione degli spazi degli allevamenti semibradi, è possibile rinvenire un unico appezzamento esterno recintato, o diversi lotti contenenti gruppi differenti di animali (solitamente suddivisi per età). I recinti possono essere totalmente indipendenti, pertanto in questo caso il carico deve essere sempre effettuato esternamente, attraverso l'ausilio di sistemi trappola, oppure possono essere collegati ad un'area condivisa dell'allevamento (con un sistema trappola che può essere in

comune tra diversi recinti). In questo secondo caso, che presenta un maggior rischio, risulta necessario che ogni volta che il veicolo accede in prossimità di tale area promiscua per caricare da uno o più recinti venga adeguatamente disinfettato all'ingresso. È in ogni caso necessario che sia presente un sistema trappola per evitare che il mezzo di trasporto debba entrare direttamente nelle aree di stabulazione degli animali. Verificare che l'automezzo possa scaricare gli animali senza transitare all'interno dell'area di stabulazione degli animali, attraverso un sistema trappola o sistemi simili.

- *Il carico/scarico dei suini vivi avviene all'esterno dell'area di stabulazione e di governo degli animali*
- *Il carico/scarico dei suini vivi avviene con moncarico?*
- *Esiste una rampa/corridoio di carico/scarico degli animali vivi, fissa o mobile?*

SÌ

NO

34. Il carico degli scarti avviene all'esterno l'area di stabulazione e di governo degli animali? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto viii)

35. Il carico degli scarti avviene con monocarico? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xv)

Elemento di verifica:

- **IL CARICO DEGLI SCARTI AVVIENE ALL'ESTERNO L'AREA DI STABULAZIONE E DI GOVERNO DEGLI ANIMALI**
- **IL CARICO DEGLI SCARTI AVVIENE CON MONOCARICO?**

Il concetto espresso per il carico/scarico dei suini vivi è sovrapponibile, con la differenza che gli automezzi per il trasporto degli scarti sono specifici per animali che sono affetti da patologie e quindi da considerare come una fonte di infezione estremamente pericolosa. Pertanto, l'automezzo che effettua il carico degli scarti non dovrebbe entrare in allevamento, a meno che non sia vuoto. Verificare, perciò, la presenza di modalità operative o strutture che garantiscano che gli scarti vengano caricati esclusivamente all'esterno del perimetro aziendale (es. utilizzo di bighe per il trasporto) o tramite automezzo vuoto e regolarmente disinfettato. Nel caso del carico dall'esterno non è necessario che il camion sia vuoto.

- *Il carico degli scarti avviene all'esterno l'area di stabulazione e di governo degli animali*
- *Il carico degli scarti avviene con monocarico?*

SÌ	NO	N/A
----	----	-----

36. Le carcasse suini morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso, conservate in un contenitore coibentato o in una cella frigorifera a tenuta, idonei e funzionanti, posti all'esterno dell'area di governo degli animali, per l'eliminazione delle stesse conformemente alle disposizioni sanitarie? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto x)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xvii)

Elemento di verifica:

LE CARCASSE SUINI MORTI SONO RIMOSSE DAI LOCALI DI ALLEVAMENTO ENTRO 24 ORE DAL DECESSO, CONSERVATE IN UN CONTENITORE COIBENTATO O IN UNA CELLA FRIGORIFERA A TENUTA, IDONEI E FUNZIONANTI, POSTI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI GOVERNO DEGLI ANIMALI, PER L'ELIMINAZIONE DELLE STESSE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SANITARIE?

La morte di un soggetto, in allevamento, può avere numerosissime cause. Le più rilevanti, dal punto di vista della biosicurezza, sono quelle infettive. Un soggetto che giunge a morte per tali motivi cause rappresenta una fonte di infezione molto rilevante per gli altri animali. La tempestiva rimozione delle carcasse, entro le 24 ore, è il primo passo per una corretta gestione dei morti. Una volta rimossi, essi devono obbligatoriamente essere conservati in una cella frigorifera. La conservazione, ma anche il temporaneo stoccaggio, in luoghi che non consistano in una cella frigorifera adatta e funzionante (es. corridoio del capannone, campi, aree esterne, casse non refrigerate ecc.) viene considerata insufficiente. **In alternativa alla cella frigorifera deve essere presente un contratto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.** Permettere l'accesso ai suini morti da parte di animali selvatici, domestici o infestanti, comporta un rischio elevato di trasmissione, soprattutto nel caso dei roditori, i quali possono successivamente entrare nei capannoni e comportarsi da veicolo per i patogeni.

Verificare che la cella frigorifera sia presente, funzionante e inaccessibile ad animali o persone non autorizzate. In alternativa, verificare la presenza di un contratto con una ditta specializzata. Valutare anche la presenza di animali morti in aree non idonee dell'allevamento.

Le carcasse suini morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso, conservate in un contenitore coibentato o in una cella frigorifera a tenuta, idonei e funzionanti, posti all'esterno dell'area di governo degli animali, per l'eliminazione delle stesse conformemente alle disposizioni sanitarie?

SÌ	NO	N/A
----	----	-----

37. Il carico dei suini morti avviene all'esterno dell'area di stabulazione e governo degli animali? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto x)

Elemento di verifica:

IL CARICO DEI SUINI MORTI AVVIENE ALL'ESTERNO DELL'AREA DI STABULAZIONE E GOVERNO DEGLI ANIMALI?

La corretta gestione degli animali morti, iniziata tramite lo stoccaggio all'interno della cella frigorifera e si conclude durante la fase di smaltimento dei suini. Il modo più frequente per eliminare le carcasse è quello di affidarsi a ditte specializzate per lo smaltimento di materiale specifico a rischio. Quest'ultime mettono a disposizione degli automezzi in grado di caricare i morti o i cassoni dove sono raccolti (nel migliore dei casi viene caricata direttamente la cella, lasciandone una nuova pulita e disinfettata). Tali automezzi, durante il percorso giornaliero, sono venuti a contatto con diversi allevamenti ed essendo dedicati allo smaltimento dei morti possono svolgere la funzione di vettore di patologie. Sono, quindi, da considerarsi come un importante fattore di rischio biologico per l'allevamento. Pertanto, per mantenere livelli di biosicurezza elevati in azienda, è fondamentale evitare che essi abbiano accesso alla zona pulita dell'allevamento. **Verificare se il carico dei morti avviene all'interno o all'esterno del perimetro aziendale (delimitato da recinzione).**

Il carico dei suini morti avviene all'esterno dell'area di stabulazione e governo degli animali?

SÌ

NO

38. Il contenitore/cella frigorifera dove vengono conservati i morti ha un accesso e un percorso differenziato da quello dell'area di stabulazione e governo degli animali? ●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) vi

Elemento di verifica: IL CONTENITORE/CELLA FRIGORIFERA DOVE VENGONO CONSERVATI I MORTI HA UN ACCESSO E UN PERCORSO DIFFERENZIATO DA QUELLO DELL'AREA DI STABULAZIONE E GOVERNO DEGLI ANIMALI?	
Valutare le procedure con cui viene effettuato il carico dei morti, verificare qualora l'automezzo della ditta di smaltimento abbia la possibilità di raccogliere i morti o da una strada esterna al perimetro dell'allevamento oppure attraverso un accesso alla cella specifico per l'esterno, oppure tramite il trasporto dei cassoni effettuato dall'allevatore con mezzi propri (trattore o carrello elevatore) al di fuori dell'allevamento. Nel caso in cui il mezzo di smaltimento dei morti debba necessariamente transitare in prossimità delle aree di stabulazione e governo degli animali per raggiungere la cella, il parametro risulta non soddisfatto.	
<i>Il contenitore/cella frigorifera dove vengono conservati i morti ha un accesso e un percorso differenziato da quello dell'area di stabulazione e governo degli animali?</i>	
SÌ	NO

39. L'area sottostante il contenitore/cella frigorifera dei morti, è idonea sia alla raccolta di eventuali materiali o liquidi percolanti sia alla pulizia e disinfezione? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) iii

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto x)

Elemento di verifica:

L'AREA SOTTOSTANTE IL CONTENITORE/CELLA FRIGORIFERA DEI MORTI, È IDONEA SIA ALLA RACCOLTA DI EVENTUALI MATERIALI O LIQUIDI PERCOLANTI SIA ALLA PULIZIA E DISINFEZIONE?

Verificare se fuoriescono dalla cella eventuali percolati derivati dalle carcasse degli animali oppure se la zona sotto la cella risulta essere pavimentata e pulita.

L'area sottostante il contenitore/cella frigorifera dei morti, è idonea sia alla raccolta di eventuali materiali o liquidi percolanti sia alla pulizia e disinfezione?

SÌ

NO

40. Qualora le carcasse dei suinetti siano temporaneamente immagazzinate nei locali di allevamento, in attesa del loro allontanamento, i contenitori utilizzati sono adeguatamente sigillati ed idonei alla conservazione? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xvii)

Elemento di verifica: QUALORA LE CARCASSE DEI SUINETTI SIANO TEMPORANEAMENTE IMMAGAZZINATE NEI LOCALI DI ALLEVAMENTO, IN ATTESA DEL LORO ALLONTANAMENTO, I CONTENITORI UTILIZZATI SONO ADEGUATAMENTE SIGILLATI ED IDONEI ALLA CONSERVAZIONE?		
Per la valutazione si rimanda all'elemento di verifica 36: <i>Le carcasse suini morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso, conservate in un contenitore coibentato o in una cella frigorifera a tenuta, idonei e funzionanti, posti all'esterno dell'area di governo degli animali, per l'eliminazione delle stesse conformemente alle disposizioni sanitarie?</i>		
<i>L'area sottostante il contenitore/cella frigorifera dei morti, è idonea sia alla raccolta di eventuali materiali o liquidi percolanti sia alla pulizia e disinfezione?</i>		
SÌ	NO	N/A

41. Lo scarico del mangime avviene in modo da non permetterne il contatto con altri animali? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) vi

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto xvi)

Elemento di verifica:	
LO SCARICO DEL MANGIME AVVIENE IN MODO DA NON PERMETTERNE IL CONTATTO CON ALTRI ANIMALI?	
Lo scarico delle materie prime o del mangime da parte del camion di trasporto deve essere effettuato preferibilmente dall'esterno dell'allevamento, o, in alternativa, all'interno dell'allevamento solo da automezzi puliti e disinfettati all'ingresso, in silos, in specifici contenitori o in locali appositamente adibiti e chiusi/chiodibili. Pertanto, al di fuori di tali ambienti, le materie e i mangimi non possono essere scaricati a contatto diretto con il suolo, neanche per il momentaneo deposito, al fine di ridurre il rischio di contatto, diretto e indiretto, con altri animali. Verificare che non avvengano scarichi di mangime sul terreno.	
<i>Lo scarico del mangime avviene in modo da non permetterne il contatto con altri animali?</i>	
SÌ	NO

42. I locali, edifici o le aree di stoccaggio dei mangimi e/o delle lettiera, sono coperti da griglie o sigillati per impedire l'ingresso di altri animali, ratti e insetti nocivi? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) i

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma a) punto vi)

Elemento di verifica:	
I LOCALI, EDIFICI O LE AREE DI STOCCAGGIO DEI MANGIMI E/O DELLE LETTIERE, SONO COPERTI DA GRIGLIE O SIGILLATI PER IMPEDIRE L'INGRESSO DI ALTRI ANIMALI, RATTI E INSETTI NOCIVI?	
I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera. I locali destinati al deposito dei mangimi e/o delle lettiera devono essere progettati in modo da impedire l'ingresso di altri animali, compresi quelli infestanti, e sottoposti a manutenzione regolare. Il libero accesso da parte di altri animali ai materiali destinati al contatto con i suini rappresenta un rischio particolarmente elevato per la biosicurezza dell'allevamento, in quanto tali materiali possono essere contaminati da secreti ed escreti. In linea generale lo stoccaggio del mangime nei silos garantisce un sufficiente isolamento (vedi domanda 41). Per quanto riguarda le lettiera, invece, può essere considerato accettabile lo stoccaggio sul terreno, purché il locale non permetta che altri animali possano entrare in contatto con tale materiale da lettiera (esempi...). Verificare che tutti i possibili accessi alle aree di stoccaggio siano chiusi o chiudibili e che esse siano inaccessibili agli animali infestanti (es. ratti e uccelli) e, se presenti, anche a quelli domestici.	
<i>I locali, edifici o le aree di stoccaggio dei mangimi e/o delle lettiera, sono coperti da griglie o sigillati per impedire l'ingresso di altri animali, ratti e insetti nocivi?</i>	
SÌ	NO

43. Le aree sottostanti i silos dei mangimi consentono una efficace pulizia e il deflusso delle acque di lavaggio?

Elemento di verifica: LE AREE SOTTOSTANTI I SILOS DEI MANGIMI CONSENTONO UNA EFFICACE PULIZIA E IL DEFLUSSO DELLE ACQUE DI LAVAGGIO?		
Verificare che le aree sottostanti i silos dei mangimi siano cementate e/o progettate al fine di consentire una efficace pulizia e il deflusso delle acque di lavaggio.		
<i>Le aree sottostanti i silos dei mangimi consentono una efficace pulizia e il deflusso delle acque di lavaggio?</i>		
SÌ	NO	N/A

44. Sono utilizzati per l'alimentazione degli animali dei prodotti derivati dal latte?

Elemento di verifica: SONO UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI DERIVATI DAL LATTE?		
Il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte sono considerati materiali di categoria 3 (Regolamento (CE) n. 1069/2009, articolo 10, lettera e)) che possono essere forniti e utilizzati come materiali per mangimi qualora siano rispettate le condizioni dettate dal regolamento (UE) N.142/2011, Allegato X, Capo II, Sezione 4, Parte II. Verificare se in azienda vengono utilizzati per l'alimentazione degli animali i suddetti prodotti.		
<i>Sono utilizzati per l'alimentazione degli animali dei prodotti derivati dal latte?</i>		
SÌ	NO	N/A

45. Se sono utilizzati per l'alimentazione degli animali dei prodotti derivati dal latte è presente il nulla-osta al loro utilizzo ed è garantita la loro tracciabilità?



Reg. (UE) 2011/142 della Commissione All. X, Capo II, Sezione 4, Parte II

Elemento di verifica: SE SONO UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI DERIVATI DAL LATTE È PRESENTE IL NULLA-OSTA AL LORO UTILIZZO ED È GARANTITA LA LORO TRACCIABILITÀ?		
Il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte, devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione riconosciuto (Regolamento (CE) n. 1069/2009, articolo 24), ad un trattamento di sterilizzazione o UHT o HTST. In deroga, è possibile destinarli all'alimentazione animale anche senza trasformazione ai sensi del Regolamento (UE) N.142/2011, Allegato X, Capo II, Sezione 4, Parte II. Verificare la presenza del nulla osta per l'utilizzo di latte e prodotti derivati in azienda.		
<i>Se sono utilizzati per l'alimentazione degli animali dei prodotti derivati dal latte è presente il nulla-osta al loro utilizzo ed è garantita la loro tracciabilità?</i>		
SÌ	NO	N/A

46. Il punto di pesa è di esclusivo utilizzo dell'allevamento? ●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) vi

Elemento di verifica: L'AZIENDA È DOTATA DI UN'AREA APPOSITA, POSTA PRIMA DELLA BARRIERA DI ENTRATA, PER LA SOSTA DEI VEICOLI DEL PERSONALE DELL'ALLEVAMENTO E/O VISITATORI?	
Il punto di pesa dell'allevamento è utilizzato per pesare gli automezzi di trasporto degli animali o dei mangimi, prima e dopo lo scarico. È necessario accertarsi che i veicoli estranei alla funzionalità dell'allevamento non possano utilizzare la pesa per altre finalità o per pesare animali non destinati all'azienda.	
<i>L'azienda è dotata di un'area apposita, posta prima della barriera di entrata, per la sosta dei veicoli del personale dell'allevamento e/o visitatori?</i>	
SÌ	NO

47. È vietata la somministrazione di rifiuti di ristorazione, mensa o avanzi casalinghi agli animali? ● ●

Reg. CE n. 1069/2009

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto i)

Elemento di verifica: È VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI RIFIUTI DI RISTORAZIONE, MENSA O AVANZI CASALINGHI AGLI ANIMALI?	
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 relativa ai sottoprodotti di origine animale, i rifiuti di cucina o ristorazione devono essere considerati materiale di categoria 1, se provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali (art. 8 lettera f), oppure materiale di categoria 3 (art. 10 lettera p). Per quanto riguarda i materiali di categoria 3 lettera p), non è prevista la deroga per la somministrazione agli animali neanche in caso di trasformazione (art. 14 lettera d) punto i)). Le malattie del suino con agenti eziologici virali particolarmente resistenti nell'ambiente (es. Enterovirus, Asfarvirus, Aftovirus, ecc.) che non si manifestano nell'essere umano od in altre specie, possono essere trasmesse mediante la somministrazione di scarti di cucina contaminati e somministrati impropriamente ai maiali. La realtà suinicola intensiva italiana, è strutturata in modo restrittivo dal punto di vista alimentare, essendo somministrati ai suini mangimi (a broda o a secco) di origine industriale, sottoposti a controlli, finemente bilanciati e calcolati da alimentaristi. Differentemente, alcune realtà non commerciali dove vengono allevati i suini per il consumo diretto (es. agriturismo) potrebbero essere più propense ad alimentare gli animali utilizzando materie meno selezionate. È necessario perciò valutare l'origine e la natura degli alimenti somministrati quotidianamente o saltuariamente ai suini e accertarsi che gli alimenti forniti siano idonei per gli animali.	
<i>È vietata la somministrazione di rifiuti di ristorazione, mensa o avanzi casalinghi agli animali?</i>	
SÌ	NO

48. Esistono ingressi per le operazioni di trasporto dei liquami differenziati da quelli dell'area di stabulazione e governo degli animali? ●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) vi

Elemento di verifica:	
Esistono ingressi per le operazioni di trasporto dei liquami differenziati da quelli dell'area di stabulazione e governo degli animali?	
I liquami dovrebbero essere convogliati in una zona di stoccaggio esterna all'allevamento. Inoltre, sarebbe opportuna la presenza di tubature specifiche per l'allevamento, in modo da evitare l'utilizzo di tubature appartenenti alla ditta incaricata dello smaltimento dei liquami, che potrebbero essere state in contatto, anche di recente, con i liquami di altri allevamenti. L'ubicazione della vasca di stoccaggio nella "zona pulita" dell'allevamento (in prossimità dell'area di stabulazione degli animali) comporta che anche il camion adibito allo smaltimento dei liquami debba transitare in tale zona, costituendo un fattore rischio per la biosicurezza dell'allevamento. Verificare la localizzazione della vasca di stoccaggio dei liquami e valutare se il percorso che effettua il veicolo per lo smaltimento transita in prossimità dell'area di stabulazione degli animali.	
<i>Esistono ingressi per le operazioni di trasporto dei liquami differenziati da quelli dell'area di stabulazione e governo degli animali?</i>	
SÌ	NO

49. I terreni attigui all'azienda sono utilizzati per lo spandimento di liquami provenienti da altre aziende?

Elemento di verifica: I TERRENI ATTIGUI ALL'AZIENDA SONO UTILIZZATI PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALTRE AZIENDE?		
I liquami rappresentano una rilevante fonte di rischio per la diffusione degli agenti patogeni all'interno dell'allevamento. In particolare, il contatto diretto od indiretto con liquami provenienti da altre aziende può favorire la trasmissione di malattie tra allevamenti anche senza la movimentazione di animali. Di conseguenza, lo spargimento di liquami, provenienti da aziende terze, in prossimità dell'allevamento, rappresenta un importante fattore di rischio per la biosicurezza e, pertanto, dovrebbe essere evitato. Valutare la vicinanza con terreni non di proprietà dell'allevamento e verificare che, in essi, non siano smaltiti liquami di altre aziende suinicole.		
<i>I terreni attigui all'azienda sono utilizzati per lo spandimento di liquami provenienti da altre aziende?</i>		
SÌ	NO	N/A

50. Gli animali domestici/da compagnia non possono avere accesso ai locali dove sono stabulati i suini? ●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) i

Elemento di verifica: GLI ANIMALI DOMESTICI/DA COMPAGNIA NON POSSONO AVERE ACCESSO AI LOCALI DOVE SONO STABULATI I SUINI?	
Gli animali domestici, similmente agli animali infestanti, possono fungere da veicolo per gli agenti patogeni. Perciò, non dovrebbe essere loro consentito di muoversi liberamente in allevamento e, in particolar modo, di entrare all'interno dei capannoni soprattutto nei periodi di vuoto sanitario, dopo che i capannoni sono stati lavati, disinfettati e preparati per accogliere il ciclo produttivo successivo. Valutare la presenza di altri animali domestici/da compagnia in allevamento. È sufficiente la sola presenza in azienda di tali animali non confinati, per assegnare una risposta negativa a questa domanda.	
<i>Gli animali domestici/da compagnia non possono avere accesso ai locali dove sono stabulati i suini?</i>	
SÌ	NO

51. Il personale che accudisce e/o può venire a contatto con i suini non pratica attività venatoria o altre attività dove può avere contatto con suidi selvatici nelle 48 ore precedenti l'ingresso in azienda? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma d)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto vi)

Elemento di verifica:

IL PERSONALE CHE ACCUDISCE E/O PUÒ VENIRE A CONTATTO CON I SUINI NON PRATICA ATTIVITÀ VENATORIA O ALTRE ATTIVITÀ DOVE PUÒ AVERE CONTATTO CON SUIDI SELVATICI NELLE 48 ORE PRECEDENTI L'INGRESSO IN AZIENDA?

I suidi selvatici costituiscono un serbatoio per numerose malattie infettive che colpiscono il suino domestico, di notevole rilevanza nel caso delle Peste Suina Africana. Tutte le attività che possono favorire un contatto diretto o indiretto con i suidi selvatici costituiscono un concreto fattore di rischio di diffusione di tali malattie infettive. Sebbene l'attività venatoria nei confronti del cinghiale rappresenti il principale rischio in questo senso, non è opportuno sottovalutare il ruolo di altre attività, venatorie o meno, che si svolgono in aree dove sono presenti i cinghiali. Pertanto il personale che accudisce o può venire a contatto con i suini, non deve praticare attività venatoria nelle 48 ore precedenti l'ingresso in azienda. Valutare la presenza di un'autodichiarazione che attesti quanto sopra.

Il personale che accudisce e/o può venire a contatto con i suini non pratica attività venatoria o altre attività dove può avere contatto con suidi selvatici nelle 48 ore precedenti l'ingresso in azienda?

SÌ

NO

52. È presente una autodichiarazione da parte dei lavoratori dipendenti degli allevamenti suini intensivi di non detenzione di suini o cinghiali allevati a carattere rurale? ●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma d)

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) iv

Elemento di verifica:	
È PRESENTE UNA AUTODICHIARAZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEGLI ALLEVAMENTI SUINI INTENSIVI DI NON DETENZIONE DI SUINI O CINGHIALI ALLEVATI A CARATTERE RURALE?	
Verificare la presenza di una autodichiarazione da parte del personale di non detenzione di suini o cinghiali.	
<i>È presente una autodichiarazione da parte dei lavoratori dipendenti degli allevamenti suini intensivi di non detenzione di suini o cinghiali allevati a carattere rurale?</i>	
SÌ	NO

53. Divieto di introduzione in allevamento di alimenti a base di carne di suini o cinghiali provenienti dalla filiera rurale ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) iv

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto iii)

Elemento di verifica:	
DIVIETO DI INTRODUZIONE IN ALLEVAMENTO DI ALIMENTI A BASE DI CARNE DI SUINI O CINGHIALI PROVENIENTI DALLA FILIERA RURALE	
Verificare la presenza di un divieto scritto, con cartellonistica, o documentazione presentata, ben esposta e disponibile a tutto il personale e visitatori che accedono in azienda, che proibisca l'introduzione in allevamento di alimenti a base di carne di suini o cinghiali.	
<i>Divieto di introduzione in allevamento di alimenti a base di carne di suini o cinghiali provenienti dalla filiera rurale</i>	
SÌ	NO

54. Divieto di somministrazione ai suini di alimenti a base di carne di suini o cinghiali provenienti dalla filiera rurale? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma i) iv

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma b) punto iii)

Elemento di verifica: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE AI SUINI DI ALIMENTI A BASE DI CARNE DI SUINI O CINGHIALI PROVENIENTI DALLA FILIERA RURALE	
Verificare la presenza di un divieto scritto, con cartellonistica, o documentazione presentata, ben esposta e disponibile a tutto il personale e visitatori che accedono in azienda, che proibisca la somministrazione di alimenti a base carne di suini o cinghiali.	
<i>Divieto di somministrazione ai suini di alimenti a base di carne di suini o cinghiali provenienti dalla filiera rurale</i>	
SÌ	NO

SEZIONE QUARANTENA

55. La rimonta viene effettuata ad opera di riproduttori esterni?

Elemento di verifica:		
LA RIMONTA VIENE EFFETTUATA AD OPERA DI RIPRODUTTORI ESTERNI?		
L'introduzione di riproduttori esterni rappresenta un importante fattore di rischio biologico, dovuto alle differenze immunologiche tra gli animali già presenti e quelli di nuova introduzione. Questi ultimi sono una possibile fonte di nuovi patogeni, verso cui l'immunità di allevamento non è efficace. È ampiamente dimostrato come il contatto diretto tra animali infetti e suscettibili sia una delle vie di trasmissione più efficaci. Inoltre, al potenziale rischio di introduzione di una patologia, si aggiunge il rischio che si verifichi l'evenienza opposta: presenza di animali immunologicamente non competenti introdotti in una popolazione in cui sono presenti specifici patogeni. Queste situazioni possono favorire, sia il continuo ricircolo di determinate malattie, rendendo più arduo l'eradicazione, che la creazione di nuovi focolai per patologie non presenti in precedenza. Pertanto, la rimonta interna riduce i rischi sopra riportati. Nel caso in cui vengano introdotti nuovi animali, è necessario intraprendere delle misure cautelative e preventive, valutate nelle domande successive.		
<i>La rimonta viene effettuata ad opera di riproduttori esterni?</i>		
SÌ	NO	N/A

56. L'allevamento dispone di locali separati fisicamente e funzionalmente per la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma c) punto i)

Elemento di verifica:	
L'ALLEVAMENTO DISPONE DI LOCALI SEPARATI FISICAMENTE E FUNZIONALMENTE PER LA QUARANTENA DEI RIPRODUTTORI DI NUOVA INTRODUZIONE?	
Verificare se in allevamento sono presenti dei locali fisicamente e funzionalmente separati adibiti alla quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Tali locali per essere giudicati correttamente separati devono possedere dei limiti strutturali in grado di garantire l'isolamento dal resto dell'allevamento, quali ad esempio muri di calcestruzzo privi di comunicazione con gli altri ambienti (es. prese d'aria, ventilazione, ecc..) o non correttamente isolate (es. finestre e porte anche solo parzialmente prive di guarnizioni adatte su tutti e 4 lati battenti). Con impianti dedicati o che comunque non permettano un possibile contatto di materiale indiretto (es. ventilazione, distribuzione dell'alimento, ecc.). Altri parametri specifici dei locali sono richiesti nei quesiti successivi. Qualora in allevamento vengano acquistati saltuariamente riproduttori e non venga fatta una rimonta esterna routinaria, dovranno, in ogni caso, essere presenti dei locali adeguati.	
<i>L'allevamento dispone di locali separati fisicamente e funzionalmente per la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione?</i>	
SÌ	NO

57. Viene praticato il tutto pieno/tutto vuoto e un idoneo periodo di vuoto sanitario? ●

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma c) punto i)

Elemento di verifica: VIENE PRATICATO IL TUTTO PIENO/TUTTO VUOTO E UN IDONEO PERIODO DI VUOTO SANITARIO?		
Gli animali di nuova introduzione devono essere accolti prima di essere spostati nei locali di stabulazione, in specifici locali di quarantena per permetterne un iniziale isolamento biologico. La quarantena deve durare almeno 4 settimane per coprire il periodo di incubazione delle principali patologie. I locali di quarantena devono essere puliti e disinfettati al termine del ciclo e prima dell'accasamento di un nuovo gruppo e devono essere fisicamente separati dagli altri locali di stabulazione e funzionalmente indipendenti. Ciò non significa che devono essere necessariamente dislocati in altri edifici, ma che non abbiano in comune con le altre strutture determinati impianti, locali e attrezzature, come descritto e richiesto al quesito 56. Nel locale quarantena deve essere effettuato rigorosamente il tutto pieno-tutto vuoto, in modo da poterlo considerare come una unità epidemiologica a sé stante. Nella quarantena devono essere presenti animali con la stessa probabilità di esposizione ad un agente patogeno. Nel caso di una nuova introduzione durante il periodo di quarantena, tale periodo deve considerarsi azzerato: è necessario attendere almeno 28 giorni dall'ultima introduzione per considerare gli animali esenti da rischio e poterli introdurre in allevamento.		
<i>Viene praticato il tutto pieno/tutto vuoto e un idoneo periodo di vuoto sanitario?</i>		
SÌ	NO	N/A

58. Il personale non accudisce altri animali oltre a quelli della quarantena, diversamente è presente una zona filtro specifica per la quarantena? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma b)

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma g) iv

Decreto 28 giugno 2022, All I, punto 4 comma c) punto ii)

Elemento di verifica:	
Il personale non accudisce altri animali oltre a quelli della quarantena, diversamente è presente una zona filtro specifica per la quarantena?	
L'ingresso nella zona di quarantena deve essere considerato come un ingresso in una nuova unità epidemiologica. Bisogna, perciò, approcciarsi come se si fosse all'ingresso di un nuovo allevamento. Il passaggio attraverso una zona filtro dedicata è sicuramente il fattore più importante. Tale zona filtro deve essere assimilabile a quella posta all'ingresso dell'allevamento, suddivisa in una zona sporca e in una zona pulita e soprattutto dotata di indumenti specifici per il personale o monouso per i visitatori. Verificare, inoltre, che la zona filtro sia utilizzata sia per l'ingresso che per l'uscita dall'area di quarantena.	
<i>Il personale non accudisce altri animali oltre a quelli della quarantena, diversamente è presente una zona filtro specifica per la quarantena?</i>	
SÌ	NO

59. I locali di quarantena dispongono di fossa/e separata/e?

Elemento di verifica:		
I LOCALI DI QUARANTENA DISPONGONO DI FOSSA/E SEPARATA/E?		
La presenza di fosse o punti di raccolta comuni dei materiali biologici di scarto (feci e urine) potenzialmente infetti dalla quarantena al resto dell'allevamento espone gli animali allevati non in quarantena ad un possibile contagio indiretto. Quindi, come per altri impianti, quello che interessa lo spostamento o stoccaggio del materiale biologico di scarto deve essere separato tra la quarantena e il resto dell'allevamento per evitare la trasmissione delle malattie e assolvere al principio della "quarantena". Il sistema di smaltimento può, tuttavia, essere in comune, solo se tale procedura evita l'ingresso in allevamento di automezzi esterni, nel qual caso devono essere precedentemente e accuratamente disinfettati.		
<i>I locali di quarantena dispongono di fossa/e separata/e?</i>		
SÌ	NO	N/A

60. I locali di quarantena dispongono di ingresso/i separato/i? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma c) punto i)

Elemento di verifica: I LOCALI DI QUARANTENA DISPONGONO DI INGRESSO/I SEPARATO/I?	
I locali destinati alla quarantena e i locali di stabulazione non possono avere in comune l'ingresso. Sebbene sia ammissibile che i due locali sopracitati siano localizzati nello stesso edificio, l'accesso dall'esterno ad entrambi deve essere necessariamente distinto, separato e distanziato poiché, essendo l'ingresso agli stabili una zona frequentemente utilizzata nella routine dell'allevamento, risulta difficile mantenere l'isolamento tra le due sezioni. Inoltre, l'ingresso alla zona di quarantena dovrebbe essere provvisto di un'ulteriore barriera sanitaria specifica per tale zona (es. zona filtro o dogana danese con indumenti e calzari dedicati).	
<i>I locali di quarantena dispongono di ingresso/i separato/i?</i>	
SÌ	NO



61. Sono disponibili attrezzature destinate esclusivamente alla quarantena? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma c) punto i)

Elemento di verifica:	
SONO DISPONIBILI ATTREZZATURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLA QUARANTENA?	
Le attrezzature per la zona di quarantena devono essere specifiche e non utilizzate in altri settori dell'allevamento. Spazzole, palette, assi, carriole, apribocca, torcinaso o qualunque altro strumento funzionale all'attività dell'azienda può essere facilmente contaminato con secreti ed escreti di animali infatti. Anche il semplice contatto con animali nella zona di quarantena rende uno strumento un potenziale veicolo di malattia (vettore inerte). Inoltre, la condizione ottimale è rappresentata da una differenziazione facilmente identificabile tra le varie attrezzature specifiche per sezione (targhette, colori differenti) per ridurre al minimo i possibili scambi accidentali. Valutare, quindi, la presenza di attrezzature specifiche per la quarantena.	
<i>Sono disponibili attrezzature destinate esclusivamente alla quarantena?</i>	
SÌ	NO

62. Sono disponibili indumenti per il personale o monouso (tute e calzari) destinati esclusivamente alla quarantena? ●●

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma a) i

Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione All. III, punto 2 comma b)

Decreto 28 giugno 2022, All 1, punto 4 comma c) punto i)

Elemento di verifica: SONO DISPONIBILI INDUMENTI PER IL PERSONALE O MONOUSO (TUTE E CALZARI) DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA QUARANTENA?	
Anche gli indumenti posso fungere da vettore inerte e potenzialmente posso essere veicolo di malattia. Nel settore della quarantena, gli indumenti compresi i calzari devono essere dedicati o monouso. Inoltre, l'ingresso nella zona di quarantena dovrebbe essere provvisto di un'ulteriore barriera sanitaria specifica per tale zona (es. zona filtro o dogana danese).	
<i>Sono disponibili indumenti per il personale o monouso (tute e calzari) destinati esclusivamente alla quarantena?</i>	
SÌ	NO

63. È prevista l'esecuzione pianificata di accertamenti diagnostici negli animali in quarantena?

Elemento di verifica: È PREVISTA L'ESECUZIONE PIANIFICATA DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI NEGLI ANIMALI IN QUARANTENA?		
Durante il periodo di quarantena è necessario effettuare dei campioni biologici (es. sangue, feci, tamponi) sugli animali all'interno dell'unità epidemiologica al fine di accertare lo stato sanitario. Tali campioni devono essere sottoposti ad accertamenti diagnostici (es. batteriologici, virologici e sierologici), per verificare e valutare lo stato sanitario degli animali di nuova introduzione. È buona prassi verificare lo stato sanitario degli animali all'ingresso degli stessi, sia per confermare lo stato sanitario dichiarato dal fornitore che per confrontare la situazione dei nuovi soggetti verso i patogeni presenti in azienda. Inoltre, anche durante gli ultimi giorni del periodo di quarantena è buona prassi valutare eventuali variazioni immunologiche verso i principali patogeni dell'allevamento. La valutazione sanitaria deve essere effettuata per ogni partita di animali di nuova introduzione e ripetuta se, nel periodo di incubazione, nuovi animali si sono aggiunti ai precedenti considerando quel momento come il giorno zero.		
<i>È prevista l'esecuzione pianificata di accertamenti diagnostici negli animali in quarantena?</i>		
SÌ	NO	N/A

64. È richiesta e disponibile alle aziende di provenienza una documentazione che attesti lo stato sanitario degli animali di nuova introduzione?

Elemento di verifica: È RICHIESTA E DISPONIBILE ALLE AZIENDE DI PROVENIENZA UNA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI LO STATO SANITARIO DEGLI ANIMALI DI NUOVA INTRODUZIONE?		
Nel momento dell'acquisto di riproduttori è importante richiedere la documentazione che attesti lo stato sanitario degli animali di nuova introduzione. Questi certificati possono comprendere la situazione vaccinale degli animali, le condizioni sanitarie dell'allevamento di origine (PRRS-free, Mycoplasma-free ecc.), gli appropriati accreditamenti (es. MVS, malattia di Aujeszky, Trichinellosi) in funzione dello status e dell'adesione al piano dell'allevamento.		
<i>È richiesta e disponibile alle aziende di provenienza una documentazione che attesti lo stato sanitario degli animali di nuova introduzione?</i>		
SÌ	NO	N/A

SEZIONE RIPRODUZIONE

65. La rimonta dei riproduttori viene effettuata con cadenza superiore ai 3 mesi?

Elemento di verifica:		
LA RIMONTA DEI RIPRODUTTORI VIENE EFFETTUATA CON CADENZA SUPERIORE AI 3 MESI?		
Nel caso di rimonta esterna, verificarne la frequenza. L'introduzione di nuovi soggetti in allevamento è una procedura da evitare, per impedire l'ingresso di nuovi patogeni o ceppi differenti, tuttavia nella condizione sopramenzionata risulta necessaria per mantenere costante il numero delle scrofe produttive e per necessità di tipo genetico. Verificare con quale frequenza viene effettuata la rimonta dei riproduttori.		
<i>La rimonta dei riproduttori viene effettuata con cadenza superiore ai 3 mesi?</i>		
SÌ	NO	N/A

66. L'esame ecografico effettuato da operatori esterni?

Elemento di verifica: L'ESAME ECOGRAFICO EFFETTUATO DA OPERATORI ESTERNI?		
L'esame ecografico è utilizzato per verificare l'efficacia della copertura (FA) e in genere avviene nel periodo della gestazione in gabbia. Sia in caso venga eseguito dal veterinario aziendale che da veterinari liberi professionisti, l'ecografo dovrebbe essere utilizzato unicamente nell'allevamento. Il rischio biologico più elevato è rappresentato dai liberi professionisti, considerati come operatori esterni dotati di uno strumento che utilizzano in più allevamenti (ecografo non dedicato all'allevamento).		
<i>L'esame ecografico effettuato da operatori esterni?</i>		
SÌ	NO	N/A

67. Nel caso in cui si pratichi la fecondazione artificiale, il materiale seminale proviene da centri di raccolta seme autorizzati?

Elemento di verifica: NEL CASO IN CUI SI PRATICHI LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE, IL MATERIALE SEMINALE PROVIENE DA CENTRI DI RACCOLTA SEME AUTORIZZATI?		
Nel caso in cui si pratichi la fecondazione artificiale con del materiale seminale di origine esterna all'azienda questo deve provenire da centri di raccolta autorizzati il cui livello sanitario deve essere garantito e certificato (generalmente risulta pari o superiore all'allevamento in esame). È necessario, pertanto, verificare la provenienza del seme utilizzato e in caso l'origine sia esterna che siano presenti le certificazioni che attestino il livello sanitario del centro di provenienza del seme.		
<i>Nel caso in cui si pratichi la fecondazione artificiale, il materiale seminale proviene da centri di raccolta seme autorizzati?</i>		
SÌ	NO	N/A

68. Nel caso in cui si pratici la monta naturale i verri sono stati sottoposti agli accertamenti diagnostici previsti per i riproduttori maschi della specie suina?

Elemento di verifica: NEL CASO IN CUI SI PRATICHI LA MONTA NATURALE I VERRI SONO STATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PREVISTI PER I RIPRODUTTORI MASCHI DELLA SPECIE SUINA?		
Nel caso in cui si pratici la monta naturale o si utilizzo il materiale seminale intra-allevamento, è comunque necessario sottoporre i verri ad accertamenti diagnostici per verificarne l' idoneità sanitaria alla riproduzione. Verificare la presenza di certificazioni ed esami di laboratorio che attestino la condizione sanitaria dei verri riproduttori.		
<i>Nel caso in cui si pratici la monta naturale i verri sono stati sottoposti agli accertamenti diagnostici previsti per i riproduttori maschi della specie suina?</i>		
SÌ	NO	N/A

69. I suinetti in sala parto sono destinati a più di due allevamenti?

Elemento di verifica:		
I SUINETTI IN SALA PARTO SONO DESTINATI A PIÙ DI DUE ALLEVAMENTI?		
Il potenziale rischio di diffusione delle malattie infettive aumenta esponenzialmente in funzione delle possibili destinazioni degli animali. Come già evidenziato, per valutare efficacemente la biosicurezza è necessario tener conto non solo del rischio che una malattia entri in allevamento, ma anche che quest'ultima ne esca. Aumentare il numero di allevamenti verso cui sono destinati gli animali, aumenta la potenziale diffusione di patogeni e contribuisce inoltre a creare situazioni con differente competenza immunologica nel caso in cui allo stesso allevamento siano destinati animali provenienti da più aziende. La risposta al quesito stima il grado potenziale di diffusione della malattia.		
<i>I suinetti in sala parto sono destinati a più di due allevamenti?</i>		
SÌ	NO	N/A

SEZIONE SVEZZAMENTO

70. I suini provengono da più di un allevamento?

Elemento di verifica:		
I SUINI PROVENGONO DA PIÙ DI UN ALLEVAMENTO?		
Animali che provengono da allevamenti diversi, seppur della stessa età e con programmi vaccinali simili, hanno una competenza immunologica diversa. Questo è dovuto in parte all'immunità passiva ricevuta dal colostro materno, e in parte alla diversità di patogeni con cui sono venuti a contatto durante la loro vita e contro i quali, appunto, hanno sviluppato immunità anticorpale. Mettere a contatto animali con provenienze diverse è, proprio per questo, una condizione sfavorevole per la biosicurezza, in quanto espone una popolazione al rischio dell'altra e viceversa. Maggiori sono le provenienze, maggiore è il rischio di esporre l'allevamento ad una situazione instabile con un potenziale rischio di rimescolamento dei differenti ceppi patogeni fino alla possibilità di riscontrare nuove mutazioni. Inoltre, l'eventuale presenza di virus “<i>door opener</i>” tipici di queste fasi (svezzamento) espone all'esacerbazione di determinate patologie più o meno silenti. Vengono considerati allevamenti diversi quelli che non condividono l'unità epidemiologica, anche se dello stesso proprietario o gruppo.		
<i>I suini provengono da più di un allevamento?</i>		
SÌ	NO	N/A

71. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento?

Elemento di verifica:

IN ALLEVAMENTO VIENE APPLICATO IL SISTEMA TUTTO PIENO/TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO?

Il tutto pieno (TP) tutto vuoto (TV) è una pratica gestionale che consiste nell'alternare un periodo di pieno regime degli edifici di stabulazione, con presenza degli animali, a periodi di vuoto sanitario delle strutture. L'adozione del TP/TV aiuta notevolmente ad evitare le contaminazioni crociate, rende possibile una approfondita pulizia e disinfezione dei locali, l'esecuzione di manutenzione ordinaria e predispone il necessario per l'ingresso del nuovo ciclo produttivo. La parte più importante è la fase del TV, in quanto permette di interrompere il mantenimento delle infezioni tra un ciclo e l'altro ma solo se effettuato in senso assoluto (per l'intero effettivo dell'allevamento). Perciò è necessario accertarsi che, qualora dichiarato, il tutto pieno/tutto vuoto sia realizzato completamente, poiché anche un piccolo numero di animali (verosimilmente rimasti indietro nella crescita) può comportarsi da vettore per le infezioni tra un ciclo e l'altro.

Nello specifico valutare nel caso in cui sia adottato il sistema TP/TV, a quanti edifici sia esteso e, in particolare, se il TV sia realizzato interamente in tutto l'allevamento.

Il TP/TV può essere effettuato per:

- **Allevamento**, in cui tutte le strutture di stabulazione sono interessate dal periodo di vuoto sanitario: attuabile principalmente dai siti 2 (svezzamento) e siti 3 (ingrasso)
- **Capannone**, in cui il periodo di vuoto sanitario interessa un singolo edificio (capannone), per intero
- **Settore/stanza**, in cui vengono vuotate porzioni di un edificio (es. stanze), rigorosamente separate (pareti e porte, non considerare settore se presenti delle grate)
- **Box**, in cui vengono svuotati solo i singoli box/alloggiamenti all'interno del settore

L'ultima evenienza è da considerarsi scarsamente efficace, perciò rende la valutazione di questo parametro insufficiente. Durante il TV risulta fondamentale che il tempo di vuoto sanitario sia garantito al fine di eseguire correttamente tutte le operazioni di pulizia e disinfezione con il rigoroso rispetto delle tre fasi descritte in precedenza (vedi domanda 12) e utilizzo di un disinfettante efficace verso le principali patologie (vedi domanda 30). Si rammenta che il tempo di vuoto

sanitario minimo dovrebbe essere tale da permettere ai box di essere completamente asciutti prima di introdurre i nuovi animali.

In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento?

SÌ

NO

N/A

72. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per capannone?

Elemento di verifica: IN ALLEVAMENTO VIENE APPLICATO IL SISTEMA TUTTO PIENO/TUTTO VUOTO PER CAPANNONE?		
Nello specifico valutare nel caso in cui sia adottato il sistema TP/TV, a quanti edifici sia esteso e, in particolare, se il TV sia realizzato interamente per singolo edificio-capannone.		
<i>In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per capannone?</i>		
SÌ	NO	N/A

Per ulteriori chiarimenti si rimanda all'item 71: *In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento?*

73. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per stanza?



Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) i

Elemento di verifica: IN ALLEVAMENTO VIENE APPLICATO IL SISTEMA TUTTO PIENO/TUTTO VUOTO PER STANZA?	
Nello specifico valutare nel caso in cui sia adottato il sistema TP/TV, a quanti edifici sia esteso e, in particolare, se il TV sia realizzato interamente su porzioni di edificio rigorosamente separate tra loro. All'interno del capannone (o del locale dove vengono tenuti gli animali) la separazione può essere strutturale e/o gestionale (può essere gestionale e non per forza strutturale). È fondamentale però che gli animali all'interno del settore siano suddivisi in gruppi omogenei per peso, età e categoria (es svezzati e suini all'ingrasso) e al momento dello svuotamento questo venga fatto seguendo una corretta gestione dell'ambiente in modo da non svuotare il capannone in maniera non omogenea.	
<i>In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per stanza?</i>	
SÌ	NO

Per ulteriori chiarimenti si rimanda all'item 71: *In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento?*

74. I capannoni sono suddivisi in settori da pareti?

Elemento di verifica:		
I CAPANNONI SONO SUDDIVISI IN SETTORI DA PARETI?		
All'interno del capannone (o del locale dove vengono tenuti gli animali) la separazione può essere strutturale e/o gestionale (può essere gestionale e non per forza strutturale). Una divisione strutturale consiste in pareti che dividono il capannone in aree di stabulazione distinte che vengono vuotate interamente.		
<i>I capannoni sono suddivisi in settori da pareti?</i>		
SÌ	NO	N/A

75. I suini a fine ciclo sono destinati a più di un allevamento?

Elemento di verifica:		
I SUINI A FINE CICLO SONO DESTINATI A PIÙ DI UN ALLEVAMENTO?		
Il potenziale rischio di diffusione delle malattie infettive aumenta esponenzialmente in funzione delle possibili destinazioni degli animali. Come già evidenziato, per valutare efficacemente la biosicurezza è necessario tener conto non solo del rischio che una malattia entri in allevamento, ma anche che quest'ultima ne fuoriesca. Aumentare il numero di allevamenti verso cui sono destinati gli animali, aumenta la potenziale diffusione di patogeni. Nonché, contribuisce a creare situazioni con differente competenza immunologica nel caso in cui allo stesso allevamento siano destinati animali provenienti da più aziende. La risposta al quesito stima il grado potenziale di diffusione della malattia.		
<i>I suini a fine ciclo sono destinati a più di un allevamento?</i>		
SÌ	NO	N/A

SEZIONE INGRASSO

76. I suini provengono da più di un allevamento?

Elemento di verifica:		
I SUINI PROVENGONO DA PIÙ DI UN ALLEVAMENTO?		
Animali che provengono da allevamenti diversi, seppur della stessa età e con programmi vaccinali simili, hanno una competenza immunologica diversa. Questo è dovuto principalmente dalle diversità di patogeni con cui sono venuti a contatto durante la loro vita e contro i quali, appunto, hanno sviluppato immunità anticorpale. Mettere a contatto animali con provenienze diverse è, proprio per questo, una condizione sfavorevole per la biosicurezza, in quanto espone una popolazione al rischio dell'altra e viceversa. Maggiori sono le provenienze, maggiore è il rischio di esporre l'allevamento ad una situazione instabile con un potenziale rischio di rimescolamento dei differenti ceppi patogeni fino alla possibilità di riscontrare nuove mutazioni. Inoltre, l'eventuale presenza di virus "<i>door opener</i>" tipici di queste fasi (messa a terra) espone l'esacerbazione di determinate patologie più o meno silenti. Vengono considerati allevamenti diversi quelli che non condividono l'unità epidemiologica, anche se dello stesso proprietario o gruppo.		
<i>I suini provengono da più di un allevamento?</i>		
SÌ	NO	N/A

77. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento?

Per la risposta al quesito si rimanda all'item 71 della sezione svezzamento: *In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento?*

78. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per capannone?

Per la risposta al quesito si rimanda all'item 72 della sezione svezzamento: *In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per capannone?*

79. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per stanza?



Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) i

Per la risposta al quesito si rimanda all'item 73 della sezione svezzamento: *In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per stanza?*

80. I capannoni sono suddivisi in settori da pareti?

Per la risposta al quesito si rimanda all'item 74 della sezione svezzamento: *I capannoni sono suddivisi in settori da pareti?*

81. I suini a fine ciclo sono destinati a solo macelli industriali?

Elemento di verifica:		
i suini a fine ciclo sono destinati a solo macelli industriali?		
Arrivati a fine ciclo, i suini sono solitamente destinati agli impianti di macellazione e trasformazione industriali. Tali impianti sono sottoposti a rigorosi controlli da parte dell'Autorità competente, e le carni e gli alimenti di origine animale derivati vengono trattati e stoccati a basse temperature con metodiche standard da addetti specializzati secondo le norme Comunitarie vigenti. Le carni entrano nel sistema di tracciabilità che è in grado di ricostruire la storia e di seguire il percorso del prodotto. Nel caso in cui gli animali a fine ciclo siano destinati anche a privati e commercianti, il rischio di diffusione di una malattia aumenta esponenzialmente, sia per l'amplificazione delle destinazioni (compresi trasporti e trasportatori) che dalla difficile tracciabilità dei prodotti di origine animale derivanti da pratiche di autoconsumo estranee all'allevamento oggetto di valutazione (rischio elevato per la diffusione di patologie ove gli agenti infettivi permangono vitali nei prodotti di origine animale). Verificare sul registro di carico/scarico la destinazione degli animali, escludendo dalla valutazione i capi utilizzati per l'autoconsumo del medesimo allevamento (massimo nel numero stabilito dalle norme Regionali, tendenzialmente non superiore a 4 unità/anno).		
<i>I suini a fine ciclo sono destinati a solo macelli industriali?</i>		
SÌ	NO	N/A