



BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA CHECKLIST DI CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO



Versione:	
1.0	Gennaio 2022
2.0	Dicembre 2022
3.0	Gennaio 2024
4.0	Giugno 2024

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD)

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



SOMMARIO

PREMESSA	4
QUESITI COMUNI AI DIVERSI SETTORI AVICOLI	6
SEZIONE 3: PERSONALE ADDETTO	6
SEZIONE 4: SILOS	7
SEZIONE 5: PARCHEGGIO	8
SEZIONE 6: INGRESSO	8
SEZIONE 7: PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI	10
SEZIONE 8: ZONA FILTRO	11
SEZIONE 9: PIAZZOLE DI CARICO/SCARICO	13
SEZIONE 10: CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO	14
SEZIONE 11: DEPOSITO RIFIUTI E ALTRI MATERIALI (SEZIONE 12 PER OVAIOLE E RIPRODUTTORI <i>GALLUS GALLUS</i>)	18
SEZIONE 12: ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI (SEZIONE 13 PER OVAIOLE E RIPRODUTTORI <i>GALLUS GALLUS</i>)	19
SEZIONE 13: GESTIONE DEGLI ANIMALI (TACCHINI E BROILER)	22
SEZIONE 14: ANIMALI MORTI (SEZIONE 15 PER OVAIOLE E RIPRODUTTORI <i>GALLUS GALLUS</i>)	22
SEZIONE 15: GESTIONE LETTIERA VERGINE (TACCHINI E BROILER)	24
SEZIONE 16: GESTIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO (TACCHINI E BROILER)	26
SEZIONE 17: REGISTRI	27
SEZIONE 18: PROCEDURA DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	28
SEZIONE 19: ALTRE ATTIVITÀ	28
SEZIONE 20: STATO SANITARIO	29
SEZIONE 21: AREE ALL'APERTO	30
INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI DI POLLI DA CARNE	30
INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI DI TACCHINI	31
INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE E RIPRODUTTORI <i>GALLUS GALLUS</i>	33
INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI AVICOLI CON CAPACITÀ FINO A 250 CAPI	37
INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI AVICOLI CON MODALITÀ SVEZZAMENTO	40
INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI INCUBATOI	42

PREMESSA

La biosicurezza comprende l'insieme di tutte le misure atte a prevenire l'ingresso e la diffusione di agenti patogeni all'interno di un'azienda zootecnica e, come richiamato dal Regolamento (UE) 2016/429, rappresenta uno dei principali strumenti a disposizione degli operatori del settore per tutelare la salute animale e ridurre l'utilizzo di farmaci, contribuendo ad assicurare il benessere animale.

Nello specifico del contesto avicolo, a partire dagli anni duemila, il settore è stato interessato da diversi episodi di influenza aviaria, sia ad alta sia a bassa patogenicità, che hanno provocato considerevoli danni economici. Le epidemie si sono concentrate in particolare a livello delle aree densamente popolate di avicoli (*Densely Populated Poultry Areas* - DPPAs) del nord Italia (Veneto, Lombardia e da ultimo Emilia Romagna), caratterizzate anche dalla presenza di zone umide in corrispondenza di rotte migratorie e siti di svernamento di anatidi selvatici. Fin dai primi focolai del 1999/2000, la Regione del Veneto, in considerazione dell'elevato livello di rischio, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la malattia di Newcastle (CRNIA, c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) ha ritenuto prioritario normare gli aspetti sanitari e gestionali della filiera avicola del proprio territorio, mediante l'emanazione di provvedimenti specifici, recanti, tra le altre misure, disposizioni concernenti i requisiti obbligatori di biosicurezza da applicare alle varie tipologie di allevamento avicolo. Tali misure hanno anticipato quanto poi applicato anche a livello nazionale mediante l'Ordinanza Ministeriale del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni e il Decreto 28/02/2010 "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale".

L'entrata in vigore dei regolamenti di sanità animale ha posto le basi per un ulteriore rafforzamento delle misure di biosicurezza, al fine di prevenire l'ingresso, lo sviluppo e la diffusione delle malattie del pollame, e in particolare dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.

Sulla base di questi presupposti il Ministero della Salute con il supporto dei servizi veterinari regionali e del CRNIA ha revisionato e integrato gli atti normativi predetti attraverso la loro abrogazione e pubblicazione del Decreto 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli".

Sono state confermate, su tutto il territorio nazionale, misure di biosicurezza obbligatorie per gli allevamenti avicoli; alcune da applicarsi durante le attività ordinarie, ed altre, più restrittive, in situazioni emergenziali. Sono state inoltre fornite misure specifiche in relazione alle specie la cui gestione è più critica e sono state inserite indicazioni anche per allevamenti familiari, all'aperto e con capacità inferiore a 250 capi. È stato indicato un tempo di adeguamento fino al 1/7/2024, al termine del quale le non conformità rilevate saranno oggetto di disciplina sanzionatoria.

Quali strumenti di ausilio alla verifica ispettiva vengono inoltre resi disponibili sul sito www.Classyfarm.it le checklist e il presente manuale esplicativo. Oltre ai requisiti cogenti sono presenti nelle checklist ulteriori quesiti utili alla valutazione del rischio delle principali patologie del pollame (Influenza e Salmonella).

L'applicazione di misure di biosicurezza rappresenta una barriera efficace trasversale, che contribuisce, oltre che alla protezione della salute degli animali e al mantenimento di condizioni di benessere anche alla protezione della salute dell'uomo, impedendo l'ingresso e la persistenza in allevamento di agenti di zoonosi a prevalente trasmissione alimentare, quali le salmonelle considerate rilevanti per la salute pubblica.

QUESITI COMUNI AI DIVERSI SETTORI AVICOLI

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE CHECKLIST

La maggior parte dei quesiti proposti sono richieste esplicite del Decreto Ministeriale 30 maggio 2023, recante “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”. Ai fini di una migliore interpretazione della checklist anche in termini di prescrizioni da parte del veterinario ufficiale, tali quesiti sono indicati con un asterisco (*). Vengono invece evidenziati, con doppio asterisco (**), i quesiti per cui lo stesso Decreto prevede una disciplina specifica di deroga.

Sono inoltre stati integrati i riferimenti alle peculiarità di allevamento di altre specie avicole; ad esempio nel caso dell'allevamento della quaglia è stato inserito il termine “stanza” in aggiunta alla dicitura di capannone.

SEZIONE 3: PERSONALE ADDETTO

Il personale che, a qualsiasi titolo, circola e opera all'interno dell'azienda e che può venire, direttamente o indirettamente, a contatto con gli animali, può potenzialmente veicolare pericoli biologici e condizionare lo stato sanitario dell'allevamento. In una situazione ideale, gli addetti impiegati dovrebbero aver ricevuto una formazione idonea in materia di biosicurezze e dovrebbero limitare il più possibile i contatti con altre realtà zootecniche avicole, evitando essi stessi di detenere pollame.

3. PERSONALE ADDETTO (OLTRE AL TITOLARE)

3.1	Personale familiare
-----	---------------------

Verificare se tra le persone che operano all'interno dell'allevamento vi sono figure appartenenti al nucleo familiare dell'allevatore.

3.2	Personale esterno (non familiare) <u>dipendente</u>
-----	--

Verificare se in azienda opera personale esterno (non costituito da figure appartenenti al nucleo familiare dell'allevatore) in qualità di dipendente assunto.

3.3	Personale esterno qualificato <u>non dipendente</u>
-----	--

Verificare se in azienda opera personale esterno qualificato (caricatori, vaccinatori ecc.), dotato pertanto di formazione idonea alla mansione da svolgere, non dipendente.

3.4	Personale esterno (non familiare e non dipendente) con accesso occasionale per operazioni routinarie (amici, vicini, ecc...)
-----	--

Verificare se persone che non sono dipendenti, accedono in azienda con frequenza saltuaria e indefinita, per prestare assistenza occasionale.

3.5	Il personale certifica di rispettare i requisiti previsti in materia di biosicurezza dal Decreto Ministeriale per poter accedere all'area di allevamento*
-----	---

Verificare se in azienda sia presente un documento (autocertificazione) scritto e firmato da detentore/proprietario e personale che accede all'allevamento, in cui si attesta che il personale (dipendente e non):

- Ha ricevuto idonea formazione in materia di biosicurezze, ovvero che abbia seguito opportuni corsi formativi con rilascio di attestato. Qualora si tratti di personale familiare o dipendente del titolare, la formazione può essere garantita dal titolare dell'allevamento il quale deve comprovarne l'esecuzione. Resta sottinteso che il titolare debba aver ricevuto egli stesso adeguata formazione;
- Adotta corrette procedure di biosicurezza e appropriate misure igienico- sanitarie;
- Non detiene volatili propri;
- Non ha praticato attività venatoria nelle 48 ore precedenti.

3.6	Il personale che opera in allevamento è dedicato ad un solo stabilimento**
-----	--

Il personale che opera in allevamento deve essere dedicato ad un solo stabilimento. Nel caso operi in più stabilimenti deve essere presente e regolarmente applicata una procedura per evitare il contatto indiretto tra gli stabilimenti. Sono escluse da quest'obbligo le squadre di addetti al carico degli animali e le squadre di vaccinazione.

SEZIONE 4: SILOS

I silos di stoccaggio per gli alimenti destinati agli animali rappresentano, direttamente o indirettamente, una potenziale fonte di introduzione di pericoli di varia natura. Tramite le operazioni di carico, se effettuate all'interno dell'area, i mezzi delle ditte mangimistiche potrebbero di fatto essere veicolo di agenti patogeni e, inoltre, diffonderli da un'azienda all'altra. I mangimi stessi potrebbero essere inquinati con microrganismi, che potrebbero persistere nei silos, se questi ultimi non vengono adeguatamente sanificati. Per tale ragione, le operazioni di carico e di sanificazione delle superfici assumono notevole importanza.

4. SILOS	
4.1	Il carico dei silos avviene esclusivamente dall'esterno dell'area di allevamento**

La verifica di questo quesito si basa su evidenze al momento del sopralluogo e sulla dichiarazione dell'allevatore. Questo requisito è da ritenersi obbligatorio per i nuovi insediamenti e per gli esistenti, laddove la situazione lo consenta.

4.2	Esiste evidenza che i silos vengono puliti e disinfettati*
-----	--

Verificare se le superfici dei silos vengono sanificate tramite controllo documentale. Nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto (ad esempio tacchini e polli da carne), i silos devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo ingresso di animali. In tutti gli altri allevamenti, la pulizia e disinfezione dei silos deve essere effettuata almeno una volta all'anno. Deve essere presente un protocollo di sanificazione adeguato che dovrebbe prevedere: (i) le operazioni di pulizia e sanificazione a base di prodotti disinfettanti e antifungini con indicazioni chiare delle concentrazioni utilizzate; (ii) la frequenza di lavaggio e disinfezione, che deve essere regolare e periodica, ed (iii)

evidenza che la sanificazione venga effettuata al termine di ciascun ciclo produttivo o almeno una volta l'anno. Non è obbligatorio pulire i silos nei quali è presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo, che comunque non può essere spostato direttamente verso altri allevamenti, se non previo trattamento di sanificazione.

SEZIONE 5: PARCHEGGIO

Le caratteristiche dell'area di sosta dei veicoli di visitatori e dipendenti dell'azienda dovrebbero essere tali da impedirne l'ingresso nell'area dell'allevamento. Come nel caso dei mezzi di carico dei silos, infatti, i veicoli potrebbero essere fonte di introduzione di agenti patogeni nell'area di allevamento.

5. PARCHEGGIO

5.1	L'area di parcheggio è separata dall'area di allevamento e chiaramente identificata*
-----	--

Verificare se l'area destinata alla sosta dei veicoli è situata, con demarcazione netta (recinzioni, barriere, nastri), preferibilmente all'esterno dell'area di allevamento e se è distintamente riconoscibile tramite apposita cartellonistica di segnalazione.



Figura 1 - Area di sosta veicoli opportunamente identificata e segnalata da apposita cartellonistica

SEZIONE 6: INGRESSO

L'ingresso dell'area di allevamento dovrebbe presentare caratteristiche tali da impedire l'accesso deliberato di persone estranee e veicoli senza che questi vengano debitamente riconosciuti e identificati. Non bisogna lasciare inoltre che personale non dipendente circoli liberamente non accompagnato all'interno dell'area aziendale di pertinenza dell'allevamento.

6. BARRIERE ALL'INGRESSO E DELIMITAZIONE DELL'AREA DI ALLEVAMENTO

6.1	Sono presenti idonee barriere all'ingresso (cancelli, sbarre mobili)*
-----	---

Verificare se all'ingresso dell'allevamento sono posizionate opportune barriere fisiche (figura 2) atte ad impedire l'accesso a persone e veicoli non autorizzati. Tali barriere possono essere rappresentate

da strutture, quali cancelli e sbarre mobili. La sbarra è da intendersi con funzione dissuasiva, così come le barriere naturali circostanti nei termini di impedire l'accesso dei veicoli.




Figura 2 - Esempi di barriere di ingresso e cartellonistica idonee



Figura 3 - Barriere e cartellonistiche non idonee e/o assenti

6.2	Esiste la possibilità che le persone e gli automezzi accedano all'area di allevamento in modo non controllato*
-----	--

Il quesito fa riferimento all'accesso accidentale di persone deve essere impedito attraverso recinzioni oppure attraverso barriere naturali e/o cartellonistica.

6.3	È presente idonea cartellonistica per la segnalazione di divieto di accesso e di procedure da adottare dopo l'accesso alle aree di allevamento*
-----	---

Verificare se all'ingresso dell'area di allevamento sono presenti cartelloni di divieto di accesso segnalati in maniera evidente ed inequivocabile e se sono presenti idonei cartelloni che illustrano le procedure da adottare durante la visita in allevamento (dall'ingresso all'uscita) (ad es. cambio indumenti calzature, corretto utilizzo dogana danese, igiene delle mani).

6.4	Sono presenti edifici non pertinenti e automezzi non dedicati all'attività all'interno dell'area di allevamento
-----	---

Verificare se all'interno dell'area dell'allevamento sono presenti edifici/strutture che non fanno parte direttamente dell'allevamento stesso (es. ricovero attrezzi dedicati all'agricoltura e non alla zootecnia) e se questi sono o meno, delimitati da recinzioni, nastri o altro tipo di demarcazione netta. Verificare, inoltre, se all'interno dell'azienda sono presenti automezzi abitualmente impiegati per attività non inerenti l'allevamento di animali (es. trattori, vecchie macchine, tubi da irrigazione, attrezzi agricoli ecc.).

SEZIONE 7: PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI

Qualora sia strettamente necessario permettere l'ingresso di automezzi all'interno dell'area di allevamento è obbligatorio che questi vengano sempre adeguatamente sanificati in modo da prevenire l'introduzione di agenti patogeni dall'esterno.

7. ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI

7.1	Presenza di un'area di disinfezione dei mezzi in ingresso con fondo impermeabile dotata di impianto fisso, antistante l'area di allevamento e separata dalla zona pulita*
-----	---

Verificare che sia presente in ingresso un'area dedicata appositamente alle operazioni di disinfezione degli automezzi, antistante l'area di allevamento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali. Tale area deve essere dotata di fondo impermeabile, omogeneo e di dimensioni adeguate. Si suggerisce pertanto una larghezza di circa 3 metri (ovvero di poco superiore larghezza minima dell'asse degli automezzi pesanti) ed una lunghezza minima a cavallo delle apparecchiature di disinfezione in modo da consentire a la pulizia e disinfezione delle ruote intere e del sottoscocca senza dispersione di materiale organico e di disinfettante su superfici non cementate.

7.2	Per gli automezzi che accedono all'area di allevamento, l'accesso avviene esclusivamente attraverso la piazzola di disinfezione*
-----	--

Verificare che l'accesso degli automezzi all'area di allevamento avvenga unicamente attraverso il punto di disinfezione.

7.3	Il sistema di disinfezione è funzionante e automatizzato**
-----	--

Verificare che l'impianto di disinfezione sia effettivamente funzionante, in grado di assicurare un lavaggio efficace del veicolo e che si attivi automaticamente tramite rilevatore di movimento (o altri sistemi analoghi) al passaggio di un veicolo. L'automatismo dell'impianto di disinfezione è obbligatorio per i nuovi allevamenti, per quelli oggetto di ristrutturazione e per gli allevamenti preesistenti siti nelle zone ad alto rischio A e B.

In assenza di automatismo, deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi, validata dal Servizio Veterinario. Verificare tramite controllo documentale che il protocollo di sanificazione degli automezzi sia rispettato nei tempi e nelle modalità previste dallo stesso. NB: le procedure di pulizia e disinfezione sono in ogni caso obbligatorie: qualora non vi sia la possibilità di allestire una postazione fissa, le procedure devono comunque essere effettuate tramite altri mezzi e previa validazione del Servizio Veterinario.



Figura 4 - Impianto di disinfezione fisso automatizzato con fondo impermeabile

7.4	Presenza di pozzetto raccolta acque di scarico per allevamenti nuovi ed in quelli oggetto di ristrutturazione*
-----	--

Verificare che, in corrispondenza dell'impianto di lavaggio, vi sia una canalina con annesso pozzetto e che questa consenta di raccogliere efficacemente le acque di scarico reflue dalle operazioni di pulizia.

SEZIONE 8: ZONA FILTRO

La zona filtro funge da anticamera e spogliatoio per l'accesso in allevamento. La zona filtro deve essere concepita in modo da essere un passaggio obbligato per chiunque visiti l'azienda, siano essi appartenenti al personale dipendente o visitatori esterni. È necessario pertanto assicurare igiene e disinfezione frequenti di questo locale poiché eventuali agenti patogeni residui potrebbero essere trasportati direttamente all'interno dell'allevamento.

8. ZONA FILTRO	
8.1	L'accesso di qualsiasi persona (allevatore, dipendenti, visitatori di qualsiasi tipo) all'area di allevamento è vincolato esclusivamente al passaggio obbligatorio (ovvero anche tramite percorsi dedicati) attraverso una zona filtro posizionata nel punto di passaggio tra la zona sporca e la zona pulita (area di allevamento)*

Verificare che in corrispondenza dell'ingresso nell'area di allevamento sia presente una zona filtro attraverso la quale tutto il personale e i visitatori debbano obbligatoriamente transitare al fine di

guadagnare l'accesso all'allevamento e in cui essi possano indossare vestiario monouso o dedicato. In situazioni strutturali in cui la zona filtro non risulta essere posizionata all'ingresso dell'allevamento, verificare la possibilità di identificare dei flussi ed accorgimenti tali da garantire il rispetto delle biosicurezze (es. distributore di calzari in ingresso necessari per raggiungere la zona filtro posta in una zona differente).

8.2	È presente una divisione funzionale della zona filtro in una "zona sporca" e "pulita"*
-----	--

Verificare se, all'interno della zona filtro, è possibile riconoscere una separazione funzionale tra zona sporca (area in cui viene accolto il visitatore e zona ufficio) e zona pulita (area a cui si accede dopo aver indossato indumenti puliti/aziendali). In una zona filtro ben organizzata vi deve essere un flusso chiaro della movimentazione del personale ed al visitatore deve essere interdetto l'accesso alla zona pulita se non ha dapprima proceduto ad indossare vestiario idoneo (calzari e vestiario dedicato per il personale dello stabilimento, copri abiti e calzari per i visitatori). A tal proposito accesso e uscita dalla zona filtro devono essere unidirezionali: in una zona filtro correttamente organizzata dovrebbero essere infatti presenti una porta d'ingresso e una d'uscita.

Le dimensioni della zona filtro dovrebbero essere proporzionali alle dimensioni dell'allevamento, in modo da consentire un'agevole e ordinata disposizione di indumenti e calzature da parte di squadre numerose di lavoratori.



Figura 5 - Esempio di zona filtro divisa funzionalmente in zona sporca e zona pulita

8.3	Il locale è pulito, lavabile e disinfettabile
-----	---

Verificare il grado di igiene e di pulizia della zona filtro mediante accurata ispezione visiva valutando la presenza di sporco, detriti, ragnatele, polvere ecc. e verificare l'assenza di materiale estraneo alla zona filtro. Verificare, inoltre, se le superfici presenti nel locale della zona filtro sono realizzate in materiale facilmente lavabile tali da permettere di effettuare agevolmente le operazioni di pulizia senza che vi siano punti in cui si può accumulare sporcizia (fughe tra le mattonelle, fratture, angoli). Verificare inoltre che l'area della suddetta zona sia libera da oggetti e/o mobili ingombranti e superflui che potrebbero impedire un'accurata pulizia del locale (figura 5).

8.4	È presente almeno un punto disinfezione (lavandino funzionante attrezzato con acqua corrente, detersivi e disinfettante per le mani)*
-----	---

Verificare che il lavabo posto all'interno della zona filtro sia effettivamente funzionante e dotato di acqua corrente, detergenti e disinfettanti per le mani.



Figura 6 - Esempi di zona filtro idonea (a sinistra) e zona filtro non idonea (a destra)

8.5	Sono presenti asciugamani monouso/erogatori ad aria e un armadietto pulito in materiale lavabile e disinfettabile per gli indumenti
-----	---

Verificare che nei pressi del lavandino/erogatore di igienizzante siano presenti salviette monouso, o erogatori ad aria funzionanti di modo da poter effettuare una appropriata asciugatura delle mani (figura 5). La presenza di asciugamani non monouso è da considerarsi un fattore di rischio anche se visivamente l'asciugamano appare in buone condizioni di pulizia. Verificare, inoltre, che gli armadietti destinati al deposito degli indumenti siano visivamente puliti e non presentino segni di sporcizia e/o usura. Verificare inoltre che le superfici e i materiali che costituiscono gli armadietti permettano di effettuare agevolmente le operazioni di pulizia e disinfezione.

8.6	Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale dipendente e il personale esterno e relativi contenitori per il deposito degli indumenti e del materiali utilizzati*
-----	--

Verificare che siano disponibili e pronti all'uso indumenti puliti e/o monouso (tute, calzari, guanti ecc.) destinati al personale dipendente e ai visitatori esterni e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

SEZIONE 9: PIAZZOLE DI CARICO/SCARICO

Le aree dedicate al carico e allo scarico di animali e materiali d'uso dovrebbero presentarsi in uno stato tale da agevolarne la sanificazione e limitare pertanto l'accumulo di sporcizia. Tali aree devono essere localizzate direttamente in corrispondenza degli ingressi dei capannoni

9. PIAZZOLE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI D'USO E DEGLI ANIMALI

9.1

Presenza di piazzole di carico/scarico dei materiali d'uso e degli animali costituite da una superficie lavabile e disinfettabile, e in stato di manutenzione adeguato*

Verificare che il manto delle piazzole di carico/scarico animali e materiali d'uso non presenti discontinuità della superficie tali da impedire una adeguata sanificazione delle stesse (crepe, anfrattuosità ecc.). Verificare inoltre che il manto sia realizzato in materiale facilmente lavabile e igienizzabile.

9.2

Le piazzole sono posizionate agli ingressi dei capannoni, hanno dimensioni minime pari all'apertura del capannone e consentono che tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tale area*

Verificare che le piazzole di carico/scarico siano localizzate nell'area antistante le aperture carrabili dei capannoni e che presentino una superficie di dimensioni sufficienti a permettere con agevolezza tutte le operazioni cui sono deputate.



Figura 7 - Piazzola di carico scarico animali e materiali d'uso idonea (a sinistra) e non idonea (a destra)

SEZIONE 10: CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO

I locali dell'allevamento dovrebbero presentare caratteristiche strutturali tali da permettere il mantenimento di un livello igienico-sanitario elevato e da prevenire l'ingresso e la circolazione di agenti patogeni.

10. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO

Anticamera capannoni

10.1

La dogana danese è presente e correttamente utilizzata*

Verificare che nel locale che precede l'area in cui sono stabulati gli animali in ciascun capannone sia presente una dogana danese, ovvero una separazione fisica netta il cui sorpasso sia vincolato alla vestizione di calzari dedicati all'area nella quale si sta per entrare, fatta salva la presenza di strutture

che consentono il passaggio da un capannone all'altro senza contatto con l'area esterna ai capannoni. Verificare inoltre il corretto utilizzo della stessa da parte degli operatori richiedendo una prova sul posto.

Una dogana danese ideale dovrebbe soddisfare diversi requisiti in termini strutturali e funzionali. Innanzitutto dovrebbe essere costituita da una barriera fisica e fissa, realizzata in materiale lavabile e disinfettabile. Si consiglia la presenza di una seduta (es panca, sedia) che permetta al personale di sedersi ed effettuare il cambio calzature. Tali calzature dedicate devono essere posizionate al di là della dogana danese e protette in contenitori lavabili e disinfettabili ad uso esclusivo delle calzature dedicate al capannone.

10.2	L'anticamera dei capannoni si presenta all'atto del controllo priva di macchinari/attrezzature/oggetti non funzionali all'allevamento
------	---

Verificare che l'anticamera dell'ingresso di ciascun capannone sia ordinata, non ingombra. Anche l'anticamera stessa dovrebbe soddisfare taluni requisiti strutturali e funzionali. Innanzitutto dovrebbe: configurarsi come un luogo dedicato e protetto; presentare superfici lavabili e disinfettabili; essere lavata e disinfettata regolarmente; presentarsi priva di macchinari o attrezzature o oggetti non funzionali all'allevamento; essere dotata di salviette monouso; essere dotata di strumenti di pulizia disponibili e accessibili.




Figura 8 - Esempi di idonea dogana danese

10.3	Presenza di calzature dedicate per ogni singolo capannone*
------	--

Verificare che ciascuna dogana danese sia dotata di calzature dedicate in un numero commisurato alla presenza di personale giornalmente impiegato nell'attività di governo degli animali. Si suggerisce di utilizzare calzature colorate o numerate con l'identificativo di ciascun capannone.



Figura 9 - Esempio di calzature dedicate

Strutture capannoni	
10.4	Presenza di adeguate chiusure dei capannoni (serrature, lucchetti, ecc.)
Verificare che gli ingressi e le aperture dei capannoni siano dotati di adeguati sistemi di chiusura tali da impedire accessi non consentiti ad estranei.	
10.5	Pavimento, pareti e soffitti sono lavabili, disinfettabili e mantenuti in buono stato di manutenzione*

Verificare che tutte le superfici dei capannoni (pavimenti, soffitti e pareti) non presentino soluzioni di continuo (fratture, crepe, piccole discontinuità), che siano in un buono stato di manutenzione e che siano realizzate in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fatta eccezione per i parchetti esterni.




Figura 10 - Caratteristiche strutturali idonee (in alto) e non idonee (in basso) a causa della presenza di numerose crepe sul pavimento

10.6	Sono presenti adeguati sistemi volti ad impedire l'accesso ai volatili (es. reti antipassero, cupolino protetto) su tutte le aperture del capannone*
------	--

Verificare che in corrispondenza delle aperture dei locali verso l'esterno siano presenti barriere fisiche atte a evitare l'ingresso di uccelli selvatici e sinantropi. Anche la presenza di sistemi danneggiati e quindi non adeguati comporta una risposta negativa. Verificare i punti di raccordo tra finestra e pareti; in particolare se sono presenti sistemi ancoraggio delle finestre che attraversano le reti, controllare che le dimensioni dei fori di passaggio non siano maggiori del necessario. Per il cupolino è necessario che la protezione con rete avvenga dall'esterno. Devono essere posizionate reti antipassero su tutte le aperture fatta eccezione per i capannoni dotati di parchetti esterni degli allevamenti siti in zone non a rischio: questi devono in ogni caso garantire la separazione tra uccelli selvatici ed il pollame, così come l'efficace copertura di mangiatoie e punti di abbeverata.



Figura 11 - Esempio di reti anti-passero idonee (in alto) e non idonee (in basso) a causa della presenza di numerose soluzioni di continuo nella rete stessa

10.7	La ventilazione è esclusivamente forzata (estrattiva)
------	---

Verificare che all'interno dei capannoni sia impiegato esclusivamente un sistema di ventilazione forzata (e che pertanto il sistema di areazione non consista meramente in un sistema di ventilazione passiva mediante, ad esempio, apertura delle fenestrate).

10.8	Le prese d'aria sono in uno stato di pulizia soddisfacente
------	--

Verificare che le prese d'aria non presentino accumulo eccessivo di sporcizia come polvere, ragnatele, materiale organico in dipendenza della fase del ciclo produttivo, ovvero l'evidenza di sporcizia, anche minima, dopo la pulizia e disinfezione del capannone e immediatamente prima dell'accasamento di nuovi gruppi, non è accettabile.

10.9	Sono presenti sistemi per la riduzione della dispersione delle polveri
------	--

Gli allevamenti avicoli ordinari di capacità superiore a 250 capi situati all'interno delle zone ad alto rischio A e B adottano, ove possibile e in particolare se posti ad una distanza inferiore a 1000 mt da

altri allevamenti della stessa tipologia, sistemi finalizzati alla riduzione della dispersione nell'ambiente delle polveri in uscita da capannoni con ventilazione ad estrazione forzata quali ad esempio barriere naturali/artificiali tra due allevamenti o nebulizzatori in corrispondenza delle ventole di estrazione.

Aree di stoccaggio dei materiali d'uso	
10.10	Presenza di una o più locali/aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettieri vergini ecc.), adeguatamente protette in modo da evitare contatti con l'avifauna selvatica (es. magazzino)*

Verificare che tutti i locali adibiti allo stoccaggio dei materiali che vengono utilizzati durante il ciclo di allevamento siano dotati di idonei sistemi di chiusura e che escludano la possibilità che l'avifauna selvatica possa venirvi a contatto (ad eccezione dei silos). Tale precauzione può non ritenersi necessaria per attrezzatura che viene usata a fine ciclo o in momenti in cui non sono presenti animali (Carica tacchini, spazzolatrice ecc). è sempre buona norma prevedere/consigliare una disinfezione dell'attrezzatura prima dell'utilizzo.

SEZIONE 11: DEPOSITO RIFIUTI E ALTRI MATERIALI (SEZIONE 12 PER OVAIOLE E RIPRODUTTORI GALLUS GALLUS)

L'area di pertinenza dell'allevamento dovrebbe essere mantenuta in modo idoneo libera da oggetti, attrezzi e materiali non collegati all'attività di allevamento in modo da impedire che vi si annidino animali infestanti.

11. DEPOSITO RIFIUTI E ALTRI MATERIALI	
11.1	Presenza di idonei contenitori protetti per il deposito dei rifiuti in prossimità della barriera*

Verificare la presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della barriera.

11.2	L'area circostante i capannoni è mantenuta in condizioni idonee con erba tagliata e priva di oggetti e materiali non pertinenti*
------	--

Verificare che il perimetro esterno dei capannoni si presenti in uno stato di manutenzione idonea, che non siano presenti accumuli di foglie e detriti, che l'erba sia tagliata con frequenza appropriata, e che l'area sia ordinata e che non venga utilizzata come deposito (anche solo temporaneo) di attrezzi, materiali, suppellettili e altri oggetti non pertinenti (per almeno 2 metri).



Figura 12 – Esempi di area circostante non idonea (a sinistra – presenza di attrezzi non pertinenti e erba in stato di incuria) e idonea (a destra – assenza di oggetti superflui, manto erboso correttamente mantenuto)

SEZIONE 12: ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI (SEZIONE 13 PER OVAIOLE E RIPRODUTTORI GALLUS GALLUS)

La gestione igienico-sanitaria degli ambienti, dei locali, delle superfici e dei materiali rappresenta un punto chiave nella prevenzione e nella lotta ai pericoli biologici.

12. PULIZIA E DISINFEZIONE (SEZIONE 13 PER OVAIOLE)

12.1

Il sistema di lavaggio, pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e delle attrezzature è adeguato e prevede l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia*

Verificare che il sistema di lavaggio implementato per la pulizia dei locali sia adeguato al contesto presso cui è installato. Verificare, ad esempio, la disponibilità dei punti di acqua corrente e di disinfettanti efficaci al fine delle procedure di disinfezione.

È importante verificare che i prodotti disinfettanti impiegati per le operazioni di pulizia consentano di garantire una adeguata sanificazione delle superfici (es. composti clorati, composti quaternari di ammonio, acido acetico, perossido di idrogeno, formaldeide, fenoli ecc.) e verificare inoltre che gli stessi vengano adoperati nel rispetto delle indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto e che siano conservati in spazi idonei. Verificare che vi sia una fornitura periodica di prodotti disinfettanti e che non vengano utilizzati prodotti scaduti.

Una adeguata ed efficace pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature non può prescindere dall'efficacia delle singole fasi; ovvero la sola disinfezione non è sufficiente se prima non viene rimossa la polvere e/o l'eventuale materiale organico presente attraverso una accurata pulizia e/o lavaggio; infatti la permanenza di materiale organico impedirebbe il raggiungimento di una concentrazione efficace di biocida cui sono esposti i microrganismi, favorendo la selezione di batteri resistenti. La pulizia può essere effettuata anche a secco con una spazzolatura molto accurata, tuttavia in caso di focolaio di influenza il manuale operativo prevede che vi siano ripetuti lavaggi con acqua e successive disinfezioni.

12.2	L'allevamento rispetto l'obbligo di presenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo dei capannoni*
------	---

Verificare se sono presenti vasche e canaline atti a raccogliere le acque reflue dalle operazioni di lavaggio. Questo requisito è obbligatorio per i nuovi insediamenti e in quelli oggetto di ristrutturazione. Il quesito non è applicabile (NA) se l'allevamento è preesistente senza pozzetti e non è oggetto di ristrutturazione.

12.3	Le attrezzature, una volta pulite e disinfettate, vengono correttamente gestite e stoccate in un luogo protetto (tettoia o magazzino) in modo da evitare la successiva contaminazione*
------	--

Verificare che gli attrezzi utilizzati per lo svolgimento delle operazioni di pulizia, una volta puliti e disinfettati, quando non ne viene fatto uso, siano gestite e stoccate in un luogo protetto. In ogni caso lo scambio delle attrezzature deve essere limitato a situazioni eccezionali: le attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo non devono essere condivise con altri allevamenti di pollame.

12.4	Presenza di una procedura scritta che descriva modalità operative, responsabilità e modalità di verifica relative a pulizia e disinfezione di strutture, attrezzature, automezzi di proprietà o in uso all'interno dell'allevamento e materiali quando pertinente*
------	--

Verificare se è presente una procedura documentale (nella quale vengono identificate una o più figure responsabili) in cui vengano dettagliate tutte le fasi della pulizia e disinfezione compresa quella delle attrezzature e modalità d'uso delle stesse, quando previsto (ad esempio pressione e portata della lancia schiumatrice, utilizzo di acqua calda o fredda ecc...); verificare anche la data dell'ultimo aggiornamento della procedura e se il documento è facilmente accessibile e recuperabile dal personale aziendale; verificare che a completamento delle operazioni di disinfezione vi sia un sistema documentale che fornisca al controllore delle evidenze circa le operazioni effettuate per ciascun ciclo di allevamento.

Tele procedura deve contemplare l'avvenuta pulizia di:

- Automezzi che accedano all'area di allevamento (Automezzi destinati al trasporto dei volatili verso impianti di macellazione (puliti e disinfettati presso il macello dopo ogni scarico); Automezzi destinati al trasporto di animali vivi (puliti e disinfettati dopo ogni scarico o comunque prima del carico successivo presso il macello o struttura idonea comunicata all'ASL competente); Automezzi destinati al trasporto delle uova (puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio, l'incubatoio o altra struttura idonea identificata); Automezzi che trasportano il mangime (disinfettati prima di entrare nel mangimificio, e lavati e disinfettati presso il mangimificio o altra struttura almeno con cadenza settimanale); Automezzi che trasportano la pollina (puliti e disinfettati dopo ogni scarico o comunque prima di accedere all'allevamento. Devono essere attrezzati di modo da non disperdere materiale durante il tragitto. Il materiale trasportato deve essere completamente coperto). Nel caso di ripetuti carichi di pollina nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare la pulizia e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento);
- Materiale non monouso e attrezzature utilizzate per il trasporto (ad esempio contenitori e imballi per uova, bancali e gabbie da trasporto); Nel caso di gabbie per il trasporto animali deve essere

predisposto un protocollo di sanificazione e disinfestazione, approvato dalla ASL competente, e inserito nel manuale di autocontrollo dello stabilimento (se previsto) la cui effettiva applicazione deve poter essere verificabile;

- Attrezzature utilizzate per la pulizia e disinfezione dei locali di allevamento;
- Locali e attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo incluse quelle per operazioni svolte al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra un capannone e l'altro, fresatrici, muletti, ecc.);
- Del grigliato presente nei capannoni, nel caso specifico delle galline ovaiole. La pavimentazione su cui gli animali stabulano va igienizzata correttamente ad ogni fine ciclo in modo che non permangano residui di materiale sul grigliato che, al successivo accasamento, potrebbero essere fonte di proliferazione batterica e incidere sulla salute degli animali. Verificare l'efficacia della procedura per la pulizia e la sanificazione del grigliato. A fine ciclo il grigliato deve essere rimosso dal capannone, e prima della successiva immissione questo va lavato e disinfettato in condizioni di sicurezza senza che vi siano situazioni di rischio per poi essere immesso nel capannone. Attrezzature con costi rilevanti (es. macchina per caricare i tacchini, trattore, ecc.) che, previa concessione dal servizio veterinario, vengono condivise con altri stabilimenti.

12.5	L'operatore conserva per almeno 12 mesi la documentazione di avvenuta pulizia e disinfezione degli automezzi provenienti da altri stabilimenti e la rende disponibile per le eventuali verifiche da parte dell'autorità competente*
------	---

La verifica della documentazione di pulizia e disinfezione viene effettuata dall'Autorità competente mediante controllo a campione.

12.6	È rispettato periodo di vuoto biologico*
------	--

Verificare, tramite controllo documentale, che il vuoto biologico minimo per allevamento/capannone (inteso come tempo intercorrente tra il carico degli animali per il macello e il successivo accasamento) sia rispettato come segue (Decreto Ministeriale 30 maggio 2023):

Giorni	Specie avicola
7 giorni	Polli da carne
8 giorni	Allevamenti di svezzamento
14 giorni	Selvaggina da penna, galli golden e livornesi, capponi, faraone destinate alla produzione di carne, quaglie, piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento accrescimento
21 giorni	Tacchini*, anatidi destinati alla produzione di carne, riproduttori di qualsiasi specie e galline ovaiole (sia in fase pollastra che in fase deposizione)

*(ridotto a 14 giorni se l'allevamento si trova in un'area non inclusa nell'elenco delle zone ad alto rischio come definite nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019)

Se nel medesimo stabilimento siano detenute specie avicole per le quali è previsto il vuoto biologico per stabilimento e altre per le quali è previsto il vuoto biologico per capannone, deve essere garantito il vuoto biologico per stabilimento.

Eventuali deroghe possono essere concesse da parte del servizio veterinario competente sullo stabilimento nel caso di allevamenti non situati nelle zone a alto rischio, alle condizioni di riportate nel Decreto 30 maggio 2023.

12.7	È rispettato periodo di vuoto sanitario*
------	--

Verificare, tramite controllo documentale, che il vuoto sanitario minimo (inteso come tempo intercorrente tra la fine dello svolgimento delle operazioni di pulizia e il successivo accasamento) sia pari ad almeno 3 giorni.

12.8	Le operazioni di pulizia/disinfezione sono a carico di una ditta esterna specializzata
------	--

Verificare se le operazioni di pulizia e disinfezione vengono affidate ad una ditta esterna o se vengono svolte dal personale addetto dell'allevamento.

SEZIONE 13: GESTIONE DEGLI ANIMALI (TACCHINI E BROILER)

Nel complesso, anche la gestione degli animali riveste un ruolo molto importante poiché talune pratiche sono in grado di limitarne il benessere e pertanto potrebbero inficiare l'immunocompetenza e lo stato di salute dei soggetti presenti in allevamento.

13. GESTIONE ANIMALI	
13.5	Presenza di reti o altri sistemi di protezione nel caso di apertura portoni per circolazione aria in stagioni calde

Verificare se in corrispondenza delle aperture del capannone verso l'esterno sono presenti reti o barriere finalizzate a favorire la ventilazione in estate e, allo stesso tempo, evitare che i soggetti allevati possano venire in contatto con avifauna selvatica.

SEZIONE 14: ANIMALI MORTI (SEZIONE 15 PER OVAIOLE E RIPRODUTTORI *GALLUS GALLUS*)

La presenza di capi morti va gestita in modo accurato poiché, a prescindere dalle cause di morte, essi possono fungere da fonte di infezione, diretta o indiretta, per gli altri animali presenti nell'allevamento. Inoltre l'inadeguata gestione delle carcasse potrebbe attirare animali selvatici e altri animali indesiderati che possono fungere da vettori, ed essere fonte di esposizione non solo per allevamento oggetto di verifica ma anche per allevamenti confinanti. Pertanto la presenza, lo smaltimento e la tracciabilità delle carcasse devono essere gestite in maniera igienico-sanitaria idonea, rimuovendo gli animali morti quanto prima dal capannone e stoccandoli in celle frigorifere dedicate.

14. ANIMALI MORTI	
14.1	Presenza di idonea cella di congelamento all'esterno dell'area di allevamento**

Verificare che la cella frigorifera sia localizzata all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in un'area dedicata. Qualora le celle siano collocate all'interno dell'area di allevamento l'operazione di carico deve avvenire o ad allevamento vuoto prima che abbia inizio il periodo di vuoto sanitario o senza che gli automezzi entrino all'interno dell'area stessa. Per i nuovi allevamenti è obbligatorio il posizionamento delle celle fuori dal perimetro dell'area di allevamento.

14.2	L'area antistante e sottostante le celle è in materiale facilmente lavabile e disinfettabile*
------	---

L'area antistante e sottostante le celle deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.



Figura 13 - Esempio di cella di congelamento priva di un'area antistante lavabile e disinfettabile e quindi non idonea (a sinistra) e di cella idonea (a destra)

14.3	La gestione dei sottoprodotti di origine animale (carcasse pollame) è conforme*
------	---

Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Nel caso specifico degli allevamenti di altre specie, la gestione dei sottoprodotti deve essere conforme anche per uova e derivati. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti a condizione che l'operazione di carico avvenga all'esterno dell'allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate. Al termine di ogni ciclo di allevamento, o anche più volte nel corso del ciclo produttivo nel caso di celle collocate all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa. Verificare che la cella frigo sia funzionante e di dimensioni sufficienti a contenere un quantitativo di animali morti durante un ciclo (nei casi previsti negli allevamenti da ingrasso).

Nei casi specifici di seguito elencati, il ritiro degli animali morti può essere effettuato durante il ciclo a talune condizioni:

- Episodi di mortalità eccezionale (a patto che il veterinario ufficiale escluda la presenza del virus dell'influenza aviaria). In questo caso il veterinario ufficiale, anche effettuando opportuni prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria (secondo il manuale operativo IA vigente), accerta che la causa non sia imputabile a malattie infettive denunciabili e rilascia il certificato per

il ritiro delle carcasse. Tale procedura è obbligatoria anche qualora la mortalità eccezionale interessi allevamenti in cui le celle siano collocate all'esterno dell'allevamento.

- Superficie totale dei locali di allevamento superiore a 10.000 metri quadri, in allevamenti a ciclo lungo (riproduzione), allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole) e gli svezzatori (a condizione che le celle siano posizionate all'esterno dell'area di allevamento). Detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese, posizionate in modo che l'automezzo non acceda all'area di allevamento.

14.4	Sono presenti le bolle di ritiro presso l'allevamento
------	---

Verificare che in allevamento siano presenti le bolle documentali attestanti l'avvenuto ritiro dei sottoprodotti di origine animale.



Figura 14 – Cella frigo non idonea poiché situata in area non dedicata



Figura 15 – Cella frigo idonea poiché riparata e situata in un'area visibilmente dedicata

SEZIONE 15: GESTIONE LETTIERA VERGINE (TACCHINI E BROILER)

La lettiera vergine va correttamente stoccata in modo che non sia esposta alla contaminazione da parte di agenti biologici che quindi potrebbero poi essere introdotti all'interno dei capannoni. Operazioni come la fresatura, pur contribuendo a garantire il rispetto del benessere animale e assicurando un ambiente igienicamente idoneo dal punto di vista della qualità dell'aria e del grado di umidità della lettiera, rappresentano un potenziale rischio in quanto prevedono l'accesso al locale. Qualora queste operazioni venissero fatte le frese dovrebbero essere introdotte in sicurezza o comunque dovrebbero essere dedicate al singolo capannone e custodite al suo interno.

15. GESTIONE LETTIERA VERGINE	
15.1	La lettiera vergine viene stoccata in un luogo coperto e chiuso e ad uso esclusivo

Verificare se è presente un'area dedicata, che non presenta comunicazioni con l'esterno, in cui viene immagazzinata solo e soltanto la lettiera vergine.



Figura 16 – Lettiera vergine stoccata in luogo coperto e chiuso

15.2	Viene effettuata fresatura durante il ciclo
------	---

Verificare che la fresa utilizzata sia correttamente gestita ovvero che non sia fonte di inquinamenti dall'esterno.

15.3	Viene aggiunta lettiera durante il ciclo
------	--

Verificare se nell'arco del ciclo di allevamento gli addetti sono soliti introdurre nuova lettiera.



Figura 17 - A sinistra: gestione idonea della lettiera vergine poiché mantenuta in locale richiudibile. A destra: gestione non idonea della lettiera vergine poiché mantenuta all'interno di locale comunicante direttamente con l'esterno

SEZIONE 16: GESTIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO (TACCHINI E BROILER)

La lettiera a fine ciclo (pollina) deve essere correttamente gestita e smaltita poiché rappresenta, una potenziale fonte di pericoli biologici che possono essere quindi reintrodotti nell'allevamento e rappresentare una fonte di esposizione anche per allevamenti confinanti attraverso animali selvatici che possono fungere da veicolo.

16. GESTIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO

16.1	La lettiera a fine ciclo viene stoccata
------	---

Verificare che alla fine di ciascun ciclo di allevamento la lettiera venga stoccata in un'area dedicata ed esclusiva, verificare la presenza di una platea di stoccaggio.

16.2	La gestione della lettiera a fine ciclo è corretta*
------	---

Per allevamento di broiler e tacchini il ritiro della pollina avviene a fine ciclo e con allevamento vuoto, pertanto il quesito si considera conforme anche in tale situazione.

Verificare che le modalità di gestione e trattamento della lettiera a fine ciclo siano idonee, ovvero essere che sia stoccata in uno spazio dedicato, coperto e inaccessibile, di modo tale da evitare il contatto diretto con fauna selvatica (in particolar modo volatili). La protezione della lettiera a fine ciclo può avvenire mediante l'utilizzo di apposite misure quali, ad esempio, reti anti-passero installate in tutti possibili punti d'ingresso. Verificare anche se esiste una procedura interna che preveda dei tempi di maturazione della lettiera prima del suo utilizzo agronomico e se sono previste attenzioni particolari nel caso in cui la lettiera residui da un gruppo di animali risultato positivo ad un sierotipo di salmonella rilevante per la salute pubblica. La mancanza di tempi precisi per la maturazione della lettiera prima del suo utilizzo e di procedure specifiche in caso di positività per salmonella non influisce sulla correttezza della gestione in quanto non è prevista una norma che dettagli questi due aspetti; si suggerisce comunque di acquisire informazioni in merito in quanto una scarsa attenzione rispetto alla gestione di questi aspetti potrebbe essere causa di recidive di salmonella nell'allevamento.

16.3	A fine ciclo la lettiera viene smaltita tramite ditta autorizzata
------	---

Verificare se, a fine ciclo, lo smaltimento della lettiera viene affidato ad una ditta autorizzata controllando il documento commerciale ai sensi del Reg.1069/2009.

16.4	A fine ciclo la lettiera è smaltita tramite smaltimento agronomico autorizzato in campi di proprietà
------	--

Verificare se, a fine ciclo, la lettiera viene smaltita tramite spandimento su campi di proprietà dell'allevatore.

SEZIONE 17: REGISTRI

Ai fini di monitorare i flussi di persone, mezzi e animali che accedono all'allevamento, è importante che siano presenti i relativi registri correttamente compilati. Ciò permette di risalire agilmente, qualora si verificano casi di malattia infettiva, a tutti i soggetti che hanno transitato nell'allevamento di modo da contenere l'estendersi della malattia anche presso altre aziende.

17. REGISTRI

17.1	È presente un registro compilato e aggiornato (preferibilmente informatizzato), di tutti i movimenti in ingresso e in uscita del personale autorizzato, automezzi, animali e attrezzature*
------	--

Verificare se il personale autorizzato (dipendente e non), automezzi, animali e attrezzature vengono puntualmente identificati e annotati all'interno di un registro apposito. La registrazione ha valore informativo e deve comprendere: data della visita, nome e cognome del visitatore, targa del mezzo, n° documento identità, motivazione della visita, provenienza e destinazione, orario d'ingresso e orario d'uscita. Da segnalare che ai sensi del Decreto Ministeriale 30 maggio 2023 anche ditte e soggetti che forniscono servizi agli allevamenti (vaccinazione, carico animali ecc.) sono tenuti alla registrazione informatizzata che deve contenere movimentazione personale (con date) e stabilimenti in cui questo ha operato.

DATA	ORA INGRESSO	ORA USCITA	NOME/COGNOME	DOCUMENTO D'IDENTITÀ	MOTIVO DELLA VISITA	PROVENIENZA	DESTINAZIONE	TARGA DEL MEZZO

Figura 18 - Esempio di registro completo

17.2	È presente un registro mortalità degli animali correttamente compilato e aggiornato*
------	--

Verificare se è presente un registro all'interno del quale sono annotati i valori di mortalità degli animali per ciascun ciclo di allevamento, differenziandolo dal numero di animali abbattuti. Ogni scostamento dalla mortalità fisiologica va tempestivamente comunicato al servizio veterinario della ASL territorialmente competente.

17.3	Presenza di una procedura scritta che preveda la gestione dei flussi comunicati e operativi in caso di emergenza epidemica o insorgenza di sospetti di malattie infettive (IA, etc)*
------	--

L'operatore deve essere in possesso di una procedura redatta dalla filiera di appartenenza (se in filiera), che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo n. 136/2022. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità e modalità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ASL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione.

17.4	L'operatore conserva le prove di acquisto di materiali (tute, calzari, ecc.) e dei disinfettanti*
------	---

L'operatore deve conservare le prove di acquisto di materiali quali calzari, abiti e disinfettanti al fine di sostanziare il loro utilizzo secondo le procedure previste.

SEZIONE 18: PROCEDURA DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

Gli animali infestanti, quali ratti, topi, insetti o altri animali nocivi possono fungere da vettori di pericoli biologici, soprattutto in caso di gestione non idonea delle aree circostanti l'allevamento, pertanto è necessario adottare degli opportuni piani di lotta la cui efficacia deve essere dimostrata.

18. PROCEDURA DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	
18.1	È presente e attuato un piano aziendale di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi*

Deve essere attuato e documentato un piano aziendale di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi. Nella procedura deve essere registrato, di volta in volta, lo svolgimento delle operazioni di verifica di derattizzazione e disinfestazione. Verificare che lo stesso documento rechi data e firma dell'operatore (controllando i rapporti della ditta esterna o il piano di controllo gestito direttamente dall'allevatore).

Il piano deve contenere:

- schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- piantine di distribuzione delle stazioni di controllo e delle esche che devono essere chiuse o coperte;
- registri di controllo con le date e le attività svolte;

18.2	L'attività di disinfestazione/derattizzazione è gestita da una ditta esterna
------	--

Verificare se i piani di lotta agli infestanti sono affidati ad una ditta esterna specializzata (controllare eventuali contratti con ditte esterne) o se sono direttamente gestiti dagli addetti dell'allevamento.

18.3	Evidenza diretta/indiretta (es: feci) di ratti/topi o altri animali nocivi
------	--

Verificare l'eventuale presenza di feci e/o altri segni suggestivi della presenza di animali infestanti in allevamento (carcasce, intaccamento di esche, morsicatura di fili ecc.).

SEZIONE 19: ALTRE ATTIVITÀ

Qualora il proprietario dell'allevamento avicolo oggetto di verifica svolga anche attività agricole o venatorie o sia proprietario di altri allevamenti di altre specie, è necessario eseguire una analisi del rischio che tenga conto anche di queste attività collaterali, andando a verificare quali altre specie vengono detenute e quale è il grado di separazione tra gli allevamenti.

19. ALTRE ATTIVITÀ

19.1	Attività agricola del conduttore
------	----------------------------------

Verificare se l'allevatore svolge anche attività agricola.

19.2	Esiste una netta separazione tra le due diverse attività
------	--

Verificare se le due attività sono separate in modo netto, ovvero anche se sono contigue, non vi sono flussi di persone e/o mezzi tra l'una e l'altra.

19.3	L'allevatore o i dipendenti si dedicano all'attività venatoria o di pesca
------	---

Verificare se l'allevatore o i dipendenti sono soliti esercitare l'attività della caccia e della pesca.

19.4	Nell'allevamento sono presenti tacchini e/o selvaggina da penna e/o riproduttori*
------	---

Le seguenti attività devono essere le uniche presenti all'interno di uno stabilimento con capacità superiore ai 250 volatili: allevamento di selvaggina da penna per ripopolamento, allevamento di tacchini da carne, allevamenti con orientamento produttivo da riproduzione delle diverse specie animali ad eccezione degli allevamenti a ciclo completo con incubato.

19.5	Altri allevamenti di proprietà dell'allevatore o di familiari
------	---

19.6	Specificare la specie avicola
------	-------------------------------------

19.7	Altri allevamenti di suini di proprietà dell'allevatore o di familiari
------	--

19.8	Altri allevamenti di altri mammiferi di proprietà dell'allevatore o di familiari
------	--

19.9	Specificare la specie
------	-----------------------------

Verificare se l'allevatore o uno o più familiari sono proprietari di altre aree destinate all'allevamento di animali e annotare, in caso di risposta positiva, quali specie animali vengono detenute.

19.10	L'allevatore possiede o gestisce impianti di biogas
-------	---

Verificare se l'allevatore è proprietario o gestore di un impianto di biogas deputato alla digestione anaerobia di biomasse vegetali, deiezioni pollina e scarti animali.

SEZIONE 20: STATO SANITARIO

20. STATO SANITARIO

20.1	L'allevamento presenta un problema di recidive per <i>Salmonella</i> spp.
------	---

Verificare attraverso gli esiti degli autocontrolli e dei controlli ufficiali nell'ambito del Piano nazionale di controllo delle salmonellosi se nello stesso capannone e/o in capannoni diversi è stato isolato per più di due cicli successivi lo stesso sierotipo di salmonella.

SEZIONE 21: AREE ALL'APERTO

21. AREE ALL'APERTO

Allevamenti ordinari avicoli all'aperto

21.1	Il pollame viene allevato in un luogo delimitato da un'adeguata recinzione con aree di alimentazione e abbeverata protette da idonea copertura*
------	---

I capannoni dotati di parchetti esterni degli allevamenti siti in zone non a rischio garantiscono la separazione tra uccelli selvatici ed il pollame, così come l'efficace copertura di mangiatoie e punti di abbeverata.

21.2	L'acqua di abbeverata proviene da serbatoi di superficie*
------	---

L'acqua di abbeverata non deve provenire da serbatoi di superficie (viene utilizzata acqua pulita).

21.3	Sono presenti corsi e/o ristagni stabili d'acqua*
------	---

Non devono essere presenti, per quanto possibile, corsi e/o ristagni stabili d'acqua.

21.4	Sono presenti strutture e superfici che, se richiesto dall'autorità competente in relazione a particolari situazioni epidemiologiche, sono in grado di ospitare gli animali al coperto dove la copertura (rete) può essere utilizzata solo per la delimitazione laterale*
------	---

Qualora richiesto dall'autorità competente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche, i volatili non devono essere tenuti all'aperto. Al fine di garantire quanto sopra, devono essere presenti strutture e superfici in grado di ospitare gli animali al coperto nel periodo a rischio garantendo il benessere animale. Solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale. Tale requisito è obbligatorio per tutti gli allevamenti avicoli ricadenti nelle zone ad alto rischio. Le regioni con zone ad alto rischio possono rendere obbligatorio tale requisito per tutti i nuovi allevamenti avicoli all'aperto o riconversioni in tale modalità di allevamento siti sul territorio regionale. In particolari situazioni epidemiologiche l'autorità competente può rendere obbligatorie tali disposizioni, laddove applicabili, anche per gli allevamenti familiari all'aperto.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI DI POLLI DA CARNE

13.1 GESTIONE ANIMALI

13.1	Viene effettuato lo sfoltimento durante il ciclo
------	--

Verificare se durante il ciclo di allevamento viene eseguita la pratica dello sfoltimento, la quale consiste nel carico scaglionato, generalmente delle femmine a 30-35 giorni di età (e dei maschi in un secondo ed eventualmente terzo momento), nel caso degli allevamenti a sessi misti, ma tale procedura può essere attuata (per una o più volte) anche in allevamenti monosesso (maschi e femmine) per esigenze commerciali.

13.2	Viene effettuato l'accasamento esclusivamente di pulcini di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio*
------	--

Negli allevamenti di polli da carne, di pollastre di ovaiole da consumo, di pollastre da riproduzione e

di tacchini da carne, è consentito esclusivamente l'accasamento di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

13.3	Viene effettuato di routine lo spostamento di gruppi di animali da un capannone all'altro**
------	---

Divieto di spostamento di gruppi di animali da un capannone all'altro dell'allevamento salvo le situazioni eccezionali in cui è strettamente necessario e attraverso l'utilizzo di mezzi adeguati evitando il contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare e delle superfici esterne ai capannoni interessati.

13.4	Vengono effettuati carichi multipli**
------	---------------------------------------

Negli allevamenti di tipo ordinario sono vietati i carichi multipli da diverse aziende. Una deroga può essere concessa dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente se i carichi multipli non avvengono in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato ai fini di svuotare l'azienda.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI DI TACCHINI

13.1 GESTIONE ANIMALI

13.1	Viene effettuato l'accasamento esclusivamente di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio**
------	---

È consentito esclusivamente l'accasamento di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio. In deroga al precedente punto la ASL competente può autorizzare, limitatamente a situazioni eccezionali che esulano dalla routinaria prassi di allevamento, l'accasamento di tacchinotti di età superiore a un giorno ad esclusione degli stabilimenti posti nelle zone ad alto rischio.

13.2	Lo spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni è limitato a situazioni eccezionali, che esulano dalla routinaria prassi di allevamento**
------	---

Lo spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni è limitato a situazioni eccezionali, che esulano dalla routinaria prassi di allevamento, fatta salva la presenza di strutture che consentono il passaggio da un capannone all'altro senza contatto con l'area esterna ai capannoni e deve essere effettuato con mezzi adeguati, evitando il contatto diretto o indiretto con selvatici e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare e delle superfici esterne ai capannoni interessati (vedi dettagli nel successivo quesito 13.4). L'accasamento a sessi misti per allevamento, non consentito all'interno delle zone B, dovrà prevedere la separazione degli animali all'interno dello stesso capannone in modo che, dopo il carico delle femmine, non sia necessario spostare i maschi.

13.3	L'invio dei tacchini al macello viene effettuato garantendo lo svuotamento dell'allevamento nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni e di ciascun capannone nell'arco di un tempo massimo di 36 ore**
------	--

L'invio dei tacchini al macello deve essere effettuato garantendo lo svuotamento dell'allevamento nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni e di ciascun capannone nell'arco di un tempo massimo di 36 ore. Non sono consentiti carichi di animali provenienti dallo svuotamento parziale di più capannoni. In deroga al precedente punto la ASL competente può autorizzare l'invio degli animali


macello in più soluzioni, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle zone B.

13.4	La gestione della pulcinaia è adeguata**
------	--

Nelle zone individuate ad alto rischio A e B in presenza di una situazione epidemiologica a rischio è consentito l'utilizzo della pulcinaia unica come alternativa all'accasamento per singolo capannone solo se il successivo spostamento dei tacchinotti tra pulcinaia e capannone viene effettuato entro il trentesimo giorno di età con una struttura che garantisca che non ci sia alcuna soluzione di continuità tra i due ambienti evitando il contatto degli animali con l'area esterna, e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare.

Gli elementi costitutivi e i criteri gestionali delle strutture sopramenzionate devono essere i seguenti: presenza di una struttura fissa o mobile di collegamento tra due capannoni (pulcinaia e capannone per completare il ciclo produttivo) costituita da un tunnel rigido completamente chiuso, privo di discontinuità e con nastro trasportatore all'interno che impedisca il contatto degli animali con la pavimentazione esterna. Il tunnel dovrà essere inserito ad incastro senza soluzione di continuità nel capannone tramite portelli a chiusura ermetica. Se trattasi di struttura mobile, questa dovrà essere adeguatamente disinfettata prima di essere riutilizzata (Figura 18). Ogni altra struttura fissa che consenta il passaggio da un capannone all'altro senza soluzione di continuità e senza contatto con l'area esterna ai capannoni è altresì ammissibile.

Figura 18 - esempio di tunnel mobili di collegamento tra i capannoni.



13.6	Vengono effettuati carichi multipli**
------	---------------------------------------

Negli allevamenti di tipo ordinario sono vietati i carichi multipli da diverse aziende. Una deroga può essere concessa dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente se i carichi multipli non avvengono in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato ai fini di svuotare l'azienda.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE E RIPRODUTTORI *GALLUS GALLUS*

11. GESTIONE UOVA

Sala uova

11.1	Sono presenti incrostazioni di residui di uova (gusci/tuorlo/albume) sul pavimento e/o sui macchinari
------	---

Verificare che il pavimento e i macchinari presenti nella sala uova non presentino incrostazioni riconducibili a residui di uova e indicativi di misure di pulizia eseguite con scarsa frequenza e/o efficacia. verificare che l'imbrattamento delle superfici sia compatibile con l'attuale attività lavorativa e non indice di scarsa igiene.

Centro di imballaggio/centro lavorazione uova/deposito annesso ad allevamento

11.2	È presente un centro di imballaggio (funzionalmente e strutturalmente annesso all'allevamento)
------	--

Verificare se il centro d'imballaggio è un ambiente direttamente annesso all'allevamento o se invece si trova al di fuori dell'area di allevamento.

11.3	È presente un lavandino dotato di sapone e asciugamano nella sala uova*
------	---

Verificare che nella sala uova sia presente un lavabo correttamente funzionante e in buono stato di manutenzione, corredato di idonei detergenti per le mani (saponi) e appropriati dispositivi di asciugatura (asciugamani, salviette monouso ecc.).

11.4	Non riceve e lavora uova anche da altri allevamenti di volatili e/o centri di imballaggio**
------	---

Verificare se al centro d'imballaggio oggetto della presente verifica confluiscono uova provenienti da più allevamenti. Inoltre nei centri di imballaggio, nei centri di lavorazione uova e nei depositi annessi ad allevamento è vietato ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o centri di imballaggio.

In deroga, i centri di imballaggio, i centri di lavorazione uova e i depositi annessi ad allevamenti, che lavorano fino a un massimo di 100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni. L'autorizzazione viene rilasciata dai servizi veterinari locali territorialmente competenti previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, che comunque dovranno essere monitorati almeno annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali.

11.5	Per l'imballaggio e il trasporto delle uova da consumo viene utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile*
------	---

Per imballaggio e trasporto uova deve essere utilizzato solo materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.

11.6	Sono utilizzati bancali in legno*
------	-----------------------------------

Verificare in quale materiale sono realizzati i bancali per il trasporto delle uova: è vietato l'utilizzo dei bancali di legno per centri di imballaggio annessi agli stabilimenti. Ne è consentito l'utilizzo per l'invio di uova esclusivamente verso centri di imballaggio non annessi ad uno stabilimento in cui sono detenuti animali, centri di lavorazione, depositi o clienti finali.

11.7	I materiali non provengono da altri stabilimenti annessi ad allevamenti di volatili*
------	--

Verificare che i materiali presenti al centro di imballaggio uova (es. bancali spediti per la pulizia e disinfezione), non provengano da altri stabilimenti annessi ad allevamenti di volatili.

11.8	Non vengono completati i carichi di uova su automezzi provenienti da altri allevamenti avicoli**
------	--

Nei centri di imballaggio, nei centri di lavorazione uova e nei depositi annessi ad allevamento è vietato completare il carico delle uova su automezzi provenienti da altri allevamenti.

In deroga, i centri di imballaggio, i centri di lavorazione uova e i depositi annessi ad allevamenti, che lavorano fino a un massimo di 100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni. L'autorizzazione viene rilasciata dai servizi veterinari locali territorialmente competenti previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, che comunque dovranno essere monitorati almeno annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali.

11.9	Non vengono caricate uova su mezzi che trasportano anche contenitori di uova e bancali, se non correttamente lavati e disinfettati**
------	--

Verificare se l'automezzo che consegna i materiali presso più allevamenti si occupa anche di effettuare il ritiro delle uova. Nei centri di imballaggio, nei centri di lavorazione uova e nei depositi annessi ad allevamento è consentito il carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per uova e bancali) a condizione che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati (valutare l'eventuale presenza di residui di guscio, tracce di uovo, presenza di pidocchi all'interno di

almeno 10 alveoli ispezionati casualmente).

In deroga, i centri di imballaggio, i centri di lavorazione uova e i depositi annessi ad allevamenti, che lavorano fino a un massimo di 100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni. L'autorizzazione viene rilasciata dai servizi veterinari locali territorialmente competenti previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, che comunque dovranno essere monitorati almeno annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali.

14. GESTIONE ANIMALI

Trasporto pollastre destinate all'allevamento di deposizione

14.1	Gli automezzi che trasportano le pollastre non hanno trasportato pollastre per altri allevamenti nello stesso viaggio
14.2	Le pollastre trasportate con un unico automezzo sono accasate in un unico capannone

Verificare se l'automezzo deputato al trasporto delle pollastre effettua le movimentazioni degli animali esclusivamente verso un singolo allevamento o se, nell'arco del medesimo viaggio, vengono consegnati capi a più aziende. Verificare inoltre se, all'accasamento delle pollastre, un unico automezzo trasporta animali che verranno accasati in un unico capannone e se uno stesso capannone accoglie animali trasportati con mezzi diversi.

14.3	In fase pollastra, viene effettuato l'accasamento esclusivamente di pulcini di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio*
------	---

Negli allevamenti di polli da carne, di pollastre di ovaiole da consumo, di pollastre da riproduzione e di tacchini da carne, è consentito esclusivamente l'accasamento di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

14.4	Per allevamenti da riproduzione in deposizione: gli animali non provengono e non sono stati destinati da/verso altri allevamenti da riproduzione**
------	--

Fatta eccezione per i galli, è vietato lo spostamento di pollame da stabilimenti da riproduzione in deposizione verso altri stabilimenti da riproduzione. Questa movimentazione può essere autorizzata in deroga dal servizio veterinario competente, in casi eccezionali opportunamente motivati. Tale quesito risulta non applicabile (NA) in caso di allevamento con indirizzo produttivo "riproduttori".

Carico animali per destinazione macello

14.5	L'allevamento effettua il tutto pieno/tutto vuoto
------	---

Verificare se, al termine del ciclo produttivo, vi è un periodo nel quale non sono più presenti animali in allevamento e vengono effettuate le idonee operazioni di pulizia prima di introdurre nuovamente animali nel capannone.

16. GESTIONE POLLINA

Trasporto

16.1	Uso agronomico
------	----------------

A fine ciclo, la pollina presente nel capannone può essere destinata direttamente allo smaltimento o venire stoccata in allevamento, nel rispetto della normativa vigente. Verificare se, nel caso di allevamenti a terra con lettiera permanente, la pollina a fine ciclo viene impiegata per uso agronomico.

16.2	Ditta specializzata
------	---------------------

Verificare se, nel caso di allevamenti a terra con lettiera permanente, la pollina a fine ciclo viene affidata ad una ditta specializzata e autorizzata per lo smaltimento. In tali tipologie di allevamento non essendo presenti sistemi di rimozione della pollina la lettiera resta nei locali di allevamento fino alla fine del ciclo di allevamento, diversamente nei sistemi in gabbia o in voliera esistono sistemi di rimozione che asportano la pollina e la stoccano in platea o in sistemi che la essicano.

16.3	Stoccata in concimaia
16.4	Destinata a biogas
16.5	Destinata a impianti di trasformazione
16.6	Frequenza di ritiro (n. ritiri/mese):

Verificare se, nel caso di allevamento in gabbia o in voliera, la pollina viene stoccata all'interno della concimaia presente in allevamento, se viene destinata ad impianto a biogas o se viene destinata ad impianti di trasformazione ed annotare la frequenza con la quale viene ritirata.

16.7	Il ritiro viene effettuato dall'allevatore
------	--

Verificare se l'allevatore stesso si occupa dello smaltimento della pollina dall'allevamento.

16.8	Il mezzo che ritira la pollina effettua trasporti per altri allevamenti avicoli nell'arco della stessa giornata**
------	---

Verificare se il mezzo adibito al ritiro della pollina effettua viaggi anche presso altri allevamenti avicoli (aumentando quindi il livello di rischio di diffusione patogeni da un'azienda all'altra) e se ciò avviene anche all'interno della stessa giornata. Tale operazione viene concessa nel caso in cui l'allevamento risulti vuoto.

16.9	Per i nuovi stabilimenti e per gli esistenti dove la situazione lo consenta, è presente un ingresso dedicato per il ritiro della pollina che permetta di non accedere all'area di allevamento*
16.10	Negli allevamenti preesistenti, in mancanza di un ingresso dedicato, sono presenti percorsi dedicati destinati agli automezzi per ritiro pollina che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento con superficie lavabile e disinfettabile*
16.11	In assenza di percorsi dedicati, viene garantita la disinfezione dei mezzi in entrata e uscita ed il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti*
16.12	Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, il carico della pollina viene effettuato all'esterno dell'allevamento*

Verificare se, nel caso la pollina non venga stoccata all'interno dell'allevamento ma sia smaltita mediante ditta autorizzata, gli automezzi deputati al trasporto possono evitare di accedere direttamente all'area di allevamento. Questo requisito è obbligatorio per i nuovi insediamenti e per gli esistenti dove la situazione lo consente. Per quelli esistenti, in caso negativo, valutare il percorso che gli automezzi devono compiere e verificare se si tratta di un percorso dedicato (dotato di superficie facilmente lavabile e disinfettabile) che permetta ai mezzi di circolare il meno possibile nell'area di allevamento. In caso il percorso per il ritiro della pollina non sia dedicato, verificare che i mezzi vengano correttamente igienizzati all'ingresso e all'uscita dall'allevamento e che i percorsi siano sempre mantenuti in buone condizioni igieniche. Nel caso ultimo in cui non sia possibile garantire una separazione ottimale delle attività e prevenire diminuzioni del livello di biosicurezza, verificare se il carico della pollina viene effettuato senza entrare nell'area di allevamento.

Stoccaggio	
16.13	lo stoccaggio della pollina avviene in uno spazio dedicato e coperto, al fine di impedire il contatto con l'avifauna selvatica*

Verificare che la pollina sia stoccata in maniera idonea in apposito spazio coperto e che impedisca il contatto con l'avifauna selvatica (specialmente volatili).

16.14	Viene garantita la possibilità, in condizioni di emergenze epidemiche, di stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate, per almeno 60 giorni*
-------	---

Verificare se, in caso di emergenze epidemiche, è presente una platea/barra locale con pavimentazione impermeabile in cui la pollina essa può essere mantenuta per almeno 60 giorni. Gli allevamenti in gabbia o voliera, al contrario di quelli a terra, non sono generalmente concepiti per stoccare quantità rilevanti di pollina, pertanto ciò rappresenta un ulteriore fattore di rischio.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI AVICOLI CON CAPACITÀ FINO A 250 CAPI

2. CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO

2.9	L'area di allevamento è correttamente definita
-----	--

L'area di allevamento dovrebbe presentare un'organizzazione formalizzata in planimetria limitando, per quanto possibile, le promiscuità tra specie allevate e altri elementi dell'attività.

3. PERSONALE ADDETTO (OLTRE AL TITOLARE)

3.5	Chiunque entri in contatto con il pollame detenuto non ha praticato attività venatorianelle 48 ore precedenti*
-----	--

Si raccomanda a chiunque pratichi attività venatoria di non entrare in contatto con il pollame detenuto in allevamento per le 48 ore successive a tale attività. Sulla base della situazione epidemiologica le regioni possono rendere obbligatoria tale misura.

3.6	I locali per la vendita ai privati sono fuori dall'area di allevamento*
-----	---

La vendita diretta a privati cittadini deve avvenire fuori dall'area di allevamento.

3.7	Chi effettua attività in allevamento esegue operazioni in altri allevamenti avicoli**
-----	---

Chi effettua attività in allevamento deve evitare di eseguire operazioni in altri allevamenti avicoli, se non strettamente necessarie al ciclo produttivo e solo se vengono adottate tutte le misure di biosicurezza.

3.8	Il personale si lava/sanifica le mani accuratamente almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento*
-----	--

Il personale deve lavarsi/sanificarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento.

4. SILOS

4.2	In assenza di silos viene garantita una corretta gestione dei sacchi di mangime in un locale idoneo e protetto*
-----	---

In assenza di silos è garantita una corretta gestione dei sacchi di mangime in un locale idoneo e protetto.

5. ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI

5.1	Presenza di un'area di disinfezione dei mezzi in ingresso con fondo impermeabile*
-----	---

Gli automezzi, qualora accedano nell'area di allevamento, devono essere disinfettati su una superficie con fondo impermeabile.

5.3	Vengono utilizzate idonee attrezzature (ad es. con pompa a spalle) e disinfettanti di provata efficacia*
-----	--

La disinfezione avviene tramite idonee attrezzature (ad esempio con pompa a spalle) e con disinfettanti di provata efficacia, secondo una procedura scritta.

6. ACCESSO ALL'AREA DI ALLEVAMENTO

6.1	È presente, all'interno dell'allevamento, uno spazio per la custodia dell'abbigliamento ad esso dedicato*
-----	---

All'interno dell'allevamento dev'essere individuato uno spazio per la custodia dell'abbigliamento ad esso dedicato.

6.3	L'accesso all'area di allevamento avviene previo utilizzo di calzature dedicate mantenute in buono stato di pulizia*
-----	--

L'accesso all'area di allevamento deve avvenire previo utilizzo di calzature dedicate e in buono stato di pulizia e deve essere limitato esclusivamente alle persone coinvolte nell'attività di allevamento.

6.4	È presente un contenitore per lo smaltimento del materiale e degli indumenti a perdere*
-----	---

In tutti gli allevamenti deve essere presente nelle vicinanze dell'ingresso all'area dove sono detenuti gli animali un contenitore per lo smaltimento del materiale e degli indumenti a perdere.

7. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO

7.1	Il pavimento dei locali di allevamento è lavabile e disinfettabile e mantenuto in buono stato di manutenzione*
-----	--

I locali di allevamento devono essere dotati di pavimento, in buono stato di manutenzione, preferibilmente lavabili e disinfettabili, in cemento o altro materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione per i parchetti esterni.

7.2	Strutture e attrezzature sono in un buono stato di manutenzione*
-----	--

Le strutture dei locali di allevamento e le attrezzature devono essere in buono stato di manutenzione, preferibilmente lavabili e disinfettabili.

In caso di emergenza epidemica:

7.3	Il pollame può essere alimentato e abbeverato al chiuso o in maniera tale da escludere contatti con selvatici*
-----	--

Gli allevamenti devono essere dotati di strutture chiuse o con tettoia, che consentano, in caso di emergenza epidemica, che il pollame venga alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo efficace il contatto del mangime e dell'acqua con i volatili selvatici.

7.4	Il mangime e le lettiere sono protetti dal contatto con volatili selvatici*
-----	---

Gli allevamenti devono essere dotati di strutture che consentano, in caso di emergenza epidemica, che i mangimi e le lettiere per il pollame siano stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali. Deve essere verificata la presenza di contenitori per la protezione dei mangimi e dei prodotti utilizzati per l'alimentazione degli animali.

7.5	L'area circostante i capannoni è mantenuta in condizioni idonee con erba tagliata e priva di oggetti e materiali non pertinenti*
-----	--

L'area circostante la struttura dev'essere mantenuta pulita e ordinata, con erba tagliata, sgombra da materiali non funzionali all'attività.

9. PULIZIA E DISINFEZIONE

9.1	Viene effettuata, almeno una volta l'anno, la pulizia e disinfezione dell'allevamento*
-----	--

Almeno una volta all'anno, si deve effettuare la pulizia e la disinfezione dell'allevamento.

10. GESTIONE E MOVIMENTAZIONE ANIMALI

10.1	Gli animali di nuova introduzione vengono tenuti separati dai volatili allevati per un congruo periodo di tempo*
------	--

Si raccomanda la separazione degli animali di nuova introduzione dal resto dei volatili allevati, per un congruo periodo di tempo (possibilmente, non inferiore alle due settimane).

10.2	Viene effettuato l'accasamento esclusivamente di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio**
------	---

Negli allevamenti di polli da carne, di pollastre di ovaiole da consumo, di pollastre da riproduzione e di tacchini da carne, è consentito esclusivamente l'accasamento di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio. In deroga al precedente punto la ASL competente può autorizzare, limitatamente a situazioni eccezionali che esulano dalla routinaria prassi di allevamento, l'accasamento di tacchinotti di età superiore a un giorno

11. GESTIONE ANIMALI MORTI

11.1	Gli animali morti vengono rimossi quanto prima dall'area di allevamento e sono correttamente smaltiti*
------	--

Gli animali morti devono essere rimossi quanto prima dall'area di allevamento e correttamente smaltiti.

14. PROCEDURA DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

14.1	Vengono effettuate le debite operazioni di derattizzazione e disinfestazione e la lotta agli insetti nocivi*
------	--

Devono essere effettuate le debite operazioni di derattizzazione e, quando necessario, la lotta agli insetti nocivi.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALLEVAMENTI AVICOLI CON MODALITÀ SVEZZAMENTO

Per gli allevamenti ad indirizzo svezzamento viene proposta una checklist a parte, che comprende allevamenti >250 e allevamenti ≤250 capi. A tal riguardo sono presenti dei quesiti specifici per l'uno o l'altro caso, la cui compilazione deve far riferimento al numero di capi presenti nell'allevamento in analisi.

MISURE SPECIFICHE PER GLI ALLEVAMENTI CON MODALITÀ SVEZZAMENTO

10.10	In caso di presenza di anatidi sono presenti idonei locali per la loro detenzione*
-------	--

In caso di presenza di anatidi, locali per la loro detenzione, tra loro completamente separati, delimitati da pareti lavabili e disinfettabili e dotati di proprio accesso indipendente, anche nel caso siano

confinanti tra loro.

10.11	Se del caso è presente un locale dedicato per la quarantena*
-------	--

Presenza di un locale dedicato per la quarantena.

12.7	Vuoto biologico e sanitario viene effettuato almeno una volta l'anno*
------	---

Il vuoto biologico e sanitario deve essere effettuato almeno una volta l'anno.

12.8	Negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni viene effettuata almeno una volta l'anno*
------	---

Negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

13.1	L'introduzione degli animali è conforme*
------	--

Devono essere introdotti solamente volatili provenienti da allevamenti ordinari o incubatoi.

13.2	Vengono reintrodotti volatili che hanno partecipato a fiere e mercati**
------	---

Vige il divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati. In deroga è possibile la loro introduzione subordinata all'adozione della quarantena in locali dedicati e alla notifica immediata di sospetto di malattia alla ASL competente ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 136/2022.

13.4	Lo spostamento di pollame avviene solo verso altri allevamenti di svezzamento, commercianti o allevamenti familiari**
------	---

Lo spostamento di pollame da allevamenti con modalità svezzamento è consentito solo verso altri allevamenti di svezzamento, commercianti o allevamenti familiari. Su richiesta dell'operatore, il servizio veterinario competente sullo stabilimento può autorizzare la movimentazione verso il macello.

13.5	Esiste una adeguata separazione tra animali e clienti del centro di svezzamento*
------	--

Per gli allevamenti di svezzamento superiori ai 250 capi, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI INCUBATOI

Per gli incubatoi è stata predisposta una checklist specifica. I quesiti, relativi alle misure di biosicurezza, si aggiungono a quanto riportato all'interno del manuale operativo per la gestione del sistema identificazione e registrazione.

1.1	Vengono tenute separate le seguenti aree: magazzino e classificazione delle uova, disinfezione delle uova, preincubazione, incubazione per la schiusa, sessaggio e vaccinazione dei pulcini di un giorno, condizionamento di uova da cova e pulcini di un giorno per la spedizione*
-----	---

Le seguenti unità funzionali e attrezzature dello stabilimento devono essere tenute separate: magazzinaggio e classificazione delle uova; disinfezione delle uova; preincubazione; incubazione per la schiusa; sessaggio e vaccinazione dei pulcini di un giorno; condizionamento di uova da cova e pulcini di un giorno per la spedizione.

1.2	I pulcini di un giorno e le uova da cova detenuti nell'incubatoio vengono in contatto con roditori e volatili esterni all'incubatoio*
-----	---

I pulcini di un giorno e le uova da cova detenuti nell'incubatoio non devono venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall'esterno dell'incubatoio.

1.3	Le operazioni si fondano sul principio della circolazione a senso unico delle uova da cova, delle attrezzature mobili e del personale*
-----	--

Le operazioni devono fondarsi sul principio della circolazione a senso unico delle uova da cova, delle attrezzature mobili e del personale.

1.4	In caso di nuovo stabilimento, è previsto un flusso unidirezionale dell'aria all'interno dei locali*
-----	--

Per i nuovi stabilimenti, oltre a quanto riportato al punto precedente, deve essere previsto anche un flusso unidirezionale dell'aria all'interno dei locali.

1.5	Sono disponibili adeguati sistemi di illuminazione naturale o artificiale e di regolazione dell'aria e della temperatura*
-----	---

Devono essere disponibili adeguati sistemi di illuminazione naturale o artificiale e di regolazione dell'aria e della temperatura.

1.6	I pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dell'incubatoio sono pulibili e disinfettabili*
-----	---

Deve essere possibile pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dell'incubatoio.

1.7	Sono disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per i pulcini di un giorno e per le uova da cova*
-----	---

Devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per i pulcini di un giorno e per le uova da cova e devono essere presenti protocolli di pulizia e disinfezione per mezzi e personale in ingresso.

1.8	Sono presenti protocolli di pulizia e disinfezione per mezzi e personale in ingresso*
-----	---

Devono essere presenti protocolli di pulizia e disinfezione per mezzi e personale in ingresso.

1.9	Le uova vengono pulite e disinfettate tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione**
-----	---

Le uova devono essere pulite e disinfettate tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione, tranne qualora siano già state disinfettate nello stabilimento di origine.

1.10	Viene effettuata pulizia e disinfezione delle incubatrici e delle attrezzature dopo la schiusa*
------	---

Deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione: delle incubatrici e delle attrezzature dopo la schiusa.

1.11	Viene effettuata pulizia e disinfezione, dopo ogni utilizzo, dei materiali da imballaggio**
------	---

Deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione dei materiali da imballaggio dopo ogni utilizzo, tranne qualora si tratti di materiali monouso destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo.

1.12	Al personale vengono forniti abiti da lavoro dedicati *
------	---

Al personale devono essere forniti abiti da lavoro dedicati mentre ai visitatori devono essere forniti copri abiti e calzari.

1.13	Ai visitatori vengono forniti copri abiti e calzari*
------	--

Ai visitatori devono essere forniti copri abiti e calzari.

1.14	Il personale possiede conoscenze e capacità adeguate ed è stato formato in materia di biosicurezza*
------	---

Il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione in materia di biosicurezza. A tal riguardo occorre verificare la presenza di attestazioni.

1.15	Il personale che opera nell'incubatoio anche saltuariamente non detiene volatili di proprietà*
------	--

Divieto per il personale che opera anche saltuariamente nell'incubatoio di detenere volatili di proprietà.

1.16	L'operatore possiede una certificazione scritta da parte del personale (che opera anche saltuariamente) di non detenzione dei volatili di proprietà*
------	--

Deve essere acquisita, da parte dell'operatore, una dichiarazione scritta e firmata dal suddetto personale attestante il rispetto di tale requisito.