

A cura di:
PAOLA NICOLUSSI - ALESSANDRA GAFFURI
FRANCESCA FUSI
LUIGI BERTOCCHI



Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DEL BENESSERE
ANIMALE
NELL'ALLEVAMENTO DEGLI
OVINI E DEI CAPRINI:
MANUALE ESPLICATIVO
CONTROLLO UFFICIALE**



CRenBA 2021



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Riferenza Nazionale
per il Benessere Animale



**VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE
NELL'ALLEVAMENTO
DEGLI OVINI E DEI CAPRINI:
MANUALE ESPLICATIVO CONTROLLO UFFICIALE**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Riferenza Nazionale per
il Benessere Animale



BRESCIA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

“Bruno Ubertini”

ANNO 2024

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

Versione:		Data
	1.0	Dicembre 2021
	2.0	Gennaio 2024

A cura di:

Alessandra Gaffuri, Francesca Fusi e Luigi Bertocchi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini", Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Paola Nicolussi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

Ugo Santucci, Antonio Ferraro, Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario.

Con il contributo del gruppo di lavoro:

Provincia di Bolzano,

Regione Emilia Romagna,

Regione Lombardia,

Regione Sardegna,

Regione Sicilia,

Regione Umbria.

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia – ITALY

Responsabile CReNBA

Dr. Luigi Bertocchi

Email: luigi.bertocchi@izsler.it

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



INDICE GENERALE

INDICE GENERALE.....	7
LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO	10
AREE DEL BENESSERE ANIMALE SECONDO IL SISTEMA CLASSYFARM (AUTOCONTROLLO)	15
AREA A. Management aziendale	15
AREA B. Strutture ed attrezzature	15
AREA Grandi rischi e sistemi di allarme	15
AREA C. Animal-based measures	16
LA CHECK LIST PER IL CONTROLLO UFFICIALE	17
INTRODUZIONE	17
CRITERI DI VALUTAZIONE PER I REQUISITI DEL CONTROLLO UFFICIALE	20
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE ANIMAL-BASED MEASURES (ABMs)	23
ESITO DEL CONTROLLO UFFICIALE	24
APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA	25
I PERSONALE	26
1. Numero di addetti che si occupano degli animali	26
2. Formazione degli addetti	28
II ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI	31
3. Numero di ispezioni	31
4. Illuminazione per l'ispezione	33
5. Trattamento degli animali malati o feriti	34
6. Abbattimento	37
III TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	48
7. Tenuta delle registrazioni dei dati	48
8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici	51
IV LIBERTA' DI MOVIMENTO	53
9. Superficie disponibile per il decubito: pecore/capre adulte (ovvero in lattazione, in asciutta) e arieti/becchi	53
10. Superficie disponibile per il decubito: animali da rimonta (> 3 mesi d'età)	53
11. Superficie disponibile per il decubito: agnelli e capretti (< 3 mesi d'età)	53
V EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	64

12. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi)	64
13. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura	71
14. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)	78
15. Infermeria (tutti i gruppi)	80
16. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)	83
17. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)	89
18. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi).....	91
19. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi).....	93
VI ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA.....	98
20. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche.....	98
21. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva.....	100
VII ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE	102
22. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera.....	102
23. Tipologia di alimentazione	107
24. Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (tutti i gruppi)	110
25. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi).....	118
26. Somministrazione di sostanze illecite	125
VIII Mutilazioni	127
27. Mutilazioni e altre pratiche	127
IX PROCEDURE D'ALLEVAMENTO.....	133
28. Disposizioni generali	133
29. Biosicurezza - Lotta agli infestanti	136
X MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs.....	140
30. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS).....	141
31. Pulizia degli animali	148
32. Lesioni cutanee	153
33. Presenza di ascessi (animali adulti e rimonta)	159
34. Zoppie	162
35. Sanità della mammella (pecore da latte).....	166
36. Asimmetria della mammella (capre adulte da latte)	168
37. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 12 mesi di vita)	170
38. Mortalità annuale degli agnelli e dei capretti (0-3 mesi di vita).....	170

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN AUTOCONTROLLO SULLA BASE DEL RISCHIO IN CLASSYFARM: ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE NEGLI OVINI E CAPRINI.....	173
GRIGLIE DI AIUTO ALLA COMPILAZIONE	174
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	178

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO

I veterinari ufficiali hanno il compito di tutelare il benessere degli animali allevati non solo garantendo, attraverso i controlli, che gli allevatori osservino le disposizioni vigenti, ma anche fornendo indicazioni sulle corrette pratiche di allevamento.

Gli animali, infatti, devono essere allevati tenendo conto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche: solo in questo modo il benessere animale può essere garantito.

Questo aspetto è ben affrontato anche nel nostro Codice penale, dove in tema di maltrattamento degli animali, si fa chiaro riferimento alle loro caratteristiche etologiche: *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori **insopportabili per le sue caratteristiche etologiche** è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”* (Codice penale, Libro II, Titolo IX bis, Articolo 544-ter “Maltrattamento di animali”).

Analogamente, *“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali **in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze**”* (Codice penale, Libro III, Titolo I, Capo II, Sezione I, Articolo 727 “Abbandono di animali”).

Tuttavia, stabilire a priori quale sia “la natura” o “la presenza di gravi sofferenze” negli animali allevati, è senz'altro un esercizio complesso, che non può esimersi dal considerare il *grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento della specie, nonché le proprie esigenze fisiologiche ed etologiche, grazie all'esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche finora disponibili* [come da Decreto Legislativo 146/2001 articolo 4, paragrafo 1, lettera a)], evitando il più possibile di confondere la loro reale condizione di vita con le aspettative e le specifiche conoscenze che ognuno di noi ha nel campo dell'allevamento zootecnico.

Dal punto di vista medico-scientifico, infatti, la “diagnosi del livello di benessere” di un animale allevato deve necessariamente basarsi sull'analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell'animale, il rispetto dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all'ambiente. Tutte queste condizioni devono essere registrate e valutate attraverso specifici indicatori e i risultati devono essere

analizzati attraverso un metodo il più possibile obiettivo e scientifico. In definitiva, la valutazione del benessere animale è un difficile esercizio di astrazione dal consueto e quotidiano approccio sanitario, zootecnico o affettivo che ogni persona può mettere in atto quando a vario titolo si relaziona con gli animali da reddito.

Per i motivi appena illustrati e per facilitare il soddisfacimento di quanto già previsto dalla normativa relativa alla protezione degli animali negli allevamenti [Decreto Legislativo 146/2001, articolo 2, paragrafo 1, lettera a)], ovvero *“Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili”*, il Ministero della Salute, con il supporto del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), basandosi non solo sulla norma citata ma anche sulle più recenti e autorevoli conoscenze scientifiche (tra cui AWIN 2015a, b; EFSA, 2012a, b; EFSA, 2014) ha reso disponibile per gli allevatori e i veterinari aziendali un sistema di valutazione e categorizzazione del rischio per il benessere animale e la biosicurezza negli allevamenti ovini e caprini, basato su una raccolta di dati in autocontrollo attraverso specifiche check list di autovalutazione e sulla successiva elaborazione e validazione degli stessi attraverso una piattaforma informatica denominata ClassyFarm.

Al fine di rendere confrontabile la valutazione effettuata in autocontrollo dal veterinario aziendale incaricato dall'allevatore (inserita in ClassyFarm) rispetto a quella effettuata durante i controlli ufficiali per le ispezioni previste dalla programmazione del Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) o dall'extra piano, si rende necessario formalizzare ed inserire in “Vetinfo – controlli” una nuova check list per il controllo ufficiale relativa agli ovini e ai caprini, costruita sui medesimi criteri di categorizzazione del rischio come da sistema ClassyFarm e completata, rispetto ai documenti precedentemente utilizzati, dal manuale esplicativo per gli ispettori.

Per questo motivo, a disposizione dei veterinari ufficiali, è stata sviluppata la nuova check list per il controllo del benessere animale negli allevamenti di ovini e caprini (con il relativo manuale esplicativo, costituito dal presente documento), per rendere agevole, autorevole, omogenea e validata la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani. La presente check list è applicabile in tutti gli allevamenti ovini e caprini con orientamento produttivo da carne, da latte, da lana o misto.

Il Decreto Legislativo 146/2001 (articolo 4, paragrafo 1, lettera a) ha, infatti, previsto che *“Le autorità sanitarie territorialmente competenti: a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attività, la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e*

addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche”.

L'obiettivo finale dell'applicazione del presente protocollo, oltre a consentire l'individuazione di situazioni non conformi e pericolose per le condizioni di benessere animale, sarà altresì quello di poter categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti e di poterli confrontare a livello nazionale, regionale e provinciale.

In dettaglio, la procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base delle nuove check list a disposizione dei veterinari ufficiali, tiene conto delle indicazioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito e delle raccomandazioni presenti nei report e nelle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

La check list si basa sull'analisi di due gruppi di dati: 1) quelli previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 collegato ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche) e 2) quelli derivati dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o animal-based measures (ABMs) previsti dalla più recente letteratura scientifica. I primi parametri sono suddivisi nella check list secondo le categorie di non conformità previste dalla Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14-11-2006 relativa ai *“requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali”* [art.3 punto c) ed allegato II].

Al riguardo, si fa presente che la suddetta Decisione è stata abrogata con l'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri, che prevede alcune modifiche nelle modalità di rendicontazione in Commissione Europea delle non conformità. Questi dati sono inoltre classificati dal sistema informativo ClassyFarm in 3 aree di rischio: Area A - “Management aziendale e personale”; Area B - “Strutture ed attrezzature” ed Area - “Grandi rischi e sistemi di allarme”.

I parametri appartenenti al secondo gruppo di dati (ABMs), relativi all'analisi della presenza o meno di effetti avversi riscontrabili sugli animali, vengono invece convogliati dal sistema informativo in una quarta area (Area C), che riporta i risultati delle principali “animal-based measures”. La valutazione delle ABMs è senza dubbio un valido ausilio al lavoro dell'autorità competente al fine di evidenziare eventuali effetti negativi sulle condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali e per dimostrare quanto sancito dalla normativa: *“nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa*

avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere” (Decreto Legislativo 146/2001, allegato, punto 21).

La possibilità di distinguere i parametri rilevati nelle aree previste dal sistema ClassyFarm consentirà, non solo di categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti, ma anche di indirizzare in modo appropriato gli interventi preventivi sui principali fattori di debolezza del sistema zootecnico di ogni singola azienda, migliorando di conseguenza le condizioni di vita degli animali.

Nel presente manuale sono riportate tutte le osservazioni contenute nella nuova check list, ognuna preceduta dalla citazione della disposizione normativa che la prescrive oltre che da tutte le indicazioni provenienti da opinioni EFSA o linee guida ufficiali inerenti, qualora disponibili. Infine, ogni osservazione è seguita da una breve spiegazione sull'argomento, con lo scopo di illustrare più a fondo la condizione da valutare e consentire al veterinario pubblico ufficiale di prendere la decisione migliore.

Il risultato finale dell'applicazione del sistema di valutazione, qui illustrato, è identificare non solo le non conformità legislative, ma anche classificare gli allevamenti tramite un indice numerico globale di benessere, in linea con il sistema ClassyFarm e con il rilievo in autocontrollo, che esprima il livello di rischio dell'allevamento, ad esempio come di seguito esposto:

- livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile/non conforme alla normativa/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incorrere in una situazione negativa (“distress”), dovuta all'impossibilità di godere a pieno di una o più delle 5 libertà (FAWC; 1979)¹;
- livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile/conforme alla normativa, compatibile con la possibilità che tutti gli animali del gregge possano soddisfare le proprie 5 libertà (FAWC; 1979)¹ e non subire condizioni di stress;
- livello 3 = rischio basso o condizione ottimale/superiore alla normativa, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell'animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà (FAWC; 1979)¹, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

¹ 1) Libertà dalla sete, fame e malnutrizione; 2) Libertà dai disagi ambientali; 3) Libertà da dolore, ferite e malattie; 4) Libertà di poter manifestare il proprio repertorio comportamentale specie-specifico; 5) Libertà dalla paura e dallo stress. Fonte: Farm Animal Welfare Council (FAWC), 1979. Farm Animal Welfare Council Press Statement.

<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http://www.fawc.org.uk/pdf/fivefreedoms1979.pdf>.

Il risultato parziale di ogni area (A, B, C e Grandi rischi) fornisce invece un'indicazione circa il peso e l'importanza che ciascuna di esse ha nella composizione finale dell'indice di rischio per il benessere animale indipendentemente dalle non conformità legislative.

Alla fine dell'intero processo di valutazione, nel sistema ClassyFarm, è prodotto un documento finale di elaborazione dei dati e riepilogo dei punti critici nel quale sono presenti:

- l'elenco dei punti critici, ovvero i criteri con risposta non conforme o insufficiente;
- il livello di rischio complessivo, relativo alle condizioni di benessere degli animali presenti in allevamento;
- il livello di rischio degli animali in relazione ad ognuna delle 4 aree di valutazione.

AREE DEL BENESSERE ANIMALE SECONDO IL SISTEMA CLASSYFARM (AUTOCONTROLLO)

Il sistema Classyfarm, per la valutazione del benessere animale in autocontrollo, si divide in quattro aree, qui di seguito descritte.

AREA A. Management aziendale

Il management aziendale è fondamentale per il benessere animale e comprende tutte quelle operazioni che coinvolgono gli addetti agli animali. Sebbene le caratteristiche strutturali di un allevamento, istintivamente, possano sembrare più importanti in termini di effetti sulle condizioni di benessere degli animali, quest'ultime in realtà sono maggiormente influenzate dalla gestione quotidiana delle principali attività routinarie eseguite dal personale. Le azioni e le scelte degli operatori, sia dirette sull'animale sia indirette, possono favorire condizioni di benessere anche in strutture apparentemente poco adeguate, oppure al contrario, possono provocare situazioni di malessere in strutture moderne e all'avanguardia.

AREA B. Strutture ed attrezzature

Le strutture e le attrezzature zootecniche, così come il management e l'igiene ambientale, rappresentano una potenziale fonte di rischio per il benessere animale e per il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali. Per questo, numerosi studi, raccomandazioni e pareri scientifici, ai fini della valutazione del rischio per il benessere animale, si focalizzano prevalentemente sull'adeguatezza delle strutture di stabulazione.

Tra una corretta condizione ambientale ed il benessere dell'animale, si interpone la capacità degli animali di adattarsi alle strutture. Pertanto, è necessario, ai fini dell'individuazione delle condizioni migliori per ogni allevamento, ricercare tra i punti critici strutturali individuati quelli più incidenti in modo da migliorarli per ridurre il rischio di sviluppare lesioni o comportamenti anomali.

Infine, è importante ricordare che un allevamento dovrebbe disporre di idonee strutture suppletive per la gestione di situazioni particolari (come, ad esempio, il box infermeria).

AREA Grandi rischi e sistemi di allarme

Come il management, l'igiene ambientale e le attrezzature zootecniche, anche i grandi rischi e i relativi sistemi d'allarme potrebbero rappresentare un pericolo per il benessere animale. La presenza o assenza di detti presidi di prevenzione, infatti, non ha un impatto diretto sul benessere di un animale ma, qualora si verificassero delle importanti situazioni di pericolo (es. guasti all'impianto elettrico),

potrebbero fare la differenza nel salvaguardare la salute, il benessere e la vita stessa di animali e uomini, impedendo o limitando il verificarsi di estremi effetti avversi. Pertanto, l'operatore deve valutare la prevenzione dei grandi rischi a tutela del benessere animale.

I criteri che rientrano in questa area dovrebbero prevedere, come buona prassi, delle procedure scritte a livello aziendale o quantomeno dimostrare l'effettiva preparazione agli eventi avversi contemplati dal criterio.

AREA C. Animal-based measures

L'analisi degli effetti avversi in tema di benessere animale, riconducibili a strutture e procedure gestionali non adeguate, è possibile attraverso la valutazione di indicatori di benessere (animal-based measures - ABMs) misurabili direttamente sull'animale (es. zoppia, lesioni cutanee, ecc.) oppure indirettamente, mediante la raccolta di dati disponibili in azienda (es. tasso di mortalità annuale), e per i quali è stata scientificamente dimostrata la correlazione con il benessere animale. L'animale che non è in condizioni di benessere manifesta, infatti, precisi segnali fisici che si possono cogliere, interpretare e valutare al fine di comprenderne lo stato di disagio.

LA CHECK LIST PER IL CONTROLLO UFFICIALE

INTRODUZIONE

Il documento da utilizzare in corso di ispezione o audit sul benessere animale è suddiviso in diverse sezioni, al fine di consentire la verifica della conformità o non conformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla normativa (valevole anche per la verifica del rispetto dei criteri di condizionalità). Inoltre, come già specificato precedentemente, questa raccolta di dati sul benessere animale, integrandosi con le informazioni presenti in Banca Dati Nazionale (BDN), le valutazioni inserite dai veterinari aziendali in corso di autocontrollo con la check list ClassyFarm e le informazioni di ritorno dai macelli, concorre a definire il livello di rischio complessivo dell'azienda oggetto del controllo. Il livello di rischio, supportato da un'analisi accurata per ogni area tematica, permette un confronto con la media provinciale, regionale e nazionale.

La parte iniziale della check list è costituita da una raccolta di informazioni, non vevoli per il giudizio finale sulla conformità o non conformità, relative a:

- Presenza di un manuale di buone pratiche. A livello generale questo dato, pur non costituendo non conformità in caso di mancata presenza, è importante per concorrere a definire un minore livello di rischio; inoltre, a livello di singoli requisiti può aiutare nella definizione di requisiti superiori al livello minimo (ottimali).
- Informazioni rilevabili dalle registrazioni effettuate nel sistema dell'anagrafe ovina e caprina (es. numero capi totali identificati individualmente), che vengono ottenute in automatico nel momento della stampa della checklist o della compilazione della check list in Vetinfo con inserimento del codice di allevamento e della data del controllo. Si ricorda che, qualora la stampa della checklist non avvenga nella medesima giornata in cui si proceda all'inserimento del controllo nel sistema, i dati rilevabili in BDN dalle due estrazioni potrebbero non coincidere esattamente, in quanto nuove comunicazioni o inserimenti da parte dell'allevatore potrebbero aver aggiornato a ritroso i dati di consistenza del gregge.

A queste informazioni si aggiungono quelle richieste in un'altra tabella, denominata “*Stima dei dati aziendali*” che precede la sezione relativa alle ABMs. In questa tabella devono essere inseriti i dati relativi alla stima della consistenza delle diverse popolazioni animali, presenti in allevamento il giorno dell'ispezione (es. animali in lattazione, in asciutta, da rimonta, ecc.), utile ai fini dell'esecuzione della valutazione del benessere (D. Lgs. 146/2001), della raccolta delle ABMs e della categorizzazione del rischio in Classyfarm. Queste informazioni possono essere raccolte tramite dichiarazione da parte dell'allevatore. Trattandosi di una “*stima*” della numerosità dei capi, tali valori possono essere approssimati e discostarsi un minimo dai valori presenti in BDN.

L'applicazione di tale check list può riguardare gli ovini e i caprini di allevamenti con diverso orientamento produttivo (come definito da BDN: es. latte, lana, carne, misto, ecc.) e differente modalità di allevamento (come definito da BDN: stabulato o intensivo (SI); all'aperto o estensivo (AE); transumante (TR)).

Per maggiore chiarezza, forniamo di seguito una breve definizione (tratta da Awini, 2015a, b; EFSA, 2014) delle varie tipologie di allevamento degli ovini e dei caprini a cui si farà riferimento nel manuale:

Allevamento intensivo: allevamento a stabulazione libera, impostato su moderne e razionali tecniche di allevamento, dove gli animali sono pressoché permanentemente custoditi all'interno di strutture e fabbricati. L'apporto nutritivo fornito dal pascolamento è assente e raramente sono presenti aree di esercizio o paddock esterni.

Allevamento semi-intensivo: allevamento a stabulazione libera molto simile al precedente, ma con accesso ad aree esterne (es. paddock esterni o pascolo) durante il giorno, nei mesi centrali dell'anno (per almeno 60 giorni l'anno), e ricovero durante la notte o anche parzialmente durante la giornata. Le strutture e i fabbricati possono essere resi sempre accessibili all'animale, che qui potrà andare ad abbeverarsi o a trovare ombra e riparo dalle intemperie; se l'accesso è regolamentato dall'uomo, nelle aree esterne dovranno essere presenti abbeveratoi e ricoveri naturali od artificiali. Il pascolamento ricopre un ruolo importante nella dieta dell'animale.

Allevamento semi-estensivo: allevamento a stabulazione libera, dove gli animali sono custoditi all'interno di un fabbricato durante i mesi invernali; nel periodo primaverile, estivo ed autunnale, utilizzo di aree di pascolo (turnate a rotazione), alpeggio, e/o transumanza con ritorno nella struttura fissa al sopraggiungere dell'inverno. Durante il pascolamento deve essere garantita all'animale la possibilità di abbeverarsi liberamente e di avere un ricovero naturale o artificiale per proteggersi dal sole o dalle intemperie.

Allevamento estensivo: allevamento a stabulazione libera, dove gli animali sono mantenuti pressoché permanentemente all'aperto, allo strado brado su prati e pascoli, anche a conduzione vagante. Per la maggior parte dell'anno gli animali usufruiscono di ricoveri naturali e vengono custoditi per periodi molto limitati in ovili o caprili.

Nell'applicazione della presente check list, tutto l'effettivo deve essere preso in esame per valutare la conformità dell'allevamento e la salvaguardia delle esigenze minime di benessere animale.

Solo nel caso in cui ci fosse un elevato numero di animali, per agevolare lo svolgimento pratico della visita, è possibile procedere a valutazioni a campione all'interno delle diverse categorie di animali (es. età differente), soprattutto qualora le strutture e le attrezzature si presentassero molto simili. Nel caso, invece, gli ambienti e i ricoveri destinati alla stessa categoria di animali fossero molto difforni,

è necessario ripetere le misurazioni. La scelta può essere documentata nella sezione della check list destinata alla raccolta delle evidenze, indicando quale approccio campionario è stato applicato.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I REQUISITI DEL CONTROLLO UFFICIALE

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario ufficiale per i parametri sanciti dalle norme sono prevalentemente suddivise nelle opzioni di scelta riportate in Tabella 1.

Tabella 1 Legenda non conformità

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SÌ (Conforme)	Nessuna
no - categoria A (Non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no - categoria B (Non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO - categoria C (Non conformità maggiore)	Sanzione amministrativa o penale immediata
NA (Non applicabile)	–
OTTIMALE* - superiore al requisito previsto	Facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

***Fondamentale per ottenere una corretta valutazione del rischio sul portale ClassyFarm**

Fra le risposte conformi dovrà essere facoltativamente indicato il livello ottimale, quando presente. Il livello ottimale sarà esclusivamente utilizzato ai fini della categorizzazione del rischio nell'ambito del Sistema ClassyFarm del Ministero della Salute. Nel report della check list ufficiale comparirà solamente il giudizio CONFORME e NON CONFORME (A, B, C)², mentre l'esito della valutazione del rischio sarà disponibile in ClassyFarm.

La parte centrale della check list contiene tutte le categorie di non conformità stabilite dalla Decisione n.778 della Commissione del 14 novembre 2006², relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta

² In relazione alle categorie di non conformità, si è ritenuto opportuno mantenerne la suddivisione in A, B e C, nonostante l'abrogazione della Decisione n. 778 della Commissione del 14 novembre 2006 da parte del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (che prevede alcuni cambiamenti nelle modalità di rendicontazione in Commissione Europea delle non conformità), per non modificare il metodo di lavoro consolidato negli anni nel nostro Paese. Si precisa che le informazioni richieste dal Regolamento per la rendicontazione sono comunque assicurate.

di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali (personale, ispezione e controllo degli animali, tenuta dei registri, libertà di movimento, edifici e locali di stabulazione, attrezzatura automatica e meccanica, alimentazione abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze, mutilazioni e procedure d'allevamento). Ciascuna di queste categorie è riconducibile da parte del sistema informativo di raccolta dei dati alle Aree di indagine del sistema ClassyFarm precedentemente descritte (Area A - management aziendale -, Area B - strutture e attrezzature -, Area - Grandi rischi e sistemi di allarme - e Area C - ABMs -), in modo che i dati raccolti nel corso dei controlli ufficiali possano confluire nel sistema generale di categorizzazione.

Per ciascuna di queste categorie di non conformità viene definito il requisito specifico (es. categoria personale: “numero di addetti che si occupano degli animali”), il/i riferimento/i normativo/i espresso/i in maniera estesa e tra virgolette, la linea guida sintetica per le modalità con le quali eseguire la valutazione e, infine, la descrizione del livello di conformità, non conformità o requisito superiore al livello minimo. Dal momento che questa nuova check list è comune ad ovini e caprini appartenenti ad allevamenti di diversa attitudine, alcuni elementi di valutazione potranno riportare indicazioni lievemente differenti in base alla specie o alla tipologia d'allevamento.

A questa sezione, che rappresenta la sintesi di quanto verrà esposto in maniera dettagliata nel presente manuale, fa seguito, evidenziata in apposito box, la parte contenente la domanda relativa al requisito specifico (es. “Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti”), a cui corrispondono le diverse risposte che evidenziano conformità, non conformità o livello ottimale. **La sezione relativa alle evidenze deve essere compilata obbligatoriamente in caso di riscontro di non conformità, per finalità di trasparenza.** Tuttavia, dovrebbe essere comunque compilata per quanto possibile anche negli altri casi, per documentare le modalità del controllo.

Come già illustrato, per la valutazione del rispetto delle condizioni di benessere in allevamenti di ovini e caprini è possibile fare riferimento ad una normativa orizzontale, rappresentata dalla Direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146. In particolare, il D. Lgs. 146/2001, all'art. 4 cita: “*Le autorità sanitarie territorialmente competenti dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasioni di altri controlli; in tale attività la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato (vedi Allegato, punto 21) deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza e le conoscenze scientifiche”*; quindi, in ogni caso, occorre sempre tenere presente il principio generale, sancito dal punto 21 dell'allegato del Decreto Legislativo 146/2001,

secondo cui *“Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere”* e agire come previsto dall’art 4 *“...secondo l’esperienza e le conoscenze scientifiche”*.

A ciò, va aggiunto quanto previsto dalla normativa sul maltrattamento degli animali, che punisce chi li sottopone a *“sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche”* (art. 544 ter c.p.), ovvero a chi li *“detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”* (art. 727 c.p.).

In base a quanto sopra definito, nei casi in cui i principi orizzontali stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria non siano sufficienti ad assicurare una valutazione completa del rispetto del benessere delle specie ovina e caprina, è necessario che il veterinario ispettore ricorra ai numerosi pareri scientifici, raccomandazioni, pubblicazioni e altro materiale divulgativo, che costituiscono la base interpretativa per alcuni requisiti che la normativa ha definito in maniera generica, dovendo spaziare su varie specie animali, con caratteristiche a volte completamente differenti.

Proprio per agevolare l’attività del veterinario ispettore, nonché uniformare l’approccio tra operatori diversi, all’interno della check list per il controllo ufficiale e nel presente manuale, sulla base di quanto ritrovato in letteratura, sono stati definiti alcuni parametri specifici per le specie animali di cui si tratta che *non rappresentano un’indicazione normativa limitante in senso stretto*, ma che possono essere di ausilio per il valutatore che, per esprimere il giudizio finale, dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento. Altresì, il giudizio non potrà prescindere dalla valutazione degli animali, attraverso le ABMs, per verificare se l’adattamento all’ambiente si sia completato o se siano presenti effetti negativi sulla salute o sul benessere. In tutti questi casi, quindi, il valutatore ritroverà sulla check list la frase ***“I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio”***.

Si chiarisce che il valutatore, in caso di scostamenti dai valori riportati nella check list, potrà esprimere un giudizio conforme anche se i limiti proposti (solo) da indicazioni e pareri scientifici non siano completamente rispettati, a condizione che la valutazione complessiva dell’allevamento e degli animali non faccia emergere condizioni di rischio. Analogamente, potrà esprimere un giudizio non conforme qualora i parametri chiaramente definiti da atti normativi siano rispettati, ma la valutazione dell’allevamento e degli animali mettano in chiara luce situazioni di mancato benessere o gravi sofferenze.

Attenzione: il presente manuale, raccogliendo, oltre alle indicazioni normative, anche importanti evidenze scientifiche sul benessere degli ovini e dei caprini, rappresenta una linea guida che - per sua

natura - non ha caratteristiche cogenti, ma che rappresenta un imprescindibile ausilio al veterinario ufficiale, per applicare i limiti previsti dal Decreto Legislativo 146/2001. Il fatto che determinati pareri o interpretazioni scientifiche sul benessere animale siano oggi disponibili, condivisi e riconosciuti dalla comunità scientifica, deve esortare il veterinario ufficiale alla loro conoscenza e al rispetto di quanto prevedono. L'utilizzo del manuale, in affiancamento alla check list, di cui è documento inscindibile, rappresenta una maggiore garanzia per verificare il rispetto del benessere animale, ma costituisce anche una forma di tutela del veterinario stesso che, attraverso la loro applicazione, potrà ragionevolmente sostenere di avere tenuto in considerazione, nel corso della sua attività ispettiva, le più importanti evidenze scientifiche attualmente disponibili, per la valutazione del rischio applicata al benessere animale in allevamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE ANIMAL-BASED MEASURES (ABMs)

Per quanto riguarda le ABMs, si tratta di valutazioni effettuate direttamente sugli animali, allo scopo di verificare se elementi strutturali o gestionali dell'allevamento stiano producendo su di essi stati di sofferenza più o meno gravi e, comunque, per valutare il loro grado di adattamento all'ambiente in cui vivono. Il rilievo delle ABMs è in grado di identificare condizioni di malessere anche quando non si ravvisano condizioni ambientali negative. Ciò è possibile perché la condizione di scarso benessere può essere collegata all'incapacità dell'animale di adattarsi all'ambiente in cui vive, anche se risulta tutto idoneo dal punto di vista normativo.

La valutazione delle ABMs è parte integrante della check list: dovrà essere sempre compilata per avere un'adeguata categorizzazione del rischio e servirà come supporto per avvalorare una decisione relativa a conformità o non conformità.

La valutazione (insufficiente, accettabile e ottimale) non influenzerà in modo diretto l'esito complessivo del controllo al fine della condizionalità.

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario ufficiale per i parametri basati sulle misure dirette sugli animali sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta:

- “inaccettabile” o “insufficiente”: ossia condizioni che potrebbero impedire a uno o più animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale ad una conferma o meno di una potenziale “non conformità legislativa”, ove prevista nei parametri sanciti dalla norma, o nei casi in cui i parametri stabiliti (solo) da indicazioni e pareri scientifici siano palesemente disattesi.
- “accettabile” o “migliorabile”: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti; questo

livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale ad un livello di potenziale conferma di “conformità legislativa”, ove prevista nei parametri sanciti dalla norma o da indicazioni e pareri scientifici.

- “ottimale” o “superiore ai requisiti previsti”: ossia la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di vivere in condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti dalla legge; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale al livello “superiore ai requisiti previsti”.
- “NA”: non applicabile.

Per il valutatore sarà sufficiente indicare una delle opzioni di scelta, quale risultato della valutazione eseguita.

In base alla numerosità dei capi, è possibile esaminare un campione di soggetti (vedi Tabella 2, nel capitolo n.10, “Misure dirette sugli animali - ABMs”) per ogni rilevazione diretta sugli animali. Solo nel caso di un elevato numero di animali, per agevolare lo svolgimento pratico della visita, è possibile procedere a valutazioni a campione all’interno delle diverse categorie: es. animali adulti (in lattazione e in asciutta) e rimonta (> 3 mesi d’età), soprattutto qualora le strutture e le attrezzature si presentassero molto simili. Nel caso, invece, gli ambienti e i ricoveri destinati alla stessa categoria di animali fossero molto difforni, è necessario ripetere le osservazioni sugli animali.

ESITO DEL CONTROLLO UFFICIALE

La parte finale e conclusiva della check list contiene gli esiti del controllo ufficiale, i provvedimenti adottati, le eventuali prescrizioni con l’esito finale del controllo (il tutto comprensivo del diritto alla difesa del proprietario/detentore).

APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA

Questo protocollo di lavoro serve ai fini della valutazione delle conformità rispetto ai requisiti normativi in materia di benessere animale negli allevamenti di ovini e caprini

Inoltre, l'applicazione di questo sistema risulta necessaria per valutare il livello di rischio, relativamente agli aspetti manageriali e strutturali dell'allevamento, per quanto riguarda il benessere animale.

Nel presente manuale gli argomenti sono trattati sia per la specie ovina sia per la specie caprina (con le dovute differenze) relativamente agli orientamenti produttivi carne, latte, lana o misto.

La possibilità di accedere al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista per i Veterinari Ufficiali ed è disponibile sulla sezione cruscotti di ClassyFarm accessibile dal portale Vetinfo. Tale elaborazione sarà disponibile dal giorno successivo a quello di invio dei dati da parte del Sistema Informativo Veterinario Nazionale presente in “Controlli”.

I PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 1					
NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI					
(Categoria di non conformità: Personale) 146/2001 All. Personale Punto 1.					
"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"					
Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali. Sono fornite indicazioni differenti in base al tipo di popolazione e alla tipologia di allevamento (es. se allevati al chiuso in stalla, o al pascolo).					
<i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri oppure nel caso siano allevamenti con attitudine non da latte); oppure un operatore per più di 150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura); oppure un operatore per più di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)					no; NO
Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri oppure nel caso siano allevamenti con attitudine non da latte); oppure un operatore per 100-150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura); oppure un operatore per 60-100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)					SI
Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri oppure nel caso siano allevamenti con attitudine non da latte); oppure un operatore per meno di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura); oppure un operatore per meno di 60 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)					Ottimale
1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare il numero degli addetti					

Gli addetti (proprietario o detentore o custode ovvero una persona che, anche temporaneamente, è responsabile e si occupa degli animali - D. Lgs. 146/2001, art.1, par. 2, lett. b), sono coloro che lavorano in allevamento a tempo pieno (1 persona) o parziale (minimo mezza giornata = mezza

persona) per svolgere le operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, escludendo gli operatori che lavorano esclusivamente nei campi o i tecnici, in caso di filiere integrate.

Negli allevamenti ovini e caprini da latte, nel caso in cui la cura quotidiana degli animali e le operazioni di mungitura siano eseguite da operatori distinti, si giudicano accettabile il rapporto di un addetto (non mungitore) per un numero di animali totali compreso tra 200 e 300; ottimale quello di un addetto per un numero di animali totali minore di 200, e insufficiente quello di un addetto per un numero di animali totali maggiore di 300, presenti al momento della visita (inclusi ovviamente agnelli/capretti qualora siano presenti).

In caso di aziende in cui l'addetto agli animali svolga anche la mungitura, se questa è effettuata meccanicamente, si considerano accettabile la presenza di un operatore per un numero di animali totali, presenti al momento della visita, compreso tra 100 e 150; ottimale un addetto per un numero di animali totali minore di 100, e insufficiente un addetto per un numero di animali totali maggiore di 150.

Nel caso, invece, in cui l'addetto alla cura quotidiana degli animali svolga anche la mungitura a mano, si considerano accettabile la presenza di un operatore per un numero di animali totali compreso tra 60 e 100; ottimale la presenza di un addetto per un numero di animali totali minore di 60, e insufficiente un addetto per un numero di animali maggiore di 100.

Negli allevamenti ovini e caprini da carne, se si tratta di allevamenti intensivi si può fare riferimento al rapporto uomo/animali suggerito per gli allevamenti da latte, con operazioni di mungitura svolte da addetti differenti (ovvero “Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali totali”).

Nel caso di allevamenti estensivi da carne, l'adeguatezza del numero di operatori/numero di animali dovrà essere valutata caso per caso, tenendo conto anche delle effettive esigenze degli animali, del loro livello produttivo/riproduttivo, della stagione, ecc.

In ogni caso, nel giudizio finale si dovrebbe prendere in considerazione il livello di automazione degli impianti per la gestione degli animali (es. mungitura, rinnovo della lettiera, distribuzione dell'alimento), che può facilitare l'operatore nello svolgimento dell'attività.

Risulta, inoltre, di notevole ausilio per il valutatore considerare anche altri fattori dell'allevamento, come ad esempio le condizioni igieniche e la pulizia degli ambienti di stabulazione, oltre alla rilevazione delle ABMs (es. BCS, pulizia, lesioni).

2. Formazione degli addetti

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 2					
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI					
(Categoria di non conformità: Personale) 146/2001 All. Personale Punto 1.					
"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate"					
Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. corso di formazione/titolo di studio).					
Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori), il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale.					
Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).					
Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto).					
I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale					no; NO
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale/titolo di studio (o combinazione opposta)					SI
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 7 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni					Ottimale
2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.					

Poiché il benessere animale è un argomento di nuova concezione, necessita tuttora di essere divulgato adeguatamente tra gli operatori che lavorano a stretto contatto con gli animali. In particolare, il concetto di benessere animale e la capacità degli animali di provare sensazioni non devono essere

confusi con le tecniche e l'ambiente di allevamento in senso lato, anche se spesso il miglioramento delle condizioni di vita del bestiame ha comportato un aumento delle performance produttive e del livello di benessere generale. Per questo il personale deve essere competente e ben motivato ed è fondamentale che sia informato e formato relativamente ai bisogni degli animali in modo da poterne prevenire e gestire i problemi.

Il rapporto con l'uomo è infatti fondamentale per il benessere animale, atteggiamenti di tipo negativo causati da comportamenti bruschi, aggressivi o violenti, determinano uno stato di paura e di stress negli ovini e nei caprini (Muri et al., 2012). È importante che il personale, nei momenti di contatto con gli animali (es. durante le operazioni di movimentazione, rimescolamento, mungitura, trattamenti sanitari, tosatura, ecc.), mantenga una routine di lavoro costante, trattando gli animali con calma e tranquillità.

Per rispondere a questo quesito, è necessario valutare attentamente le competenze, le capacità e le conoscenze complessive del personale addetto agli animali [proprietario o detentore ovvero custode, cioè la persona che, anche temporaneamente, ne è responsabile e se ne occupa - D. Lgs. 146/2001, art.1, par. 2, lett. b)], considerando che esse possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio o corso di formazione).

Per questo, si considera accettabile la presenza di una **esperienza pratica** di almeno 7 anni nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori) il conseguimento di titolo di studio attinente o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale.

I titoli di studio attinenti ritenuti idonei sono: diploma o laurea in agraria, medicina veterinaria e lauree brevi o magistrali in produzioni animali o aree tematiche inerenti.

I corsi di formazione per proprietari, custodi o detentori dovrebbero essere strutturati prevedendo, ad esempio, una durata di almeno 8 ore (2 mezze giornate o 2 incontri serali) con argomenti riguardanti il benessere animale e i principali fattori di rischio, identificando chiaramente le principali esigenze delle specie ovina e caprina e illustrando i principi elementari del loro comportamento.

Tali conoscenze sono, infatti, ritenute un valore aggiunto alla preparazione e all'esperienza del personale, in quanto funzionali allo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, fondamentale per ottenere elevati livelli di benessere. Inoltre, il programma dei corsi dovrebbe prevedere una formazione specifica e adeguata in tema di norme minime di protezione degli animali in allevamento (comprese istruzioni pratiche relative alle mutilazioni consentite) e in relazione all'abbattimento degli animali (si veda requisito n. 6) nel caso lo stesso debba essere effettuato da personale aziendale.

I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Per assegnare un giudizio ottimale, invece, è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica.

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il proprietario/detentore o il custode degli animali).

Una condizione ottimale è rappresentata anche dalla presenza di istruzioni pratiche impartite a tutti gli addetti sulla gestione e sul benessere degli animali, evidenziata da documenti raccolti (ad es. in un manuale di buone prassi) che ne dimostrano il contenuto, a condizione che le procedure di formazione e/o le istruzioni operative rivolte al personale presente in allevamento siano state diffuse.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CREMBA

II ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 2).

Elemento di verifica 3					
NUMERO DI ISPEZIONI					
(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2010 All. Controllo Punto 2					
“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.” L’ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento. Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o compiute con particolare impiego di attenzione da parte dell’operatore (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell’alimentazione con strumenti meccanici). Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata, oltre ad un numero conforme di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale.					
Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti: - STALLA: meno di 1 ispezione/giorno; - ALL’APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione, al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari					no; NO
Si considera adeguato un numero di visite sufficienti: - STALLA: almeno 1 ispezione/giorno; - ALL’APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione, al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari					SI
Si considera ottimale un numero di visite superiore al requisito minimo previsto: STALLA/ALL’APERTO (PASCOLO): 2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata					Ottimale
3) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno; mentre gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare sofferenze.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto e se esiste un programma per organizzare le ispezioni degli animali stabulati all’aperto					

Un'ispezione corretta degli animali prevede che tutti gli individui allevati vengano osservati e valutati in funzione della loro condizione di salute e benessere. Tale operazione deve essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell'individuare possibili criticità e/o qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo.

Affinché le ispezioni siano svolte in modo efficace, bisogna tenere presente che gli animali in salute emettono normalmente delle vocalizzazioni, sono attivi, hanno movimenti e posture adeguate alla loro età, al sesso, alle condizioni psicologiche, allo stadio di maturità sessuale e alle condizioni di allevamento. Animali sani hanno occhi puliti e vivaci, vello e manto in buone condizioni, cute priva di lesioni, arti e piedi normali, manifestano normale comportamento alimentare e di abbeverata, normale ruminazione, corretta defecazione ed urinazione ed un adeguato comportamento esplorativo. Per questo, le ispezioni non si devono svolgere nel corso di attività routinarie, come la distribuzione degli alimenti o la mungitura, qualora le stesse siano altamente specializzate o impegnino in modo massivo l'attenzione dell'operatore. Tuttavia, situazioni in cui il numero degli animali sia molto ridotto (es. meno di 30-40 capi totali) o, ad esempio, la mungitura sia eseguita a mano, consentono lo svolgimento dell'ispezione durante queste attività routinarie.

Il controllore ufficiale deve, pertanto, verificare che almeno un addetto dell'allevamento effettui un'attenta osservazione degli animali almeno una volta al giorno nel caso di soggetti stabulati in stalla e ad intervalli sufficienti e con frequenze regolari e programmate in caso di animali stabulati all'aperto o al pascolo.

Tale requisito si applica a tutti i gruppi di animali presenti (es. adulti, rimonta e capretti/agnelli).

Stabilire quale sia il numero di ispezioni sufficienti per gli animali stabulati all'aperto non è affatto semplice, ma non può prescindere dal considerare la tipologia e la fase produttiva/riproduttiva degli animali in esame (es. animali adulti che devono partorire; presenza di animali molto giovani, ecc.); la stagione in cui gli animali sono allevati all'aperto (es. periodi di forte calore o freddo intenso); le caratteristiche della zona di stabulazione all'aperto (es. facilità per gli animali di reperire acqua, alimenti, riparo; assenza di pendii impervi o predatori; ecc.); l'evenienza di particolari eventi straordinari (es. forti temporali; ecc.).

La valutazione di tale attività si configura come requisito ottimale quando le ispezioni sono almeno 2 al giorno e, oltre ad osservare, l'addetto descrive e registra i comportamenti anomali (posture, "facies", stereotipie, segni di lotta, ecc.), i segni clinici o le lesioni riscontrate.

4. Illuminazione per l'ispezione

“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 3).

Elemento di verifica 4					
ILLUMINAZIONE PER L'ISPEZIONE					
(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2001 All. Controllo Punto 3					
“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile”					
L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.					
Illuminazione per l'ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione					no; NO
Illuminazione per l'ispezione sufficiente: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante					SI
4) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*):					
(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne					

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali; in aggiunta, dovrebbe essere presente un'illuminazione fissa o mobile che consenta di controllare gli animali in qualsiasi momento, anche di notte, e al pascolo.

Per l'ispezione degli animali si ritiene adeguata la presenza dell'illuminazione fissa artificiale; se assente, il valutatore verifica la presenza, disponibilità e funzionalità di una fonte luminosa mobile.

5. Trattamento degli animali malati o feriti

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

Elemento di verifica 5					
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI MALATI O FERITI					
(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2001 All. Controllo Punto 4					
“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.” Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato (non necessariamente di tipo farmacologico), verificare tramite intervista presso gli addetti se sono state impartite precise istruzioni, anche di tipo orale. Punti da controllare: - la verifica dell'immediato trattamento: si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale malato o ferito possa essere spostato o sia già stato spostato nel reparto infermeria (area o box, eventualmente isolato) o, in alternativa, che l'animale malato (che non necessita dell'infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza); - il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda. Per assegnare il giudizio conforme tutte le condizioni devono essere soddisfatte.					
Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda					no; NO
Si considera adeguato: presenza di personale istruito ed evidenza che i due punti di verifica sopra enunciati siano soddisfatti					SI
Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite, della zoppia, o specifici protocolli terapeutici).					Ottimale
5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

(*) Indicare se sono presenti animali ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati, feriti o con problemi di tipo comportamentale

Unitamente all'ispezione giornaliera degli animali, è di fondamentale importanza che il proprietario, il detentore o l'addetto agli animali si accorga precocemente della presenza di eventuali segni di malattia, di malessere o di trauma in uno o più soggetti e che si adoperi prontamente per porvi rimedio. In particolare, se gli animali in questione non rispondono positivamente ai primi trattamenti che l'operatore può mettere in atto (non necessariamente di tipo farmacologico), è assolutamente necessario consultare un medico veterinario, che farà le dovute considerazioni del caso.

Al momento della valutazione, è possibile assegnare il giudizio accettabile se gli animali malati o feriti vengono gestiti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Pertanto, in sede di ispezione, sarà necessario valutare se sono presenti animali malati o feriti che hanno necessità di trattamenti appropriati.

In caso di loro presenza, verificare il rispetto dei punti 1 e 2 sopra enunciati:

1. *verifica dell'immediato trattamento*: si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale malato o ferito possa essere spostato o sia già stato spostato nel reparto infermeria (area o box, eventualmente isolato) o, in alternativa, che l'animale malato (che non necessita dell'infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto nel registro dei trattamenti, cartaceo e/o elettronico, o nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza);
2. *consulto con un veterinario*: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

In caso di assenza di animali malati o feriti al momento dell'ispezione, verificare che l'allevatore sia in grado di mettere in pratica i punti 1 e 2 in caso di necessità.

Infine, il giudizio non adeguato si assegna di fronte all'evidenza di personale non istruito sulle modalità di trattamento di animali malati o feriti o alla presenza in allevamento di animali che necessitano di un intervento (ad es. medicazione, trasferimento in infermeria, ecc.), e non l'hanno ancora ricevuto.

Durante la valutazione è necessario tenere presente l'insorgenza e il decorso delle varie patologie riscontrate, difatti alcune potrebbero avere un andamento iperacuto tale da determinare il ritrovamento di alcuni soggetti malati, ancora non gestiti, al momento del sopralluogo. L'assegnazione del giudizio non adeguato deve, quindi, tenere conto dell'insorgenza e del decorso delle varie patologie riscontrate nei reparti non adibiti ad infermeria.

Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite, della zoppia, delle patologie infettive, traumatiche, ecc.).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

6. Abbattimento

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4).

“L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento” (Reg. CE 1099/2009, considerando 2).

“La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale. Nella maggior parte dei casi gli animali possono essere abbattuti nel rispetto di adeguate condizioni di benessere. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarne le sofferenze. Nell’interesse degli animali è opportuno dunque escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento. (Reg. CE 1099/2009, considerando 12).

Definizioni (Reg. CE 1099/2009; Art. 2):

a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale;

d) «abbattimento d’emergenza»: *l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, **qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze**; e secondo il considerando n.12 è da intendersi “emergenza” in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del regolamento. L’abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d’emergenza.*

j) «macellazione»: *l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana.*

Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate:

- 1. Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.*
- 2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:*
 - a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;*
 - b) siano protetti da ferite;*
 - c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;*
 - d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;*
 - e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;*
 - f) non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere. (Reg. CE 1099/2009, Capo II, Articolo 3, Paragrafo 1 e 2).*

Metodi di stordimento

- 1. Gli animali sono **abbattuti** esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale. (Reg. CE 1099/2009, Capo II Articolo 4).*
- Consultare il Reg. CE 1099/2009, allegato 1, capo 1 per chiarimenti sulle metodologie.

Livello di competenze e certificato di idoneità

- 1. L'**abbattimento** e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano **un adeguato livello di competenze** per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.*
- 2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di **macellazione** siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...] (Reg. CE 1099/2009, Capo II Articolo 7).*

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile. (Reg. CE 1099/2009, Capo IV Articolo 19).

“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.” (Reg. CE 1/2005, Allegato I, Capo I, Paragrafo 1)

Linee guida sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009

“Macellazione d'urgenza al di fuori dal macello

Gli animali che presentano lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, così come definito dal Regolamento (CE) 1/2005, al fine di evitare ulteriore sofferenza, possono essere sottoposti alla macellazione in allevamento, come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI. Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità.”

Elemento di verifica 6

ABBATTIMENTO

(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2001 All. Controllo Punto 4, Reg. CE 1099/2009 e Reg. CE 1/2005 Allegato I, Capo 1, Paragrafo 1

D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]”

Reg. 1099/2009

Art. 2 Definizioni

a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale;

d) «abbattimento d'emergenza»: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;

e secondo il considerando n.12 è da intendersi “emergenza” in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l'abbattimento di emergenza dall'applicazione di determinate disposizioni del regolamento. L'abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d'emergenza.

j) «macellazione»: l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana.

Capo II Articolo 4

Metodi di stordimento

1. Gli animali sono **abbattuti** esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale.

Capo II Articolo 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

1. L'**abbattimento** e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di **macellazione** siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...]

Capo IV Articolo 19

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.

Reg. 1/2005

Allegato I, Capo I, Paragrafo 1

“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.”

Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009).

Valutare che tali pratiche siano svolte da personale competente (es. eutanasia effettuata da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure proprietario/detentore adeguatamente formato) e che siano presenti delle istruzioni (es. numeri da contattare in caso d'emergenza, materiale didattico del corso frequentato dal proprietario/detentore, modalità di manutenzione degli strumenti, ecc.).

È tuttavia possibile, in casi eccezionali, effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza. In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un prolungamento delle sofferenze dell'animale. Questi eventi non devono avere tuttavia caratteristiche di routinarietà.

I limiti indicati relativamente alla presenza di istruzioni in allevamento sono un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione	no; NO
Si considera adeguato: Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione	SI
Il requisito superiore previsto prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza	Ottimale

6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di MSU o abbattimento. Le valutazioni ABM in calce alla checklist (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

Qualora animali malati o feriti versino in condizioni particolarmente gravi e dolorose, caratterizzate da prognosi infausta o da lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, possono essere sottoposti in allevamento ad abbattimento (eutanasia) o a macellazione speciale d'urgenza (MSU), al fine di evitarne il protrarsi delle sofferenze.

La macellazione speciale d'urgenza (MSU) è possibile per un animale, per il resto sano, che ha subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello, se alla visita *ante mortem* effettuata da un veterinario vengono escluse eventuali sintomatologie relative a condizioni sanitarie dell'animale che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali o un eventuale trattamento farmacologico con tempi di sospensione ancora in corso. La procedura di MSU deve essere effettuata da personale provvisto di certificato di idoneità alla macellazione.

L'abbattimento (eutanasia) può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche se eseguito nelle migliori condizioni; è quindi opportuno che gli operatori o il personale adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante questa procedura. I metodi di abbattimento accettati per i ruminanti e più frequentemente utilizzati sono: iniezione letale (es. somministrazione di overdose di barbiturici) effettuata esclusivamente da un veterinario, il dissanguamento o l'enuervazione previo stordimento con proiettile captivo penetrante o non penetrante, effettuato da un veterinario o da personale adeguatamente formato.

Per personale adeguatamente formato si intende, oltre al veterinario, un operatore munito di certificato di idoneità alla macellazione o un operatore aziendale (proprietario/detentore o addetto agli animali), che abbia frequentato un corso sul benessere animale di almeno 8 ore, nel quale sia prevista la trattazione dell'argomento specifico, con nozioni teoriche e pratiche sull'abbattimento degli animali (individuazione dei casi in cui è necessario l'abbattimento, metodologie, strumenti, manutenzione, procedure, ecc.), completate da esercitazioni in campo, in presenza di idonei docenti (es. veterinario, operatore munito di certificato di idoneità, ecc.).

La condizione adeguata prevede che l'abbattimento sia effettuato da un medico veterinario, oppure da personale provvisto del certificato di idoneità alla macellazione oppure, da personale aziendale adeguatamente formato. Nel caso in cui l'abbattimento sia eseguito da personale aziendale, è necessario inoltre riscontrare la presenza di istruzioni scritte riguardanti le modalità di esecuzione dell'abbattimento, gli strumenti utilizzati e gli operatori autorizzati ad effettuare questo intervento. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere conservati in azienda anche gli attestati di partecipazione al corso di formazione.

In particolari circostanze, come nel caso di allevamenti di piccole dimensioni o a conduzione spiccatamente rurale, le istruzioni impartite agli operatori possono anche essere di tipo orale, purché il personale aziendale addetto all'abbattimento dia prova, tramite intervista, di conoscerle appieno e fornisca sufficiente garanzia di abbattere gli animali senza causare loro inutili e prolungati dolori, sofferenze o lesioni.

In ogni caso, la strumentazione utilizzata deve essere adeguata e sottoposta a regolare manutenzione (es. pistola a proiettile captivo funzionante, coltello affilato, ecc.) e il corretto funzionamento dovrà essere verificato durante l'ispezione. Nel caso in cui alla dichiarazione di utilizzo di un metodo non corrisponda la verifica della disponibilità di una strumentazione adeguata o sottoposta a corretta manutenzione, il giudizio dovrà essere valutato come insufficiente.

La condizione ottimale prevede, oltre ai criteri sopra elencati, anche la presenza in tutti i casi di un protocollo scritto (ad es. contenuto in un manuale di buone prassi) in cui vengano riportate in dettaglio le procedure per la corretta gestione degli animali malati o feriti, dal loro contenimento, primo soccorso, come eseguire l'abbattimento e le operazioni correlate, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'evenienza.

In alcune circostanze eccezionali, ad es. incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, è tuttavia possibile effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza (vedasi *abbattimento d'emergenza*). In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un inutile e grave prolungamento delle sofferenze dell'animale. Va da sé che questa eccezione deve mantenere caratteristiche di sporadicità, imprevedibilità (senza presentarsi a "cadenze" regolari) ed avere evidenza che nessun'altra possibilità pratica era percorribile.

Di seguito un estratto del Reg. CE 1099/2009 (allegato 1, capo 1).

ALLEGATO I

ELENCO DEI METODI DI STORDIMENTO E RELATIVE CARATTERISTICHE

(di cui all'articolo 4)

CAPO I

Metodi

Tabella 1 — Metodi meccanici

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche per determinati metodi — capo II del presente allegato
1	Dispositivo a proiettile captivo penetrante	Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall'impatto e dalla penetrazione di un proiettile captivo Semplice stordimento	Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Posizione e direzione dello sparo Velocità appropriata, lunghezza d'uscita e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s)	Non applicabile
2	Dispositivo a proiettile captivo non penetrante	Danni gravi al cervello provocati dall'impatto di un proiettile captivo senza penetrazione Semplice stordimento	Ruminanti, volatili da cortile, conigli e lepri Macellazione soltanto per i ruminanti Macellazione, spopolamento e altre situazioni per volatili da cortile, conigli e lepri	Posizione e direzione dello sparo Velocità appropriata, diametro e forma del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie Forza della cartuccia utilizzata Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s)	Punto 1
3	Arma a proiettile libero	Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall'impatto e dalla penetrazione di uno o più proiettili	Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Posizione dello sparo Potenza e calibro della cartuccia. Tipo di proiettile	Non applicabile
4	Macerazione	Schiacciamento istantaneo dell'intero animale	Pulcini fino a 72 ore e uova embrionate. Tutte le situazioni diverse dalla macellazione	Dimensione massima della partita da introdurre. Distanza tra le lame e velocità di rotazione Misure per impedire il sovraccarico	Punto 2
5	Dislocazione cervicale	Distensione e torsione manuale o meccanica del collo che provocano un'ischemia cerebrale	Volatili da cortile fino a cinque kg di peso vivo Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Non applicabile	Punto 3

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche per determinati metodi — capo II del presente allegato
6	Colpo da percussione alla testa	Colpo deciso e preciso alla testa che provoca danni gravi al cervello	Suinetti, agnelli, capretti, conigli, lepri, animali da pelliccia e volatili da cortile fino a 5 kg di peso vivo Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Forza e localizzazione del colpo	Punto 3

Tabella 2 — Metodi elettrici

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Elettronarcosi con applicazione di corrente limitata alla testa	Esposizione del cervello a una corrente che genera un'attività epilettiforme generalizzata sull'elettroencefalogramma (EEG) Semplice stordimento	Tutte le specie. Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Tempo minimo di esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) Frequenza della calibratura del dispositivo Ottimizzazione del flusso di corrente Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Posizione e superficie di contatto degli elettrodi	Punto 4
2	Elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo	Esposizione del corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un'attività epilettiforme generalizzata sull'EEG e la fibrillazione o l'arresto cardiaco Semplice stordimento in caso di macellazione	Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Tempo minimo di esposizione Frequenza della calibratura del dispositivo Ottimizzazione del flusso di corrente Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Posizione e superficie di contatto degli elettrodi Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento o semplici stordimenti	Punto 5

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
3	Bagni d'acqua	Esposizione di tutto il corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un'attività epilettiforme generalizzata sull'EEG ed eventualmente la fibrillazione o l'arresto cardiaco tramite immersione. Semplice stordimento eccetto quando la frequenza è uguale a o minore di 50 Hz	Volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Frequenza della calibratura del dispositivo Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Riduzione al minimo della sofferenza durante la sospensione Ottimizzazione del flusso di corrente Durata massima della sospensione ai ganci prima del bagno d'acqua Tempo minimo di esposizione per ciascun animale Immersione dei volatili fino alla base delle ali Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) per una frequenza superiore a 50 Hz	Punto 6

Tabella 3 — Metodi di esposizione a gas

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Biossido di carbonio ad alta concentrazione	Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 40 % di biossido di carbonio. Il metodo può essere usato in fosse, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati Semplice stordimento in caso di macellazione di suini	Suini, mustelidi, cincillà, volatili da cortile eccetto anatre e oche Macellazione soltanto per i suini Situazioni diverse dalla macellazione per i volatili da cortile, mustelidi, cincillà, suini	Concentrazione di biossido di carbonio Durata dell'esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento Qualità del gas Temperatura del gas	Punto 7 Punto 8
2	Biossido di carbonio in due fasi	Esposizione successiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio, seguita, quando gli animali hanno perso conoscenza, da una più elevata concentrazione di biossido di carbonio	Volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Concentrazione di biossido di carbonio Durata dell'esposizione Qualità del gas Temperatura del gas	Non applicabile

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
3	Biossido di carbonio associato a gas inerti	Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio associato a gas inerti fino all'anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati Il semplice stordimento per i suini se la durata dell'esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 7 minuti Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata complessiva dell'esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 3 minuti	Suini e volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Concentrazione di biossido di carbonio Durata dell'esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento Qualità del gas Temperatura del gas Concentrazione di ossigeno	Punto 8
4	Gas inerti	Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas inerti quali argo o azoto fino all'anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati Semplice stordimento in caso di macellazione di suini Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata dell'esposizione all'anossia è inferiore a 3 minuti	Suini e volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Concentrazione di ossigeno Durata dell'esposizione Qualità del gas Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento Temperatura del gas	Punto 8
5	Monossido di carbonio (in forma pura)	Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 4 % di monossido di carbonio	Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti Situazioni diverse dalla macellazione	Qualità del gas Concentrazione di monossido di carbonio Durata dell'esposizione Temperatura del gas	Punti da 9.1, 9.2 e 9.3
6	Monossido di carbonio associato ad altri gas	Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più dell'1 % di monossido di carbonio associato ad altri gas tossici	Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti Situazioni diverse dalla macellazione	Concentrazione di monossido di carbonio Durata dell'esposizione Temperatura del gas Filtrazione del gas prodotto dal motore	Punto 9

Tabella 4 — Altri metodi

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Iniezione letale	Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall'iniezione somministrata da un medico veterinario	Tutte le specie Situazioni diverse dalla macellazione	Tipo di iniezione Uso di farmaci approvati	Non applicabile

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENL

III TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)

7. Tenuta delle registrazioni dei dati

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta." (D. Lgs. 146/2001, allegato, punti 5-6).

NB: I riferimenti al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, attualmente abrogato, si intendono fatti ai corrispondenti articoli dei decreti legislativi 5 agosto 2022, n.134 e n.136.

"L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali." (D. lgs 134/2022 art. 9 comma 10).

Per quanto riguarda il D. Lgs. 136/2022 si vedano:

- articolo 6: *"Notifica e comunicazione delle malattie all'Autorità competente"*;
- articolo 11 comma 4 *"gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto"*;
- Allegato 3 *"Individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalità anomale"*.

Elemento di verifica 7

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI DEI DATI

(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri)

146/2001, punti 5-6; 134/2022, art. 9, comma 10; 136/2022, art. 6, art. 11, comma 4, e Allegato 3

D. Lgs. 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

(i riferimenti al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, attualmente abrogato, si intendono fatti ai corrispondenti articoli dei decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134 e n. 136)

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta."

D. Lgs. 134/2022 art.9, comma 10

“L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.”

D. Lgs. 136/2022

Art. 6 “Notifica e comunicazione delle malattie all'Autorità competente”; **art. 11 comma 4** “gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto”; **Allegato 3** “Individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalità anomale.”

Verificare in BDN la presenza del registro di carico e scarico e la corretta registrazione delle informazioni, al fine di valutare se si siano verificate eventuali mortalità anomale.

Nel caso si siano verificate mortalità anomale, verificare che siano state correttamente individuate, registrate e segnalate.

Si considera non conforme: assenza in BDN del registro di carico e scarico o mancata o non corretta registrazione delle informazioni e/ o evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136	NO
Si considera conforme: presenza in BDN del registro di carico e scarico e corretta registrazione delle informazioni e mancata evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136	SI

7) In BDN è presente il registro di carico e scarico, le informazioni vengono correttamente registrate e non sono presenti episodi di mortalità anomale non registrate

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non registrate o di mancanza delle registrazioni delle informazioni in BDN

Il detentore degli animali deve tenere un registro informatizzato, di carico e scarico degli animali, da cui risulti, tra l'altro, la registrazione degli animali usciti dall'attività perché morti.

Il controllore dovrà quindi valutare se eventuali casi di mortalità anomale sono stati correttamente comunicati. Per mortalità anomale si intendono, letteralmente, ai sensi del D. Lgs. 146/2001, tutti i casi di nuova malattia o morte improvvisa che si manifestano a distanza di 8 giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Se dal controllo relativo a questo item emergessero sospetti di irregolarità relative al sistema di identificazione e registrazione degli animali sarà comunque necessario rispondere “SI” al punto della check list che cita “Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE, ovvero all’impiego di sostanze vietate” e procedere come specificato successivamente nel documento, ai fini della corretta comunicazione degli esiti dei controlli di condizionalità.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punti 5-6).

Elemento di verifica 8					
TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI					
(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri) 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.					
<i>“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.”</i> Sono presenti le registrazioni informatizzate dei trattamenti su Vetinfo Farmacosorveglianza, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.					
Si considera non conforme: assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o non corretta registrazione dei trattamenti					NO
Si considera conforme: corretta registrazione dei trattamenti in Vetinfo farmacosorveglianza					SI
8) Le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza vengono effettuate nei tempi stabiliti e i trattamenti sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione					

L'allevamento deve disporre di un registro dei trattamenti terapeutici effettuati (ai sensi degli artt. 4, 5 e 15 del D. Lgs. 158/2006 e dell'art.79 D. Lgs. 193/2006), in cui il veterinario, che ha in cura gli animali, inserisce: la data di inizio e di fine trattamento, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di attesa corrispondenti.

L'allevatore vi riporta la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro i termini stabiliti dalla normativa sul corretto utilizzo del farmaco. Si rammenta che a partire dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei trattamenti devono essere effettuate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema Vetinfo.

Di conseguenza le verifiche dovranno riguardare, da tale data, esclusivamente le registrazioni in Vetinfo dei trattamenti farmacologici, secondo quanto indicato nel Manuale Operativo della Ricetta Elettronica.

Il registro cartaceo dei trattamenti, ammesso fino al 28 gennaio 2022, presenta pagine pre-numerate, è vidimato dall'Autorità Sanitaria competente è conservato per cinque anni dall'ultima registrazione, anche in caso di abbattimento o vendita degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta dell'Autorità Sanitaria per i controlli (art. 79, comma 2, D. Lgs. 193/2006).

Il valutatore verifica la presenza e la corretta compilazione del registro informatizzato, effettuando un controllo a campione su almeno due trattamenti, dei quali annota gli estremi nel campo "evidenze". La presenza della regolare tenuta delle registrazioni su Vetinfo è necessaria anche per garantire la verifica relativa al corretto e tempestivo trattamento degli animali malati o feriti e quella relativa all'utilizzo di analgesici e anestetici in corso di eventuali mutilazioni.

Pertanto, si considera non adeguato: l'assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o, in seguito al controllo a campione, il riscontro di un'errata registrazione dei trattamenti.

Si considera adeguato: la corretta registrazione dei trattamenti nel sistema Vetinfo farmacosorveglianza e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.

Se dal controllo relativo a questo item emergessero sospetti di irregolarità relative alla Sicurezza Alimentare sarà comunque necessario rispondere "SI" al punto della check list che cita "*Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE, ovvero all'impiego di sostanze vietate*" e procedere come specificato successivamente nel documento, ai fini della corretta comunicazione degli esiti dei controlli di condizionalità.

IV LIBERTA' DI MOVIMENTO

9. Superficie disponibile per il decubito: pecore/capre adulte (ovvero in lattazione, in asciutta) e arieti/becchi

10. Superficie disponibile per il decubito: animali da rimonta (> 3 mesi d'età)

11. Superficie disponibile per il decubito: agnelli e capretti (< 3 mesi d'età)

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. [...]” (146/2001 All. Libertà di movimento punto 7).

“La facilità di movimento, cioè la capacità degli animali di girarsi, di pulirsi, di alzarsi, di sdraiarsi e di sgranchire le gambe, è da tempo considerata un requisito fondamentale per un buon benessere. Questi movimenti sono parte del repertorio comportamentale di tutte le specie, e gli animali sono altamente motivati ad eseguirli. Sono, inoltre, importanti per mantenere l'adeguato funzionamento del corpo. La difficoltà di movimento può essere causata da una mancanza di spazio nei locali adibiti al ricovero degli animali. La densità troppo alta può anche impedire agli animali di muoversi normalmente. L'inadeguata progettazione delle strutture può impedire agli animali di sdraiarsi e di alzarsi normalmente” (EFSA, 2014)

Elemento di verifica 9					
SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO: PECORE/CAPRE ADULTE (OVVERO IN LATTAZIONE, IN ASCIUTTA) E ARIETI/BECCHI					
(Categoria di non conformità: Libertà di movimento) 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7.					
“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.” L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causare loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m). <i>I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (ad es. lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
PECORE/CAPRE ADULTE e ARIETI/BECCHI					
Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,5 m ² /capo per le pecore/capre adulte (arieti/becchi: < 3,5 m ² in box singolo e < 2,2 m ² /capo in box collettivo)					no; NO
Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,5 – 1,7 m ² /capo per le pecore/capre adulte (arieti/becchi: 3,5 m ² in box singolo e 2,2 m ² /capo in box collettivo)					SI
Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 1,7 m ² /capo per le pecore/capre adulte (arieti/becchi: > di 3,5 m ² in box singolo e > di 2,2 m ² /capo in box collettivo), oltre alla possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo					Ottimale
9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

Elemento di verifica 10					
SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO: ANIMALI DA RIMONTA (> 3 MESI D'ETÀ)					
(Categoria di non conformità: Libertà di movimento) 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7.					
<i>“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.”</i> L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 80 cm). <i>I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (ad es. lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
ANIMALI DA RIMONTA (> 3 mesi d'età)					
Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore 1,0 m ² /capo					no; NO
Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,0 – 1,2 m ² /capo					SI
Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 1,2 m ² /capo oltre alla possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo					Ottimale
10) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

Elemento di verifica 11					
SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO: AGNELLI E CAPRETTI (< 3 MESI D'ETÀ)					
<i>(Categoria di non conformità: Libertà di movimento) 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7.</i>					
<i>“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. [...]”</i> L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni. Considerare come superficie disponibile per il decubito l'intera area del box. Nel caso dei capretti, si considera ottimale la presenza di spazi ed arricchimenti ambientali adatti a stimolare il gioco, la curiosità e l'interazione dei soggetti in base alla loro età (es. da circa 45 giorni di vita), purché essi non rappresentino dei pericoli per l'incolumità dei giovani animali. <i>I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (ad es. lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
AGNELLI E CAPRETTI (< 3 mesi d'età)					
Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 0,3 m ² /capo di spazio per il decubito					no; NO
Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 0,3 - 0,5 m ² /capo di spazio per il decubito					SI
Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 0,5 m ² /capo di spazio per il decubito, e/o con la possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo anche solo qualche ora al giorno					Ottimale
11) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

La libertà di movimento deve essere rispettata per garantire agli ovini e ai caprini di poter manifestare comportamenti normali, come pulirsi senza difficoltà ed assumere posture caratteristiche della specie per sdraiarsi, alzarsi, dormire e riposare. Queste garanzie consentono di mantenere un alto livello di benessere in allevamento.

Per spazio libero disponibile si considera la superficie accessibile e fruibile, a disposizione delle pecore e delle capre adulte (in lattazione e in asciutta), degli animali da rimonta e dei maschi

riproduttori, sufficiente a consentire il decubito e i normali movimenti di alzata e coricata senza alcun impedimento. Sono da escludere dal computo della superficie disponibile le aree di esercizio, i corridoi e la corsia di accesso all'alimento (circa 100 cm per le pecore e capre adulte e circa 80 cm per la rimonta) che rendono tale spazio non fruibile. Infatti, se nella corsia di accesso all'alimento alcuni animali dovessero riposare in decubito, impedirebbero ad altri di accedere agli alimenti e questo accade tanto più frequentemente quanto è più ridotta la superficie disponibile.

L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali (attraverso i rispettivi criteri) e nel caso di scostamenti minimi dai valori riportati occorre comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento e le condizioni degli animali (es. presenza di effetti negativi in termini di salute e benessere) prima di esprimere il giudizio finale.

Pertanto, sottratto lo spazio di accesso alla rastrelliera/mangiatoia, si considera accettabile una superficie disponibile per il decubito compresa tra 1,5 e 1,7 m²/capo per le **pecore e le capre adulte** (Andersen et al., 2006) e tra 1,0 e 1,2 m²/capo per le **capre e le pecore da rimonta**.

Il riscontro di un valore superiore a tale superficie unitaria (> 1,7 m²/capo per gli animali adulti e > 1,2 m²/capo per la rimonta), unitamente alla possibilità di avere accesso ad un'area di esercizio, di dimensione pari a quella del decubito o alla presenza di pascolo o di arricchimenti ambientali consentono di assegnare il giudizio ottimale nella valutazione del presente parametro (Aschwanden et al 2009, Bøe et al., 2007; Miranda de la Lama e Mattiello, 2010).

In caso di nicchie sopraelevate per il decubito delle capre adulte, l'80% della loro superficie può essere calcolato come superficie utile al riposo.

Per gli agnelli e capretti stabulati in gruppo e allattati artificialmente, fino a circa tre mesi di età, si considera adeguata: una superficie compresa tra 0,3 - 0,5 m²/capo di spazio per il decubito mentre si considera ottimale la situazione in cui tutti gli animali siano liberi con una superficie disponibile superiore a 0,5 m²/capo di spazio per il decubito, e/o con la possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo anche solo qualche ora al giorno. Come per gli animali adulti, si considera ottimale – soprattutto per i capretti – la presenza di spazi ed arricchimenti ambientali adatti a stimolare il gioco, la curiosità e l'interazione dei soggetti in base alla loro età (es. da circa 45 giorni di vita), purché essi non rappresentino dei pericoli per l'incolumità dei giovani animali. Il giudizio ottimale non potrà invece essere assegnato nel caso in cui gli animali siano stabulati su grigliato senza la presenza di lettiera che garantisca un decubito confortevole.

Nel caso in cui, dopo la nascita, **gli agnelli e i capretti rimangano con le madri**, è necessario verificare che lo spazio per il decubito a disposizione di tutti gli animali sia la somma di quello destinato alle madri, cioè almeno 1,5-1,7 m²/capo, più quello destinato ai giovani animali, ossia almeno 0,3-0,5 m²/capo. Negli allevamenti di capre è buona norma che nei box che accolgono le

madri con i capretti, siano presenti delle nicchie dove il capretto possa coricarsi e sentirsi protetto per non essere calpestato dagli adulti.

Per ulteriore chiarimento, si fa presente che negli allevamenti ovini di tipo semi-estensivo, gli agnelli vengono svezzati in media intorno ai 45 giorni di vita; nei primi giorni dopo la nascita vengono lasciati in appositi recinti, in particolare quando le condizioni climatiche sono avverse durante la stagione invernale; successivamente seguono le madri al pascolo. Qualora gli agnelli vengano allattati con latte artificiale, dopo l'assunzione del colostro, vengono allevati in un'area separata dalle madri in appositi recinti che, durante il periodo invernale, sono dotati di lampade riscaldanti, il cui impiego è fondamentale per creare delle zone confortevoli e termicamente idonee agli animali.

Per gli arieti e i becchi si devono garantire 3,5 m² in box singolo e 2,2 m²/capo in box collettivo; misure superiori permetteranno di esprimere un giudizio migliorativo oltre alla possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo o presenza di arricchimenti ambientali per i becchi; al contrario, superfici inferiori ai limiti minimi indicati saranno valutate negativamente.

I becchi (ad eccezione del periodo dei calori quando vengono introdotti nel box delle femmine) devono essere stabulati separatamente da quest'ultime, in box singolo o collettivo, al fine di evitare atteggiamenti fastidiosi e lesivi nei confronti delle capre non in calore.

Lo stesso dicasi per gli arieti che, ad eccezione dei periodi dei calori, sono stabulati separatamente dal resto del gregge in recinti/box singoli. In caso di box singolo è consigliabile che sia consentito il contatto visivo con gli altri animali del gregge.

In generale, gli arricchimenti ambientali sono raccomandati per gli allevamenti di capre. Per arricchimento ambientale si intende l'introduzione di oggetti che comportino un cambiamento dell'ambiente di stabulazione al fine di migliorare le funzioni biologiche dell'animale e soddisfare le caratteristiche etologiche della specie. Infatti, la mancanza di stimoli ambientali può portare la capra ad atteggiamenti di noia ed apatia fino alla frustrazione. Si considerano arricchimenti ambientali: mangiatoie ben dislocate, poste anche ad altezze diverse, pareti divisorie verticali, tavolati e gradini, che favoriscono il movimento e la naturale tendenza ad arrampicarsi tipica della capra, come pure sassi, rocce o tronchi di albero. Non sono considerati arricchimenti ambientali i giochi (es. la palla), la musica e le spazzole (Newberry, 1995).

Vista l'ampia varietà di razze ovine e caprine allevate sul territorio nazionale, il valutatore dovrà esprimere il suo giudizio tenendo conto anche dello sviluppo corporeo dei soggetti, che può essere influenzato dalla specie, dalla razza o dalla selezione genetica. Le misure riportate in questi criteri si riferiscono indicativamente ai seguenti pesi:

- capre adulte: tra i 40 e i 70 kg;
- capre da rimonta: tra 20 e 40 kg;

- becchi: oltre i 70 kg;
- pecore adulte: 40-50 kg (75 kg nelle razze pesanti);
- pecore da rimonta: 20-30 kg;
- arieti: oltre i 70 kg (fino a 100 kg nelle razze pesanti).

Infine, se durante l'ispezione si riscontrasse la presenza di animali (es. becchi) legati, è necessario verificare che ciascuno di essi abbia lo spazio disponibile e la libertà di movimento adeguati per alzarsi e coricarsi, per alimentarsi ed abbeverarsi e per accudire a sé stesso ed interagire con gli altri animali. L'attrezzatura utilizzata per legare l'animale non deve ovviamente causare ad esso disagio, lesioni o sofferenze.



Figura 1 - Becco costantemente legato per impedirgli di scavalcare le pareti del box. Anche se costantemente legato, ogni animale deve poter mangiare, bere, alzarsi e decubitarsi in libertà e confortevolezza.



Figura 2 – Esempi di box singoli adeguati per becchi



Figura 3 – Esempio di box adeguato per capretti.



Figura 4 – Esempio di box che assicura uno spazio troppo limitato per i capretti.



Figura 5 – Esempio di recinto per capre adulte troppo sovraffollato.



Figura 6 - Esempio di superficie adeguata al decubito delle capre adulte.



Figura 7 - Un sasso e un tronco come esempio di arricchimento ambientale.



Figura 8 - Esempio di recinto per pecore adulte con agnelli, dal giudizio almeno adeguato.



Figura 9 - Esempio di recinto per pecore adulte troppo sovraffollato.



Figura 10 - Esempio di recinto per agnelli ≤ 90 giorni dal giudizio adeguato.



Figura 11 - Esempio di recinto per agnelli ≥ 90 giorni chiaramente sovraffollato: giudizio non adeguato.



Figura 12 - Esempio di box per agnelli ≤ 90 giorni fornito di riscaldamento artificiale.

V EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

12. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi)

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 8).

Elemento di verifica 12					
IGIENE, PULIZIA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI STABULAZIONE E DELLA LETTIERA (TUTTI I GRUPPI)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 8.					
<i>“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”</i> Considerare l’igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera, e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. <i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
Si considera non adeguato: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali					no; NO
Si considera adeguato: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente in quasi tutti i gruppi					SI
Si considera ottimale: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale					Ottimale
12) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati. Gli escrementi, l’urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le					

valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità
--

La valutazione deve essere condotta osservando tutti gli ambienti in cui sono stabulati gli animali presenti in allevamento al momento della visita, compresi quelli giovani e improduttivi.

Tutte le superfici di camminamento e di stabulazione, come lettieri, pavimenti, passaggi, paddock esterni, ecc., siano esse deputate ad ospitare gli animali giovani e improduttivi, gli animali in lattazione o in asciutta, devono essere pulite, asciutte e garantire un facile accesso al personale, per agevolare le operazioni di pulizia quotidiana e di rinnovo delle lettieri. In caso di stabulazione prevalente su lettiera, essa dovrebbe essere mantenuta asciutta e pulita per tutta la sua superficie.

Una pavimentazione e/o una lettiera sporche, mal gestite, umide e fredde possono causare negli animali delle problematiche comportamentali e sanitarie. Infatti, un'insufficiente cura della lettiera predispone gli animali ad un aumento delle affezioni gastro intestinali e respiratorie a causa del ristagno di feci ed urina. Si ricorda che anche i recinti e le attrezzature che compongono i box, le pareti e i soffitti dovrebbero essere facilmente lavabili e disinfettabili.

La valutazione della gestione della lettiera dovrà considerare sia il livello di igiene osservabile sia la routine e l'organizzazione delle operazioni di mantenimento della stessa. La lettiera deve essere composta da materiali idonei (paglia, stocchi di mais o pula di riso) e non generare eccessiva polvere al momento della distribuzione. Affinché le operazioni di gestione della lettiera risultino corrette è necessario che, oltre a fornire una sufficiente quantità di materiale, venga anche garantito che la lettiera si mantenga asciutta mediante un'adeguata ventilazione all'interno della struttura.

La lettiera dovrebbe essere curata (pulizia, rabbocco, rinnovo e ridistribuzione del materiale) con una frequenza che tenga conto della capacità assorbente del prodotto utilizzato, del periodo stagionale e della tipologia di animali allevati, in quanto l'aumento della minzione, le feci meno solide o la presenza di invogli fetali possono influire sul livello di pulizia della lettiera.

Negli allevamenti ovini e caprini, ad esempio, la lettiera dovrebbe essere eliminata in toto ogni 2-3 mesi e rabboccata ogni 2-3 giorni.

La capra è un animale che ama sdraiarsi su una lettiera pulita ed asciutta; quindi carenti condizioni d'igiene e soprattutto un'elevata umidità della lettiera potrebbero influenzarne negativamente il riposo e la ruminazione. Alcune ricerche hanno evidenziato anche come gli ovini preferiscano sdraiarsi nella paglia rispetto ad altre tipologie di lettieri (Bøe, 1990; Gorden and Cockram, 1990; Faerevik et al., 2005) e questo atteggiamento risulta essere maggiormente evidente nelle razze a pelo corto.

In generale le razze ad attitudine da latte presentano vello meno spesso degli ovini da carne; questo suggerisce che le razze da latte abbiano necessità di una lettiera di paglia per termoregolarsi

specialmente durante la stagione fredda. Per gli ovini allevati in maniera estensiva è necessario mettere a disposizione almeno una superficie asciutta per il riposo (EFSA, 2014).

Nel caso in cui il materiale da lettiera sia assente e gli animali debbano coricarsi sul pavimento, considerare che, se la superficie in questione è pulita, il giudizio potrà essere al massimo conforme, in quanto gli animali sono costretti a coricarsi in ogni caso su una superficie bagnata.

In aggiunta, i box, le pareti e i soffitti dovrebbero essere facilmente lavabili e disinfettabili. La disinfezione dovrebbe avvenire ogni volta che tutti i locali sono stati sgomberati dagli animali e prima dell'introduzione dei nuovi soggetti; come prassi ottimale le procedure di pulizia e disinfezione di fine ciclo andrebbero formalizzate in specifici protocolli operativi (es. manuale di buone prassi).

Anche negli allevamenti semi-intensivi, semi-estensivi o estensivi sarà necessario svolgere una valutazione del livello igienico presente. Infatti, si considera adeguata una prevalenza di ambienti asciutti e puliti, con presenza di aree bagnate o fangose solo nei pressi, ad esempio, dei punti di abbeverata, in modo che gli animali possano comunque scegliere di coricarsi in spazi puliti, asciutti e confortevoli. All'opposto, una prevalenza di ambienti molto sporchi, paludosi o fangosi è da considerarsi negativamente; mentre può essere assegnato il giudizio ottimale se tutti gli ambienti sono asciutti e ben drenati anche nei pressi dei punti di abbeverata, grazie ad una copertura uniforme da coltre erbosa e/o ad esempio per presenza di fontane/vasche in cemento o altro materiale. In base alle caratteristiche dell'area di stabulazione all'aperto, rappresenta una condizione ottimale anche l'intervento dell'operatore nella rimozione regolare del materiale organico prodotto e nell'aggiunta di lettiera pulita e asciutta nei punti ascrivibili a riposo e decubito.

Le situazioni in cui si palesi la presenza di ambienti molto puliti ed asciutti, con una lettiera idonea e rabboccata a giorni alterni in tutti i gruppi, possono essere giudicate ottimali.

Si precisa che, in questo quesito, gli elementi da verificare sono la gestione e le condizioni igieniche degli ambienti di stabulazione e della lettiera, mentre la valutazione delle loro caratteristiche e tipologie, ovvero della loro possibilità di essere nocivi agli animali è compresa nel quesito n.14 "Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi".



Figura 13 – Capre adulte: esempio di lettiera e corridoi sporchi.



Figura 14 – Esempio di lettiera con livello di pulizia accettabile.



Figura 15 – Capre adulte: esempio di corridoio dalla pulizia accettabile.



Figura 16 - Pecore adulte: esempio di lettiera sporca.



Figura 17 – Pecore adulte: esempio di lettiera dalla pulizia accettabile (prestare attenzione alla presenza di materiale fecale evidente).



Figura 18 – Pecore adulte: esempio di lettiera pulita, asciutta e gestita in modo ottimale con ricambio frequente del materiale.



Figura 19 – Agnelli: esempio di lettiera pulita, asciutta e gestita in modo ottimale con ricambio frequente del materiale

13. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 8).

Elemento di verifica 13					
IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA					
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione</i>					
<i>Punto 8.</i>					
<i>“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”</i>					
PECORE E CAPRE DA LATTE					
Valutare l'igiene generale dei locali e delle attrezzature per la mungitura (comprese sala di mungitura, sala di attesa e mangiatoie), senza confondere questo aspetto con il loro livello tecnologico. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Si considera non adeguato: Presenza di residui fecali o altro sui gruppi, sui pavimenti, sui muri e sulle mangiatoie, o presenza di materiali difficilmente lavabili e disinfettabili					no; NO
Si considera adeguato: Pulizia adeguata dei gruppi e delle mangiatoie ma presenza di residui fecali o altro su pavimenti e muri					SI
Si considera ottimale: Assenza di residui fecali e buona igiene generale					Ottimale
13) I locali e le attrezzature adibite alla mungitura sono puliti regolarmente e frequentemente e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario					
Gli escrementi e l'urina sono rimossi con regolarità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Indicare le condizioni igieniche dei locali e delle attrezzature adibite alla mungitura					

Negli allevamenti ovini e caprini da latte è necessario valutare anche l'igiene delle attrezzature e dei locali della sala di mungitura, in quanto riveste notevole importanza sia per la salute degli animali, sia per le condizioni igienico-sanitarie del latte raccolto, con evidenti riflessi di sanità pubblica.

Al riguardo si raccomanda che le attrezzature per la mungitura siano mantenute pulite attraverso la rimozione quotidiana delle feci dalle parti meccaniche del gruppo di mungitura, dai pavimenti e dalle pareti della sala.

Bisogna inoltre controllare la pulizia delle mangiatoie, per verificare che non ci siano residui di alimenti e di sporcizia inveterati.

Controllare anche lo stato di pulizia della sala di attesa, nel caso sia presente, e dei corridoi e/o delle rampe di accesso alla sala o al palchetto di mungitura.

Analogamente, nel caso di allevamenti da latte di tipo semi-estensivo ed estensivo, dove gli animali vivono all'aperto e vengono convogliati appositamente verso la sala di mungitura, per rispondere al presente criterio di valutazione è necessario verificare anche le condizioni di igiene caratterizzanti gli spazi antistanti la sala di mungitura, che devono essere dotati di ripari per proteggere gli animali dal sole o dalle intemperie durante l'attesa.

La zona di sosta pre-mungitura, infatti, è il luogo dove le pecore sostano in attesa di essere munte; le sue condizioni influenzano in maniera considerevole sia lo stato di benessere degli animali sia le caratteristiche igieniche del latte. È, pertanto, fondamentale che questa zona 1) sia adeguatamente pulita (la presenza di fango e acqua stagnante influisce negativamente sullo stato di pulizia della mammella e di altre parti del corpo, 2) sia di superficie adeguata alla numerosità del gruppo in mungitura e dotata di recinzione costruita con materiale che non arrechi danno agli animali, 3) riparata dai venti dominanti e dotata di tettoia, per consentire il riparo degli animali durante la stagione estiva ed invernale (Nicolussi P. e Cannas A., 2005).

Nel caso in cui l'impianto di mungitura sia collocato all'interno della stalla, senza una netta divisione tra l'area dedicata alla mungitura e quella per la stabulazione degli animali, non si potrà assegnare un giudizio ottimale, per il difficile mantenimento di un elevato livello igienico.



Figura 20 - Palchetto di mungitura all'interno della stalla: livello di pulizia accettabile.



Figura 21 – Sala di mungitura: livello di pulizia ottimale.



Figura 22 – Sala d’attesa alla mungitura sporca.



Figura 23 - Zona di accesso alla sala di mungitura dalla pulizia ottimale.



Figura 24 – Zona di accesso alla sala di mungitura con ottimali condizioni di pulizia.

CRenBA 2021



Figura 25 – Sala di mungitura: pulizia ottimale.

CRenBA 2021



Figura 26 - Sala per la mungitura: livello di pulizia accettabile.



Figura 27 - Sala di mungitura: pulizia ottimale



Figura 28 – Esempio zona di sosta pre-mungitura, dove le pecore vengono convogliate in attesa di essere munte.

14. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 8)

“I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali” (D. Lgs. 146/2001 allegato, punto 9).

Elemento di verifica 14					
ASSENZA DI FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE NOCIVI (TUTTI I GRUPPI)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione					
Punti 8 e 9					
<i>“8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.</i> <i>9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.”</i> Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse (incluse quelle di camminamento: pavimenti, corridoi, passaggi, accessi, corsia di alimentazione, aree di esercizio, ecc.), con cui gli animali possono venire a contatto, e i dispositivi di attacco eventualmente utilizzati, non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare lesioni o traumi.					
Si considera non adeguato: Presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, corridoi, accessi, delimitazioni, attacchi che causano lesioni agli animali					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di locali, ambienti, percorsi e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali					SI
14) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con le quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. superficie di decubito o lettiera dannosa e gravemente lesiva per gli animali; presenza di spigoli, rastrelliere, passaggi, corridoi, attacchi ecc.					

taglienti e/o lesivi, con sporgenze, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni cutanee, zoppie) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Tutti i materiali, le lettiere e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione e al pascolo, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare traumi o lesioni gravi, tali da causare importanti sofferenze agli animali.

Contemporaneamente tutte queste attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate.

Il controllore ufficiale verifica che le strutture siano integre e che non possano arrecare danno agli animali. La presenza di valutazioni insufficienti a livello di zoppie o di lesioni cutanee può supportare eventuali non conformità, tuttavia, è necessario valutare approfonditamente i tipi di lesione e le cause ipotizzate. Nel caso di un numero elevato di lesioni cutanee è necessario approfondire la possibile eziologia al fine di relazionare correttamente le cause.



Figura 29 – Presenza di verghe di ferro in grado di provocare lesioni o traumi.

15. Infermeria (tutti i gruppi)

“[...] Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4, comma 2).

Elemento di verifica 15	
INFERMERIA (TUTTI I GRUPPI)	
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Controllo Punto 4.	
“Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli.” Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un’area di isolamento-infermeria o, in caso di necessità e in base alle caratteristiche dell’azienda (es. gregge di piccole dimensioni) possa servirsene. Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento ed acqua fresca <i>ad libitum</i>. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate. Se la zona è un recinto individuale di isolamento, esso deve avere dimensioni adeguate, permettere all’animale di girarsi facilmente, di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie. La zona di isolamento-infermeria deve essere fornita di lettiera asciutta e confortevole che possa migliorare le condizioni degli animali. Si considera requisito adeguato l’esistenza di un’infermeria identificata e circoscritta adibita a tale funzione. Quest’area deve essere segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta (se è soggetta a rotazione) o segnalata sulla planimetria aziendale (se è a localizzazione fissa). <u>Tuttavia, in caso di allevamenti di piccole dimensioni per “infermeria identificata” si intende che:</u> - in caso di presenza di animali feriti o che necessitano isolamento, il box o altro spazio o settore deve essere identificato; - in caso non ci siano animali feriti o bisognosi di isolamento, il box o altro spazio o settore può essere solo “identificabile”, ma l’allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità. Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non inferiore al 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m²/capo), facili da ispezionare da parte dell’operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, asciutta ed abbondante, abbeveratoi e facile accesso al cibo. <i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>	
Si considera non adeguato: Assenza di qualsiasi locale specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati	no; NO
Si considera adeguato: Presenza di locale identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta e confortevole, ove la condizione clinica lo richieda	SI

Si considera ottimale: Presenza di locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m ² /capo)					Ottimale
15) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta e confortevole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche del recinto di isolamento-infermeria					

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento disponga [o possa servirsene ove necessario, nel caso di aziende di piccole dimensioni (esempio: meno di 30-40 capi totali)] di un'area di isolamento-infermeria costituita da specifici box collettivi o individuali, preferibilmente su lettiera permanente e, se possibile, separata dal resto del gregge (soprattutto in relazione alla patologia degli animali da isolare).

Queste aree devono essere utilizzate per il ricovero e la separazione di animali feriti o malati, al fine di consentire o facilitare il loro trattamento e la guarigione. La separazione degli animali infermi è importante per evitare che gli animali sani arrechino disturbo o competano per l'alimento o per il decubito. Tuttavia, una certa possibilità di contatto visivo e/o tattile con i conspecifici dovrebbe essere sempre garantita, per evitare stress inutili, essendo gli ovini e i caprini animali sociali.

L'infermeria deve essere identificata ed evidenziata da apposita cartellonistica o altra indicazione scritta o segnalata sulla planimetria aziendale, come area circoscritta adibita a tale funzione. Pertanto, se presente, tale area deve essere vuota o contenente solo individui la cui condizione clinica richieda un trattamento specifico.

Tuttavia, nel caso di allevamenti di piccole dimensioni (esempio meno di 30-40 capi totali), è consentito che - ove non ci siano animali feriti o bisognosi di isolamento al momento della visita - il box o altro spazio o settore destinato all'infermeria possa non essere presente e dunque solo "identificabile", ma l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.

Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento e acqua in idonee quantità (*ad libitum*) e tale spazio deve essere fornito di lettiera confortevole, paglia o materiali simili, e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali, nel caso in cui la condizione clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito o zoppi.

Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non inferiore al 3% del numero medio capi presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m²/capo), facili da ispezionare da parte dell'operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, abbeveratoi a livello, facile accesso all'alimento e con attrezzature specifiche per l'immobilizzazione del soggetto e per l'esecuzione di eventuali terapie. Un'eccellente pratica gestionale è tenere e compilare regolarmente un registro/quaderno infermeria (suppletivo al registro dei trattamenti), nel quale indicare i capi ricoverati, i problemi riscontrati e gli eventuali trattamenti eseguiti.



Figura 30 - Locale infermeria, separato e con lettiera asciutta e confortevole (ottimale).



Figura 31 - Locale infermeria, separato e identificato, ma privo di lettiera.

16. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 16 TEMPERATURA ED UMIDITÀ (TUTTI I GRUPPI) (Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10.					
“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”. Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature per il mantenimento di condizioni non dannose per gli animali. L’isolamento termico della struttura, il riscaldamento (es. per capretti e agnelli) e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali, la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa e le concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniacale, ecc.). Il livello di ventilazione adeguato deve permettere da un lato la rimozione del calore quando eccessivo (es. estate – inizio autunno) e dall’altro la rimozione dell’umidità in eccesso nelle stagioni più fredde (es. tardo autunno - inverno) mantenendo però una temperatura confortevole (protezione dal freddo eccessivo). La ventilazione naturale può essere garantita da ampie finestre, la cui apertura è regolata in base alla temperatura interna ed esterna, a cui si associa un buon isolamento termico della copertura (coibentazione) e la presenza di un camino e/o la presenza di teloni ombreggianti o antiventto. Si considera “stalla aperta” quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Si considera non adeguato: Presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un’adeguata aerazione oppure insufficiente protezione dal caldo e dal freddo					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) oppure possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche, modulando le aperture in funzione del clima oppure presenza di impianti meccanici di ventilazione/aerazione idonei (senza sistemi di controllo)					SI
Si considera ottimale: Oltre ai criteri per l’adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. coibentazione delle strutture, oppure presenza di impianti meccanici di condizionamento del microclima con sistemi automatici di controllo oppure pascolo idoneo con ripari naturali/artificiali					Ottimale
16) La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. All’atto dell’ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all’età degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche					

Il range di temperatura ideale è tra 8°C e 19°C per i caprini adulti, tra 18°C e 20°C per i capretti, tra 5° e 16°C per gli ovini adulti e tra 8° e 20° C per gli agnelli.

Gli animali in condizioni di stress termico (caldo o freddo) mettono in atto una serie di risposte fisiologiche di adattamento con ripercussioni negative sull'ingestione di sostanza secca, sulla produzione di latte, sulla fertilità e sulle difese immunitarie, favorendo l'insorgenza di malattie condizionate.

Per limitare i danni dello stress da caldo, è importante adottare in azienda sistemi di abbattimento delle temperature, favorendo la ventilazione naturale passiva della stalla con opportune aperture laterali (finestre o porte), fornendo una buona protezione dalla luce diretta del sole (es. tende ombreggianti), o installando sistemi di raffrescamento attivo, in grado di agire direttamente sugli animali (ventilatori e/o estrattori), eventualmente associati ad un buon isolamento termico della copertura (coibentazione).

Per rispondere al criterio di verifica, l'assenza di sistemi di ventilazione o la presenza di ambienti chiusi con una scarsa circolazione d'aria e/o l'evidenza di concentrazioni dannose di gas sono valutati negativamente. Sono valutate come adeguate, invece, le stalle aperte o gli allevamenti che sono dotati di sistemi di ventilazione/areazione oppure che hanno la possibilità di modulare le aperture in funzione del clima.

La valutazione ottimale è assegnata in presenza di impianti con ottimi sistemi di coibentazione, oppure in presenza di impianti meccanici di condizionamento del microclima con sistemi automatici di controllo; tale giudizio può essere attribuito anche agli allevamenti che consentono alle pecore e alle capre adulte di raggiungere il pascolo nel periodo estivo, appurato però che esse possano ricevere riparo dalle eccessive radiazioni solari estive, dal vento e dalle precipitazioni.

Per gli animali di allevamenti semi-estensivi o estensivi il giudizio ottimale potrà essere assegnato solo in caso di evidenza della presenza di ripari (naturali/artificiali) che possano garantire una protezione dal sole o dalle intemperie.



Figura 32 – Condizioni micro-climatiche non adeguate: le ragnatele sul soffitto testimoniano una scarsa circolazione d'aria.



Figura 33 - Condizioni micro-climatiche adeguate: stalla aperta.



Figura 34 - Condizioni micro-climatiche adeguate: stalla chiusa con possibilità di areare la struttura.



Figura 35 – Condizioni micro-climatiche adeguate: stalla munita di tende ombreggianti che proteggono dalla luce diretta del sole.



Figura 36 – Presenza di estrattori, utili a modulare la temperatura e l’umidità relativa all’interno della stalla. Se associati a sistemi automatici di controllo, potrebbero essere giudicati come ottimali.




Figura 37 - Esempio di ventilazione naturale (stalla aperta): giudizio adeguato.



Figura 38 - Condizioni micro-climatiche ottimali: accesso ad una zona di pascolo idonea e dotata di ripari, anche naturali.

17. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 17					
PRESENZA DI GAS NOCIVI (TUTTI I GRUPPI)					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione					
Punto 10.					
“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”. Durante la valutazione dell’allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. $\text{NH}_3 > 20$ ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre, tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro della stalla all’altezza degli animali. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Si considera non adeguata l’evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 > 20$ ppm; $\text{CO}_2 > 3000$ ppm)					no; NO
Si considera adeguata l’evidenza di una concentrazione di gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 < 20$ ppm; $\text{CO}_2 < 3000$ ppm)					SI
Si considera ottimale l’evidenza di una concentrazione di gas ottimale per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 < 10$ ppm; $\text{CO}_2 < 3000$ ppm)					Ottimale
17) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH_3 CO_2 a campione in tutti i settori e tipologie, per confermare un sospetto di condizione inadeguata					

I gas ritenuti maggiormente nocivi per la salute e il benessere degli animali in allevamento sono l'ammoniaca (NH_3) e l'anidride carbonica (CO_2); numerosi sono i fattori gestionali o strutturali che possono influenzare il livello di questi gas (es. la taglia degli animali, la densità degli animali, la pavimentazione, la lettiera, ecc.).

L'ammoniaca deriva principalmente dal catabolismo delle sostanze organiche, in particolare dell'urea contenuta nelle urine. Una gestione scorretta della lettiera e delle defezioni, quindi, può portare ad un aumento del livello di emissioni di gas con peggioramento della qualità dell'aria.

La presenza di biossido di carbonio, invece, è dovuta alla respirazione degli animali presenti. Pertanto, una bassa concentrazione di anidride carbonica, di poco superiore ai valori esterni, è da ritenersi normale.

In caso di deficit di ventilazione (naturale o forzata) all'interno del capannone, la concentrazione di questi due composti nell'aria può aumentare pericolosamente. Un corretto ricambio di aria previene infatti l'aumento dei livelli di questi gas nocivi e favorisce anche la rimozione di polveri ed agenti patogeni.

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili valori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. Per la condizione ottimale i livelli di ammoniaca devono essere inferiori a 10 ppm e i valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. $\text{NH}_3 > 20$ ppm), negli animali potrebbe essere rilevata presenza di rossore delle congiuntive e lacrimazione, mentre il valutatore potrebbe avvertire il tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione.

In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro della stalla all'altezza degli animali.

Nel caso di allevamenti all'aperto (semi-estensivi o estensivi), il giudizio sarà ottimale.

18. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 11).

Elemento di verifica 18					
ILLUMINAZIONE MINIMA – CICLO DI LUCE PER GLI ANIMALI					
(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11					
“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.” Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dispongono di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per i 40 lux, una luce che permette di leggere la checklist senza sforzo. Le fonti di luce artificiale dovrebbero essere installate in modo da non causare disagio agli animali. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro. <i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
Si considera non adeguato: Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno					SI
18) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro.					

Gli ovini e i caprini necessitano di un'illuminazione naturale o di programmi luminosi che rispettino il ritmo circadiano della giornata, al fine di orientarsi nei loro ambienti di stabulazione, avere normali comportamenti e contatti sociali e soddisfare le loro normali esigenze fisiologiche (es. alternanza

corretta di momenti di attività e momenti di riposo, tempistiche corrette di riposo, ecc.). L'intensità luminosa deve essere tale da permettere agli animali di vedersi chiaramente tra loro ed esplorare l'ambiente, potendo così compiere tutte le normali attività previste dal loro etogramma.

In generale, per l'allevamento degli ovini e dei caprini, i cicli di luce-buio nell'arco della giornata sono corretti, in quanto vincolati all'illuminazione naturale. Qualora le condizioni dell'allevamento non garantiscano un buon ingresso di luce naturale, è auspicabile la presenza di un corretto sistema di illuminazione artificiale, con un programma luminoso che segua un ritmo circadiano ed includa un periodo di luce, ininterrotto, di almeno 8 ore e uno di buio, ininterrotto, sempre della durata di almeno 8 ore. Questo deve essere verificato soprattutto in allevamenti da latte che effettuano la destagionalizzazione del calore in gruppi di animali. L'utilizzo dell'illuminazione artificiale non deve in ogni caso compromettere la garanzia di un adeguato periodo di riposo per gli animali.

Pertanto, al momento della visita aziendale, una valutazione conforme può essere assegnata laddove sia presente un'illuminazione naturale o artificiale adeguata (almeno 40 lux) per almeno 8 ore al giorno e un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. Una valutazione insufficiente è invece assegnata qualora l'illuminazione naturale o artificiale sia assente o inadeguata.

L'intensità deve essere verificata mediante apposita strumentazione portatile oppure, nel caso in cui non si disponesse di idonei strumenti di misurazione, si può considerare idonea una luce che permette di leggere un foglio di giornale senza sforzo. In caso di sospetta condizione inadeguata è comunque necessario confermare con apposita strumentazione (es. luxometro).

19. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)

“Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 12).

“Un elemento importante nella capacità delle pecore di mantenere l'equilibrio termico è l'accesso ad una zona di ombra o un riparo adeguati per evitare radiazioni solari dirette, prevenire scottature e fornire rifugio da vento, pioggia o neve. Il riparo può essere rappresentato da siepi, pareti in pietra, rocce, alberi, arbusti o altra vegetazione di sufficiente altezza da fornire ombra, nonché rifugi artificiali” (AWIN, 2015b).

Elemento di verifica 19 PRESENZA DI RIPARI NELLE AREE ESTERNE PER GLI ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12</i>					
“Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.” Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località. Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il requisito si considera non applicabile.					
Si considera non adeguato: In funzione della valutazione del rischio, delle necessità e delle possibilità, l'assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali					SI
Si considera ottimale: Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali					Ottimale
19) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	NA	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere i ripari, la loro localizzazione e le modalità con le quali gli animali li raggiungono					

Gli animali allevati in modo estensivo sono esposti maggiormente a condizioni atmosferiche avverse rispetto agli animali mantenuti in condizioni di temperatura e umidità controllate. Questa variabilità ambientale di per sé potrebbe non causare un basso livello di benessere, tuttavia l'esposizione

prolungata a condizioni ambientali estreme, in particolare se sono accompagnate da altri disagi (ad esempio, la sottanutrizione, BCS insufficiente, mancanza di riparo) possono essere fonte di stress cronico (EFSA, 2014).

Nei sistemi di allevamento estensivi, la fornitura di riparo e di ombra sono importanti per la protezione dalle radiazioni solari e dalle condizioni meteorologiche avverse. All'ombra alcune razze ovine sono in grado di mantenere una temperatura corporea fisiologica anche in presenza di temperature ambientali fino a 50 °C (Johnson, 1987), mentre le razze ovine del Mediterraneo possono tollerare temperature fino a 30 °C quando possiedono zone ombreggiate (Sevi et al., 2001). L'indice di temperatura-umidità (THI, temperature humidity index), può essere utilizzato per misurare l'impatto combinato della temperatura e dell'umidità dell'aria sulle risposte fisiologiche e sullo stato di benessere delle pecore. Vale la pena notare che lo stress da calore aumenta il fabbisogno idrico degli animali e può quindi aumentare il rischio di sete prolungata se l'approvvigionamento di acqua è limitato. Durante l'esposizione al freddo le pecore aumentano l'assunzione di mangimi e si riuniscono per evitare l'ipotermia.

Qualora anche un solo gruppo di animali sia stabulato all'aperto, in aree esterne non accessibili ai fabbricati (es. aree di esercizio o pascolo), esso deve poter usufruire di adeguati ripari dalle intemperie, dalle condizioni climatiche avverse (grande calore o temperature molto rigide) e dai predatori. In funzione delle necessità e delle possibilità del luogo, i ripari possono essere sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.), sia di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) e devono essere sufficienti (almeno in caso di necessità) a dare idonea protezione a tutti gli animali presenti.

Nei casi particolari in cui gli animali siano allevati su pascolo vagante o in transumanza, l'ispettore deve giudicare le caratteristiche del luogo di permanenza prevalente e valutare quanto riscontrato in relazione allo stato degli stessi, prendendo i dovuti provvedimenti del caso: es. presenza di animali malati che avrebbero bisogno di un riparo e non possono usufruirne oppure presenza di effetti avversi sugli animali proprio in conseguenza dell'assenza di ripari e protezioni.

In virtù di quanto sopra specificato, nel momento dell'esecuzione della visita, la condizione adeguata prevede la possibilità per tutti gli animali allevati, in aree esterne non accessibili a fabbricati, di usufruire di ripari sia naturali, sia artificiali sufficienti ed adeguati a proteggerli nel momento in cui si verifica la condizione avversa.

Mentre il giudizio ottimale è assegnato in presenza di ripari di tipo artificiale (es. tettoie, ricoveri) sempre accessibili da tutti gli animali, idonei a proteggere dalle avversità climatiche e, se del caso, dai predatori, con dimensioni minime dell'area disponibile adeguate a consentire un confortevole decubito (criteri 9, 10, 11) per tutti i soggetti e le categorie di animali presenti.

In particolare, per quanto riguarda il giudizio sull'idoneità dei ripari e delle protezioni atti ad impedire l'aggressione dai predatori, l'ispettore dovrà eseguire una *valutazione del rischio* applicata alla specifica situazione: es. considerare l'effettiva presenza e circolazione di predatori nella zona in esame; considerare a quale specie essi appartengono e che attitudini di predazione hanno; considerarne la numerosità stimata e il numero di attacchi e sbranamenti nelle stagioni precedenti ecc., ecc. Questi fattori devono essere giudicati alla luce delle misure di *mitigazione del rischio* messe in atto dall'allevatore: es. presenza e numero di cani da guardiania; caratteristiche delle recinzioni; presenza di sorveglianza notturna; ecc. I dati di mortalità per sbranamento devono obbligatoriamente essere presi in considerazione per completare la valutazione del rischio e capire se l'allevatore abbia messo in pratica tutto quanto è nelle proprie facoltà per impedire gli attacchi (e quindi rientrare in una condizione di conformità), oppure no.

Solo laddove non vi siano problematiche di predazione, i ripari e le misure da mettere in atto possono essere nulle o minimali.

In ogni caso, come previsto dal D. Lgs. 146/2001, la protezione degli animali domestici dalla predazione operata da animali selvatici è diretta responsabilità del proprietario, custode o detentore e non può, quindi, essere ascritta ad una mera condizione di fatalità o di naturalità.

Infine si ricorda che, qualora l'ispezione sia eseguita in un allevamento in cui non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il requisito in esame si considera non applicabile.



Figura 39 – Aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati: esempio di pascolo idoneo e ben gestito, dal giudizio accettabile perché non sono presenti ricoveri in muratura.



Figura 40 - Aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati: esempio di pascolo sprovvisto di qualsiasi riparo naturale o artificiale (possibile giudizio non adeguato).



Figura 41 – Esempio di pascolo per pecore ed agnelli idoneo e provvisto di riparo naturale per tutti gli animali (giudizio adeguato).



Figura 42 – Esempio di recinto per pecore idoneo e provvisto di riparo naturale accessibile a tutti gli animali (giudizio adeguato).

VI ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA

20. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche

“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 20					
ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE					
<i>(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica e meccanica) 146/2001 All. Impianti automatici e meccanici</i>					
<i>Punto 13.</i>					
<i>“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali”.</i> La macchina mungitrice, i sistemi automatici di alimentazione, di ventilazione, ecc. possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati almeno una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali (es. possedere un generatore di corrente).					
Si considera non adeguato: Mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi					no; NO
Si considera adeguato: Almeno 1 ispezione al giorno					SI
Si considera ottimale: Presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni					Ottimale
20) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.)					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni					

Gli impianti automatici o meccanici che possono influenzare il benessere animale (sistemi automatici di alimentazione, ventilazione, ecc.) dovrebbero essere sottoposti a controlli giornalieri e a manutenzioni regolari per accertarne il buon funzionamento. In caso venissero riscontrati difetti o malfunzionamenti, essi devono essere risolti immediatamente o devono essere prese misure adeguate in attesa di risolvere il guasto (es. generatore di corrente).

Inoltre, qualora questi impianti siano fondamentali per il benessere degli animali, essi dovrebbero essere muniti di sistemi d'allarme, che a loro volta dovrebbero essere controllati per verificarne l'efficacia, al fine di segnalare tempestivamente la presenza di guasti o malfunzionamenti (criterio 21).

Il valutatore verifica la quotidianità delle ispezioni agli impianti e le eventuali misure prese in caso di malfunzionamento. Nella fattispecie, poiché risulta impraticabile verificare che l'ispezione avvenga quotidianamente e continuativamente (a meno che non risultino all'atto della visita mancati interventi tempestivi), fa fede la dichiarazione del responsabile dell'allevamento.

La condizione non adeguata prevede la mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o il rilievo di una mancanza d'intervento tempestivo. La condizione adeguata prevede almeno un'ispezione al giorno. La condizione ottimale prevede la presenza di procedure documentate o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni.

21. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

“[...] Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 21					
ALLARME IMPIANTO DI VENTILAZIONE E IMPIANTO DI RISERVA					
(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica e meccanica) 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici					
Punto 13.					
<i>"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari".</i> Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore, nonché un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. apertura d'emergenza di finestre/generatore di corrente, ecc.). Il sistema di allarme e il sistema sostitutivo devono essere verificati regolarmente, soprattutto se il loro malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile.					
Si considera non adeguato: Assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato					SI
21) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore					

Sono da considerarsi sistemi di ventilazione forzata gli impianti che consentono di gestire unicamente il ricambio dell'aria di un ambiente con l'esterno. Questo avviene senza l'apertura di finestre o porte, tramite condotte di ventilazione forzata, collegate con gli ambienti interni da aspiratori (per la rimozione dell'aria) e da diffusori (per l'immissione di aria nuova).

Il valutatore si accerta della presenza di un impianto di ventilazione forzata; se presente, che esso sia sottoposto a manutenzione periodica e che sia fornito di un sistema sostitutivo che, in caso di necessità, consenta un ricambio di aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto sia riparato. Esempi di sistemi di riserva possono essere: la presenza di un generatore di corrente che garantisca un adeguato funzionamento dell'impianto in caso di interruzione di corrente; la presenza di finestre che si aprono automaticamente quando insorge il guasto per fornire una ventilazione naturale adeguata; la presenza di ventilatori portatili a carrello da utilizzare per aumentare la circolazione dell'aria.

Il valutatore si accerta, altresì, della presenza di un sistema di allarme che avverta tempestivamente della presenza di un guasto al fine di permettere un intervento nel più breve tempo possibile, in modo da salvaguardare le condizioni di benessere animale.

Gli impianti di riserva e di allarme devono essere sottoposti periodicamente a controllo e manutenzione. Inoltre, in caso di allarmi presenti solo a livello locale è necessario verificare l'esistenza di una procedura, documentata anche con semplice diagramma, che dimostri la conoscenza di nominativi e recapiti di personale esperto a cui ricorrere in caso di necessità per il ripristino della funzionalità degli impianti.

Pertanto, la condizione non adeguata prevede, in caso di ventilazione unicamente forzata, l'assenza del sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale (es. locali chiusi privi di finestre, privi di generatore di corrente, ecc.) e/o l'assenza di controlli regolari del sistema di allarme e del sistema sostitutivo. Mentre, la condizione adeguata prevede, in caso di ventilazione unicamente forzata, la presenza del sistema d'allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale funzionante e regolarmente controllato.

In aggiunta a quanto detto sopra, sebbene non richiesto in maniera specifica dalla normativa, è auspicabile la presenza di un sistema di allarme in caso di incendio (es. avviso sonoro) e dei relativi dispositivi per la rilevazione del fumo e delle fiamme.

Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. presenza di aperture verso l'esterno tali da generare circolazione naturale dell'aria; stalla completamente aperta; pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile.

VII ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

22. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie ed in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute ed a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 14).

“Le esigenze nutrizionali dell'animale variano in funzione dei fabbisogni energetici di mantenimento e di produzione (crescita, aumento ponderale, gestazione, lattazione)” (EFSA, 2014).

Elemento di verifica 22

GESTIONE DEGLI ALIMENTI E DELLA RAZIONE GIORNALIERA

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) 146/2001 All.

Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni."

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli animali.

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, almeno ognuno dei gruppi base previsti dall'allevamento (es. rimonta-asciutta-lattazione-arieti/becchi) disponga di una razione specifica. Tale razione specifica può essere scritta o registrata o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo.

Nel caso di allattamento artificiale degli agnelli/capretti, la preparazione e la somministrazione del latte devono essere idonee e le tettarelle devono essere mantenute in buone condizioni igieniche.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: - STALLA: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani; - PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza					no; NO
Si considera adeguato: - STALLA: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (in relazione ai fabbisogni specifici) e composta da alimenti sani; - PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare					SI
Si considera ottimale: - STALLA: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani; - PASCOLO: gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle essenze erbacee e adeguata integrazione calcolata da un alimentarista					Ottimale
22) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali.					
Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere eventualmente la razione o le razioni (se specifiche per i diversi gruppi di animali), le modalità di calcolo, il nominativo dell'alimentarista o del veterinario che l'ha calcolata, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, mortalità, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

Una buona alimentazione comprende due elementi o criteri: assenza di fame prolungata e assenza di sete prolungata. La fame può derivare dalla malnutrizione, dalla sotto-nutrizione o da entrambi. La malnutrizione si verifica quando le sostanze nutritive non sono equilibrate, mentre la sotto-nutrizione riflette un'offerta insufficiente. Ci sono diversi motivi per cui la fame prolungata porti a mancanza di benessere. In primo luogo, sia la malnutrizione che la sotto-nutrizione causano stress e, se sufficientemente prolungate o gravi, possono portare alla debilitazione, all'immunosoppressione e alla malattia. La malnutrizione si traduce in una mancata corrispondenza tra le componenti nutritive dell'alimento, e le esigenze nutrizionali di un singolo animale che sono una conseguenza del suo sesso, dell'età, dello stadio di crescita o dello stadio riproduttivo e della precedente storia nutrizionale. Questo può accadere a causa di carenze nutritive dei foraggi assunti al pascolo, e per la mancanza di integrazione compensativa o la scorretta formulazione di diete fornite nei regimi di alimentazione controllati. Le diete ad elevata concentrazione di proteine, comuni nei sistemi produttivi estensivi, possono ridurre la resistenza dell'ospite ai parassiti gastrointestinali (Athanasiadou et al., 2008).

Gli squilibri minerali dietetici possono presentarsi a causa della natura dei suoli dove le pecore vanno al pascolo. Ad esempio, una carenza secondaria di rame nelle pecore può essere causata da un eccesso di zolfo e molibdeno, con conseguente anemia, disturbi ossei, atassia neonatale, disturbi cardiovascolari, diarrea e suscettibilità alle infezioni (Underwood e Suttle, 1999). Allo stesso modo, un eccesso di potassio può compromettere l'assorbimento del magnesio e portare ad una specifica carenza secondaria seguita da una malattia metabolica (tetania da erba). La malnutrizione può anche essere indotta dal consumo di fattori anti-nutrizionali nelle piante, come i tannini (Min et al., 2002), mentre le tossine nelle piante possono essere causa di avvelenamenti.

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli ovini e dei caprini. Le esigenze nutrizionali dell'animale variano in funzione dei fabbisogni energetici di mantenimento e di produzione (crescita, aumento ponderale, gestazione, lattazione). Per questo, durante l'ispezione, è necessario riscontrare la presenza di una razione adatta e specifica almeno per ciascun gruppo di base che caratterizza l'allevamento (es. rimonta, pecore/capre adulte in lattazione o in asciutta, arieti/becchi).

Tale razione specifica, in relazione alla numerosità dei capi e del personale coinvolto, può essere scritta o registrata sulla pesa o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo.

È requisito ottimale, invece, che tali razioni siano opportunamente calcolate in base ai fabbisogni reali degli animali presenti, ad esempio grazie alla presenza di un alimentarista professionista e di specifici addetti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti.

È un benefit, infatti, che il calcolo della razione venga eseguito da un esperto tecnico alimentarista, che valuti i fabbisogni nutritivi e la capacità di ingestione degli ovini e dei caprini rapportata alle differenti fasi fisiologiche, nonché la gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle varie tipologie delle essenze erbacee al fine di evitare l'insorgere di patologie legate ad una errata alimentazione.

Una valutazione dell'idoneità dell'alimentazione degli animali può essere effettuata anche verificando il loro stato di nutrizione attraverso il Body Condition Score (BCS) che, in ogni caso, rappresenta un indicatore dello stato fisiopatologico del soggetto.

Se l'alimentazione risulta insufficiente, saranno presenti verosimilmente molti soggetti con BCS insufficiente; se invece persistessero errori nella somministrazione o nella gestione dei gruppi, potrebbero esserci animali con condizione corporea molto disforme tra loro e/o evidenza di turbe

all'apparato gastro-enterico (es. diarrea, meteorismo, ecc.). È necessario, tuttavia, tenere presente possibili interferenze cliniche di origine infettiva e il fatto che animali con BCS insufficiente dovrebbero essere alloggiati in infermeria.

Infine, ma non meno importante, la corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla **qualità degli alimenti** che la compongono, che devono essere di origine conosciuta, controllati e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini e fienili sottoposti ad interventi periodici di pulizia e di prevenzione delle infestazioni) per evitare alterazioni e contaminazione con sostanze tossico-nocive. L'esame degli alimenti destinati agli animali (foraggi o mangimi sfusi o confezionati) di tipo visivo/olfattivo e l'esecuzione di esami di laboratorio a campione rappresentano un efficace intervento di prevenzione delle contaminazioni causate da muffe o batteri, che potrebbero modificare le loro proprietà organolettiche e nutrizionali, con possibile sviluppo di sostanze tossiche per la salute dell'animale.

In caso di allevamenti di tipo semi-intensivo, e semi-estensivo e estensivo dove il pascolamento è parte integrante della somministrazione della razione alimentare, occorre valutare la gestione dello stesso e la qualità dell'apporto trofico di quest'ultimo. Quindi, il veterinario ufficiale dovrà sincerarsi che, qualora i foraggi forniti dal pascolo non siano sufficienti a soddisfare i fabbisogni nutrizionali degli animali, sia prevista un'integrazione della razione tramite altri alimenti (es. mangime).

Per quanto riguarda gli animali molto giovani, è assai importante l'assunzione/somministrazione del colostro, in quanto gli agnelli e i capretti nascono privi della copertura anticorpale materna per la tipologia di placentazione che impedisce il passaggio diretto degli anticorpi materni. Il trasferimento dell'immunità passiva, pertanto, deve avvenire necessariamente attraverso l'assunzione del colostro in adeguate quantità e qualità entro le prime ore di vita; si aggiunga il fatto che la capacità di assimilazione delle immunoglobuline da parte della mucosa intestinale dell'agnello e del capretto diminuisce drasticamente con il passare delle ore. Successivamente, verificare che anche la preparazione e la somministrazione del latte artificiale dato ad agnelli e capretti avvenga correttamente e che gli utensili utilizzati per la sua preparazione e le tetterelle usate per la sua somministrazione siano mantenute pulite. In particolare, nella preparazione del latte in polvere è necessario che lo stesso venga riscaldato a 45 °C (per consentire lo scioglimento della componente lipidica) e somministrato alla temperatura di 37 °C.



Figura 43 – Esempio di fieno conservato in luogo asciutto.



Figura 44 – Esempi di procedure scritte, esposte o facilmente consultabili.

23. Tipologia di alimentazione

“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 15).

Elemento di verifica 23					
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE					
(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) 146/2001 All.					
Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15					
“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.” L'alimentazione dovrebbe essere somministrata <i>ad libitum</i> per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di somministrazione disgiunta degli alimenti fibrosi (es. fieno, erba, ecc.) da quelli concentrati (es. mangimi, granaglie, ecc.), gli alimenti fibrosi devono essere garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 h e la parte di concentrati deve essere somministrata in almeno due occasioni. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Si considera non adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli non corretti perché non garantita nelle 24h e frazionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali					no; NO
Si considera adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli corretti perché garantita nelle 24h (es. fieno sempre disponibile o somministrato in più occasioni, unifeed, pascolo/prato) e frazionata correttamente (somministrazione di concentrati, se previsti, in almeno 2 volte al giorno)					SI
23) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni, a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere le modalità di somministrazione dell'alimento ed eventualmente gli intervalli tra le varie somministrazioni. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

Oltre alle considerazioni già poste nel criterio precedente, e per assicurare che i sistemi di alimentazione permettano ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti, nonché ridurre la competizione tra i soggetti, è necessario che l'accesso e la disponibilità dei nutrimenti avvenga ad intervalli adeguati.

Per andar incontro all'esigenza dei ruminanti di svolgere numerosi pasti durante la giornata (che, se non avvertono la competizione, sono frequenti e non troppo abbondanti) è necessario che gli alimenti

siano garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 ore (*ad libitum*) per consentire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza.

Nel caso di alimentazione frazionata (ovvero quando i foraggi e i concentrati sono distribuiti separatamente), gli alimenti dovrebbero essere sempre disponibili, soprattutto per quanto riguarda la frazione fibrosa, mentre quella concentrata dovrebbe essere somministrata almeno in due occasioni (per evitare repentine cadute del pH ruminale). Ad esempio, negli allevamenti ad attitudine da latte la parte di alimento costituita da concentrati viene generalmente somministrata durante la mungitura, con eventuali integrazioni anche in altri momenti della giornata in corsia di alimentazione o in mangiatoie disponibili al pascolo.

Una valutazione dell'idoneità dell'alimentazione degli animali può essere effettuata anche verificando il loro stato di nutrizione mediante il Body Condition Score (BCS) che, in ogni caso, rappresenta un indicatore dello stato fisiopatologico del soggetto (criterio n. 30 "Stato di nutrizione").



Figura 45 - Esempio di alimentazione unifeed, garantita in greppia nell'arco delle 24 ore (*ad libitum*).



Figura 46 - Esempio di alimentazione unifeed, garantita in greppia nell'arco delle 24 ore (*ad libitum*).



Figura 47 – Esempio di accesso ad una alimentazione adeguata, perché fornita da una zona di pascolamento idonea e rigogliosa.

24. Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (tutti i gruppi)

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

Elemento di verifica 24 CARATTERISTICHE DELL'ACCESSO IN MANGIATOIA E NUMERO DI POSTI DISPONIBILI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) 146/2001 All.</i> <i>Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17.</i>	
<i>“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”</i> Di seguito sono forniti gli spazi ritenuti adeguati per ogni tipologia di animale. Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia. PECORE DA LATTE ADULTE E ARIETI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 30 cm lineari; OVINI DA RIMONTA: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 15 cm lineari; AGNELLI (fino a 3 mesi): 15 cm/capo in mangiatoia; oppure se allattati artificialmente → in caso di 2 somministrazioni di latte/giorno, devono poter accedere tutti contemporaneamente al pasto; → in caso di distributrice automatica in funzione nelle 24h, garantire almeno 1 tettarella ogni 25 agnelli. CAPRE DA LATTE ADULTE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 35 cm lineari; CAPRE DA RIMONTA: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 25-30 cm lineari; BECCHI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 60 cm lineari; CAPRETTI (fino a 3 mesi): 20 cm/capo in mangiatoia oppure 1 tettarella ogni 15 capretti in caso di distributrice automatica in funzione nelle 24h. Nel caso delle capre adulte, per la condizione ottimale (oltre a quanto già specificato) deve esserci un'altezza costante tra l'appoggio degli arti e l'ingresso della testa in rastrelliera, indipendentemente dal livello della lettiera (es. presenza di un'area antistante la mangiatoia profonda 80-100 cm) o presenza di un gradino di appoggio per gli arti anteriori. <i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>	
Si considera accesso agli alimenti non adeguato: difficoltà di prensione dell'alimento (es. l'animale deve inginocchiarsi o assumere posizioni non fisiologiche); oppure posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi inferiori al numero di animali	no; NO

Si considera accesso agli alimenti adeguato: facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi almeno pari al numero di animali					SI
Si considera accesso agli alimenti ottimale: facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi superiori al numero di animali oppure pascolo idoneo					Ottimale
24) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere le modalità di accesso all'alimento, riportare gli spazi disponibili per l'alimentazione, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, lesioni, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione degli ovini e dei caprini devono essere adeguatamente dimensionate e costruite con materiali idonei, al fine di garantire un facile accesso degli animali e la possibilità di ingerire l'alimento necessario ai propri fabbisogni.

In particolare, la superficie disponibile in mangiatoia deve essere rapportata al numero di capi presenti e alle loro dimensioni.

Ad esempio, per gli ovini si considera accettabile:

PECORE DA LATTE ADULTE E ARIETI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 30 cm lineari;

OVINI DA RIMONTA: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 15 cm lineari;

AGNELLI (fino a 3 mesi): 15 cm/capo in mangiatoia, oppure se allattati artificialmente: in caso di 2 somministrazioni di latte/giorno, devono poter accedere tutti contemporaneamente al pasto; in caso di distributrice automatica in funzione nelle 24h, garantire almeno 1 tettarella ogni 25 agnelli.

Mentre per i caprini si considera accettabile:

CAPRE DA LATTE ADULTE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 35 cm lineari;

CAPRE DA RIMONTA: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 25-30 cm lineari;

BECCHI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 60 cm lineari;

CAPRETTI (fino a 3 mesi): 20 cm/capo in mangiatoia oppure 1 tettarella ogni 15 capretti in caso di distributrice automatica del latte in funzione nelle 24h (nel caso di dieta esclusivamente latte).

Lo spazio disponibile in mangiatoia o i posti nelle rastrelliere devono essere adeguati alla consistenza del gregge e a tutte le categorie di animali affinché tutti gli animali di uno stesso gruppo abbiano contemporaneo accesso agli alimenti.

In aggiunta alla misurazione del numero di posti disponibili in mangiatoia, è fondamentale valutare anche l'idoneità e la conformazione della rastrelliera e le modalità di accesso alla mangiatoia da parte degli animali, che non deve rappresentare un pericolo per i capi presenti.

Durante la visita aziendale, il primo aspetto da valutare è la possibilità che tutti gli animali accedano contemporaneamente alla mangiatoia, indipendentemente dalla modalità di somministrazione dell'alimento (somministrazione *ad libitum* oppure no).

Infatti, nel caso delle capre, uno spazio inferiore le costringe ad affiancarsi l'una contro l'altra, comprimendosi e influenzandosi reciprocamente negli spostamenti.

Nelle capre adulte il secondo aspetto da valutare è la presenza di condizioni che costringano l'animale ad inginocchiarsi per alimentarsi. Infatti, l'animale deve poter mangiare in posizione quadrupedale; di conseguenza le modalità di accesso alla mangiatoia devono essere verificate e l'aumento della lettiera non deve incidere negativamente sulla distanza necessaria (circa 30-40 cm) tra il punto in cui l'animale appoggia gli arti anteriori e quello in cui accede all'alimento. Questa altezza può essere mantenuta costante solo con l'ausilio di un gradino su cui gli animali appoggiano gli arti anteriori. Pertanto, affinché questa condizione sia sempre rispettata, è opportuno che nella parte antistante la rastrelliera/mangiatoia sia presente una piattaforma alta 30 cm e profonda 80-100 cm, costituita da materiale diverso dalla lettiera, generalmente cemento o legno. La funzione di questa struttura è impedire che il rabbocco progressivo della lettiera interferisca con l'altezza che deve esserci tra il punto in cui l'animale appoggia gli arti e quello in cui c'è l'accesso alla mangiatoia (Meisfjord Jorgensen et al., 2007; Toussaint. 1997; Aschwanden et al., 2008; Anzuino et al., 2010; Muri et al., 2013; Harwood, 2006).

Per questi motivi, quando gli animali sono costretti a mangiare inginocchiati o appoggiati sullo sterno e/o il numero di posti in mangiatoia è inferiore al numero di animali presenti, deve essere assegnata la risposta non conforme.

La conformità è invece assegnata quando si riscontra una corretta modalità di accesso alla mangiatoia, grazie al basso livello della lettiera, e i posti in mangiatoia sono pari al numero di animali presenti nel box.

Si considera ottimale la situazione in cui si riscontri una corretta modalità di accesso alla mangiatoia e l'altezza tra l'appoggio degli arti e l'ingresso della testa in mangiatoia rimanga sempre costante, indipendentemente dal livello della lettiera, ad esempio grazie alla presenza di un gradino. In aggiunta, per assegnare la risposta ottimale è necessario che: il numero di posti in mangiatoia sia

superiore al numero di animali; o che all'interno del box siano presenti mangiatoie centrali con accesso al foraggio ad altezze diversificate; oppure che l'alimentazione sia integrata con un pascolamento idoneo (allevamento semi-intensivo e semi-estensivo) o che la conduzione del gregge avvenga in un'area pascolativa idonea (allevamento estensivo).



Figura 48 – Esempio di competizione tra capretti per l'accesso alle tette.



Figura 49 – Esempio di spazio lineare in mangiatoia non sufficiente a consentire un comodo accesso agli alimenti per tutti gli animali presenti.



Figura 50 – Autocattura con spazio disponibile insufficiente per le capre adulte (<35 cm lineari).



Figura 51 – Esempio di accesso in mangiatoia accettabile.



Figura 52 – Esempi di accesso ottimale in mangiatoia con altezza costante tra l'appoggio degli arti e l'ingresso della testa in rastrelliera, per la presenza di un'area antistante la mangiatoia profonda 80-100 cm.



Figura 53 - Animale costretto ad inginocchiarsi per mangiare (giudizio insufficiente).



Figura 54 – Esempio di accesso ottimale agli alimenti, perché il numero di posti in mangiatoia è superiore al numero di animali e all'interno del recinto sono presenti mangiatoie centrali aggiuntive.



Figura 55 - Esempio di accesso ottimale agli alimenti, perché il numero di posti (che devono essere larghi almeno 30 cm/capo) è superiore al numero di animali presenti.



Figura 56 - Esempio di spazi in mangiatoia non sufficienti a consentire un facile accesso agli alimenti per tutti gli animali presenti.

25. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)

“Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 16).

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

Elemento di verifica 25 DISPONIBILITÀ DI ACQUA E NUMERO DI ABBEVERATOI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) 146/2001 All.</i> <i>Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17.</i>	
<i>“16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi”.</i> <i>17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”</i> Per quanto riguarda il numero di abbeveratoi, si considera adeguato: OVINI (tutti i gruppi): almeno 1 abbeveratoio ogni 25 animali o se a vasca 2-3 cm/capo (1 m di vasca per 50 animali); CAPRINI: in caso di abbeveratoio a vasca almeno 3 cm/capo; oppure almeno 1 abbeveratoio ogni 20 capre adulte e almeno 1 abbeveratoio ogni 25 capre da rimonta. <i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio.</i> Per quanto riguarda la qualità dell’acqua si considera adeguato che gli abbeveratoi siano mantenuti in buone condizioni di pulizia, liberi da feci e residui di alimento inveterato; in aggiunta al requisito adeguato si considera ottimale, l’esecuzione su base almeno annuale di esami per la potabilità dell’acqua.	
Si considera non adeguato: - - STALLA: Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i>) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti) - PASCOLO: Distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre	no; NO
Si considera adeguato: - - STALLA: Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e in numero sufficiente; somministrazione di un’adeguata quantità di latte agli animali non ancora svezzati	SI

- PASCOLO: Presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e disponibili per tutti i gruppi e/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non siano pericolosi per gli animali					
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi (compreso in quello degli animali non ancora svezzati) e deve essere prevista l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia)					Ottimale
25) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.					
<i>Il numero di punti di abbeverata è in linea con le indicazioni fornite? E' garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare modalità di accesso all'acqua e numero di abbeveratoi, descrivere la frequenza di pulizia di abbeveratoi, riportare gli estremi di eventuali esami dell'acqua, ecc. ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

Tutti gli animali devono sempre avere accesso ad acqua fresca, di buona qualità, in quantità sufficiente ad impedire la disidratazione, libera da odori e sapori repellenti, agenti infettivi, sostanze tossiche e contaminanti che potrebbero accumularsi nei tessuti corporei ed essere dannosi per la salute ed il benessere degli animali.

Le attrezzature per la somministrazione dell'acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo la rivalità tra gli animali e consentire a tutti i soggetti, di bere secondo le loro necessità. Gli animali devono poter accedere alle risorse idriche a proprio piacimento in qualunque momento della giornata, senza l'impedimento di barriere fisiche o senza percorrere lunghe distanze, in particolare nel periodo estivo.

Inoltre, gli abbeveratoi dovrebbero essere numericamente adeguati alla consistenza del gregge, e razionalmente distribuiti nell'area di pascolo. In particolare, per gli ovini si considera adeguato almeno 1 abbeveratoio ogni 25 animali o se a vasca 2-3 cm/capo (1 m di vasca per 50 animali); mentre per i caprini, in caso di abbeveratoio a vasca si considerano adeguati almeno 3 cm/capo; oppure almeno 1 abbeveratoio ogni 20 capre adulte e almeno 1 abbeveratoio ogni 25 capre da rimonta.

Gli abbeveratoi per agnelli/capretti dovrebbero essere regolabili in altezza o comunque tali da consentire a tutti gli animali, compresi quelli con età inferiore a 30 giorni, di abbeverarsi agevolmente.

È, però, assai difficile stabilire a priori quale sia la quantità appropriata e la qualità adeguata dell'acqua da somministrare a ciascun animale, in quanto entrambe queste caratteristiche variano moltissimo in relazione al soggetto e alle condizioni ambientali. Pertanto, non è ritenuta adeguata la somministrazione di acqua in modo frazionato tale che anche un singolo animale non disponga sempre di acqua, in virtù del fatto che tutti gli animali dell'allevamento devono poter soddisfare le proprie esigenze idriche bevendo quando e quanto vogliono. La libertà dalla sete può, infatti, essere rispettata solamente quando gli abbeveratoi sono tutti funzionanti e collegati alla rete idrica oppure, in caso di approvvigionamento "manuale", quando i recipienti utilizzati possono contenere una quantità di acqua decisamente superiore ai fabbisogni di tutti gli animali presenti nel gruppo. In quest'ultimo caso dovrà anche essere verificato che l'allevatore riempia correttamente e costantemente tutti gli abbeveratoi.

I fabbisogni di acqua pro capite per le pecore e le capre adulte possono variare dai 5 ai 15 litri/giorno, in funzione di diversi fattori, quali: la quantità e la qualità degli alimenti ingeriti (sostanza secca, tipologia e composizione), la temperatura ambientale, il peso e l'età dell'animale, il livello e la fase della produzione lattifera.

Prestare, inoltre, particolare attenzione alla possibilità di accesso all'acqua per gli animali malati (ad es. in infermeria), in momenti critici come il parto, sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore, quando l'accesso ad acqua fresca *ad libitum* diventa ancora più importante e necessario per garantire le esigenze fisiologiche e l'omeostasi dell'organismo.

Pertanto, può essere assegnato il giudizio conforme qualora nessun animale sia privato della libertà di bere (acqua fresca e pulita) secondo il proprio stato di necessità, malattia o calura estiva; agli animali non ancora svezzati deve essere somministrata una adeguata quantità di latte.

Per **assicurare che l'acqua sia fresca, pulita e di buona qualità**, la pulizia (vedasi criterio n.12) ed il controllo degli abbeveratoi a disposizione di ciascun gruppo di animali dovrebbero essere eseguiti giornalmente in modo da rimuovere sia la sporcizia (causa di incontrollate proliferazioni batteriche e possibili disordini metabolici), sia le eventuali ostruzioni al normale flusso idrico. Solo così facendo, infatti, in caso di guasti alla rete idrica o ai singoli abbeveratoi, è possibile intervenire prontamente per risolvere il problema e garantire agli animali di soddisfare i propri fabbisogni.

Per assegnare il giudizio ottimale, l'acqua deve essere somministrata *ad libitum* a tutti gli animali presenti in allevamento e deve essere disponibile anche per gli animali non ancora svezzati (oltre al latte, almeno una volta al giorno). Deve, inoltre, essere prevista l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia).



Figura 57 – Esempio di disponibilità di acqua per i capretti.



Figura 58 – Esempio di abbeveratoio a tazza correttamente posizionato (a circa 1 m da terra).



Figura 59 - Presenza di un rialzo per facilitare l'abbeverata.



Figura 60 – Esempio di abbeveratoio a vasca.

CRenBA 2021



Figura 61 – Esempio di condizione accettabile per la disponibilità di acqua per gli animali da rimonta.

CRenBA 2021



Figura 62 – Esempio di disponibilità di acqua al pascolo con giudizio almeno accettabile.



Figura 63 - Esempio di disponibilità di acqua ottimale, perché l'abbeveratoio è accessibile anche agli agnelli.



Figura 64 – Erogazione di acqua non *ad libitum* con evidenza di scarso riempimento al momento della visita: verificare che i fabbisogni idrici di tutti gli animali siano sempre soddisfatti.

26. Somministrazione di sostanze illecite

“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate ai fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la salute e il suo benessere.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 18).

Elemento di verifica 26					
SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ILLECITE					
(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 18.					
“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la sua salute e il suo benessere.” Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l’armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci.					
Si considera non adeguato: evidenza di somministrazione di sostanze illecite					NO
Si considera adeguato: nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite					SI
26) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere le verifiche condotte					

La somministrazione di sostanze farmacologicamente attive vietate (es. sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste), potenzialmente pericolose sia per la salute degli animali che dell’uomo, configura un trattamento illecito praticato sugli animali (Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 art. 2 lett. C).

A questa fattispecie fanno eccezione, i trattamenti farmacologici con sostanze o prodotti autorizzati eseguiti per scopi terapeutici o profilattici, o in vista di un trattamento zootecnico, inteso come la somministrazione di sostanze autorizzate ad azione estrogena, androgena o gestagena per la

sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni (Direttiva 96/22/CE, art. 1, par. 2, lett. c; e art. 5).

Il valutatore si accerta che non vengano somministrate sostanze illecite agli animali tramite il controllo dei registri di trattamento e con un'ispezione dell'armadietto dei farmaci o dei locali e degli ambienti dell'allevamento. L'utilizzo di eventuali sostanze non consentite può essere evidenziato da esami aggiuntivi, sia sulle carcasse al macello che da campioni biologici, a seconda della sostanza sospettata.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

VIII Mutilazioni

27. Mutilazioni e altre pratiche

“È vietato [...] il taglio [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda” (D. Lgs. 146/2001 allegato, punto 19).

Elemento di verifica 27	
MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE	
(Categoria di non conformità: Mutilazioni) 146/2001 All. Mutilazioni Punto 19.	
È vietato [...] il taglio [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.” Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso. Se praticata, verificare che la rimozione dell'abbozzo corneale sia eseguita al di sotto dei 21 giorni d'età, ad esempio tramite cauterizzazione termica o causticazione (applicazione di una pasta/matita caustica) della gemma corneale, e sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda. Se la rimozione dell'abbozzo corneale avviene dopo i 21 giorni d'età o se si riscontrano altre mutilazioni (es. taglio della coda, castrazione, mozzamento delle corna in animali adulti) riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico. Il taglio della coda è ammesso solo a <u>fini terapeutici</u> certificati e adeguatamente registrati. Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria. Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali.	
Si considera non adeguato: Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	NO
Si considera adeguato: Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	SI
Si considera ottimale: Tutti gli animali sono integri e non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni	Ottimale

27) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione/incisione/castrazione, le categorie e - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati. Descrivere le modalità ed i medicinali utilizzati, riportare il nominativo del veterinario, ecc.					

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso.

Idealmente, tutte le mutilazioni andrebbero evitate, ma – se necessarie – il dolore inferto andrebbe ridotto al minimo tramite applicazione di analgesia ed anestesia, in quanto il fatto stesso di catturare e contenere gli animali, per portare a termine la mutilazione, rappresenta di per sé una fonte importante di stress, a cui si aggiunge il dolore causato dalla mutilazione stessa, se non si ricorre all'uso di farmaci.

Durante l'ispezione, è necessario verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. rimozione dell'abbozzo corneale, taglio della coda, castrazione, mozzamento delle corna dopo la loro spunta).

Se la **rimozione dell'abbozzo corneale** è praticata, verificare che essa sia eseguita al di sotto dei 21 giorni d'età, ad esempio tramite cauterizzazione termica o causticazione (applicazione di una pasta/matita caustica) della gemma corneale, e sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda. Se, nell'azienda ispezionata, la rimozione dell'abbozzo corneale è avvenuta dopo i 21 giorni d'età, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico, ricordando che, in ogni caso, il ricorso a tale pratica dopo i 21 giorni d'età non può essere di tipo routinario su tutto l'effettivo del gregge, ma deve rappresentare un evento sporadico ed eccezionale. Diversamente, il requisito è non conforme.

Si precisa che non è possibile sanzionare la “sola” presenza di soggetti con più di 21 giorni d'età non ancora degemmati, benché all'interno di un gregge privato delle corna. In caso di sospetto si suggerisce di approfondire le circostanze rilevate anche con controlli successivi, sui medesimi animali.

È importante che il personale addetto sia competente e preparato per eseguire correttamente la procedura (es.: conoscendo bene il punto di reperi, lo strumento che si utilizza, ecc.) e per assicurarsi che la rimozione della gemma sia completa, in modo da evitare lo sviluppo di un corno deforme.

La cauterizzazione termica prevede l'utilizzo di uno strumento chiamato termocauterio, generalmente elettrico o a gas, la cui estremità resa incandescente deve essere posta su ciascuna gemma corneale, applicando una lieve pressione per circa 10 secondi, accompagnata da una leggera rotazione (movimento d'avvitamento). Se l'intervento è stato eseguito correttamente l'abbozzo corneale cade spontaneamente dopo 3-4 settimane. Il termocauterio, come tutte le apparecchiature, deve essere ben mantenuto e controllato, affinché la temperatura raggiunta sia sempre sufficiente e non troppo elevata. La causticazione prevede invece l'impiego di sostanze fortemente alcaline (idrossido di sodio o potassio, sotto forma di pasta o matita) da applicare sul bottone corneale per causarne la distruzione chimica. Quando si utilizza una pasta caustica bisogna prestare attenzione che non coli sulla faccia o che non sia leccata da altri animali.

Una pratica ottimale prevede la depilazione dell'area interessata e l'applicazione di uno strato di vaselina (o similari) attorno all'area dove deve essere applicato il prodotto, per impedire che coli all'esterno e che causi causticazioni della testa e degli occhi.

Se durante l'ispezione si riscontrano **altre mutilazioni** (es. mozzamento delle corna dopo la loro spunta, taglio della coda, castrazione), riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, anche in questi casi deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico.

Se le mutilazioni riscontrate non sono, invece, riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, può essere opportuno inviare comunicazione all'autorità competente per l'azienda di provenienza, al fine della verifica sul registro dei trattamenti.

Metodi di decornazione, quando lo sviluppo delle corna è già cominciato, prevedono la rimozione delle corna mediante taglio alla loro base, con utilizzo di un protocollo che coinvolga obbligatoriamente il medico veterinario. Per facilitare il maneggiamento dell'animale è opportuno procedere a sedazione (es. xylazine). Mentre per ridurre il dolore e l'infiammazione sono necessari l'utilizzo di anestesia locale (blocco del nervo cornuale con es. procaina o lidocaina, 10 minuti prima dell'intervento) e di analgesia con l'utilizzo di antinfiammatori non steroidei (FANS) somministrati per via parenterale (es. flunixin meglumine, ketoprofene e meloxicam). L'analgesia dovrebbe essere condotta sia prima dell'intervento sia fino a qualche giorno dopo.

Poiché è vietato il **taglio delle code**, se non a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 19), la presenza di animali con coda amputata, in assenza di documentazione e registrazione (es. registrazioni di trattamento analgesico e anestetico) redatta dal medico veterinario dell'allevamento che, sotto la propria responsabilità, opportunamente giustifichi e motivi tale procedura, deve essere considerata insufficiente. Stessa valutazione può essere assegnata

qualora la documentazione sia presente ma giudicata non idonea o non sufficiente a motivare il ricorso alla caudotomia, oppure la stessa sia stata eseguita senza analgesia ed anestesia oppure con pratiche dolorose e non idonee. Ovviamente, se si riscontrano soggetti con lesione alla coda di origine traumatica o da schiacciamento, ciò non ricade nella pratica di mutilazione.

La pratica della **caudectomia** arreca gravi ripercussioni al benessere degli agnelli e delle pecore adulte, e non risulta giustificata da reali benefici nella conduzione aziendale. Nelle razze a pelo corto e da latte il taglio della coda non rappresenta una pratica utile per il benessere della pecora e deriva spesso da consuetudini inveterate e, nell'Europa mediterranea, dove le pecore vengono allevate prevalentemente per la produzione di latte, la coda viene tagliata adducendo come motivazione una migliore igiene della mammella e del latte, fatto non dimostrato e controverso in letteratura.

Qualora ce ne fosse bisogno, si sottolinea che la coda è una parte anatomica molto importante, utilizzata dagli animali nella deambulazione, in particolare nella corsa, per mantenere l'equilibrio, ed è punto di attacco dei muscoli che regolano il corretto funzionamento del retto; a questo si aggiunge un importante ruolo comportamentale, ad esempio nella comunicazione con i consimili e nell'allontanamento degli insetti.

Studi recenti (Peli et al., 2017) hanno evidenziato che il taglio della coda nella pecora Lacaune, in particolare se eseguito lasciando un moncone troppo corto causa, a lungo termine, modificazioni nella forma e nelle dimensioni delle fibre muscolari, in quanto riduce la massa dei muscoli retto-coccigei. Tale pratica è associata ad un maggiore rischio di prolapsi vaginali e rettali al momento del parto e ad un aumento di insorgenza di carcinomi squamocellulari nella regione perineale e di sviluppo di neuromi (Fisher e Gregory, 2007; French e Morgan, 1992).

Infine, non vi sono studi sulla specie ovina che mettano in relazione la caudectomia con l'igiene della mammella e la qualità del latte. Uno studio condotto sulla specie bovina in questo ambito (Schreiner e Ruegg, 2002) non ha rilevato differenze attribuibili alla caudectomia.

Per quanto riguarda la **castrazione**, essa è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione solo se eseguita prima del raggiungimento della maturità sessuale degli animali, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli stessi. Per gli arieti e i becchi la maturità sessuale viene raggiunta tra i 5 e i 7 mesi di età, in funzione dello stato nutrizionale, del periodo di nascita e della razza.

Metodi di castrazione prevedono l'uso di anelli elastici, pinze da castrazione (es. Burdizzo) e rimozione chirurgica. Per pinza Burdizzo si intende una sorta di tenaglia che tramite compressione del cordone spermatico all'interno dello scroto causa atrofia testicolare nelle settimane successive. Poiché la cute rimane integra, di norma non insorgono infezioni secondarie.

In generale, poiché la castrazione provoca in ogni caso forte dolore e disagio per molti giorni, anche quando viene effettuata su animali non maturi sessualmente, sotto controllo veterinario, deve sempre essere accompagnata da almeno una prolungata analgesia sistemica post-intervento.

La castrazione eseguita dopo la maturità sessuale è un atto medico-chirurgico e richiede obbligatoriamente l'intervento di un medico veterinario e pertanto deve sempre essere accompagnata da anestesia locale (es. lidocaina, procaina inoculata in cordoni spermatici e scroto) e da prolungata analgesia sistemica, che quindi richiedono indispensabile intervento del medico veterinario.

Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterilizzati o monouso ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria.

Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali, ovvero il requisito ottimale può essere assegnato se tutti gli animali sono integri e nessuno di loro né di recente, né in passato ha subito una mutilazione e/o castrazione (ancorché consentita).



Figura 65 - Il taglio delle code eseguito routinariamente, non per fini terapeutici certificati e non registrato adeguatamente (es. assenza di registrazioni di trattamento analgesico e anestetico) dal medico veterinario dell'allevamento che, sotto la propria responsabilità, opportunamente giustifichi e motivi tale procedura, deve essere considerato non conforme.

IX PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

28. Disposizioni generali

“Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.” (D. Lgs. 146/2001, articolo 2, comma 1).

“Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.” (D. Lgs. 146/2001 allegato, punto 20).

Elemento di verifica 28

DISPOSIZIONI GENERALI

*(Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento) 146/2001 Art. 2 Comma 1 e All. Procedure di allevamento
Punto 20*

146/2001 Art. 2 Comma 1

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali [...] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20

“Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali”.

Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali. Tra queste si suggerisce di prestare attenzione alle modalità di esecuzione della tosatura, qualora questa causi gravi ferite agli animali.

In aggiunta, verificare che il proprietario o il detentore non siano negligenti circa alcune misure da adottare per mantenere gli animali in condizioni di benessere (es. mancata esecuzione del pareggio podale con evidenza di unghioni lunghi e deformi, in grado di creare disagio agli animali).					
Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali					no, NO
Si considera adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali					SI
28) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM (es. ferite gravi da tosatura, unghioni lunghi e deformi per assenza di pareggio, zoppia, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

Questo criterio si riferisce alle disposizioni generali di allevamento, e contempla le eventuali non conformità non trattate negli altri criteri che possono ledere il benessere degli animali.

Non devono essere praticate procedure che ledono le 5 libertà degli animali (Brambell, 1965; FAWC, 1979):

1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
2. libertà dai disagi ambientali;
3. libertà dalle malattie e dalle ferite;
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
5. libertà dalla paura e dallo stress.

La condizione non adeguata prevede una tipologia d'allevamento in cui la gestione delle fasi produttive provochi evidenti conseguenze negative sullo stato degli animali (rilevabili tramite ABMs); mentre la condizione adeguata prevede una tipologia d'allevamento in cui la gestione delle fasi produttive non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali.

La tosatura è una pratica comune e routinaria, e deve essere eseguita da personale opportunamente addestrato e competente. Le attrezzature impiegate devono essere ben mantenute, pulite e disinfettate al fine di non arrecare lesioni e abrasioni durante il loro utilizzo. Sarebbe auspicabile una tosatura all'anno per le pecore, eseguita all'inizio del periodo caldo dell'anno e, preferibilmente, la scelta del giorno di esecuzione andrebbe intrapresa in base alle previsioni meteorologiche. Nei primi periodi dopo la tosatura, le pecore dovrebbero avere a disposizione dei ripari notturni, soprattutto in aree

geografiche in cui l'escursione termica giornaliera è maggiore. Poiché la pecora soffre in modo particolare la contenzione, è necessario che l'operazione venga svolta mantenendo l'animale legato per il minor tempo possibile e, qualora fossero provocate lesioni cutanee, ferite, o abrasioni, siano prestate cure immediate. Si suggerisce di prestare particolare attenzione alla presenza di lesioni cutanee, tagli e cicatrici imputabili alle modalità di esecuzione della tosatura negli ovini: qualora questa procedura causi ferite gravi ed importanti agli animali deve essere considerata non conforme. In aggiunta, verificare che il proprietario o il detentore non siano negligenti circa alcune misure da adottare per mantenere gli animali in condizioni di benessere, affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili (come previsto dal D. Lgs. 146/2001, Art. 2, comma 1). Tra queste "misure" può essere annoverata (ma non è necessariamente l'unica) la mancata esecuzione del pareggio podale, confermata dall'evidenza di unghioni lunghi e deformi, che in quanto tali possono recare disagio agli animali, che non riescono a muoversi correttamente o a raggiungere con facilità gli alimenti e l'acqua.



Figura 66 – Unghioni lunghi e deformi che compromettono l'andatura dell'animale.

29. Biosicurezza - Lotta agli infestanti

“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi” (Reg. CE 852/2004, allegato I, parte A, cap. II, punto 4 f)).

Elemento di verifica 29					
BIOSICUREZZA - LOTTA AGLI INFESTANTI					
(Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento) Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f).					
“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi” Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti). Se l'ambiente in cui vivono gli animali è ritenuto tale da non richiedere alcuna azione di controllo, il requisito si considera non applicabile. <i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
Si considera non adeguato: Completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori)					no, NO
Si considera adeguato: Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti) ma giudicate idonee al contenimento dei principali infestanti					SI
Si considera ottimale: Presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive)					Ottimale
29) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere le condizioni rilevate (es. presenza di mosche o evidenza della presenza di roditori o loro tracce). Descrivere, nel caso siano presenti perché ritenute necessarie, le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate. In caso N.A. specificare il motivo.					

La presenza di roditori ed insetti rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni. Essi, infatti,

possono comportarsi da vettori biologici e/o meccanici, favorendo la diffusione in modo particolare di infezioni a ciclo oro-fecale.

Se da una parte i roditori sono vettori di zoonosi, dall'altra possono avere un ruolo (sia come reservoir sia come vettori meccanici) nella permanenza all'interno di allevamenti zootecnici di malattie che possono esitare in forme cliniche negli animali domestici e/o costituire un rischio per la sicurezza alimentare.

È auspicabile che il controllo dei roditori avvenga attraverso un piano di derattizzazione definito e organico che può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente. È fondamentale prevedere la gestione ordinata del magazzino di stoccaggio di materiali o alimenti, la rimozione costante della sporcizia, la conservazione degli alimenti più graditi in locali non accessibili agli animali nocivi, nonché evitare l'accumulo di materiale vario ed estraneo nel perimetro dell'azienda ed effettuare frequentemente lo sfalcio di eventuali erbacce. Da ricordare che la rilevazione, pure se occasionale e sporadica, anche di un solo esemplare di roditore, può indicare la presenza di un'intera popolazione. Non bisogna, inoltre, dimenticare che i roditori sono in grado di provocare danni alle strutture, come cavi elettrici, tubature di gomma e di plastica.

L'introduzione o la presenza di gatti per il controllo dei roditori, non soddisfa i criteri di base della biosicurezza poiché a loro volta i gatti diventano potenziali vettori per la diffusione di patogeni, quindi esita in una condizione non conforme.

Le operazioni di derattizzazione possono essere effettuate sia da ditte esterne specializzate che dal responsabile dell'allevamento stesso, ma in linea generale è molto importante garantire un idoneo posizionamento di esche e trappole e rispettare pedissequamente le scadenze per la corretta manutenzione delle stesse. Buona prassi è la disponibilità in sede di una piantina dell'allevamento con l'ubicazione di esche e trappole, la presenza della scheda di sicurezza relativa al prodotto utilizzato, nonché il numero di lotto, l'indicazione del principio attivo e delle date di distribuzione, di controllo e di sostituzione. Le esche devono essere sottoposte a verifica periodica del consumo e sostituite; è inoltre necessario che vengano stabiliti in anticipo i limiti critici (es. presenza di tracce di roditori/presenza di roditori morti/consumo di un numero x di esche) e le conseguenti azioni correttive (es. pulizia generale e riposizionamento, modifica del principio attivo, posizionamento di trappole aggiuntive, ecc.). Le esche non devono essere posizionate in luoghi accessibili agli altri animali domestici e devono sempre essere fissate a perni, all'interno di appositi contenitori, per evitare la dispersione da parte dei roditori. Non devono essere utilizzate bustine libere di prodotti rodenticidi, né prodotti in polvere o granuli, distribuiti negli ambienti di allevamento.

Altro elemento di rischio per quanto riguarda la biosicurezza è la presenza di insetti (es. mosche). Le mosche possono essere innanzitutto causa diretta di grave irritazione, spesso associata a perdita di

peso e, per quanto riguarda le mosche ematofaghe (es. tabanidi) a un'ingente perdita di sangue. Alcune mosche inoltre sono miasigene, ovvero i propri stadi larvali sono parassiti obbligati o facoltativi di alcune specie animali, compiendo parte del loro ciclo vitale nei tessuti dell'ospite (Belcari et al., 2012). I danni provocati da queste larve riguardano irritazione locale ed esitano in perdita di peso e deprezzamento della carcassa. Le mosche in allevamento intensivo possono poi fungere da vettore meccanico nella trasmissione di malattie da un animale all'altro (Foil e Gorham, 2000).

Quindi, per quanto riguarda gli insetti, sarebbe opportuno programmare interventi a calendario (autonomi o tramite intervento di una ditta esterna), più frequenti nel periodo estivo-autunnale, rivolti al controllo sia delle forme adulte sia delle larve. Risulta inoltre utile mantenere i locali puliti ed asciutti evitando l'accumulo di rifiuti e di sporco in zone difficilmente accessibili.

La condizione non adeguata prevede la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti (a meno che tale condizione sia ritenuta non necessaria) o la presenza di piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori).

La condizione adeguata prevede la presenza di procedure anche se approssimative e non formalizzate all'interno di piani scritti, ma giudicate idonee ad un contenimento ritenuto efficace ed accettabile di roditori e mosche.

La condizione ottimale prevede la presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione adeguatamente descritti e documentati dagli operatori e verifica in loco dell'efficacia delle azioni svolte; presenza di un manuale o di istruzioni relativi alla lotta agli infestanti, con descrizione dei principi attivi utilizzati; schede di sicurezza e planimetrie con localizzazione delle esche; definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento; registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive).

Durante lo svolgimento di questa verifica, l'operatore è quindi chiamato a chiedere, ma anche a valutare attivamente, quali procedure siano state messe in atto dall'allevatore e se queste siano realmente efficaci oppure no nella lotta ai roditori e alle mosche. Infatti, se durante la visita dovessero palesarsi situazioni chiaramente in antitesi con quanto affermato dal gestore dell'allevamento (es. evidenza di roditori che circolano indisturbati, presenza di feci di roditori o di insetti in quantità eccessiva, ecc.), il valutatore deve tenerne conto e selezionare la risposta più affine a quanto riscontrato.

Infine, se l'ambiente in cui vivono gli animali è ritenuto tale da non richiedere alcuna azione di controllo, il requisito si considera non applicabile, ma nel campo delle evidenze tale circostanza deve essere descritta, sostanziata e motivata.

Figura 67 - Identificazione di trappola avvelenata con cartello

X MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs

Nell'ambito di questa valutazione del rischio, le misure animal based measures (ABMs) che saranno utilizzate in allevamento sono: la prevalenza di animali molto magri, il grado di pulizia del vello e del manto, la presenza di animali con lesioni cutanee, la prevalenza di animali zoppi, la prevalenza di animali con patologie mammarie ed altre forme infettive (malattia degli ascessi) e il tasso di mortalità. In allevamento, le ABMs devono essere eseguite su tutte le categorie di animali presenti, salvo diversa indicazione.

Mentre nel caso dei requisiti normativi intesi in senso stretto è necessario valutare complessivamente l'allevamento (riportando nelle evidenze i box/capannoni o recinti nei quali sono state effettuate misurazioni, rilievi, ecc...) ed esprimere il giudizio come conforme o non conforme (tenendo presente che basta rilevare una non conformità anche solo in una delle unità controllate perché il giudizio finale sia negativo), nel caso delle ABMs viene effettuata una valutazione della popolazione su base statistica e il risultato non influenza in modo diretto il giudizio di conformità o non conformità, ma è essenziale per confermare ad esempio un sospetto di non conformità o un'ipotesi di conformità in casi dubbi. Per questo motivo il giudizio, in caso di ABMs sarà "insufficiente, adeguato, ottimale". Per operare correttamente ed esprimere il giudizio sulle condizioni della popolazione dell'allevamento, in caso di ABMs dirette, è necessario osservare un numero minimo di animali statisticamente significativo, che rappresenti i diversi gruppi o categorie di animali presenti (es. pecore/capre adulte, arieti/becchi, pecore/capre da rimonta, agnelli/capretti di età inferiore ai 3 mesi). Le indicazioni al riguardo sono contenute in Tabella 2.

Tabella 2 - Numero minimo di animali da osservare per la valutazione delle animal-based measures (ABMs) dirette

Dimensioni gruppo	Numero minimo di animali da osservare
Fino 30	Tutti
Da 31 a 99	Rispettivamente da 30 a 39
Da 100 a 199	Rispettivamente da 40 a 50
Da 200 a 299	Rispettivamente da 51 a 55
Da 300 a 549	Rispettivamente da 55 a 59
Da 550 a 1000	Rispettivamente da 60 a 63
Da 1001 a 3000	Rispettivamente da 63 a 65

30. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)

“Una condizione corporea scarsa può essere il riflesso di uno stato precedente di fame prolungata o di malattia.” (Welfare Quality®, 2009b, cap. 1.1).

“La valutazione della condizione corporea dell’animale è uno strumento utile per stimare lo stato di nutrizione e di salute delle capre.” (AWIN, 2015a).

“Il body condition scoring (BCS) è un metodo standardizzato per valutare il quantitativo di grasso corporeo. Il BCS misura l’equilibrio tra l’energia introdotta e quella utilizzata, ed è collegata allo stimolo per l’assunzione degli alimenti. Il BCS può essere influenzato da vari fattori, quali la disponibilità di alimenti, fattori produttivi e riproduttivi, condizioni meteorologiche, parassiti, problemi dentali, tipologia della razione, malattie. Il BCS viene valutato mediante palpazione dei processi spinosi della regione lombare, dopo l’ultima costola. Tastare i processi orizzontali e verticali, per stimare la copertura muscolo-adiposa della regione lombo sacrale.” (AWIN, 2015b).

“Un problema pratico per quando si usa il BCS è che la sua relazione con il contenuto di grasso corporeo, che differisce tra le razze con medesima attitudine (latte o carne), e in relazione allo stadio produttivo. Per esempio, comparando la razza Sarda con una Lacaune, risulterà che la prima con un BCS di 2.0 avrà già un deposito di grasso viscerale, che la Lacaune possiede solo con un BCS intorno a 3.0. Per la razza Sarda durante il periodo riferibile alla nascita degli agnelli, il BCS ottimale si attesta tra 3.25 e 3.50, che può diminuire fino ad un minimo di 2.0 -2.5 tra il 6° e 8° mese di lattazione. Le pecore non dovrebbero perdere più di 1 punto di BCS in 6 settimane. Tuttavia, questi valori potrebbero non essere ottimali per tutte le razze.” (Cannas A., 2004).

Elemento di verifica 30. STATO DI NUTRIZIONE MISURATO TRAMITE BODY CONDITION SCORE (BCS) <i>Animal-based measures</i>	
Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di BCS da 1 a 5 per gli animali adulti. Sono da registrare gli animali molto magri o molto grassi.	
OVINI ADULTI: valori di BCS minori di 2 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati	
CAPRINI ADULTI: valori di BCS minori di 1,5 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati	
Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti	Insufficiente
Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti	Adeguito
Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti	Ottimale
30) Animali con BCS oltre i limiti	

Adeguito	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con BCS oltre i limiti e il numero di animali controllati			

Un buono stato di nutrizione è garantito attraverso una razione bilanciata, che fornisce un adeguato apporto nutrizionale e soddisfa i fabbisogni in rapporto al periodo produttivo dell'animale. Se gli animali allevati sono sani e correttamente alimentati, anche la loro condizione corporea (body condition) è ottimale. Il monitoraggio di questo parametro è importante per verificare che gli animali abbiano un corretto accrescimento e che non ci siano gravi errori sia nella gestione dei gruppi (es. sovraffollamento, inadeguato spazio per capo in mangiatoia), che nella formulazione, preparazione e somministrazione della razione.

È bene sottolineare che nelle **capre**, a differenza dei bovini e degli ovini, che hanno depositi adiposi sottocutanei, la riserva di grasso è principalmente a livello intra-addominale e questo talvolta rende più difficile una valutazione accurata del Body Condition Score (BCS) (Harwood, 2006, Battini et al., 2014). Quindi, per facilitare l'assegnazione del BCS di ciascun animale, può essere utile avvalersi della palpazione di alcuni punti di repere, invece che limitarsi ad osservarli. La valutazione del BCS si effettua ponendosi posteriormente all'animale, procedendo alla valutazione della zona lombare. Infine, si valuta la quantità di tessuto adiposo che ricopre lo sterno.


Devono essere valutati, come da Tabella 2, un numero rappresentativo di soggetti adulti. Solo le condizioni estreme (molto grasso o molto magro) vengono registrate nel corso della valutazione, in quanto correlate a problemi di benessere (AWIN, 2015a).

Nello specifico, le caratteristiche degli animali con body condition score (BCS) oltre i limiti sono:

- **Animale molto magro (capra BCS < 1,5, pecora BCS ≤ 2):**

Condizioni generali: protuberanze ossee in evidenza, spina dorsale prominente, fianco incavato e coste chiaramente visibili;


Zona lombare: il processo spinoso delle vertebre lombari può essere facilmente pizzicato (i); i processi spinosi sono prominenti e distanziati o comunque visibili come una cresta continua. La muscolatura è scarsa e non si apprezza la presenza di grasso sottocutaneo. Vi è una marcata depressione nel passaggio da processo spinoso a processo trasverso (ii). La mano può facilmente afferrare i processi trasversi delle vertebre lombari, che sono molto prominenti (iii). Ponendosi caudalmente all'animale si può notare la rientranza del fianco (iv) (Villaquiran et al., 2004).



- **Animale molto grasso (BCS >4, sia capre che pecore):**

Condizioni generali: spina dorsale e coste non visibili. Aspetto rotondeggiante, la gabbia toracica è ricoperta da grasso eccessivo.

Zona lombare: ossa del bacino difficilmente individuabili. L'intera regione della groppa è arrotondata per la presenza di muscoli e grasso. I processi spinosi delle vertebre lombari sono completamente ricoperti e non si possono percepire al tatto (i). Vi è una marcata convessità nel passaggio da processo spinoso a quello trasverso (ii) ed è impossibile impugnare i processi trasversi (iii). La fossa del fianco è arrotondata (iv) (Villaquiran et al., 2004).



In caso di difficoltà nella valutazione del BCS tramite osservazione della zona lombare, si può valutare la zona dello sterno, tramite la palpazione. Negli animali molto magri, il grasso sternale è limitato e si può facilmente pizzicare tra pollice e indice e muovere da parte a parte; inoltre, la cartilagine e le articolazioni condrocostali sono facilmente palpabili. Negli animali grassi il tessuto adiposo si estende a coprire tutto lo sterno e le articolazioni condrocostali e non può essere stretto tra due dita. Altri punti di repere che possono aiutare nella corretta valutazione sono le coste e gli spazi intercostali.




Figura 68 – Determinazione del BCS nelle capre: punti di reperi e modalità di palpazione (Villaquiran et al., 2004).

La valutazione del BCS nelle **pecore** viene effettuata ponendosi posteriormente all'animale, procedendo alla palpazione della zona lombare, subito dopo l'ultima costa; si esaminano i processi spinosi e trasversi e si rileva la quantità di grasso e di muscolo che ricopre le vertebre. Il valutatore dovrà tenere conto delle differenze di grasso corporeo esistenti tra le diverse razze produttrici di latte. Il metodo generalmente impiegato è stato descritto da Russel et al. (1969), e ripreso nel progetto Awin (2015b): un animale viene considerato magro se in questa scala il suo BCS è inferiore a 2; normale se il BCS è compreso tra 2 e 4; grasso se è superiore a 4, in una scala compresa tra 0 e 5. Questo sistema viene utilizzato per tutte le razze ovine e per qualunque finalità produttiva (Tabella 3).

Tabella 3 - Determinazione del BCS nelle pecore secondo AWIN (2015b).

BCS	Processi spinosi	Muscolatura - grasso
Grasso > 4	Non sono palpabili se non con pressione accentuata	Muscolo pieno e rotondo e grasso di copertura abbondante
Normale tra 2 e 4	Facilmente distinguibili con leggera palpazione	Muscolatura evidente e leggero grasso di copertura
Magro < 2	Prominenti e facilmente palpabili senza pressione manuale	Tessuto muscolare poco evidente e assenza di grasso di copertura

Ai fini della valutazione del benessere, quindi, si annotano gli animali molto magri con BCS pari o minore di 1,5 (caprini) o pari o minore di 2 (ovini), e gli animali molto grassi con BCS pari o maggiore di 4 (caprini e ovini), sommandoli e rapportandoli al numero totale di soggetti osservati (Anzuino et al., 2010; AWIN, 2015a).

Per assegnare il giudizio ottimale, i soggetti con BCS oltre i limiti devono essere inferiori al 5%, mentre per assegnare il giudizio accettabile devono essere inferiori al 10%.



Figura 69 – Capra adulta con BCS > 4.



Figura 70 – Esempio di BCS < 1,5



Figura 71 – Valutazione del BCS.



Figura 72 - Esempio di animale con BCS > 4 (molto grasso).



Figura 73 - Esempio di animale con BCS < 2 (molto magro).

31. Pulizia degli animali

“La valutazione della pulizia del vello dell’animale fornisce indicazioni indirette dello stato igienico delle aree di ricovero dell’animale, ma anche dello stato di salute in quanto nel vello possono essere presenti ectoparassiti, aree alopeciche ecc. Per ogni animale considerare lo stato di pulizia dell’intero vello, collo, addome, mammella, arti e coda.” (AWIN, 2015b).

“Gli animali dovrebbero essere mantenuti in una condizione pulita che sia il più possibile libera da contaminazione con letame.” (CE draft 8/09 articolo 6, punto 3).

“Lo stato fisico può essere un indicatore di salute e benessere dell’animale. Caratteri dello stato fisico che possono indicare una condizione di benessere compromessa comprendono: anomalo colore o aspetto del pelo oppure un eccessivo imbrattamento con feci, fango o sporcizia.” (OIE, 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

Elemento di verifica 31			
PULIZIA DEGLI ANIMALI			
Animal-based measures			
Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare lo stato di pulizia dell’intero vello o del manto (collo, addome, mammella, arti e coda)			
OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Più del 20% di animali sporchi CAPRE DA LATTE: Più del 10% di animali sporchi			Insufficiente
OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Tra il 7% e il 20% di animali sporchi CAPRE DA LATTE: Tra il 5% e il 10% di animali sporchi			Adeguito
OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Meno del 7% di animali sporchi CAPRE DA LATTE: Meno del 5% di animali sporchi			Ottimale
31) Grado di pulizia del corpo degli animali			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali sporchi e il numero di animali controllati			

Gli animali mostrano in genere avversione per gli ambienti sporchi e preferiscono evitarli se viene data loro la possibilità di scegliere. Inoltre, gli ambienti sporchi sono spesso associati ad un aumento delle problematiche sanitarie, quali dermatiti, mastiti, laminiti ed irritazioni della cute, con conseguente compromissione del benessere.

Per meglio indagare le reali condizioni igieniche in cui vivono gli animali, il valutatore non deve limitarsi a giudicare lo stato delle strutture (N-ABMs), ma deve proseguire nell’analisi osservando lo

stato di pulizia del manto e del vello (ABMs) degli animali presenti in allevamento, quale segnale oggettivo e difficilmente mascherabile.

Per quanto riguarda gli ovini, è necessario controllare in modo particolare la pulizia della mammella della pecora adulta da latte, in quanto un suo imbrattamento può predisporre all'insorgere di mastiti. Il giudizio insufficiente viene assegnato con più del 20% di animali sporchi, accettabile se i capi sporchi sono tra il 7% e il 20%, mentre è ottimale un numero di animali con vello sporco inferiore al 7%. Nella valutazione, qualora gli animali siano al pascolo, è opportuno tenere in considerazione le recenti condizioni meteorologiche. Negli ovini la pulizia deve essere verificata su tutte le categorie di animali presenti al momento della visita in allevamento.

Il progetto di ricerca AWIN (2015b) propone la seguente scala di valutazione per la pulizia del vello:

Animale pulito

- Vello asciutto e pulito che non mostra alcun segno di sporcizia o di contaminazione;
- Vello asciutto o leggermente umido a causa delle condizioni atmosferiche del momento; leggera presenza di fango o sporcizia sul corpo attribuibile al contenimento o alla condizione dei recinti o del pascolo al momento della visita.

Animale sporco

- Vello molto sporco e bagnato, con lana imbrattata di fango o residui fecali su addome e arto posteriore del corpo;
- Vello lurido, animale molto bagnato e rivestito di fango e sterco, in numerose parti del corpo (testa, fianchi, addome, arti anteriori e posteriori).

Per quanto riguarda i caprini, bisogna ricordare che la capra è un animale generalmente pulito poiché, in condizioni fisiologiche, produce delle deiezioni secche e ben conformate, di conseguenza, il mantello e la mammella si imbrattano difficilmente di feci quando l'animale si sdraia a terra. Tuttavia, errate modalità di gestione dei locali di stabulazione e/o delle aree di esercizio possono determinare una lettiera sporca e bagnata, con conseguente presenza in allevamento di animali con pelo bagnato o imbrattato di feci e mammella sporca. È noto che gli ambienti sporchi non sono confortevoli per l'animale; infatti, la capra non ama sdraiarsi su una lettiera umida e non adeguatamente rinnovata (Battini et al., 2014).

La valutazione della pulizia della mammella è particolarmente importante nelle capre adulte, dove l'imbrattamento della mammella può rappresentare un fattore predisponente per l'insorgenza di mastiti con conseguente compromissione del benessere. Sebbene nella capra le mastiti ambientali siano meno frequenti che nel bovino, per il quale è stata dimostrata una correlazione tra igiene della mammella e degli arti posteriori ed incidenza di mastiti subcliniche (Shreiner e Ruegg, 2003), anche

nella capra, la presenza di sporco sugli arti potrebbe essere un importante indicatore di rischio di mastiti (Anzuino et al., 2010).

La valutazione di questo parametro è primariamente eseguita sulle capre adulte (capre in lattazione e/o in asciutta) e il numero di animali da esaminare deve essere proporzionato alla dimensione del gruppo (vedi Tabella 2). Le aree del corpo da osservare sono: il quarto posteriore, l'estremità degli arti posteriori e la mammella; a queste si possono aggiungere anche il collo, il torace e soprattutto l'addome, in caso di incertezza sul giudizio. Ai fini del giudizio finale, un animale è considerato pulito quando presenta gli arti e il quarto posteriore puliti o poco sporchi e la mammella pulita, mentre è considerato sporco quando ha almeno due aree sporche. Il pelo bagnato è da considerarsi come sporcizia. Per assegnare il giudizio ottimale, le capre adulte da latte con mantello sporco devono essere inferiori al 5%, mentre per assegnare il giudizio accettabile è tollerato al massimo il 10% di animali sporchi.

Nel caso di altre categorie di animali (caprini da carne oppure rimonta, becchi e capretti in caprili da latte), evidenti condizioni di sporcizia devono essere opportunamente registrate nel campo evidenze, ricordando che si considera ottimale la presenza di meno del 7% di animali sporchi e insufficiente la presenza di più del 20% di animali sporchi.



Figura 74 – Animale sporco.



Figura 75 - Animale pulito, in quanto presenta solo un'area sporca.



Figura 76 - Animale con vello sporco.



Figura 77 - Animali dal vello pulito.



Figura 78 – Animali dal vello pulito.

32. Lesioni cutanee

Elemento di verifica 32			
LESIONI CUTANEE <i>Animal-based measures</i>			
Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee. Le lesioni si valutano osservando l'intero animale: testa (inclusi occhi e orecchie), collo, torace, addome, mammella e tutti gli arti. OVINI E CAPRINI ADULTI: Per lesioni cutanee si intendono le alterazioni rappresentate da: - aree alopeciche con una superficie totale di almeno 7 x 7 cm (comprese le alopecie da cause micotiche e parassitarie); - tumefazioni ed ascessi (non da malattia degli ascessi); - ferite ed abrasioni profonde; - callosità esuberanti e fessurate.			
Più del 10% di animali con lesioni cutanee			Insufficiente
Tra il 5% e il 10% di animali con lesioni cutanee			Adeguito
Meno del 5% di animali con lesioni cutanee			Ottimale
32) Animali con lesioni al corpo			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con lesioni, il gruppo e il numero di animali controllati.			

La valutazione delle lesioni deve essere svolta osservando l'intero animale (entrambi i lati) in senso cranio-caudale. In particolare, occorre prestare attenzione a: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, addome, arto posteriore e mammella.

Negli ovini e nei caprini, le lesioni cutanee di piccole dimensioni sono più difficili da identificare, perché coperte dal vello o dal manto (Llonch et al., 2015), per questo esse si intendono le alterazioni rappresentate da:

- aree alopeciche con una superficie totale (anche non continua) di almeno 7 x 7 cm (comprese le alopecie da cause micotiche e parassitarie);
- tumefazioni ed ascessi (non da linfadenite caseosa);
- ferite ed abrasioni profonde;
- callosità esuberanti e fessurate.

Non si considera lesione l'ispessimento della cute a livello di carpo, che è un reperto frequentemente riscontrato nell'allevamento della capra da latte e che è giudicato condizione normale, fino a che gli animali non dimostrino di soffrirne. Diversamente, si considera lesione la presenza di tessuto calloso esuberante, fessurato, con edema e rigonfiamento dei tessuti molli peri-articolari (Anzuino et al., 2010).

Nella pecora la presenza di eventuali lesioni cutanee, come: abrasioni, aree alopeciche (ad esempio dovute a cause micotiche o parassitarie), tumefazioni, ascessi, callosità esuberanti e fessurate, ferite datate e recenti, dovrebbe essere valutata con gli animali confinati in un recinto o animali contenuti in auto-catturanti, per eseguire un accurato controllo di tutte le parti dell'animale.

Come indicato in Awin (2015b), il valutatore dovrebbe osservare la presenza di lesioni sia recenti sia cicatrizzate esaminando l'intero animale in senso cranio-caudale e registrando la localizzazione e la gravità di ogni lesione per:

1. Testa;
2. Orecchie, inclusi strappi e lesioni da perdita di marche auricolari (le forature pulite derivanti da perdita o rimozione delle marche auricolari non dovrebbero essere conteggiate), incisioni, segni o tagli alle orecchie anche se guariti;
3. Ferite e lesioni oculari;
4. Collo, torace, addome, mammella;
5. Arti (gonfiori, alopecie, calli, lesioni o zone crostose sulle articolazioni, indicativi di artriti, ferite o traumi, o decubito su superficie dure).

La valutazione è sempre eseguita su un numero statisticamente significativo di animali (vedi Tabella 2). Sono valutati positivamente gli allevamenti che presentano meno del 5% di animali con lesioni cutanee, e negativamente quelli che presentano più del 10% di soggetti con lesioni cutanee.

CRenBA 2021



Figura 79 – Lesione cutanea: area alopecica superiore a 7 x 7 cm.

CRenBA 2021



Figura 80 – Lesione cutanea: area alopecica superiore a 7 x 7 cm.



Figura 81 – Lesione cutanea: tumefazione alle articolazioni del carpo.



Figura 82 – Lesione cutanea: abrasione (dovuta ad una testata).



Figura 83 - Ovino con lesioni alopeciche ed escara cutanea.



Figura 84- Ovino con lesione oculare.



Figura 85 - Ovino con importante lesione all'orecchio.




Figura 86 - Ovino con lesione cutanea ascrivibile ad area alopecica

33. Presenza di ascessi (animali adulti e rimonta)

Elemento di verifica 33			
PRESENZA DI ASCESSI (ANIMALI ADULTI E RIMONTA)			
<i>Animal-based measures</i>			
Valutare il numero di animali (adulti e rimonta) con ascessi integri o aperti e/o ipertrofia dei linfonodi (correlati alla malattia degli ascessi) sul numero totale di animali (adulti e rimonta) osservati.			
Più del 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi			Insufficiente
Tra il 2% e il 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi			Adeguito
Meno del 2% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi			Ottimale
33) Numero di animali con presenza di ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi correlati alla presenza di linfadenite caseosa			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con presenza di ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi (correlati alla presenza di Linfadenite Caseosa/Malattia degli Ascessi) sul totale degli animali osservati (adulti e rimonta).			

La linfadenite caseosa e la “malattia degli ascessi” sono malattie croniche del sistema linfatico molto diffuse negli allevamenti e sono sostenute rispettivamente da *Corynebacterium pseudotuberculosis* e da *Staphylococcus aureus* subsp. *anaerobius*. Le due forme sono spesso clinicamente indistinguibili e talvolta dal materiale ascessuale si isolano entrambi i patogeni; la malattia si manifesta con ascessi contenenti pus caseoso di color giallo-verdastro, generalmente localizzati a livello linfonodale. Le sedi più comuni sono i linfonodi parotidei e sottomandibolari, seguiti dai prescapolari, i precurali e i sopramammari. Poiché si tratta di una malattia sistemica, possono essere interessati anche i linfonodi profondi e gli organi parenchimatosi; gli ascessi possono suppurare e diffondere il materiale infetto nell’ambiente (Harwood, 2006).

La linfadenite caseosa è una malattia altamente diffusiva e contagiosa, difficile da curare e da eradicare, ed è in grado di compromettere il benessere di un intero allevamento: tale patologia è molto diffusa negli allevamenti **caprini**, mentre raramente riscontrabile in quelli ovini.

Ferrante e colleghi (2012) hanno evidenziato come la presenza di ascessi sia un indicatore di cattivo benessere delle capre e, ad esempio in Norvegia, questa malattia è stata inserita (insieme alla artrite-encefalite caprina (CAEV) e alla paratubercolosi) in un programma di eradicazione di malattie con

lo scopo di migliorare il benessere degli animali e la produttività (Nagel-Alne et al., 2014; Muri et al., 2015).

La valutazione di questo parametro deve essere eseguita su un numero rappresentativo di soggetti, come da Tabella 2, presenti nel gruppo delle capre adulte (in lattazione e/o in asciutta), delle capre da rimonta e dei becchi. Devono essere contati gli animali con ascessi (integri o aperti) e/o con ipertrofia dei linfonodi, ovvero i soggetti con lesioni ascrivibili ad infezione in atto. Infatti, le cicatrici di pregressi ascessi non devono essere considerate nel conteggio (AWIN, 2015a).

Sono valutati positivamente gli allevamenti che presentano meno del 2% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi e negativamente quelli che presentano più del 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi.



Figura 87 – Presenza di ascessi diffusi.



Figura 88 - Interessamento dei linfonodi sottomandibolari.



Figura 89 – Presenza di importante ascesso sottomandibolare in una pecora.

34. Zoppie

“La zoppia è considerata un importante indicatore del benessere nel bestiame.” (Welfare Quality® 2009b, 5.5 Conclusion).

“La zoppia consiste in un’anomalia nella capacità di movimento, che è maggiormente evidente quando l’animale deambula; per la maggiore parte dei casi è il risultato di infezioni podali. L’animale che zoppica a livello di uno o più arti, sente dolore ed è impossibilitato a sostenere il peso del corpo con i quattro arti contemporaneamente; l’animale tende ad abbassare la testa e a non caricare sull’arto malato, che può essere anche tenuto sollevato in posizione antalgica.” (AWIN, 2015b).

Elemento di verifica 34 ZOPPIE <i>Animal-based measures</i>			
Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3. Si considera animale zoppo se presenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con minimo carico sull’arto interessato, ha una camminata “a passo d’oca”. Score 3 = Animale che non appoggia il peso su un arto o non è in grado di camminare, o cammina sulle ginocchia. Considerare il numero di animali zoppi (compresi quelli in infermeria) presenti al momento della visita rispetto al numero totale di animali adulti.			
OVINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi CAPRINI ADULTI: Più dell’8% di animali zoppi			Insufficiente
OVINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi CAPRINI ADULTI: Tra il 4% e l’8% di animali zoppi			Adeguito
OVINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi CAPRINI ADULTI: Meno del 4% di animali zoppi			Ottimale
34) Animali con evidenti segni di zoppia			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con zoppia di grado 2 e 3, il gruppo e il numero di animali controllati.			

La zoppia, qualunque sia la causa, è un disturbo locomotorio caratterizzato da manifestazioni dolorose talmente forti da influenzare negativamente tutte le principali attività di un animale, quali il riposo, il movimento, l’assunzione di alimento ed acqua o l’espressione di specifiche caratteristiche

comportamentali. I disturbi locomotori sono spesso l'espressione finale di pessime condizioni gestionali o strutturali o di forme infettive.

La valutazione dei disturbi di deambulazione nei **caprini** è da eseguirsi attraverso l'analisi della loro gravità e prevalenza, utilizzando lo schema di punteggiatura suggerito da Anzuino et al. (2010), che distingue le andature degli animali in 4 punti:

0. **Andatura normale ed uniforme**, con peso correttamente ripartito su tutti gli arti e normale spostamento in avanti;
1. **Andatura zoppicante su uno o più arti** (andatura dubbia con passi irregolari), ma il peso del corpo è bilanciato sui 4 arti e la progressione in avanti è normale;
2. **Andatura con grave zoppia**, difficoltà di progressione in avanti, spostamento del peso da un arto all'altro ed iniziale andatura a "passo d'oca";
3. **Marcata andatura a "passo d'oca"**, difficoltà di progressione in avanti, mancato scaricamento del peso su uno o più arti e camminata sulle ginocchia.

Si considerano zoppi gli animali con punteggio uguale o superiore a 2 (compresi quelli in infermeria). Per esprimere il giudizio, la percentuale di animali zoppi è calcolata sul numero totale di animali adulti. Sono valutati positivamente gli allevamenti caprini che presentano meno del 4% di animali zoppi, e negativamente quelli che presentano più dell'8% di animali zoppi.

La valutazione dei disturbi di deambulazione negli **ovini** si esegue in modo molto simile a quella dei caprini, come si evince dalle definizioni di AWIN (2015b), indicanti 4 livelli di giudizio:

- **Punteggio 0: Assenza di zoppia**

Il movimento è fluido, il peso è distribuito allo stesso modo sui quattro arti, senza accorciare il passo; viene accettato un lieve dondolio del capo se la deambulazione viene effettuata su una superficie irregolare.

- **Punteggio 1: Lieve zoppia**

Il passo è più corto, accompagnato da palesi movimenti ondulatori del capo, a volte a scatto, quando l'arto affetto da zoppia tocca il terreno.

- **Punteggio 2: Zoppia**

Movimenti ondulatori del capo molto evidenti, mancato appoggio dell'arto malato durante la deambulazione o tenuto sollevato durante la stazione quadrupedale, alimentazione al pascolo sulle ginocchia anteriori.

- **Punteggio 3: Zoppia grave**

Decubito o riluttanza al movimento o a stare in posizione quadrupedale.

Per meglio identificare il grado di zoppia, gli animali possono essere invitati a muoversi lentamente per esaminare la loro andatura e successivamente osservati mentre camminano ad andatura più veloce su una superficie piana e dura.

Sono valutati positivamente gli allevamenti ovini che presentano meno del 6% di animali zoppi, e negativamente quelli che presentano più dell'10% di animali zoppi.

Durante la valutazione, l'allevatore può dichiarare quanti animali zoppi sono presenti in allevamento al momento della visita (compresi i soggetti in infermeria), ma il valutatore, durante la fase di osservazione degli animali, deve effettuare un vero e proprio conteggio degli animali zoppi. È possibile eseguire la valutazione anche osservando e valutando attentamente l'andatura di un numero statisticamente significativo di soggetti (vedi Tabella 2).



Figura 90 - Deambulazione sulle ginocchia.



Figura 91 - Ovino affetto da zoppia, con arto anteriore sinistro sollevato in posizione antalgica.



Figura 92 - Ovino affetto da zoppia, con arto posteriore sollevato in posizione antalgica.

35. Sanità della mammella (pecore da latte)

Elemento di verifica 35 SANITÀ DELLA MAMMELLA (PECORA DA LATTE) <i>Animal-based measures</i>			
Verificare/calcolare il valore di media geometrica mobile della conta delle cellule somatiche del latte di massa, sulla base dei controlli eseguiti, prendendo in considerazione i risultati degli ultimi 3 mesi. In assenza di analisi routinarie (almeno 1 volta al mese) sul latte di massa, il parametro si considera insufficiente.			
Media geometrica cellule somatiche maggiore di 1.500.000 cell/ml e/o assenza di dati negli ultimi 3 mesi			Insufficiente
Media geometrica cellule somatiche tra 750.000 e 1.500.000 cell/ml			Adeguito
Media geometrica SCC minore di 750.000 cell/ml			Ottimale
35) Media geometrica mobile cellule somatiche nel latte di massa			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il valore di media geometrica mobile della conta delle cellule somatiche del latte di massa calcolato in base ai controlli degli ultimi 3 mesi, oppure registrare l'assenza di controlli routinari sul latte di massa.			

La conta delle cellule somatiche è ampiamente impiegata come indice di mastite negli allevamenti bovini, mentre per quanto riguarda le cellule somatiche dei piccoli ruminanti, allo stato attuale, non esiste un valore soglia.

Il Comitato Scientifico del Simposio internazionale “Cellule somatiche e qualità del latte dei piccoli ruminanti”, che si è tenuto nel 1994 a Biella, ha proposto, come obiettivo a termine, una soglia unica per i piccoli ruminanti di 1.500.000 cell./ml.

Rosati e colleghi nel 2005 ha effettuato uno studio in 4 regioni italiane: Sardegna, Lazio, Toscana e Sicilia, dove si alleva complessivamente oltre l'80% del patrimonio ovino nazionale, e ha coinvolto allevamenti di razza Comisana e Sarda, ovvero i più rappresentativi a livello nazionale della produzione di latte ovino. Ebbene, da questo lavoro è emerso che i valori medi delle cellule somatiche nel latte di massa degli allevamenti selezionati, sono stati pari a 1.133.000 cell/ml (media geometrica) e 1.389.000 cell/ml (media aritmetica). La classe di ampiezza di cellule somatiche maggiormente rappresentata è risultata quella compresa nell'intervallo tra 500.000 e 1.500.000 cell/ml. È stato evidenziato che i valori più elevati di cellule somatiche nel latte sono stati rilevati nelle fasi iniziali ed in quelle finali della lattazione.

Poiché la conta delle cellule somatiche negli ovini è un parametro importante per determinare la salute della mammella e quindi il benessere delle pecore adulte, per eseguire la valutazione, è necessario verificare che l'allevatore sia in possesso di analisi di laboratorio relative alle cellule somatiche del latte di massa: se la media geometrica delle cellule somatiche del latte di massa (eseguita sui controlli degli ultimi 3 mesi) è compresa tra 750.000 e 1.500.000 cell/ml il giudizio è accettabile. Il giudizio è insufficiente per valori medi superiori a 1.500.000 cell/ml o nel caso in cui i dati non siano disponibili. Nel caso di allevamenti con parti stagionali, se il gregge è tutto in asciutta si può far riferimento all'ultimo intervallo di tempo in cui gli animali erano in lattazione; se gli animali sono tutti in lattazione ma non sono ancora trascorsi 3 mesi, si prende in considerazione l'ultimo periodo disponibile, anche se inferiore a 3 mesi.

Si precisa che tale parametro non può essere applicato negli allevamenti di capre da latte, perché non esiste una normativa di riferimento e le cellule somatiche non sempre sono indicative per valutare la sanità della mammella.

36. Asimmetria della mammella (capre adulte da latte)

“L’asimmetria della mammella è il problema mammario più frequente nelle stalle di capre da latte ed è correlato all’infezione e all’infiammazione della ghiandola mammaria. È spesso associata ad un’elevata conta delle cellule somatiche ed è probabile che sia il risultato di passate infezioni intramammarie, con successiva fibrosi ed atrofia della ghiandola. Comporta, inoltre, dolore e sofferenza.” (AWIN, 2015a).

Elemento di verifica 36			
ASIMMETRIA DELLA MAMMELLA (CAPRE ADULTE DA LATTE)			
Animal-based measures			
La mammella si considera asimmetrica quando un quarto è più lungo del 25% rispetto all’altro, capezzoli esclusi.			
Più del 10% di animali con asimmetria della mammella			Insufficiente
Tra il 5% e il 10% di animali con asimmetria della mammella			Adeguito
Meno del 5% di animali con asimmetria della mammella			Ottimale
36) Numero di capre adulte (da latte) con asimmetria della mammella			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di capre adulte (da latte) con presenza di asimmetria della mammella sul totale delle capre adulte (da latte) osservate.			

Questa valutazione ABM deve essere eseguita negli allevamenti caprini e solo sulle capre adulte in produzione.

Nella specie caprina, infatti, non ci sono dei parametri di riferimento per valutare la sanità della mammella, come ad esempio le cellule somatiche, e il rilievo sugli animali di asimmetrie mammarie è un indicatore di eventuali problemi all’apparato mammario. Nella capra da latte la corretta morfologia della mammella è importante; infatti, una mammella simmetrica, ben attaccata e alta da terra, con capezzoli corretti per forma ed inclinazione, è meno soggetta ad insulti traumatici nel corso della mungitura o durante le quotidiane attività dell’animale.

In questa specie, l’asimmetria della mammella può essere associata a processi infiammatori e/o infettivi in atto o pregressi ed è comunque un fattore predisponente per patologie alla mammella.

Si considerano asimmetriche le mammelle che presentano una emi-mammella più lunga del 25% rispetto all’altra, capezzoli esclusi (AWIN, 2015a).

Nel caso i capretti siano allattati dalla madre, potrebbe esserci un'asimmetria dovuta alle modalità di suzione del piccolo, ma in genere questa non è superiore al 25%.

Sono valutati positivamente gli allevamenti che presentano meno del 5% di animali con asimmetria della mammella e negativamente quelli che ne presentano più del 10%.



Figura 93 - La prima capra da destra ha mammella simmetrica, la seconda da destra ha mammella asimmetrica.



Figura 94 – Mammella con asimmetria accettabile (<25%).

37. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 12 mesi di vita)

38. Mortalità annuale degli agnelli e dei capretti (0-3 mesi di vita)

Elemento di verifica 37			
MORTALITÀ ANNUALE DEGLI ANIMALI ADULTI (OLTRE 12 MESI DI VITA)			
Animal-based measures			
Considerare il numero di animali (ovini o caprini) adulti (>12 mesi d'età) morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero totale di animali adulti presenti il giorno della visita.			
Se il numero di animali adulti mediamente presenti (al giorno in allevamento) subisce grosse fluttuazioni durante l'anno o se c'è un'elevata movimentazione di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento, è più opportuno usare al denominatore il numero di animali circolanti* negli ultimi 12 mesi.			
<i>*Per capi circolanti si intendono i soggetti con età superiore a 12 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento nell'ultimo anno.</i>			
Più del 5%			Insufficiente
Tra il 2% e 5%			Adeguito
Meno del 2%			Ottimale
37) Mortalità annuale degli animali adulti			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte			

Elemento di verifica 38			
MORTALITÀ ANNUALE DEGLI AGNELLI E DEI CAPRETTI (0-3 MESI DI VITA)			
Animal-based measures			
Considerare e stimare il numero di agnelli/capretti morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) e eutanassizzati tra il 2° e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di agnelli/capretti circolanti* negli ultimi 12 mesi (escludendo quindi gli animali nati morti o morti nelle prime 24 ore).			
<i>*Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 3 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).</i>			
Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti provenienti da altri allevamenti), il denominatore equivale al numero di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi.			

Più del 10%	Insufficiente		
Tra il 4% e 10%	Adeguito		
Meno del 4%	Ottimale		
38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (0-3 mesi di vita)			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte			

La mortalità è un parametro ABM indiretto in grado di valutare l'efficacia delle pratiche gestionali e delle prassi igienico-sanitarie attuate in allevamento. Gli animali morti in azienda sono infatti la conseguenza estrema, non solo di gravi problemi sanitari, ma anche di pessime condizioni di benessere animale e di gestione degli stati patologici.

Nel dettaglio, si propongono due elementi di verifica, uno relativo agli animali adulti (ovini o caprini) ovvero oltre 12 mesi d'età, l'altro relativo agli animali giovani, ovvero agli agnelli e ai capretti tra 0 e 3 mesi di vita.

In particolare, il requisito n.37 si calcola rapportando il numero di animali adulti (> 12 mesi d'età) morti per cause naturali, accidentali, a seguito di eutanasia o per macellazione speciale d'urgenza (MSU) negli ultimi 12 mesi, rispetto al numero di animali adulti (> 12 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione.

Da ricordare che se il numero di animali adulti mediamente presenti (al giorno in allevamento) subisce grosse fluttuazioni durante l'anno o se c'è un'elevata movimentazione di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento, è più opportuno utilizzare al denominatore il numero di *animali circolanti* negli ultimi 12 mesi (ovvero i soggetti di età superiore ai 12 mesi presenti almeno un giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi).

Per quanto riguarda il requisito n.38, invece, è necessario rapportare il numero di agnelli o di capretti morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) o sottoposti ad eutanasia tra il 2° e il 90° giorno della loro vita, rispetto al numero di agnelli o capretti *circolanti** in allevamento (escludendo, sia al numeratore sia al denominatore, gli animali nati morti o morti nelle prime 24 ore) nell'intervallo di tempo relativo agli ultimi 12 mesi rispetto alla data del controllo. Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti provenienti da altri allevamenti), il denominatore equivale al numero di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi.

**NB: Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 3 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (sempre escludendo i nati morti o morti nelle prime 24 ore di vita).*

Così calcolata, si considera accettabile una mortalità compresa tra:

- 2% e 5% per gli animali adulti (oltre 12 mesi d'età);
- 4% e 10% per gli animali giovani (fino a 3 mesi d'età).

In attesa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di identificazione e registrazione delle specie ovina e caprina, il dato della mortalità di agnelli e capretti può essere solo stimato sulla base delle dichiarazioni fornite dall'allevatore, unitamente all'analisi di altri fattori che caratterizzano l'allevamento (es. stagione dei parti, numerosità di animali adulti, ecc.). Nonostante le difficoltà nella stima di tale parametro, è importante procedere alla sua raccolta perché la mortalità rappresenta l'indicatore iceberg delle condizioni avverse di benessere animale e può aiutare ad evidenziare contesti particolarmente a rischio e bisognosi d'intervento.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN AUTOCONTROLLO SULLA BASE DEL RISCHIO IN CLASSYFARM: ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE NEGLI OVINI E CAPRINI

Il documento “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella Valutazione del rischio per il benessere animale negli ovini e nei caprini” potrà essere utilizzato per le diverse necessità operative e riporterà i seguenti risultati:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario;
- i punti critici riscontrati, (criterio con valutazione non conforme - insufficiente);
- il livello generale di rischio dell'allevamento espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “non-conformi – insufficienti”, “conformi – accettabili” e “conformi – ottimali (requisito superiore)” siglate dal valutatore;
- il livello di rischio relativo ad ogni area che sarà espresso in relazione al rapporto fra osservazioni non conformi, conformi, conformi al livello ottimale per il controllo ufficiale e “insufficienti, “adeguate” e “ottimali” per le ABMs, rilevate dal valutatore nell'ambito di ogni area (management, strutture, grandi rischi e ABMs);

I dati, la forma e la grafica del documento “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella Valutazione del rischio per il benessere animale negli ovini e caprini” saranno definiti di concerto con il Ministero della Salute e le Regioni.

GRIGLIE DI AIUTO ALLA COMPILAZIONE

Di seguito, si allegano le griglie che possono essere utilizzate per la raccolta delle misurazioni delle strutture di allevamento e delle animal-based measures (ABMs).

Le stesse griglie saranno disponibili per il download anche su www.classifyfarm.it, nella sezione “Veterinario Ufficiale”.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

ALLEVAMENTO _____

N° PECORE IN LATTAGIONE
N° PECORE IN ASCIUTTA
N° ARIETI

N° CAPI DA VALUTARE
N° CAPI DA VALUTARE
N° CAPI DA VALUTARE

N° CAPI	BCS	PULIZIA	LESIONI	ASCESSI	ZOPPIA
PECORE IN LATTAGIONE					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					

N° CAPI	BCS	PULIZIA	LESIONI	ASCESSI	ZOPPIA
PECORE IN ASCIUTTA					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
ARIETI					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
ISMONTA					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

ALLEVAMENTO _____

N° CAPRE IN LATTAGIONE
N° CAPRE IN ASCIUTTA
N° BECCHI

N° CAPI DA VALUTARE
N° CAPI DA VALUTARE
N° CAPI DA VALUTARE

N° CAPI	BCS	PULIZIA	LESIONI	ASCESSI	ASIMMETRIA MAMMELLA	ZOPPIA
CAPRE IN LATTAGIONE						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						

N° CAPI	BCS	PULIZIA	LESIONI	ASCESSI	ASIMMETRIA MAMMELLA	ZOPPIA
CAPRE IN ASCIUTTA						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

BECCHI						
1		/		/		
2		/		/		
3		/		/		
4		/		/		
5		/		/		
6		/		/		
7		/		/		
8		/		/		
9		/		/		
10		/		/		

RMONTA

N° CAPI DA VALUTARE

N° CAPI	ASCESSI
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

N° CAPI	ASCESSI
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Andersen I. L., Knut E. B. (2006) “Resting pattern and social interactions in goats - The impact of size and organization of lying space”. *Applied Animal Behaviour Science* 108:89-103.
- Angell J.W., Cripps P.J., Grove-White D.H., Duncan J.S. 2015. A practical tool for locomotion scoring in sheep: reliability when used by veterinary surgeons and sheep farmers. *Vet Rec* 176, 521–39.10.1136/vr.102882
- Anzuino K., Bell N. J., Bazeley K.J., Nicol C. J. (2010) “Assessment of welfare on 24 commercial UK dairy goat farms based on direct observations”. *Veterinary Record* 167:774-780.
- Aschwanden J, Gygax L., Wechsler B., Keil N. M (2009): Loose housing of small goat groups: Influence of visual cover and elevated levels on feeding, resting and agonistic behavior. *Applied Animal Behaviour Science* 119, 171–179
- Aschwanden J, Gygax L., Wechsler B., Keil N. M. (2008) “Social distances of goats at the feeding rack: Influence of the quality of social bonds, rank differences, grouping age and presence of horns”. *Applied Animal Behaviour Science* 114:116–131.
- Averós X., Lorea A., Beltrán de Heredia I., Arranz J., Ruiz R., Estevez I. 2014. Space availability in confined sheep during pregnancy, effects in movement patterns and use of space. *PLoS One* 9(4):e94767.do:10.1371/journal.pone.0094767
- Awin 2015a. Awin welfare assessment protocol for goats. Doi:10.13130/AWIN_GOATS_2015
- Awin, 2015b. Awin welfare assessment protocol for sheep. Doi: 10.13130/AWIN_SHEEP_2015
- Battini M., Vieira A., Barbieri S., Ajuda I., Stilwell G., Mattiello S. (2014) “Invited review: Animal- based indicators for on-farm welfare assessment for dairy goats”. *Journal of Dairy Science*, 97:6625-6648.
- Bendelja D., Antunac N., Mikulec N., Vnučec I., Mašek T., Mikulec Ž., Havranek J. 2009. Urea concentration in sheep’s milk. *Mljekarstvo*, 59 (1), 3-10
- Bergonier D., De Cremoux R., Rupp R., Lagriffoul G., Berthelot X. 2003. Mastitis of dairy small ruminants. *Vet Res*, 34, 689–716.
- Berthelot X., Lagriffoul G., Concordet D., Barillet F., Bergonier D. 2006. Physiological and pathological thresholds of somatic cell counts in ewe milk. *Small Ruminant Res*, 62:27-31.
- Bertocchi L., Fusi F., Angelucci A., Bolzoni L., Pongolini S., Strano RM., Ginestreti J., Riuzzi G., Moroni P., Lorenzi V. 2018 Characterization of hazards, welfare promoters and animal-based measures for the welfare assessment of dairy cows: Elicitation of expert opinion. *Preventive Veterinary Medicine* *Vet Med* 150:8-18. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29406088>
- Binns S.H., Cox I.J., Rizvi S., Green L.E. 2002. Risk factors for lamb mortality on UK sheep farms. *Preventive Veterinary Medicine* 52, 287–303

- Biosecure – Koorimp, 2013. Animalia
- Blagitz MG., Souza FN., Batista CF., Diniz SA., Haddad JPA., Benites NR., et al. 2014. Clinical findings related to intramammary infections in meat-producing ewes. *Trop Anim Health Prod* 46, 127–32.10.1007/s11250-013-0462-8
- Bøe E. K., Andersen I. L., Buisson L., Simensen E., Jeksrud W. K. (2007) “Flooring preferences in dairy goats at moderate and low ambient temperature”. *Applied Animal Behaviour Science* 108:45-57.
- Bøe K. 1990. Thermoregulatory behaviour of sheep housed in insulated and uninsulated buildings. *Applied Animal Behaviour Science*, 27, 243–253.
- Bøe K.E and Andersen I.L. 2010. Competition, activity budget and feed intake of ewes when reducing the feeding space. *Applied Animal Behaviour Science*, 125,109-114. Boivin X., Lensink J., Tallet C., Veissier I. 2003. Stockmanship and farm animal welfare. *Animal Welfare*, 12, 479-492
- Botreau R., Veissier I., Perny P. 2009. Overall assessment of animal welfare: strategy adopted in Welfare Quality. *Animal Welfare* 18, 363-370. <https://www.researchgate.net/publication/233561191>
- Bracke M.B.M., Edwards S.A., Engel B., Buist W.G., Algers B. 2008. Expert opinionas ‘validation’ of risk assessment applied to calf welfare. *Acta Veterinaria Scandinavica* 50, 29–40.
- Brambell F.W.R., 1965. Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems. Command Report 2836, HMSO, London.
- Cannas, A. (2004). Feeding of lactating ewes. *Dairy sheep nutrition*, 79-108.
- Capdeville J., and Veissier I. 2001. A method of assessing welfare in loose housed dairy cows at farm level, focusing on animal observations. *Acta Agriculturae Scandinavica Section A – Animal Science* 51, 62–68.
- Caroprese M. 2008. Housing and Welfare. *Small ruminant researches* 76(1), 21-25
- Caroprese M., Annicchiarico G., Schena L., Muscio A., Migliore R., Sevi A. 2009. Influence of space allowance and housing conditions on the welfare, immune response and production performance of dairy ewes. *J Dairy Res* 76, 66–73.10.1017/S0022029908003683.
- CE draft 8/09. Bozza normativa in discussione a Strasburgo per la definizione di una normativa sul benessere dei bovini: “Standing committee of the European convention for the protection of animal kept for farming purposes” – draft revised recommendations concerning cattle” revisione 8 del 22 – 24 Settembre 2009.

- Cockram M.S., Imlah P., Goddard P.J., Harkiss G.D., Waran NK. 1993. The behavioural, endocrine and leucocyte response of ewes to repeated removal of lambs before the age of natural weaning. *Appl Anim Behav Sci* 38, 127–42.10.1016/0168-1591(93)90061-S
- Decreto Legislativo n. 134 del 5 agosto 2022, “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.”
- Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022, “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.”
- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006, “Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.
- Decreto Legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 127.
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2001.
- Dwyer CM. 2004. Chronic stress in sheep: assessment tools and their use in different management conditions. 76, 31-41. *Animal Welfare* 13, 293-304
- Dwyer CM. 2008. The Welfare of the Neonatal Lamb. *Small Ruminant Research* 76, 31-41.
- EFSA, 2012a. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW); Guidance on risk assessment for animal welfare. *The EFSA Journal* 10(1):2513.
- EFSA, 2012b. Statement on the use of animal-based measures to assess the welfare of animals. *EFSA Journal* 10(6):2767. <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/2767>
- EFSA, 2014. Scientific opinion on the welfare risks related to the farming of sheep for wool, meat and milk production. *EFSA Journal* 12(12):3933. <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/3933>
- Faerevik G., Andersen I.L., Bøe K.E. 2005. Preferences of sheep for different types of pen flooring. *Appl Anim Behav Sci* 90, 265–76.10.1016/j.applanim.2004.08.010

- Farm Animal Welfare Council (FAWC), 1979. Farm Animal Welfare Council Press Statement. <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http://www.fawc.org.uk/pdf/fivefreedom1979.pdf>
- FAWC (Farm Animal Welfare Council). 2009. Report on farm animal welfare in Great Britain: past, present and future. FAWC, London.
- Feinstein A.R., and Cicchetti D.V. 1990 High agreement but low Kappa: I. the problems of two paradoxes. *Journal of Clinical Epidemiology* 43 (6), 543-549. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2348207>.
- Fisher, M.W. & Gregory, N.G.. (2007). Reconciling the differences between the length at which lambs' tails are commonly docked and animal welfare recommendations. *Proc. NZ Soc. Anim. Prod.* 67. 32-38.
- Fragkou I., Boscus CM., Fthenakis GC. 2014. Diagnosis of clinical or subclinical mastitis in ewes. *Small Rumin Res* 118, 86–92.10.1016/j.smallrumres.2013.12.015
- French N.P., Morgan K.L. (1992). Neuromata in docked lambs' tails. *Res. Vet. Sci.* 52, 389–390.
- Goddard P.J. 2011. Welfare assessment in sheep. *Farm Animal Practice* 33, 508-5016
- Harwood David (2006) “Goat health and welfare - A veterinary guide”, Editore: Richard Wood.
- Llonch, P.; King, E.M.; Clarke, K.A.; Downes, J.M.; Green, L.E. A systematic review of animal based indicators of sheep welfare on farm, at market and during transport, and qualitative appraisal of their validity and feasibility for use in UK abattoirs. *Vet. J.* 2015, 206, 289–297.
- Meisfjord Jorgensen G.H., Andersen I.L., Boe K.E. (2007) “Feed intake and social interaction in dairy goats—the effects of feeding space and type of roughage”. *Applied Animal Behaviour Science*. 2007; 107:239–251.
- Miranda-de la Lama G.C., Mattiello S. (2010) “The importance of social behaviour for goat welfare in livestock farming”. *Small Ruminant Research*, 90:1-10.
- Molle G., Decandia M., Cabiddu A., Landau SY., Cannas A., 2008. An update on the nutrition of dairy sheep grazing Mediterranean pastures. *Small Ruminant Research* 77, 93–112
- Morgan-Davies C., Waterhouse A., Pollock ML., Milner JM. 2008. Body condition score as an indicator of ewe survival under extensive conditions. *Animal Welfare* 17, 71–7.
- Mullan S., Edwards S.A., Butterworth A., Whay H.R., and Main D.C.J., 2009. Interdependence of welfare outcome measures and potential confounding factors on finishing pig farms. *Applied Animal Behaviour Science* 121, 25–31
- Munoz C., Campbell A., Hemsworth P., Doyle R. 2017. Animal based measures to assess the welfare of extensively managed ewes. *Animal* 8(1), 2

- Muri K, Stubbsjøen S.M. and Valle P.S. (2013) “Development and testing of an on-farm welfare assessment protocol for dairy goats”. *Animal Welfare* 22:385-400.
- Muri K., Leine N. and Valle P.S. (2015) “Welfare effects of a disease eradication programme for dairy goats”. *Animal* pag. 1-9.
- Muri K., Tufte P.A., Skjerve E., Valle P.S (2012) “Human-animal relationships in the Norwegian dairy goat industry: attitudes and empathy towards goats (Part I)”. *Animal welfare*, 21:535- 545.
- Nagel-Alne G. E., Asheim L. F., Hardaker J. B., Sølverøde L., Lindheim D., Vallé P. S., (2014) “The Norwegian Healthier Goats programme – A financial cost–benefit analysis”. *Preventive Veterinary Medicine* 114 (2):96-105.
- Napolitano F., De Rosa G., Ferrante V., Grasso F., Braghieri A. 2009a. Monitoring the welfare of sheep in organic and conventional farms using an ANI 35 L derived method. *Small Rumin Res* 83, 49–57. doi:10.1016/j.smallrumres.2009.04.001
- Napolitano F., De Rosa G., Girolami A., Scavone M., Braghieri A. 2011. Avoidance distance in sheep: test-retest reliability and relationship with stockmen attitude. *Small Ruminant Researches* 99, 81– 86. doi:10.1016/j.smallrumres.2011.03.044
- Napolitano F., De Rosa G., Sevi A. 2008. Welfare implications of artificial rearing and earlyweaning in sheep. *Applied Animal Behaviour Science* 110, 58–72
- National farm biosecurity manual, grazing livestock production, 2018. Animal Health Australia
- Nicolussi P., Cannas A. (2005) Linee Guida “Il benessere nella mungitura degli ovini da latte”. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
- OIE (World Organisation for Animal Health), 2014. “Animal welfare and beef cattle production systems”, in: “Terrestrial Animal Health Code”, Versione 7 del 07/07/2014, Capitolo 7.9.
- Peli A., Roccaro M., Martelli G., Nannoni E., Scagliarini A., Grandis A. 2017 Effects of Tail Docking in sheep on histological features of the muscles of the pelvic diaphragm – the 11th international veterinary behaviour meeting, Samorin, Slovakia.
- Phythian C., Cripps P.J., Michalopoulou E., Jones P.H., Grove-White D., Clarkson M.J., et al. 2012. Reliability of indicators of sheep welfare assessed by a group observation method. *Vet J* 193, 257–263
- Phythian C.J., Michalopoulou E., Jones P.H., Winter A.C., Clarkson M.J., Stubbings L.A., et al. 2011. Validating indicators of sheep welfare through a consensus of expert opinion. *Animal* 5:6, 943–52
- Phythian C.J., Michalopoulou E., Duncana J., Wemelsfelder F. 2013. Inter-observer reliability of Qualitative Behavioural Assessment of sheep. *Applied Animal Behaviour Science* 144, 73-79

- R Development Core Team 2015 R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
- Richmond SE., Wemelsfelder F., de Heredia IB., Ruiz R., Canali E., Dwyer CM. 2017. Evaluation of Animal-Based Indicators to Be Used in a Welfare Assessment Protocol for Sheep. *Front Vet Sci* 11, 4-210. doi: 10.3389/fvets.2017.00210. eCollection 2017.
- Roger P.A. 2008. The impact of disease and disease prevention in animal welfare. *Small Ruminant researches* 76, 104-111
- Rosati R., Militello G., Boselli C., Giangolini G., Amatiste S., Brajon G., Gazzoni S., Casini M., Scatassa M., Bono P., Cannas A., Mugoni G., Simula M., Denti G., Gradassi S., Fagiolo A. 2005. Cellule somatiche nel latte ovino e caprino: definizione del valore medio nazionale e del valore fisiologico. *Scienza e tecnica lattiero casearia*, 56(3), 000-000
- Russel, J. F., Doney M. and Gunn, R. 1969 "Subjective assessment of body fat in live sheep" *Journal of Agricultural Science*, 72, 451-454. <http://dx.doi.org/10.1017/S0021859600024874>
- Schreiner, DA & Ruegg, Pamela. (2002). Effects of Tail Docking on Milk Quality and Cow Cleanliness. *Journal of Dairy Science*. 85. 2503-11. 10.3168/jds.S0022-0302(02)74333-6.
- Shreiner D. A. and Ruegg P. L. (2003) "Relationship Between Udder and Leg Hygiene Scores and Subclinical Mastitis". *J. Dairy Sci.* 86:3460–3465.
- Sørensen J.T., Fraser D. 2010. On-farm welfare assessment for regulatory purposes: issues and possible solutions. *Livestock Science* 131, 1–7
- Stubbs S.M., Hektoen L., Valle P.S., Janczak A.M and Zanella A.J. 2011. Assessment of sheep welfare using on-farm registrations and performance. *Animal Welfare*, 20, 239-251.
- Toussaint, G. (1997) "The housing of milk goats". *Livestock production Science* 49:151-164.
- Villaquiran M., Gipson T.A., Merkel R.C., Goetsch A.L., Sahlu (2004) "Body Condition Scores in Goats". America Institute for Goat Research "E (Kika) de la Garza"- www2.luresext.edu.
- Welfare Quality®, 2009a. Welfare Quality® assessment protocol for cattle. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
- Welfare Quality®, 2009b. Assessment of animals' welfare measures for dairy cattle, beef bulls and veal calves. Welfare Quality® Report n.11.
- Wemelsfelder F., and Lawrence A.B. 2001. Qualitative assessment of animal behaviour as an on-farm welfare-monitoring tool. *Acta Agriculturae Scandinavica Section A – Animal Science* 51, 21–25.