

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



TESI IN MATEMATICA:

"I SISTEMI DI LOGICA MODALE T, S4, S5:
SINTASSI E SEMANTICA"

Relatore:
Ch.mo Prof.
ULDERICO DARDANO

Candidato:
FRANCESCO MAGLIOCCA
N87/1032

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Calcolo Proposizionale

Introduciamo un sistema formale per il Calcolo Proposizionale che chiameremo *CP*.

Calcolo Proporzionale: L'alfabeto

Sia A insieme numerabile disgiunto da $\{\neg, \vee, (,)\}$ e contenente almeno tre elementi che indicheremo con p, q, r .

Chiamiamo l'insieme $\Sigma = A \cup \{\neg, \vee, (,)\}$ *alfabeto* e gli elementi di A *variabili proposizionali*.

Calcolo Proporzionale: Il linguaggio

L'insieme delle formule ben formate (fbf) L_{CP} è il più piccolo sottoinsieme di $\Sigma^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma^n$ tale che:

- ▶ $x \in A \Rightarrow x \in L_{CP}$;
- ▶ $\alpha \in L_{CP} \Rightarrow \neg(\alpha) \in L_{CP}$;
- ▶ $\alpha \in L_{CP}$ e $\beta \in L_{CP} \Rightarrow (\alpha) \vee (\beta) \in L_{CP}$.

Calcolo proposizionale: Connettivi aggiuntivi

Se $\alpha \in L_{CP}$ e $\beta \in L_{CP}$, allora diamo le seguenti definizioni:

- ▶ $(\alpha) \wedge (\beta) := \neg(\neg(\alpha) \vee \neg(\beta));$
- ▶ $(\alpha) \rightarrow (\beta) := (\neg(\alpha)) \vee (\beta);$
- ▶ $(\alpha) \leftrightarrow (\beta) := ((\alpha) \rightarrow (\beta)) \wedge ((\beta) \rightarrow (\alpha)).$

Calcolo Proporzionale: Gli assiomi

- ▶ HPD: $p \rightarrow (q \rightarrow p)$
- ▶ HPMP: $(r \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (r \rightarrow p) \rightarrow (r \rightarrow q)$
- ▶ \vee -I1: $p \rightarrow (p \vee q)$
- ▶ \vee -I2: $q \rightarrow (p \vee q)$
- ▶ \vee -E: $(p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r)$
- ▶ \wedge -I: $p \rightarrow q \rightarrow p \wedge q$
- ▶ \wedge -E1: $p \wedge q \rightarrow p$
- ▶ \wedge -E2: $p \wedge q \rightarrow q$
- ▶ \neg -I: $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p$
- ▶ TER: $p \vee \neg p$

Calcolo Proporzionale: Le regole di deduzione

1. Modus Ponens:

$$\frac{\alpha \rightarrow \beta \quad \alpha}{\beta}$$

2. Regola di sostituzione:

Se $\alpha \in L_{CP}$, $x \in A$ e $\beta \in L_{CP}$, allora la formula $\alpha[x/\beta]$ ottenuta sostituendo uniformemente β al posto di x all'interno di α è una conseguenza di α .

Calcolo Proporzionale: Dimostrazioni

Una dimostrazione è una sequenza finita D di fbf tale che ogni termine D_i della sequenza soddisfa una delle seguenti condizioni

- ▶ D_i è un assioma;
- ▶ esistono D_h, D_k , con $h < i, k < i$, tali che D_i è derivato per *Modus Ponens* da D_h e D_k .
- ▶ esiste D_h , con $h < i$, tale che D_i è derivato tramite la regola di *sostituzione* a partire da D_h .

Se $\alpha \in L_{CP}$ ed esiste una dimostrazione D il cui ultimo termine è α , diciamo che α è un *teorema* e scriviamo $\vdash \alpha$.

Calcolo Proporzionale: Semantica

Chiamiamo *interpretazione* una funzione $I : A \rightarrow \{0, 1\} \subset \mathbb{N}$. Data un'interpretazione I definiamo la funzione $V_I : L_{CP} \rightarrow \{0, 1\} \subset \mathbb{N}$ come segue:

- ▶ $V_I(x) = I(x), \forall x \in A$
- ▶ $V_I((\alpha) \vee (\beta)) = \max\{V_I(\alpha), V_I(\beta)\}$
- ▶ $V_I(\neg(\alpha)) = 1 - V_I(\alpha)$

Tutti i connettivi presenti in CP sono interpretati come operatori vero-funzionali.

Sia $\alpha \in L_{CP}$, diciamo che α è *valida* e scriviamo $\models \alpha$ se $V_I(\alpha) = 1$, per ogni interpretazione I .

Calcolo Proposizionale: Semantica

Logica Modale

Estendiamo il sistema CP in modo da introdurre due nuovi connettivi, \Box e \Diamond corrispondenti alle nozioni di *necessità* e *possibilità*.

Logica Modale: Sulla vero-funzionalità di \Box e \Diamond

\Box e \Diamond non possono essere operatori vero-funzionali.

Infatti non basta sapere che “Vincenzo è ricco” è vera per potersi esprimere sul valore di verità da associare alla proposizione “È necessario che Vincenzo sia ricco”.

Logica Modale: Sulla vero-funzionalità di \Box e \Diamond

È noto che qualsiasi operatore vero-funzionale sia definibile in termini di negazione e disgiunzione. Quindi se \Box e \Diamond fossero stati interpretabili come operatori vero-funzionali, avremmo potuto semplicemente aggiungerli come connettivi derivati in *CP* senza bisogno di fare altro.

Logica Modale: I Sistemi

Non c'è un unico sistema per la logica modale, anzi ce ne sono molti. Ne presentiamo tre:

1. Sistema T
2. Sistema S4
3. Sistema S5

Sistema T: L'alfabeto

Estendiamo l'alfabeto di CP aggiungendo il simbolo \Box , quindi chiamiamo l'insieme $\Sigma_1 = A \cup \{\neg, \vee, \Box, (,)\}$ alfabeto

Sistema T: Il linguaggio

L'insieme delle formule ben formate (fbf) L è il più piccolo sottoinsieme di $\Sigma_1^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_1^n$ tale che:

- ▶ $x \in A \Rightarrow x \in L$;
- ▶ $\alpha \in L \Rightarrow \neg(\alpha) \in L$;
- ▶ $\alpha \in L$ e $\beta \in L \Rightarrow (\alpha) \vee (\beta) \in L$;
- ▶ $\alpha \in L \Rightarrow \Box(\alpha) \in L$.

Sistema T: Connettivi aggiuntivi

Se $\alpha \in L$, allora diamo la seguente definizione:

$$\Diamond(\alpha) := \neg(\Box(\neg(\alpha)))$$

Sistema T: Regole di deduzione

1. Modus Ponens:

$$\frac{\alpha \rightarrow \beta \quad \alpha}{\beta}$$

2. Regola di sostituzione:

Se $\alpha \in L$, $x \in A$ e $\beta \in L$, allora la formula $\alpha[x/\beta]$ ottenuta sostituendo uniformemente β al posto di x all'interno di α è una conseguenza di α .

3. Regola di necessitazione:

$$\frac{\alpha}{\Box \alpha}$$

Sistema T: Assiomi

Gli assiomi del Sistema T sono tutti gli assiomi di CP più i seguenti:

- ▶ T: $\Box p \rightarrow p$
- ▶ K: $\Box(p \rightarrow q) \rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q)$

Sistema S4

Il Sistema S4 è ottenuto aggiungendo al Sistema T l'assioma S4:

$$\Box p \rightarrow \Box \Box p$$

Sistema S5

Il Sistema S5 è ottenuto aggiungendo al Sistema T l'assioma S5:

$$\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$$

Logica Modale: Dimostrazioni

Una dimostrazione in un sistema S ($\in \{T, S4, S5\}$) è una sequenza finita D di fbf tale che ogni termine D_i della sequenza soddisfa una delle seguenti condizioni

- ▶ D_i è un assioma di S ;
- ▶ esistono D_h, D_k , con $h < i, k < i$, tali che D_i è derivato per *Modus Ponens* da D_h e D_k .
- ▶ esiste D_h , con $h < i$, tale che D_i è derivato tramite la regola di *sostituzione* a partire da D_h .
- ▶ esiste D_h , con $h < i$, tale che D_i è derivato tramite la regola di *necessitazione* a partire da D_h .

Se $\alpha \in L$ ed esiste una dimostrazione D in un sistema S il cui ultimo termine è α , diciamo che α è un *teorema* e scriviamo $\vdash_S \alpha$.

Relazioni tra i sistemi T, S4, S5

Definizione

Diciamo che un sistema formale è meno forte di un altro se tutti i teoremi del primo sono teoremi anche del secondo.

Nota

È ovvio che CP è meno forte del Sistema T , che è meno forte sia del sistema $S4$ che del sistema $S5$.

Teorema

$\vdash_{S5} \Box p \rightarrow \Box \Box p$, ovvero il Sistema $S4$ è meno forte del Sistema $S5$.

Logica Modale: Semantica

Un modello di Kripke è una terna (W, R, I) costituita da:

- ▶ W insieme non vuoto i cui elementi sono detti *mondi*;
- ▶ R relazione binaria su W detta *relazione di accessibilità*;
- ▶ $I : A \times W \rightarrow \{0, 1\} \subset \mathbb{N}$ detta *interpretazione*.

Logica Modale: Semantica II

Dato un modello di Kripke $K = (W, R, I)$ definiamo la funzione $V_K : L \times W \rightarrow \{0, 1\}$ come segue. Fissato $w \in W$:

- ▶ $V(x, w) = I(x, w), \forall x \in A$
- ▶ $V(\neg(\alpha), w) = 1 - V(\alpha, w)$
- ▶ $V((\alpha) \vee (\beta), w) = \max\{V(\alpha, w), V(\beta, w)\}$
- ▶ $V(\Box(\alpha), w) = \min\{V(\alpha, w') : w' \in W \text{ e } wRw'\}$

Sistema T: Semantica

Chiamiamo T-modello un modello di Kripke in cui la relazione di *accessibilità* sia **riflessiva**.

Se $\alpha \in L$, diciamo che α è T-valida e scriviamo $\models_T \alpha$ se per ogni T-modello $K = (W, R, I)$ si ha $\forall w \in W. V_K(\alpha, w) = 1$.

Sistema S4: Semantica

Chiamiamo S4-modello un modello di Kripke in cui la relazione di *accessibilità* sia **riflessiva** e **transitiva**.

Se $\alpha \in L$, diciamo che α è S4-valida e scriviamo $\models_{S4} \alpha$ se per ogni S4-modello $K = (W, R, I)$ si ha $\forall w \in W. V_K(\alpha, w) = 1$.

Sistema S5: Semantica

Chiamiamo S5-modello un modello di Kripke in cui la relazione di *accessibilità* sia la relazione binaria totale su W .

Se $\alpha \in L$, diciamo che α è S5-valida e scriviamo $\models_{S5} \alpha$ se per ogni S5-modello $K = (W, R, I)$ si ha $\forall w \in W. V_K(\alpha, w) = 1$.

T, S4, S5: Teorema di adeguatezza

Per tutti e tre i sistemi vale il teorema di adeguatezza che afferma:

Per ogni formula $\alpha \in L$:

$$\vdash \alpha \Rightarrow \models \alpha$$

Collasso nel calcolo proposizionale

In nessun sistema è dimostrabile la formula $p \rightarrow \Box p$
quindi non è un teorema la formula $p \leftrightarrow \Box p$ in nessun sistema.

Collasso nel calcolo proposizionale

Basta costruire un $S5$ -modello come segue:

- ▶ $W = \{w_1, w_2\}$;
- ▶ $R = W \times W$;
- ▶ $I(x, w_1) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = p \text{ e } w = w_1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Sistema T: Procedura di decisione

Data $\alpha \in L$, cerchiamo un T-modello che falsifichi α , ovvero un T-modello K in cui esista un mondo w tale che:

$$V_K(\alpha, w) = 0$$

.

Rappresentiamo graficamente questo procedimento con dei diagrammi detti T-diagrammi

Sistema T: Procedura di decisione

$$w_1 \quad \boxed{\Diamond(p \wedge \Diamond q) \xrightarrow[0]{} (\Box \Diamond p \rightarrow \Diamond \Box q)}$$


Sistema T: Procedura di decisione

$$w_1 \frac{\Diamond_1(p \wedge \Diamond q)}{*} \xrightarrow{0} \left(\frac{\Box_1^* \Diamond p}{1} \xrightarrow{0} \frac{\Box q}{\Diamond^*} \right)$$


Sistema T: Procedura di decisione

$$w_1 \quad \underset{*}{\underset{1}{\diamond}}(p \wedge \underset{*}{\underset{1}{\diamond}}q) \xrightarrow{0} (\overset{*}{\underset{1}{\square}} \underset{*}{\underset{1}{\diamond}}p \xrightarrow{0} \overset{*}{\underset{0}{\diamond}} \overset{*}{\underset{0}{\square}}q)$$

Sistema T: Procedura di decisione



Sistema T: Procedura di decisione



Sistema T: Procedura di decisione II

$$w_1 \quad \boxed{\Box p \stackrel{0}{\leftrightarrow} \neg \Diamond \neg p}$$

Sistema T: Procedura di decisione II

w_1	$\boxed{\square p \leftrightarrow \neg \diamond \neg p}$ $\begin{array}{c} 0 \\ \vdash \end{array}$
-------	---

Diagram illustrating the reduction of a formula $w_1(1)$ to a formula w_2 .

The formula $w_1(1)$ is represented as a boxed structure containing a table of truth values for the formula $p \leftrightarrow \neg \Diamond \neg p$:

\Box	p	\leftrightarrow	\neg	\Diamond	$\neg p$
$\frac{*}{1}$	$\frac{p}{1}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{*}{*}$

An arrow points from $w_1(1)$ to w_2 , which is represented as a boxed structure containing a table of truth values for the formula $\neg p$:

$\neg p$	p
$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{0}$

The formula w_2 is shown to the right of the table.

Diagram illustrating the reduction of a 3-SAT formula to a 2-SAT formula:

The top box represents the 3-SAT formula $w_1(2)$ with clauses:

- $p \leftrightarrow q$
- $p \vee r$
- $\neg p \vee \neg q$

The bottom box represents the 2-SAT formula w_3 with clauses:

- $p \vee \neg p$
- $\neg p \vee q$

An arrow points from the top box to the bottom box, indicating the reduction.

Sistema T: Procedura di decisione III

Data una formula $\alpha \in L$, una volta seguita tutta la procedura diciamo che abbiamo ottenuto un sistema completo di T-diagrammi per α .

Sistema T: Teorema di completezza

Se $\alpha \in L$, si può sfruttare la procedura di decisione definita per dimostrare che ogni formula T-valida è anche un teorema di T. Quindi, ricordando anche il Teorema di Adeguatezza otteniamo:

$$\vdash_T \alpha \Leftrightarrow \models_T \alpha$$

Conclusioni

Le semantiche di Kripke si sono rivelate uno strumento molto utile per analizzare le differenze tra i vari sistemi di logica modale introdotti.

Lo studio effettuato ci porta a considerare questi sistemi non tanto come antagonisti tra di loro, ma piuttosto come rappresentazioni di sfumature diverse dei concetti di *necessità* e *possibilità*.

Grazie per l'attenzione.