

Resultados

Teste t para amostras independentes

Teste t para amostras independentes

		Estatística	gl	p
p95_ms	t de Student	-0.227 ^a	18.0	.823
	t de Welch	-0.227	9.00	.825
	U de Mann-Whitney	10.0		.002

Nota. H_a $\mu_{Qdrant} \neq \mu_{pgvector}$

^a O teste de Levene é significativo (p < 0.05), sugerindo a violação do pressuposto da homogeneidade de variâncias

Pressupostos

Teste à Normalidade (Shapiro-Wilk)

	W	p
p95_ms	0.411	<.001

Nota. Um p-value pequeno sugere a violação do pressuposto da normalidade

Teste à Homogeneidade de Variâncias (Levene)

	F	gl	gl2	p
p95_ms	5.00	1	18	.038

Nota. Um p-value pequeno sugere a violação do pressuposto da homogeneidade de variâncias

[3]

Teste t para amostras independentes

Teste t para amostras independentes

	Estatística	gl	p

Teste t para amostras independentes

Teste t para amostras independentes		
Estatística	gl	p

Referências

[1] The jamovi project (2025). *jamovi*. (Version 2.7) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2025). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.5) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2025-05-25).

[3] Fox, J., & Weisberg, S. (2024). *car: Companion to Applied Regression*. [R package]. Retrieved from <https://cran.r-project.org/package=car>.