

Estrategias para la modelización y pronóstico de series temporales interrumpidas: evaluación comparada con aplicación al transporte urbano de Rosario

Tesina de grado



Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística

Alumno: Santini Franco Andres
Directora: Mag. Méndez Fernanda
Carrera: Licenciatura en Estadística

Tabla de contenidos

0.0.1	Pagina de Agradecimientos	1
0.0.2	Resumen	2
1.	Introducción	3
2.	Objetivos	4
2.1	Objetivo general	4
2.2	Objetivos específicos	4
3.	Metodología	5
3.1	Conceptos básicos de series de tiempo	5
3.1.1	Autocorrelación	6
3.1.2	Pronósticos	7
3.1.3	Limitaciones en la modelización de series temporales	8
3.2	ARIMA/SARIMA	8
3.3	Modelos altamente adaptativos (ETS)	10
3.4	Modelos de intervención	13
3.5	Métodos contrafactuales	14
3.5.1	Establecer como faltante (<i>set to missing</i>)	14
3.5.2	Lo que podría haber ocurrido (<i>what might have been</i>)	15
3.6	Métodos de combinación (<i>ensemble</i>)	15
3.7	Métricas de evaluación	17
3.7.1	Raíz del error cuadrático medio (RMSE)	17
3.7.2	Error absoluto medio (MAE)	17
3.7.3	Error porcentual absoluto medio (MAPE)	17
3.7.4	Puntuación de Winkler (<i>Winkler Score</i>)	18
3.7.5	Evaluación diferenciada por régimen temporal	18
4.	Aplicación	19
4.1	Análisis descriptivo	19
4.2	Ajuste de modelos	25
4.2.1	ARIMA/SARIMA	25
4.2.2	ETS	27
4.2.3	Modelos de intervención	29
4.2.4	Métodos contrafactuales	31
4.2.5	Ensemble	33
4.3	Resultados	34
5.	Conclusión	37

0.0.1 Pagina de Agradecimientos

0.0.2 Resumen

1. Introducción

El análisis y pronóstico de series temporales constituyen herramientas fundamentales en diversas áreas aplicadas -como economía, salud, movilidad, transporte, energía, educación y políticas públicas- debido a su capacidad para describir la evolución de los fenómenos y anticipar escenarios futuros. Sin embargo, los métodos tradicionales suelen basarse en la suposición de estabilidad de los patrones históricos y de continuidad estructural. Este supuesto puede resultar problemático cuando las series se ven afectadas por eventos disruptivos que alteran la regularidad de su comportamiento.

Los *shocks* exógenos, tales como pandemias, reformas regulatorias o cambios en los comportamientos sociales, interrupciones en infraestructuras o eventos extraordinarios generan alteraciones significativas en las series temporales. En muchos casos, estos eventos se manifiestan a través de quiebres de nivel, cambios en la tendencia y la estacionalidad, observaciones atípicas extremas y procesos de recuperación no lineales. La irrupción simultánea de alguno de estos fenómenos desafía los supuestos y la capacidad de adaptación de la mayoría de los modelos clásicos, dificultando la obtención de pronósticos precisos, especialmente cuando se busca comprender el comportamiento inmediato posterior a la disrupción y la trayectoria de recuperación.

Un caso particularmente relevante, tanto en Argentina como a nivel mundial, es la pandemia de COVID-19. Durante el año 2020, esta produjo una alteración abrupta en las series de movilidad y transporte urbano: el volumen de pasajeros transportados cayó a mínimos históricos debido a las restricciones de circulación, seguido de una recuperación lenta y heterogénea a medida que las restricciones se fueron flexibilizando. Estas características convierten a las series de transporte y movilidad en un contexto adecuado para el análisis de metodologías robustas para el tratamiento de series temporalmente interrumpidas.

Recientemente, Hyndman y Rostami-Tabar (2024) han sistematizado diversas estrategias para el tratamiento y pronóstico de series interrumpidas, incluyendo modelos altamente adaptativos, modelos de intervención, métodos contrafactuales y combinaciones (*ensembles*), planteando un marco conceptual que resulta particularmente relevante para series afectadas por *shocks* como los observados en el transporte urbano durante la pandemia.

En este contexto, la presente tesina propone evaluar y comparar metodologías modernas de pronóstico para series interrumpidas, aplicándolas específicamente a la serie mensual de pasajeros del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) de la ciudad de Rosario, con el objetivo de analizar el desempeño de las distintas estrategias durante el período disruptivo y en la etapa posterior.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Evaluar, de manera comparativa, distintas metodologías de pronóstico aplicables a series temporales univariadas interrumpidas, mediante su aplicación a la serie de pasajeros del transporte urbano de Rosario, con el fin de analizar su desempeño predictivo en distintos momentos del ciclo disruptivo.

2.2 Objetivos específicos

- Realizar un análisis descriptivo detallado de la serie, identificando el período de interrupción y sus efectos sobre la tendencia y estacionalidad.
- Ajustar modelos ARIMA y SARIMA como línea de base, evaluando su estabilidad en presencia de eventos disruptivos.
- Implementar modelos altamente adaptativos (ETS) y analizar su capacidad de ajuste durante la disrupción.
- Ajustar modelos de intervención (regresión con errores ARIMA), incorporando variables explicativas que representen el evento disruptivo.
- Implementar modelos contrafactuales:
 - Marcando el período disruptivo como faltante (*“set to missing”*).
 - Reconstrucción del período mediante estimaciones de lo que podría haber sido (*“what might have been”*).
- Explorar combinaciones de modelos (*ensembles*) y evaluar si mejoran el desempeño.
- Comparar todas las estrategias mediante métricas puntuales y probabilísticas (RMSE, MAE, MAPE y *Winkler Score*).
- Elaborar recomendaciones metodológicas para el uso de estas estrategias en series temporales afectadas por interrupciones similares.

3. Metodología

En esta sección se presentan diversas estrategias para manejar interrupciones en el pronóstico de series temporales. El tratamiento de interrupciones en series de tiempo constituye un problema complejo y multifacético, y la elección de la estrategia más adecuada depende de las características específicas de los datos y de la naturaleza de la interrupción. Por ello, en la presente tesina se proponen múltiples estrategias en lugar de un único enfoque, con el fin de abordar de manera efectiva distintas situaciones y casos.

3.1 Conceptos básicos de series de tiempo

Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones ordenadas de una variable objetivo a lo largo del tiempo en intervalos regulares (cada día, cada mes, cada año, etc.). La naturaleza intrínseca de las series temporales es que sus observaciones son dependientes o correlacionadas, y por lo tanto, el orden de las observaciones es importante. Por esta razón, ciertos procedimientos o técnicas que se basan en el supuesto de independencia no son aplicables y se necesitan de diferentes métodos.

Formalmente, un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias y_t donde el índice t toma valores en un cierto conjunto C . En nuestro caso, este conjunto es ordenado y corresponde a los instantes temporales (días, meses, años, etc.). Para cada valor t del conjunto C , es decir, para cada instante temporal, está definida una variable aleatoria y_t , y los valores observados de las variables aleatorias en distintos instantes forman una serie temporal. Por lo tanto, una serie de tiempo de T datos, $(y_1, y_2, \dots, y_T)$, es una muestra de tamaño uno del vector de T variables aleatorias ordenadas en el tiempo correspondientes a los momentos $t = 1, \dots, T$, y la serie observada se considera una realización del proceso estocástico.

En el análisis de series temporales resulta esencial identificar los patrones que influyen en su comportamiento a lo largo del tiempo, ya que estos permiten comprender la dinámica de los datos y facilitan su adecuada modelización. Entre los principales componentes que pueden observarse en una serie temporal se destacan la tendencia, la estacionalidad, el componente cíclico y el componente aleatorio, los cuales se describen a continuación.

- **Tendencia:** esta componente refleja un crecimiento o decrecimiento en la serie a través del tiempo, no tiene que ser necesariamente lineal. A veces se refiere a la tendencia como un cambio de dirección, cuando se pasa de una tendencia creciente a una decreciente.
- **Estacionalidad:** es el comportamiento repetitivo de la serie en un período corto y conocido, esta componente está afectada por factores estacionales tales como el momento del año o el día de la semana entre otros.
- **Ciclo:** corresponde a oscilaciones de largo plazo que se manifiestan en torno a la tendencia, sin una periodicidad fija, y cuya duración suele extenderse por un período no inferior a dos años.

- Aleatorio: comprende las variaciones irregulares de la serie que no pueden ser atribuidas a la tendencia, la estacionalidad ni al componente cíclico. Dichas fluctuaciones responden, en general, a perturbaciones imprevisibles o a la influencia de factores externos no sistemáticos.

En el análisis de series temporales, es importante determinar si una serie es estacionaria o no lo es. Diremos que una serie es estacionaria en sentido débil si, para todo t :

$$1. E(y_t) = \mu_t = \mu = cte \quad (1)$$

$$2. Var(y_t) = \sigma_t^2 = \sigma^2 = cte \quad (2)$$

$$3. Cov(y_t, y_{t-k}) = \gamma_k \quad k = 0, \pm 1, \pm 2 \quad (3)$$

Las dos primeras condiciones indican que la media y la variancia son constantes. La tercera, que la covariancia entre dos variables depende sólo de su separación.

Por otro lado, diremos que una serie es no estacionaria si la media, la variancia y la covariancia no son constantes a través del tiempo. Una forma de solucionar la no estacionariedad en media es tomando una cantidad adecuada de diferencias de la serie, es decir, si la serie $\{y_t\}$ es no estacionaria y tomamos una cantidad d de diferencias se obtiene una nueva serie $\{(1-B)^d y_t\}$ para algún entero $d \geq 1$, que es estacionaria. Para determinar cuantas diferenciaciones hay que realizarle a la serie se puede realizar por inspección de algún gráfico de la función de autocorrelación o bien realizar alguna prueba de hipótesis, como por ejemplo, el test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). El cual establece como hipótesis nula que la serie es estacionaria y como hipótesis alternativa que la serie no es estacionaria, P-valores pequeños indicarían que es necesario establecer al menos una diferenciación. (Redactarlo mejor)

Sin embargo, un proceso puede ser estacionario en media pero no en variancia y covariancia. Por lo tanto, para corregir este problema es necesario aplicar las transformaciones de Box-Cox a la variable objetivo, definida como:

$$T(y_t) = \begin{cases} \frac{y_t^\lambda - 1}{\lambda} & \text{si } \lambda \neq 0 \\ \ln(y_t) & \text{si } \lambda = 0 \end{cases} \quad (4)$$

3.1.1 Autocorrelación

La autocorrelación es una medida de asociación que mide la correlación entre una serie temporal y la misma serie en diferentes momentos. Es una herramienta fundamental en el análisis de series ya que permite detectar no aleatoriedad, identificar dependencias temporales y validar modelos de series temporales (por ejemplo, *AR*, *ARMA*, entre otros).

3.1.1.1 Función de Autocorrelación

La Función de Autocorrelación (ACF, por sus siglas en inglés) constituye una herramienta fundamental en el análisis de series temporales, ya que permite cuantificar el grado de asociación

lineal entre los valores de la serie y sus propios valores pasados a distintos rezagos. Formalmente, la autocorrelación correspondiente a un rezago k se define mediante la siguiente expresión:

$$\rho_k = \frac{Cov(y_t, y_{t+k})}{\sqrt{Var(y_t)}\sqrt{Var(y_{t+k})}} = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} \quad (5)$$

donde ρ_k es el coeficiente de autocorrelación para el rezago k , y_t y y_{t+k} son los valores de la serie en los tiempos t y $t + k$ respectivamente y notar que $Var(y_t) = Var(y_{t+k}) = \gamma_0$.

El coeficiente ρ_k varía de -1 a 1. Si ρ_k está cerca de 1 indica que los valores de la serie están altamente correlacionados con los valores rezagados en k momentos. Si ρ_k está cerca de -1 indica que los valores de la serie están altamente correlacionados de forma negativa con los valores rezagados en k momentos. Por último, si ρ_k está cerca de 0 indica que no hay una correlación significativa entre los valores de la serie para ese rezago.

3.1.1.2 Función de Autocorrelación Parcial

La Función de Autocorrelación Parcial (PACF, por sus siglas en inglés) es una herramienta clave en el análisis de series temporales que permite medir la relación lineal directa entre una observación y su valor rezagado k , eliminando previamente el efecto de los rezagos intermedios $1, 2, \dots, k - 1$. A diferencia de la Función de Autocorrelación (ACF), que capta tanto efectos directos como indirectos entre los valores de la serie, la PACF aísla exclusivamente la contribución propia de cada rezago. La expresión de la autocorrelación parcial correspondiente al rezago k resulta:

$$\phi_{kk} = Corr(y_t, y_{t+k} | y_{t+1}, y_{t+2}, \dots, y_{t+k-1}) \quad (6)$$

Esta función resulta especialmente útil en la etapa de identificación de modelos autorregresivos dentro de la metodología de Box-Jenkins, ya que un corte claro en la PACF suele indicar el posible orden p de un modelo $AR(p)$.

3.1.2 Pronósticos

Unos de los objetivos primordiales del análisis de series temporales es realizar pronósticos tanto puntuales como por intervalos de predicción de la variable en estudio haciendo uso de los modelos propuestos. Formalmente, los pronósticos puntuales a un horizonte l con $l > 0$, se obtienen como:

$$\hat{y}_{T+l|T} = E(y_{n+l} | y_n, y_{n-1}, \dots) \quad (7)$$

Se podría hablar de intervalos de predicción haciendo el supuesto de distribución normal y/o los intervalos de predicción a partir de distribuciones simuladas de la variable respuesta.

3.1.3 Limitaciones en la modelización de series temporales

Una de las potenciales limitaciones que puede afectar a la modelización de series temporales son las observaciones extremas, también conocidas como *outliers*, se la define como aquellas observaciones que se alejan del patrón regular de los datos, es decir que sobresalen notoriamente del resto de las observaciones. Muchas veces este tipo de datos no hay que tenerlos en cuenta en la modelización de la serie porque pueden afectar seriamente los resultados del análisis, pudiendo sugerir modelos no apropiados y de esa forma alterar los pronósticos. Estas observaciones pueden existir en un único punto, una secuencia transitoria de puntos extremos o un cambio de patrón de las observaciones que se mantiene en el tiempo.

3.2 ARIMA/SARIMA

Los modelos ARIMA (*AutoRegressive Integrated Moving Average*) representan uno de los enfoques más utilizados y consolidados para el análisis y pronóstico de series temporales univariadas. Estos están compuestos por tres componentes esenciales: la parte autorregresiva (AR), el término integrado o de diferenciación (I) y la parte promedio móvil (MA). El modelo general se expresa como:

$$\phi_p(B)\nabla^d y_t = \theta_q(B)\varepsilon_t \quad (8)$$

donde y_t representa el valor observado, $\phi_p(B) = (1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p)$ es el operador AR regular de orden p , $\nabla^d = (1 - B)^d$ representa las diferencias regulares y $\theta_q(B) = (1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q)$ es el operador promedio móvil regular de orden q . Adicionalmente, se asume que el término de error ε_t constituye un proceso ruido blanco Gausseano, es decir, $\varepsilon_t \underset{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

La componente autorregresiva modela la dependencia entre el valor actual de la serie y sus valores pasados, por lo que un proceso autorregresivo de orden p se lo puede escribir como:

$$\phi_p(B)y_t = \varepsilon_t \quad (9)$$

Este planteo es análogo a una regresión lineal múltiple, con la particularidad de que los predictores corresponden a valores rezagados de y_t . Este enfoque se denomina modelo autorregresivo $AR(p)$, el cual se formula, en general, series estacionarias y exige determinadas restricciones sobre sus parámetros. Por definición se tiene que un proceso $AR(p)$ es siempre invertible, pero para que sea estacionario es necesario que las raíces de $\phi_p(B) = 0$ caigan fuera del círculo unitario.

La componente promedio móvil refleja la dependencia entre el valor actual de la serie y los errores de pronósticos previos, por lo que un proceso promedio móvil de orden q se lo puede escribir como:

$$y_t = \theta_q(B)\varepsilon_t \quad (10)$$

Por definición se tiene que este proceso es siempre estacionario, pero para que sea invertible es necesario que las raíces de $\theta_q(B) = 0$ caigan fuera del círculo unitario.

Así, la incorporación conjunta de estas componentes y la utilización de un orden apropiado de diferenciación en la parte regular permiten capturar estructuras sistemáticas complejas, con el propósito de obtener un ajuste adecuado del modelo.

Sin embargo, los modelos ARIMA no incorporan la estacionalidad de manera explícita, es por ello que, para series con ciclos recurrentes, como ocurre con series mensuales o trimestrales, se emplean los modelos SARIMA:

$$\Phi_P(B^s)\phi_p(B)\nabla_s^D\nabla^d y_t = \theta_q(B)\Theta_Q(B^s)\varepsilon_t \quad (11)$$

donde y_t representa el valor observado, $\Phi_P(B^s) = (1 - \Phi_1 B^s - \dots - \Phi_P B^{sP})$ es el operador AR estacional de orden P , $\nabla_s^D = (1 - B^s)^D$ representa las diferencias estacionales, $\Theta_Q(B^s) = (1 - \Theta_1 B^s - \dots - \Theta_Q B^{sQ})$ es el operador promedio móvil estacional de orden Q y ε_t es un proceso ruido blanco Gausseano.

Con el objetivo de seleccionar la especificación más adecuada, se utilizará la función `ARIMA()` del paquete `fable`, que permite realizar una selección automática del mejor modelo basándose en el algoritmo de Hyndman-Khandakar.

Dicho algoritmo implementa un procedimiento automatizado para la identificación del modelo ARIMA más adecuado. En primer lugar, evalúa la necesidad de diferenciación mediante la aplicación de tests de raíz unitaria, tales como el test de KPSS.

Posteriormente, el algoritmo realiza una búsqueda en el espacio de posibles modelos, combinando distintos órdenes de las componentes autorregresivas y de promedio móvil, tanto regulares como estacionales. Esta exploración se lleva a cabo mediante un enfoque iterativo.

En cada iteración, los modelos candidatos son estimados mediante máxima verosimilitud y comparados utilizando el criterio de información corregido de Akaike (*AICc*). Finalmente, se selecciona aquel modelo que minimiza dicho criterio.




Figura 1: Ejemplo ilustrativo del proceso iterativo de búsqueda de los parámetros del algoritmo de Hyndman-Khandakar

Si bien los modelos ARIMA y SARIMA constituyen un punto de partida indispensable, presentan limitaciones importantes cuando la serie contiene eventos disruptivos abruptos. Bajo estas circunstancias, los parámetros estimados a partir de datos previos a la interrupción pueden no reflejar adecuadamente el comportamiento posterior. Asimismo, la adaptación del modelo al patrón estacional posterior puede ser lento o inestable.

Por estas razones, en este trabajo los modelos ARIMA y SARIMA se consideran como modelos de referencia (*baseline*) para la comparación con enfoques diseñados explícitamente para capturar interrupciones, tal como proponen Hyndman y Rostami-Tabar (2024).

3.3 Modelos altamente adaptativos (ETS)

Los modelos de suavizado exponencial, o modelos ETS (*Error–Trend–Seasonality*), constituyen una familia alternativa caracterizada por su capacidad de adaptarse rápidamente a cambios recientes en la estructura de la serie. Estos modelos pueden ajustarse a la interrupción a medida que ocurre. Por lo tanto, suelen aproximarse relativamente bien al proceso de generación de datos. Su formulación se basa en la actualización recursiva de componentes no observados (error, tendencia y estacionalidad), utilizando ponderaciones decrecientes para las observaciones pasadas.

La estructura general del modelo se compone de:

- una componente de error (E) que describe la variabilidad de los datos que no se puede explicar por la tendencia ni por la estacionalidad.
- una componente de tendencia (T) que explica la dirección que sigue la serie temporal, puede ser creciente, decreciente o nula.
- una componente de estacionalidad (S) que se refiere al comportamiento repetitivo en intervalos regulares específicos que tiene la serie temporal.

Estos tres componentes pueden introducirse al modelo de forma aditiva (A), multiplicativa (M), o en el caso de la tendencia y estacionalidad no incluirse (N). Por ejemplo, un modelo ETS(A,N,M) indica que el error ingresa de forma aditiva, la tendencia no se incluye y la estacionalidad ingresa de forma multiplicativa.

Entre sus principales características, se destaca por ser una solución muy simple, que es fácil de implementar y rápida de computar. Además, no requiere modelar explícitamente la interrupción, por lo que el modelo puede utilizarse para realizar pronósticos incluso si se desconoce el momento o el efecto de la interrupción.

A continuación se presentan algunos de los ejemplos más conocidos de modelos ETS.

Suavizado Exponencial Simple (SES) - ETS(A,N,N)

El método de Suavizado Exponencial Simple resulta apropiado para la generación de pronósticos en series que no presentan tendencia ni estacionalidad definida. Los pronósticos se calculan mediante promedios ponderados de las observaciones pasadas, donde los pesos decrecen de manera exponencial conforme las observaciones se alejan en el tiempo, asignándole menor peso a los datos más antiguos. La expresión de la generación de pronósticos resulta:

$$\hat{y}_{T+1|T} = \alpha y_t + \alpha(1 - \alpha)y_{t-1} + \dots + \alpha(1 - \alpha)^{t-1}y_1 \quad (12)$$

donde $0 < \alpha < 1$.

Una forma alternativa de representar el modelo es con la forma de componentes, para el suavizado exponencial simple, la única componente que se incluye es el nivel, denotado como ℓ_t . Estas representaciones de los métodos de suavizado exponencial comprenden una ecuación de pronóstico y una ecuación de suavizado para cada uno de los componentes incluidos en el método. La forma de componentes del suavizado exponencial simple viene dada por:

- Ecuación de pronóstico: $\hat{y}_{T+h|T} = \ell_t$
- Ecuación de suavizado: $\ell_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)\ell_{t-1}$

donde ℓ_t es el nivel (o el valor suavizado) de la serie en el tiempo t . Estableciendo $h = 1$, se obtienen los valores ajustados, mientras que al establecer $t = T$, se obtienen los pronósticos reales, más allá de los datos de entrenamiento.

Con respecto a la estimación de los parámetros, una opción puede ser elegir los valores de los parámetros de forma subjetiva (o en base a la experiencia previa). Sin embargo, una forma más fiable y objetiva de obtener valores para los parámetros desconocidos es estimarlos a partir de los datos observados utilizando algún método de estimación, como puede ser mediante la minimización de la suma de cuadrados de los errores (SCE).

Método lineal de Holt - ETS(A,A,N)

El método lineal de Holt constituye una extensión del Suavizado exponencial simple, que permite pronosticar series temporales que presentan tendencia. Éste involucra una ecuación de pronóstico y dos ecuaciones de suavizado (una para el nivel y una para la tendencia):

- Ecuación de pronóstico: $\hat{y}_{T+h|T} = \ell_t + hb_t$
- Ecuación de nivel: $\ell_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1})$
- Ecuación de tendencia: $b_t = \beta^*(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta^*)b_{t-1}$

donde ℓ_t denota el nivel estimado de la serie en el tiempo t , b_t representa una estimación de la tendencia (pendiente) de la serie en el tiempo t , α es el parámetro de suavizado para el nivel, $0 \leq \alpha \leq 1$, y β^* es el parámetro de suavizado para la tendencia, $0 \leq \beta^* \leq 1$.

De forma análoga al Suavizado exponencial simple, la ecuación de nivel puede interpretarse como un promedio ponderado entre la observación actual y_t y el pronóstico de un paso adelante obtenido en el tiempo anterior ($\ell_{t-1} + b_{t-1}$). Por otro lado, la ecuación de tendencia establece que b_t es un promedio ponderado entre la variación estimada del nivel ($\ell_t - \ell_{t-1}$) y la estimación previa de la tendencia b_{t-1} .

En este modelo, la función de pronóstico deja de ser constante y pasa a ser lineal en el horizonte de predicción. Es decir, el pronóstico a h pasos se obtiene sumando al último nivel estimado ℓ_t el producto entre h y la última estimación de la tendencia b_t . En consecuencia, los pronósticos resultan ser una función lineal creciente (o decreciente) en función del horizonte h .

Método aditivo de Holt-Winters - ETS(A,A,A)

El método aditivo de Holt-Winters extiende el método lineal de Holt con el objetivo de incorporar explícitamente la estacionalidad en el pronóstico. Este método se compone de una ecuación de pronóstico y tres ecuaciones de suavizado (una para el nivel ℓ_t , otra para la tendencia b_t y la última para la estacionalidad s_t). A cada una de estas ecuaciones le corresponden los parámetros de suavizado α , β^* y γ , respectivamente.

- Ecuación de pronóstico: $\hat{y}_{T+h|T} = \ell_t + hb_t + s_{t+h-m(k+1)}$
- Ecuación de nivel: $\ell_t = \alpha(y_t - s_{t-m}) + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1})$
- Ecuación de tendencia: $b_t = \beta^*(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta^*)b_{t-1}$
- Ecuación de estacionalidad: $s_t = \gamma(y_t - \ell_{t-1} - b_{t-1}) + (1 - \gamma)s_{t-m}$

donde k es la parte entera de $\frac{h-1}{m}$, lo que garantiza que los índices estacionales utilizados en el pronóstico provengan del último año de la muestra y m representa el período estacional.

Aquí, la ecuación de nivel representa un promedio ponderado entre la observación desestacionalizada ($y_t - s_{t-m}$) y el pronóstico no estacional correspondiente al período t , dado por ($\ell_{t-1} + b_{t-1}$). La ecuación de tendencia coincide con el método lineal de Holt. Por su parte, la ecuación estacional expresa un promedio ponderado entre el índice estacional actual, ($y_t - \ell_{t-1} - b_{t-1}$), y el índice correspondiente a la misma estación del ciclo anterior.

Los modelos presentados previamente permiten capturar distintas configuraciones estructurales de la serie, tales como nivel, tendencia y estacionalidad. Cabe aclarar que se pueden presentar muchas más combinaciones dependiendo de como ingresa cada componente al modelo, si de forma aditiva, multiplicativa o no ingresando.

Con el fin de determinar la especificación más adecuada se utilizará la función `ETS()` del paquete `fable`, que permite hacer una selección automática del modelo ajustado, seleccionando aquel modelo que minimice el/los criterio/s de información $AICc$, AIC o BIC .

Sin embargo, tal como señalan Hyndman y Rostami-Tabar (2024), los ETS presentan limitaciones ante *shocks* abruptos. En particular, necesitan un período de ajuste para que sus parámetros se estabilicen luego de una interrupción abrupta, lo que puede derivar en pronósticos inestables o con mayor variabilidad durante y después del evento.

A pesar de ello, su simplicidad y adaptabilidad hacen que constituyan un componente valioso dentro del conjunto de estrategias para series interrumpidas, funcionando como una opción más simple a enfoques más estructurales o contrafactuales.

3.4 Modelos de intervención

Los modelos de intervención están diseñados para describir y cuantificar el impacto de un evento externo en una serie temporal. Su propósito es identificar cómo, y en qué magnitud, se modifican los valores de la serie a partir de la ocurrencia de un hecho exógeno, permitiendo distinguir entre la evolución “natural” del proceso y los efectos atribuibles a dicho evento.

La intervención puede estar asociada a la implementación de una política pública, un programa o la ocurrencia de un evento disruptivo, como fue el caso de la pandemia de COVID-19. En tales contextos, la serie temporal puede experimentar quiebres estructurales que no pueden ser adecuadamente explicados mediante modelos de series temporales univariados tradicionales, lo cual justifica la incorporación explícita de variables que representen el evento en cuestión.

El enfoque clásico de intervención fue introducido por Box y Tiao (1975) y combina:

1. un modelo de regresión, que incorpora variables explicativas para representar el efecto del *shock*, y
2. un modelo ARIMA para los errores, que captura la dependencia temporal residual.

La estructura general se expresa como:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_{1,t} + \beta_2 \cdot x_{2,t} + \cdots + \beta_k \cdot x_{k,t} + \eta_t \quad (13)$$

$$\phi_p(B)\nabla^d\eta_t = \theta_q(B)\varepsilon_t \quad (14)$$

donde η_t representa el término de error del modelo de regresión y ε_t representa el término de error del modelo ARIMA.

Las variables de intervención pueden representar:

- cambios permanentes en la estructura,
- impactos transitorios,
- procesos de lenta recuperación.

La principal ventaja de estos modelos es que permiten incorporar explícitamente la estructura causal del evento y pronosticar interrupciones futuras similares. No obstante, diferenciar entre una verdadera interrupción y un factor determinante más general como un cambio tendencial, puede introducir cierto grado de subjetividad en el análisis.

En el marco conceptual de Hyndman y Rostami-Tabar (2024), los modelos de intervención constituyen la estrategia “estructural”, en la cual la interrupción se modela directamente como parte del proceso generador de datos.

3.5 Métodos contrafactuales

Los métodos contrafactuales abordan el problema desde una perspectiva distinta: en lugar de intentar modelar directamente el efecto del *shock*, se orientan a reconstruir cómo habría evolucionado la serie en ausencia del evento disruptivo. Esto permite generar pronósticos menos influenciados por valores atípicos y evaluar escenarios alternativos.

3.5.1 Establecer como faltante (*set to missing*)

La técnica “*Set to Missing*” consiste en identificar el período de interrupción en la serie temporal y marcar esas observaciones como valores perdidos, para luego ajustar el modelo sólo con los datos disponibles fuera del período interrumpido. De este modo, el modelo no utiliza información contaminada por la interrupción y genera pronósticos que representan lo que habría ocurrido sin el evento disruptivo.

Cabe destacar que los pronósticos generados para el período de interrupción no serán precisos, pero pueden interpretarse como escenarios contrafactuales. Por otro lado, los pronósticos posteriores a la interrupción tienden a ser más estables, dado que no se ven afectados por observaciones atípicas o ruidosas.

A pesar de que muchos modelos de series de tiempo tienen problemas con los datos faltantes, algunos enfoques pueden tratarlos adecuadamente. Wu, Chang y Lee (2015) sugieren

una estrategia de pronósticos basados en LSSVM (*Least Squares Support Vector Machine*) que fue particularmente diseñado para trabajar con series temporales con datos faltantes.

La incorporación de valores faltantes incrementa la incertidumbre del modelo, dando lugar a intervalos de predicción más amplios. Esta característica señalada por Hyndman y Rostami-Tabar (2024), puede resultar beneficiosa desde una perspectiva interpretativa, ya que refleja de manera realista la falta de información confiable durante los períodos disruptivos.

3.5.2 Lo que podría haber ocurrido (*what might have been*)

Este enfoque reconstruye el período de interrupción utilizando únicamente información del período previo a la interrupción, simulando el comportamiento que probablemente habría tenido la serie temporal si la interrupción no hubiese ocurrido. La idea consiste en reemplazar las observaciones distorsionadas por el evento disruptivo por valores estimados que reflejen la dinámica histórica del proceso antes de la interrupción. Las estrategias para obtener estas estimaciones se basan en:

- utilizar los datos del periodo pre-disruptivo para estimar un modelo (ARIMA, ETS, etc), para luego obtener las observaciones estimadas durante el período disruptivo.
- utilizar los datos del período pre-disruptivo para estimar las observaciones durante el período disruptivo haciendo uso de alguna medida resumen (media, mediana, entre otras).

Una vez obtenidas estas estimaciones, los valores reconstruidos se incorporan a la serie y se ajusta un modelo sobre el conjunto completo de datos, permitiendo así realizar pronósticos posteriores a la interrupción con mayor estabilidad.

Sin embargo, es importante notar que los valores estimados durante la interrupción no constituyen pronósticos genuinos en sentido estricto, ya que se habrán utilizado información futura para calcular los datos ajustados durante la interrupción. No obstante, los pronósticos posteriores a la interrupción sí serán pronósticos verdaderos y deberían ser prácticamente iguales a los obtenidos con la estrategia anterior (*set to missing*).

3.6 Métodos de combinación (*ensemble*)

Los métodos de combinación, o *ensembles*, consisten en integrar múltiples modelos para producir un pronóstico final que aproveche las fortalezas de cada uno. Su fundamento teórico se basa en que diferentes modelos capturan distintas fuentes de información parcial sobre el problema, que se superponen de forma incompleta y, por lo tanto, se complementan entre sí.

Hendry y Clements (2004) demostraron que el *ensemble* puede ser visto como una aplicación del estimador de *Stein-James*, donde el valor futuro desconocido funciona como un meta-parámetro cuya estimación mejora al promediar distintas fuentes de información parcial.

En el contexto de series interrumpidas, Hyndman y Rostami-Tabar (2024) destacan que los *ensembles* son especialmente valiosos porque permiten combinar:

- modelos tradicionales (ARIMA/SARIMA),
- modelos altamente adaptativos (ETS),
- modelos de intervención,
- modelos contrafactuales.

Esta integración elimina la inestabilidad que presentan algunos métodos en la fase del *shock* o en la recuperación temprana.

La forma de *ensemble* utilizada en esta tesina será la combinación lineal simple, expresada como:

$$\tilde{y}_{T+h|T} = \sum_{i=1}^N w_{T+h|T,i} \cdot \hat{y}_{T+h|T,i} \quad (15)$$

donde $\tilde{y}_{T+h|T}$ es el pronóstico del ensemble h pasos hacia adelante, $w_{T+h|T,i}$ el peso asignado al i -ésimo modelo de pronóstico, el cual es el mismo para todos los modelos y $\hat{y}_{T+h|T,i}$ es el i -ésimo modelo de pronóstico.

Esta combinación lineal aporta robustez, atenúa los errores específicos de cada enfoque y suele superar a los métodos individuales, aunque puede quedar incompleto cuando los objetivos de los componentes difieren, como por ejemplo, predecir lo que ocurrió vs. lo que podría haber ocurrido.

De todas formas, diversos estudios han demostrado que a pesar de su simplicidad, el promedio simple suele ser competitivo e incluso superar combinaciones más complejas, especialmente cuando los modelos individuales poseen desempeños heterogéneos ante las interrupciones.

3.7 Métricas de evaluación

Con el fin de comparar el desempeño de los modelos propuestos, es necesario definir diversas métricas de evaluación. Estas métricas permiten analizar tanto la capacidad de ajuste como el desempeño predictivo puntual y la calidad de los intervalos de predicción de los distintos métodos.

3.7.1 Raíz del error cuadrático medio (RMSE)

Es una medida directa del error de predicción en las mismas unidades que la variable de respuesta, representa la raíz cuadrada del promedio de las diferencias al cuadrado entre los valores observados y los valores predichos. Valores más pequeños indican buenos resultados. Su expresión resulta:

$$RMSE(\hat{y}, y) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (16)$$

donde y_i es el i-ésimo valor real, $\hat{y}_i$ es el i-ésimo valor pronosticado y n es la cantidad de observaciones.

3.7.2 Error absoluto medio (MAE)

Es una métrica que cuantifica la magnitud promedio de los errores en un conjunto de predicciones en las mismas unidades que la variable respuesta, sin considerar su dirección. Al centrarse únicamente en el tamaño de los errores, ayuda a identificar qué tan lejos están las predicciones de los resultados reales. Valores más pequeños indican buenos resultados. Su expresión resulta:

$$MAE(\hat{y}, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (17)$$

donde y_i es el i-ésimo valor real, $\hat{y}_i$ es el i-ésimo valor pronosticado y n es la cantidad de observaciones.

3.7.3 Error porcentual absoluto medio (MAPE)

Al igual que el MAE, el MAPE es una métrica de precisión que mide la desviación promedio de un valor predicho respecto al valor observado, con la ventaja de ser más fácil de interpretar al no tener en cuenta la escala de medición. Valores más pequeños indican buenos resultados. Su expresión resulta:

$$MAPE(\hat{y}, y) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \right) \cdot 100\% \quad (18)$$

donde y_i es el i -ésimo valor real, $\hat{y}_i$ es el i -ésimo valor pronosticado y n es la cantidad de observaciones.

3.7.4 Puntuación de Winkler (*Winkler Score*)

Es una métrica que evalúa el intervalo de predicción de los modelos ajustados, si la observación cae dentro del intervalo de predicción su valor resulta en la amplitud del intervalo, mientras que si la observación cae fuera del intervalo de predicción a dicha amplitud se le sumará un término de penalización que es proporcional a cuán lejos la observación cae del intervalo. Valores más pequeños indican intervalos de predicción más estrechos. Su expresión resulta:

$$W_{\alpha,t} = \begin{cases} (u_{\alpha,t} - l_{\alpha,t}) + \frac{2}{\alpha} (l_{\alpha,t} - y_t) & \text{si } y_t < l_{\alpha,t} \\ (u_{\alpha,t} - l_{\alpha,t}) & \text{si } l_{\alpha,t} \leq y_t \leq u_{\alpha,t} \\ (u_{\alpha,t} - l_{\alpha,t}) + \frac{2}{\alpha} (y_t - u_{\alpha,t}) & \text{si } y_t > u_{\alpha,t} \end{cases} \quad (19)$$

donde y_t es el valor observado en el tiempo t , $u_{\alpha,t}$ es el límite superior del intervalo de predicción en el tiempo t , $l_{\alpha,t}$ es el límite inferior del intervalo de predicción en el tiempo t y $1 - \alpha$ es el nivel de confianza establecido.

Para la obtención de la puntuación anual, se calcula el promedio de las puntuaciones obtenidas, cuya expresión resulta:

$$W_{\alpha} = \frac{1}{12} \cdot \sum_{t=1}^{12} W_{\alpha,t} \quad (20)$$

3.7.5 Evaluación diferenciada por régimen temporal

Dado que los eventos disruptivos producen cambios abruptos en la estructura temporal, la evaluación se realizará en tres segmentos, siguiendo el enfoque del artículo de Hyndman:

1. Durante el shock (2020): se evalúa la capacidad de adaptación inmediata.
2. Recuperación inmediata (2021–2022): se evalúa la velocidad con la que cada modelo retorna a un comportamiento estable.
3. Horizontes extendidos (2023–2024): se evalúa estabilidad predictiva de mediano plazo.

De este modo, es posible identificar no solo el mejor modelo en términos generales, sino también el método más adecuado para cada fase de la serie.

4. Aplicación

La aplicación empírica se desarrolla sobre una serie mensual de movilidad urbana correspondiente al total de pasajeros transportados por el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) de la ciudad de Rosario, abarcando el período comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2024, utilizando el *software* de programación R.

Esta misma contiene una serie de características que la convierten en un caso adecuado para evaluar y comparar metodologías de pronóstico diseñadas para series interrumpidas. En particular, permiten analizar la capacidad de los distintos enfoques para adaptarse a cambios estructurales abruptos y generar pronósticos confiables en contextos de alta incertidumbre.

El procedimiento de aplicación se estructurará de acuerdo con los siguientes pasos:

- Preprocesamiento de los datos: Se lleva a cabo un proceso riguroso de limpieza y transformación de los datos, utilizando herramientas provistas por los paquetes `tidyverse` y `lubridate`.
- Análisis de las características de la serie: Se examinan las propiedades intrínsecas de la serie, incluyendo la identificación de tendencia, estacionalidad y período donde ocurre la disrupción, a través de herramientas visuales implementadas con la librería `ggplot2`.
- Modelización y análisis del shock pandémico (2020) y de la etapa de recuperación (2021–2024): Se ajustan los modelos previamente seleccionados para capturar y pronosticar esta transición, empleando las librerías del paquete `fpp3`.
- Evaluación comparada de pronósticos: Se evalúa el desempeño de los diversos enfoques tanto durante la disrupción como en el período posterior, a través de métricas puntuales y probabilísticas, utilizando las librerías del paquete `fpp3`.

El propósito de esta aplicación es, por un lado, ofrecer un análisis riguroso de la evolución de la movilidad urbana en la ciudad de Rosario a lo largo de casi dos décadas y, por otro, generar evidencia empírica sólida que permita identificar qué estrategias de modelización resultan más adecuadas para el tratamiento de series temporales interrumpidas, caracterizadas por *shocks* abruptos y procesos de recuperación graduales.

4.1 Análisis descriptivo

La serie en estudio corresponde al número de pasajeros transportados de forma mensual por el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en la ciudad de Rosario. (Fuente de los datos).

Se considera como pasajeros transportados al total de viajes abonados mediante el sistema de cancelación, independientemente de la existencia de beneficios, subsidios o gratuidades.

Esta definición permite trabajar con una medida homogénea y comparable a lo largo del tiempo, representativa del volumen real de demanda del sistema.

En la Figura 2 se observa la evolución temporal de la serie para el período comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2024. En términos generales, la serie presenta un comportamiento relativamente estable durante el período previo a 2020, con fluctuaciones moderadas alrededor de un nivel elevado de utilización del servicio. Sin embargo, se identifican claramente un conjunto de observaciones atípicas durante los años 2020 y 2021, las cuales constituyen un quiebre significativo en la dinámica de la serie.

Estas observaciones atípicas se explican por las restricciones sanitarias impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19, las cuales afectaron de manera directa la movilidad urbana. Como consecuencia, se registra una caída abrupta en el número de pasajeros transportados, seguida de un proceso de recuperación posterior. No obstante, dicha recuperación presenta un comportamiento no lineal y, en general, no alcanza los niveles observados en el período pre-pandemia, lo que sugiere la posible existencia de cambios estructurales persistentes en la demanda del servicio.

Por otro lado, la Figura 3 permite analizar el comportamiento estacional de la serie. Se observa una estacionalidad anual bien definida, con caídas sistemáticas en los meses asociados a períodos vacacionales, particularmente en diciembre, enero y febrero, así como en julio. Estos descensos se encuentran vinculados a la reducción de la actividad educativa y laboral, lo cual impacta directamente en la demanda del transporte público.

Asimismo, durante los meses restantes se observan niveles relativamente más elevados y estables, lo que refuerza la existencia de un patrón estacional recurrente en la serie. Este comportamiento se mantiene de manera consistente en el período previo a la pandemia, aunque se ve parcialmente alterado durante los años 2020 y 2021 como consecuencia del evento disruptivo.

En relación con la tendencia de largo plazo, se observa una leve tendencia decreciente a lo largo de los años. Si bien parte de esta tendencia puede explicarse por el impacto de la pandemia, también podrían intervenir otros factores estructurales, tales como cambios en los hábitos de movilidad, la incorporación de medios de transporte alternativos o transformaciones en la dinámica urbana.




Figura 2: Pasajeros transportados por el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Rosario. Período 01/2006-12/2024.




Figura 3: Cantidad de pasajeros transportados por el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Rosario por año.

Con respecto al análisis de dispersión, la Figura 4 muestra la distribución anual de los pasajeros transportados. En ella se puede identificar una leve disminución en la media a lo largo del tiempo, así como una variabilidad que no parece ser constante entre años. Este comportamiento sugiere la presencia de heterocedasticidad, es decir, cambios en la variabilidad de la serie a lo largo del tiempo.

Estos patrones constituyen un indicio de que la serie no es estacionaria, tanto en media como en varianza. En particular, la presencia de una tendencia y de cambios en la dispersión refuerza la necesidad de aplicar transformaciones y/o diferenciaciones para lograr una representación adecuada del proceso.

Con el objetivo de estabilizar la varianza, se aplica una transformación de Box-Cox. El valor del parámetro $\lambda = 0$ fue seleccionado a partir de la minimización del coeficiente de variación en la Tabla 1, lo cual conduce a la utilización de la transformación logarítmica, es decir, $y^{(\lambda)} = \ln(y)$.

Esta transformación permite reducir la heterogeneidad en la varianza y facilita la posterior modelización de la serie.




Figura 4: Distribución anual de pasajeros transportados por el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Rosario.

Tabla 1: Coeficiente de variación

λ	Coeficiente de variación
-2.0	10.9127
-1.0	2.3564
-0.5	0.4845
0.0	0.1096
0.5	0.1714
1.0	0.2766
2.0	0.4391

En cuanto a la estructura de dependencia temporal, la Figura 5 presenta la función de autocorrelación muestral, donde se observan valores positivos elevados en los primeros rezagos, con un decrecimiento gradual a medida que aumenta el rezago. Este patrón es característico de series no estacionarias o con fuerte dependencia temporal, lo que sugiere la necesidad de aplicar diferenciación para estabilizar la media.

Por su parte, la Figura 6 muestra la función de autocorrelación parcial muestral, en la cual se identifica un pico significativo en el primer rezago, seguido de algunos rezagos adicionales

con valores estadísticamente significativos, mientras que la mayoría de los rezagos posteriores se mantienen dentro de las bandas de confianza.




Figura 5: Función de autocorrelación muestral






Figura 6: Función de autocorrelación parcial muestral

Al aplicar la transformación correspondiente a la variable respuesta, en la Figura 7 se presenta la evolución temporal del logaritmo natural de los pasajeros, junto con su distribución anual. Se observa que el rango de la variable se reduce considerablemente, lo que contribuye a una mayor estabilidad en la varianza. Al analizar el comportamiento de la serie en los años de interés, se observa que hasta el año 2019, la variable parece ser estable en varianza pero no en media. Este comportamiento sugiere la conveniencia de aplicar una diferenciación en la serie, como estrategia para solucionar la no estacionariedad en media.



(a) Logaritmo natural de los pasajeros transportados por el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Rosario



(b) Distribución anual del logaritmo natural de los pasajeros transportados por el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Rosario

Figura 7: Resumen de la serie transformada

4.2 Ajuste de modelos

En esta sección se presentan los resultados del ajuste de los distintos modelos considerados, con el objetivo de analizar su capacidad para capturar la dinámica de la serie ante la presencia de un evento disruptivo, como fue la pandemia de COVID-19, así como también su desempeño en la fase de recuperación y estabilización.

Para ello, se estimaron los modelos anteriormente presentados, cuyos resultados se presentan a continuación.

4.2.1 ARIMA/SARIMA

Los modelos ARIMA/SARIMA fueron ajustados sobre la serie previamente transformada con el fin de capturar la dependencia temporal observada en el análisis exploratorio. En particular, se consideraron tanto componentes no estacionales como estacionales, permitiendo modelar adecuadamente la dinámica mensual de la serie.

Dado que el análisis se realiza bajo un esquema de evaluación por ventanas móviles, los modelos estimados no son únicos, sino que varían en función del período de entrenamiento considerado. En este sentido, la Tabla 2 resume las especificaciones seleccionadas en cada una de las etapas analizadas. Cabe destacar que la amplitud de los intervalos de predicción en la fase de estabilización son muy amplios indicando alta incertidumbre en los modelos.

Tabla 2: Modelos ajustados en cada fase

Entrenamiento	Modelos ajustados
Hasta 2019	$SARIMA(1, 0, 2)(1, 1, 0)_{12}$
Hasta 2020	$SARIMA(1, 1, 3)(0, 0, 2)_{12}$
Hasta 2021	$SARIMA(1, 1, 3)(0, 0, 2)_{12}$
Hasta 2022	$SARIMA(1, 1, 3)(0, 0, 1)_{12}$
Hasta 2023	$SARIMA(1, 1, 3)(0, 0, 2)_{12}$

En términos de desempeño predictivo, la Figura 8 presenta los pronósticos generados en cada una de las diferentes etapas. Durante el período del evento disruptivo (año 2020), se observa que el modelo estimado no logra predecir adecuadamente la magnitud de la caída de la serie. Esto se debe a que estos modelos se basan en la información histórica, por lo que tienden a extrapolar.

En la fase de recuperación inmediata (años 2021 y 2022), se aprecia una mejora progresiva en la capacidad predictiva. A medida que se incorporan observaciones correspondientes al período posterior al evento disruptivo, estos modelos comienzan a mejorar el ajuste, reflejando parcialmente el proceso de recuperación. Sin embargo, se observan desvíos de los valores reales de la serie, lo cual indica que la recuperación no es inmediata.

Finalmente, en la etapa de estabilización (años 2023 y 2024), estos modelos muestran un desempeño superior. En este período, la serie presenta un comportamiento más regular y predecible, lo que permite a los modelos ajustados capturar de manera más precisa su evolución. En particular, el pronóstico correspondiente al año 2024 exhibe un alto grado de concordancia con los valores reales, tanto en términos puntuales como en la cobertura de los intervalos de predicción.




Figura 8: Pronósticos utilizando modelos ARIMA/SARIMA

4.2.2 ETS


Los modelos ETS ajustados sobre la serie transformada en cada etapa corresponden a los especificados en la Tabla 3. Estas especificaciones permiten capturar la evolución del nivel, la tendencia y la estacionalidad de la serie, adaptándose a las distintas fases del período analizado.

Tabla 3: Modelos ajustados en cada etapa

Entrenamiento	Modelos ajustados
Hasta 2019	$ETS(M, A, A)$
Hasta 2020	$ETS(A, N, A)$
Hasta 2021	$ETS(A, N, A)$
Hasta 2022	$ETS(A, N, A)$
Hasta 2023	$ETS(A, N, A)$


A diferencia de los modelos ARIMA/SARIMA, los modelos ETS presentan una mayor capacidad de adaptación frente a cambios repentinos en la dinámica de la serie. Este comportamiento se evidencia en la Figura 9, donde se observa que, si bien durante el período del *shock* los pronósticos resultan similares a los obtenidos mediante modelos ARIMA/SARIMA, en la fase de recuperación inmediata los modelos ETS logran ajustarse con mayor rapidez a la nueva estructura de la serie, lo que se traduce en una mejora sustancial en la calidad de los pronósticos, reflejando una capacidad superior para capturar la recuperación gradual de la serie.

Por último, en la fase de estabilización, los pronósticos generados por estos modelos se ubican próximos a los valores reales, lo que indica un buen desempeño en términos de ajuste global. Sin embargo, se observa la presencia de una mayor incertidumbre asociada a las predicciones, reflejada en la amplitud de los intervalos de pronóstico.




Intervalo de predicción 80%

(a) Pronóstico año 2020




Intervalo de predicción 80%

(b) Pronóstico año 2021




Intervalo de predicción 80%

(c) Pronóstico año 2022



Intervalo de predicción 80%

(d) Pronóstico año 2023



Intervalo de predicción 80%

(e) Pronóstico año 2024


Figura 9: Pronósticos utilizando ETS

4.2.3 Modelos de intervención

Estos modelos requieren de la definición de una variable explicativa que haga referencia a la intervención que estamos estudiando, en este caso, la situación vivida en el país debido a la pandemia de COVID-19. Para ello, definimos como variable explicativa a la siguiente:


$$x_t = \begin{cases} 0 & \text{si } t \notin \text{Marzo 2020 - Julio 2021} \\ 1 & \text{si } t \in \text{Marzo 2020 - Julio 2021} \end{cases} \quad (21)$$

Dicha variable indicadora, se estableció de esta forma por la drástica baja de la utilización de este servicio público debido a el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecido en Argentina a partir del 20 de marzo del 2020




Intervalo de predicción 80%

(a) Pronóstico año 2020




Intervalo de predicción 80%

(b) Pronóstico año 2021




Intervalo de predicción 80%

(c) Pronóstico año 2022



Intervalo de predicción 80%

(d) Pronóstico año 2023



Intervalo de predicción 80%

(e) Pronóstico año 2024

Figura 10: Pronósticos utilizando modelos de intervención

4.2.4 Métodos contrafactuales

4.2.4.1 Establecer como faltante (*set to missing*)






Figura 11: Pronósticos utilizando la estrategia 'establecer como faltante'


4.2.4.2 Lo que podría haber ocurrido (*what might have been*)




(a) Pronóstico año 2020



(b) Pronóstico año 2021



(c) Pronóstico año 2022



(d) Pronóstico año 2023

(e) Pronóstico año 2024

Figura 12: Pronósticos utilizando la estrategia 'lo que podría haber ocurrido'

4.2.5 Ensemble







Figura 13: Pronósticos utilizando Ensemble


4.3 Resultados





Estrategia

- Arima
- ETS
- STM
- Ensemble
- Regresión dinámica
- WMHB



Estrategia

- Arima
- ETS
- STM
- Ensemble
- Regresión dinámica
- WMHB

Tabla 4: RMSE {#tbl-anonymous-795638-1}

Estrategia	2020	2021	2022	2023	2024
Arima	72.6188	39.8946	44.4757	15.7846	7.8482
ETS	73.5476	27.6106	7.6389	8.8325	16.4607
Regresión dinámica	72.6188	48.2336	35.2806	21.0903	11.1204
STM	72.6188	43.5942	17.8111	15.8258	14.2177
WMHB	72.6188	51.7077	6.4751	6.7116	11.2510
Ensemble	72.8024	11.2208	19.6805	12.5617	9.4374

Tabla 5: MAE {#tbl-anonymous-795638-2}

Estrategia	2020	2021	2022	2023	2024
Arima	65.2824	35.6734	41.2118	14.0559	5.9100
ETS	66.2331	24.9127	6.8219	6.9264	12.1061
Regresión dinámica	65.2824	40.4633	32.0100	18.6567	9.6294
STM	65.2824	41.3842	16.1269	14.5379	11.5649
WMHB	65.2824	49.8611	5.1969	5.1991	7.7184
Ensemble	65.4713	8.9914	17.9613	10.6388	5.4565

Tabla 6: MAPE {#tbl-anonymous-795638-3}

Estrategia	2020	2021	2022	2023	2024
Arima	782.3700	62.3211	51.3059	14.7926	7.7671
ETS	787.5277	42.8660	9.5705	7.5814	15.5987
Regresión dinámica	782.3700	72.2868	40.9031	19.4196	11.1595
STM	782.3700	88.4641	19.7778	15.5554	14.4000
WMHB	782.3700	104.6633	7.5828	5.2990	10.1835
Ensemble	783.4745	19.5210	22.9699	10.8759	7.5188

Tabla 7: Puntuación de Winlker {#tbl-anonymous-795638-4}

Estrategia	2020	2021	2022	2023	2024
Arima	599.2769	280.7661	243.4410	85.3179	92.5032
ETS	615.1908	114.7553	90.6417	92.7460	105.5659
Regresión dinámica	599.2769	266.8093	184.4661	58.3325	58.9032
STM	599.2769	344.1494	112.1934	81.4613	48.2305
WMHB	599.2769	440.1319	26.2719	22.7540	43.7482
Ensemble	601.8546	102.1934	64.1796	58.7224	64.0629

Evaluación de los pronósticos para cada estrategia utilizada

5. Conclusión

6. Bibliografía

Box, G. E. P., & Tiao, G. C. (1975). Intervention analysis with applications to economic and environmental problems. *Journal of the American Statistical Association*, 70(349), 70–79.

Gardner, E. S. (2006). Exponential smoothing: The state of the art — Part II. *International Journal of Forecasting*, 22, 637–666. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.005>

Hendry, D. F., & Clements, M. P. (2004). Pooling of forecasts. *The Econometrics Journal*, 7(1), 1–31.

Hyndman, R. J. (2014). Measuring forecast accuracy. In *Business Forecasting: Practical Problems and Solutions*, 177–183.

Hyndman, R. J., & Rostami-Tabar, B. (2024). Forecasting interrupted time series. *Journal of the Operational Research Society*, 76(4), 790–803. <https://doi.org/10.1080/01605682.2024.2395315>

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>

Peña, D. (2005). *Análisis de series temporales* Alianza Editorial.

Wang, X., Hyndman, R. J., Li, F., & Kang, Y. (2023). Forecast combinations: an over 50-year review. *International Journal of Forecasting*, 39(4), 1518–1547. <https://robjhyndman.com/publications/combinations/>

Wei, W. W. S. (2006). *Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods* (2nd ed.). Pearson Education.

Wu, S.-F., Chang, C.-Y., & Lee, S.-J. (2015). Time series forecasting with missing values. In *2015 1st International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCom)* (pp. 151–156). <https://doi.org/10.4108/icst.iniscom.2015.258269>