

Comenzado el	viernes, 10 de octubre de 2025, 22:50
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 10 de octubre de 2025, 22:55
Tiempo empleado	5 minutos 10 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ni el PET ni el SPECT permiten observar cambios asociados a la DFT.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Atrofia desproporcionada en las regiones frontales mediales y/o orbitales/insular con o sin atrofia de las regiones temporales anteriores." El anterior es uno de los criterios para DFTvC Probable

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La DFT es la segunda demencia neurodegenerativa más frecuente después de la Demencia Tipo Alzheimer.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La presentación súbita y progresiva de los síntomas es característica de la DFT.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes pruebas ayudarían a detectar dificultades específicamente ejecutivas y de la cognición social?

Seleccione una:

- ☐ a. Copia de figuras simples, Fluencia verbal semántica
- ☐ b. TMT (sección A), Test de Denominación de Córdoba
- ☒ c. Test del Hotel y Reconocimiento de emociones ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Test del Hotel y Reconocimiento de emociones

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes criterios es necesario para diagnóstico de DFT con patología definitiva?

Seleccione una:

- ☒ a. Evidencia histopatológica de DFT en biopsia o en estudio post-mortem (tauopatía, TDP-43, DLDH) ✓
- ☐ b. Hipoperfusión frontal o hipometabolismo en SPECT o PET
- ☐ c. Conducta perseverativa, estereotipada, compulsiva o con rituales
- ☐ d. Apatía o inercia temprana

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evidencia histopatológica de DFT en biopsia o en estudio post-mortem (tauopatía, TDP-43, DLDH)

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La desinhibición conductual temprana y los cambios en la alimentación y la hiperoralidad se consideran criterios diagnósticos para posible DFTvC

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un inicio insidioso y de progresión gradual de la sintomatología excluye el diagnóstico de DFT

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Algunas diferencias entre "Fenocopias" y pacientes con DFTvC es que los síntomas de los primeros no suelen progresar y que pueden tener un mejor rendimiento en pruebas neuropsicológicas que los DFTvC

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones no caracteriza a la Demencia Fronto Temporal Variante Conductual como entidad clínica - patológica?

Seleccione una:

- ☒ a. Ataxia Cerebelosa ✓
- ☐ b. Atrofia en lóbulos frontales y temporales anteriores
- ☐ c. Deterioro de algunas funciones cognitivas
- ☐ d. Deterioro de la personalidad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ataxia Cerebelosa