

Repaso de Estadística **Segundo Parcial**

francfede16@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Repaso 3

21. ¿Qué tipo de variable requiere el modelo teórico de la Distribución Normal?

* 1 punto

- ☐ A) Variable cualitativa de nivel nominal.
- ☐ B) Variable cualitativa de nivel ordinal.
- ☐ C) Variable cuantitativa de tipo continuo.
- ☐ D) Variable aleatoria discreta exclusivamente dicotómica.
- ☐ E) Variable cualitativa politómica sin orden jerárquico.

22. ¿Cuál de los siguientes NO es un supuesto requerido para utilizar de forma válida el coeficiente de correlación de Pearson?

* 1 punto

- ☐ A) Que las variables analizadas sean cuantitativas.
- ☐ B) Que exista una relación lineal entre las variables.
- ☐ C) Que las variables tengan una distribución aproximadamente normal.
- ☐ D) Que se cumpla el principio de homocedasticidad (similar varianza a lo largo de los valores).
- ☐ E) Que la variable independiente posea al menos tres niveles nominales politómicos.



23. ¿En qué consiste incurrir en un Error de Tipo I (falso positivo) en un contraste de hipótesis? * 1 punto

- ☐ A) En mantener o retener la hipótesis nula cuando en la realidad de la población es falsa.
- ☐ B) En rechazar la hipótesis nula when en la realidad de la población es verdadera.
- ☐ C) En seleccionar un nivel de confianza general inferior al 50%.
- ☐ D) En aplicar una prueba estadística no paramétrica cuando se cumplía con éxito el supuesto de normalidad.
- ☐ E) En cometer un error de transcripción al confundir estadísticos latinos con parámetros.

24. ¿Qué representa el Nivel Crítico o valor p (p-valor) que arroja un * 1 punto contraste de hipótesis?

- ☐ A) La probabilidad exacta de que la hipótesis alternativa formulada sea absolutamente falsa.
- ☐ B) La fuerza de la relación entre dos variables cualitativas medida en una escala sin unidades métricas.
- ☐ C) La probabilidad asociada al estadístico de contraste obtenido, que indica cuán probable es observar esos datos muestrales (o unos más extremos) si la hipótesis nula fuera estrictamente verdadera.
- ☐ D) El número neto de participantes que cambiaron sus respuestas durante la realización del experimento.
- ☐ E) El porcentaje de varianza que no pudo ser explicado por los factores principales del modelo estadístico.

25. ¿Qué parámetros matemáticos específicos definen por completo la forma exacta y la posición de una distribución normal? * 1 punto

- ☐ A) La mediana y el rango intercuartílico.
- ☐ B) La media y la desviación estándar.
- ☐ C) La moda y la varianza dentro de los grupos.
- ☐ D) El número de ensayos (N) y la probabilidad constante de éxito.
- ☐ E) Los grados de libertad (gl) y el nivel de significación (alfa).



26. ¿Qué significa que la curva de la Distribución Normal sea 'asintótica' respecto al eje de abscisas (eje X)?

* 1 punto

- ☐ A) Que corta de forma abrupta al eje X en los puntos de inflexión media.
- ☐ B) Que tiene un límite vertical fijo que le impide superar el valor de 1.0.
- ☐ C) Que la curva se aproxima continuamente al eje horizontal pero nunca llega a tocarlo, extendiéndose teóricamente desde menos infinito hasta más infinito.
- ☐ D) Que es una línea perfectamente recta paralela al eje vertical Y.
- ☐ E) Que carece por completo de colas o extremos probabilísticos.

27. Debido a la simetría perfecta de la Distribución Normal, ¿qué valores coinciden exactamente en su punto central más alto?

* 1 punto

- ☐ A) La media, la desviación estándar y la varianza.
- ☐ B) El error tipo I, el error tipo II y la potencia estadística.
- ☐ C) El estadístico, el estimador y el parámetro poblacional.
- ☐ D) La media, la mediana y la moda.
- ☐ E) El valor mínimo, el valor máximo y el rango de la muestra.

28. ¿En qué puntos geográficos de la curva normal se localizan matemáticamente sus 'puntos de inflexión'?

* 1 punto

- ☐ A) En los extremos teóricos de más y menos infinito.
- ☐ B) En el punto exacto donde se ubica la moda central.
- ☐ C) En los valores correspondientes a la media más/menos una desviación típica.
- ☐ D) En las coordenadas definidas por el nivel crítico de $p = 0.05$.
- ☐ E) En el lugar exacto donde la variable bajo estudio se transforma en discreta.

29. ¿Cómo se define formalmente la Hipótesis Nula (H_0)? *

1 punto

- ☐ A) Como la afirmación del investigador que sostiene la presencia de un efecto clínico de gran magnitud.
- ☐ B) Como una afirmación que propone la ausencia de efecto, relación o diferencia entre las variables bajo estudio.
- ☐ C) Como la conjetura científica que se acepta de forma definitiva sin necesidad de recolectar datos empíricos.
- ☐ D) Como una suposición metodológica que solo se formula cuando no se cumplen los supuestos paramétricos.
- ☐ E) Como el enunciado estadístico encargado de fijar el desvío estándar de una muestra.



30. ¿Qué sucede con el valor del coeficiente de correlación de Pearson si aplicamos una transformación lineal (como cambiar la unidad de medida de metros a pies) sobre las variables?

* 1 punto

- ☐ A) La correlación disminuye exactamente a la mitad.
- ☐ B) La correlación cambia su signo algebraico de positivo a negativo.
- ☐ C) La correlación se vuelve nula automáticamente.
- ☐ D) La correlación no se altera en absoluto.
- ☐ E) La correlación se duplica debido al cambio métrico.

Atrás

Enviar

Página 5 de 5

Borrar formulario

El formulario se creó en Ciclo Básico Común - Universidad de Buenos Aires. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



