

Repaso de Estadística **Segundo Parcial**

francfede16@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Repaso 2

11. ¿Qué postula en esencia el Teorema Central del Límite? *

1 punto

- ☐ A) Que si una muestra es lo suficientemente grande, la distribución muestral de la media seguirá aproximadamente una distribución normal, sin importar la forma de la distribución original de la población.
- ☐ B) Que el tamaño del efecto tiende a reducirse a cero a medida que el número de sujetos aumenta.
- ☐ C) Que las variables cualitativas nominales se transforman de forma espontánea en continuas al aumentar el tamaño muestral.
- ☐ D) Que la hipótesis nula siempre debe rechazarse cuando la muestra bajo estudio supera los 100 participantes.
- ☐ E) Que la varianza de cualquier población es siempre el doble del tamaño de la muestra seleccionada.

12. ¿Qué prueba estadística paramétrica está diseñada para comparar los promedios de una variable continua entre dos grupos de sujetos completamente distintos e independientes (por ejemplo, comparar Varones vs. Mujeres)?

* 1 punto

- ☐ A) Test de Friedman para rangos repetidos.
- ☐ B) Prueba t de Student para muestras independientes.
- ☐ C) Coeficiente de correlación por rangos de Spearman.
- ☐ D) ANOVA de una vía de medidas repetidas vinculadas.
- ☐ E) Prueba t de Student de una única muestra de contraste.



13. ¿Qué evalúa metodológicamente el modelo estadístico de un ANOVA de dos vías (o ANOVA de dos factores)? * 1 punto

- ☐ A) La correlación de rango simultánea establecida entre dos variables continuas altamente asimétricas.
- ☐ B) La diferencia exacta entre dos medidas repetidas tomadas sobre un único grupo homogéneo de sujetos.
- ☐ C) La existencia de diferencias en una variable dependiente cuantitativa continua entre muestras divididas y clasificadas según dos variables independientes categóricas (factores).
- ☐ D) El error estándar cometido por un investigador al reemplazar letras latinas por griegas en un informe.
- ☐ E) Exclusivamente la tasa de falsos negativos presentes cuando el tamaño muestral de la población es pequeño.

14. En un ANOVA de un factor con k niveles en la variable independiente y un tamaño muestral total de N sujetos, ¿cómo se calculan los grados de libertad 'Entre los grupos' y 'Dentro de los grupos', respectivamente? * 1 punto

- ☐ A) $gl_{entre} = N - 1$; $gl_{dentro} = n - 1$
- ☐ B) $gl_{entre} = k - 1$; $gl_{dentro} = N - k$
- ☐ C) $gl_{entre} = N - k$; $gl_{dentro} = k - 1$
- ☐ D) $gl_{entre} = k - 2$; $gl_{dentro} = N - 1$
- ☐ E) $gl_{entre} = N + k$; $gl_{dentro} = k * N$

15. ¿Cuáles son los valores paramétricos fijos que caracterizan a la denominada 'distribución normal unitaria' (o estandarizada)? * 1 punto

- ☐ A) Media = 1 y Desviación Estándar = 1.
- ☐ B) Media = 0 y Varianza = 0.
- ☐ C) Media = 100 y Desviación Estándar = 15.
- ☐ D) Media = 0 y Desviación Estándar = 1.
- ☐ E) Media = 50 y Desviación Estándar = 10.



16. Si en un diseño de tres o más grupos independientes los datos cumplen con el supuesto de normalidad pero VIOLAN el supuesto de homogeneidad de varianzas (heterocedasticidad), ¿qué alternativa paramétrica y qué prueba post-hoc asociada deben emplearse? * 1 punto

- ☐ A) Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis con comparaciones de Dunn.
- ☐ B) ANOVA de Welch con prueba post-hoc de Games-Howell.
- ☐ C) ANOVA de dos vías clásico con corrección estricta de Bonferroni.
- ☐ D) Prueba t de Student clásica combinada con el desvío absoluto de Wilcoxon.
- ☐ E) Mantener de forma obligatoria la hipótesis nula debido a la infracción técnica de supuestos.

17. ¿Cuál es la alternativa no paramétrica que sustituye a la prueba t de muestras independientes cuando los datos no siguen una distribución normal? * 1 punto

- ☐ A) Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.
- ☐ B) Prueba de Kruskal-Wallis.
- ☐ C) Prueba U de Mann-Whitney.
- ☐ D) Test de Friedman.
- ☐ E) ANOVA robusto de Welch.

18. ¿Bajo qué condición metodológica se acepta provisionalmente como verdadera la Hipótesis Alternativa (H1)? * 1 punto

- ☐ A) En el momento en que la hipótesis nula es retenida por falta de evidencia.
- ☐ B) Cuando el nivel de significación elegido por el investigador llega al valor máximo de 1.0.
- ☐ C) Únicamente cuando la evidencia empírica permite rechazar formalmente la hipótesis nula (H_0).
- ☐ D) Cuando la muestra estudiada presenta severas asimetrías y múltiples valores atípicos.
- ☐ E) Cuando el equipo de investigación comete de forma voluntaria un error de Tipo II.



19. Si un psicólogo clínico desea evaluar el nivel de ansiedad de un grupo de 25 pacientes evaluados en un diseño de 'antes' y 'después' de recibir una terapia breve, ¿qué prueba paramétrica es la adecuada? * 1 punto

- ☐ A) Prueba U de Mann-Whitney.
- ☐ B) Prueba de Kruskal-Wallis de rangos múltiples.
- ☐ C) Prueba t de Student para muestras independientes.
- ☐ D) Prueba t de Student para muestras apareadas (o medidas relacionadas).
- ☐ E) Análisis de Varianza (ANOVA) de dos factores cruzados.

20. ¿Cuál es la utilidad específica de las denominadas 'Pruebas Post-hoc' (como Tukey, Bonferroni o Dunnett) tras realizar un ANOVA? * 1 punto

- ☐ A) Comprobar el cumplimiento del supuesto de normalidad antes de calcular el estadístico global F.
- ☐ B) Identificar de manera específica entre qué pares de grupos concretos existen diferencias significativas, una vez que el ANOVA general ha resultado estadísticamente significativo.
- ☐ C) Transformar los valores métricos continuos en rangos no paramétricos cuando falla la homocedasticidad.
- ☐ D) Eliminar de forma automática las puntuaciones atípicas que distorsionan las medias aritméticas muestrales.
- ☐ E) Estimar el tamaño del efecto global calculando de forma directa el valor de la d de Cohen.

[Atrás](#)

[Enviar](#)

Página 5 de 5

[Borrar formulario](#)

El formulario se creó en Ciclo Básico Común - Universidad de Buenos Aires. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



