

Repaso de Estadística **Segundo Parcial**

francfede16@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Repaso 4

31. En estadística inferencial, ¿cómo se define y caracteriza conceptualmente la 'probabilidad'?

* 1 punto

- ☐ A) Como un valor empírico exacto obtenido únicamente a partir de muestras de menos de 30 casos.
- ☐ B) Como un concepto ideal que refiere a las frecuencias con las que ocurrirían las cosas si los eventos se repitieran un número infinito de veces en las mismas condiciones.
- ☐ C) Como un indicador cuantitativo diseñado para predecir con total certeza hechos individuales aislados.
- ☐ D) Como una medida que adopta valores negativos cuando los eventos bajo análisis son imposibles.
- ☐ E) Como un índice cualitativo que describe de forma subjetiva la opinión de un investigador.

32. Si un investigador decide reducir el nivel de significación estadística de un estudio, pasando de $\alpha = 0.05$ a uno más exigente de $\alpha = 0.01$, ¿qué consecuencia directa se genera?

* 1 punto

- ☐ A) Se incrementa de forma inmediata el riesgo de cometer un error de Tipo I.
- ☐ B) El tamaño total de la muestra recolectada disminuye de forma automática en el software.
- ☐ C) Se reduce la probabilidad de cometer un error de Tipo I, pero aumenta la probabilidad de incurrir en un error de Tipo II (β).
- ☐ D) Se duplica el valor absoluto de la potencia del contraste estadístico.
- ☐ E) Las variables continuas del estudio se transforman de inmediato en cualitativas ordinales.



33. En estadística inferencial, ¿cuál es la distinción conceptual y de nomenclatura entre un 'estadístico' y un 'parámetro'? * 1 punto

- ☐ A) El estadístico describe a toda la población y el parámetro describe únicamente a la muestra seleccionada.
- ☐ B) El estadístico es una característica fija y constante, mientras que el parámetro es una variable muestral.
- ☐ C) El estadístico describe una muestra y se representa con letras latinas; el parámetro describe una población y se representa con letras griegas.
- ☐ D) El estadístico se calcula con pruebas no paramétricas y el parámetro con pruebas cuantitativas paramétricas.
- ☐ E) No existe ninguna diferencia analítica; ambos términos se usan como sinónimos idénticos.

34. Si observamos un gráfico de dispersión donde a medida que aumentan los valores de la variable X, disminuyen los valores de la variable Y, ¿qué tipo de relación se evidencia? * 1 punto

- ☐ A) Relación directa o positiva.
- ☐ B) Relación inversa o negativa.
- ☐ C) Relación nula o ausencia de relación.
- ☐ D) Relación homocedástica exponencial.
- ☐ E) Relación causal unidireccional simétrica.

35. ¿Quién establece la probabilidad de cometer un error de Tipo I y en qué momento de la investigación se realiza? * 1 punto

- ☐ A) Se calcula automáticamente al finalizar el procesamiento de datos a través de un software.
- ☐ B) Queda determinada por la potencia estadística al concluir la interpretación de los resultados.
- ☐ C) La establece de forma voluntaria el investigador a priori (antes de recolectar datos) al fijar el nivel de significación (alfa).
- ☐ D) Depende de manera exclusiva del tamaño bruto total estimado para la población de origen.
- ☐ E) Se establece realizando un promedio ponderado de los errores cometidos en investigaciones pasadas.



36. ¿Cuál es el objetivo primordial de aplicar un Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía o un factor?

* 1 punto

- ☐ A) Estimar el coeficiente de correlación lineal presente entre dos variables dicotómicas continuas.
- ☐ B) Comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de más de dos grupos independientes, particionando la varianza total.
- ☐ C) Evaluar de forma exclusiva los coeficientes de asimetría y curtosis de una única variable aislada.
- ☐ D) Predecir la probabilidad matemática exacta de un suceso binario a lo largo de un número infinito de observaciones.
- ☐ E) Reemplazar de forma definitiva la necesidad de calcular pruebas post-hoc cuando la hipótesis nula es rechazada.

37. En una prueba de contraste de una sola muestra, ¿qué diferencia clave existe entre la utilización de la prueba Z y la prueba t de Student?

* 1 punto

- ☐ A) En la prueba t se conoce con precisión la desviación estándar poblacional, mientras que en la Z se desconoce.
- ☐ B) La prueba Z está diseñada para datos cualitativos nominales y la prueba t para datos cuantitativos discretos.
- ☐ C) En la prueba t se desconoce la desviación estándar poblacional y se recurre a la desviación muestral para estimarla, a diferencia de la prueba Z donde el desvío poblacional es conocido.
- ☐ D) La prueba Z constituye una herramienta no paramétrica pura, mientras que la prueba t es de naturaleza paramétrica.
- ☐ E) La prueba t carece por completo de grados de libertad en sus fórmulas explicativas.

38. ¿Cuál es la alternativa no paramétrica idónea para comparar más de dos grupos independientes cuando no se cumple el supuesto de normalidad en las puntuaciones continuas?

* 1 punto

- ☐ A) ANOVA de una vía de medidas repetidas.
- ☐ B) Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.
- ☐ C) Prueba de Kruskal-Wallis.
- ☐ D) Test no paramétrico de Friedman.
- ☐ E) Coeficiente de correlación por rangos de Spearman.



39. ¿Qué rango numérico de valores puede adoptar formalmente un coeficiente de correlación lineal? * 1 punto

- ☐ A) De 0 a 100.
- ☐ B) De 0 a 1.
- ☐ C) De -1 a 1.
- ☐ D) Cualquier número real desde menos infinito hasta más infinito.
- ☐ E) De -0.5 a 0.5.

40. ¿Cómo se define operativamente un 'grado de libertad' (gl) en el cálculo de un estadístico inferencial? * 1 punto

- ☐ A) Como el margen máximo de error subjetivo que se le permite cometer a los encuestadores de un estudio.
- ☐ B) Como la cantidad de valores independientes que pueden variar libremente en un cálculo estadístico después de imponer una restricción matemática.
- ☐ C) Como el número total de sujetos estudiados multiplicado por las hipótesis de investigación declaradas.
- ☐ D) Como el porcentaje complementario de confianza que se obtiene al restar el valor del nivel de significación alfa.
- ☐ E) Como la ubicación posicional exacta de la mediana dentro de una distribución altamente asimétrica.

[Atrás](#)

[Enviar](#)

Página 5 de 5 [Borrar formulario](#)

El formulario se creó en Ciclo Básico Común - Universidad de Buenos Aires. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



