


¿Qué estadística inferencial aplicar?


Hoja 1 — Selección general y Rama [A] · Relación entre variables



¿Qué estadística inferencial aplicar?

Hoja 2 — Rama [B] · Comparación de grupos

[B] COMPARACION DE GRUPOS (1 cualitativa x 1 cuantitativa)



FUNCION DE LAS PRUEBAS POST-HOC:
 Si ANOVA da significativo ($p \leq \alpha$), ANOVA solo dice que AL MENOS un grupo difiere. El post-hoc identifica ENTRE QUE PARES esta la diferencia, controlando α global.

¿Qué estadística inferencial aplicar?

Hoja 3 — Rama [C] · Interpretación de resultados

[C] INTERPRETACION DE RESULTADOS YA OBTENIDOS

p-VALOR (nivel crítico)

p ≤ alpha (0.05) --> RECHAZAR H₀ (resultado significativo)
p > alpha (0.05) --> MANTENER H₀ (no significativo)

El p-valor es la probabilidad del resultado observado SUPONIENDO que H₀ es verdadera. No es la probabilidad de que H₀ sea cierta.

ERRORES POSIBLES

Error TIPO I = alpha Rechazar H₀ siendo verdadera (FALSO POSITIVO)
Error TIPO II = beta Mantener H₀ siendo falsa (FALSO NEGATIVO)

Bajar alpha (ej 0.05 -> 0.01)
--> baja prob. de Error I
--> SUBE prob. de Error II
No se pueden minimizar ambos a la vez.

TAMAÑO DEL EFECTO (umbrales de Cohen, 1992)

	pequeño	mediano	grande
r (Pearson)	0.10	0.30	0.50
d (Cohen)	0.20	0.50	0.80
eta ² (ANOVA)	0.01	0.06	0.14

El tamaño del efecto NO depende del N muestral.
Mide la magnitud REAL del fenómeno.

COMBINACION p-VALOR x TAMAÑO DEL EFECTO

Significativo + efecto grande --> Hallazgo robusto y relevante
Significativo + efecto pequeño --> Significancia trivial
(inflada por N grande)
No signif. + efecto grande --> Muestra insuficiente (baja potencia)
No signif. + efecto pequeño --> No hay efecto detectable

/!\ Con N muy grande (ej N=2000), diferencias minimas dan p < 0.05 sin relevancia practica.

CORRELACION ≠ CAUSALIDAD

Un r alto y significativo NO permite afirmar causalidad.
Pensar siempre en:
- Variables CONFUSORAS (tercera variable)
- Causalidad INVERSA (Y causa X, no al reves)
- Diseño NO EXPERIMENTAL no permite afirmar causa

COMO USAR LA GUIA

1. Identifico la rama [A], [B] o [C] segun lo que pide el caso.
2. Bajo por los rombos de decision respondiendo al enunciado.
3. Llego al endpoint con el nombre de la prueba (o el marco de interpretacion). La conclusion clinica la escribo yo.