

En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?

Compasión y Loving-Kindness Meditation

Clase 19
12 de mayo



Empatía y neurociencia

1. La capacidad del cerebro replicar la activación cerebral al ver un estímulo en otra persona, **como si le estuviera ocurriendo a uno.**



¿Qué siente esta persona?
si no, ¿qué he sentido yo que me haría verme como esta persona se ve?

2. La capacidad del cerebro de proyectar el uno mismo, para **cambiar el punto de vista desde el cual se observa una situación.**



¿Cuál es el contexto de esta persona?
¿Qué está ella percibiendo que yo no percibo?

3. La capacidad del cerebro de **inhibir el propio conocimiento.**



¿En qué se diferencia lo que sabe o cree esta persona de lo que yo sé o creo?

Empatía desde la **psicología**


- **Empatía cognitiva:** capacidad para identificar y comprender las emociones de los demás.
- **Empatía afectiva:** capacidad para sentir y conectar con las emociones, sensaciones y sentimientos de los demás.



Comprensión empática



Importancia de la experiencia



COMPASIÓN



Compasión, según la RAE

compasión

Del lat. tardío *compassio*, *-ōnis*.

1. **f.** Sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien.

Definiciones de Compasión

Compasión es el sentimiento que surge al ser testigo del sufrimiento de otro y que **motiva un deseo de ayudar**.

Goetz, J. L. et al. (2010)

"Compassion: an evolutionary analysis and empirical review."

La compasión a menudo se considera una fortaleza humana importante, que requiere un sentido de cuidado, empatía y simpatía, cada uno de los cuales permite a uno conectarse y cuidar al otro. De notable relevancia para la salud mental, la compasión no es solo un proceso que construye relaciones positivas con los demás; también es un camino vital para liberar a la mente humana de los efectos de las emociones negativas dañinas (Wang 2005)

Mongrain, M. et al (2010).

Practicing compassion increases happiness and self-esteem.

The relationship of dispositional compassion with well-being: a study with a 15-year prospective follow-up

Aino I. L. Saarinen^{a,b}, Liisa Keltikangas-Järvinen^b, Laura Pulkki-Råback^b, Claude Robert Cloninger^{id}^c, Marko Elovainio^{b,d}, Terho Lehtimäki^e, Olli Raitakar^f and Mirka Hintsanen^a

^aResearch Unit of Psychology, University of Oulu, Oulu, Finland; ^bDepartment of Psychology and Logopedics, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland; ^cDepartment of Psychiatry, Washington University, St. Louis, USA; ^dNational Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland; ^eDepartment of Clinical Chemistry, Fimlab Laboratories and Finnish Cardiovascular Research Center-Tampere, Faculty of Medicine and Life Sciences, University of Tampere, Tampere, Finland; ^fResearch Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine, University of Turku, Finland; Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, Turku University Hospital, Turku, Finland

ABSTRACT

We investigated the associations of individual's compassion for others with his/her affective and cognitive well-being over a long-term follow-up. We used data from the prospective Young Finns Study ($N = 1312\text{--}1699$) between 1997–2012. High compassion was related to higher indicators of affective well-being: higher positive affect ($B = 0.221, p < .001$), lower negative affect ($B = -0.358, p < .001$), and total score of affective well-being (the relationship of positive versus negative affect) ($B = 0.345, p < .001$). Moreover, high compassion was associated with higher indicators of cognitive well-being: higher social support ($B = 0.194, p < .001$), life satisfaction ($B = 0.149, p < .001$), subjective health ($B = 0.094, p < .001$), optimism ($B = 0.307, p < .001$), and total score of cognitive well-being ($B = 0.265, p < .001$). Longitudinal analyses showed that high compassion predicted higher affective well-being over a 15-year follow-up ($B = 0.361, p < .001$) and higher social support over a 10-year follow-up ($B = 0.230, p < .001$). Finally, compassion was more likely to predict well-being ($B = [-0.076; 0.090]$) than vice versa, even though the predictive relationships were rather modest by magnitude.

ARTICLE HISTORY

Received 11 September 2018
Accepted 12 August 2019


KEYWORDS

Compassion; personality;
well-being; happiness;
longitudinal

Mayor compasión
relacionada con:

- mayor PA, menor NA,
- mayor satisfacción con la vida
- mayor optimismo

Compasión predice bienestar
más claramente que al revés



Compasión desde otras perspectivas

El que lastima y el lastimado son uno solo.

Arthur Schopenhauer

*Soy el que tiende la red, soy el pájaro,
soy la imagen, el espejo,
el grito y el eco.*

Jalal-Uddin Rumi (en JL Borges *¿Qué es el budismo?*)

Meditación LKM (Loving-Kindness Meditation)



<https://www.youtube.com/watch?v=0Hhf-GAkCUU>

Loving-Kindness Meditation (LKM)

- Basada en antigua práctica del budismo
- Meditación = Ejercicio mental
- Mucha evidencia científica avala su efectividad

"Vamos a mandar unos pensamientos amables, vamos a empezar por nosotros mismos, y luego lo haremos por otras personas."

*"Deseo lo siguiente **para ti: deseo que tu corazón esté tranquilo, que tenga alegría, que tenga salud, que sea feliz**"*



Loving-Kindness Meditation Increases Social Connectedness

Cendri A. Hutcherson, Emma M. Seppala, and James J. Gross
Stanford University

La necesidad de conexión social es fundamental en los humanos. Sentirse conectado socialmente confiere beneficios para la salud mental y física. Sin embargo, en muchas culturas, los cambios sociales están conduciendo a una creciente desconfianza social y alienación.

¿Se pueden aumentar los sentimientos de conexión social y positividad hacia los demás? ¿Es posible autogenerar estos sentimientos?

En este estudio, se utilizó un breve ejercicio de LKM para examinar si se podía crear una conexión social con extraños en un contexto controlado de laboratorio. En comparación con un grupo control, incluso unos pocos minutos de LKM aumentaron los sentimientos de conexión social y positividad hacia las personas nuevas [...].

Estos resultados sugieren que esta técnica de fácil implementación puede ayudar a **aumentar las emociones sociales positivas y disminuir el aislamiento social**.

LKM Incrementa la Conexión Social

Evaluación:

[...] medimos las respuestas evaluativas (conectado, similar, y positivo) de los participantes a fotografías de ellos mismos, otro cercano, así como tres extraños neutrales, emparejados con el género, la edad y la edad del participante[...]

Para controlar los efectos no específicos de la meditación sobre la respuesta emocional general (no social), también evaluamos las respuestas a un objeto no social (una lámpara).


Resultados:

- Solo el grupo **LKM reportó un incremento del ánimo positivo**
- Solo el grupo LKM se volvió significativamente más positivo hacia los extraños neutrales y hacia el objeto

Mindfulness (2014) 5:249–258
DOI 10.1007/s12671-012-0172-8

ORIGINAL PAPER

Tracking Longitudinal Changes in Affect and Mindfulness Caused by Concentration and Loving-kindness Meditation with Hierarchical Linear Modeling



ORIGINAL PAPER

Loving-Kindness Meditation Promotes Mental Health in University Students

Christina Totzeck¹ · Tobias Teismann¹ · Stefan G. Hofmann² · Ruth von Brachel¹ · Verena Pflug³ · Andre Wannemüller¹ · Jürgen Margraf¹

Published online: 2 May 2020

© The Author(s) 2020

LKM promueve la salud mental en estudiantes universitarios (Totzek y colegas 2020)

Objetivos

Se ha demostrado que la (LKM) mejora el bienestar y las emociones positivas en poblaciones clínicas y no clínicas. El objetivo principal del presente estudio fue examinar si LKM podría ser una intervención eficaz para promover la salud mental positiva utilizando la Escala de Salud Mental Positiva (PMH) y disminuir la depresión, la ansiedad y el estrés en estudiantes universitarios.

Métodos

La muestra (n = 110) estuvo formada por estudiantes universitarios en Alemania. La mitad de ellos (n = 55) se sometieron a intervención LKM. Se compararon con un grupo de control emparejado (n = 55) que no recibió tratamiento. Todos los participantes completaron la *medida de salud mental positivas y negativas* al inicio y evaluaciones de seguimiento de 1 año. Participantes de LKM adicionalmente completaron las mismas medidas antes y después del tratamiento. Se llevaron a cabo múltiples análisis de varianza para verificar efectos a largo plazo de LKM sobre medidas de salud mental positivas y negativas.

LKM promueve la salud mental en estudiantes universitarios (Totzek y colegas 2020)

Resultados Se encontró un efecto significativo a corto plazo de LKM sobre la ansiedad y la PMH. Los análisis a largo plazo revelaron una significativa disminución de la depresión, ansiedad y estrés para quienes completan LKM, y un aumento significativo de depresión, ansiedad y estrés para el grupo de control.

Conclusiones

Los resultados sugieren que LKM mejora la salud mental en estudiantes universitarios.

LKM promueve la salud mental en estudiantes universitarios (Totzek y colegas 2020)

Participantes

Grupo de intervención: 55 estudiantes de la Universidad de Bochum, seleccionados para participar en grupo LKM. 40 de ellos siguen practicando LKM después de 6 meses. Media de avance: en la carrera 5 semestres. Edad promedio: 22.8 años. Debieron practicar la **LKM al menos 5 días a la semana**.

Grupo de control: 55 estudiantes de la misma universidad, seleccionados de tal manera de tener el mismo nivel de avance, edad promedio y facultad de origen.

Table 1 Baseline scores of the DASS, PMH, and SHS in the LKM group and control group and mean differences between both groups

Measures	Group	Mean score	SD	Mean difference between groups	Sign. <i>p</i>
DASS-D	LKM	5.73	5.19	1.66	.092
	Control group	4.07	4.11		
DASS-A	LKM	4.36	4.26	1.39	.078
	Control group	2.97	3.10		
DASS-S	LKM	7.76	4.94	1.33	.181
	Control group	6.44	4.57		
PMH	LKM	17.34	6.33	− 0.933	.461
	Control group	18.27	5.83		
SHS	LKM	18.59	4.63	− 1.22	.203
	Control group	19.81	4.59		

DASS Depression, Anxiety, and Stress Scale, *PMH* Positive Mental Health Scale, *SHS* Subjective Happiness Scale, *LKM* loving-kindness meditation

Table 2 Mean differences, standard errors, and *p* values of the DASS, PMH, and SHS between pre- and post-LKM intervention

Measures	Mean scores (SD)		Mean difference	Standard error	Sign. <i>p</i>	95% CI	
	Time 2	Time 3				LL	UL
DASS-D	5.06 (4.41)	3.57 (3.23)	−1.49	.84	.084	−0.208	3.187
DASS-A	4.59 (3.84)	2.45 (2.62)	−2.15**	.68	.003	0.787	3.511
DASS-S	8.19 (4.90)	7.55 (4.09)	−0.68	.97	.515	−1.318	2.595
PMH	16.28 (6.52)	19.40 (4.56)	3.13*	1.19	.012	−5.521	−0.734
SHS	16.21 (3.98)	17.59 (5.43)	1.38	.94	.148	−3.274	0.509

DASS Depression, Anxiety, and Stress Scale, PMH Positive Mental Health Scale, SHS Subjective Happiness Scale, CI confidence interval, LL lower level, UL upper level. Time 2, pre-intervention; time 3, post-intervention

Time 2: pre-intervención, 5 meses después de Time 1 (=baseline)

Time 3: post-intervención; 1 mes después de Time 2

Time 4: un año después de Time 1.

Table 3 Mean differences, standard errors, and *p* values of the DASS, PMH, and SHS between baseline and follow-up assessment

Measures	Group	Time		Mean difference	Standard error	Sign. <i>p</i>	95% CI	
							LL	UL
DASS-D	LKM	1	4	− 2.82**	.60	.000	1.630	4.020
	Control group	1	4	1.76*	.62	.005	− 2.989	− 0.537
DASS-A	LKM	1	4	− 1.10*	.53	.040	0.053	2.147
	Control group	1	4	0.58	.54	.287	− 1.654	0.496
DASS-S	LKM	1	4	− 2.17**	.64	.001	0.892	3.458
	Control group	1	4	1.42*	.66	.035	− 2.737	− 0.105
PMH	LKM	1	4	0.95	.91	.300	− 2.763	0.863
	Control group	1	4	− 0.71	.93	.449	− 1.149	2.570
SHS	LKM	1	4	1.02	.64	.116	− 2.311	0.261
	Control group	1	4	− 1.47*	.66	.029	0.155	2.793

DASS, Depression, Anxiety, and Stress Scale, *PMH* Positive Mental Health Scale, *SHS* Subjective Happiness Scale, *CI* confidence interval, *LL* = lower level, *UL* = upper level. Time 1, baseline; time 4, follow-up

Loving-Kindness Meditation for Posttraumatic Stress Disorder: A Pilot Study

David J. Kearney,^{1,2} Carol A. Malte,³ Carolyn McManus,⁴ Michelle E. Martinez,⁵ Ben Felleman,⁵
and Tracy L. Simpson^{3,6}

¹VA Puget Sound Health Care System, Department of Medicine, Seattle, Washington, USA

²Department of Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington, USA

³Center of Excellence in Substance Abuse Treatment and Education, VA Puget Sound Health Care System, Seattle, Washington, USA

⁴Swedish Medical Center, Department of Physical Therapy, Seattle, Washington, USA

⁵VA Puget Sound Health Care System, Seattle, Washington, USA

⁶Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington, USA

LKM para trastorno de estrés post-traumático

La meditación de amabilidad amorosa es una práctica diseñada para mejorar los sentimientos de bondad y compasión por uno mismo y por los demás e implica la repetición de frases de intención positiva para uno mismo y los demás. Realizamos una prueba piloto abierta de meditación de bondad amorosa para veteranos con trastorno de estrés postraumático (PTSD).

Las medidas de PTSD, depresión, autocompasión y atención plena se obtuvieron al inicio del estudio, después de un curso de meditación de bondad amorosa de 12 semanas y 3 meses después. [...]

Se encontró una gran disminución para los síntomas de PTSD a los 3 meses de seguimiento ($d = -0,89$), y se **encontró una disminución media para la depresión a los 3 meses de seguimiento** ($d = -0,49$). [...]

CIERRE

Ticket de salida

Código: [redirige](#)