

En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?

Autocompasión – parte 3

CLASE 22
28 de mayo



Autocompasión

1

Auto amabilidad

Me trato como trataría a alguien que quiero mucho



2

Humanidad Común

Muchos seres humanos están o han vivido lo mismo que yo



3

Mindfulness

*Tomo perspectiva:
"tengo pena pero la pena no soy yo"*



Resultados primer estudio

TABLE 1 Zero-Order Correlations between Study Variables

Measure	SCS	Mast	P-App	P-Avd	FF	PC	IM	Anx	GPA	Gender
Self-compassion (SCS)	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mastery Goals (Mast)	.28**	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Performance-Approach (P-App)	-.13*	.24**	1.00	—	—	—	—	—	—	—
Performance-Avoidance (P-Avd)	-.29**	.04	.61**	1.00	—	—	—	—	—	—
Fear of Failure (FF)	-.51**	-.32**	.26**	.43**	1.00	—	—	—	—	—
Perceived Competence (PC)	.35**	.45**	.12	-.16*	-.36**	1.00	—	—	—	—
Intrinsic Motivation (IM)	.30**	.71**	.24**	.04	-.24**	.45**	1.00	—	—	—
Anxiety (Anx)	-.66**	-.22**	.15*	.28**	.58**	-.44**	-.34**	1.00	—	—
GPA	-.03	.20**	.17*	-.07	-.07	.24**	.22**	-.07	1.00	—
Gender	-.14*	.00	.06	.15*	.07	-.05	.09	.07	.11	1.00


Note: N = 222. Gender is coded: 0 = Males; 1 = Females.

* $p < .05$; ** $p < .01$.

Correlaciones Autocompasión

Negativamente con:

- **Ansiedad**
- **Miedo al fracaso**
- Orientación al desempeño



Positivamente con:

- Orientación al dominio
- Motivación intrínseca

Enfrentando el sufrimiento con amabilidad (Smeets y colegas, 2014)

Meeting Suffering With Kindness: Effects of a Brief Self-Compassion Intervention for Female College Students

Elke Smeets,¹ Kristin Neff,² Hugo Alberts,¹ and Madelon Peters¹

¹ Maastricht University

² University of Texas at Austin

Objetivo

Se investigó la efectividad de una **intervención grupal de autocompasión de 3 semanas** recientemente desarrollada para mejorar la resiliencia y el bienestar entre estudiantes universitarias.

Método

52 estudiantes fueron asignadas al azar a una intervención diseñada para enseñar habilidades de autocompasión (n = 27) o una intervención de grupo de control activo en la que se enseñaron habilidades generales de manejo del tiempo (n = 25).

Ambas intervenciones constaron de 3 reuniones grupales realizadas durante 3 semanas.

Para medir las ganancias de resiliencia y bienestar, las participantes completaron una serie de cuestionarios antes y después de la intervención.

Resultados

Los resultados mostraron que una intervención de autocompasión condujo a:

- Aumentos significativos en autocompasión, atención plena, optimismo y autoeficacia
- Una disminución significativamente mayor en la rumiación en comparación con la intervención de control activo.

Si bien ambas intervenciones aumentaron la satisfacción con la vida y la conexión, no se encontraron diferencias para la preocupación y el estado de ánimo.

Conclusión

Estos hallazgos sugieren que una breve intervención de autocompasión tiene potencial para mejorar la resiliencia y el bienestar de los estudiantes.

Autocompasión y otras escalas

Table 1
Bivariate Associations Between Study Variables at Pretest ($N = 52$)

Measure	SC	M-AWJ	M-NR	LS	CON	OPT	SEF	PA	NA	RUM
M-AWJ	.53**									
M-NR	.52**	.22								
LS	.55**	.50**	.16							
CON	.48**	.60**	.15	.56**						
OPT	.59**	.53**	.34**	.47**	.44**					
SEF	.56**	.49**	.47**	.44**	.30*	.63**				
PA	.27*	.39**	-.03	.21	.22	.05	-.02			
NA	-.40**	-.43**	-.04	-.35**	-.40**	-.15	-.07	-.79**		
RUM	-.38**	-.50**	-.09	-.21	-.30*	-.40**	-.36**	-.24	.24	
WOR	-.63**	-.52**	-.46**	-.41**	-.43**	-.59**	-.44**	-.30*	.27*	.50**

Note. SC = Self-Compassion; M-AWJ = Mindfulness Accept without Judgment; M-NR = Mindfulness Nonreactivity to Inner Experience; LS = Life Satisfaction; CON = Connectedness; OPT = Optimism; SEF = Self-Efficacy; PA = Positive Affect; NA = Negative Affect; RUM = Rumination; WOR = Worry.

* $p \leq .05$. ** $p \leq .01$.

Correlación positiva:

- **Satisfacción con la vida**
- **Optimismo**
- **Auto-eficacia**
- **Ánimo positivo (PA)**

Correlación negativa:

- **Animo negativo (NA)**
- **Rumiación**
- **Preocupación**

Table 2

Pretest and Posttest Mean Scores by Group, Interaction Effects Analysed With 2 (Group) × 2 (Time) Repeated Measures ANOVAs, and Cohen's d Effect Sizes Calculated With Gain Scores

Outcome	Self-compassion group <i>N</i> = 27		Control group <i>N</i> = 25		<i>F</i>	Cohen
	Pretest <i>M</i> (<i>SD</i>)	Posttest <i>M</i> (<i>SD</i>)	Pretest <i>M</i> (<i>SD</i>)	Posttest <i>M</i> (<i>SD</i>)		
Self-compassion	3.79 (.78)	4.60 (.72)	4.15 (.83)	4.11 (.88)	16.34**	1.19
Mindfulness AWJ	30.48 (5.68)	33.11 (5.49)	29.90 (5.90)	29.31 (6.34)	5.67*	.70
Mindfulness NR	19.00 (3.69)	21.85 (3.22)	20.32 (4.07)	19.09 (3.64)	17.26**	1.20
Life satisfaction	25.37 (4.87)	27.56 (4.99)	25.05 (5.91)	26.27 (5.10)	1.05	.30
Connectedness	88.78 (11.93)	91.69 (11.99)	86.23 (15.15)	87.36 (13.58)	1.27	.33
Optimism	19.04 (3.28)	22.19 (3.77)	19.22 (4.25)	20.59 (4.75)	4.98*	.66
Self-efficacy	28.22 (3.99)	30.11 (3.47)	29.32 (3.94)	29.45 (4.21)	3.25 [†]	.52
Positive affect	26.41 (6.54)	26.26 (4.97)	26.05 (5.01)	25.05 (4.58)	.31	.15
Negative affect	20.26 (7.21)	20.07 (5.74)	19.91 (7.01)	19.95 (6.18)	.06	.07
Rumination	10.44 (3.18)	9.04 (2.68)	10.64 (3.40)	11.05 (3.08)	5.87*	.70
Worry	33.30 (10.79)	31.74 (8.91)	33.68 (11.51)	33.27 (10.20)	.44	.19

Note. ANOVA = analysis of variance; SD = standard deviation; AWJ = Accept Without Judgment; NR = Nonreactivity to Inner Experience.

p* < .05. *p* < .01. [†]*p* = .08.

Se observan mejoras significativas en:

- Autocompasión
- Mindfulness
- Optimismo
- Rumiación

El programa de autocompasión de Neff y Germer 2012

A lo largo del programa, **se utilizan ejercicios interpersonales para generar una experiencia de autocompasión, facilitando sentimientos de humanidad común.** Por ejemplo, los participantes pueden compartir en grupos pequeños el lenguaje que usan cuando se critican a sí mismos y discutir cómo usar un lenguaje más amable y de mayor apoyo. Se enseñan prácticas informales como poner las manos en el corazón en momentos de estrés o repetir una serie de frases de autocompasión memorizadas para usar en la vida diaria.

Las prácticas en el hogar se asignan al final de cada sesión, como escribir una carta a uno mismo desde la perspectiva de un amigo idealmente compasivo. También se enseñan prácticas de meditación formal, incluida la meditación de bondad amorosa (LKM), y una variante de LKM que enfatiza la compasión por los sentimientos de incapacidad o estrés.

Un estudio piloto sobre programa de auto-compasión (Neff y colegas, 2012)

Participantes: **21 participantes mujeres** que respondieron a un llamado de publicidad; promedio de edad 51.26 años

Programa: **8 semanas**

Se midió, antes y después de la intervención indicadores, de satisfacción con la vida, felicidad, ansiedad, depresión, conexión social, estrés.

Table 1

*Pretest and Posttest Scores for the Pilot MSC Group Analyzed With Matched-Pairs *t* Tests*

Outcome	Pretest <i>M</i> (<i>SD</i>)	Posttest <i>M</i> (<i>SD</i>)
Self-compassion	2.58 (0.65)	3.47 (0.79)**
Mindfulness	2.43 (0.49)	2.85 (0.71)*
Social connectedness	4.02 (0.88)	4.24 (0.57)
Life satisfaction	3.62 (1.65)	4.40 (1.49)**
Happiness	3.83 (1.50)	4.57 (1.36)*
Depression	1.45 (0.22)	1.22 (0.21)**
Anxiety	2.99 (0.72)	2.44 (0.81)**
Stress	3.14 (0.72)	2.73 (0.87)*

Note. MSC = mindful self-compassion; M = mean; SD = standard deviation.

t test significant at * $p < .05$ and ** $p \leq .001$.

Los participantes del taller mejoran en autocompasión, mindfulness, satisfacción con la vida, felicidad, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de estrés

Table 2

Pretest and Posttest Mean Scores by Group and MSC Intervention Effects Analyzed With 2 (Group) X 2 (Time) Repeated Measures Analyses of Variance, and Effect Sizes Using Cohen's d (Calculated With Gain Scores)

Outcome	MSC group		Control group		<i>F</i>	Effect size Cohen's <i>d</i>
	Pretest <i>M (SD)</i>	Posttest <i>M (SD)</i>	Pretest <i>M (SD)</i>	Posttest <i>M (SD)</i>		
Self-compassion	2.65 (0.68)	3.78 (0.60)	2.75 (0.71)	2.93 (0.67)	31.79**	1.67
Mindfulness	2.46 (0.62)	2.92 (0.51)	2.47 (0.62)	2.60 (0.56)	8.03**	.60
Other-compassion	4.17 (0.44)	4.46 (0.47)	4.17 (0.49)	4.16 (0.41)	11.91**	.68
Social connectedness	3.68 (1.07)	4.09 (0.99)	3.42 (1.07)	3.69 (1.13)	0.38	.13
Life satisfaction	3.61 (1.59)	4.48 (1.61)	3.60 (1.57)	3.70 (1.61)	8.09**	.51
Happiness	3.86 (1.20)	4.38 (1.14)	3.46 (1.47)	3.78 (1.58)	0.62	.15
Depression	1.74 (0.34)	1.33 (0.29)	1.61 (0.43)	1.56 (0.46)	17.42**	.86
Anxiety	3.04 (0.71)	2.44 (0.74)	3.01 (0.70)	2.94 (0.73)	10.88**	.76
Stress	3.11 (0.59)	2.80 (0.70)	3.11 (0.56)	3.03 (0.60)	4.13*	.37
Avoidance	2.40 (0.75)	2.01 (0.71)	2.13 (0.75)	2.15 (0.82)	4.48*	.50

Note. MSC = mindful self-compassion; M = mean; SD = standard deviation.

p* < .05. *p* < .01.

Los participantes del taller mejoran en autocompasión, mindfulness, satisfacción con la vida, felicidad, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de estrés

¿Cómo avanzamos hacia la autocompasión en momentos difíciles?



Loving Kindness Meditation



1. Recuerda un momento difícil, no abrumador, en el que no hayas sido autocompasivo/a
2. ¿Cuál emoción incómoda sentiste en ese momento difícil?
3. ¿Que otras emociones incómodas sientes frecuentemente?

Ejemplos de emociones “incómodas”

Tristeza	Ansiedad	Desesperación	Inquietud	Vulnerabilidad	Desconfianza
Miedo	Preocupación	Impotencia	Anticipación	Soledad	Sospecha
Ira	Tensión	Agobio	Expectativa	Desamparo	Rechazo
Asco	Estrés	Enfado	Temor	Envidia	Desprecio
Culpa	Aburrimiento	Rabia	Pánico	Aversión	Humillación
Vergüenza	Indiferencia	Resentimiento	Terror	Desagrado	Incredulidad
Remordimiento	Desilusión	Rencor	Hostilidad	Repulsión	Fastidio
Frustración	Decepción	Celos	Irritación	Confusión	Amargura

“ Ying y Yang” de los mensajes autoamables

1. Contención

Relacionado con entregar:

- Validación (por ejemplo, de cómo te sientes)
- Confort emocional y físico



2. Llamado a la Acción:

- Protección (por ejemplo de las acciones de otros)
- Motivación



3. Mensajes amables

- Piensa frases que otros te han dicho y te han transmitido cariño en momentos difíciles. Anótalas
- Piensa en aquellas frases que otros te han dicho y te han dado ánimo para tomar acción. Anótalas



Mensajes del curso:

Contención y validación

- Estoy aquí para cuando me necesites
- Es válido que te sientas así
- Es normal
- Te quiero
- Eres más capaz de lo que crees
- Nunca dejaré de quererte

Acción / protección / ánimo

- Estoy aquí para cuando me necesites
- Te está haciendo mal
- Podemos buscar una solución
- Eres más capaz de lo que crees
- No seas tan dura contigo
- Trata de verte desde los ojos de otro
- Aléjate de esa persona

4. ¿Qué mensaje amable te ha servido?

Selecciona uno o más mensajes amables que podrías haberte dicho en la situación difícil que elegiste



Actividad de autocompasión

1. Con los ojos cerrados, piensa en la situación difícil, recuerda la emoción que sentiste.
2. ¿Qué emoción estás sintiendo? Responde internamente
3. Ubica la emoción en el cuerpo, siente el resto de tu cuerpo
4. Transmite calor y relajación a esa zona; tócala con tu mano si quieres
5. En modo LKM piensa en la persona querida y redirige ese amor a ti mismo/a, entrégate mensajes autoamables.
6. Si identificas mensajes poco amables transmite amor y comprensión a esa parte de ti que (en el fondo) quiere que seas mejor.

Para recordar en momentos difíciles

- sentir tu cuerpo e identificar/nombrar tus emociones
- tomar perspectiva
- redirigir cariño a ti mismo/a
- usar mensajes autoamables
- recordar que tus emociones son válidas y que sufrir es normal
- ser compasivo con la parte de ti que no lo es

General Self-Compassion Break

https://self-compassion.org/wp-content/uploads/2020/08/self-compassion.break__01-cleanedbydan.mp3

Rememora un pequeño sufrimiento, piensa en una situación difícil, de estrés, un problema con una relación, una preocupación por algo que pudiera suceder. Debe ser una situación difícil pero no muy abrumadora.

Conéctate con esa situación, qué está pasando, que podría pasar, trae la situación a tu mente.

Usa estas frases para recordar los 3 componentes de la autocompasión:

1. **Encuentra un mensaje para transmitirte cariño a ti mismo/a** en situación con la estás lidiando. **Encuentra un mensaje para transmitirte ánimo** o llevarte a la acción en este momento.
1. El sufrimiento es parte de la vida, **encuentra un mensaje para decirte a ti mismo que no es anormal sentirse así**, mucha gente ha pasado por una situación similar, quizás diferente en el grado de sufrimiento, pero es parte de la vida, parte de ser humano.
1. **Encuentra un mensaje para decirte a ti mismo/a, que reconozca que este es un momento difícil con el que estás lidiando.** Puedes decirte a ti mismo/a que algo te duele o nombrar la emoción que estás sintiendo.

Puedes nombrarte a ti mismo por tu nombre, cualquier forma en que se sienta natural expresar tu profundo deseo de estar bien y libre de sufrimiento.

Ahora, finalizando el ejercicio, trata de notar cómo se siente tu cuerpo, date permiso para sentir cualquier sensación, siéntela tal como es en este momento.