

En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?

Autocompasión – parte 2

CLASE 21
26 de mayo



Autocompasión

1

Auto amabilidad

Me trato como trataría a alguien que quiero mucho



2

Humanidad Común

Muchos seres humanos están o han vivido lo mismo que yo




3

Mindfulness

*Tomo perspectiva:
"tengo pena pero la pena no soy yo"*



Menti




Ticket de salida

1. ¿Tiene algún fundamento científico como afecta la autocompasión en uno mismo?
2. ¿Cuando la auto compasión se pasa al otro extremo de justificar actitudes propias que son “negativas” ¿cómo puede la autocompasión coexistir con la autocrítica?
3. ¿Cómo evitar el compararse negativamente con otros, para lograr una mayor compasión con uno mismo?
4. ¿Por qué no es tan fácil ser autocompasivo a veces? A pesar de tener todas las intenciones del mundo
5. Me pregunto cómo una persona con depresión o con trastornos mentales puede trabajar en su autocompasión, ¿es más difícil?
6. ¿Cómo se puede presentar la autocompasión en momentos de bloqueo mental extremos?


Actividad Grupal

1. Los integrantes de cada grupo escoge la afirmación que les parece más correcta y argumentan por qué:
 - a) "La autocompasión, puede llevar a la autocomplacencia lo cual se opone al crecimiento personal"
 - b) "La autocompasión aporta al bienestar emocional, lo que promueve el crecimiento personal."


Autocompasión (SCS) vs. Ánimo Positivo (PA) [N = 46, $r = 0.5$]




Autocompasión (SCS) vs. Ánimo Positivo (PA) [N = 533, $r = 0.52$]




Autocompasión (SCS) vs. Ánimo Negativo (NA) [N = 46, $r = -0.7$]




Autocompasión (SCS) vs. Ánimo Negativo (NA) [N = 533, $r = -0.59$]



Felicidad Subjetiva (SHS) promedio según Autocompasión (SCS) [N = 38]



Felicidad Subjetiva (SHS) promedio según Autocompasión (SCS) [N = 345]



Autocompasión, metas y afrontando el fracaso académico (Neff y colegas, 2005)

Self and Identity, 4 263–287, 2005
Copyright © 2005 Psychology Press
ISSN: 1529-8868 print/1529-8876 online
DOI: 10.1080/13576500444000317

 Psychology Press
Taylor & Francis Group

Self-compassion, Achievement Goals, and Coping with Academic Failure

KRISTIN D. NEFF
YA-PING HSIEH
KULLAYA DEJITTERAT

University of Texas at Austin, Austin, Texas, USA

Dos estudios examinaron la relación entre la **autocompasión, objetivos de rendimiento académico y el afrontamiento del fracaso académico** percibido por estudiantes universitarios.

Estudio 1 (N = 222)

Encontró que la autocompasión se asoció positivamente con metas de dominio y negativamente con metas de desempeño, relación que fue mediada por el **menor miedo al fracaso y una mayor competencia percibida de los individuos autocompasivos**.

Estudio 2

Confirmó estos hallazgos entre los estudiantes que percibieron prueba de medio semestre como un fracaso (N = 110), y los resultados también indicaron que la autocompasión se asoció positivamente con las estrategias de afrontamiento centradas en las emociones y negativamente con las estrategias orientadas a la evitación.

Orientación de dominio versus logro

Los estudiantes con una **orientación de dominio (mastery)** hacia el aprendizaje:

- Están motivados por la curiosidad y el deseo de desarrollar habilidades, dominar tareas y comprender material nuevo.
- Tienden a establecer sus propios estándares de logro
- Hacen atribuciones de **esfuerzo** para el éxito y el fracaso
- Piensan que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje.

Los estudiantes con una **orientación al desempeño**:

- Están motivados por ratificar o mejorar su sentido de autoestima.
- Tienden a hacer atribuciones de **capacidad** para el éxito y el fracaso, y a evaluar su capacidad a través de comparaciones sociales.
- Hay dos tipos diferentes de metas de desempeño, además, orientadas a lograr el éxito o evitar el fracaso (Elliot & Church, 1997; Middleton y Midgley, 1997).
- Elliot (1999) sostiene que la adopción de ambos tipos de objetivos de desempeño está motivada por el miedo al fracaso.

Resultados primer estudio

TABLE 1 Zero-Order Correlations between Study Variables

Measure	SCS	Mast	P-App	P-Avd	FF	PC	IM	Anx	GPA	Gender
Self-compassion (SCS)	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mastery Goals (Mast)	.28**	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Performance-Approach (P-App)	-.13*	.24**	1.00	—	—	—	—	—	—	—
Performance-Avoidance (P-Avd)	-.29**	.04	.61**	1.00	—	—	—	—	—	—
Fear of Failure (FF)	-.51**	-.32**	.26**	.43**	1.00	—	—	—	—	—
Perceived Competence (PC)	.35**	.45**	.12	-.16*	-.36**	1.00	—	—	—	—
Intrinsic Motivation (IM)	.30**	.71**	.24**	.04	-.24**	.45**	1.00	—	—	—
Anxiety (Anx)	-.66**	-.22**	.15*	.28**	.58**	-.44**	-.34**	1.00	—	—
GPA	-.03	.20**	.17*	-.07	-.07	.24**	.22**	-.07	1.00	—
Gender	-.14*	.00	.06	.15*	.07	-.05	.09	.07	.11	1.00


Note: N = 222. Gender is coded: 0 = Males; 1 = Females.

* $p < .05$; ** $p < .01$.

Correlaciones Autocompasión

Negativamente con:

- **Ansiedad**
- **Miedo al fracaso**
- Orientación al desempeño



Positivamente con:

- Orientación al dominio
- Motivación intrínseca

Interpersonal problem solving, self-compassion and personality traits in university students

Coskun Arslan

Department of Psychological Counseling and Guidance, Faculty of Ahmet Kelesoglu Education, Necmettin Erbakan University, 42090 Meram Konya, Turkey.

Correlaciones con escala de autocompasión

7. Approaching problems in a negative way	-0.63**
8. Constructive Problem Solving	0.44**
9. Lack of Self Confidence	-0.34**
10. Unwillingness to take Responsibility	-0.34**
11. Insistent-persevering approach	.21**

Enfrentando el sufrimiento con amabilidad (Smeets y colegas, 2014)

Meeting Suffering With Kindness: Effects of a Brief Self-Compassion Intervention for Female College Students

Elke Smeets,¹ Kristin Neff,² Hugo Alberts,¹ and Madelon Peters¹

¹ Maastricht University

² University of Texas at Austin

Objetivo

Se investigó la efectividad de una **intervención grupal de autocompasión de 3 semanas** recientemente desarrollada para mejorar la resiliencia y el bienestar entre estudiantes universitarias.

Método

52 estudiantes fueron asignadas al azar a una intervención diseñada para enseñar habilidades de autocompasión (n = 27) o una intervención de grupo de control activo en la que se enseñaron habilidades generales de manejo del tiempo (n = 25).

Ambas intervenciones constaron de 3 reuniones grupales realizadas durante 3 semanas.

Para medir las ganancias de resiliencia y bienestar, las participantes completaron una serie de cuestionarios antes y después de la intervención.

Resultados

Los resultados mostraron que una intervención de autocompasión condujo a:

- Aumentos significativos en autocompasión, atención plena, optimismo y autoeficacia
- Una disminución significativamente mayor en la rumiación en comparación con la intervención de control activo.

Si bien ambas intervenciones aumentaron la satisfacción con la vida y la conexión, no se encontraron diferencias para la preocupación y el estado de ánimo.

Conclusión

Estos hallazgos sugieren que una breve intervención de autocompasión tiene potencial para mejorar la resiliencia y el bienestar de los estudiantes.

Autocompasión y otras escalas

Table 1
Bivariate Associations Between Study Variables at Pretest ($N = 52$)

Measure	SC	M-AWJ	M-NR	LS	CON	OPT	SEF	PA	NA	RUM
M-AWJ	.53**									
M-NR	.52**	.22								
LS	.55**	.50**	.16							
CON	.48**	.60**	.15	.56**						
OPT	.59**	.53**	.34**	.47**	.44**					
SEF	.56**	.49**	.47**	.44**	.30*	.63**				
PA	.27*	.39**	-.03	.21	.22	.05	-.02			
NA	-.40**	-.43**	-.04	-.35**	-.40**	-.15	-.07	-.79**		
RUM	-.38**	-.50**	-.09	-.21	-.30*	-.40**	-.36**	-.24	.24	
WOR	-.63**	-.52**	-.46**	-.41**	-.43**	-.59**	-.44**	-.30*	.27*	.50**

Note. SC = Self-Compassion; M-AWJ = Mindfulness Accept without Judgment; M-NR = Mindfulness Nonreactivity to Inner Experience; LS = Life Satisfaction; CON = Connectedness; OPT = Optimism; SEF = Self-Efficacy; PA = Positive Affect; NA = Negative Affect; RUM = Rumination; WOR = Worry.

* $p \leq .05$. ** $p \leq .01$.

Correlación positiva:

- **Satisfacción con la vida**
- **Optimismo**
- **Auto-eficacia**
- **Ánimo positivo (PA)**

Correlación negativa:

- **Animo negativo (NA)**
- **Rumiación**
- **Preocupación**

Table 2

Pretest and Posttest Mean Scores by Group, Interaction Effects Analysed With 2 (Group) × 2 (Time) Repeated Measures ANOVAs, and Cohen's d Effect Sizes Calculated With Gain Scores

Outcome	Self-compassion group <i>N</i> = 27		Control group <i>N</i> = 25		<i>F</i>	Cohen
	Pretest <i>M</i> (<i>SD</i>)	Posttest <i>M</i> (<i>SD</i>)	Pretest <i>M</i> (<i>SD</i>)	Posttest <i>M</i> (<i>SD</i>)		
Self-compassion	3.79 (.78)	4.60 (.72)	4.15 (.83)	4.11 (.88)	16.34**	1.19
Mindfulness AWJ	30.48 (5.68)	33.11 (5.49)	29.90 (5.90)	29.31 (6.34)	5.67*	.70
Mindfulness NR	19.00 (3.69)	21.85 (3.22)	20.32 (4.07)	19.09 (3.64)	17.26**	1.20
Life satisfaction	25.37 (4.87)	27.56 (4.99)	25.05 (5.91)	26.27 (5.10)	1.05	.30
Connectedness	88.78 (11.93)	91.69 (11.99)	86.23 (15.15)	87.36 (13.58)	1.27	.33
Optimism	19.04 (3.28)	22.19 (3.77)	19.22 (4.25)	20.59 (4.75)	4.98*	.66
Self-efficacy	28.22 (3.99)	30.11 (3.47)	29.32 (3.94)	29.45 (4.21)	3.25 [†]	.52
Positive affect	26.41 (6.54)	26.26 (4.97)	26.05 (5.01)	25.05 (4.58)	.31	.15
Negative affect	20.26 (7.21)	20.07 (5.74)	19.91 (7.01)	19.95 (6.18)	.06	.07
Rumination	10.44 (3.18)	9.04 (2.68)	10.64 (3.40)	11.05 (3.08)	5.87*	.70
Worry	33.30 (10.79)	31.74 (8.91)	33.68 (11.51)	33.27 (10.20)	.44	.19

Note. ANOVA = analysis of variance; SD = standard deviation; AWJ = Accept Without Judgment; NR = Nonreactivity to Inner Experience.

p* < .05. *p* < .01. [†]*p* = .08.

Se observan mejoras significativas en:

- Autocompasión
- Mindfulness
- Optimismo
- Rumiación

El programa de autocompasión de Neff y Germer 2012

A lo largo del programa, **se utilizan ejercicios interpersonales para generar una experiencia de autocompasión, facilitando sentimientos de humanidad común.** Por ejemplo, los participantes pueden compartir en grupos pequeños el lenguaje que usan cuando se critican a sí mismos y discutir cómo usar un lenguaje más amable y de mayor apoyo. Se enseñan prácticas informales como poner las manos en el corazón en momentos de estrés o repetir una serie de frases de autocompasión memorizadas para usar en la vida diaria.

Las prácticas en el hogar se asignan al final de cada sesión, como escribir una carta a uno mismo desde la perspectiva de un amigo idealmente compasivo. También se enseñan prácticas de meditación formal, incluida la meditación de bondad amorosa (LKM), y una variante de LKM que enfatiza la compasión por los sentimientos de incapacidad o estrés.

Un estudio piloto sobre programa de auto-compasión (Neff y colegas, 2012)

Participantes: **21 participantes mujeres** que respondieron a un llamado de publicidad; promedio de edad 51.26 años

Programa: **8 semanas**

Se midió, antes y después de la intervención indicadores, de satisfacción con la vida, felicidad, ansiedad, depresión, conexión social, estrés.

Table 1

*Pretest and Posttest Scores for the Pilot MSC Group Analyzed With Matched-Pairs *t* Tests*

Outcome	Pretest <i>M</i> (<i>SD</i>)	Posttest <i>M</i> (<i>SD</i>)
Self-compassion	2.58 (0.65)	3.47 (0.79)**
Mindfulness	2.43 (0.49)	2.85 (0.71)*
Social connectedness	4.02 (0.88)	4.24 (0.57)
Life satisfaction	3.62 (1.65)	4.40 (1.49)**
Happiness	3.83 (1.50)	4.57 (1.36)*
Depression	1.45 (0.22)	1.22 (0.21)**
Anxiety	2.99 (0.72)	2.44 (0.81)**
Stress	3.14 (0.72)	2.73 (0.87)*

Note. MSC = mindful self-compassion; M = mean; SD = standard deviation.

t test significant at * $p < .05$ and ** $p \leq .001$.

Los participantes del taller mejoran en autocompasión, mindfulness, satisfacción con la vida, felicidad, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de estrés

Table 2

Pretest and Posttest Mean Scores by Group and MSC Intervention Effects Analyzed With 2 (Group) X 2 (Time) Repeated Measures Analyses of Variance, and Effect Sizes Using Cohen's d (Calculated With Gain Scores)

Outcome	MSC group		Control group		<i>F</i>	Effect size Cohen's <i>d</i>
	Pretest <i>M (SD)</i>	Posttest <i>M (SD)</i>	Pretest <i>M (SD)</i>	Posttest <i>M (SD)</i>		
Self-compassion	2.65 (0.68)	3.78 (0.60)	2.75 (0.71)	2.93 (0.67)	31.79**	1.67
Mindfulness	2.46 (0.62)	2.92 (0.51)	2.47 (0.62)	2.60 (0.56)	8.03**	.60
Other-compassion	4.17 (0.44)	4.46 (0.47)	4.17 (0.49)	4.16 (0.41)	11.91**	.68
Social connectedness	3.68 (1.07)	4.09 (0.99)	3.42 (1.07)	3.69 (1.13)	0.38	.13
Life satisfaction	3.61 (1.59)	4.48 (1.61)	3.60 (1.57)	3.70 (1.61)	8.09**	.51
Happiness	3.86 (1.20)	4.38 (1.14)	3.46 (1.47)	3.78 (1.58)	0.62	.15
Depression	1.74 (0.34)	1.33 (0.29)	1.61 (0.43)	1.56 (0.46)	17.42**	.86
Anxiety	3.04 (0.71)	2.44 (0.74)	3.01 (0.70)	2.94 (0.73)	10.88**	.76
Stress	3.11 (0.59)	2.80 (0.70)	3.11 (0.56)	3.03 (0.60)	4.13*	.37
Avoidance	2.40 (0.75)	2.01 (0.71)	2.13 (0.75)	2.15 (0.82)	4.48*	.50

Note. MSC = mindful self-compassion; M = mean; SD = standard deviation.

* $p < .05$. ** $p < .01$.

Mensajes autocompasivos: dos tipos

1. Contención

Relacionado con entregar:

- Validación (por ejemplo, de cómo te sientes)
- Confort emocional y físico




2. Llamado a la Acción:

- Protección (por ejemplo de las acciones de otros)
- Motivación



ACTUALIZAR

Un hijo llega donde su padre y dice: "estoy triste :c, me fue mal en matemáticas de nuevo". El padre le dice: "eres un fracaso, no sirves para eso!!"



Avanzando hacia la autocompasión

Recordar que en momentos difíciles es importante darte cariño a ti misma/o.

¿Qué frases puedes usar? ¿Qué imágenes de cariño puedes usar?

Actividad:

- Piensa frases que otros te han dicho y te han transmitido cariño en momentos difíciles. Anótalas
- Piensa en aquellas frases que otros te han dicho y te han dado ánimo para tomar acción. Anótalas

Mensajes del curso:

Contención:

1)

Acción:

1)

General Self-Compassion Break

https://self-compassion.org/wp-content/uploads/2020/08/self-compassion.break__01-cleanedbydan.mp3

Rememora un pequeño sufrimiento, piensa en una situación difícil, de estrés, un problema con una relación, una preocupación por algo que pudiera suceder. Debe ser una situación difícil pero no muy abrumadora.

Conéctate con esa situación, qué está pasando, que podría pasar, trae la situación a tu mente.

Usa estas frases para recordar los 3 componentes de la autocompasión:

1. **Encuentra un mensaje para transmitirte cariño a ti mismo/a** en situación con la estás lidiando. **Encuentra un mensaje para transmitirte ánimo** o llevarte a la acción en este momento.
2. El sufrimiento es parte de la vida, **encuentra un mensaje para decirte a ti mismo que no es anormal sentirse así**, mucha gente ha pasado por una situación similar, quizás diferente en el grado de sufrimiento, pero es parte de la vida, parte de ser humano.
3. **Encuentra un mensaje para decirte a ti mismo/a, que reconozca que este es un momento difícil con el que estás lidiando.** Puedes decirte a ti mismo/a que algo te duele o nombrar la emoción que estás sintiendo.

Puedes nombrarte a ti mismo por tu nombre, cualquier forma en que se sienta natural expresar tu profundo deseo de estar bien y libre de sufrimiento.

Ahora, finalizando el ejercicio, trata de notar cómo se siente tu cuerpo, date permiso para sentir cualquier sensación, siéntela tal como es en este momento.