

# 高数基础班 (13)

13

反常积分举例（敛散性；计算），定积分应用（几何；物理）

P104-P111

主讲 武忠祥 教授



还不关注，  
你就慢了



# 常考题型与典型例题

## 常考题型

1. 反常积分敛散性
2. 反常积分计算

# (一) 反常积分的敛散性

【例3】(2015年2) 下列反常积分中收敛的是 ( )

(A)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$  ①是 ②p\*

(B)  $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_2^{+\infty} = +\infty$

(C)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln \ln x \Big|_2^{+\infty} = +\infty$

(D)  $\int_2^{+\infty} \frac{x^{1000}}{e^x} dx = +\infty$

①定义.  
②比较法: ✓  
③p积分.

【解】(A)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} \Big|_2^{+\infty} = +\infty$

(D)  $\int_2^{+\infty} x e^{-x} dx = -\int_2^{+\infty} x d e^{-x} = -x e^{-x} \Big|_2^{+\infty} + \int_2^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_2^{+\infty}$

$\frac{x}{e^x} \leq \frac{x}{x^3} = \frac{1}{x^2}$   $\left( e^x \geq x^3 \right)$   $-\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$   $x \rightarrow +\infty$

$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$

【例4】(2013年2) 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & \underline{1 < x < e}, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & \underline{x \geq e}. \end{cases}$

若反常积分  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则

(A)  $\alpha < -2$ .

(B)  $\alpha > 2$ .

(C)  $-2 < \alpha < 0$ .

(D)  $0 < \alpha < 2$ . ✓

【解】

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e \frac{dx}{(x-1)^{\alpha-1}} + \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^{\alpha+1} x} \stackrel{\ln x = t}{=} \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1}}$$

$\Rightarrow \alpha - 1 < 1$   
 $\Rightarrow \alpha < 2$

$\Rightarrow \alpha + 1 > 1$   
 $\Rightarrow \alpha > 0$

$\alpha > 0$  ✓

【例5】(2016年2) 反常积分  $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ ,  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$

的敛散性为( )

(A) 收敛, 收敛.

(C) 发散, 收敛.

✓ (B) 收敛, 发散.

✓ (D) 发散, 发散.

$(-\infty, 0]$

【解】

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -e^{\frac{1}{x}} \Big|_{-\infty}^0 = 0 + 1 = 1 \quad \text{收}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -e^{\frac{1}{x}} \Big|_0^{+\infty} = -1 + (+\infty) = \infty \quad \text{发}$$

$[0, +\infty)$

发

" $\infty$ " ✓

【例6】(2016年1) 反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$  收敛, 则( )

(A)  $a < 1, b > 1$ .

(B)  $a > 1, b > 1$ .

✓ (C)  $a < 1, a + b > 1$ .

(D)  $a > 1, a + b > 1$ .

【解】

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$$

Handwritten notes:  $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$  (with  $p < 1$ ),  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$  (with  $p > 1$ ),  $\frac{1}{x^{a+b}} > 1$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^a(1+x)^b} = 1$$

$$\Rightarrow a < 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} = 1$$

$$\Rightarrow a+b > 1$$

## (二) 反常积分的计算

$$\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$$

【例7】(2000年, 2)  $\int_2^{+\infty} \frac{dx-2}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

$[\frac{\pi}{3}]$

① 换元 ✓

【解1】令  $\sqrt{x-2} = t, \quad x-2 = t^2$

$\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 d\sqrt{x}$  ② 分部

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{+\infty} \frac{2t}{t(t^2+9)} dt = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{9+t^2} = \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{2}{3} \arctan \frac{t}{3} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{3} \left[ \frac{\pi}{2} - 0 \right] \end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2}$$

$$= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$$

【解2】

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_2^{+\infty} \frac{2 d\sqrt{x-2}}{9 + (\sqrt{x-2})^2} = \frac{2}{3} \arctan \frac{\sqrt{x-2}}{3} \Big|_2^{+\infty} \\ &= \frac{2}{3} \left[ \frac{\pi}{2} - 0 \right] = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

【例8】(2000年4) 计算  $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}}$   $\left(\frac{\pi}{4e}\right)$

【解】

$$\begin{aligned} I &\stackrel{*}{=} \int_1^{+\infty} \frac{e^x dx}{e^x + e^2} = \int_1^{+\infty} \frac{de^x}{e^2 + (e^x)^2} \\ &= \frac{1}{e} \arctan \frac{e^x}{e} \Big|_1^{+\infty} \\ &= \frac{1}{e} \left[ \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right] = \frac{\pi}{4e} \end{aligned}$$



【例9】 (2013年, 1, 3)  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (\ln 2)$

【解】

$$\text{原式} = - \int_1^{+\infty} \ln x d \frac{1}{1+x}$$

$$= \underbrace{- \frac{\ln x}{1+x}}_{\substack{\text{分部} \\ \text{积分}}} \bigg|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1+x-x}{x(1+x)} dx$$

$$\ln x - \ln(1+x)$$

$$= \ln \frac{x}{1+x} \bigg|_1^{+\infty} = 0 - \ln \frac{1}{2} = \ln 2$$

# 第六章 定积分应用

## 本节内容要点

### 一. 考试内容概要

(一) 几何应用

(二) 物理应用

### 二. 常考题型与典型例题

题型一 几何应用

题型二 物理应用

# (一) 几何应用

## 1. 平面图形的面积

- (1) 若平面域  $D$  由曲线  $y = f(x), y = g(x) (f(x) \geq g(x))$ ,  
 $x = a, x = b$  ( $a < b$ ) 所围成, 则

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$


- (2) 若平面域  $D$  由曲线  $\rho = \rho(\theta), \theta = \alpha, \theta = \beta (\alpha < \beta)$   
所围成, 则

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\theta) d\theta$$

$$\iint_D 1 db = S$$

$$S = \iint_D 1 db = \int_a^b dx \int_{g(x)}^{f(x)} dy$$

$$S = \iint_D 1 db \cdot db = \rho d\rho d\alpha$$
$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\alpha \int_0^{\rho(\alpha)} \rho d\rho$$



## 2. 旋转体体积

若平面域  $D$  由曲线  $y = f(x)$ , ( $f(x) \geq 0$ ),  
 $x = a, x = b$  ( $a < b$ ) 所围成, 则

$$dV = 2\pi r(x, y) db$$

$$V = 2\pi \int_D r(x, y) db$$

1) 区域  $D$  绕  $x$  轴旋转一周所得到的旋转体积为



$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

$$V_x = 2\pi \int_D y db = 2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} y dy = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

2) 区域  $D$  绕  $y$  轴旋转一周所得到的旋转体积为

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

$$V_y = 2\pi \int_D x db = 2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} x dy = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$



### 3. 曲线弧长 (数三不要求)

$d_s$  ✓ 1)  $C: y = y(x), a \leq x \leq b. \quad s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$   
 2)  $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \alpha \leq t \leq \beta. \quad s = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$   
 3)  $C: \rho = \rho(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta. \quad s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta$

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$$

$o(dx)$

### 4. 旋转体侧面积 (数三不要求)

$d_s$   $S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$


$ds$

### (二) 物理应用 (数三不要求)

1. 压力;

2. 变力做功;

3. 引力。



$2\pi f(x) \frac{dx}{ds} X ?$   
 $ds$

# 常考题型与典型例题

## 常考题型

1.几何应用

2.物理应用

## (一) 几何应用

【例1】(2014年, 3) 设  $D$  是由曲线  $xy+1=0$  与直线  $y+x=0$

及  $y=2$  围成的有界区域, 则  $D$  的面积为 \_\_\_\_\_.

【解】

$$S = \iint_D 1 \, d\sigma \quad \checkmark$$

$$= \int_1^2 dy \int_{-y}^{-\frac{1}{y}} dx$$

$$= \int_1^2 (y - \frac{1}{y}) dy = (\frac{1}{2}y^2 - \ln y) \Big|_1^2 = \frac{3}{2} - \ln 2$$

$$xy = -1$$

$$-y^2 = -1 \quad y^2 = 1$$

$$y = -x$$

$$(\frac{3}{2} - \ln 2)$$

$$xy+1=0$$

$$y+x=0$$



【例2】(2013年, 2) 设封闭曲线  $L$  的极坐标方程为

$r = \cos 3\theta$  ( $-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$ ), 则  $L$  所围平面图形的面积是 \_\_\_\_\_.

【解1】

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta \\ &\stackrel{*}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 6\theta) d\theta = \frac{1}{2} \left( \theta + \frac{1}{6} \sin 6\theta \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

【解2】

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta \\ &\stackrel{3\theta=t}{=} \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

\*



【例3】(2015年2, 3) 设  $A > 0$ ,  $D$  是由曲线段  $y = A \sin x$  ( $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ )

及直线  $y = 0, x = \frac{\pi}{2}$  所围成的平面区域,  $V_1, V_2$  分别表示  $D$  绕

$x$  轴与  $y$  轴旋转所成旋转体的体积. 若  $V_1 = V_2$ , 求  $A$  的值.

$$[V_1 = \frac{\pi^2}{4} A^2, V_2 = 2\pi A, A = \frac{8}{\pi}]$$


【解】

$$V_1 = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} A^2 \sin^2 x \, dx = \pi A^2 \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2 A^2}{4}$$

$$V_2 = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x A \sin x \, dx = 2\pi A \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$$

$$= 2\pi A.$$

$$V_1 = V_2 \Rightarrow A = \frac{8}{\pi}$$



【例4】(2012年, 数二) 过点  $(0,1)$  作曲线  $L: y = \ln x$  的切线, 切点为  $A$ , 又  $L$  与  $x$  轴交于  $B$  点, 区域  $D$  由  $L$  与直线  $AB$  围成. 求区域  $D$  的面积及  $D$  绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积.

$$[S=2; V=\frac{2\pi}{3}(e^2-1)]$$

【解1】 设切点为  $(x_0, y_0)$ , 则切线方程为  $y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$


$$1 - \ln x_0 = -1 \quad 2 = \ln x_0 \quad x_0 = e^2 \quad y = \ln x \quad \checkmark$$

【解2】 设过点  $(0,1)$  的线方程为  $y - 1 = kx$ ,  $y = 1 + kx \quad \checkmark$

$$\checkmark \begin{cases} 2x = 1 + kx \\ \frac{1}{x} = k \end{cases} \Rightarrow \ln x = 2, \quad x = e^2, \quad k = e^{-2}$$

$$S = \int_1^{e^2} \ln x dx - \frac{1}{2} (e^2 - 1) \cdot 2 = 2 \quad \checkmark$$

$$V = \pi \int_1^{e^2} \ln^2 x dx - \frac{\pi}{3} \cdot 4 \cdot (e^2 - 1) = \frac{2\pi}{3} (e^2 - 1) \quad \checkmark$$



【例5】(2011年1, 2) 曲线  $y = \int_0^x \tan t dt (0 \leq x \leq \frac{\pi}{4})$  的弧长

$s = \underline{\hspace{2cm}}$ .

$y = y(x)$

$[\ln(1+\sqrt{2})]$

【解】

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx$$


$$y' = \tan x$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x \, dx = \ln(\sec x + \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \ln(1 + \sqrt{2})$$

## (二) 物理应用

【例6】(2011年2) 一容器的内侧是由图中曲线绕  $y$  轴旋转一周而成的曲面，该曲线由  $x^2 + y^2 = 2y (y \geq \frac{1}{2})$  与  $x^2 + y^2 = 1 (y \leq \frac{1}{2})$  连接而成。



$\int \text{质量} \cdot g \cdot \rho \cdot dV$

$\pi x^2 dy$

$= \pi(2y - y^2) dy$

$\pi x^2 dy = \pi(1 - y^2) dy$

$2 - y$

$\rho \cdot 10^3 \cdot \pi(1 - y^2) dy$

(I) 求容器的容积; ✓

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？


(长度单位: m, 重力加速度为  $g\text{m/s}^2$ , 水的密度为  $10^3\text{kg/m}^3$ )

【解】  $V = 2\pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} x^2 dy = 2\pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) dy = \frac{9\pi}{4}$

$W = 10^3 \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \pi(1 - y^2)(2 - y)g dy + 10^3 \int_{\frac{1}{2}}^2 \pi[2y - y^2](2 - y)g dy = \frac{27}{8} \pi \rho g$

【例7】(2002年2) 某闸门的形状与大小如图

所示, 其中  $y$  轴为对称轴, 闸门的上部为矩形  $ABCD$ ,  $DC=2\text{m}$ , 下部由二次抛物线与线段  $AB$  所围成, 当水面与闸门的上端相平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为5:4, 闸门矩形部分的高  $h$  应为多少



$$\bar{y} \cdot d$$

$$p = \rho g (h+1-y)$$

$$dP = \rho g (h+1-y) \cdot 2x dy$$

压强  $p = \rho g h$  ✓

压力  $P = p \cdot A$  ✓

$$p = \rho g (h+1-y)$$

$$dP = \rho g (h+1-y) \cdot 2x dy$$

【解】  $P_1 = 2 \int_1^{h+1} \rho g (h+1-y) dy = 2 \rho g \left[ (h+1)y - \frac{y^2}{2} \right]_1^{h+1} = \rho g h^2,$

$$P_2 = 2 \int_0^1 \rho g (h+1-y) \sqrt{y} dy = 2 \rho g \left[ \frac{2}{3} (h+1) y^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} y^{\frac{5}{2}} \right]_0^1$$

$$= 4 \rho g \left( \frac{1}{3} h + \frac{2}{15} \right).$$

$$\frac{h^2}{4 \left( \frac{1}{3} h + \frac{2}{15} \right)} = \frac{5}{4}.$$


$$h = 2 \quad h = -\frac{1}{3}$$



还不关注，  
你就慢了



关注「公众号：武忠祥老师」

 你将获得

- 1、「考研数学真题」电子资料
- 2、全年每日一题
- 3、每个月的考研数学复习规划
- 4、不定期武老师公仔、周边抽奖