

# 高数基础班 (22)

22	傅里叶级数；向量代数与空间解析几何；方向导数，曲面切平面， 曲线法线	P172-P186
----	---------------------------------------	-----------

主讲 武忠祥 教授



还不关注，  
你就慢了



# 第三节 傅里叶级数

## 本节内容要点

### 一. 考试内容概要

- (一) 傅里叶系数与傅里叶级数
- (二) 收敛定理 (狄利克雷) ✓
- (三) 函数展开为傅里叶级数 ✓

### 二. 常考题型方法与技巧

题型一 有关收敛定理的问题

题型二 将函数展开为傅里叶级数

# 考试内容概要

## (一) 傅里叶系数与傅里叶级数

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad n = 1, 2 \dots$$

$$f(x) \simeq \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

## (二) 收敛定理 (狄利克雷)

设  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上连续或有有限个第一类间断点, 且只有有限个极值点, 则  $f(x)$  的傅里叶级数在  $[-\pi, \pi]$  上处处收敛, 且收敛于

1)  $S(x) = f(x)$

当  $x$  为  $f(x)$  的连续点.

2)  $S(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$

当  $x$  为  $f(x)$  的间断点.

3)  $S(x) = \frac{f((- \pi)^+) + f(\pi^-)}{2}$

当  $x = \pm \pi$ .

### (三) 周期为 $2\pi$ 的函数的展开

(1)  $[-\pi, \pi]$  上展开.

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underline{f(x)} \underline{\cos nx} dx \quad \underline{n = 0, 1, 2 \dots}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underline{f(x)} \underline{\sin nx} dx \quad n = \underline{1, 2 \dots}$$

(2)  $[-\pi, \pi]$  上奇偶函数的展开.

i)  $f(x)$  为奇函数

$$\underline{a_n = 0}, \quad n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad n = 1, 2 \dots$$

ii)  $f(x)$  为偶函数.

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = 0$$

$$n = 1, 2 \dots$$

(3) 在  $[0, \pi]$  上展为正弦或展为余弦.

i) 展为正弦.

$$a_n = 0,$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$n = 1, 2 \dots$$


ii) 展为余弦.

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = 0$$

$$n = 1, 2 \dots$$



## (四) 周期为 $2l$ 的函数的展开

(1)  $[-l, l]$  上展开.

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 1, 2, \dots$$

## (2) $[-l, l]$ 上奇偶函数的展开.

i)  $f(x)$  为奇函数.

$$a_n = 0,$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$\checkmark \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 1, 2 \dots$$

ii)  $f(x)$  为偶函数.

$$\checkmark \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = 0$$

$$n = 1, 2 \dots$$



(3)在  $[0, l]$  上展为正弦或展为余弦.

i) 展为**正弦**.

$$a_n = 0,$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 1, 2 \dots$$

ii) 展为**余弦**.

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = 0$$

$$n = 1, 2 \dots$$

# 常考题型与典型例题

## 常考题型

1.狄利克雷收敛定理

2.将函数展为傅里叶级数

## 1.狄利克雷收敛定理

【例1】(1988年1) 设  $f(x)$  是周期为2的周期函数，它在区间  $(-1,1]$  上的定义为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

则  $f(x)$  的傅里叶 (Fourier) 级数在  $x=1$  处收敛于  $\frac{3}{2}$ .

$[\frac{3}{2}]$

【解】

$$\frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}$$

【例2】(1989年1) 设函数  $f(x) = x^2, 0 \leq x < 1$ , 而

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, -\infty < x < +\infty$

其中  $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, n = 1, 2, 3, \dots$  则  $S\left(-\frac{1}{2}\right)$  等于 ( )

(A)  $-\frac{1}{2}$

(B)  $-\frac{1}{4}$

(C)  $\frac{1}{4}$

(D)  $\frac{1}{2}$

[B]

【解】

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) = -S\left(\frac{1}{2}\right) = -\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$$

$2l=2$

$l=1$

## 2. 将函数展为傅里叶级数

【例3】(1993年1) 设函数  $f(x) = \pi x + x^2$  ( $-\pi < x < \pi$ )

$2\pi$

的傅里叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则其中系数  $b_3$  的值为 \_\_\_\_\_.

$[\frac{2}{3}\pi]$

【解】

$$\begin{aligned} b_3 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi x + x^2) \sin 3x \, dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} x \sin 3x \, dx = -\frac{2}{3} \int_0^{\pi} x \, d\cos 3x = \frac{2}{3} \pi \end{aligned}$$

【例4】(1991年1) 将函数  $f(x) = 2 + |x|$  ( $-1 \leq x \leq 1$ ) 展开成以  $2$  为周期的傅里叶级数，并由此求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  的和


为周期的傅里叶级数，并由此求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  的和

$l=1$

【解】 由于  $f(x) = 2 + |x|$  ( $-1 \leq x \leq 1$ ) 是偶函数，所以

$$\textcircled{1} \quad b_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots \quad a_0 = 2 \int_0^1 (2 + x) dx = 5,$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (2 + x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx = \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \quad n = 1, 2, \dots$$



$$\textcircled{2} \quad 2 + |x| = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)\pi x}{(2n+1)^2}.$$

$-1 \leq x \leq 1$

当  $x = 0$  时,  $2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ , 从而  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ .

$$a = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4}a \Rightarrow \frac{3}{4}a = \frac{\pi^2}{8} \Rightarrow a = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

【例5】(1995年1) 将  $f(x) = x - 1$  ( $0 \leq x \leq 2$ ) 展开成周期为4  $= 2l$

的余弦级数.


【解】  $a_0 = \frac{2}{2} \int_0^2 (x-1) dx = 0,$

$$a_n = \frac{2}{2} \int_0^2 (x-1) \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^2 (x-1) d \sin \frac{n\pi x}{2} = -\frac{2}{n\pi} \int_0^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx$$

$$= \frac{4}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] = \begin{cases} 0, & \underline{n = 2k}, \checkmark \\ -\frac{8}{(2k-1)^2 \pi^2}, & \underline{n = 2k-1} \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

$$\underline{f(x) = -\frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2}}$$

$$x \in [0, 2] \quad \text{或} \quad 0 \leq x \leq 2$$



$$l = 2$$

# 第十一章 向量代数与空间解析几何及 多元微分学在几何上的应用



# 第一节 向量代数

## 1. 数量积

1) 几何表示:  $\underline{a \cdot b = |a| |b| \cos \alpha}$

2) 代数表示:  $\underline{a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}$

3) 运算规律:

i) 交换律:  $a \cdot b = b \cdot a$


ii) 分配律:  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

4) 几何应用:

i) 求模:  $|a| = \sqrt{a \cdot a}$

ii) 求夹角:  $\cos \alpha = \frac{a \cdot b}{|a| |b|}$


iii) 判定两向量垂直:  $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$



## 2. 向量积

1) 几何表示:  $\underline{a \times b}$  是一向量 模:  $|a \times b| = |a| |b| \sin \alpha$

方向: 右手法则.



2) 代数表示:  $\underline{a \times b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$

✓ 3) 运算规律

i)  $a \times b = -(b \times a)$  \*

ii) 分配律:  $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

✓ 4) 几何应用:

i) 求同时垂直于 a 和 b 的向量:  $a \times b$

ii) 求以 a 和 b 为邻边的平行四边形面积:  $S = |\underline{a \times b}|$

iii) 判定两向量平行:  $a // b \Leftrightarrow a \times b = 0$

### 3. 混合积: $(abc) = (a \times b) \cdot c$

① 1) 代数表示:  $(abc) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$

② 2) 运算规律:


i) 轮换对称性:  $(abc) = (bca) = (cab)$  ✓

ii) 交换变号:  $(abc) = -(acb)$  ✓

③ 3) 几何应用

i)  $V_{\text{平行六面体}} = |(abc)|$

ii) 判定三向量共面:  $\underline{a, b, c \text{ 共面}} \Leftrightarrow \underline{(abc) = 0}$ .



# 常考题型与典型例题

## 常考题型

### 向量的计算

【例1】(1995年) 设  $(a \times b) \cdot c = 2$ , 则

$$[(a + b) \times (b + c)] \cdot (c + a) = \underline{\hspace{2cm}}$$

【解】  $[(a + b) \times (b + c)] \cdot (c + a) = [a \times b + a \times c + b \times b + b \times c] \cdot (c + a)$

$$= (a \times b) \cdot c + (a \times b) \cdot a + (a \times c) \cdot c + (a \times c) \cdot a + (b \times c) \cdot c + (b \times c) \cdot a$$

$$= (a \times b) \cdot c + (b \times c) \cdot a$$

$$= 2(a \times b) \cdot c = 4$$

## 第二节 空间平面与直线

### 1. 平面方程

1) 一般式:  $Ax + By + Cz + D = 0.$   $\mathbf{n} = \{A, B, C\}$

2) 点法式:  $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$


3) 截距式:  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

### 2. 直线方程

1) 一般式: 
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

2) 对称式:  $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t$

3) 参数式:  $x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt.$



### 3. 平面与直线的位置关系 (平行、垂直、夹角)

关键: 平面的法线向量, 直线的方向向量。

### 4. 点到面的距离


点  $(x_0, y_0, z_0)$  到平面  $Ax + By + Cz + D = 0$  的距离.

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

### 5. 点到直线距离

点  $(x_0, y_0, z_0)$  到直线  $\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n}$

$$d = \frac{|\{x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0\} \times \{l, m, n\}|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$



# 常考题型与典型例题

## 常考题型

### 建立平面和直线方程

【例1】(1987年1) 与两直线

$$\begin{cases} x=1, \\ y=-1+t, \\ z=2+t \end{cases} \text{ 及 } \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$$

都平行, 且过原点的平面方程为 \_\_\_\_\_.

$$\vec{s}_1 = (0, 1, 1)$$

$$\vec{s}_2 = (1, 2, 1)$$

$$(1, -1, 1)$$

$$\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1, 1, -1)$$

$$[x - y + z = 0]$$

$$1 \cdot (x-0) + (-1)(y-0) + 1 \cdot (z-0) = 0$$
$$x - y + z = 0$$

## 第三节 曲面与空间曲线

1. 曲面方程: 一般式  $F(x, y, z) = 0$  或  $z = f(x, y)$

2. 空间曲线:

i) 参数式: 
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

ii) 一般式: 
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

3. 常见曲面

1) 旋转面: 一条平面曲线绕平面上一条直线旋转;

设  $L$  是  $yo z$  平面上一条曲线, 其方程是  $\begin{cases} \underline{f(y, z)} = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ , 则

(1)  $L$  绕  $y$  轴旋转所得旋转面方程为  $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$ .

(2)  $L$  绕  $z$  轴旋转所得旋转面方程为  $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$ .



## 2. 柱面: 平行于定直线并沿定曲线移动的直线L形成


的轨迹;

(1) 准线为  $\Gamma: \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ , 母线平行于  $z$  轴的柱面方程

为  $f(x, y) = 0$ ;

(2) 准线为  $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$  母线平行于  $z$  轴的柱面方程


为  $H(x, y) = 0$ .



## 3. 二次曲面

(1) 椭圆锥面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$ ; 特别的: 圆锥面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$

(2) 椭球面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ; 特别的: 球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$



(3) 单叶双曲面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$


(4) 双叶双曲面  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

(5) 椭圆抛物面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z;$

特别的: 旋转抛物面

$z = x^2 + y^2$

(6) 双曲抛物面 (马鞍面)  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$



#### 4) 空间曲线投影

曲线  $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$  在 xoy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} \underline{H(x, y) = 0} \\ z = 0 \end{cases} \checkmark$$

# 常考题型与典型例题

## 常考题型

### 建立柱面和旋转面方程

【例1】求以曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 = 1 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$  为准线, 母线平行于  $z$  轴的柱面.

【解】将  $z = x^2 + y^2$  代入  $x^2 + y^2 + 2z^2 = 1$  得

$$\underline{x^2 + y^2} + 2(\underline{x^2 + y^2})^2 = 1$$

即  $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$  为所要求的柱面.

【例2】求下列曲线绕指定的轴旋转产生的旋转面的方程

1)  $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$  分别绕  $x$  轴和  $y$  轴旋转.

2)  $\begin{cases} z = y^2 \\ x = 0 \end{cases}$  分别绕  $y$  轴和  $z$  轴旋转.

【解】 1) 绕  $x$  轴:  $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$

绕  $y$  轴:  $2(x^2 + z^2) + y^2 = 1$

2) 绕  $y$  轴:  $x^2 + z^2 = y^4$

绕  $z$  轴:  $z = y^2 + x^2$

【例3】求曲线  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0) \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases}$  在  $\underline{xoy}$  面和  $\underline{xoz}$


面上的投影曲线方程.

【解】在  $xoy$  面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = ax \end{cases}$$

在  $xoz$  面上的投影为

$$\begin{cases} z^2 + ax = a^2, (0 \leq x \leq a) \\ y = 0 \end{cases}$$



## 第四节 多元微分在几何上的应用

### 1. 曲面的切平面与法线

$$f(x, y) - z = 0$$

1) 曲面  $F(x, y, z) = 0$  ✓


法向量:

$$\mathbf{n} = \{F_x, F_y, F_z\}$$

2) 曲面  $z = f(x, y)$  ✓

法向量:

$$\mathbf{n} = \{f_x, f_y, -1\}$$



### 2. 曲线的切线与法平面

1) 曲线  $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$  ✓

切向量:


$$\boldsymbol{\tau} = \{x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\}$$

2) 曲线  $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$  ✓

切向量:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$$

其中  $\mathbf{n}_1 = \{F_x, F_y, F_z\}, \mathbf{n}_2 = \{G_x, G_y, G_z\}$



# 常考题型与典型例题

## 常考题型

建立曲面的切平面和法线及曲线的切线和法平面



【例1】(2013年) 曲面  $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$  在点  $(0, 1, -1)$

处的切平面方程为

✓ (A)  $x - y + z = -2$ .

(B)  $x + y + z = 0$ .

【A】

(C)  $x - 2y + z = -3$ .

(D)  $x - y - z = 0$ .

$x - y + z + z = 0$

$1 \cdot (x-0) + (-1)(y-1) + 1 \cdot (z+1) = 0$

【解】

$f(x, y, z) = x^2 + \cos(xy) + yz + x$

$f_x = 2x - y \sin(xy) + 1$

$f_x(0, y, -1) = 1 - y$

$f_x(0, 1, z) = 1 + z$

$f_x(0, 1, -1) = 1$

$f_y(0, 1, -1) = -1$

$f_z(0, 1, -1) = 1$


【例2】(1993年) 由曲线  $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$  绕轴  $y$  旋转一周得

到的旋转面在点  $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$  处的指向外侧的单位法向量为 \_\_\_\_\_.

$$(0, \sqrt{\frac{2}{5}}, \sqrt{\frac{3}{5}})$$

【解】

$$F = 3x^2 + 3z^2 + 2y^2 - 12 = 0$$



$$F_x = 6x \quad 3x \quad \vec{n} = (0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2})$$

$$F_y = 4y \quad 2y$$

$$F_z = 6z \quad 3z$$

$$\vec{n}^0 = \left( 0, \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{30}}, \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{30}} \right) = (0, \sqrt{\frac{2}{5}}, \sqrt{\frac{3}{5}})$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{0 + 12 + 18} = \sqrt{30}$$

【例3】(2003年) 曲面  $z = x^2 + y^2$  与平面  $2x + 4y - z = 0$

平行的切平面的方程是 \_\_\_\_\_.

【解】

$$z = f(x, y)$$

$$\vec{n} = (f_x, f_y, -1) = (2x, 2y, -1)$$

$$\frac{2x}{-2} = \frac{2y}{-8} = \frac{-1}{-1} = 1 \Rightarrow$$

$$x=1, y=2, z=5 \quad \checkmark$$

$$2(x-1) + 4(y-2) + (-1)(z-5) = 0$$

$$2x + 4y - z - 5 = 0$$

$$2x + 4y - z = 5$$

$$\vec{n}_1 = (2, 4, -1)$$

【例4】求曲线  $x = t - \sin t$   $y = 1 - \cos t$ ,  $z = 4 \sin \frac{t}{2}$  在点

$t = \frac{\pi}{2}$  处的切线方程和法平面方程.

【解】

$$\vec{\tau} = (1, 1, \sqrt{2})$$

$$\vec{r} = \left( \frac{\pi}{2} - 1, 1, 2\sqrt{2} \right)$$

$\vec{\tau}$

$$x_t = 1 - \cos t$$

$$y_t = \sin t$$

$$z_t = 2 \cos \frac{t}{2}$$

切线方程为  $\frac{x + 1 - \frac{\pi}{2}}{1} = \frac{y - 1}{1} = \frac{z - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

法平面方程为  $x + y + \sqrt{2}z - \frac{\pi}{2} - 4 = 0$

**【例5】** 求曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$  在点  $(1, -2, 1)$  处的切线和法平面方程

**【解】**

切线方程为  $\frac{x-1}{-3} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{3}$

法平面方程为  $x - z = 0$



还不关注，  
你就慢了



关注「公众号：武忠祥老师」

🎁 你将获得

- 1、「考研数学真题」电子资料
- 2、全年每日一题
- 3、每个月的考研数学复习规划
- 4、不定期武老师公仔、周边抽奖