

# 高数基础班 (21)

21	幂级数（概念、性质、函数展开为幂级数，级数求和及举例）	P164-P172
----	-----------------------------	-----------

主讲 武忠祥 教授



还不关注，  
你就慢了



# 第二节 幂级数

## 本节内容要点

### 一. 考试内容概要

(一) 收敛半径 收敛区间 收敛域

(二) 幂级数的性质

(三) 函数的幂级数展开

### 二. 常考题型与典型例题

题型一 求收敛半径、收敛区间及收敛域

题型二 将函数展开为幂级数

题型三 级数求和


# 考试内容概要

## (一) 幂级数的收敛半径、收敛区间及收敛域

定义1 形如  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + \cdots + a_n (x - x_0)^n + \cdots$$

$$x - x_0 = t$$



定理1 (阿贝尔定理)

(1) 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  当  $x = x_0 (x_0 \neq 0)$  时收敛, 则当  $|x| < |x_0|$  时,

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  绝对收敛.

(2) 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  当  $x = x_0$  时发散, 则当  $|x| > |x_0|$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  发散.

**定理2** 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛性有且仅有以下三种可能

(1) 对任何  $x \in (-\infty, +\infty)$  都收敛;  $R = +\infty$

(2) 仅在  $x = 0$  处收敛;  $R = 0$

(3) 存在一个正数  $R$ , 当  $|x| < R$  时绝对收敛, 当  $|x| > R$  时发散.

**【注】** 若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在点  $x = x_0$  处条件收敛, 则点  $x_0$

必为该幂级数收敛区间  $(-R, R)$  的一个端点.

定理3 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ , 则  $R = \frac{1}{\rho}$ .

$\rho = +\infty, R = 0$   
 $\rho = 0, R = +\infty$

定理4 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ , 则  $R = \frac{1}{\rho}$ .

$(-R, R)$  收敛区间  
 $x = \pm R$  收敛域

## (二) 幂级数的性质

### 1) 有理运算性质

设  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R_1$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  的收敛半径为  $R_2$ ,

令  $R = \min\{R_1, R_2\}$ , 则当  $x \in (-R, R)$

$R_1 \neq R_2$

$R_1 = 1, R_2 = 1$   
 $\sum x^n + \sum (-x^n)$

(1) 加减法:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$

$R_1 = R_2 = 2 \Rightarrow R = 2$   
 $\sum 0 x^n$   
 $R = +\infty$

(2) 乘法:  $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n) \cdot (\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

$c_n = \underline{a_0 b_n} + \underline{a_1 b_{n-1}} + \cdots + \underline{a_n b_0}$

(3) 除法: 
$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

2) 分析性质:

设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R$ , 和函数为  $S(x)$ . 则

(1) 连续性:  $S(x)$  在 收敛域 上连续;

(2) 可导性:  $S(x)$  在  $(-R, R)$  上 可导, 且可逐项求导,

任意阶可导

半径不变. 即  
A A A A

$$\underline{S'(x)} = \left( \sum_{n=0}^{\infty} \underline{a_n} x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} \underline{n a_n} x^{n-1}$$

(3) 可积性:  $S(x)$  在收敛域上 可积, 且可逐项积分,

半径不变. 即

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} a_n x^{n+1}. \quad R$$

### (三) 函数的幂级数展开

定理1 如果函数  $f(x)$  在区间  $(x_0 - R, x_0 + R)$  上能展开为

$x - x_0$  的幂级数  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ , 则, 其展开式是唯一的,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \approx f(x) \quad \checkmark$$

$f(x)$  在  $x = x_0$  处的泰勒级数.

**定理2** 设  $f(x)$  在  $x = x_0$  处任意阶可导, 则  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$

在  $(x_0 - R, x_0 + R)$  上收敛于  $f(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ .

其中  $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$  为  $f(x)$  在  $x_0$  处的泰勒公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$$

中的余项.



# 几个常用的展开式

$$\int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x (1 - t + t^2 - t^3 + \dots) dt$$

$$(1) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots; \quad (-1 < x < 1)$$

$$(2) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad (-\infty < x < +\infty) \quad \text{真} \quad \checkmark$$

$$(3) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots \quad (-\infty < x < +\infty) \quad \text{真} \quad \checkmark$$

$$(4) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad (-\infty < x < +\infty) \quad \text{真}$$

$$(5) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \dots \quad (-1 < x \leq 1) \quad \text{真}$$

$$(6) \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots \quad (-1 < x < 1) \quad \text{真}$$

# 函数展开为幂级数的两种方法

## 1) 直接展开法

第一步  $f(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$

第二步 考查  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} = 0$

是否成立.

## 2) 间接展开法

根据函数展开为幂级数的唯一性，从某些已知函数的展开式出发，利用幂级数的性质（四则运算，逐项求导，逐项积分）及变量代换等方法，求得所给函数的展开式.

# 常考题型与典型例题

## 常考题型

1.求收敛半径、收敛区间、收敛域;

2.将函数展成幂级数;

3.求幂级数的和函数.

\* 唯.重.

# 一. 求收敛半径、收敛区间及收敛域

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho^n = 0, \quad |x| < 1$$

【例1】(09年3) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^n$  的收敛半径为                     .  $\left[\frac{1}{e}\right]$

【解1】  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1} - (-1)^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{e^n - (-1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e + (-\frac{1}{e})^n}{1 - (-\frac{1}{e})^n} \cdot \frac{n^2}{(n+1)^2} = e$

$R = \frac{1}{e}$

【解2】  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{e^n - (-1)^n}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e \sqrt[n]{1 - (-\frac{1}{e})^n}}{(\sqrt[n]{n})^2} = e$

$R = \frac{1}{e}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

【例2】(1995年1) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$  的收敛半径  $R = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【解】

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n [1 + (-\frac{2}{3})^n]}} = \frac{1}{3} \frac{\sqrt[n]{n} \rightarrow 1}{\sqrt[n]{1 + (-\frac{2}{3})^n} \rightarrow 1}$$

$$= \frac{1}{3} = \rho$$

~~$R = \frac{1}{\rho} = 3$~~

$R = \sqrt{3}$

!!!

$$|x^2| < 3$$

$\Downarrow$

$$|x| < \sqrt{3}$$

奇次项

$[\sqrt{3}]$

【例3】(00年1) 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$  的收敛区间, 并讨论

该区间端点处的收敛性.

【解】  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[3^n + (-2)^n]n}{[3^{n+1} + (-2)^{n+1}](n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n\right]n}{3\left[1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right](n+1)} = \frac{1}{3} = \rho \rightarrow \frac{2}{3} < 1$

或  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{3^n + (-2)^n} \sqrt[n]{n}} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n}} = \frac{1}{3}$

所以收敛半径为3, 收敛区间为  $(-3, 3)$

当  $x = 3$  时,  $\frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} > \frac{1}{2n}$ , 且  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散, 原级数发散.

当  $x = -3$  时,  $\frac{(-3)^n + 2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = (-1)^n \frac{1}{n} - \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)$   
且都收敛, 原级数收敛.

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}}$$

\*

$(-R, R)$

收敛域

$[-3, 3)$

【例4】(2008年1) 已知幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$  在  $x=0$  处收敛, 在


$x=-4$  处发散, 则幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$  的收敛域为 \_\_\_\_\_.

【解】

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$$

$$(-4, 0]$$

阿达定理 \*



【例5】若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  条件收敛，则  $x = \sqrt{3}$  与  $x = 3$

依次为幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$  的

(A) 收敛点，收敛点.

(B) 收敛点，发散点.

(C) 发散点，收敛点.

(D) 发散点，发散点.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$$

【解】由级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  条件收敛可知幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$  在  $x = 2$

处条件收敛，则  $x = 2$  为幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$  的收敛区间的端点，

故其收敛半径为 1. 由幂级数的性质可知幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$  的收敛半径也为 1.

由于  $|\sqrt{3} - 1| < 1, |3 - 1| > 1$ . 则  $x = \sqrt{3}$  为收敛点，

$x = 3$  为发散点，故应选 (B).



## 二. 将函数展开为幂级数

【例6】(06年1) 将函数  $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$  展开成  $x$  的幂级数.

【解】 因为  $\frac{x}{2+x-x^2} = \frac{x}{3} \left( \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x} \right)$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}, \quad |x| < 2$$

$$\frac{x}{2+x-x^2} = \frac{x}{3} \left( \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x} \right)$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ (-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right] x^{n+1}, \quad |x| < 1.$$

$$\frac{1}{1-x}$$

$$\frac{1}{3} \frac{(2-x) + (1+x)}{(2-x)(1+x)}$$

【例7】(2007年3) 将函数  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$  展开成  $(x-1)$  的幂级数, 并指出其收敛区间.

【解】 因为  $\frac{1}{x^2 - 3x - 4} = \frac{1}{5} \left( \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1} \right)$

$$\frac{1}{x-4} = \frac{1}{(x-1)-3} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1-\frac{x-1}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x-1}{3} \right)^n, \quad x \in (-2, 4)$$

$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{(x-1)+2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{x-1}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left( -\frac{x-1}{2} \right)^n, \quad x \in (-1, 3)$$

所以  $\frac{1}{x^2 - 3x - 4} = -\frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \frac{1}{3^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right] (x-1)^n, \quad x \in (-1, 3).$

Handwritten red notes showing the partial fraction decomposition of  $\frac{1}{x^2 - 3x - 4}$  into  $\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1}$ . The decomposition is written as  $\frac{1}{x^2 - 3x - 4} = \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1}$  with a checkmark next to it.

【例8】将函数  $f(x) = \ln(x^2 + x)$  在  $x=1$  处展开为幂级数.

【解】

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$$

$x-1$   
 $x=0$

$$[\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (1 + \frac{1}{2^n})(x-1)^n, |x-1| < 1]$$

$$f(x) = \ln x(x+1) = \ln x + \ln(x+1)$$

$$|x-1| < 1 \quad \checkmark$$

$$= \ln[1+(x-1)] + \ln[2+(x-1)]$$

$$|\frac{x-1}{2}| < 1$$

$$= \ln[1+(x-1)] + \ln 2 + \ln[1 + \frac{x-1}{2}]$$

$$|x-1| < 2 \quad \checkmark$$

$$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-1)^n}{n} + \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(\frac{x-1}{2}\right)^n$$

【例9】将函数  $f(x) = \sin x$  在  $x = \frac{\pi}{4}$  处展开为幂级数.

$x=0$

【解】  $f(x) = \sin\left[\frac{\pi}{4} + \left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right]$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2n}}{(2n)!} \right]$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

【例10】将函数  $f(x) = \arctan x^2$  展开成  $x$  的幂级数.

$$[2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n+2} x^{4n+2}, |x| < 1]$$

【解】

$$\boxed{f'(x) \approx \frac{2x}{1+x^4}} \quad f(0) \approx 0$$

$$= 2x \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n+1}$$

$$\frac{1}{1+x^4} \quad \checkmark$$

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(x) dx = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+2}}{4n+2}$$

$$|x^4| < 1$$

$$\infty \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad |x| < 1$$

$$\begin{matrix} f(x) \\ || \\ \dots \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} +c \\ \hline \checkmark \end{matrix}$$

$$|x| < 1$$

### 三. 级数求和

【例11】求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$  的收敛域及和函数.

【解】

$$R=1$$

$$x=\pm 1 \text{ 均不收敛}$$

$$\underline{(-1, 1)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

$$= x \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left( \frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$$

求和函数

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-x} \xrightarrow{\text{求导}} \frac{1}{(1-x)^2}$$

求和函数

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$[(-1, 1); \frac{x}{(1-x)^2}]$

① 求和函数  
② 求收敛域

【例12】(2017年1) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$  在区间  $(-1,1)$

内的和函数  $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .  $\left( x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} \right)$

【解】  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n \right)'$

$$= \left( \frac{x}{1+x} \right)' = \frac{1}{(1+x)^2} \left( - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n \right)' = \left( - \left( \frac{1}{1+x} - 1 \right) \right)'$$

$$\frac{(1+x) - x}{(1+x)^2}$$

$$\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

【例13】(2014年3) 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$  的收敛域及和函数.

【解】  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1, R = 1$ , 当  $x = \pm 1$  时原级数显然发散, 则其收

敛域为  $(-1, 1)$ .

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

$$= \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} \right)'' + \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right)' = \left( \frac{x^2}{1-x} \right)'' + \left( \frac{x}{1-x} \right)'$$

$$= \left( -\frac{2x}{(1-x)^3} + \frac{1}{(1-x)^2} \right) + \left( -\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(1-x)^2} \right)$$

$$= \frac{3-x}{(1-x)^3} \quad x \in (-1, 1).$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$



【例14】求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$  的收敛域及和函数.

【解】  $R=1, x=\pm 1$   $x \in [-1, 1]$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)-n}{n(n+1)} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$$

$$= -\ln(1-x) - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (x \neq 0)$$

$$= -\ln(1-x) - \frac{1}{x} [-\ln(1-x) - x] \quad (x \neq 0)$$

【注】可利用结论  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) \quad (-1 \leq x < 1).$

解.

$$-\ln(1-x) - \frac{1}{x} [-\ln(1-x) - x]$$

$$S(x) = \begin{cases} -\ln(1-x) - \frac{1}{x} [-\ln(1-x) - x] & -1 \leq x < 0 \\ 0 & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

$$\frac{x^2}{2}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$\{[-1, 1]; 1 + (\frac{1}{x} - 1)\ln(1-x)\}$$

【例15】(2010年1) 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$  的收敛域及和函数.

【解】 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} = 1$  因此收敛半径  $R=1$ .

当  $x = \pm 1$  时, 原级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$  收敛, 因收敛域为  $[-1, 1]$ .

设  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} \quad (-1 \leq x \leq 1)$

则  $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}$

又  $S(0) = 0$ , 故  $S(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x$

于是  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = xS(x) = x \arctan x, x \in [-1, 1].$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

$$u_n = \frac{1}{2n-1} \quad \checkmark$$

$\rightarrow 0$

$$(x^2)^{n-1}$$

$$S(x) - S(0) = \int_0^x S'(x) dx$$



还不关注，  
你就慢了



关注「公众号：武忠祥老师」

📁 你将获得

- 1、「考研数学真题」电子资料
- 2、全年每日一题
- 3、每个月的考研数学复习规划
- 4、不定期武老师公仔、周边抽奖