
Comenzado en	Saturday, 4 de March de 2023, 13:00
	Terminados
Finalizado en	Saturday, 4 de March de 2023, 14:28
Tiempo	1 hora 28 mins
empleado	
Calificación	75.00 de un total de 100.00

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 15.00 sobre 15.00

Se tienen tres cargas ($\mathbf{Q} = 5.00 \text{ nC}$) formando un triángulo equilátero de 1.50 m de lado.



a) El campo eléctrico resultante (en N/C) en el **punto "p"**, que es el punto medio del lado del triángulo, tiene un valor de:

Respuesta:

169

~

b) La energía potencial eléctrica (en nJ) del sistema de partículas es de:

Respuesta:

-150



c) Considerando potencial cero en el infinito, el potencial (en V) en el **punto "p"** del sistema de partículas es de:

Respuesta:

69.3




Pregunta 2

Parcialmente correcta

Puntúa 15.00 sobre 20.00

Un electrón en un monitor de computadora entra a medio camino entre dos placas paralelas con cargas opuestas como en la figura. La rapidez inicial del electrón es 5.10×10^{7} (+i) m/s y su desviación vertical en el punto "d" es 4.70 mm.



a) Calcular la magnitud del campo eléctrico entre las placas (en kN/C) (8 puntos)

Respuesta =

[13.9



b) Calcular la magnitud de la aceleración del electrón (en 10¹⁵ m/s²) (7 puntos)

Respuesta =

2.45



c) Determine la magnitud de la densidad de la carga superficial en las placas (en nC/m²) (5 puntos)

Respuesta =

247



Pregunta 3

Parcialmente correcta

Puntúa 5.00 sobre 10.00

Una partícula de masa 3.00 μ g y carga 7.50 nC, se mueve del punto $\bf{\it A}$ al punto $\bf{\it B}$ y solamente el campo eléctrico actúa durante su movimiento. En el punto $\bf{\it A}$ tiene una velocidad de 45.0 m/s. En el punto $\bf{\it B}$ tiene una velocidad de 120 m/s. Determine la diferencia de potencial $V_B - V_A$ (en kV)

Respuesta =

2.48

×

Comentario:

Pregunta 4 Correcta Puntúa 10.00 sobre 10.00 a) El momento dipolar de un dipolo, dentro de un campo eléctrico de 300 N/C, se encuentra inicialmente perpendicular a un campo eléctrico, pero se hace rotar en la misma dirección que el campo. Si el momento tiene una magnitud de 2.00 x 10⁻⁹ C.m, el trabajo (en nJ) realizado por el campo es: Respuesta = 600 b) Si en un instante la magnitud del momento de torsión que se ejerce sobre el dipolo es de 3.00 x 10 -7 Nm, el ángulo (en grados) que forma la recta que une a las cargas del dipolo con el campo eléctrico es: Respuesta = 30.0 Pregunta 5 Correcta Puntúa 15.00 sobre 15.00 Una varilla uniformemente cargada (de largo 5.00 m, y carga por unidad de longitud de 6.00 nC/m) está doblada en la forma de un cuadrante de circulo. Cuál es la magnitud del campo eléctrico (en N/C) en el centro del círculo? Respuesta = 26.6 Pregunta 6 Correcta Puntúa 15.00 sobre 15.00 a) Un cilindro macizo no conductor, largo de radio R=15.0~cm y longitud L, tiene una densidad uniforme de $4.50~\mu C/m^3$. Deje constancia en su procedimiento y utilice la Ley de Gauss para calcular el campo eléctrico (en kN/C) a una distancia r = 12.0 cm. (8 puntos) Respuesta = 30.5 b) Utilizando la Ley de Gauss y dejar constancia en su procedimiento, calcule el campo eléctrico (en kN/C) a una distancia $r = 25.0 \, cm$ (7 puntos) Respuesta = 22.9

Pregunta 7
Incorrecta
Puntúa 0.00 sobre 15.00
Una carga positiva $Q = 6.00 nC$ está distribuida uniformemente en una esfera aislada de radio $R = 12.0 cm$, centrada en el origen de coordenadas. Utilizando la Ley de Gauss y dejando constancia de su aplicación:
a) Calcular el flujo eléctrico (en <i>N/Cm</i> ²) a través de otra esfera concéntrica con radio 5.00 <i>cm</i> Respuesta = 282
b) Calcular la magnitud del campo eléctrico (en <i>N/Cm</i> ²) producido por la esfera de radio 12.0 <i>cm</i> en el punto <i>y</i> = 5.00 <i>cm</i> es: Respuesta = 8988
c) Si ahora se coloca una carga puntual $q = + 1.20 nC$ en el punto $y = 18.0 cm$, calcular la magnitud del campo resultante en el punto $y = 15.0 cm$ (en kN/C): Respuesta = 1.20
→ Problema 16 (Ejercicio 61- Serway-Jewett, 7a Edición)
lr a

Clave Primer Examen Parcial ►