

ANDRÉS NAVAS

UN  
33 HISTORIAS  
VIAJE  
MATEMÁTICAS  
A LAS  
ASOMBROSAS  
IDEAS

Se

¿Cómo influye la geometría en nuestro día a día?, ¿cuál es el origen de la primera bandera de Chile?, ¿cuán inexactos son los mapas del mundo?, ¿quién fue el primer científico chileno?, ¿por qué no hay un Premio Nobel de Matemáticas?, ¿cómo se trabajan las exitosas películas animadas de Pixar?, ¿qué tiene que ver la flor del naranjo con el azar? o ¿qué famosos personajes de la historia universal fueron matemáticos? son algunas de las preguntas que responde el libro que tienes en tus manos.

Andrés Navas, académico universitario ganador de los premios MCA (2013) y Umalca (2016), logra, a través de 33 historias, iluminar el oscuro y misterioso mundo de las matemáticas con un talento narrativo sorprendente, haciendo que la compleja mente de Ramanujan se relacione con la geometría del papel tisú, y que la forma del estadio del Bayern de Múnich coexista con el arte de Escher. Porque, para nuestro autor, la historia, la ciencia, la política, el arte y la cultura son materias que dialogan y a las que podemos entrar con la avidez con la que se ve un partido de fútbol o se escucha una canción.

En un esfuerzo único, Navas abre la puerta para que la divulgación matemática encuentre su lugar entre los lectores, escribiendo el primer texto sobre esta ciencia exacta pensado para un público amplio en Chile. No necesitas más que ser curioso para maravillarte con este hermoso y desconocido mundo.



Andrés Navas

**Un viaje a las ideas**  
**33 historias matemáticas asombrosas**

ePub r1.2  
Un\_Tal\_Lucas 26.07.2019

Andrés Navas, 2017

Editor digital: Un\_Tal\_Lucas  
ePub base r2.1

Aa



## DEDICATORIA

A la memoria de mi primer gran maestro, Cecilia Saavedra Herrera (de la Escuela D174 República de Francia), quien, siendo heredera de la tradición del profesorado normalista, concebía la educación como un doble oficio de rigor y entrega sin límites. Mis agradecimientos por todas esas lecciones de las cuales era simplemente imposible olvidar nada, incluida una peculiar enseñanza matemática: «Para saber si un número es divisible por 7, basta dividirlo por 7».

A la memoria de Ramón Correa Soto (uno de los valientes del Congreso de Catapilco; capítulo 23), quien a lo largo de toda su carrera trabajó incansablemente por el desarrollo de la matemática chilena, al punto de hacerme llegar, a pesar de la enfermedad que lo aquejaba, su lista de observaciones al original de este libro tan solo unos días antes de su partida.

A la memoria del matemático francés Jean-Christophe Yoccoz, un científico gigante (recompensado con una Medalla Fields en 1994) cuya extraordinaria humildad y gentileza desviaron el rumbo hacia nuestro país, el cual visitó en diversas ocasiones para dictar cursos, organizar conferencias y guiar estudiantes de doctorado (Juan Rivera-Letelier y Mario Ponce). Mis agradecimientos por esas tensas tardes de invierno en 2003 contemplando el volcán Licancabur por la ventana de un café en San Pedro de Atacama mientras mi tesis de doctorado se iba lentamente llenando con sus amables anotaciones en tinta de color rojo...

A la memoria de José Balmes (Premio Nacional de Artes Plásticas 1999), quien, en 1995, a petición del entonces presidente de la Sociedad de Matemática de Chile —Samuel Navarro—, pintó un cuadro<sup>[11]</sup> de inspiración matemática para promocionar la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en Viña del Mar (uno de los ganadores de esa competencia para adolescentes fue Artur Ávila, quien diecinueve años más tarde se convertiría en el primer latinoamericano en ganar una Medalla Fields). En dicha ocasión, Balmes accedió a realizar tan curiosa obra argumentando que «tanto matemáticos como artistas estamos igual de locos». Unos días antes de su fallecimiento, dio su autorización para que su obra (reproducida abajo) pudiese aparecer en este libro.



«Gracias a la vida, que me ha dado tanto,  
me dio el corazón, que agita su marco,  
cuando miro el fruto, del cerebro humano...»

**Violeta Parra**

## ANTES DE EMPEZAR ESTE VIAJE

«Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros, es un objeto de primera necesidad». Esta frase, acuñada por Nicanor Parra en su «Manifiesto», es perfectamente aplicable hoy a la ciencia. Así, los «resplandores» de esta «debieran llegar a todos por igual, pues alcanza para todos». Ahora bien, ¿cómo propiciar este acercamiento de la gente a la ciencia más allá de las instancias educacionales tradicionales? ¿Cómo ofrecer un acceso a la vez rápido y certero a esa «oscura» actividad humana que tal vez sea —muchas veces sin que se sepa— la que más influye en nuestras vidas, y que seguirá modificando por siempre nuestros patrones de comportamiento? Libros, museos, festivales culturales, programación tanto radial como televisiva, medios de prensa, internet, redes sociales, etcétera; ciertamente todos estos caminos son propicios para ello. Sin embargo, la tarea seguirá estando inconclusa mientras los científicos no realicemos el esfuerzo de bajar de nuestro pequeño y querido —aunque a menudo desconocido— «Olimpo» para colaborar directamente con ella como obreros, sin aspirar a sacralidad ni —peor aun— utilizar este espacio como vitrina de marketing personal o institucional.

Difícil labor para nosotros. Atrapados en la vorágine de las reglas que rigen hoy la administración universitaria, con la eterna presión para publicar más y más artículos en revistas indexadas, y con la siempre urgente necesidad de adjudicarnos proyectos, de redactar informes, de evaluar y autoevaluarnos, de acreditar y acreditarnos, aquella que debiese ser una labor primordial —la difusión del conocimiento— ha ido quedando relegada cada vez más al estricto espacio otorgado a nuestras horas de clase. Increíble paradoja: en el período de la historia en que tenemos más medios para conectarnos unos con otros, la subvaloración de toda instancia comunicativa que rompa las reglas estandarizadas del trabajo académico es abismante. Así, nos resulta mucho más cómodo escribir extensos textos de estudio o largas guías de ejercicios para los estudiantes (por los que seguramente seremos recompensados) que grabar un video que contenga todo esto y subirlo a Vimeo o YouTube para hacerlo accesible a todo el mundo (acción por la cual un estigma de falta de seriedad caerá seguramente sobre nosotros). La divulgación científica se ve así empantanada por perniciosos elementos de la vida académica, a los que se suman la desidia de los estamentos involucrados.

Sin embargo, científicos de todo el mundo han tomado conciencia de este problema, y han incorporado la tarea divulgadora como una de sus misiones primordiales. Contraviniendo las convenciones que supuestamente debieran guiar sus carreras, desafiando la incredulidad e incomprendición de muchos colegas, y «sacrificando» una parte valiosa de su tiempo, han comprendido que son ellos quienes más tienen que decir sobre su propio saber y que, sobre todo, son ellos quienes mejor pueden transmitir su pasión, motor esencial de la ciencia.

¿Vale la pena replicar estas experiencias a escala local? Ciertamente que sí, pero con algo de prudencia. En el ejercicio de la divulgación científica, instintivamente se tiende a reproducir modelos que, pudiendo funcionar perfectamente en otras latitudes, no siempre contribuyen de igual manera en nuestro entorno más cercano. En un país de poca tradición científica como el nuestro, las teorías más elaboradas nos pueden parecer a veces un poco ajena, especialmente si estas son el producto del trabajo realizado en regiones distantes. Así, para propiciar un acercamiento no basta solo con hablar de «la ciencia», sino que también es necesario hablar de «nuestra ciencia», sin olvidar que los actores principales de esta obra, los científicos, no somos entes inmaculados a través de los cuales se devela la verdad científica, sino que vivimos inmersos en una sociedad cambiante a la que debemos nuestro trabajo.

La tan vilipendiada matemática no ha escapado a esta ola divulgativa. Así lo constatan el trabajo pionero de Hassler Whitney y Martin Gardner en Estados Unidos y de los grandes equipos de divulgadores de la Rusia soviética (muchos de ellos cobijados bajo el alero de la labor descomunal ejecutada por Nikolay Konstantinov a lo largo de varias décadas). Más recientemente, así lo corroboran el trabajo de Hannah Fry, John Barrow, John H. Conway, Marcus du Sautoy y Simon Singh en Inglaterra; de Tadashi Tokieda en Japón; de Tianxin Cai en China; de Ali Nesin en Turquía; de Étienne Ghys y Cédric Villani en Francia; de Nikolai Andreyev en Rusia; de Marta Macho Stadler y Eduardo Sáenz de Cabezón en España; de Pablo Amster y Adrián Paenza en Argentina, y de tantos, tantos otros. Cada uno con su propio estilo, sello local y personalidad, y apuntando a audiencias diferentes, ha sido artífice de las primeras alegrías de cientos de jóvenes que en el futuro seguirán una carrera ya sea técnica o científica, así como del asombro de un público variopinto que se creía completamente ajeno a estos quehaceres. ¡Nada podría ser más gratificante!

Transmitir matemática no es una tarea sencilla, pues suele gozar de la peor reputación. Oscura, aburrida e inútil, son solo algunas de las cualidades que a menudo se le atribuyen. Sin embargo, nada de eso se condice con la realidad. La matemática es diáfana, pues es fuente reveladora de una verdad

profunda, inmutable e inamovible. También es entretenidísima, pero lamentablemente es enseñada muchas veces en la escuela —y a veces incluso en la universidad— sobre la base de la mecanización y la memorización, las que aniquilan toda curiosidad, y no de la comprensión ni del encantamiento a través de la práctica. Finalmente, es quizás la más útil de todas las ciencias, pues, por una parte, sus métodos, conceptos y lenguaje son usados por todas las otras ciencias y, por otra, es utilizada cotidianamente en las más variadas instancias, que van desde un simple cálculo de vuelto en un almacén hasta el envío de satélites al espacio, pasando por el acontecimiento rutinario más sagrado en estos días: el funcionamiento del teléfono celular.

Este libro es un aporte más a la gigantesca tarea divulgativa de la matemática. Una parte importante de las 33 historias que siguen fueron publicadas en forma de columnas en el diario electrónico *El Mostrador*, aunque aquí son transcritas con un ligero trabajo editorial, el cual incluye actualizaciones, complementación de datos y algunas notas explicativas y comentarios anexos (encerrados en recuadros sombreados en celeste) para los más entendidos. Muchos de los relatos restantes se articulan en torno a los primeros y, en general, tienen una extensión mayor por ser más informativos; además, ellos aparecen por primera vez en este libro, salvo excepciones ya publicados en otros medios más especializados, como los sitios electrónicos de divulgación RedCiencia (dependiente de Conicyt, Chile) e Images des Mathématiques (dependiente del CNRS, Francia). Aunque la organización tiene un carácter temático (y no sigue necesariamente el orden cronológico de la publicación y/o producción original), los capítulos son esencialmente independientes unos de otros, por lo que pueden ser leídos casi en cualquier orden (varias referencias cruzadas entre ellos son explícitamente mencionadas). Hay capítulos para todos los gustos: algunos largos y otros muy cortos, unos novelescos y otros un poco más técnicos, unos cuantos sencillos y otros más complejos, varios divertidos (o, al menos, espero que lo sean) y algunos bastante duros y trágicos. La lectura puede hacerse, además, en distintos niveles de profundidad, por lo que no debe desanimarse en el camino: a través de las siguientes páginas, entre muchas otras cosas, usted podrá sorprenderse con la geometría escondida en los diseños de la bandera de la Independencia de Chile, los balones de fútbol y el Estadio Olímpico de Múnich, aprenderá de embaldosados, cuasicristales y obras de Escher, vislumbrará teorías matemáticas modernas (como la geometría no euclidiana, la topología o la teoría del caos), se enterará de qué se hace en una conferencia de matemática y por qué no existe un Premio Nobel para esta ciencia, y sobre todo, descubrirá que muchos matemáticos han vivido (y a veces sufrido) intensamente la época en que les tocó existir.

Si bien algunos pasajes del libro pueden parecer un poco densos, aquello no necesariamente es atribuible a mi falta de capacidad para transmitir ideas de manera coloquial. En efecto, a menudo estas ideas no son infinitamente simplificables, pues hay un nivel mínimo desde el cual un concepto primario debe ser reconocido. Por esta razón, haber tratado de rebasar cierto límite didáctico hubiese puesto en riesgo la sustancia del texto. Como consecuencia, no es esperable que absolutamente todo lo aquí escrito sea comprendido en una primera lectura, e incluso en una relectura. De hecho, la elaboración de varios capítulos me significó, en algunas ocasiones, largos procesos de estudio y reflexión. En este sentido, sería más bien esperable que este libro desperte su curiosidad animándolo a investigar más allá de lo expuesto. No existe excusa: con un simple clic de búsqueda en internet, se puede rastrear un tema por medio de un par de «palabras clave», y un vendaval de información estará a disposición. A modo de ejemplo, y en relación con el primer capítulo, pruebe con «división aurea», y —al año 2016— tendrá nada menos que 371 000 entradas en Google, incluyendo 155 000 relacionadas con banderas, y 25 400 específicas para la bandera de Chile, incluyendo la página de Wikipedia.

Para orientar un poco la navegación virtual en torno al libro, hemos añadido a nuestras referencias varios de estos documentos, incluyendo —entre otros— artículos accesibles en la web y videos en Vimeo y YouTube. Evidentemente, no reclamo autoría sobre ninguno, sino que simplemente me he servido de ellos en el espacio de libertad que nos confiere la red. Muy probablemente, habrá quienes teman por la eventual caducidad de estos archivos y critiquen este estilo poco ortodoxo para dar referencias. Para soslayar este problema, un repositorio quedará disponible desde el sitio de Facebook «Un viaje a las ideas», al cual dejo extendida una invitación abierta a adherirse y discutir en mayor profundidad los contenidos aquí presentados.


## LA DIMENSIÓN HERMOSA Y DESCONOCIDA DE LA PRIMERA BANDERA DE CHILE




Si se le preguntara a una persona ligada a la matemática cuál es el más hermoso de todos los números, muy probablemente esta le respondería —tal como yo lo haría— que es el número de oro, aquel que usualmente se denota con la letra griega  $\varphi$  (léase «fi») y tiene el valor  $(\sqrt{5} + 1)/2 \sim 1,681\dots$ . Esta elección puede justificarse a partir de la ciencia misma, pero resulta mucho más inspirador hacerlo desde nuestro entorno, pues este número es omnipresente en la naturaleza. La disposición de las hojas en las plantas (filotaxis), la proporción entre diversas partes del cuerpo humano, la forma de las caracolas de mar, etcétera, obedecen a patrones ligados a él. A menudo esto se debe a que en los procesos biológicos rigen leyes de autorreplicación con los cuales  $\varphi$  está intrínsecamente relacionado. En efecto, este número corresponde a la proporción en la que debe ser dividido un trazo para que el todo sea a la parte más grande como esta es a la más pequeña. De esta manera, el número de oro corresponde a algo así como un punto de equilibrio al pasar de una escala mayor a otra menor:  $\varphi$  es el número de la armonía.

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \Phi = 1.618\dots$$

Existen diversos métodos para conseguir esta división (denominada «áurea» o «dorada»), pero tal vez el más sencillo está dado por el conocido «triángulo mágico» (o «triángulo áureo»), aquel de dos ángulos de  $72^\circ$  y uno de  $36^\circ$ . En él, la proporción de los lados mayores respecto del menor es necesariamente igual a  $\varphi$ . Además, si se divide un ángulo de  $72^\circ$  en dos de  $36^\circ$ , entonces la proyección en el otro lado determina también una división áurea. Otro triángulo con una propiedad similar es el «gnomon áureo», de dos ángulos de  $36^\circ$  y uno de  $108^\circ$ . En este, la proporción del lado mayor respecto a los menores también es igual a  $\varphi$ . El número de oro aparece así estrechamente ligado a un pentágono regular, pues los triángulos y gnómones áureos emergen de él al trazar las diagonales, dando origen a la estrella de cinco puntas.



Se tiene antecedentes de la división áurea desde las tablas sumerias del 3200 a. C., en las que aparece asociada a varios pentagramas. Posteriormente, los antiguos griegos lograron comprender de manera sistemática la importancia de  $\varphi$  y su efecto estético, tanto así que lo implementaron en muchas de sus magnas construcciones, como el colosal Partenón de Atenas. De hecho, la notación  $\varphi$  se estableció en honor a Fidias, creador de varias de las esculturas del templo. Pero quien hizo de la división áurea una pequeña joya de la cultura en Occidente fue el monje matemático Luca Paccioli, a través de su libro *La divina proportione* (1509). Esta preciosa obra está ilustrada por su gran amigo Leonardo da Vinci, quien incorporó la proporción áurea en la mayoría de sus pinturas, incluida la más sublime de todas: la *Gioconda* (o *Mona Lisa*). Su simple contemplación nos hace olvidar toda sugerencia a códigos secretos o teorías conspirativas para sobrecogernos ante su bella e insinuante sonrisa. En esta subyace la perfección de la geometría euclíadiana encapsulada en un único y prístino número que no deja de maravillar a artistas, arquitectos, místicos, poetas y científicos:  $\varphi$ .



Increíblemente, pese a su relevancia universal, es ampliamente ignorado en nuestro país que el número de oro está anclado también en lo más profundo de nuestra historia, más precisamente, en el diseño de nuestra bandera nacional, la «estrella de Chile», también conocida como la «estrella solitaria».


Por mandato de Bernardo O'Higgins, la elaboración de la bandera de la Patria Nueva fue

responsabilidad de José Ignacio Zenteno, quien al parecer encargó el diseño al español Antonio Arcos (hay quienes señalan que este fue realizado por otro español: Gregorio de Andía y Varela), siendo la confección de la primera de ellas obra de Dolores Prats de Huici (algunos mencionan a las hermanas Pineda de Concepción). Si bien la estructura y los colores son similares a los de hoy, varios detalles distintivos llaman la atención. Primeramente, constaba de dos escudos diferentes al centro (uno por cada lado). Por otra parte, dentro de la estrella pentagonal incorporaba una de ocho puntas, la *guñelve*, que en la tradición mapuche representa al planeta Venus y que fue usada por Lautaro en su pendón de guerra. Pero las diferencias no se detienen allí: las dimensiones de esta bandera eran muy distintas a las de la actual, pues estaba concebida en función de la razón áurea. Si bien no se dispone de ningún documento oficial al respecto, algunas personas se han interesado en el tema. Una de ellas es Gastón Soublette, quien exhibió varios de estos aspectos en su hermoso libro *La estrella de Chile* (1984). Sin embargo, consideraciones conceptualmente más actualizadas y mediciones más acabadas permiten corregir algunos errores y desentrañar completamente el diseño, de una belleza y elegancia geométricas deslumbrantes.

En primer lugar, el alto de la bandera se divide horizontalmente en dos partes iguales: la inferior para el campo rojo, y la superior para los campos blanco y azul. La proporción entre los largos de los campos blanco y azul es exactamente  $\varphi$ . En el campo azul, la proporción entre el alto y el largo es igual a


$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2+\sqrt{5}}} = 0,72654\dots$$

Esto permite que las diagonales del rectángulo azul formen en su centro, hacia izquierda y derecha, dos ángulos de  $72^\circ$  (el valor  $0,72654\dots$  no es otra cosa que la tangente de  $36^\circ$ ). Este aspecto es sumamente importante, pues  $72^\circ$  corresponde a la quinta parte de una circunferencia completa. La estrella de cinco puntas comienza así a delinearse.



Pero aún falta lo más impresionante: los ángulos que quedan en la intersección de las diagonales apuntando hacia arriba y abajo son de  $108^\circ$ , que al ser divididos cada uno en tres partes iguales de  $36^\circ$  nos determinan dos tríos de triángulos mágicos y dos tríos de gnómones áureos; además, los lados de los ángulos centrales de  $36^\circ$  cortan a los segmentos horizontales superior e inferior en razón áurea.

Si se traza ahora la horizontal media del campo azul, por el centro del rectángulo pasarán cinco líneas que forman consecutivamente ángulos de  $36^\circ$ . De esta forma, eligiendo alternadamente cinco puntos en estos trazos sobre una circunferencia basada en el centro, tendrá los vértices de una estrella pentagonal totalmente regular, con una inclinación dinámicamente sugerente hacia los vértices del campo azul. Un último detalle: la magnitud de la circunferencia parece haber sido escogida de modo que la razón entre el alto del campo azul y el diámetro de esta sea nuevamente igual a  $\varphi$ .



Fue esta hermosa y sofisticada bandera, de profunda inspiración masónica, la que con los dos escudos y la *guñelve* añadidos, y en una escala de 2,4 m de largo, flameó orgullosamente el 12 de febrero de 1818, día del juramento de la Independencia de Chile. Ella había sido oficializada el 18 de octubre de 1817 y, si bien fue replicada durante algunos años, rápidamente cayó en desuso. Su fin era mera cuestión de tiempo

al no existir una élite que fuese capaz de apreciar y entender su belleza y contrapesarla a la dificultad de su elaboración. Basta señalar que, incluso en 1960, el historiador Luis Valencia Avaria la describía como «de tamaño desproporcionado por su extraordinario largo».



«Una chingana», ilustración del naturalista francés Claudio Gay en su obra *Atlas de la historia física y política de Chile*, publicada en Francia en 1854. Si bien la bandera carece de los escudos y la *guñelve*, su diseño geométrico parece ser el mismo del la bandera de la Independencia.

El nacimiento definitivo de la bandera actual derivó de una ley dictada en 1912: «La proporción entre el alto y el largo —o vaina y vuelo— de la bandera chilena debe ser 2:3, quedando dividida horizontalmente en dos franjas de igual tamaño. Mientras el sector inferior corresponde al color rojo, el sector superior se subdivide a la vez en un cuadrado azul y un rectángulo blanco, cuyos largos están en proporción 1:2, respectivamente. La estrella se ubica en el centro del cantón azul y se elabora sobre una circunferencia cuyo diámetro corresponde a la mitad del lado del cantón».

Nacía así una bandera que, comparada con la original, no puede sino parecernos rígida, simplista y despojada de simbolismo. Desaparecía con esto la «primera estrella de Chile», aquella diseñada magistralmente como un emblema del portentoso destino que para nuestra patria soñaron nuestros próceres. ¿No será esto una pequeña metáfora de nuestra historia?

Bandera 1818




Bandera actual



A la izquierda: fotografía de la bandera elaborada y portada por el obrero Enrique Rhodes Illescas, quien se enroló en el Ejército para la Guerra del Pacífico y participó en varias batallas. A la derecha: fotografía de la bandera que portaban las huestes que tomaron el Morro de Arica. La primera bandera es conservada en el Museo Marítimo Nacional de Valparaíso, y la segunda en el Museo Histórico y de Armas de Arica. Claramente, el diseño geométrico de ambas corresponde al de la bandera de la Independencia, lo que muestra que este era un conocimiento que aún perduraba hacia el año 1880.

Juzgue usted: ¿cuál es más armoniosa?; ¿la bandera actual de proporción largo/alto igual a 3/2, o la de la Independencia, de proporción (irracional)  $\frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}} = 1,801\dots$ ? Dicho sea de paso, solo tres países tienen actualmente banderas de proporción largo/alto igual a un número irracional: Irán, Nepal y Togo.

La bandera de la Independencia se conserva en el Museo Histórico Nacional. En 1980 fue secuestrada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), simbolizando con ello el secuestro del ideario republicano que llevó a cabo la dictadura. Fue devuelta en 2003 por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos —con intermediación del equipo de *The Clinic*— y restaurada en 2009. Lamentablemente, ninguna de las restauraciones a las que ha sido sometida —y de las cuales no se cuenta con una bitácora completa— ha tenido especial cuidado con su extraordinario valor geométrico, de modo que sus dimensiones actuales son ligeramente diferentes a las de su concepción original.



La bandera de la Independencia tal cual es conservada hoy en el segundo piso del Museo Histórico Nacional (ubicado frente a la Plaza de Armas de Santiago y de acceso gratuito).


### Apéndice: para los amantes del olvidado arte de la regla y el compás

Con la ayuda de un aprendiz y una simple cuerda, todo buen maestro constructor suele ejecutar las dos maniobras básicas de la geometría euclíadiana: trazar rectas (extendiendo la cuerda) y dibujar circunferencias (haciendo girar una cuerda extendida y manteniendo uno de sus extremos fijo). Fueron estos simples procedimientos los que permitieron que culturas ancestrales pudieran erigir, con gran exactitud, templos, pirámides y otros monumentos en pacientes faenas que solían durar siglos e involucraban a varias generaciones. De allí nació con toda naturalidad la «geometría de la regla y el compás», hoy en día injustamente desdeñada y ausente de la formación escolar. Para quienes sienten nostalgia de ella, estos serían los pasos para construir la bandera de la Independencia usando tan nobles herramientas:

1. Sea  $AB$  un trazo horizontal de un largo cualquiera, el cual será considerado como nuestra unidad de medición.
2. Levante la perpendicular a  $AB$  en  $A$  y sobre esta marque  $P$ , de modo que  $AP = AB/2$ .
3. Sobre la prolongación de  $AP$  marque el punto  $Q$ , de modo que  $PQ = PB$  (no es difícil constatar que la longitud de  $AQ$  es igual a  $\varphi$  veces la de  $AB$ ).
4. Sean  $B'$ ,  $B''$  puntos sobre la extensión de  $AB$  tales que  $AB' = BB'' = AQ$ .
5. Sea  $R$  el punto en que se intersectan la circunferencia de centro  $A$  y radio  $AQ$  con la circunferencia de centro  $B'$  y radio  $AB$  y que está por encima de la recta  $AB$ .
6. Sea  $C$  el punto de intersección de  $AR$  con la perpendicular a  $AB$  levantada en  $B$ .
7. Sea  $D$  el punto de intersección de  $AQ$  con la perpendicular a  $BC$  por  $C$ .
8. Sea  $O$  el punto de intersección de  $AC$  con  $BD$ .
9. Trace la paralela a  $AB$  y  $CD$  pasando por  $O$ . Denote  $S_1$  y  $S_2$  los puntos de intersección de esta paralela con  $AD$  y  $BC$ , respectivamente.
10. Refleje copiando el  $\triangle AOS_1$  sobre el lado  $AO$  con vértice  $O$ , y llame  $T_1$  al punto de intersección del lado libre con  $AB$ . Haga lo mismo con el  $\triangle BOS_2$ , llamando  $T_2$  al punto de intersección del lado libre con  $AB$ .
11. Llame  $T_3$  y  $T_4$  a los puntos de intersección con  $CD$  de las prolongaciones de  $T_1O$  y  $T_2O$ , respectivamente.
12. Marque  $Q_1$  en  $AC$ , de modo que  $AQ_1 = AD$ .
13. Una  $B'$  con  $Q_1$  y trace la paralela a  $B'Q_1$  pasando por  $B$ . Denote por  $Q_2$  al punto de intersección de esta paralela con  $AC$ .
14. Marque el punto medio  $Q_3$  de  $AQ_2$ . Luego, trace la circunferencia de centro  $O$  y radio  $AQ_3$ , y llame  $R_1, R_2, \dots, R_{10}$  a los puntos de intersección de esta con  $OS_2, OC, OT_3, OT_4, OO, OS_1, OA, OT_1, OT_2$  y  $OB$ , respectivamente.
15. Una  $R_2$  con  $R_6$ , luego  $R_6$  con  $R_{10}$ , posteriormente  $R_{10}$  con  $R_4$ , luego  $R_4$  con  $R_8$ , y finalmente  $R_8$  con  $R_2$  (la estrella se obtiene de estos segmentos eliminando los trazos centrales).
16. Prolongue  $DC$  hacia la derecha y marque el punto  $P_1$ , de modo que  $DP_1 = AB'$ .
17. Una  $P_1$  con  $B'$  y, en la prolongación del trazo, marque el punto  $P_2$  tal que  $P_1B' = B'P_2$ .

**18.** Trace la perpendicular a  $P_1 P_2$  en  $P_2$ , e interséctela con la prolongación de  $DA$  en un punto  $P_3$ .

Para concluir, pinte de rojo el rectángulo  $AB'P_2P_3$  y de blanco el rectángulo  $BB'P_1C$  y la estrella determinada por  $R_2, R_4, R_6, R_8, R_{10}$ . Finalmente, pinte de azul el rectángulo  $ABCD$  menos la estrella.



## **SOBRE ÁNGELES Y DEMONIOS: MATEMÁTICA, ARTE Y PLACER**



Antes de haber sido el título de una novela de Dan Brown (el mismo autor del libro *El código da Vinci*), *Ángeles y demonios* es el nombre de uno de los grabados mejor logrados del artista holandés Maurits Escher (1898-1972), famoso además por sus ilustraciones de paisajes imaginarios y figuras imposibles. Sin embargo, a menudo se ignora que detrás de esta obra perfecta que tan bien simboliza la dualidad humana se hallan profundos conceptos matemáticos, además de una inspiración en el arte geométrico islámico.



La sala de las Camas del Baño de Comares, en la Alhambra, está plagada de diseños geométricos (no olvidemos que la palabra «azulejo» proviene del árabe: *al-zillij*). Lleva, además, la siguiente inscripción: «No hay vencedor sino Allah».

Escher era diseñador con estudios en arquitectura y realizó muchos viajes durante su juventud. A los veinticuatro años visitó la Alhambra en Granada, lo cual marcaría para siempre su carrera. Dicha construcción (declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco) es una de las más ornamentadas de la cultura árabe. En ella destacan en todo su esplendor los arabescos, diseños geométricos que decoran


muros y techos de manera repetitiva. Dicho sea de paso, decoraciones de similares características fueron (y continúan siendo) producidas por innumerables culturas. Como ejemplo concreto y cercano, resulta interesante constatar las creaciones del pueblo diaguita, cuyo estudio debiera merecer mayor atención. Sin embargo, de entre todas, las ornamentaciones de la Alhambra destacan no solo por su calidad técnica y estética, sino también porque adelantan descubrimientos científicos de varios siglos posteriores.




Iconografía diaguita, tomada del libro *Arte y Cultura Diaguita Chilena: Simetría, Simbolismo e Identidad*, de la arqueóloga Paola González (Ucayali Editores Ltda, Santiago, 2013; p. 117).

Le sugiero mirar las paredes de su cocina o baño, alguna cortina o una prenda geométricamente decorada. Notará que muchas de ellas están tapizadas con modelos que se repiten con cierta frecuencia. En general, la repetición es horizontal y vertical, aunque también puede ser en una dirección inclinada. En algunos casos, el motivo y su disposición son tan regulares que se replican, además, por rotaciones bien centradas, a veces en  $180^\circ$ , a veces en  $90^\circ$ , otras en  $60^\circ$  y  $120^\circ$ . Incluso pueden aparecer repeticiones del «tipo espejo» (llamadas reflexiones) frente a líneas bien escogidas. A todo este conjunto de simetrías y la forma en que interactúan la matemática les denomina «grupo», término no muy ilustrativo, acuñado por el célebre Évariste Galois (el mismo que muriera a los veintiún años en un duelo de caballeros tras una noche en la que escribió todos sus descubrimientos, previendo un desenlace fatal).

En 1891, el científico ruso Evgraf Fedorov describió la lista de todos los grupos de repetición posibles, constatando la existencia de exactamente diecisiete. Este resultado fue redescubierto por el matemático húngaro George Pólya en 1924, quien en un artículo de investigación lo ilustró de una manera muy especial y con una nomenclatura no menos llamativa. Observe que cada decoración presenta elementos que la hacen intrínsecamente distinta a las otras. Por ejemplo, si bien la última admite rotaciones de  $60^\circ$ , la penúltima solo admite rotaciones en  $120^\circ$ : los grupos subyacentes son, por lo tanto, diferentes.



Sorprendentemente, las ornamentaciones de la Alhambra (cuya construcción se inició en el siglo XIII) replican estas diecisiete posibilidades, sin olvidar ninguna. Escher quedó maravillado e incorporó la idea de la repetitividad en su creación. Sin embargo, a diferencia del arte arabesco en el que, en general, cada figura decorativa tiene una posición bien diferenciada del resto, en la obra de Escher las figuras se yuxtaponen en permanente competición unas con otras, en una rígida búsqueda del equilibrio. Pero tal vez la diferencia más importante radica en que Escher aprovechó todos los conocimientos matemáticos de su época. No en vano, usualmente señalaba que se hacía rodear más por científicos que por artistas. Es así como, tras conversaciones con el célebre geómetra canadiense Harold Coxeter, incorporó un nuevo elemento a sus diseños, inimaginable esta vez para los antiguos decoradores: la geometría no euclidiana. Sin este toque, *Ángeles y demonios* se vería así:



No es sino gracias a la geometría hiperbólica que la obra se ilustra en un disco en el cual las figuras se «deforman» hacia el borde. Escher comprendió a la perfección este efecto: tal deformación desaparece si «cambiamos nuestra forma de medir»: el mundo plano se reduce entonces a un disco cuyo borde es inalcanzable por estar a una distancia infinita. Surge así una geometría «negativamente curvada»

(capítulo 11), en la cual las rectas se trasforman en arcos de circunferencia que, curiosamente, son idénticas a las que utiliza editorial Planeta en su logo. Los tríos de estas «rectas curvadas» forman triángulos que, en comparación a los euclidianos, son mucho más «delgados», lo cual se manifiesta en que la suma de sus ángulos es siempre menor a  $180^\circ$  y su área nunca excede el valor  $\pi$ . Además, el teorema de Pitágoras ya no es válido, pues se produce una expansión exponencial del espacio en todas las direcciones. Como consecuencia de todo esto, ya no es posible ampliar o reducir nuestro mundo a una escala diferente, por lo que deja también de ser cierto el teorema de Thales (popularizado de manera genial por el conjunto argentino Les Luthiers; vea en YouTube «Les Luthiers, Teorema de Thales, Aquí-Les Luthiers»).





El «mundo hiperbólico» se reduce a un disco en el cual el borde está «en el infinito», y donde los caminos más cortos entre dos puntos (las «líneas geodésicas») son arcos de circunferencia como los que aparecen en el logo de editorial Planeta. Girando este disco en torno a su centro obtendrá más de estas geodésicas.

Curiosa y paradojalmente, uno de los primeros precursores de esta geometría fue un sacerdote, el jesuita Giovanni Saccheri, quien sin embargo no logró desentrañarla pues estaba endiabladamente empecinado en probar su inexistencia. Hubo que esperar la genialidad de Karl Gauss, János Bolyai, Nikolái Lobachevski, Bernhard Riemann, Felix Klein y Henri Poincaré para que sus misterios se revelaran, condensándose en uno de los inventos más notables del intelecto humano, cuya consagración máxima se dio quizás a través de las teorías de la relatividad de Albert Einstein, en las que se aplica a la perfección.

Arte y matemática tienen una sincronía muchísimo más rica que lo que se suele creer, la cual ha sido explorada a lo largo de la historia por diversas culturas. Por ejemplo, en el mundo islámico, el desarrollo artístico de la geometría nació naturalmente como un camino para acercarse a la divinidad; esto como resultado del impedimento político-religioso de representar la figura humana, la de seres vivos y, muy especialmente, la de Dios.

Pero no se trata solo de historia, sino también de presente y de futuro, pues la interacción entre arte y matemática puede dar lugar a una infinitud de experimentaciones. Es así como incluso el arte erótico ha comenzado a apoderarse de la idea de repetitividad, tal como queda ilustrado en la reproducción de más abajo de la obra *Siluetas de amor a la luz de la luna*, del artista brasileño Fernando de la Rocque (que no deja de tener ciertas reminiscencias de las esculturas de Kahrurao en la India). Por simple deleite, se exhibe también una versión en geometría hiperbólica, obtenida a partir del original mediante un programa computacional ideado y gentilmente ejecutado para este artículo por el matemático, ingeniero y diseñador belga Jos Leys. Ciertamente, nuevas experimentaciones con esta técnica son aún posibles...





En la página anterior: *Siluetas de amor a la luz de la luna*, de Fernando de la Rocque (<http://fernandodelarocque.blogspot.nl>). En esta página: la misma obra modificada computacionalmente, a través de la geometría hiperbólica, por Jos Leys ([www.josleys.com](http://www.josleys.com)). Una versión simplificada del programa empleado está disponible en el sitio [www.malinc.se/m/ImageTiling.php](http://www.malinc.se/m/ImageTiling.php). Mediante este, usted puede transformar, por ejemplo, su foto de perfil de Facebook o de WhatsApp en un precioso «mandala hiperbólico» y sorprender a sus «contactos».

## EL TRIUNFO DE LOS HEXÁGONOS




Ya sea en la forma de los panales de las abejas, en las formaciones basálticas de la Calzada del Gigante en Irlanda o en los salares del altiplano andino, las configuraciones hexagonales están muy presentes en la naturaleza. Ello está lejos de ser una simple curiosidad, sino que hay diversos procesos que condicionan este fenómeno. Lo de los panales de abejas ya había sido vislumbrado por Pappus de Alejandría en el siglo II d. C.: las abejas «eligen» la más regular de estas configuraciones por ser la que minimiza el gasto de cera. De manera más precisa, cualquier otra que cubra la misma superficie y tenga igual número de celdas utilizará más cera (en términos matemáticos, esto se traduce en que la suma de los perímetros de las regiones de división será mayor al que se obtiene si estas son hexagonales y están regularmente dispuestas). Darwin se refirió también a este fenómeno, señalando que esta «elección» de las abejas no era sino una confirmación de su teoría de la evolución.

Increíblemente, lo que para Pappus y Darwin era evidente (y estaba anclado en la vida de las abejas desde tiempos milenarios) no tuvo confirmación científica cabal sino hasta hace muy poco. En 1943, un avance fundamental fue logrado por el húngaro László Fejes Tóth, quien probó la imbatibilidad de los hexágonos regulares en comparación con cualquier combinación de regiones convexas (es decir, regiones en las que todo trazo que une dos puntos queda enteramente contenido en ellas). Pero, eventualmente, podían haber regiones aun mejores que fuesen no convexas. Esta posibilidad fue descartada recién en 1999 por Thomas Hales, por aquel entonces en la Universidad de Michigan.



A la izquierda: la Calzada del Gigante. A la derecha: el salar de Uyuni, en Bolivia.

Los procesos que determinan formaciones rocosas son más difíciles de explicar; de hecho, aunque no están del todo entendidos, se presume que en estos también opera cierto «principio de minimalidad». Sin embargo, si bien este principio funciona perfectamente en condiciones ideales, estas no se dan en la naturaleza. Así es como en el salar de Uyuni, en Bolivia, pueden apreciarse variaciones en la forma de las regiones poligonales que aparecen, muchas de las cuales tienen, incluso, menos de seis lados. Curiosamente, es difícil hallar regiones con siete o más lados. Nuevamente, esto no es casualidad. El canadiense Ian Niven probó que es imposible cubrir el plano utilizando polígonos convexos de más de seis lados, a menos que la disposición se vuelva eventualmente «degenerada», es decir, que requiera polígonos cada vez más «alargados» y «achatados».




Como se observa en la figura anterior, existen otras configuraciones que permiten cubrir el plano utilizando un único patrón hexagonal no regular dispuesto de manera astuta. De hecho, todas las diferentes posibilidades fueron descritas por Karl Reinhardt en su tesis doctoral de 1918, bajo la dirección del célebre matemático alemán Ludwig Bieberbach. Hace un par de años intenté leer este trabajo, con pésimos resultados: además de su larga extensión, está escrito en un alemán no muy moderno, y la terminología empleada no es en absoluto convencional. Decidí entonces pedir ayuda a los especialistas, y la respuesta que recibí de uno de ellos —Branko Grünbaum— me dejó aun más perplejo: «Tanto la tesis de Reinhardt como trabajos posteriores en este tema específico son tremadamente complicados, y muy probablemente incompletos; sería muy útil retomarlos hasta obtener una simplificación que sea digerible». Entiéndase bien: nadie en el mundo es capaz de reproducir los argumentos de la obra de Reinhardt, ¡pero la comunidad matemática concuerda en que estos son correctos! Aunque suene extraño, este tipo de situaciones suele ocurrir en esta ciencia.

En fin, mientras nadamos en este tormentoso mar de dudas, desde el fondo seguirán emergiendo los hexágonos, con una leve sensación de triunfo. Y si este tipo de divagaciones no le estimula no importa: de todas formas, continuará viendo hexágonos en su diario vivir por bastante tiempo, ya sea en construcciones, enrejados u ornamentaciones. Para comenzar a convencerse, tan solo mire atentamente esta fotografía (le será familiar):





El uso —más bien reciente— de patrones hexagonales en mallas permite ahorrar material, de acuerdo con la sabia «inteligencia de las abejas». Además, para los arcos de fútbol, evita de mejor manera que la pelota atraviese la red (en caso de gol, ciertamente).

## EL REGRESO DE LOS PENTÁGONOS




Si bien las cada vez más escasas abejas nos enseñan a embaldosar con hexágonos, estos no son los únicos polígonos que logran cubrir el plano. Como se observa más abajo, cualquier triángulo consigue tapizarlo si se lo dispone de manera astuta. Lo mismo sucede con cualquier cuadrilátero, sea convexo o no (recuerde que una figura es convexa si carece de concavidades, es decir, si toda línea que une dos de sus puntos queda totalmente contenida dentro de ella).




Arriba: puesto que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es  $180^\circ$ , una disposición adecuada de este permite tapizar el plano. Abajo: embaldosados por cuadriláteros, el segundo de los cuales se obtiene gracias a una feliz «coincidencia total de cóncavo y convexo».

¿Y qué sucede con los pentágonos? El perfecto y áureo pentágono regular no logra cubrir el plano sin superposiciones. Sin embargo, otros pentágonos sí lo hacen, hecho ya conocido desde tiempos antiguos. Por ejemplo, algunas calles de El Cairo están pavimentadas siguiendo el patrón ilustrado a continuación.



En el «embaldosado de El Cairo»: grupos de cuatro pentágonos se ensamblan formando hexágonos.

La historia del problema de determinar cuáles son los pentágonos que embaldosan el plano, aún inconclusa, es de lo más insólito en la matemática reciente. Y si bien no se trata de un problema central en la matemática de hoy en día, el hecho de que sea abordable para casi cualquier persona (sin importar su edad) lo hace especialmente atractivo. Sorprendentemente, se trata de un tema en extremo difícil. De hecho, la discusión ya es lo suficientemente compleja si solo se consideran pentágonos convexos. En este contexto, y tras décadas de trabajo, la solución fue anunciada por Richard Kershner en 1968. Según él, habría solo ocho tipos de pentágonos que logran cubrir el plano. Cabe señalar que no se trata necesariamente de pentágonos específicos, sino a veces de grupos conformados por pentágonos con características particulares comunes. Por ejemplo, el plano es cubierto por todo pentágono de lados  $a, b, c, d, e$  y ángulos  $A, B, C, D, E$  en el que  $b$  y  $c$  tengan la misma longitud,  $d$  y  $e$  midan lo mismo, y  $B$  y  $D$  sean ángulos rectos. Observe que a esta familia pertenece el pentágono que embaldosa las calles de la capital egipcia.




En esta familia de pentágonos se cumple  $b = c$ ,  $d = e$ , y los ángulos en  $B$  y  $D$  miden  $90^\circ$ .

La argumentación de Kershner era muy elaborada. Por ello, inicialmente solo se publicó una nota informativa del resultado en la revista *American Mathematical Monthly*. Su contenido fue comentado por Martin Gardner en su columna «Mathematical Games» de la revista *Scientific American Magazine* en

1975. Esta última llegó a las manos del experto en informática Richard James, quien hizo una lectura aguda de ella y... ¡descubrió un embaldosado pentagonal que no estaba en la lista de Kershner!


El resultado anunciado se revelaba entonces incorrecto. Pero la historia daría para mucho más. La nota de Gardner llegó también a las manos de Marjorie Rice, quien no tenía ningún tipo de formación científica, pero sí una curiosidad colosal. Las llamativas ilustraciones de la revista (dirigida por correo a su hijo) llamaron poderosamente su atención, inspirándola y motivándola a trabajar para entender lo propuesto allí. Recurriendo solo a los vagos recuerdos de sus lecciones de geometría del liceo, desarrolló técnicas y notaciones especiales para tratar el problema. El resultado fue espectacular: entre 1976 y 1977, logró descubrir nada menos que otros cuatro grupos de pentágonos que no estaban en la lista de Kershner. Con esto, íbamos ya en trece familias pentagonales.

Algunos años más tarde, en 1985, Rolf Stein dio con un embaldosado pentagonal más. La particularidad del pentágono asociado es que no pertenece a una familia grande, sino que tiene medidas angulares muy precisas ( $A = 90^\circ$ ,  $B \sim 145,34^\circ$ ,  $C \sim 69,32^\circ$ ,  $D \sim 124,66^\circ$ ,  $E \sim 110,68^\circ$ ). Hasta ese instante, la lista llegaba a los catorce tipos de pentágonos. El problema quedaría prácticamente enterrado y sin ningún avance por mucho tiempo.




El pentágono de Rolf Stein.

Hubo que esperar treinta años para que un nuevo pentágono aflorara. Usando un algoritmo computacional, el equipo formado por Case Mann, Jennifer McLoud y David von Derau logró dar, en 2015, con un decimoquinto embaldosado pentagonal, ilustrado tanto al inicio de este capítulo como al final del cuadro de la página siguiente. Nuevamente se trata de un pentágono muy preciso y sorprendentemente sencillo. De hecho, tal como se observa a continuación, ni las medidas de sus ángulos ni las proporciones entre las longitudes de sus lados son tan exóticas. ¡Este pentágono hubiese podido perfectamente ser descubierto décadas (¿siglos?) antes!



$$a : b : c : d : e = 1 : 2 : \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1} : 1 : 1$$


Pero este descubrimiento no cierra en absoluto el problema. Por el contrario, lo vuelve aun más interesante. ¿Se podrá agregar otro pentágono a la lista? ¿Se podrán agregar infinitos? A la luz de la historia, tan difícil es adivinar la respuesta como arriesgado es aventurar una conjetura al respecto.



La lista de las quince familias de pentágonos que embaldosan el plano conocidas hasta hoy. La cuarta es aquella a la que pertenece el embaldosado de El Cairo y la última es la del pentágono descubierto recientemente. A principios del 2017, Michaël Rao, de la Escuela Normal Superior de Lyon, anunció haber corroborado computacionalmente (capítulo 32) que no existe ningún pentágono convexo que embaldose el plano que no esté contemplado en esta lista de quince familias. Sin embargo, su trabajo no ha sido validado aún por la comunidad internacional.


Una curiosidad de los embaldosados exhibidos es su periodicidad, es decir, que se repiten bajo traslaciones. *A priori*, solo se indaga sobre la posibilidad de cubrir el plano, pero *a posteriori* se constata, en los ejemplos conocidos, que los pentágonos convexos que lo consiguen también lo hacen en configuraciones que se trasladan en sí mismas en dos direcciones diferentes. Más precisamente, si bien pueden embaldosar sin periodicidad (como queda ilustrado abajo a la derecha, en una configuración descubierta por Michael Hirschhorn), necesariamente lo logran de forma periódica al disponerlos de manera diferente. ¿Seguirá siendo esto cierto para los pentágonos convexos que embaldosan pero que aún no han sido descubiertos? Tras mucho tiempo de trabajo, Egon Schulte logró dar con una respuesta afirmativa a esta pregunta hace un par de años. Sin embargo, se ignora aún si existe un pentágono no convexo que embaldose el plano pero nunca lo haga con periodicidad. Este problema es parte de uno aún mayor que involucra polígonos (no convexos) en general. Con esta generalidad, es conocido como el «problema Einstein», nombre que no tiene ninguna relación con el célebre físico y matemático, sino que nace de un simple juego de palabras del alemán: *ein* (uno) y *stein* (ladrillo).

Se trata, sin duda alguna, de otro acertijo intimidante en un camino que, hasta ahora, ha estado plagado de muchos aciertos y demasiados errores.



Un mismo pentágono puede embaldosar de manera periódica (a la izquierda) y no periódica (a la derecha). Observe, sin embargo, la simetría rotacional para la configuración de la derecha.

## LOS CUASICRISTALES: UNA HISTORIA DE QUÍMICA, MATEMÁTICA, METEORITOS, ARTE ISLÁMICO Y PAPEL TISÚ




El año 2011, Dan Shechtman fue galardonado con el Premio Nobel de Química por un descubrimiento realizado décadas antes: la mañana del 8 de abril de 1982, con la ayuda de un microscopio electrónico, observó por primera vez un cristal «exótico». Pero la comunidad científica se resistió inicialmente a validar su contenido; de hecho, su artículo fue rechazado en la primera revista a la cual fue sometido (*Physical Review Letters*). ¿La razón? Shechtman había echado por tierra una antigua ley de la cristalografía, según la cual los átomos de todos los cristales debiesen configurarse espacialmente siguiendo patrones que se repiten bajo traslaciones. La aleación metálica que sintetizó y observó en colaboración con su equipo de trabajo no cumplía con este precepto, por lo cual fue llamada un «cuasicristal».

Una imagen obtenida por difracción a partir de uno de estos cuasicristales está ilustrada al inicio de este capítulo. Observando con atención, notará que la imagen no se copia a sí misma bajo ninguna traslación. Es más, si dispusiéramos de una imagen que cubra una porción mayor del material, seguirá cumpliéndose esta propiedad de no replicación por traslación, sin importar el tamaño de la muestra.


Sin embargo, los motivos de la muestra sí se repiten infinitas veces de manera «cuasiperiódica». Más precisamente, la configuración de cualquier porción finita de la imagen aparecerá copiada dentro de toda región que tenga un tamaño lo suficientemente grande. Es como si la imagen quisiera «autocopiarse» en infinitas direcciones, pero no lo lograra nunca.

Las estructuras geométricas abstractas que verifican esta propiedad eran conocidas en matemática desde antes del descubrimiento de Shechtman. En particular, tras el trabajo pionero de 1961 del especialista en lógica Hao Wang, cinco años más tarde, Robert Berger descubrió una familia de 20 426 polígonos que no logran cubrir el plano con repetición translacional, pero sí cuasiperiódicamente. Esta construcción fue brillantemente simplificada por el célebre físico y matemático Roger Penrose, quien, entre 1973 y 1974, construyó embaldosados cuasiperiódicos usando tan solo dos piezas (los cuales fueron descubiertos independientemente por el matemático aficionado Robert Ammann unos meses después). En uno de ellos —ilustrado más abajo— las piezas tienen formas rómbicas: una está formada por dos triángulos de ángulos  $36^\circ$ ,  $72^\circ$  y  $72^\circ$  (triángulos áureos) pegados a lo largo del lado menor; la otra, por dos triángulos de ángulos  $36^\circ$ ,  $36^\circ$  y  $108^\circ$  (gnómones áureos) pegados a lo largo del lado mayor (capítulo 1). Estas dos figuras están escaladas adecuadamente para que sus lados iguales midan exactamente lo mismo, de modo que puedan acoplarse unas con otras siguiendo reglas muy precisas.



A la izquierda: los rombos utilizados en el embaldosado de Penrose. A la derecha: las reglas de encaje del embaldosado de Penrose prohíben la aparición de esta configuración regular, la cual es reminisciente del diseño de la bandera de la Independencia de Chile (capítulo 1).

Las piezas usadas por Penrose están muy relacionadas con la geometría pentagonal y, por consiguiente, con la razón áurea. De hecho, la proporción entre la cantidad de rombos celestes y verdes que aparecen en la configuración global debiese ser cada vez más parecida al número de oro  $\varphi$  si se contabiliza a lo largo de regiones cada vez más grandes. Esto muestra, en particular, que no puede haber simetría translacional, pues si la hubiese, entonces dicha proporción debiese aproximarse cada vez más a un número racional, a saber, el cuociente entre el número de piezas de uno y otro tipo presentes en cualquier porción del diseño que, por simple repetición, cubre todo el plano. Además, esto explica otra característica muy especial del embaldosado de Penrose, presente también en la imagen del cuasicristal ilustrado más arriba: la existencia de una simetría rotacional de orden 5 (es decir, de una rotación de un quinto de vuelta completa que envía el embaldosado exactamente sobre sí mismo). Este aspecto no es menor pues, de acuerdo con una ley llamada «restricción cristalográfica», si una configuración que cubre el plano se repite translacionalmente en varias direcciones, entonces solo puede tener simetrías rotacionales de orden 2, 3, 4 o 6. De este modo, las rotaciones de orden 5 están prohibidas para los cristales, pero autorizadas para los cuasicristales.




Embaldosado de Penrose: configuración cuasiperiódica formada por solo dos piezas. No intente encontrar una dirección de desplazamiento en la cual la figura se repita: cada vez que crea haber hallado una, notará después que hay piezas que rompen la simetría translacional. De hecho, puede pasar horas contemplando porciones cada vez más grandes de este embaldosado, pero constatará la no repetición translacional de cada una de ellas.

Hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún cuasicristal sobre la faz de la Tierra y oriunda de ella. Sin embargo, dichas estructuras existen en el universo de manera natural, tal como lo revelaron los restos descubiertos en 2012 de un meteorito caído en las montañas de Koryak en Siberia. De alguna manera,

condiciones similares a las del laboratorio de Shechtman son (o, al menos, fueron) replicadas en alguna región del espacio exterior.

De la misma forma que la propia naturaleza había anticipado el trabajo de Shechtman, la invención de Penrose estuvo precedida por la sabiduría de tiempos ancestrales. Así lo reveló el trabajo del año 2007 del entonces estudiante Peter J. Lu, en conjunto con el físico Paul Steinhardt, quienes constataron que en ciertos períodos de la cultura islámica fueron elaboradas en Persia —actual Irán— configuraciones que cumplen las propiedades de cuasiperiodicidad y no repetitividad por traslaciones. Sin duda alguna, el ejemplo más espectacular corresponde a la del templo Darb-i Iman («la puerta del profeta»), ubicado en la hermosa ciudad de Isfahán, cuya construcción y decoración datan del siglo xv. Sorprendentemente, quienes realizaban este tipo de obras de decoración eran considerados simples obreros y figuraban en lo más bajo del escalafón social.




Decoración del templo Darb-i Iman: configuración cuasiperiódica que, si bien evidencia una simetría de reflexión respecto de la línea central, no presenta ninguna simetría translacional.

¿Quiénes deben ser considerados entonces los verdaderos descubridores/inventores de los cuasicristales y de los embaldosados cuasiperiódicos? Esta pregunta apunta a algo más profundo, a saber, si los procesos naturales y la matemática misma nos preceden o son meras conceptualizaciones humanas. ¿La matemática se inventa o se descubre? Difícil discusión, en la que no pretendo entrar acá.


De manera más terrenal, podemos preguntarnos también a quién «pertenecen» estas estructuras. Paradójicamente, el mismo Penrose se vio envuelto en una insólita discusión al respecto. En 1995, ante el otorgamiento de una patente comercial al experto en computación Roger Schlafly por el descubrimiento de dos nuevos números primos y sus eventuales aplicaciones prácticas, había reaccionado molesto señalando que «la matemática existe para todos». Sin embargo, distinta fue su reacción cuando en 1997 llegó a sus manos un rollo de papel tisú Kleenex, cuyo diseño replicaba uno de sus embaldosados (supuestamente, esto lo hacía más llamativo pues evitaba que los pliegues del papel mullido se superpusieran uno sobre otro de manera repetitiva, creando una impresión ligeramente desagradable a la vista y al tacto). Insólitamente, se produjo una disputa en la corte de justicia por derechos de propiedad intelectual, en la que se enfrentaron Penrose y su propia firma, Pentaplex Limited, contra la empresa Kimberly Clark Limited, que había tomado el control de la producción del papel Kleenex. Por fortuna, al final primó la cordura y ambas partes llegaron a un acuerdo de colaboración. Gracias a esto, podremos seguir disfrutando de minutos placenteros contemplando la no repetitividad de un bello papel tisú.




## CORTANDO Y PEGANDO (Y COMIENDO) CHOCOLATE




Es muy probable que navegando en internet o consultando su cuenta de Facebook, usted se haya topado alguna vez con un intrigante video en el que se propone una forma de crear chocolate gratuitamente: «¡El Misterio del Chocolate Infinito Por Fin Revelado!» en YouTube. El método consiste, simplemente, en hacer unos cuantos cortes y reensamblar las partes, dejando fuera una de ellas.




Claro está que algún truco debe haber, pues, como diría Lavoisier, «el chocolate no se crea ni se destruye, solo se transforma» (o se come). Lo que sucede es que tras cortar y reensamblar sin un cuadro, la barra se vuelve más corta, tal como se ilustra a continuación.




Una variación de este curioso truco aparece bosquejado abajo a la izquierda. Aquí, el problema son los ángulos, pues las líneas de las regiones roja y celeste no están sobre una misma recta, sino que se juntan formando ángulos distintos a  $180^\circ$ . Algo similar sucede en el bosquejo a la derecha.



Lo anterior no es más que una deliciosa excusa para recordar que, aunque pueden parecer simples juegos, las acciones de cortar piezas, moverlas y reensamblarlas son facetas importantes de la geometría elemental. De ellas surge, por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras (el cual, dicho sea de paso, también aparece en manuscritos chinos de una época ligeramente anterior a la del sabio helénico). Seguramente usted conoce su clásico enunciado: «En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa». Pues bien, esta afirmación, que suele ser tristemente reducida a la oscura igualdad  $a^2 + b^2 = c^2$  resulta del hecho banal de que, al cortar astutamente los cuadrados construidos por sobre los catetos en unas pocas piezas, estas pueden ser reensambladas en el cuadrado construido sobre la hipotenusa, tal como se aprecia a continuación.



De manera alternativa, los cuadrados sobre los catetos pueden ser complementados por cuatro triángulos rectángulos en un cuadrado más grande, el cual puede ser llenado también con el cuadrado de la hipotenusa y los mismos cuatro triángulos. Expuesto de cualquiera de estas formas, el teorema más importante de la matemática de todos los tiempos no es más que un tangram, un simple juego de niños.



Muchos otros argumentos sencillos permiten probar el teorema de Pitágoras. Uno de ellos es obra nada menos que de Leonardo da Vinci, y otro del presidente de Estados Unidos James Garfield. En el sitio [www.cut-the-knot.org/pythagoras/](http://www.cut-the-knot.org/pythagoras/), usted hallará más de un centenar; muy recomendable es la explicación número 117.

Siglos más tarde, esta faceta lúdica de la geometría (que no debe ser confundida con el «cortar y pegar» digital de los tiempos modernos) se concretizó en otro bello resultado que, lamentablemente, está ausente de nuestros programas educativos. Se trata de un teorema descubierto en el siglo XIX y en forma independiente por el húngaro Farkas Bolyai, el prusiano Paul Gervien y el escocés William Wallace (¡atención!: este último no es el que lideró la independencia de su país, inmortalizado en la mítica película *Corazón valiente*). Este teorema establece que dadas dos figuras poligonales cualesquiera de igual área, siempre es posible cortar una de ellas a lo largo de un número finito de líneas rectas de modo que las piezas resultantes puedan ser reensambladas para obtener la otra. Por ejemplo, en 1907, Henri Dudeney astutamente observó que existe una partición de un cuadrado en cuatro pedazos que, al ser dispuestos nuevamente, configuran un triángulo de la misma área y de lados iguales (esto es, un triángulo «equilátero»), tal como aparece ilustrado al inicio de este capítulo y está animado en YouTube: «Dudeney's Dissection». Cabe hacer notar, sin embargo, que esta brillante descomposición no es la única posible, aunque es la más sencilla que se conoce.


El argumento de Bolyai, Gervien y Wallace puede ser fácilmente implementado en situaciones concretas, como lo muestra el sitio interactivo <http://dmsm.github.io/scissors-congruence>. Así, guillotinando una esvástica (símbolo iconográfico de diversas culturas ancestrales, incluida la mapuche) y jugando con las piezas resultantes, podemos rápidamente formar una hermosa paloma.



He aquí otra preciosa fórmula de áreas (creada por el matemático austriaco Georg Alexander Pick) que data de 1899, pero que lamentablemente está ausente de nuestra bitácora escolar (aunque sería de gran utilidad para la PSU). Según Pick, si un polígono tiene «puntos enteros» como vértices (mejor dicho, puntos de coordenadas enteras), entonces su área es igual a la cantidad de puntos enteros en su interior menos uno, más la mitad de los puntos enteros que quedan en su borde:

$$\text{Área} = \text{interiores} - 1 + \text{borde}/2.$$


Si no lo cree, haga la prueba con las figuras expuestas abajo. Si se convenció, ahora resta saber por qué es cierta: en el número 1 del año 3 de la *Revista del Profesor de Matemática* (disponible gratuitamente en <https://rpmat.cl>) hallará una demostración.



Hasta aquí solo nos hemos detenido a analizar figuras planas. Una interrogante surge entonces de manera natural: ¿puede hacerse algo similar con cuerpos geométricos tridimensionales? Sorprendentemente, esta pregunta inocente en apariencia resulta no ser tan sencilla.

Durante el Congreso Internacional de Matemáticos de París en los albores del siglo xx, David Hilbert, uno de los más destacados matemáticos de la historia, propuso una lista de veintitrés problemas que guiarían la investigación por los siguientes cien años. El tercer problema trataba precisamente sobre esta interrogante geométrica, y fue el primero en caer. De hecho, la solución fue hallada apenas un par de años después por su estudiante Max Dehn, quien probó que es imposible hacer cortes rectos a un cubo de modo tal de obtener un número finito de piezas que, al ser redispuestas, configuren un tetraedro regular.


Se desvanecía así un viejo anhelo, el de derivar de manera elemental las fórmulas de volúmenes de poliedros como, por ejemplo, aquella según la cual el volumen de una pirámide es igual a un tercio del producto del área de su base por su altura.



A la izquierda: el área de un triángulo es la mitad del producto de su base por su altura, pues coincide con la mitad del rectángulo correspondiente. A la derecha: la fórmula análoga del volumen de un poliedro no puede ser establecida por un método similar; la verificación de su validez requiere inexorablemente el uso del cálculo diferencial (o de alguna herramienta similar).


Más aun, Dehn logró entender exactamente cuándo un poliedro es equivalente a otro del mismo volumen por este proceso de corte y reensamblaje. En resumen, el espacio tridimensional resultó ser mucho más complejo que el plano.

¿Y si volvemos entonces al mundo bidimensional pero consideramos cortes no necesariamente rectos? En este contexto, nos encontramos cara a cara con una verdadera pesadilla de los matemáticos de la antigüedad: el problema de la cuadratura del círculo (esto es, construir, usando solo una regla —no numerada— y un compás, un cuadrado de área igual a la de un círculo dado). En la antigua Grecia se había hecho un progreso que se creía llevaría a su solución. En efecto, aunque no se conserve ninguna de sus obras, se sabe que Hipócrates de Quíos (no confundir con Hipócrates de Cos, el padre de la medicina) había observado lo siguiente: si sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos iguales se construye una lúnula como en la figura siguiente, entonces su área es igual al área del triángulo.



En la construcción de la lúnula de Hipócrates, la circunferencia externa debe estar centrada en el punto medio del cateto: las áreas pintadas de azul son iguales.

Esta configuración admite diversas variaciones, como la del sabio persa Alhacén. En ella, la suma de las áreas de las lúnulas construidas sobre los catetos es igual al área del triángulo. El punto crucial de esta configuración consiste en que la circunferencia cuyo diámetro es la hipotenusa pasa por el vértice del ángulo recto.




La suma de las áreas de las lúnulas naranjas ( $L_1$  y  $L_2$ ) es igual a la suma de las áreas de las semicircunferencias en  $a$  y  $b$  ( $S_a$  y  $S_b$ , respectivamente) menos la de la semicircunferencia  $S_c$  en  $c$  más el área  $\Delta_{abc}$  del triángulo. En «fórmulas», esto es:

$$L_1 + L_2 = S_a + S_b - S_c + \Delta_{abc} = \pi a^2 + \pi b^2 - \pi c^2 + \Delta_{abc}$$

Todas estas configuraciones maravillaron a Leonardo da Vinci, quien se obsesionó con el problema de la cuadratura del círculo y estaba convencido de que las lúnulas serían la herramienta decisiva para su solución. Sin embargo, en este punto da Vinci estaba equivocado, si bien la lápida a toda esperanza de cuadrar el círculo no vino a ser puesta sino cuatro siglos después por el matemático alemán Ferdinand von Lindemann.

Pobre da Vinci, murió creyendo en un imposible.

## LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y DE LOS PECES



Iniciemos este recorrido escarpado meditando sobre la siguiente disyuntiva borgesiana: supongamos que para formar palabras se pueden usar todas las combinaciones de las veintisiete letras del abecedario (y que, en particular, no haya problema alguno con las palabras sin vocales). Más aun, imaginemos que tenemos una copia del diccionario de todas las palabras posibles en nuestras manos. Ciertamente, sería lógico dividir este inmenso diccionario en veintisiete tomos, cada uno de los cuales corresponda a la primera letra de las palabras que figuran en él. Pues bien, como todas las palabras del tomo correspondiente a la letra «a» comienzan con la letra «a», resultaría totalmente natural borrar esta primera letra de cada palabra allí listada, pues se trata de información redundante. Al hacer esto, ¿con qué nos quedamos? Basta meditar un instante para adivinar: hemos recuperado una copia exacta del diccionario original. Haciendo lo mismo con los tomos de las letras «b», «c»,... obtenemos veintisiete tomos iguales. Así, el diccionario de todas las palabras es igual a veintisiete copias idénticas de sí mismo.

- Todo lo anterior es absurdo, pues la cantidad de palabras en cuestión sería infinita y, por lo tanto, el diccionario de todas las palabras no puede tener materialidad alguna.

Muy bien, pero, ¿habrá alguna forma de conferir una geometría a esta paradoja? Tal fue la pregunta que se hicieron a inicios del siglo XX el alemán Felix Hausdorff y, posteriormente, los polacos Stephan Banach y Alfred Tarski. Basándose en una idea del primero, los dos últimos dejaron estupefacto al mundo académico cuando, en 1924, anunciaron el siguiente teorema: «Una pelota de cualquier radio puede ser descompuesta en una cantidad finita de partes que, al ser reensambladas, originan dos pelotas del mismo radio que la original». La matemática conseguía probar así que la Biblia tiene razón: ¡el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces (o, en nuestra formulación, de las pelotas) es factible!

- Esto es una total estupidez, pues no se puede crear masa a partir de la nada.

Sin embargo, en nuestra elucubración debemos desprendernos de toda consideración física. La masa, los átomos, las moléculas, el vacío, la nada, todas son nociones que deben estar ausentes de nuestro raciocinio ya que, en el universo matemático, el espacio está compuesto de puntos que son indistinguibles unos de otros. Es en parte por esta razón que los caminos de la lógica pueden llevar a la matemática hacia terrenos insospechados, los que a veces la alejan de la realidad física.

- Bien, pero el concepto de volumen sí es matemático, y la afirmación de Banach y Tarski implica la creación de volumen, lo cual sigue siendo absurdo.

Buen argumento, pero justamente lo que se está revelando es que no se puede asignar un volumen a todos los subconjuntos del espacio. Las partes en que debe ser dividida una bola para equirrepartirla en dos bolas de igual radio a la original son complicadísimas «nubes» de puntos que no poseen volumen. Entiéndase bien: no se trata de que su volumen sea igual a cero, sino de que simplemente ¡no tienen volumen!

- Muy bien, ahora puede parecer verosímil, pero ¿cuáles son, por ejemplo, las partes en las que se descompone una pelota de radio 1 que se reensamblan en dos pelotas del mismo radio?


Muy perspicaz pregunta. De hecho, resulta imposible dar una descripción explícita de los conjuntos involucrados. Hacerlo contravendría uno de los cimientos lógicos sobre los cuales reposa gran parte de la matemática y que preferimos no poner en cuestionamiento. Esta piedra angular, a la que denominamos «axioma de elección», corresponde a una cierta potestad huidobriana de «pequeños dioses» que nos autoconferimos y que dice simplemente que, si tenemos familias de conjuntos, entonces podemos escoger un miembro de cada una de ellas. A grandes rasgos, las partes involucradas en la descomposición de Banach-Tarski de una pelota corresponden a elecciones abstractas en familias de puntos infinitas, lo cual les da un aspecto «nebuloso» e impide que se las pueda describir verbalmente. Hacerlo provocaría, simplemente, un colapso del universo lógico...

Aunque el axioma de elección puede parecer evidente, lo cierto es que no lo es cuando hay infinitas familias de conjuntos involucradas, y ellas son además infinitas. De hecho, ha habido quienes —los así llamados «intuicionistas»— lo han puesto en cuestionamiento y han desarrollado una matemática «paralela» en la cual deja de tener validez, y en la que la descomposición de Banach-Tarski es imposible.


- Bien —suena intimidantemente convincente—, pero, ¿puede hacerse lo mismo con un círculo del plano en lugar de una pelota?

Otra perspicaz pregunta; para ella, la respuesta es negativa. Un aspecto crucial de la construcción de Banach y Tarski consiste en explotar la riqueza de los movimientos rígidos del espacio tridimensional, que son muchísimo más complejos que los del plano. A modo de ejemplo, dos rotaciones del plano centradas en un mismo punto siempre están relacionadas, pues si aplicamos una y luego la otra obtenemos el mismo resultado que si invertimos el orden de aplicación: «el orden de los factores no altera el producto».


Sucede que en el espacio tridimesional esto deja de ser verdad. Si bien las rotaciones con un eje común están relacionadas como anteriormente, existen pares de rotaciones que no tienen relación alguna entre ellas. Es como si, al considerar el diccionario geométrico cuyas palabras corresponden a elecciones al azar entre una y otra rotación, todas esas fuesen distintas, y no se tuviese por ejemplo la relación  $ab = ba$  de las rotaciones del plano centradas en un mismo punto. Así, para las rotaciones en tridimensionales, ¡el orden de los factores sí altera el producto!



La rotación de ángulo  $\alpha$  en un plano horizontal y de ángulo  $\beta$  en un plano vertical representadas más arriba no verifican ninguna relación algebraica si  $\alpha$  y  $\beta$  son bien escogidos (y «poco convencionales»). Esto se cumple, por ejemplo, si  $\alpha = \beta$  coinciden con el ángulo descrito en la figura de abajo, el cual —medido en grados— es irracional.



Gozamos así de la «libertad» necesaria para ejecutar nuestra «paradoja» inicial. En efecto, pese a que el diccionario de todas las palabras (en un alfabeto de apenas dos letras) no existe físicamente, si tomamos un punto en la pelota y consideramos todos los puntos a los que va a parar usando nuestras dos rotaciones «libres», estos puntos quedan codificados cada uno con una palabra de dicho diccionario. Como esta acción puede ser ejecutada con cualquier punto, la pelota entera puede ser pensada como una amalgama de infinitos diccionarios de dos letras cada uno. Ejecutando entonces nuestra partición borgesiana de cada uno de estos diccionarios, se puede fácilmente completar la ejecución del milagro de multiplicar una pelota en dos pelotas iguales.



A la izquierda: Stephan Banach. A la derecha: Alfred Tarski.

Banach fue el patriarca de una brillante generación de matemáticos polacos que tuvo un final abrupto con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien él logró sobrevivir a la ocupación nazi, murió en 1945 producto de un cáncer desarrollado en esos años.

Tarski tuvo «mejor» suerte. Pese a que buena parte de su familia pereció en la guerra (su ascendencia era judía), logró emigrar a Estados Unidos en 1939. Dictó clases en Berkeley y Harvard, desde donde cimentó una escuela de lógica y filosofía de enorme trascendencia. Entre sus discípulos se cuenta un chileno, Rolando Chuaqui, quien, aunque defendió una tesis en probabilidades dirigida por el matemático de ascendencia africana David Blackwell, fue profundamente influenciado por su obra. La conjectura de Chuaqui, resuelta por el polaco Piotr Zakrzewski en 1991, era una suerte de afirmación recíproca de la paradoja de Banach-Tarski: someramente, el que un objeto no admite una descomposición paradojal implica que a todos sus subconjuntos se les puede asociar un volumen apropiado. En memoria de Chuaqui se celebran cada año las jornadas homónimas de filosofía. Además, con su nombre fue bautizado el edificio de la Facultad de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diseñado por Alejandro Aravena.

Fue de esta forma que las ideas de Tarski, al igual que las de un buen maestro y profeta, se fueron multiplicando por el mundo entero como panes y peces.

## EL DÍA EN QUE CASI LE ROBARON LOS DECIMALES A $\pi$



El sábado 14 de marzo del 2015 se «celebró» en muchas localidades del mundo el «día de  $\pi$ »: el mes 3, día 14, año 15, las cifras se confabularon en un glorioso 3,1415, emulando así el inicio de uno de los números más importantes de la matemática. Si bien esto no es más que una simple curiosidad y no reviste mayor relevancia, sirve como excusa para rememorar una vieja y particular historia, aquella del día en que le intentaron robar (y cambiar) los decimales a  $\pi$ .

Para tan singular relato, recordemos primeramente quién es nuestro personaje. La letra griega  $\pi$  se destina para designar al número que corresponde al largo de una cuerda con forma de una circunferencia perfecta de diámetro 1 si la cortamos en un punto y la disponemos completamente estirada. Si el diámetro de la circunferencia no es igual a 1, no hay mayor complicación: su longitud es  $\pi$  veces su diámetro. Además, el área encerrada por esta circunferencia es  $\pi$  veces el cuadrado de su radio.

Siendo tan claro el significado de  $\pi$ , resulta natural preguntarse por qué se usa una letra para designarlo, y no se entrega su valor exacto. El problema radica en que para escribir este valor necesitaríamos de infinitas cifras decimales. Peor aún, no hay ninguna regla sencilla que permita producir los decimales de  $\pi$  uno tras otro. Es así como, en la práctica, se trabaja con valores aproximados de este número, siendo 3,14 y 3,1415 los más utilizados. Si quiere una mejor aproximación, pruebe memorizar

$$\pi = 3,1415926535897932384626433832795028841971693\dots$$

Los antiguos helénicos ya vislumbraban este problema. Así, Arquímedes de Siracusa trabajaba con otra aproximación, esta vez en forma de fracción:

$$\frac{22}{7} = 3,142857142857142857\dots$$

En la India clásica, Aryabhata trabajaba con la aproximación correcta a cuatro dígitos decimales. Sin embargo, tanto Arquímedes como Aryabhata estaban plenamente conscientes de que estos no correspondían al valor exacto de  $\pi$ , aunque sus esfuerzos para entender completamente este número, así como los de cientos de personas en los siglos posteriores, fueron infructuosos. Hubo que esperar hasta el siglo XVIII para que el matemático francés Johan Lambert probara que la expresión decimal de  $\pi$  no puede tener ninguna periodicidad. A los números con esta propiedad la matemática los llama «irracionales», no por sus características «psicológicas», sino porque no son expresables como fracciones (es decir, no son cocientes, o «razones», entre números enteros).

Por mucho tiempo, el concepto de número solo abarcaba el ámbito de los racionales. Sin embargo, los pitagóricos pronto notaron algo extraño: si el lado de un cuadrado mide 1, entonces, de acuerdo con el teorema de Pitágoras (capítulo 6), el cuadrado de la medida de su diagonal debe ser igual a  $1^2 + 1^2 = 2$ . No obstante, el cuadrado de ningún número racional puede ser igual a 2. En efecto, si para un par de enteros positivos sin factores en común se tuviese la igualdad

$$\frac{m^2}{n^2} = 2,$$

entonces  $m$  tendría que ser par y  $n$  impar, y por lo tanto  $m^2$  sería múltiplo de 4, pero no así  $2n^2$ . Sin embargo, esto es absurdo, pues (tal como se deduce de la igualdad de arriba) debe cumplirse  $m^2 = 2n^2$ .

Este descubrimiento dejó estupefactos a los pitagóricos. Como en su concepción los números debían ser todos «commensurables a la unidad» (es decir, racionales), no podían entender qué acontecía. Incluso, se cuenta que prohibieron estrictamente hablar del tema a quienes no formaran parte de su comunidad hasta que no lograran descifrar el misterio; se dice, además, que un miembro de la escuela que no respetó esta orden, un tal Hípaso de Metaponto, fue lanzado al mar desde un barco como castigo, y murió ahogado.

Sea esta historia cierta o no, lo concreto es que la plena comprensión del concepto de la irracionalidad no llegó sino hasta fines del siglo XIX, y fue obra del alemán Richard Dedekind. Por cierto, todos los números  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{5}$ ,  $\sqrt{6}$ ,  $\sqrt{7}$ ,  $\sqrt{8}$ ,  $\sqrt{10}, \dots$  son irracionales, pero son, en un sentido muy preciso, los irracionales más sencillos que existen. Aun así, muchas interrogantes existen para estos números: vea, por ejemplo, el capítulo 33.

Un siglo después, Ferdinand von Lindemann probó algo aún más impresionante:  $\pi$  es «trascendente», lo que quiere decir que no es solución de ninguna ecuación «sencilla» (esto es, una ecuación polinomial con coeficientes enteros). Así,  $\pi$  es un número muchísimo más complejo que, por ejemplo,  $\sqrt{2}$  o  $\varphi$  (capítulo 1): es un «irracional trascendente». La virtud del teorema de Lindemann es que echó por tierra una antigua aspiración de la humanidad: la de poder construir, usando solo un compás y una regla sin numeración, un cuadrado cuya área fuese igual a la de un círculo dado (capítulo 6). La tan ansiada «cuadratura del círculo» se revelaba, por fin, como una tarea imposible.

El número  $\sqrt{2}$  es algebraico, pues es solución de la ecuación polinomial  $x^2 = 2$ . Sin embargo, de acuerdo con Lindemann,  $\pi$  no puede ser solución de ninguna ecuación de este tipo. ¿Qué relación hay con las construcciones con regla y compás? Pues bien, una recta tiene ecuación cartesiana:

$$ax + by = c,$$

mientras que una circunferencia se representa por:

$$(x - d)^2 + (y - e)^2 = f^2.$$


Hallar puntos de intersección entre rectas y circunferencias corresponde a «intersectar» dichas ecuaciones, lo que en lenguaje algebraico se traduce en resolver sistemas de ecuaciones. Ahora bien, como  $\pi$  no es solución de ninguna de estas ecuaciones, no se puede construir, con regla y compás, un trazo de largo  $\pi$ . Por lo tanto, no se puede cuadrar el círculo.

Pero pese al avance de la ciencia, cada cierto tiempo aparecen personas que, por razones (o sinrazones) difíciles de enumerar y explicar, pasan por alto todo el conocimiento acumulado, proponen soluciones delirantes a este tipo de problemas, y —como si esto no bastara— se ufanan de haber hecho un descubrimiento revolucionario. Tengo el vago recuerdo de una de ellas apareciendo en la televisión chilena en los años noventa para promover su «solución» al problema de la cuadratura del círculo. Un recuerdo más nítido es el de un señor que recorría las universidades del país portando un libro autoeditado de nombre *Cuadrado del círculo*, con el que trataba de convencer al mundo de que su contenido era no solo correcto, sino además de relevancia mundial. Dicho texto llegó por azar a mis manos (de hecho, hasta el día de hoy lo guardo preciosamente en mi biblioteca personal). En una paciente jornada de lectura, en medio de muchas incoherencias logré detectar el error, el cual no deja de ser interesante: mediante una aventurada aseveración relacionada con la figura ilustrada abajo, el autor daba

por hecho que  $\frac{\pi}{2}$  debía ser igual a  $1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$ , lo cual es una falsedad, pues


$$\frac{\pi}{2} = 1,5707\dots < 1,5773\dots = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$$

No estaba tan mal, después de todo.



En la figura, si el radio de la circunferencia es 1, entonces la longitud del arco que une  $C$  y  $Q$  es igual a  $\frac{\pi}{2}$ , y el trazo  $PR$  mide  $1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$ . Inspirado en esto, en la Olimpiada Chilena de Matemáticas del año 2008 se les preguntó a los estudiantes cuál de estos largos es mayor, o si son iguales. Como no se les permitía usar calculadora, ocurrió lo esperable: aparecieron respuestas en las tres direcciones posibles.


Pero no todas estas historias son igual de inocentes. A fines del siglo XIX, el estadounidense Edwin Goodwin, un médico rural aficionado a la matemática, dio con una de estas soluciones desquiciadas, según la cual el valor de  $\pi$  debía ser igual nada menos que a 3,2. Increíblemente, logró convencer de publicar su demostración al comité editorial de la revista *American Mathematical Monthly*, la cual actualmente goza de gran prestigio científico (especialmente en el ámbito divulgativo), pero que, en ese entonces, parecía ser que no funcionaba de manera muy profesional. Pero esto no se detuvo allí: quedó tan feliz el señor Goodwin con su publicación, que tuvo la brillante idea de patentar su descubrimiento, de modo de percibir dividendos de derecho de autor por cualquier uso que se hiciera de este. Además, su espíritu «altruista» lo llevó a proponer un «proyecto de ley que presenta una nueva verdad matemática y que es ofrecido como una contribución a la educación que solo podrá ser utilizado por el estado de Indiana de forma gratuita sin necesidad de pagar ningún tipo de derechos de autor, siempre y cuando sea aceptado y adoptado en forma oficial por la legislatura en 1897». Dicho proyecto fue validado por la Comisión de Educación respectiva y contó con los votos necesarios en el Congreso para su aprobación.



La configuración errada de Goodwin: si el radio de la circunferencia es igual a 5 (y por lo tanto su diámetro es 10), entonces el valor «7» arriba debiese ser reemplazado por  $5\sqrt{2} = 7,071\dots$ , y el «8» por  $2,5\pi = 7,8539$ .

Las cosas iban de manera tal que solo faltaba el visto bueno del Senado de Indiana para que  $\pi$  perdiera, por ley, todos sus decimales, salvo el primero, que por cierto sería reemplazado por uno equivocado. Afortunadamente, una coincidencia hizo que el matemático Clarence Waldo, de la Universidad Purdue, estuviese visitando el edificio del Senado por tareas relacionadas con el presupuesto para ciencias. Al enterarse de tamaña aberración, corrió espantado a explicar a los senadores que estaban a un paso de patentar un fraude, y logró salvarlos de un ridículo aún mayor.

Así, gracias a Waldo, el 14 de marzo de 2015, los habitantes del estado de Indiana pudieron también celebrar el día de  $\pi$ . Dicen que fue una gran fiesta.



Miniatura simplificada de un póster con las primeras 350 cifras de  $\pi$ . El original puede ser adquirido en <http://unihedron.com/projects/pi>; también existen versiones para  $\varphi$  —capítulo 1— y otros números irracionales importantes.

## PLATÓN, ARQUÍMEDES Y LA CACHAÑA



Difícilmente olvidaremos la Copa América del 2015. Hasta esa fecha, solo teníamos recuerdos amargos de este torneo continental, como los del cabezazo que el «Gato» Fernández le tapó al «Pato» Yáñez en los últimos minutos de la final del año 1979, o del balón débilmente despejado por el «Condor» Rojas en la final de 1987. Y como debimos esperar demasiado tiempo, la alegría nos llegó por partida doble, pues se repitió al año siguiente. En 2016, además, el mejor jugador del campeonato fue un chileno: Alexis Sánchez. En 2015, en cambio, el puesto de figura del campeonato quedó desierto. Permítanme, entonces, llenar ese lugar vacante declarando como estrella del torneo a un ente inanimado, el juguete más querido por miles de niños, el regalo más esperado para cumpleaños y navidades: la pelota.

Confeccionar un balón de fútbol no es tarea sencilla, y lo era aun menos hace unas décadas. Nuestros mayores suelen decir que los jugadores de antaño eran mil veces mejores que los de ahora porque, entre otras cosas, debían patear pelotas varias veces más pesadas, de esas que dolía atajar o cabecear, especialmente cuando llovía. Y mucho de eso es cierto, pues los primeros balones eran muy distintos a los actuales. La tecnología estaba recién desarrollándose, y se hacía muy difícil, por ejemplo, dar la última costura. Tan solo observe el siguiente diseño: así era la pelota del primer Mundial de Fútbol (1930), aquel cuya final enfrentó a Uruguay y Argentina y que Gardel «no quiso ver».




La geometría del diseño fue evolucionando lentamente. Durante décadas se usaron pelotas que eran híbridos entre el balón actual y uno de vóleibol. Entre ellas destacan la del Mundial de 1950 (esa que, en la épica jornada del Maracanazo, Ghiggia le clavó abajo a la izquierda a Barbosa: «Gol de Ghiggia Uruguay 1950» en YouTube) y, obviamente, la mítica *Crack*, la pelota del Mundial de 1962 (esa que, en Arica, Leonel Sánchez le clavó de zurda y borde externo a Yashin —la «Araña Negra»— al lado derecho: «WC 1962 Chile vs. USSR 2-1 (10.06.1962)» en YouTube).




En orden correlativo: los balones de los mundiales de 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962 y 1966.

En esta historia de pelotas, el Mundial de México 1970 (quizás el mejor de todos los tiempos) marcó un hito. Unos años antes, una serie de satélites de llamativa geometría habían sido puestos en órbita. En honor a ellos, el balón mundialista —diseñado por Adidas— fue llamado de la misma manera: *Telstar*. Con variaciones solo en la decoración y el nombre (*Tango*, *Azteca*, *Etrusco*, etcétera), este fue usado en todos los mundiales hasta el 2002, y sigue siendo hoy el más popular. La *Cachaña*, balón oficial de la Copa América 2015, obedece al mismo patrón, aunque consta de elementos anexos —por ejemplo, subdivisiones de cada cara hexagonal— muy interesantes.




A la izquierda: el primer satélite Telstar dio inicio a la era de las comunicaciones modernas. A la derecha: el balón Telstar con el que se disputó el Mundial de México 1970.

¿Cómo se diseña una de estas pelotas? Para responder a esta pregunta debemos remontarnos a los tiempos de los antiguos geómetras, quienes sabían muy bien que en el plano existen figuras perfectamente simétricas de cualquier número de lados. Tal como se observa abajo, estos «polígonos regulares» tienen bordes rectos, lados de la misma medida y ángulos iguales. Además, al girarlos sobre su centro en un ángulo apropiado caen nuevamente sobre sí mismos, al igual que si se los refleja ante un espejo bien dispuesto.



En nuestro espacio físico tridimensional ocurre, sin embargo, algo muy diferente. Por ejemplo, si usted intenta armar un poliedro con siete caras y simetrías perfectas, constatará rápidamente que esto es imposible. De hecho, hay solo cinco poliedros «regulares» convexos: el cubo, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro, ilustrados en este orden más abajo. Si bien este es un descubrimiento del matemático ateniense Theaetetus, estos poliedros son llamados «sólidos platónicos» en honor al filósofo Platón, quien les atribuye un carácter «místico» en sus *Diálogos*.



¿Por qué solo cinco? Es fácil explicar por qué puede haber solo unos pocos: cada cara de un poliedro regular debe ser un polígono regular, y si se comienza con un polígono con muchos lados, entonces su ángulo interno será demasiado grande, lo cual nos dejará sin espacio suficiente para ensamblar otros polígonos y luego «cerrar» el poliedro.

Si los polígonos de las caras tienen  $m$  lados, entonces sus ángulos internos miden  $(m - 2)180^\circ/m$ . La suma de los ángulos que concurren a cada vértice del poliedro debe ser inferior a  $360^\circ$ , para que así exista el espacio suficiente para acoplar los polígonos «hacia adentro». Por lo tanto, si en cada vértice concurren  $n$  polígonos, entonces se debe cumplir

$$\frac{(m - 2)180^\circ}{m} < 360^\circ.$$

Dividiendo por 180 cada lado de esta desigualdad, deducimos que

$$n(m - 2) < 2m,$$

es decir,


$$nm < 2n + 2m,$$

y por lo tanto,

$$(n - 2)(m - 2) < 4.$$


Las únicas posibilidades para esto son las siguientes:  $n = 3, m = 4$  (cubo);  $n = 3, m = 3$  (tetraedro);  $n = 4, m = 3$  (octaedro);  $n = 5, m = 3$  (icosaedro) y  $n = 3, m = 5$  (dodecaedro).

Los centros de las caras de un cubo son los vértices de un octaedro, y viceversa. Se dice entonces que el cubo y el octaedro son poliedros «duales». Los centros de las caras de un tetraedro son los vértices de un nuevo tetraedro; por lo tanto, este poliedro es dual a sí mismo. El dodecaedro y el icosaedro, por su parte, son duales uno del otro.




Los poliedros regulares y sus duales.

Los dos últimos poliedros están muy relacionados con la división áurea (capítulo 1). Por ejemplo, los vértices de un icosaedro coinciden con los de tres rectángulos áureos (es decir, rectángulos en que la razón entre el largo y el ancho es igual a  $\varphi$ ) que tienen el mismo centro y están dispuestos ortogonalmente unos con otros. Esta descripción explica el hecho de que, en coordenadas cartesianas, los doce puntos  $(0, \pm 1, \pm\varphi)$ ,  $(\pm\varphi, 0, \pm 1)$  y  $(\pm 1, \pm\varphi, 0)$  son los vértices de un icosaedro.




Un icosaedro construido a partir de tres rectángulos áureos.

Debido a la rigidez espacial, que solo permite cinco formas perfectas, Arquímedes concibió otras combinando polígonos regulares de distinto número de lados. Si bien sus trabajos al respecto fueron muy detallados (llegando a describir las trece nuevas posibilidades), no fue sino hasta el Renacimiento cuando fueron redescubiertos, entre otros, por Johannes Kepler (el mismo que enunció las célebres tres leyes de la mecánica celeste). Una forma de obtener un «sólido arquimediano» consiste en «truncar» un sólido platónico, es decir, cortar cada una de sus puntas mediante planos dispuestos de manera tal que todas las aristas resultantes tengan la misma longitud. Si usted realiza este proceso con un icosaedro (y pinta apropiadamente las caras), obtiene la siguiente sugerente figura:




La pelota *Telstar* no es sino la versión esférica de un icosaedro truncado, en el que las veinte caras triangulares devienen hexágonos y doce caras pentagonales nacen de los vértices tras el truncamiento. Surge así la mítica configuración del «balón de los treinta y dos cascos» (y sesenta vértices).

A continuación se ilustra un molde para hacer el icosaedro truncado (recuerde dejar unos pliegues para pegar las caras):




Pero no solo de pelotas vive el hombre. Las formas icosaédricas y dodecaédricas han maravillado a artistas desde tiempos remotos, tanto así que están presentes en la obra de Leonardo da Vinci (quien ya había imaginado una pelota *Telstar* inspirado en su naturaleza intrínsecamente áurea; capítulo 1), de Salvador Dalí (quien representó su versión de *La última cena* en una bóveda dodecaédrica) y de muchos otros.




A la izquierda: una imagen de da Vinci en *La divina proportione*, de Luca Paccioli (capítulo 1). A la derecha: *La última cena*, obra de Salvador Dalí.

Más tarde, en la década de los cuarenta, el inventor y arquitecto estadounidense Richard Buckminster Fuller creó sus famosos domos geodésicos, que hoy en día se han vuelto muy populares en nuestro país (especialmente en el Valle de Elqui y el Cajón del Maipo). Si bien estas son estructuras poliédricas de cierta regularidad, no corresponden a sólidos platónicos ni arquimediano, aunque se parecen mucho a ellos. Algunos comienzan con estructuras icosaédricas o dodecaédricas, las que son subdivididas apropiadamente en triángulos para conferirles mayor redondez y mejorar su resistencia sobre la base del principio de «tensegridad» (esto es, todas las piezas están sometidas a una cierta tensión, lo cual otorga estabilidad a la estructura). Sus caras, sin embargo, no siempre son polígonos regulares, y sus aristas tienen distintas medidas unas de otras. Así, hacer los cálculos para construir un domo no es una tarea trivial. En páginas electrónicas de arquitectura se pueden encontrar programas para el «cálculo de domos», el cual se vuelve ligeramente más sofisticado cuando se pretende usar solo madera, sin «contaminar» la estructura con piezas metálicas (para este noble proceso, se deben calcular no solo las longitudes de las piezas, sino también sus ángulos de encaje).




Sin duda alguna, el domo más famoso es el que sirvió de pabellón a Estados Unidos en la exposición universal de 1967 en Montreal, conocido hoy como la Biosfera y diseñado por el propio Fuller. El azar quiso que dos de las grandes innovaciones arquitectónicas ergonómicas, la de Fuller y la de Frei Otto (capítulo 10), se hayan presentado al mundo en el mismo evento. Curiosamente, ambas tienen, además, alguna relación con el fútbol. Pero si Frei Otto exploró las posibilidades de la curvatura «negativa», Fuller sentó las bases de una arquitectura curvada «positivamente» (capítulo 11). El desarrollo de esta se extiende hasta el día de hoy, y nos ofrece maravillas como el Proyecto Edén en Grimshaw, Inglaterra. Inaugurado en 2001, se trata de un gigantesco jardín botánico poliédrico que tiene la virtud, además de estar confeccionado con materiales ligeros, de respetar el medio ambiente y aprovechar de manera espléndida la luz solar.



A la izquierda: la Biósfera. A la derecha: el Proyecto Edén.

Pero esto no es todo. En 1985, Harold Kroto, Robert Curl y Richard Smalley descubrieron nuevos alótropos (formas moleculares estables) de carbono, distintas a los diamantes y al grafito, ya bien conocidos (este trabajo les valió el Premio Nobel de Química en 1996), a los que, debido a su configuración geométrica poliédrica, y en honor a Fuller, llamarón fullerenos. En el más notable de ellos, el buckminsterfullereno (llamado también buckybalón o futboleno), cada molécula tiene la misma configuración de una pelota *Telstar*, lo cual se condice con su fórmula molecular: C<sub>60</sub>. Tiempo después, en plena era de la nanotecnología, nuevas formas serían descubiertas (por ejemplo, el grafeno), en una aventura científica que todavía está en plena efervescencia y ha dado origen a notables aplicaciones y promete aún muchas otras (entre las más espectaculares figura el rol inhibidor del fullereno para el virus del sida).



Una molécula de futboleno.

La historia de las formas poliédricas universales es apasionante. Al contemplar tanto desarrollo en torno a ellas, Platón muy probablemente hubiese mudado su visión mística de las cosas, olvidando sus famosos «cinco elementos» (tierra, fuego, aire, agua y éter, cada cual asociado a uno de sus sólidos) con los que pretendía explicar el universo. Así, se hubiese sumado a la tribuna para contemplar la maravilla de los domos geodésicos y de las microestructuras icosaédricas. Aunque, quizás, la armonía cósmica más prístina la hubiese hallado al patear una pelota *Telstar* en medio de una intensa pichanga en un descampado, o bien al contemplar el elegante juego de un genio rebelde del fútbol de ilustre nombre, muy inspirador para él: Sócrates.

## EL BAYERN DE MÚNICH Y LA GEOMETRÍA DE UN ESTADIO



Es habitual ver al Bayern de Múnich disputando las más altas instancias de la Liga de Campeones. Es cierto: el fútbol europeo de clubes ha perdido en alguna medida su espíritu deportivo, convirtiéndose en una lucha entre unas pocas instituciones que acaparan gran parte de los recursos. A pesar de esto, este poderoso equipo, por el que han pasado leyendas germanas del fútbol como Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Oliver Kahn y Manuel Neuer, entre otros, sigue despertando aún la pasión de muchos aficionados. En algunos casos, esta viene reforzada por la espectacularidad del que fuera su estadio por más de treinta años, el Olímpico de Múnich. Y es que una hermosa y profunda teoría matemática, la de las superficies mínimas, es la secreta inspiración de la increíble cubierta que corona sus galerías.

De manera similar a nivel local, desde hace ya algunos años, muchos espacios públicos de nuestro país como terminales de pasajeros, pabellones de exposición, restaurantes y recintos de espectáculos, han sido cubiertos por membranas semitraslúcidas que, a simple vista, parecen simples carpas, pero que en realidad son muchísimo más sofisticadas. Estas operan siempre sobre la base del mismo principio: a grandes rasgos, sobre un esqueleto metálico rígido y sinuoso se extiende una membrana flexible, la cual es tensionada mediante cables de modo que alcance su forma «natural». Así se origina una estructura que destaca no solo por su ligereza, eficiencia y economía, sino también por la elegancia de sus formas, muy alejadas de las clásicas pautas ortogonales de la arquitectura tradicional. De cierta manera, estas formas se adaptan al medio en lugar de imponerse a él, creando espacios que, además de unificados y correlacionados, son altamente sostenibles, sanos y diversos. Todo esto está muy acorde con una filosofía arquitectónica, el «organicismo», la que, de manera aun más ambiciosa, promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural.



A la izquierda: la estación Del Sol del Metro de Santiago. A la derecha: el Estadio Regional de Antofagasta.

La historia de estas estructuras se remonta a tiempos ancestrales. En efecto, usando membranas tejidas con fibras naturales, diversas comunidades desarrollaron construcciones basadas en la «tensión». Sin embargo, y a pesar de la audacia con que llegaron a aplicar estas ideas, ninguna fue capaz de teorizarlas. Así, quien es considerado el precursor de las estructuras tensionadas es el arquitecto alemán Frei Otto. Curiosamente, sus primeras experiencias al respecto las tuvo en el campo de prisioneros en que estuvo recluido hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, donde se encargó de la construcción de refugios tipo carpas. Más tarde, inició un proceso de investigación sistemático sobre estas técnicas, el que condujo a la fundación del Instituto para la Construcción de Estructuras Ligeras de la Universidad de Stuttgart. Hacia 1967, su diseño del Pabellón de Alemania Federal para la Exposición Universal de Montreal (ilustrado a continuación) era una muestra de los inmensos avances ya alcanzados.



Sin embargo, encargarse de la cubierta del nuevo estadio que comenzaba a erigirse en Múnich era un desafío muchísimo mayor. Para lidiar con él, Otto debió recurrir a conocimientos de vanguardia en matemática, a los cuales agregó una cuota de astucia impresionante.

Para la matemática, una superficie es, someramente, un objeto bidimensional sin puntas. Si la superficie logra conectar sus bordes usando la menor cantidad de material posible, es decir, si corresponde a la membrana de menor área que empalma a las mismas orillas, entonces es llamada mínima. Por ejemplo, un plano es la superficie mínima que llena un anillo con forma de circunferencia perfecta. Sin embargo, si cambiamos los bordes entonces aparecen formas diferentes. Entre las más sencillas figuran la catenoide (ilustrada a la izquierda a continuación), que corresponde a la membrana mínima que une dos anillos bien dispuestos uno en posición paralela a otro, y el helicoide (al centro), que es la superficie que traza una hélice al girar y simultáneamente subir a lo largo de un eje a velocidad constante. Un ejemplo más sofisticado es la superficie de Costa (a la derecha), denominada así en honor a quien la descubrió en 1984, el matemático brasileño Celso José da Costa.

Si quiere seguir disfrutando de tan sinuosas formas, puede acceder a un pequeño festival de superficies mínimas desde el video «berlin math film festival minimal discrete surfaces 2008 tom» en


YouTube.



Naturalmente, son estas las formas que asume una estructura sometida a tensión, pues si el área de la membrana empleada no fuese mínima, entonces esta se podría tensionar aun más. El problema para su implementación como cubierta es que, dado que la forma está «curvada negativamente», es decir, la superficie tiende «a abrirse» en cada uno de sus puntos (capítulo 11), no puede ser reproducida mediante membranas planas. Más aun, se ajusta a complejas ecuaciones diferenciales, en torno a las cuales trata por ejemplo un importante trabajo del matemático estadounidense Jesse Douglas, que le valió ser galardonado en 1936 con una de las primeras medallas Fields (un trabajo con los mismos resultados fue producido por el húngaro Tibor Radó, pero este, por razones de edad, ya no calificaba para el premio; capítulo 19). Y si bien hoy las soluciones a estas ecuaciones pueden ser muy bien aproximadas y bosquejadas con programas computacionales especialmente concebidos para esto (entre los que se encuentra Rhinoceros 3D), hace cuarenta y cinco años eran difíciles de manipular.

Otto se enfrentó a todos estos problemas para cubrir el coliseo de Múnich, y a ellos debió añadir uno más: dada la magnitud de su proyecto, este no podía consistir en envolver el estadio con carpas, sino que debía construir una cubierta de material más sólido cuya forma fuese exactamente igual a la de una estructura tensada, de modo que pudiese soportar de la mejor manera posible las condiciones ambientales y, a su vez, presentara formas estéticamente llamativas.

Recordó entonces los experimentos del físico belga Joseph Plateau en el siglo XIX, quien trabajó con películas de jabón para obtener superficies mínimas. El proceso es muy sencillo: se toma uno o varios trozos de alambre de borde tan sinuoso como se quiera y luego se «cierran», es decir, se unen sus puntos de inicio y final. Posteriormente, se los sumerge en una solución jabonosa y se los retira suavemente. Al sacarlos, la forma mínima y curvada «hacia afuera» será automáticamente producida por la naturaleza (una presentación interactiva de este experimento aparece en el video «Soap Film Demonstrations» en YouTube).



Fue usando este procedimiento que Otto esbozó la cubierta del estadio de Múnich. Primeramente, construyó maquetas de lo que serían los soportes de las estructuras, y luego comenzó a experimentar, al igual que Plateau, con capas de burbujas que se acoplasen a ellas. La cubierta final fue, entonces, una reproducción a gran escala de este diseño burbujeante. Para su confección se usaron placas de poliéster de alta resistencia recubiertas con PVC. El resultado fue simplemente espectacular, y el mundo entero quedó maravillado el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1972 al contemplar el que hasta ese entonces era el estadio más moderno del planeta.

Otto, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, fue galardonado el año 2015 con el premio Pritzker (equivalente al Óscar en el área, el mismo que en 2016 fue otorgado al chileno Alejandro Aravena). Lamentablemente, su deceso se produjo solo días después de su nominación, convirtiéndose así su caso en el único premio póstumo de este tipo que ha sido conferido.

En cuanto al estadio, inició una lenta agonía hacia mediados de la década pasada: no fue sede del Mundial de Fútbol del 2006, y el propio Bayern se trasladó por esos años a su nuevo estadio, el Allianz Arena. Aun así, tanto el coliseo como toda la villa alrededor son un símbolo de la ciudad de Múnich: sus dependencias son utilizadas para conciertos y otras actividades, además de ser objeto de visitas guiadas. Recorrer estos parajes es un doble placer. Por un lado, están la arquitectura formidable y la sofisticada

geometría que esconde. Por otro, la historia deportiva —en especial futbolística— que allí se guarda es de ensueño. Es como si se pudiese respirar el ambiente de aquella tarde de final de Mundial en 1974 (disponible *in extenso* en [www.dailymotion.com](http://www.dailymotion.com)), en que una ordenada selección alemana derrotó limpiamente a la temible Naranja Mecánica de Johan Cruyff. O de esa tarde de final de Eurocopa en 1988, en que el cuadro naranja se reivindicó frente a la URSS gracias a un sublime gol de volea de Marco van Basten: «Marco Van Basten Mejor gol de Volea de la Historia» en YouTube. Sin embargo, a pesar de tan recordadas gestas, el deleite de muchos será por siempre ese singular e irreverente partido entre filósofos ideado por el genial grupo de humoristas ingleses Monty Phyton: «Partido de Filósofos - Final» en YouTube. Ciertamente, no podía haber un espacio más apropiado que el Estadio Olímpico de Múnich para recibir a dos equipos con tan selectas alineaciones.

## TODOS LOS MAPAS DEL MUNDO



La seriedad de la prensa científica radica en su capacidad de discernir lo que es cierto de lo que no lo es y, dentro de lo primero, lo relevante de lo superfluo. La matemática no escapa a este juego, y los pocos espacios en que es la protagonista son de lo más variado. Obviamente, existen medios bien informados que suelen dar cuenta de manera apropiada de los últimos avances importantes o, al menos, otorgan una cobertura razonable de la entrega de premios internacionales. Sin embargo, la mayoría de las veces, las «noticias» tratan de simples juguetes, las que a veces pueden ser interesantes (como la descrita al inicio del capítulo 6), no obstante carezcan de mayor trascendencia. En otras ocasiones se cae en la tentación de dar validez a anuncios desafortunados apelando a su espectacularidad. En un país de una incipiente prensa científica, este último punto se ve agravado por el hecho de que muchos medios locales compran notas a agencias extranjeras de prestigio, sin cuestionarse mayormente si están practicando un control editorial adecuado ni darse el trabajo de consultar a especialistas de nuestra propia comunidad (muy probablemente, esto último ni siquiera se les pasa por la cabeza). Tal fue el caso en 2014, cuando diversos medios anunciaron la solución de la conjectura de Riemann, relacionada directamente con la distribución de los números primos (capítulo 31) y quizás el problema abierto más importante de la matemática: «El profesor que asegura haber resuelto un problema matemático de 150 años» en [www.t13.cl](http://www.t13.cl). Claramente, en aquella ocasión, la primicia era aún más tentadora dado su carácter algo exótico: quien afirmaba haber encontrado la solución era el académico nigeriano Opeyemi Enoch, quien había sido motivado a trabajar en el problema por estudiantes que perseguían el millón de dólares ofrecido por el Instituto Clay a aquel que lo resolviese (tal como había sucedido con la conjectura de Poincaré; capítulo 14). Lo cierto es que cuando el anuncio apareció en los medios, la comunidad matemática ya había echado por tierra cualquier esperanza de que las ideas de Enoch pudiesen llevar a una solución correcta.

Lamentablemente, las desmedidas ansias de aumentar la visibilidad de las notas de divulgación han llevado incluso al extremo de «contaminar» episodios que, si bien son dignos de todo elogio, son presentados de manera distorsionada. Este fue el caso del mapa mundial propuesto por el japonés Hajime Narukawa en 2016, respecto del cual erróneamente se mencionó que «refleja fielmente las proporciones entre regiones y países» y «resuelve el espinoso problema de proyectar un planeta esférico a un mapa plano»: ver el video «BBC: el extraordinario mapa que muestra al mundo tal como es realmente» en [www.latercera.com](http://www.latercera.com).




El mapa de Narukawa, denominado «AutoGraph».

Para su confección, Narukawa dividió el globo terrestre en noventa y seis regiones de igual área y las proyectó sobre un tetraedro, el cual una vez «abierto» y dispuesto de forma rectangular origina el mapa. Hasta aquí nada es cuestionable. De hecho, la idea es muy original, y el producto final, excelente. ¡Ya quisiera yo tener una copia de él en mi pared! No es de extrañar entonces que, en virtud de este trabajo, Narukawa haya obtenido uno de los galardones más prestigiosos de diseño en Japón, el Good Design Award, concedido por el Instituto Japonés de Promoción del Diseño.

El punto conflictivo radica en la forma como fue presentada la noticia en la mayoría de los medios —de lo cual debe excluirse de responsabilidad a Narukawa y su equipo—. En efecto, decir que este o cualquier otro mapa constituye una representación fiel del globo terrestre es simplemente una aberración, para cuya constatación basta una simple visita a Wikipedia: en la entrada «Theorema egregium». Allí se señala clara y categóricamente que la existencia de un «mapa perfecto» entraría en contradicción con uno de los resultados más importantes de la matemática: el *teorema egregium*.

Estudiar la geometría de las superficies no es tarea sencilla. Para ello, los viejos métodos de la geometría del plano aprendidos en la escuela no resultan suficientes, y se requiere del uso del cálculo diferencial. En este camino, un concepto fundamental es el de curvatura. Instintivamente, tendemos a decir que una superficie está «curvada» si no puede ser extendida sobre un plano. Así, por ejemplo, un cilindro o un cono no están curvados, pues al abrirlos apropiadamente se desenrollan a la perfección. Sin embargo, esto se hace imposible con un balón o con la campana de una trompeta: sin importar dónde ni cuántas veces los cortemos, nunca será posible extender una porción de ellos en el plano.

Ahora bien, el «tipo» de curvatura de un balón es ciertamente distinto al de la campana de la trompeta. El primero tiende a «cerrarse», pues se curva «hacia adentro», esto es, en cada posición, todas las direcciones apuntan en el mismo sentido. La segunda, en cambio, tiende a «abrirse», pues se curva «hacia afuera», esto es, en cada posición hay algunas direcciones que apuntan en un sentido y otras que apuntan en el sentido contrario. En el primer caso, la curvatura es positiva, mientras que en el segundo es negativa. Pero esto está lejos de ser una simple convención de signos, pues la curvatura es un número claramente definido mediante el cálculo infinitesimal. Así, la curvatura de cualquier punto de un plano, un cilindro o un cono es igual a cero, mientras que la de los puntos de un balón es igual al inverso del cuadrado de su radio. De esta forma, mientras más grande es el balón, menos curvado está (esto explica por qué nuestro planeta es «casi plano»). En cuanto a la campana de la trompeta, su curvatura ciertamente dependerá del modelo específico, pero hay uno en particular que es geométricamente muy elegante (aunque no de mucho interés musical): aquel en que todo punto tiene curvatura exactamente igual a  $-1$  y cuya superficie, por analogía, es llamada «seudoesfera».



Seudoesfera impresa con tecnología 3D.

Karl Gauss, uno de los más brillantes matemáticos de la historia (apodado no sin razón «el príncipe de las matemáticas»), demostró en 1825 que si una transformación de una superficie en otra preserva todas las distancias, entonces las curvaturas de ambas deben ser iguales. Tan maravillado quedó con este resultado que lo bautizó como *teorema egregium* («teorema notable»). Y Gauss tenía todo el derecho a estar feliz y orgulloso, pues más allá del descubrimiento mismo, este lo llevó a imaginar nuevas geometrías —en especial, geometrías de curvatura negativa—, hasta ese entonces inimaginables para el ser humano. Lamentablemente, dado el carácter extraordinariamente reservado del meticuloso Gauss, quien además no quería entreverarse en una discusión con la comunidad filosófica (sus ideas desacreditaban en buena parte la «teoría de la naturaleza» de Immanuel Kant), muchos de sus trabajos nunca fueron publicados y solo fueron descubiertos entre sus escritos con posterioridad a su muerte.

Un aspecto sumamente interesante es que Gauss llegó a su *teorema egregium* no solo como resultado de una investigación teórica en matemática de vanguardia, sino también motivado por una necesidad muy concreta. En efecto, el gobierno prusiano le había encomendado importantes tareas de geomensura. Así, mientras elaboraba las respectivas cartas geográficas, comenzó a tomar conciencia de que, mientras más territorio estas abarcaban, mayor distorsión iban exhibiendo.

De este modo, gracias a la genialidad de Gauss y su *teorema egregium*, sabemos que transformar una esfera —cualquiera sea su radio— en un plano, preservando las distancias, es sencillamente imposible, pues sus curvaturas son diferentes. Y si bien nuestro planeta no es una esfera perfecta, su curvatura es positiva en todas partes. Por lo tanto, nunca existirá un mapa perfecto de la Tierra, no importa cuál sea la escala empleada. Ciertamente, el viejo y popular mapa de Mercator admite mejoras que permiten corregir, entre otros aspectos, la excesiva distorsión de las regiones próximas a los polos (como Groenlandia o todo el continente antártico). Pero, necesariamente, esto involucrará nuevas imprecisiones en otras regiones. Por ejemplo, si se observa con atención el mapa de Narukawa, se constatará que el posicionamiento de varias partes del globo (especialmente África) es bastante incómodo. De cierta forma, lo que hace esta carta geográfica es «distribuir» la distorsión de manera más equilibrada, pero —repetimos— no es perfecta. Más aun, insinuar que este o cualquier otro mapa «resuelve el espinoso problema de proyectar un planeta esférico en un plano» es un despropósito comparable a afirmar que «se acaba de resolver el milenario problema de la cuadratura del círculo» (capítulo 8).

Si bien el *teorema egregium* descarta toda posibilidad de un mapa perfecto de la Tierra, el hecho de que una esfera completamente redonda no pueda ser proyectada apropiadamente a un plano era conocido desde mucho antes. Para explicar esto, conviene recordar en primer lugar que la manera más rápida de desplazarse de un punto a otro sobre una esfera con velocidad constante consiste en seguir el arco de la circunferencia que la divide en dos mitades exactamente iguales y pasa por dichos puntos. Este tipo de circunferencias son, por lo tanto, análogas a las rectas del plano y, como tales, son llamadas «geodésicas».

Aunque en curvatura negativa también existen geodésicas (es decir, caminos que minimizan la distancia) entre dos puntos cualesquiera, estas son más difíciles de describir. Ahora bien, un trío de geodésicas que se intersectan de a pares conforma una figura que, por analogía, llamamos «triángulo».

En una figura tal, tiene sentido referirse a los «ángulos» entre los lados. Sucede que, en curvatura positiva, dichos triángulos tienden a «ensancharse» (de modo que la suma de los ángulos es mayor que  $180^\circ$ ), mientras que en curvatura negativa, estos se «adelgazan» (y los ángulos suman menos que  $180^\circ$ ).

Para realizar cálculos en el plano se utiliza una vieja disciplina conocida como trigonometría. Por su parte, para hacer los cálculos de la geometría en la esfera y en la seudoesfera se recurre, respectivamente, a dos técnicas análogas desarrolladas desde tiempos remotos: la trigonometría esférica y la hiperbólica (la primera era conocida desde la antigüedad y, la segunda, desde fines del siglo XIX).

Estas dos herramientas otorgan, por ejemplo, versiones *ad hoc* del teorema de Pitágoras (capítulo 6), las que tienen como consecuencia un hecho relevante: si  $a, b$  son los lados de un triángulo  $\Delta$  que delimitan un ángulo recto y  $c$  es el otro lado, entonces se cumple  $a^2 + b^2 > c^2$  si  $\Delta$  está en una esfera y  $a^2 + b^2 < c^2$  si  $\Delta$  está en una seudoesfera.

Para visualizar lo anterior, considere, por ejemplo, la figura que resulta de una esfera al cortarla en ocho casquetes iguales. Pues bien, este «octante» es un triángulo cuyos lados miden lo mismo y sus ángulos son rectos. Corresponde, entonces, a un triángulo equilátero y rectángulo a la vez; ciertamente, para este, carece de sentido hablar de catetos y de hipotenusa.

Y si estos argumentos que involucran ángulos no lo convencen, considere la siguiente situación: se dan cuatro puntos  $A_1, A_2, B, C$  en el plano, con  $B$  al lado izquierdo de la recta  $A_1 A_2$  y  $C$  al lado derecho. Esto determina las distancias


$$a = A_1 A_2, \quad b_2 = BA_2, \quad c_1 = CA_1, \quad c_2 = CA_2, \quad c = CA_2 \text{ y } d = BC.$$

Pues bien, si consideramos una configuración de cuatro puntos en la esfera para la cual las distancias análogas a  $a, b_1, b_2, c_1$  y  $c_2$  sean las mismas, entonces la distancia  $d$  entre los puntos  $B$  y  $C$  del plano será necesariamente mayor que la de los puntos correspondientes en la esfera. Y si hacemos lo mismo sobre la seudoesfera, entonces  $d$  será menor que la distancia entre los nuevos puntos.

Así que ya lo sabe: si desea una representación fidedigna de la Tierra, tenga claridad de que siempre lo mejor será invertir en un globo terráqueo. Definitivamente, vale la pena.

Lamento, con este capítulo, desencantar a muchas personas que habían reaccionado entusiastamente frente al anuncio desmesurado de la BBC y otros medios —si bien algunos difundieron la información de manera certera—, y habían compartido la noticia del «mapa perfecto» de Narukawa en las redes sociales. Pero así como en ciencia se trabaja incansablemente en la búsqueda de la verdad, la prensa de divulgación científica debiese velar porque este aspecto prime en sus contenidos, y que no sea el número de *likes* en Facebook el aspecto decisivo para una decisión editorial en torno a un artículo.

No siempre la verdad es lo más popular.





Curvatura positiva   Curvatura negativa   Curvatura nula

### Apéndice: mapas, mapas y más mapas

Existe una gran variedad de mapas del mundo, cada uno de los cuales se ajusta a una u otra necesidad (muchos de ellos aparecen desplegados en Wikipedia). El más popular de todos, aquel ideado por Gerardus Mercator en 1569, resulta de proyectar horizontalmente cada punto de un globo terráqueo apoyado en el polo sur hacia un cilindro que lo rodea, para luego «abrir» dicho cilindro a lo largo de un meridiano. En este proceso, ambos polos literalmente «explotan», y la Antártica deviene una suerte de monstruo blanco en el sur. De esta manera, pese a que este mapa tiene algunas propiedades geométricas muy agradables, la distorsión de superficies en las regiones alejadas del ecuador lo hace, al menos, «políticamente incorrecto».




Si se desea restaurar la proporción entre las áreas de las diversas regiones, un método natural consiste en «achatar verticalmente» el mapa hacia los extremos inferior y superior. Esta idea fue desarrollada por Johann Lambert en 1772. Sin embargo, hoy es más popular una implementación ideada por James Gall en 1875 y «redescubierta» por Amo Peters en 1973. El ahora llamado «mapa de Gall-Peters» es recomendado por la Unesco para instruir sobre la real proporción de las superficies de los distintos territorios, tanto así que es ampliamente utilizado en las escuelas de Inglaterra.



A la izquierda: mapa de Mercator. A la derecha: mapa de Gall-Peters.

Los diseños de Lambert y de Gall-Peters no fueron, sin embargo, los primeros en representar fielmente las áreas de los distintos territorios. Alrededor del año 1500, Johannes Stabius ya había desarrollado el amable mapa con forma de corazón ilustrado a inicios de este capítulo, el cual verifica esta propiedad (posteriormente, fue perfeccionado por Johannes Werner, de modo que suele llamársele mapa de Stab-Werner).



Existe otro tipo de proyección del globo terráqueo, esta vez hacia un disco (y a lo largo de circunferencias), en la cual las proporciones de las superficies de las regiones también son preservadas. Se trata de la así llamada proyección acimutal de Lambert (ilustrada a la izquierda), actualmente utilizada en el logo de las Naciones Unidas (ilustrado a la derecha).

Si bien el mapa de Narukawa no respeta fielmente las proporciones entre las áreas de los territorios, tampoco las distorsiona demasiado. Esto permite, a su vez, no incurrir en severas distorsiones de las formas de los continentes, como ocurre con el mapa de Gall-Peters. Es justamente este equilibrio lo que hace tan notable esta nueva carta geográfica.


Matemáticamente, podría pensarse en establecer un sistema de medición del grado de imperfección de un mapa. Determinar, bajo este parámetro, cuál es el mejor mapa deviene entonces un problema planteado sin ambigüedad. Su solución, lamentablemente, no parece en absoluto sencilla. ¿Será que alguna vez podamos decir «a ciencia cierta» que hemos encontrado el mejor mapa de todos? Permítanme ser optimista al respecto.

## LA CÉLULA DE SU TELÉFONO Y LA GEOMETRÍA DE LA HAYA



El funcionamiento de uno de los objetos más venerados hoy en día, el teléfono celular, depende de diversos procesos físicos y matemáticos. Por ejemplo, para que el sistema de geolocalización satelital que lleva consigo funcione adecuadamente, es necesario que implemente cálculos que consideren nada menos que la teoría de la relatividad. En efecto, como las conexiones satelitales se dan a una escala muy grande, si se operase solamente sobre la base de la mecánica clásica, entonces se cometerían errores imperdonables. De manera más concreta, sin las «correcciones relativistas», el Waze que lo orienta mientras maneja su automóvil podría indicarle doblar unos quince metros más allá de donde ya debió hacerlo, o la aplicación Pokémon Go posicionaría erróneamente un pokémon y le impediría cazarlo.


Pero, al margen de esta y muchas otras sofisticaciones científicas y tecnológicas, permítame plantearle una interrogante muchísimo más banal: ¿sabe usted por qué se le llama «celular» a su teléfono móvil? Para vislumbrar la respuesta, observe con atención la siguiente fotografía con microscopio de un tejido humano y luego imagine que, en el «núcleo» de cada célula, usted colocara una barra vertical: ¿a qué se asemejaría la imagen resultante?



Desde ya hace un tiempo, todo nuestro territorio está plagado de antenas de telefonía, cada una de las cuales tiene asociada una «célula», es decir, la región de los puntos que están más próximos a esta antena que a cualquier otra. La superficie terrestre ha devenido así un inmenso tejido, en el cual nuestro teléfono móvil se conecta siempre a la antena más cercana. Cuando pasamos de una célula a otra, cambiamos de la señal de una antena a la de otra en un instante casi imperceptible, varias veces inferior a un segundo. Esto último constituye uno de los mayores progresos tecnológicos asociados a la telefonía celular, algo que no se había podido lograr, por ejemplo, con la vieja tecnología de la radio.

Distribuir antenas de manera óptima se vuelve entonces un problema matemático. De hecho, este tipo de problemas ya había sido considerado en geometría plana por el ruso Georgy Voronói hace poco más de

un siglo, cuando los viejos teléfonos eran la máxima novedad. Fue él quien acuñó el término «célula» para la región de proximidad. En el caso de la geometría plana, esta corresponde a un polígono convexo cuya forma y número de lados dependen del posicionamiento de los nodos de referencia (las «antenas»). La razón de la forma poligonal se halla en un viejo conocido del liceo: la mediatrix (también conocida como simetral). Si bien esta recta es usualmente presentada como la perpendicular en el punto medio de un trazo, tiene la particularidad de que sus puntos están exactamente a la misma distancia de los extremos de este. La mediatrix determina dos semiplanos, cada uno de los cuales contiene los puntos más cercanos a uno u otro extremo. Así, cada región celular en un diagrama de Voronoi queda determinada por las mediatrices asociadas a pares de nodos de referencia «vecinos».



A la izquierda: la mediatrix del trazo  $AB$  divide el plano en dos semiplanos, uno con los puntos más cercanos a  $A$  y el otro con los puntos más cercanos a  $B$ ; los puntos de la mediatrix son aquellos que equidistan de  $A$  y  $B$ . A la derecha: en la distribución poligonal de Voronoi, cada recta divisoria (en azul) corresponde a una simetral entre dos nodos de referencia «vecinos».

Existe un precedente interesante al trabajo de Voronoi: más de medio siglo antes, y con fines estrictamente teóricos, el alemán Gustav Dirichlet había considerado una construcción análoga, aunque ¡en geometría hiperbólica! (capítulo 2). Además, la misma idea fue introducida en meteorología casi contemporáneamente a Voronoi por Alfred Thiessen. En este contexto, los nodos corresponden a estaciones pluviométricas, y la división en «regiones de Thiessen» permite un mejor manejo de los datos recopilados por ellas.


El viejo adagio se cumple una vez más: cuando una buena idea aparece, suele ocurrírsele a varias personas a la vez.



Mapa de las estaciones pluviométricas en la costa oeste de Estados Unidos y la división de Thiessen asociada.


Si en lugar de puntos consideramos «zonas» de referencia, la discusión se complica bastante. Primeramente, cuando hablamos de la distancia que nos separa de una franja o una región (como un

límite territorial o una ciudad), nos referimos a la distancia al punto de dicha zona que está más cerca de nosotros (si bien puede haber más de un punto que está a distancia mínima). Podemos considerar, entonces, el conjunto equidistante entre dos zonas, es decir, el conjunto de los puntos que están a la misma distancia de ambas. Como hemos visto, si cada una de las zonas es un punto, dicho conjunto es una mediatrix; sin embargo, para zonas con geometría más elaborada, aparecen configuraciones más interesantes y complejas.




De izquierda a derecha: una elipse, una hipérbola y una parábola aparecen como conjuntos equidistantes.

Comencemos con tres ejemplos relativamente sencillos. Si consideramos una circunferencia y un punto situado dentro del círculo que ella determina, entonces el conjunto equidistante es una elipse (que deviene una circunferencia concéntrica si el punto considerado es el centro de la circunferencia original). Por su parte, el conjunto equidistante entre una circunferencia y un punto externo a ella es una hipérbola, mientras que el conjunto equidistante entre una recta y un punto fuera de ella es una parábola. Si no sabe o no recuerda qué son estas curvas, existe una manera muy sencilla de describirlas, que de hecho fue la que utilizó Apolonio de Perge —su descubridor— hacia el siglo II a. C. Simplemente, tome un cono y córtelo con un plano: la curva resultante será una elipse, hipérbola o parábola dependiendo de si el ángulo de inclinación de dicho plano es menor, mayor o igual que el del cono (la elipse será una perfecta circunferencia si el plano es totalmente horizontal).



¿Qué sucede si las zonas consideradas son regiones? Si bien el conjunto equidistante puede ser aún una curva, hay situaciones en que este corresponde a un área con interior (esto último puede darse cuando las regiones tienen una frontera común).



El conjunto equidistante entre las regiones verde y roja no es una línea, sino toda la zona pintada de azul. Desde cada lugar de esta última, el punto más cercano de ambas regiones es el vértice común.

En fin, si quiere averiguar más propiedades sobre conjuntos equidistantes, puede consultar el hermoso artículo «On equidistant sets and generalized conics: the old and the new», disponible en <http://arxiv.org>. En virtud de este trabajo, sus autores, los matemáticos chilenos Mario Ponce (actual decano de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile) y Patricio Santibáñez (en ese entonces, profesor del Instituto Nacional), fueron galardonados en 2015 con el prestigioso Premio Paul Halmos-Lester R. Ford de la Asociación Matemática Americana (MMA).




Mario Ponce (al centro) y Patricio Santibáñez (a la derecha) recibiendo el Premio Paul Halmos-Lester R. Ford de manos de Francis Su, entonces presidente de la MAA.

Así como las mediatrices que originan las regiones de Voronói-Thiessen son relevantes en muchos contextos, la discusión geométrica anterior lo es en lo que respecta a límites marítimos. En efecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que «cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados. No obstante, esta disposición no será aplicable cuando,

por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma». Se debe tener presente que si bien nuestro planeta no es plano, estas demarcaciones conciernen a territorios relativamente pequeños, en los cuales la geometría plana es aplicable sin que se incurra en mayores errores.


En el diferendo marítimo entre Chile y Perú zanjado el año 2015, la posición peruana consistía precisamente en una aplicación de la lógica de conjuntos equidistantes. La posición chilena, en cambio, insistía en mantener el paralelo a la altura del famoso Hito 1 como línea demarcatoria dentro del espacio marítimo de las doscientas millas.



La curva en rojo representa el límite pedido por Perú; la azul, el solicitado por Chile.

La resolución final de la Corte Internacional de la Haya en 2012 respetó parcialmente ambas posiciones: si bien se falló como límite el paralelo del Hito 1 hasta un punto A ubicado a ochenta millas marinas de la costa, a partir del punto A se aplicó la lógica de la posición peruana. El problema que se presentó es que dicho punto A no se encuentra sobre el conjunto equidistante entre las costas chilena y peruana. Por esta razón, la Corte dio una solución demarcatoria astuta, la cual no deja de tener cierto interés geométrico. Para proceder a la división, se dejó de considerar todo territorio, tanto en Chile como en Perú, que estuviese a menos de ochenta millas del punto A; en otras palabras, se «borró» momentáneamente del mapa un círculo de centro A y radio ochenta millas. Luego se consideró el conjunto equidistante respecto de lo que quedaba de Perú y Chile tras el corte. Dicha curva evidentemente pasa por A, y pasó a ser considerada como el límite de los mares territoriales entre ambos países desde A y hasta un punto B ubicado a doscientas millas marinas de la costa chilena. A partir de este punto, el límite sigue la curva de demarcación de las doscientas millas marinas hacia el sur.

Nuestro límite marítimo con Perú es, entonces, la consecuencia de una decisión geométricamente salomónica.



La curva en negro representa el límite establecido por la Corte. Para trazarla, se «retiró» del mapa de Chile y Perú todo territorio situado a menos de ochenta millas marinas del punto A (es decir, se «borró» momentáneamente el círculo clareado en la figura), y luego se consideró el conjunto equidistante respecto de lo que quedaba.

## REFLEXIONES SOBRE UNA MESA COJA



Desde la sagrada invención del café, el vino y la cerveza, nos hemos visto enfrentados al desagradable problema de la mesa paticoja. Tradicionalmente, este ha sido resuelto «a la chilena» con tapas de bebida, servilletas o pedazos de cartón. Sin embargo, existe una solución igualmente simple pero muchísimo más estable y elegante cuando las puntas de las patas determinan un cuadrado perfecto. Al menos, así nos lo enseña una profunda disciplina matemática de extraño nombre: la topología.

En efecto, si la mesa no tiene problemas, entonces su inestabilidad se debe al piso dispareso. En caso de no haber escalones, bordes ni puntas abruptas en el suelo, la ciencia nos dictamina lo siguiente: gire la mesa manteniendo fijo su centro y, antes de dar un cuarto de vuelta, habrá encontrado un punto de equilibrio, es decir, una posición en que las cuatro patas quedan en contacto preciso y simultáneo con el suelo. Haga la prueba...



Antes de un cuarto de vuelta la mesa debe haber alcanzado una posición de equilibrio.

¿Por qué ocurre esto? Muy simple: en una posición inestable, un par de patas opuestas está en un nivel superior respecto del otro par. Tras un cuarto de giro en torno al centro, estos pares de patas intercambian posiciones; por lo tanto, el par que estaba en un nivel superior pasa a uno inferior y viceversa. Necesariamente, en algún momento durante el giro, ambos pares de patas opuestas deben pasar por el mismo nivel: es este el instante en que la mesa deja de cojear (aunque nadie le garantiza que no quede ligeramente inclinada).

Expuesto así, el equilibrio de la mesa resulta tan obvio como el hecho de que si usted está a un lado de una calle y necesita ir hacia el otro, necesariamente tiene que cruzarla! La razón de esto es muy sencilla: al movernos (o al girar la mesa), lo hacemos de manera continua, es decir, paulatinamente, sin pasar de una posición a otra completamente diferente en un solo instante. Ciertamente, podemos hacer

movimientos bruscos, pero incluso estos se ven pausados en cámara lenta: la teletransportación no nos está permitida —aún—.

¿Es todo esto una simple curiosidad o un mero devaneo sobre la obviedad? En lo absoluto. Aunque parezca sorprendente, la comprensión cabal de este concepto de «continuidad» y sus aplicaciones constituye uno de los avances más importantes de la matemática de fines del siglo XIX y principios del XX. En torno a él se articuló la topología, que es la teoría que estudia las propiedades y leyes de los objetos que subsisten bajo deformaciones o movimientos que no involucren quiebres ni rupturas. Una de estas leyes, el importantísimo «teorema del punto fijo» de Luitzen Brouwer, tiene, por ejemplo, la sorprendente consecuencia doméstica siguiente: si usted agita suavemente el café de su taza, entonces, sin importar cómo ni por cuánto tiempo lo haga, inevitablemente, al final, una gota volverá al mismo sitio inicial. ¡Pero atención!: esto deja de ser verdad si usted revuelve el café con una cuchara, pues en tal caso estaría «rompiendo» la «continuidad» del líquido y, con ello, escaparía de los designios de la topología.



A la izquierda: un típico juego de ingenio topológico. Al centro: la visualización geométrica de una red. A la derecha: una red social.


En fin, si quiere impresionar a alguien, sepa que la mayoría de los desafíos de ingenio de bolitas, cuerdas, clavos y argollas que usted puede encontrar en ferias artesanales se resuelven fácilmente con la ayuda de la topología. Si quiere maravillarse, sepa que la prueba matemática rigurosa de Roger Penrose y Stephen Hawking de la existencia de singularidades espacio-temporales fue lograda en parte gracias al uso de la topología. Si lo suyo es lo práctico, sepa que la topología es extensamente aplicada en el diseño de los robots mecánicos, pues permite simplificar sus posibles movimientos al mejorar la manera en que estos se articulan entre sí. Si le gusta navegar en internet, sepa que un tema de gran actualidad —tanto en computación como en sociología— es el estudio de la topología de las redes sociales, donde estas son entendidas como «objetos» (denominados grafos; capítulo 15) formados por nodos —que representan a los usuarios— entre los cuales existen conexiones en caso de interacción. Si de actualidad se trata, sepa que el Premio Nobel de Física del año 2016 fue otorgado a David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz «por sus descubrimientos teóricos de las transiciones topológicas de las fases de la materia». Y si a este diluvio de ideas científicas y tecnológicas quiere darle un toque más literario, puede sumergirse en las páginas de la *Topología del pobre topo*, de nuestro mítico poeta Rodrigo Lira, cuya lectura le dejará un extraño (y agrio) sabor topológico.

Así, la próxima vez que esté frente a su café servido en una mesa coja, sacará de su bolsillo su libro de Lira o su juego de cuerdas y argollas favorito, pensará en la forma del universo, los robots, los estados de la materia y su cuenta de Facebook, ¡y por ningún motivo cometerá el sacrilegio de usar servilletas para nivelar la mesa! Usted ya lo sabe: si la mesa está coja, escoja.


Rodrigo Lira

# Topología del pobre Topo

(fragmento)




## POINCARÉ, PERELMAN Y EL MILLÓN DE DÓLARES



Desde la más remota antigüedad, el ser humano se ha preguntado incansablemente acerca de la forma de su entorno y, en general, del universo. Muchas de estas percepciones desarrolladas por comunidades ancestrales requieren de un esfuerzo imaginativo portentoso para concretizarlas, con sorprendentes conexiones con la ciencia moderna. La monumental historia a la que me referiré aquí comienza, como muchas otras, en la antigua Grecia. Allí, una visión extraordinariamente temeraria y hermosa, la del filósofo y matemático pitagórico Filolao, postulaba que «el mundo limita por el exterior con la esfera del Olimpo». Ahora bien, al margen de toda consideración metafísica o religiosa, ¿puede usted imaginar cómo se verían dos mundos pegados a lo largo de un mismo borde esférico? Asumamos —como parecía ser la concepción de Filolao— que estos mundos (el de los mortales y el Olimpo de los dioses) son ambos como dos grandes globos: ¿cómo podría unírselos a lo largo de una esfera común, uno por dentro y otro por fuera?

El problema de la forma del universo es, tal vez, demasiado complejo. Concentrémonos, entonces, en algo ligeramente más banal y que fue una preocupación esencial del ser humano durante siglos: la forma de la Tierra. En la escuela pitagórica ya se enseñaba su redondez, aunque sin mayor fundamento. Aristóteles fue el primero en aportar argumentos para la esfericidad del mundo: la sombra que proyecta la Tierra en la Luna durante un eclipse es siempre circular. Más tarde, Eratóstenes logró calcular la medida del radio de la Tierra con gran precisión mediante un experimento de extraordinaria simpleza y originalidad —ilustrado a continuación—.



Mientras los rayos del Sol caen perpendicularmente sobre la superficie en Siena, lo cual se constata por el hecho de que llegan al fondo de un pozo de agua, en Alejandría lo hacen formando un ángulo  $\theta$ , fácilmente calculable a partir de la sombra de una torre. Este ángulo es el mismo que forman las proyecciones de la torre y el pozo hacia el centro de la Tierra. Conociendo este ángulo y la distancia entre Siena y Alejandría, el radio de la Tierra se calcula sin dificultad.


Pero todo esto se basaba en algo que seguía siendo un supuesto: la redondez de la Tierra. Se atribuye la constatación de ella a Sebastián Elcano, quien comandó el final de la primera vuelta alrededor del mundo emprendida por Hernando de Magallanes. Sin embargo, coincidirá usted en que no solo una forma redonda, sino muchas otras, permitirían que a un cuerpo se le dé una vuelta comenzando y volviendo al mismo lugar. Por ejemplo, esto hubiera sido posible si la Tierra tuviese una forma de dona. Desde este punto de vista extremadamente escéptico, la constatación final de la redondez de nuestro planeta no la habría hecho sino Yuri Gagarin, en 1961, al emprender el primer viaje al espacio y, desde allí, constatar su forma inapelable.



Evidentemente, entreverarse en una discusión de este tipo puede parecer una pérdida de tiempo. Aunque, ¿lo es realmente? A fin de cuentas, si bien tenemos claridad acerca de la forma de nuestro


planeta, la situación es mucho más difusa cuando hablamos de la forma del universo. De hecho, en lo que va de este relato, aún no logramos visualizar ni siquiera la visión de Filolao a este respecto.

Entender los distintos tipos de configuraciones de todos los «espacios» imaginables, al margen de consideraciones físicas, es una de las misiones más importantes de la topología (capítulo 13). En esta disciplina, dos espacios son considerados equivalentes si uno puede ser deformado en el otro sin romperlo (es decir, «continuamente»). Por ejemplo, si un cuerpo se mueve en un espacio que consta de «una sola dirección», entonces hay solo dos posibilidades: o lo hace a lo largo de una curva que no se cierra, o bien sobre una curva en que un punto vuelve sobre sí mismo. En la primera, el espacio subyacente es, para la topología, igual a una recta, pues puede deformarse en esta; en la segunda de las posibilidades, el espacio es, topológicamente, una circunferencia.



Para la topología, esta curva es equivalente a una circunferencia.

Una de las nociones básicas de la topología es el concepto de «dimensión», que corresponde simplemente a la cantidad de direcciones independientes en las que es posible moverse. Por ejemplo, un disco circular es, en su interior, un espacio de dimensión dos. Para la topología, este espacio es equivalente a un hemisferio de una esfera. Otro espacio bidimensional particularmente interesante es la famosa banda de Möbius, aquella sobre la que, al dar giro completo, se reaparece en la misma posición, pero sobre la cara opuesta. Observe, sin embargo, que tanto el disco como la banda tienen un «borde». La esfera, en cambio, no posee borde, y también es un espacio bidimensional. Aun así, la banda de Möbius puede venir incorporada a un espacio sin borde; por ejemplo, tal es el caso para la «botella de Klein» (llamada así en honor a Felix Klein, su inventor), un objeto que no puede ser presentado dentro de nuestro universo de tres dimensiones sin incurrir en autointersecciones.




A la izquierda: una banda de Möbius. A la derecha: una botella de Klein.

Uno de los grandes teoremas de la matemática de fines del siglo XIX e inicios del XX es la clasificación de todos los espacios bidimensionales sin borde: en el caso de que un espacio de este tipo no lleve incorporado una banda de Möbius, debe ser ya sea una esfera, una dona (a la que, curiosamente, en matemática se le llama «toro»), o bien pertenecer a una familia infinita en la cual cada miembro (el bitoro, el tritoro, etcétera) se obtiene agregando un asa al anterior.




De izquierda a derecha: un toro, un bitoro, un tritoro y... ¡otro tritoro!

Entre las superficies bidimensionales, la esfera destaca por lo siguiente: si un lazo (cerrado) da una vuelta en torno a ella, entonces es posible deformarlo sin romperlo hasta que se vuelva tan pequeño como se quiera. En términos matemáticos, se dice que la esfera es «simplemente conexa».



Deformando un lazo cerrado en una esfera.

Las superficies «toroidales», en cambio, no cumplen esta propiedad pues, por ejemplo, los lazos que rodean las asas o los que dan «una vuelta completa» no pueden hacerse arbitrariamente pequeños sin romperlos. Así, la esfera es la única superficie cerrada, orientable y simplemente conexa.



Si bien el lazo a la izquierda puede ser deformado en un punto, esto no es posible con el de la derecha.

¿Qué sucede con un espacio tridimensional? Se puede ganar un poco de intuición en tres dimensiones estableciendo analogías con el mundo bidimensional. Consideremos, por ejemplo, el universo de Filolao (dos globos pegados a lo largo de un borde esférico común) y pensemos en su análogo bidimensional: dos discos pegados a lo largo de una circunferencia común. ¿Dónde podemos hallar tal configuración? Muy fácil: tal como hemos señalado, un disco es equivalente a un hemisferio esférico, y los dos hemisferios se juntan en un ecuador —que no es otra cosa que una circunferencia—, originando así una esfera. Por lo tanto, ¡el análogo bidimensional del mundo de Filolao no es otra cosa que una superficie como la de nuestro planeta! El universo de Filolao es, entonces, una esfera tridimensional, un objeto que no puede ser reproducido geométricamente, pero sí concebido por analogía.



Dos «discos» (casquetes) pegados a lo largo de una circunferencia originan una esfera (bidimensional).

La esfera tridimensional tiene la misma propiedad de su versión en dos dimensiones: es simplemente conexa. Hacia fines del siglo XIX, uno de los padres de la topología, Henri Poincaré, conjeturó que, al igual que en dimensión dos, esta propiedad caracteriza la esfera tridimensional entre los espacios cerrados de dimensión 3. Sin embargo, él mismo vislumbró la dificultad de este problema, el que, literalmente, le causaba «horror». Y fue muy visionario en ello, pues transcurrieron más de cien años antes de que fuese totalmente resuelto. Por allí pasaron célebres matemáticos, entre los que podemos destacar a quienes les fue adjudicada la Medalla Fields (capítulo 19) por su trabajo en torno a la conjetura: Stephen Smale, quien resolvió la cuestión pero en dimensión mayor que cuatro; Michael Freedman, quien hizo lo propio en dimensión cuatro; William Thurston, quien —entre muchas otras cosas— planteó un camino para la solución, y Gregory Perelman, quien finalmente la resolvió.

En este camino, la estrategia de Thurston resultó fundamental. Él propuso buscar una geometría «natural» para cada espacio, por muy complicado que este sea. Por ejemplo, la geometría natural para los espacios equivalentes a una esfera es la redonda. Sin embargo, este es un caso muy particular, pues desafiando la imaginación de todos sus contemporáneos, Thurston observó que para muchísimos espacios tridimensionales cerrados, la geometría natural es la hiperbólica (capítulo 2). Esto lo llevó a formular su famosa «conjetura de geometrización», cuya solución tenía como una de sus consecuencias a la de Poincaré, pero que podía ser atacada por métodos diferentes.

En efecto, una geometría se plantea mediante la asignación de longitudes y puede ser modificada mediante un proceso de «evolución» que se describe en términos de complejas ecuaciones sobre esas longitudes. El estudio de este «flujo geométrico» (llamado «flujo de Ricci») fue fuertemente impulsado por Richard Hamilton. Fue justamente al final de esta historia cuando intervino Perelman, quien demostró que este flujo efectivamente llega a su destino y no se detiene antes de originar la forma límite natural. De allí el porqué de la foto de entrada de este capítulo, en la que Perelman aparece lidiando con complicadas ecuaciones y no con figuras geométricas o configuraciones de espacios, como hubiese sido más esperable. Fue gracias a estas que logró probar la conjetura de Thurston y, por extensión, la de Poincaré.

La expectación causada por la solución de Perelman trascendió las esferas del mundo matemático por varias razones. Primeramente, y emulando lo que había hecho Hilbert a inicios del siglo XX (capítulo 6), el Instituto Matemático Clay había elaborado poco antes una lista de siete problemas que guiarían la investigación matemática en el siglo XXI; naturalmente, entre ellos estaba la conjetura de Poincaré. Pero se había añadido un incentivo extra: un premio de un millón de dólares para quienes resolviesen alguno y publicasen un artículo que contuviera la solución, algo totalmente inédito en el mundo de la matemática, donde los premios en dinero suelen ser más bien exigüos, y muchos los consideran superficiales e incluso ofensivos. Pues bien, desde un inicio, Perelman, manifestó su rechazo a esta tentadora oferta, al punto de que decidió no publicar sus artículos, sino solo ponerlos a disposición de la comunidad en el repositorio gratuito [www.arxiv.org](http://www.arxiv.org) (capítulo 17).

Más aun, en el Congreso Internacional de Matemáticos en 2006 debía ser anunciada la Medalla Fields que el Comité Científico le había otorgado. Sin embargo, Perelman rechazó también este premio y no se presentó a la conferencia. La noticia se enturbió incluso más cuando se conoció una presunta disputa con

el medallista Fields chino Shing-Tung Yau y porque circuló, durante el mismo congreso en Madrid, el famoso artículo «Manifold Destiny» de la revista *The New Yorker*, donde se trata el caso con tintes de una polémica bastante poco elegante: ver en Wikipedia la entrada «Manifold Destiny». Lo concreto es que, hasta el día de hoy, Perelman sigue alejado del mundo académico en su San Petersburgo natal. En cuanto al millón de dólares, se sabe que fue destinado al Instituto Poincaré de París gracias a la intermediación de Cédric Villani, su director, con lo que se creó la «Cátedra Poincaré», que financia estadías en el instituto de matemáticos jóvenes y excepcionales del mundo entero.

Hace ya un par de siglos, Karl Gauss había dicho: «Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se le revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella». Y uno de los grandes genios de la geometría del siglo XX, Mijaíl Grómov, dijo respecto al trabajo de Perelman: «Para acometer una gran obra, se debe tener una mente pura, y solo se debe pensar en matemática; cualquier otra cosa es debilidad humana, y aceptar premios es signo de debilidad».

Ciertamente, Perelman seguirá viviendo en el imaginario científico como un ícono de fortaleza matemática, la que le permitió calmar por fin el horror de Poincaré.



Cédric Villani, el inconfundible matemático «de la humita y la araña» (ganador de una Medalla Fields en 2010), en una fotografía tomada durante su visita a Chile para el congreso de celebración del aniversario número cincuenta de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile (diciembre de 2015). En su compañía —y con una llamativa camisa— aparece Nicolás Libedinsky, impulsor de dicho evento.

## HACIENDO MEMORIA



Si escarbamos en la historia buscando los orígenes de la matemática chilena (al menos desde la Independencia en adelante), debemos comenzar por reconocer que algún conocimiento estaba asentado hacia 1810, como se ve reflejado en el intrincado y elegante diseño geométrico de nuestra bandera de la Independencia (capítulo 1). Dicho conocimiento sobrevivió tal vez en academias militares o instituciones señeras de educación, como el Instituto Nacional o, más tarde, la Universidad de Chile. Es así como, hacia 1850, aparece en escena un personaje único, un adelantado a su época: Ramón Picarte Mujica.

Picarte es considerado el primer científico nacido y formado académicamente en Chile. Pese a esto, su historia es muy poco conocida (el único retrato que se dispone de él, reproducido arriba, está digitalizado en el extraordinario repositorio cultural *Memoria Chilena*). Su padre, también llamado Ramón, es a menudo más reconocido, pero por otras razones: fue un militar que luchó en la Independencia del lado carrerista y que, más tarde, fue degradado del Ejército por Diego Portales debido a su inclinación liberal (una de las avenidas principales de la ciudad de Valdivia lleva el nombre de Ramón Picarte en su honor). Ramón Picarte Mujica, por su parte, compartió aulas en el Instituto Nacional nada menos que con Miguel y Víctor Amunátegui, Diego Barros Arana, Alberto Blest Gana y Eusebio Lillo, en una generación conocida como la de «los notables». Más tarde, fue discípulo de Antonio Gorbea, quien lo guio en su carrera de agrimensor e inspiró su estudio de lo que él llamaba «la ciencia de los números».

Por aquellos años, en los que solo Julio Verne podía ser capaz de imaginar un objeto parecido a una calculadora moderna, en ingeniería y astronomía eran herramientas básicas las famosas «tablas» de cálculo, especialmente las de divisiones, logaritmos y funciones trigonométricas. Si usted visita una librería antigua o una feria de libros usados (como las del persa Biobío en Santiago o de la plaza O'Higgins en Valparaíso), aún puede encontrar algunas a la venta (si ve una a buen precio le recomiendo comprarla, pues se trata de una verdadera reliquia). Pues bien, entre otras cosas, Picarte ideó una sencillísima tabla de divisiones, más exacta que la utilizada en Europa en aquellos años. Tristemente, no obtuvo apoyo en Chile para imprimirla, pese a haber abogado insistenteamente ante Antonio Varas (ministro del presidente Manuel Montt), quien, paradójicamente, había sido su rector en el liceo.

### Organización de la clase


El profesor de Matemática pura enseñará la Aritmética, los principios de Algebra, la Geometría, y Trigonometría plana, la práctica de estas dos ciencias, como medir distancias, accesibles, é inaccesibles, levantar planos, la nivelación & dará los principales elementos de secciones cónicas. Enseñará los principios del arte de fortificar, defender, y atacar las plazas, y puntos importantes.

El profesor de Matemática mixta enseñará los elementos de Dinámica, y Estática ; la Teoría de las fuerzas centrales; los principios de Hydrodinamica, los de Astronomía, y Geografía.

Extracto de las bases para la creación del Instituto Nacional, texto redactado por Camilo Henríquez en 1812 y publicado en la *Aurora de Chile* el 18 de junio de ese año (copiado del original —respetando la ortografía— disponible en

[www.auroradechile.cl](http://www.auroradechile.cl)). Comparado con el actual, el programa destinado a la matemática resulta, por lo menos, curioso.

Con su propio dinero, decidió entonces emprender un viaje a Francia a presentar su obra. Como era de esperar, Picarte fue muy bien recibido por una sociedad extraordinariamente meritocrática, cuna de instituciones de educación de élite concebidas en tiempos posrevolucionarios (como la Escuela Normal Superior o la Escuela Politécnica). Así, en febrero de 1859, expuso su trabajo ante la Academia de Ciencias de París. El informe de esta, datado el día 14 de dicho mes, fue firmado —entre otros— nada menos que por Charles Hermite, uno de los matemáticos más importantes del mundo en la época y que, años más tarde, dirigiría la tesis de doctorado de Henri Poincaré. Picarte pudo finalmente imprimir su tabla en forma de un libro titulado *La division réduite à une addition*, reproducido parcialmente a continuación en su versión en castellano, de la cual se preserva una copia en la Biblioteca Nacional de Santiago. Esta obra fue traducida y se hizo muy popular en buena parte de Europa, incluyendo Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica y Holanda.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7650	01307190	02014379	03091500	05297875	06030498	07643157	09146037	10455716	11784706
7651	01307018	02014007	03091058	05228073	05232093	07842119	09149131	10456150	11784758
7652	01306848	02013005	03090544	05422792	05341939	07841087	09147053	10454783	11781031
7653	01307667	02013334	03090001	05292670	05233289	07840063	09148740	10455417	11780094
7654	01306506	02013013	03090519	05429528	05322482	07839059	09145546	10452033	11780508
7655	01306536	02013071	03091907	05205343	05281879	07838014	09144350	10450066	11757092
7656	01308185	02012930	03091895	05384090	06230865	07836001	09143150	10449321	11785486
7657	01305865	02011989	03091764	05282078	05292973	07835067	09141902	10447036	11752013
7658	01305894	02011648	03091747	05212398	05292190	07834944	09140708	10446569	11752416
7659	01305553	02011307	03091600	05222614	05329897	07833921	09139574	10445228	11750881
7660	01305485	02011095	03091649	05291932	05272415	07832908	09118588	10443864	11749497
7661	01305513	02010950	03091598	05292130	05289585	07831876	09117188	10442501	11747814
7662	01305142	02010983	03091547	05292049	05282711	07830854	09115590	10441138	11746920
7663	01306497	02009044	03091491	05219888	05248600	07829882	09115480	10430776	11747447
7664	01304870	02009003	03091445	05419907	05294006	07828810	09113361	10436413	11743016
7665	01304823	02009020	03091384	05271856	05252157	07827780	09112340	10437052	11741683
7666	01304851	02009023	03091386	05271784	05252205	07826764	09112129	10438090	11740161
7667	01304891	02009043	03091273	05271704	05252145	07824747	09112008	10434329	11738620
7668	01304813	02009044	03091265	05271684	05252063	07824726	09112884	10432968	11737099
7669	01305001	02007908	03091155	05212504	0519755	07823706	09112705	10431608	11734550
7670	01305782	02007560	03091154	05215184	05518005	07822686	09112545	10430748	11734029
7671	01305811	02007122	03091083	05214444	05518055	07821666	09112377	10428888	11733409
7672	01305441	02006983	03091023	05213764	05517364	07820646	09112146	10427329	11730970
7673	01305321	02006445	03090914	05212045	05516356	07819027	09112088	10426170	11730441
7674	01308101	02006403	03090904	05412406	05515567	07818008	09112171	10424811	11727712
7675	01305692	02005763	03090875	05211798	05514658	07817500	09110031	10423455	11729384
7676	01305702	02005524	03090866	05211047	05513809	07816571	09111933	10423905	11724857
7677	01305659	02005174	03090777	05211081	05513810	07816571	09111933	10423905	11724857

En la tabla de Picarte aparece explícitamente el valor de la división de cada dígito 1,2,...,9 por cada número entre 1 y 10 000, con una exactitud de 10 cifras decimales (es este último aspecto la principal virtud de las tablas). Para ejecutar una división con ellas, por ejemplo, para realizar el cálculo 8 976 795 : 7674 = 1169,7673, se procede como sigue:

Valor (desde la tabla) de:

8 : 7674 (sin el 0 ni las comas iniciales):	0010424811
9 : 7674 (valor desplazado 1 espacio):	001172771
7 : 7674 (valor desplazado 2 espacios):	000912127
6 : 7674 (valor desplazado 3 espacios):	0007818
7 : 7674 (valor desplazado 4 espacios):	000912
9 : 7674 (valor desplazado 5 espacios):	00117
5 : 7674 (valor desplazado 6 espacios):	0006

Suma de los números listados: 0011697652

Resultado obtenido por simple adición y posicionando la coma decimal (correcto a dos cifras decimales): 1169,7652.


Ahora bien, la elaboración de esta tabla no fue el resultado de realizar mecánicamente cada división (pues hubiese tomado demasiado tiempo), sino que involucra astutos argumentos simplificadores. Estos incluyen, por ejemplo, un lúcido uso de la identidad algebraica

$$\frac{a^2}{b} = (2a - b) + \frac{(a - b)^2}{b}.$$

El 17 de mayo de 1859, *El Mercurio de Valparaíso* incluyó una nota en la que se relataba la hazaña de Picarte en la ciudad luz. Ante esto, el gobierno chileno se apresuró a nombrarlo «funcionario adjunto a la

legación de Chile en Francia» y asignarle una pensión pecuniaria a partir del día siguiente. El 11 de junio del mismo año, la Universidad de Chile lo nombró «miembro corresponsal de la Facultad de Física y Matemáticas». Así, de vuelta en Chile unos años más tarde, Picarte fue recibido con todos los honores que nuestro país suele otorgar para excusarse de no haber reconocido el talento tempranamente y haber tenido que esperar que tal reconocimiento viniese del extranjero. Sin embargo, no pudo acometer la tarea de fundar una escuela científica, en parte porque se volcó hacia intereses de índole político y social, y en parte también porque nuestro país aún no estaba preparado para ello.

Pasaron décadas y también varios nombres de inmigrantes señeros, como los de Ricardo Poenisch, Francisco Pröschele y Carlos Grandjot, quienes trajeron consigo parte del saber matemático del hemisferio norte. Vino después un período hermoso, una época encabezada por un presidente —Pedro Aguirre Cerda— para quien gobernar era sinónimo de educar, lo que originó una algarabía intelectual de la cual brotaron los primeros nombres chilenos de la matemática, como Guacolda Antoine y Domingo Almendras. Paralelamente, aparecieron los primeros divulgadores de la ciencia, como Arturo Aldunate Phillips, quien, en 1940, publicó un interesantísimo libro: *Matemática y poesía*. Lamentablemente, los censores literarios de esos años no estuvieron a la altura para juzgarlo; en particular, aquél de mayor autoridad en la época, Hernán Díaz Arrieta (más conocido como Alone), no escribió crítica alguna sobre esta obra (un error menor si lo comparamos con el que repitió dos décadas más tarde con la poesía de Enrique Lihn).




Así, poco a poco se fue cimentando una base más sólida para una escuela matemática en Chile. Pero el inicio oficial no vino sino hasta fines de la década de los cuarenta.

Antiguamente, la ciencia se transmitía mediante libros o tratados; entre los más célebres para la matemática figuran los *Elementos* de Euclides, los *Principios matemáticos de la filosofía natural* de Newton o *La teoría analítica del calor* de Fourier. Por el contrario, la ciencia moderna se transmite principalmente vía publicaciones en revistas especializadas. En este esquema, la entrada de nuestro país al concierto internacional se produjo en 1949 con el artículo de Roberto Frucht, de la Universidad Técnica Federico Santa María, titulado «Graph of degree three with a given abstract group», publicado en la revista *Canadian Journal of Mathematics*.



Frucht era de nacionalidad alemana, pero de ascendencia judía. Por ello, con el advenimiento del régimen nazi, debió escapar de su país, primero a Italia y luego a Argentina, para finalmente recalar en Chile, donde se sintió totalmente acogido y vivió tranquilamente «a pesar de los temblores». Había estudiado primero física —nada menos que con Max Planck—, para luego dedicarse a la matemática guiado por el algebrista Issai Schur. Entre sus colaboradores figuraba el célebre geométrico canadiense Harold Coxeter. Son dos sus aportes más recordados a la matemática. Ambos tratan sobre el estudio de grafos, que son objetos muy sencillos formados por vértices o nodos conectados por «aristas» (no necesariamente rectas). Si bien un grafo puede poseer una infinidad de vértices, a menudo se asume que cada uno de ellos está directamente conectado solo a una cantidad finita. Entender las propiedades de los grafos es un tema de enorme actualidad, especialmente en el estudio de las redes sociales.


El primer teorema de Frucht es una bonita extensión de un resultado del inglés Arthur Cayley, uno de los pioneros de la teoría de grupos. A grandes rasgos, establece que todo conjunto abstracto de simetrías puede ser representado como el conjunto de las simetrías de un grafo, es decir, como las transformaciones que intercambian los nodos y las aristas respectivas de modo que, al final del proceso, el grafo se ve exactamente igual a como era antes. Así, un objeto matemático muy abstracto —un grupo (capítulo 2)— puede siempre ser presentado de una manera visual.



Representación de una simetría de un grafo en que los nodos 3 y 5 se intercambian, así como los nodos 1 y 2.

El otro gran descubrimiento de Frucht es un precioso objeto geométrico: el grafo más pequeño posible, en el cual todo nodo tiene tres conexiones y no admite ninguna simetría efectiva, es decir, ninguna simetría que cambie algún nodo. Como nuestra percepción tiende a asignar belleza a los cuerpos simétricos, este «grafo de Frucht» (ilustrado más abajo) viene a ser algo así como el monstruo más chico que existe. Obsérvelo bien: trate de intercambiar los nodos y constatará que, necesariamente, tendrá que

crear o borrar conexiones, de modo que el grafo no será nunca el mismo. Se trata, simplemente, de la más pequeña de las aberraciones posibles.



Desde la década de los sesenta, la matemática chilena comenzó un desarrollo sostenible tanto en Santiago como en regiones. Se implementaron diversas iniciativas en distintas instituciones —entre las que destaca el mítico programa de Licenciatura Académica en Matemática (LAM) de la Universidad Técnica del Estado (actual Universidad de Santiago de Chile)—, que han derivado en la formación sistemática de generaciones de matemáticos. Es así como, en 1975, nació la Sociedad de Matemática de Chile (Somachi), una instancia aglutinadora de la matemática chilena y que la representa ante la Unión Matemática Internacional.

Hoy en día nuestro país está a la vanguardia en el área dentro de Latinoamérica, en conjunto con Argentina y México, ligeramente detrás de Brasil, aunque con una producción per cápita mayor (vea «Chile es el país que más estudios de matemática per cápita hace en Latinoamérica» el 14 de agosto de 2014 en: [www.latercera.com](http://www.latercera.com)). La mayoría de las universidades de nivel realiza investigación de punta en el área, y se producen artículos que van a parar a las revistas más prestigiosas del mundo (mención especial merece la tesis de Héctor Pastén, quien se doctoró con apenas veintidos años en la Universidad de Concepción, y cuyo trabajo fue publicado en *Inventiones Mathematicae*, una de las cinco revistas más importantes de la matemática en la actualidad). Además, en el seno de la Universidad de Chile se creó el Centro de Modelamiento Matemático (CMM), institución cuya misión es «crear nuevas matemáticas y usarlas para resolver problemas provenientes de otras ciencias, la industria y las políticas públicas» y que está asociada al Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia. Ha sido tal el desarrollo que, para el Congreso Internacional de Matemáticos de 2014 en Seúl, la Unión Matemática Internacional convocó a la directiva de la Somachi a presentar los avances chilenos, como ejemplo para otros países en desarrollo. El video de la presentación, que narra hitos de nuestra historia matemática, presenta datos de actualidad y se ameniza con entrevistas breves, está disponible en YouTube: «Historia de la matemática en Chile».

No debemos, sin embargo, detenernos en esta senda. Muy por el contrario, nuestra matemática, y nuestra ciencia en general, necesita de un nuevo impulso que nos posicione definitivamente como actores relevantes a nivel mundial. Para ello tenemos que aumentar drásticamente el financiamiento que le otorgamos, pues «la ciencia no es un lujo, sino un objeto de primera necesidad». Además, tal como señala certeramente el matemático Alejandro Maass (galardonado con el premio de la Unión Matemática de América Latina y El Caribe en 2009), «debemos multiplicar la masa crítica para desarrollar la ciencia que necesitamos». En efecto, un universo de alrededor de doscientos cincuenta investigadores activos en matemática no es suficiente para competir internacionalmente. Pero, por sobre todas las cosas, debemos propiciar el desarrollo armónico de nuestra ciencia con la sociedad, promoviendo instancias masivas y transversales de colaboración dentro y fuera de la comunidad, como la construcción de un centro de convenciones científicas o la organización sistemática de actividades de divulgación.

No podemos permitir que la historia de Picarte se repita, o que la semilla dejada por Frucht y tantos otros deje de florecer. Así, cualquier niña o niño que sueñe con un futuro ligado a la ciencia podrá tener la certeza de que, en nuestro país, ese sueño es posible.

## UN PROBLEMA EN DOS DIMENSIONES EN BUSCA DE UN FINAL FELIZ





La matemática es una ciencia en que se trabaja rigurosamente en busca de la perfección absoluta, tratando de no dejar espacio alguno para el error. Sin embargo, al igual que cualquier otra actividad humana —ya sea personal o colectiva—, está sujeta a nuestros propios vaivenes. Es así como a lo largo de la historia se han cometido equivocaciones que, reproducidas por generaciones, han tenido en ascuas a quienes las han revelado. Uno de estos magnos errores, de desenlace aún en parte inconcluso, tuvo lugar durante varias décadas del siglo pasado.

La gran mayoría de los fenómenos físicos, biológicos, sociales y económicos se modelan matemáticamente mediante las temidas ecuaciones diferenciales. Si usted no sabe de qué se tratan no importa: de todas maneras, hoy sabemos que en su gran mayoría no pueden ser resueltas como esperaríamos, es decir, encontrando la fórmula de la solución a partir de la fórmula de la ecuación. Pero esto no nos intimida: pese a no ser posible resolverlas, sabemos que una solución existe, y de todas formas queremos «aproximarla» o al menos «predecir» algunas de sus propiedades más importantes. Para ilustrar la relevancia de este proceso, basta mencionar que el informe meteorológico que a usted le ayuda a escoger tranquilamente su vestimenta cada día es elaborado aproximando la solución de (una variación de) la famosa ecuación de Navier-Stokes (y otras afines), la cual está lejos de ser completamente dominada por la ciencia y es materia de intenso estudio y controversia.

¿Pero qué es, exactamente, una ecuación diferencial? Aunque las hay de diversos tipos, las que nos conciernen para esta historia tienen lugar en el plano bidimensional y pueden ser fácilmente ilustradas con un dibujo de niños. En efecto, imagine que en cada punto de un plano usted dibuja una flecha que varía suavemente de punto a punto tanto en tamaño como en dirección. Pues bien, esta distribución geométrica «es» una ecuación diferencial, y resolverla no es más que encontrar curvas que sigan tangencialmente las direcciones de estas flechas, de modo que una partícula se mueva a lo largo de ellas a una velocidad variable dependiendo de la longitud de las flechas. Así, un punto en que la flecha desaparece se entiende como un punto estacionario, en el cual la partícula permanece inmóvil.

Una vez «resuelta» la ecuación de esta manera pictórica, nos podemos preguntar qué sucede con las curvas halladas: ¿se alejan más y más, o quedan rondando en espiral dentro de alguna región? La ocurrencia de este último fenómeno tiene interpretaciones relevantes de acuerdo con el ámbito de estudio. De ahí que el borde de cada región de vorticidad merezca un nombre especial: ciclo límite. En la ilustración a continuación se aprecia uno de estos ciclos, pero perfectamente pueden aparecer varios en distintas partes del plano.



A la izquierda: un ciclo límite. A la derecha: portada del texto recopilatorio de «los problemas de Hilbert».


El problema número 16 de la lista de los veintitrés problemas que según David Hilbert guiarían la matemática del siglo XX (capítulo 6) trataba sobre estos ciclos: si suponemos que la distribución de flechas viene dada por fórmulas polinomiales, ¿pueden aparecer infinitos ciclos límite? Este importante problema fue «resuelto» negativamente en 1923 por Henri Dulac en un largo trabajo, el cual fue «extendido» en 1957 en otro vasto trabajo por Ivan Petrovsky y Yevgueni Landis, quienes lograron establecer el número máximo de ciclos que podía aparecer de acuerdo con ciertas características de la ecuación.

No obstante, durante los años setenta, muchos matemáticos de todas partes del mundo comenzaron a cuestionar los trabajos de Dulac y Petrovski-Landis. No solo se dieron cuenta de que, en realidad, nadie los había leído en detalle, sino que rápidamente pusieron en evidencia graves errores de argumentación. Una estocada certera vino entonces desde China: en 1979-1980, Lan-Sun Chen y Ming Shu Wang e, independientemente, Song Ling Shi, exhibieron ecuaciones que contradecían la predicción de Petrovski-Landis. Tras ochenta años de trabajo y certezas, todo parecía volver a fojas cero.

Eran momentos de angustia, pero una luz de esperanza surgió en Chile. En 1984, mientras las canciones de Los Prisioneros comenzaban a sonar una y otra vez en las radios locales, Rodrigo Bamón (por entonces en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil) volvió a las raíces del problema lidiando humildemente con distribuciones cuadráticas, es decir, aquellas en que los polinomios involucrados tienen grado a lo más 2. Mezclando conocimientos y conceptos profundos con una portentosa astucia felina —es decir, trabajando como toda persona de ciencia idealmente debiese hacerlo—, logró probar (¡esta vez de manera concisa y correcta!) que el número de ciclos límite debe ser finito en tal caso. Este hallazgo allanó el camino para que, años más tarde (1991), Jean Écalle e, independientemente, Juli Ilyashenko, resolvieran el problema general de la finitud de ciclos límite para distribuciones polinomiales, reivindicando así, aunque solo parcialmente, a Dulac. El número máximo de ciclos que pueden aparecer sigue, sin embargo, siendo un misterio.

A pesar de que los trabajos de Ilyashenko y Écalle son extensos y complejos, la comunidad concuerda en que ambos son correctos. Pero, a la luz de la historia, las dudas son perfectamente lícitas. A final de cuentas, en su debido momento, los trabajos de Dulac y de Petrovski-Landis también habían sido validados y transparentemente publicados en prestigiosas revistas especializadas. ¿Qué significa, entonces, que un trabajo sea correcto? ¿Significa que no hay errores lógicos en su formulación y articulación, sin importar que esto lo haga comprensible apenas para un pequeño grupo de científicos (a veces, tan solo para el autor)? ¿Hasta qué punto un trabajo así es un aporte genuino al conocimiento? Y finalmente, ¿puede un trabajo de este tipo realmente asegurarnos que algo es válido? Personalmente creo que sí, mientras nadie demuestre lo contrario...

## EL FESTIVAL DEL CAOS DE OLMUÉ



En septiembre de 2015 se realizó en Olmué el congreso «Global Dynamics Beyond Uniform Hyperbolicity», una de las conferencias más importantes a nivel mundial en «teoría del caos», cuyas versiones anteriores habían tenido lugar en Estados Unidos, Brasil, China, Francia y Polonia. Este encuentro congregó a más de cien académicos venidos desde todas las regiones del mundo.

¿Pero qué es, exactamente, la teoría del caos? No es sencillo responder a esta pregunta, en parte debido a que ni siquiera los especialistas de las distintas ramas científicas han convenido en una definición precisa. Sin embargo, hay un elemento común para todas las visiones. La ciencia moderna, en general, debe su éxito a su capacidad de, a partir de mediciones iniciales, predecir fenómenos mediante la implementación de modelos matemáticos. Por ejemplo, dadas la posición y la velocidad iniciales de una carga lanzada desde un avión, se puede prever dónde caerá; y si los datos iniciales están ligeramente errados, la carga caerá en un punto muy cercano a aquel inicialmente previsto. Por el contrario, los sistemas caóticos son aquellos que, pese a contar con un modelo teórico perfectamente estructurado y aparentemente muy simple, se resisten a estas predicciones debido a que son demasiado sensibles a las condiciones iniciales: una pequeña modificación al principio del proceso puede desencadenar comportamientos completamente diferentes. Tal es el caso del sistema mecánico conocido como «péndulo doble», que consiste simplemente en un péndulo que cuelga del extremo de otro. Si bien su movimiento obedece a leyes perfectamente gobernadas por ecuaciones relativamente sencillas, es totalmente impredecible (vea en YouTube el video «Péndulo doble»). Algo similar ocurre también con el curso de las condiciones meteorológicas, las fluctuaciones de las poblaciones biológicas, el movimiento de los cuerpos de un sistema planetario o las oscilaciones de la bolsa, razón que hace tan complejo su estudio.

El fenómeno anterior ha sido popularizado como «efecto mariposa», según el cual el simple aleteo de un insecto podría desencadenar, en un tiempo posterior, una tormenta a miles de kilómetros de distancia. Ciertamente, se trata de una exageración de la idea, que no deja de tener, sin embargo, cierto asidero. Además, su nombre está inspirado en un hecho matemático concreto. En 1963, el meteorólogo Edward Lorenz obtuvo un modelo climatológico (basado en las ecuaciones de Navier-Stokes) consistente en tres ecuaciones diferenciales acopladas (capítulo 16). Vistas como sistema, dichas ecuaciones tienen una realización geométrica en el espacio tridimensional. Allí, las curvas de las soluciones se organizan de una forma complicadísima, lo que genera un objeto que pareciera estar conformado por las dos alas de una mariposa, tal como aparece ilustrado al inicio de este capítulo.

En fin, si usted quiere tener un acercamiento más serio al concepto, un documento extraordinariamente útil es la película *Chaos*, de Aurélien Alvarez, Étienne Ghys y Jos Leys, disponible gratuitamente en castellano en [www.chaos-math.org/es](http://www.chaos-math.org/es).

Desde el punto de vista matemático, la rama que se ocupa del estudio del caos es la de los sistemas dinámicos, cuyo origen histórico preciso puede situarse en los trabajos de Henri Poincaré, a fines del siglo XIX. Ahora bien, como la mayoría de las teorías científicas, estuvo precedida de ideas que ya circulaban en la élite cultural. Por ejemplo, en su cuento *El misterio de Marie Rogêt*, Edgar Allan Poe escribía de manera asombrosamente visionaria lo siguiente: «Así pues, respecto a las dos vertientes de suposiciones, debe ser considerado que la más insignificante variación en los hechos de los dos casos puede dar cabida a los más importantes errores al gravemente desviar los dos cursos de eventos; así como en aritmética, un error que por sí solo puede ser despreciado, produce, por fuerza de multiplicarse, un resultado que dista enormemente de la verdad».

Frente a tanta complejidad e incerteza, el trabajo matemático consiste en la tarea aparentemente paradojal de comprender las «leyes que originan el caos», abandonando, por cierto, la vieja aspiración de gobernarlo. Es por ello que, en general, la comunidad matemática internacional se resiste un poco a usar el término «caos». A fin de cuentas, en muchos momentos de la historia el ser humano se ha visto enfrentado a nuevos problemas surgidos de contextos que, en un principio, parecían caóticos, pero que, mediante un estudio profundo, han derivado en teorías que han facilitado su comprensión. En este sentido, no deja de ser visionaria la frase de otro poeta, el franco-uruguayo Lautréamont, quien, en sus *Cantos de Maldoror* escribía a propósito de las matemáticas: «El todopoderoso se ha revelado, con todos sus atributos, en ese trabajo memorable que consiste en hacer nacer, desde las entrañas del caos, esos tesoros de teoremas y sus magníficos esplendores».

Ciertamente, algo de este esplendor se respiró en los primaverales días del 2015 de la conferencia en Olmué.

## Apéndice: sobre las conferencias y otras peculiaridades matemáticas

La matemática es especial en muchos aspectos. Como no se trata de una ciencia experimental, su desarrollo (al menos en lo referente a las áreas más teóricas) no requiere de grandes instrumentos de laboratorio. Una excepción la constituye la necesaria inversión en equipos computacionales de alta capacidad, cuyo uso ha invadido incluso las ramas que podrían ser calificadas como más «puras» (capítulo 32). No obstante, la mayoría de las simulaciones y experimentos computacionales en la matemática de hoy pueden ser realizados con una máquina no muy sofisticada.

Pero entonces, ¿en qué aspectos es necesario concentrar recursos para el desarrollo de esta ciencia? Una respuesta a esta pregunta se impone inmediatamente: las conferencias (además de seminarios especializados y escuelas temáticas) no son solo necesarias, sino imprescindibles para su progreso. Es en este tipo de instancias donde los especialistas de las distintas ramas exponen sus últimos resultados y comparten estrategias y puntos de vista, lo cual desemboca a menudo en trabajos colaborativos. Además, es allí donde los estudiantes se arman de conocimientos de vanguardia y germinan sus primeras ideas, que a menudo son las que marcan toda la carrera científica.

Antiguamente, la mayoría de los trabajos en matemática se hacía en solitario, y eran rarísimos los resultados clásicos de esta ciencia de autoría compartida. Hoy en día, esta situación se ha modificado enormemente, y no es extraño hallar, por ejemplo, artículos con más de tres autores de distintas partes del mundo (algo prácticamente impensable hace un siglo). Ciertamente, las conferencias han potenciado esta colaboración vertiginosa, la cual se ha visto facilitada en los últimos años con el uso de Skype y otras tecnologías de comunicación. Aun así, la matemática mantiene reglas deontológicas particulares: no existe el concepto de «primer» y «segundo autor» de un artículo, y el hecho de ser el «autor correspondiente» (es decir, aquel que gestiona el contacto con la revista especializada) no revela absolutamente nada especial sobre el rol de la persona en cuestión en el trabajo. Es más, salvo rarísimas excepciones, el orden de los autores es siempre alfabético.

Otro aspecto muy valioso para el flujo de las ideas es el hecho de que un altísimo porcentaje de matemáticos cumple con el noble mandato de poner a disposición sus trabajos de manera gratuita —previo a la publicación— ya sea en sus propias páginas de internet o en el repositorio mundial [www.arxiv.org](http://www.arxiv.org). Por lo demás, la ciencia en que se produce —y, por consiguiente, se cita— la menor cantidad de artículos por investigador es la matemática. Para constatar esto, basta visitar el sitio <https://scholar.google.com>, donde queda consignado que, entre las cien revistas científicas de mayor índice de impacto, ninguna se concentra en la matemática. Obviamente, esto no significa que en esta disciplina se trabaje menos; simplemente, es una consecuencia de la tradición de una comunidad científica que tiende a priorizar la calidad por sobre la cantidad en la producción. Es así como, por ejemplo, el año 2002 le fue atribuida una Medalla Fields al francés Laurent Lafforgue, pese a que hasta esa fecha apenas acumulaba cinco artículos de investigación y cuatro notas de anuncio de trabajos en curso (capítulo 19).

Un último aspecto que ha irrumpido con fuerza en los últimos años, y que sin duda alguna modificará profundamente el sistema de publicación y difusión matemática en el corto plazo, tiene relación con la posibilidad de filmar charlas y hacer videos explicativos masivos. Ha sido tal el impacto de los medios audiovisuales que la mayoría de los grandes centros de investigación en el área ya dispone de canales de YouTube para tornar accesible este tipo de material a todo el mundo. De este modo, hoy en día es posible revisar el contenido expuesto en muchas conferencias apenas unos días después de realizadas, y a veces incluso seguir las *online*. Pero a pesar de este avance, nada aún ha podido (y, muy probablemente, nada podrá) reemplazar la posibilidad de dialogar *in situ* con colegas investigadores, por ejemplo, entre dos charlas de una conferencia, degustando una sagrada taza de café.

Conferencias, seminarios, escuelas temáticas, estadías de trabajo en colaboración. Es tanta la relevancia de este tipo de encuentros que la mayoría de los países de vanguardia en matemática mantiene centros especialmente abocados a su organización y permanente gestión, los cuales suelen estar abiertos a toda la comunidad internacional. Por solo dar algunos ejemplos emblemáticos, podemos citar el Instituto Henri Poincaré en París (Francia), el Instituto Mittag-Leffler en Estocolmo (Suecia), el

Instituto Max Planck en Bonn (Alemania), el Instituto de Investigación en Ciencias Matemáticas en Berkeley (Estados Unidos) y la Estación Internacional de Investigación de Banff (Canadá). Recientemente, esta última institución ha abierto una antena en México, la Casa Matemática de Oaxaca, con lo que selló un acuerdo que representa un extraordinario avance para el país latinoamericano del norte.

Lamentablemente, nuestro país no solo no dispone de una instancia específica de este tipo, sino tampoco de un centro de convenciones científicas. Pese a esto, son cada vez más numerosas las conferencias de relevancia mundial que se organizan en Chile. En este sentido, un hito extraordinariamente relevante (y que, lamentablemente, no tuvo mayor repercusión en los medios de prensa) fue la realización en agosto de 2015 en Santiago del Congreso Internacional de Física Matemática, el encuentro más importante a nivel mundial del área, que se efectúa cada tres años de manera itinerante en distintos países del mundo. Sin duda alguna, este evento constituyó un paso importante en la tarea de hacer que «nuestro país sea conocido por la calidad de su investigación científica», tal como expresara el encargado de la organización, Rafael Benguria (Premio Nacional de Ciencias Exactas 2005).

Y es que en matemática (así como en ciencia en general), las conferencias no son un lujo, sino una primera necesidad.


## PIXAR Y LOS FRACTALES: OTRO ÓSCAR PARA LA MATEMÁTICA



Muy pocos quedaron indiferentes ante la entrega de los premios Óscar de 2016. Y es que en un país tan sediento de triunfos como el nuestro, el galardón otorgado a *Historia de un oso* será, sin duda alguna, uno de esos escasos trofeos que orgulloosamente atesoraremos en nuestra vitrina nacional. Sin embargo, y como era previsible, no faltaron quienes en foros de discusión y redes sociales tendieron a minimizar el premio, llegando incluso a insinuar una supuesta «politización del jurado». Evidentemente, no tiene sentido alguno detenerse en este tipo de comentarios habituales de quienes sienten nostalgia por una época oscura. Hubo, sin embargo, otro tipo de comentarios —no virulentos, pero sí un poco desmesurados — que merecen reflexión: en este breve episodio de fiebre chovinista a la chilena, se acentuó el logro mencionando que se había derrotado a un «gigante como Pixar», que postulaba en la misma categoría con el cortometraje *Sanjay's Super Team*. Frente a esto, resulta sano señalar que este coloso de la animación, que hoy es propiedad de Disney, fue en sus inicios una modesta empresa que triunfó en una lucha desigual frente a otros monstruos. Claro está, la razón de su éxito es múltiple, pero a él subyace una brillante idea de raíz matemática: el uso de los fractales en computación gráfica.

La historia de Pixar aparece muy bien descrita en su sitio de Wikipedia. Allí se puede constatar, por ejemplo, que sus orígenes vienen de una empresa de computación orientada a la creación de programas de animación gráfica. La bitácora completa es larga e intrincada, e incluye relaciones con George Lucas, Steve Jobs y finalmente Disney. A lo largo de ella hay, sin embargo, un hito decisivo. Hacia fines de los años setenta, cuando el desarrollo de los algoritmos de animación computacional era aún muy precario, Loren Carpenter, funcionario de Boeing que había realizado estudios de posgrado tanto en matemática como en computación en la Universidad de Washington, trabajaba afanosamente en mejorar estos procesos. Llegó entonces a sus manos un libro del célebre promotor y divulgador de los fractales, Benoît Mandelbrot. Maravillado al descubrir una teoría tan sencilla como profunda y de tanto potencial, Carpenter se preguntó si estas ideas podían ser aplicadas en su propio trabajo. Tras una iluminadora reflexión, modificó sus programas computacionales y produjo una primera animación, *Vuelo libre* («Vol libre» en Vimeo). Si bien se trata de una cinta de solo un par de minutos de duración y que hoy puede parecernos básica e incluso tosca, lo cierto es que para la época era una auténtica revolución, tanto así que fue aclamada con una ovación en las primeras conferencias en las que fue presentada. De esta forma nació Pixar, con Carpenter como uno de sus socios fundadores y director científico. Desde ese momento, la historia de la animación 3D cambió para siempre.

Seguramente usted se ha topado más de una vez con una imagen fractal. Muy conocida es aquella del «conjunto de Mandelbrot», llamado así en honor al célebre matemático de origen polaco, que de hecho fue quien acuñó el vocablo «fractal» (aunque, dicho sea de paso, este conjunto había sido previamente descubierto por Robert Brooks y Peter Matelski).



A la izquierda: el primer dibujo del conjunto, obra de Brooks y Matelski, realizada con los recursos computacionales de la época (1978). A la derecha: el conjunto tal como se comenzó a popularizar a partir de mediados de la década de los ochenta.

Quizás el primer fractal de la historia de la matemática se remonte a fines del siglo XIX. Corresponde a una creación del revolucionario Georg Cantor, aquel que reveló a la humanidad la existencia de distintos niveles de infinito (capítulo 22). La construcción de Cantor es muy sencilla: del intervalo  $[0,1]$  retire el tercio central (sin sacar los puntos del borde), obteniendo dos intervalos de longitud  $1/3$ , a saber,  $[0,1/3]$  y  $[2/3,1]$ . De cada uno de estos retire el tercio central, obteniendo ahora cuatro intervalos de longitud  $1/9$ . Continúe con el proceso infinitamente. Al final, obtendrá un conjunto muy extraño de puntos que, en cierta manera, es pequeño, pues no incluye ningún intervalo, pero, al mismo tiempo es inmenso y de una rica complejidad (en la teoría de Cantor, es igual de infinito que toda la recta numérica). A continuación se reproducen los cuatro primeros pasos del proceso (obviamente, resulta imposible reproducirlos todos).



Esta construcción nos da una intuición de qué son los fractales: objetos geométricos obtenidos por infinitas repeticiones de un mismo proceso, en los cuales la complejidad de una porción (por muy pequeña que esta sea) es igual a la del todo, pues es una copia de una parte relevante de este. En el conjunto de Cantor y otros de naturaleza similar (como la «curva de Koch» y el «triángulo de Sierpiński», representados más adelante; vea también «Processing : Koch Curve - Fractal Animation» y «Fractal Zoom Sierpinski Gasket» en YouTube), estas copias corresponden a versiones «homotéticas», es decir, reproducciones similares pero de distinto tamaño de toda la figura o una parte de ella. Para el conjunto de Mandelbrot, las copias son un poco más intrincadas, pero el principio de «autosimilaridad» que opera es nuevamente el mismo (vea «Mandelbrot Set Zoom» en YouTube).

El estudio de los fractales se vincula con varias vertientes de la matemática, y son enormemente gravitantes sus relaciones con los sistemas dinámicos (la «teoría del caos»). En esta rama moderna de la matemática, de gran desarrollo en nuestro país (capítulo 17), se estudian justamente procesos —muchas veces derivados de la física, pero también de la geometría, como ocurre con los fractales— en los que una misma ley opera indefinidamente, de modo que es sumamente difícil (y a menudo imposible) predecir el resultado final aunque se cuente con todos los datos. No es de extrañar, entonces, que los fractales exhiban a veces un gran nivel de complejidad.





El Ying y el Yang en modelo fractal.

Los fractales tienen también numerosas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, son usados en la fabricación de ciertas placas de calor para cocinas (pues permite optimizar la difusión del calor) y en la de paneles aislantes de ruido para carreteras (en los que las ondas sonoras quedan «vagando perpetuamente»). Sin embargo, en las aplicaciones, muchas veces los procesos no son repetidos indefinidamente, sino un número finito pero elevado de veces, de modo de asegurar el comportamiento deseado. Un ejemplo es el sistema usado para los cables de acero, cuyos precedentes más ancestrales se remontan a las cuerdas que sostenían los puentes colgantes incaicos, tal como señala Garcilaso de la Vega en sus escritos del siglo XVI. La idea es sumamente sencilla: las hebras iniciales se acoplan unas con otras, con un leve giro, para así formar hebras de mayor grosor. Con estas nuevas hebras se procede una vez más a acoplarlas con un leve giro a fin de formar hebras aún mayores. El proceso se repite las veces que sea necesario de acuerdo con el peso que se quiere sostener, como se aprecia en la siguiente imagen.



Por cierto, los fractales fueron desarrollados también por otras culturas ancestrales, especialmente en África. En efecto, en numerosas regiones subsaharianas de este continente es posible hallar asentamientos cuya construcción sigue un patrón repetitivo. Tal vez el más famoso sea Ba-ila, en el sur de Zambia, cuya fotografía (de una época anterior a 1944) y su modelo fractal teórico aparecen a continuación. Lamentablemente, estos sitios fueron tratados con total indiferencia por las tropas colonialistas, quizás porque estos «no se ciñen a la tipología cartesiana» en la que dominan las calles rectas con intersecciones en ángulos de 90°, típicas de las ciudades occidentales. Así, la relevancia de su geometría ha sido puesta en evidencia solo en los años recientes. Sin embargo, esto no ha logrado contrarrestar el enorme deterioro ya sufrido por la mayoría de ellos.



Los fractales no solo aparecen como una creación humana, sino que están también muy presentes en la naturaleza. Basta observar las ramificaciones de muchas especies de árboles para notar una tendencia fractal en su desarrollo. Nuevamente, aquí tienden a operar procesos en finitos niveles, y no los procesos de infinitos pasos idealizados por la matemática.




Es esta idea de «fractalización», pero solo con finitas repeticiones de un mismo proceso, la que es utilizada en las animaciones de Pixar. En lugar de describir completamente un paisaje o figura mediante indicaciones precisas, se busca producir un programa que, repitiendo varias veces unas pocas instrucciones, genere una imagen de apariencia muy similar a la que se pretende recrear. Así, no es de extrañar que en la primera animación de Carpenter los contornos sean muy parecidos a los de los fractales exhibidos más arriba. Obviamente, la técnica ha sido mejorada con el curso de los años, pero la idea base sigue siendo siempre la misma. Su debut en el cine se produjo con la película *Star Trek II: La ira de Khan* (disponible en YouTube), en la cual se usó un programa elaborado por Carpenter en colaboración con Robert Cook, denominado REYES («Renders Everything You Ever Saw»).

Desde su creación hasta 2016, Pixar acumuló nada menos que diecisésis premios Óscar. La lista empieza con la recordada *Toy Story*, que es la primera película animada totalmente digital de la historia. De hecho, hay quienes ven en la famosa frase: «¡Al infinito y más allá!», una alegoría a la matemática, específicamente al trabajo de Cantor. En la misma ceremonia de 2016 le fue otorgado un nuevo Óscar por la película *Inside Out* (presentada en Hispanoamérica con el nombre de *Intensa-Mente*). Ciertamente, la historia de este gigante es una muestra ejemplar de una feliz cadena de innovación. Por un lado, la comunidad académica produce conocimiento de vanguardia, el cual es transmitido por divulgadores científicos y recogido por especialistas con miras a aplicaciones prácticas más inmediatas, todo esto amparado por emprendedores dispuestos a invertir en el recurso más valioso con que cuenta una nación: las ideas y el talento de sus ciudadanos.

Es de esperar ahora que, de la misma forma que Carpenter, los realizadores de la *Historia de un oso* reciban en Chile todo el apoyo y financiamiento que merece su enorme creatividad. Tal vez este sería un premio incluso mayor que el trofeo logrado. Aunque, por cierto, tal como señalara Gabriel Osorio en su breve discurso ante la academia de Hollywood, la mejor recompensa sería sin duda alguna que las circunstancias que inspiraron su historia no se produzcan nunca más en nuestro país.

## FERMAT, WILES Y EL NOBEL DE LA MATEMÁTICA



Probablemente usted se habrá preguntado alguna vez si existe un Premio Nobel de Matemática. Y si sabe de su inexistencia, tal vez haya llegado a sus oídos un viejo mito muy difundido según el cual dicho premio no fue instituido por Alfred Nobel en represalia porque su pareja habría tenido un amorío con un matemático. Lo cierto es que la razón es mucho más sencilla: en materias científicas se tiende a dar prioridad a áreas del conocimiento y trabajos de índole más aplicada. Esto explica no solo el hecho de que la matemática no sea considerada, sino también el que célebres físicos teóricos como Stephen Hawking y Roger Penrose no hayan sido galardonados con un Premio Nobel, o que a Albert Einstein se le haya adjudicado en virtud de su explicación del efecto fotoeléctrico, y no por la teoría de la relatividad. Aun así, dos matemáticos se las arreglaron para ganar el Premio Nobel de Literatura: el catedrático español José Echegaray en 1904, y el activista político, filósofo y lógico inglés Bertrand Russell en 1950. A ellos deben añadirse dos matemáticos que obtuvieron un premio muy similar a un Nobel: John Nash y Leonid Kantorovich, ambos laureados con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en honor a Alfred Nobel (erróneamente conocido como el Premio Nobel de Economía). Al primero le fue conferido en virtud de su «teoría de juegos», muy bien sintetizada en la escena del bar de la famosa (aunque un poco caricaturesca) película *Una mente brillante*; al segundo, por su «teoría de la colocación óptimal de productos» (apéndice del capítulo 22). A lo anterior debe agregarse además el que varios de los premiados en física puedan ser también considerados matemáticos, comenzando por el mismísimo Einstein, que contrariamente a la caricatura que suele hacerse de él, era un eximio practicante de esta ciencia, aunque en un escalafón menor al de Henri Poincaré, David Hilbert o Emmy Noether, quienes dominaban la matemática en su época.

No fue sino hasta la década de 1930 que el canadiense John Fields vino a reemplazar al Nobel en el ámbito de la matemática y estableció un premio especial para esta ciencia, la Medalla Fields. Las reglas de este premio son, sin embargo, muy diferentes: se otorgan a lo más cuatro medallas una vez cada cuatro años, con ocasión del Congreso Internacional de Matemáticos organizado por la Unión Matemática Internacional (IMU); además, los laureados no deben superar los cuarenta años al año del congreso.

La Medalla Fields se entrega desde el año 1936 y, como era de esperar, no ha estado exenta de polémica. La más connotada fue sin duda alguna la de 2006, cuando el ruso Gregori Perelman rechazó no solo el premio, sino también el millón de dólares que se había ofrecido a quien resolviera el problema que le valió la presea: la conjectura de Poincaré (capítulo 14). Al margen de esto, una crítica permanente que se hace a la Medalla Fields es el límite tan bajo de edad. Para algunos, este inhibe el desarrollo de investigación de largo plazo. Para otros, pone en clara desventaja a las mujeres, pues el corto período de productividad considerado incluye su edad fértil. No es de extrañar entonces que entre los cincuenta y seis ganadores a la fecha, solo se cuente una mujer, la iraní Maryam Mirzakhani, a quien se le otorgó la medalla en 2014.



Maryam Mirzakhani (a la derecha) recibiendo la Medalla Fields de manos de Park Geun-Hye, presidenta de Corea del Sur, en el Congreso Internacional de Matemáticos realizado en 2014 en dicho país. Lamentablemente, Maryam falleció en julio de 2017 (a la edad de 40 años) víctima de un cáncer que venía arrastrando desde un largo tiempo, el cual le había impedido incluso dictar la conferencia plenaria que le había sido asignada en aquel congreso.

Así, una nueva distinción —esta vez sin restricción de edad— apareció en escena en 2003. Se trata del Premio Abel, otorgado por el rey de Noruega y llamado de esta manera en honor al célebre matemático de dicho país, Niels Abel, quien en su corta vida (1802-1829) logró probar la inexistencia de una fórmula general para resolver ecuaciones polinomiales de grado cinco o mayor. El premio se entrega una vez al año, en principio a una sola persona, aunque en algunos casos ha sido compartido. El año 2015 uno de los ganadores fue John Nash por sus trabajos en ecuaciones diferenciales parciales, muy distintos de sus trabajos en teoría de juegos que le habían valido el «Premio Nobel de Economía». Trágicamente, tras volver de la ceremonia de entrega del premio en Oslo, Nash sufrió un accidente automovilístico en el trayecto en taxi desde el aeropuerto, producto del cual falleció junto a su esposa: ambos habían olvidado abrocharse el cinturón de seguridad (el conductor salvó ilesos).

El Premio Abel 2016 recayó con muy justa razón en Andrew Wiles, quien en los años noventa fue un ícono de la matemática por haber resuelto uno de los problemas más famosos de esta ciencia: la conjectura de Fermat. Como muchas historias en matemática, esta nace en tiempos antiguos, cuando el sabio Diofante de Alejandría escribió una obra fundamental, llamada *Arithmetica*. En honor a él fueron bautizadas las así llamadas ecuaciones diofantinas, en las cuales, habiendo varias incógnitas, se buscan solamente soluciones que sean números enteros.

Una de las ecuaciones más señeras de este tipo es la pitagórica, en la que se buscan números naturales que satisfagan la misma relación que, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, cumplen las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo:

$$x^2 + y^2 = z^2$$

Por ejemplo, la famosa combinación  $x = 3, y = 4, z = 5$  cumple esta relación, pues

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$$

Lo mismo sucede para  $x = 5, y = 12, z = 13$ :

$$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$$

De hecho, es relativamente fácil encontrar una fórmula para todas las combinaciones posibles, las que por cierto son infinitas. A continuación se exhibe la lista de todas aquellas en que los números que aparecen no superan a 500 y que son «primitivas» (es decir, no se obtienen multiplicando cada entrada de otra terna por el mismo número, como sucede, por ejemplo, con  $x = 6, y = 8, z = 10$ , que se obtiene multiplicando por 2 cada miembro de la terna  $x = 3, y = 4, z = 5$ ):

3	4	5	19	180	181	180	299	349
5	12	13	57	176	185	225	272	353
8	15	17	104	153	185	27	364	365
7	24	25	95	168	193	76	357	365
20	21	29	28	195	197	252	275	373
12	35	37	84	187	205	135	352	377
9	40	41	133	156	205	152	345	377
28	45	53	21	220	221	189	340	389
11	60	61	140	171	221	228	325	397
16	63	65	60	221	229	40	399	401
33	56	65	105	208	233	120	391	409
48	55	73	120	209	241	29	420	421
13	84	85	32	255	257	87	416	425
36	77	85	23	264	265	297	304	425
39	80	89	96	247	265	145	408	433
65	72	97	69	260	269	84	437	445
20	99	101	115	252	277	203	396	445
60	91	109	160	231	281	280	351	449
15	112	113	161	240	289	168	425	457
44	117	125	68	285	293	261	380	461
88	105	137	136	273	305	31	480	481
17	144	145	207	224	305	319	360	481
24	143	145	25	312	313	44	483	485
51	140	149	75	308	317	93	476	485
85	132	157	36	323	325	132	475	493
119	120	169	204	253	325	155	468	493
52	165	173	175	288	337			

La «fórmula general» para las ternas pitagóricas es la siguiente:

$$x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn, \quad z = m^2 + n^2,$$

donde  $m$  y  $n$  son números naturales y  $m > n$ . Por ejemplo, para  $m = 2, n = 1$ , se obtiene  $x = 3, y = 4, z = 5$ , mientras que de la pareja  $m = 3, n = 2$  surge la terna  $x = 5, y = 12, z = 13$ .

¿Qué sucede si, en la ecuación anterior, cambiamos el exponente 2 por uno mayor? Allá por el año 1637, Pierre de Fermat escribió en el margen de una hoja de su copia de *Arithmetica* que tal situación no puede ocurrir. En otras palabras, si  $n > 2$ , entonces no hay números naturales  $x, y, z$ , que satisfagan  $x^n + y^n = z^n$ .

Él afirmaba haber dado con una prueba sencilla de esto, la cual lamentablemente no cabía en el espacio que tenía en su libro. Lo cierto es que, muy probablemente, nunca tuvo dicha demostración, o al menos su argumento era incorrecto. En efecto, tras esfuerzos de muchas generaciones de matemáticos, entre quienes destaca en particular la francesa Sophie Germain (capítulo 21), la primera prueba fue dada por Wiles recién en 1993, es decir, trescientos cincuenta y seis años después.




Imagen relativa al teorema de Fermat, realizada por el destacado artista chileno Fernando Krahn (1935-2010), quien solía colaborar ilustrando artículos de divulgación científica —entre otros medios— para *The New Yorker*, *Esquire* y *The Atlantic Monthly* en Estados Unidos, *La Vanguardia*, *El País* y *Muy Interesante* en España, y *De Telegraaph* en Holanda.

En estricto rigor, su prueba data de 1994. Y es que tras el anuncio al cabo de tres míticas conferencias en Cambridge, los especialistas del tema detectaron inmediatamente un punto conflictivo que tardó un año en reparar, para lo cual trabajó con su antiguo estudiante Richard Taylor. En todo caso, no era de extrañar que se presentara algún inconveniente, pues se trata de un trabajo largo y extraordinariamente complejo, en el cual Wiles resuelve otra conjetura de apariencia muy diferente, formulada por los japoneses Yukata Taniyama y Gorō Shimura, y que no solo implica la validez del enunciado de Fermat, sino que tiene consecuencias muy importantes más allá de este. Sin duda alguna, se trata de una saga apasionante, que fue brillantemente narrada por Simon Singh en *El último teorema de Fermat*, uno de los libros de divulgación matemática más vendidos en el mundo.

Es posible que la conjetura de Fermat no sea realmente importante en sí misma, pero sí lo es por toda la nueva matemática que surgió en torno a ella para intentar resolverla. A lo largo de más de trescientos años, fue fuente de inspiración para impulsar el desarrollo de la teoría algebraica de números, la geometría aritmética y, por extensión, la geometría algebraica. Se trata de áreas tremadamente sofisticadas de la matemática, en las que los números pasan a ser entidades abstractas inmersas en estructuras que tienen una cierta «corporalidad», una suerte de «geometría» intrínseca. Uno de los últimos grandes precursores —y, en cierta forma, el refundador— de estas teorías fue Alexander Grothendieck, fallecido en 2014 tras haber vivido aislado de la comunidad científica durante los últimos veinticinco años de su vida. Para muchos, Grothendieck fue el matemático más revolucionario de todo el siglo XX, y ciertamente merecía también el Premio Abel, más aun cuando no recibió personalmente la Medalla Fields que se le adjudicó en 1966, pues no acudió al Congreso Internacional de Matemáticos de Moscú en señal de protesta contra la Unión Soviética.

Wiles trabajó en silencio por más de seis años en todos estos complejos temas, y su trabajo es considerado una obra titánica. Sin embargo, no fue galardonado con la Medalla Fields porque las ideas, aunque correctas, le llegaron un poco tarde: cuando halló la solución de la conjetura de Fermat ya tenía cuarenta años... Se creó entonces un premio especial para él, la Placa de Plata de la IMU, que le fue entregada en el Congreso Internacional de Matemáticos de 1998 en Berlín, frente a una concurrencia de miles de personas que lo aplaudieron de pie durante casi un minuto. Sin duda alguna, el Premio Abel vino a poner aun mayor justicia en esta historia.

## SOFÍA KOVALÉVSKAYA: EL HEROICO GORRIÓN DE LA MATEMÁTICA



En plena mitad del siglo XIX, el 15 de enero de 1850, nació en Moscú una descendiente directa del rey Matías Corvino de Hungría (1443-1490): Sofía Vasílievna. Sin embargo, el origen noble de la niña se había degradado porque su abuelo se casó con una gitana, siendo por ello despojado de su título de príncipe. Aun así, ella recibió una educación de primera calidad a cargo de un tutor personal, un profesor de física, uno de matemática, y muy especialmente, de su tío Pyotr, quien estimulaba sus vetas poética y científica. Se cuenta que, siendo Sofía pequeña, después de una mudanza debieron empapelar la nueva casa, pero faltó material. Usaron entonces un libro viejo para completar el trabajo en su pieza. Se trataba, por azar, de un texto de cálculo diferencial, y las extrañas fórmulas que quedaron impresas en la pared de su cuarto alimentaron su fantasía y curiosidad científica desde temprana edad.

Pese a esto, sus extraordinarios progresos horrorizaron a su padre, quien detestaba a «las mujeres sabias» y sencillamente le prohibió avanzar más en su estudio de las ciencias. Pero Sofía se las arregló para continuar a escondidas y de forma autodidacta. Así era ella: brillante, tímida, rebelde, apasionada y, según cuentan, muy bella. Al leer los relatos originales respecto a esto último, no puede sino venir a mi mente una escena famosa de la novela *El idiota*, de Fiódor Dostoyevski, en la cual el príncipe Myshkin le dice torpemente a Aglaia Ivanovna: «Usted es tan hermosa que da miedo mirarla». Y Dostoyevski no es ajeno a esta historia: fue novio de su hermana Anya —quien, según muchos, inspiró el personaje Aglaia de su novela—; además, se dice que Sofía se enamoró de él siendo aún una niña.

Toda la vida de Sofía es un precioso y trágico cuento ruso, parte del cual es relatado con singular maestría por la Premio Nobel de Literatura Alice Munro en su libro *Demasiada felicidad*, el que, a su vez, está inspirado en la obra *Pequeño gorrión: retrato de Sofía Kovalévskaia*, de Don Kennedy.

Con apenas dieciocho años, Sofía contrajo matrimonio con el paleontólogo Vladimir Kovalevski, del que tomó su apellido. Se trataba, sin embargo, de un contrato por simple conveniencia: era la única manera que tenía de salir del país y aprender matemática. Viajó a Heidelberg y luego a Berlín, donde estudió bajo la guía de Karl Weierstrass, con quien entabló una relación muy singular: al recibirla, el rígido alemán pensó inmediatamente en deshacerse de la aspirante a aprendiz proponiéndole una lista de problemas muy difíciles. Su sorpresa fue mayúscula cuando Sofía volvió a la semana siguiente con soluciones para todos ellos, muchas de las cuales eran más sencillas y elegantes que las del propio maestro. Desde entonces se convirtió en su mentor personal, debido a que a las mujeres les estaba vedado asistir a las clases comunes. Weierstrass, el más riguroso de los «analistas» (es decir, quienes desarrollan el cálculo diferencial e integral), tuvo que guiar el talento desenfrenado de Sofía, cuya carrera fue muy fluctuante. Cada cierto tiempo, debía sobrellevar el drama de su familia: las muertes primero de su padre, luego de Vladimir —con quien, años después de su matrimonio, había establecido una verdadera relación de pareja y tenido una hija, pero que se suicidó abrumado por las deudas—, y finalmente de su hermana Anya. En

otros períodos, se dedicaba a actividades diversas (muchas de ellas consideradas frívolas por la academia), como tertulias intelectuales o negocios. Esto último, unido a su belleza y matizado con su espíritu nihilista y libertario, no le granjearon una muy buena fama.

En 1874, Sofía se doctoró en ausencia, pero con honores, en la Universidad de Göttingen. Si bien esta era «más liberal» que la de Berlín como para permitir el otorgamiento del grado doctoral a una mujer, de todos modos le negó toda posibilidad de ejercer como académica. Inició entonces un largo peregrinar para conseguir trabajo (su Rusia zarista natal por la que deambuló durante varios años nunca se lo ofreció). Casi una década más tarde, amparada por el matemático y mecenas Gustav Mittag-Leffler (quien también había sido alumno de Weierstrass), consiguió recalcar en Suecia. Al cabo de un par de años, y siendo recomendada —entre muchos otros— por Charles Hermite (el mismo que firmó el acta de aprobación de las tablas de Picarte; capítulo 15), fue nombrada catedrática de matemáticas de la Universidad de Estocolmo. Se convertía así en la primera mujer en ostentar un cargo de este tipo en ese país, y la tercera en toda Europa. Con más estabilidad, pudo dar rienda a su otra pasión, la literatura, a la vez que comenzó a abogar por los derechos femeninos. Lamentablemente, con apenas cuarenta y un años y en pleno esplendor de su carrera, murió de una neumonía mal cuidada, en medio de una profunda depresión sentimental gatillada por el rompimiento con su nueva pareja, Maxim, quien pretendía que abandonara su carrera para que llevaran una vida conyugal tradicional.

De la obra matemática de Sofía destacan especialmente dos hitos. El primero nace de su tesis de doctorado y trata sobre ecuaciones diferenciales. Un problema central en matemática es determinar si estas tienen o no soluciones, y en el caso de que existan, si son las únicas. El teorema de Cauchy-Kovalévskaya afirma que tal es el caso para algunas ecuaciones muy importantes en que las funciones involucradas son extremadamente suaves (más específicamente, funciones a las que llamamos «analíticas», como los polinomios, las funciones trigonométricas, el logaritmo y la mayoría de las funciones comúnmente utilizadas). Este teorema había sido establecido en casos más particulares por el francés Augustin Cauchy, pero fue Sofía quien dio con la versión general que se esperaba gracias a una demostración que es un verdadero portento de tenacidad y en la que despliega una técnica magistral.

El segundo gran resultado de Sofía consiste en un trabajo particularmente elegante sobre un problema planteado por Leonhard Euler acerca de la rotación de un cuerpo sólido en torno a un punto. Se trataba de un tema muy conocido en la época, tanto así, que en su novela *Middlemarch*, la escritora inglesa George Eliot (1819-1880) señalaba: «En resumen, la mujer era un problema que (...) no podía ser menos complicado que el de las revoluciones de un cuerpo sólido de forma irregular». El propio Euler lo había resuelto en el caso en que el punto es el centro de gravedad del cuerpo, y Joseph-Louis Lagrange en el caso en que el cuerpo tiene un eje de rotación (como un trompo). La solución de Sofía, que extiende las dos anteriores, consiste en una configuración universalmente conocida como «el trompo de Kovalévskaya», en la cual se explora un nuevo tipo de simetrías. Este trabajo le valió un importante reconocimiento en 1888: el Premio Bordin de la Academia Francesa de Ciencias.

Pero Sofía no solo nos legó su matemática. También incursionó en la física, con un estudio de óptica; en la astronomía, con un trabajo sobre los anillos de Saturno; en la literatura, con una serie de poemas, un libro de memorias y una novela, *Mujer nihilista*, además de una obra de teatro, *La lucha por la felicidad*, escrita junto a Anna Leffler, hermana de Gustav; y en la divulgación científica, con decenas de artículos para periódicos. En medio de estos últimos figuran muchos de sus famosos aforismos, entre los cuales destaca uno particularmente inspirador y muy revelador de su espíritu:

«Es imposible ser matemático sin tener alma de poeta (...)  
El poeta debe ser capaz de ver lo que los demás no ven,  
debe ver más profundamente que otras personas.  
Y el matemático debe hacer lo mismo».



A la izquierda: imagen de Kovalévskaia tomada de su libro de memorias. A la derecha: monumento en su casa de niñez en Polibino, transformada hoy en museo (si bien al momento de su muerte, ciertos políticos rusos expresaron que no había nada que lamentar por «la simple desaparición de una mujer nihilista»).

## LA DURA CARRERA DE TRES MUJERES MATEMÁTICAS



A mediados de la década de los noventa, la periodista Déborah Baylei, una de las primeras mujeres que en Chile incursionó en el periodismo deportivo, realizó una entrevista al ajedrecista Iván Morovic que, pese a su final abrupto, pasó totalmente desapercibida. Tras presentarlo como un genio, como el hombre que finalmente derrotaría a Gary Kasparov (cosa que, por cierto, nunca ocurrió), se entreveraron en una amena conversación en la que, en cierto momento, Baylei le consultó sobre la presencia femenina entre los grandes maestros del ajedrez. La respuesta de Morovic fue singularmente brutal: insinuó que algo así sería casi imposible, pues es difícil que las mujeres puedan estar más de cinco minutos en silencio.

Esta afirmación no es sino una muestra más del estigma que ha debido sobrellevar el género femenino en el mundo intelectual y, en particular, en la ciencia. Un ejemplo emblemático es el de Marie Curie, quien, pese a haber liderado la física y química de su época (ganó un Premio Nobel en ambas disciplinas, algo que no ha logrado ninguna otra persona), se vio enfrentada a diversos obstáculos a lo largo de su carrera por «su condición de mujer». Aunque en el mundo matemático los ejemplos son mucho menos conocidos, esta ciencia no ha estado ajena al problema. Más allá del caso novelesco de Sofía Kovalevskaya (capítulo 20), hay otras historias sencillamente aberrantes. Rápidamente, y en forma de pequeños relatos, me referiré a tan solo tres de ellas, pidiendo disculpas por la omisión de decenas de otras.

### Hipatia de Alejandría (siglo iv d. C.): la reina del fin de una época gloriosa

Hipatia es la primera mujer científica en la historia de la cual se tiene antecedentes totalmente fidedignos, aunque su figura ha sido mitificada por la literatura y el cine, incluyendo la película *Ágora*, producida por Alejandro Amenábar en 2009. Por ejemplo, si bien se tiene certeza de que dirigía la biblioteca de Alejandría, se ha mencionado también que presenció su incendio. Sin embargo, hubo varios atentados contra esta, algunos por soldados romanos y otros por cristianos fanáticos, y no se tiene total claridad de las fechas. Lo concreto es que tanto su muerte como la desaparición de la biblioteca son considerados hitos emblemáticos del inicio del oscurantismo religioso. El incendio de la biblioteca es, sin duda alguna, la mayor pérdida cultural de la humanidad en toda su historia, pues muchísimas obras cumbre de la civilización griega que allí eran conservadas se perdieron para siempre. Entre ellas figuraba un libro de geometría, *Los elementos*, de Hipócrates de Quíos (capítulo 6). Si hoy consideramos a Euclides el padre de la geometría por su libro homónimo es, en parte, por la desaparición del texto de Hipócrates, del cual se sabe que pasajes completos fueron transcritos en la obra de Euclides. Entre las llamas se perdieron también los libros de la matemática y filósofa Teano (probablemente nacida en Cretona), de quien se suele afirmar que fue discípula y esposa de Pitágoras, y que tomó las riendas de su escuela científica tras la muerte de este. Aun más, se dice que fue ella quien desentrañó la naturaleza geométrica de la división áurea (capítulo 1) y la hizo popular en la antigua Grecia.

Hipatia, hija y discípula del astrónomo Teón, llevó una vida ascética y cultivó la filosofía, la física, la astronomía y, por cierto, la matemática. Muchos de sus escritos versan sobre álgebra y geometría, y contienen lúcidas anotaciones sobre textos clásicos. Además, perfeccionó el astrolabio, instrumento de gran utilidad en la época para la navegación, pues facilita la orientación al observar la posición de las estrellas. Entre sus inventos figura el densímetro, aparato que permite determinar la densidad de un

líquido sin necesidad de establecer su peso y volumen. El funcionamiento de este se sustenta, obviamente, en el principio de flotación de Arquímedes, cuya terrible muerte (fue decapitado por soldados romanos, no sin antes completar el cálculo que hacía en la arena al momento de ser capturado) se emparenta mucho con la suya.

En la época, la tensión entre corrientes paganas y cristianas estaba ya al límite. Hipatia había participado de la educación de Orestes, a quien apoyaba políticamente como prefecto liberal de Alejandría y cuyo enemigo declarado era Cirilo, patriarca de la ciudad. Se afirma que este último instigó el asesinato de Hipatia, lo que muy probablemente jamás será probado del todo. Lo cierto es que, tal como relata un historiador de la época (Sócrates Escolástico), «una tarde, mientras regresaba a casa en su carro, la bajaron de él, la arrastraron y se la llevaron a la iglesia El Cesáreo, donde la desnudaron completamente y la asesinaron (golpeándola o cortándola) con tejas (o conchas); después de despedazarla, se llevaron sus miembros destrozados a un lugar llamado Cinarón y los quemaron». Cirilo, por el contrario, tuvo mucha mejor suerte, tanto así que fue proclamado santo por las Iglesias católica, luterana, ortodoxa y copta.



Hipatia aparece en el famoso fresco *La Escuela de Atenas*, pintado por Rafael en uno de los muros del Vaticano.

### Sophie Germain (1776-1831): la tenacidad de una mujer que debió esconder que era mujer

Aunque desde temprana edad manifestó un interés inusitado por la matemática, sus padres no querían que siguiera este camino, al punto que la dejaban sin luz ni calefacción por las noches para que no estudiara. Como no estaba permitido a las mujeres asistir a clases superiores, debía pedir prestadas las notas de cursos de la Escuela Politécnica. Más tarde, llegó al extremo de suplantar a un estudiante. Así de simple: fue a clases disfrazada de hombre y estableció correspondencia científica firmando como Antoine Auguste Le Blanc. De esta forma se relacionó con Joseph-Louis Lagrange, hasta que este la citó personalmente por estar muy interesado en su trabajo y se enteró de quién realmente era. También se escribió con Karl Gauss, por quien abogó cuando las tropas de Napoleón invadieron Prusia y entraron en su pueblo (Braunschweig), pues Germain temía que Gauss fuera ejecutado «al igual que Arquímedes». Solo en ese momento, el sabio alemán descubrió que quien le escribía era una mujer. Por cierto, pese a haber sido apoyada por Lagrange, Gauss y muchos otros, ninguna institución académica permitió que enseñara en sus aulas.

En el campo matemático, Germain hizo varios aportes. Uno de ellos fue un trabajo acerca de vibraciones sobre superficies elásticas, que le valió un premio de la Academia de Ciencias de Francia, convirtiéndose así en la primera mujer —aparte de las esposas de los académicos— que asistió a una de sus sesiones. Pero, sin duda alguna, fue en la teoría de los números donde hizo sus mayores contribuciones. En particular, realizó avances colosales para la época en torno a la conjectura de Fermat (capítulo 19), la cual logró demostrar, por ejemplo, para todos los exponentes menores que 200. Para ser más precisos, en la primera mitad del siglo XIX ya se sabía que la ecuación  $x^n + y^n = z^n$  no tiene soluciones enteras  $x, y, z$  si  $3 \leq n < 200$ , y esto gracias al señor Le Blanc.



A la izquierda: Sophie Germain. A la derecha: Emmy Noether.

### Emmy Noether (1882-1935): elegancia a toda prueba

Su historia es con toda seguridad la más emblemática del siglo XX en lo que respecta a la discriminación de la mujer en la matemática. Noether revolucionó el álgebra, transformando un área excesivamente árida, donde los progresos solían involucrar proezas de cálculo, en un área pura y conceptual, donde cada nueva pieza se articula con la anterior en un elegante recorrido lógico. Junto con esto, incursionó en la física, al punto de impresionar a Albert Einstein con su bellísimo teorema que relaciona las simetrías del universo con las leyes de conservación. Noether formaba parte de la élite mundial de la matemática de principios de siglo, y tiene un sitio de honor en toda la historia de esta ciencia.

A pesar de esto, el «problema» de ser mujer, al que debía añadir otro más, su origen judío, le impidieron acceder a una posición académica a su altura en una universidad. Por largos períodos debió sobrevivir con trabajos secundarios, como clases de ayudantía o particulares. Incluso, algunas de esas lecciones tuvo que darlas suplantando a David Hilbert. La mancha en la historia de la Universidad de Göttingen por haber rechazado en un inicio su contratación —al igual que la de Kovalévskaya— única y exclusivamente por su género perdurará por siempre (Noether vino a ser aceptada con un contrato respetable recién cinco años después). Aun así, muchos de sus cercanos señalaban que Noether era extraordinariamente generosa con sus ideas, al punto de que varios resultados importantes en distintas líneas de la matemática que, en general, son atribuidos a otras personas, en realidad se incubaron en su extraordinario intelecto. En honor a ella, en cada Congreso Internacional de Matemáticos (capítulo 19) hay una charla especial, la Conferencia Emmy Noether, reservada para honrar a mujeres que hayan realizado contribuciones fundamentales y sostenidas en la ciencia matemática.




Una calle recuerda a Sophie Germain en París, y otra hace lo propio con Emmy Noether en Leverkusen.

Desde una perspectiva actual, resulta casi imposible entender cómo se tardó tanto en otorgar a las mujeres condiciones mínimas de igualdad a los hombres en el plano intelectual. Y por hombres me refiero ciertamente a hombres blancos: mientras en la Universidad de Princeton de Estados Unidos —el «país de la libertad»— la primera mujer que obtuvo un doctorado en ciencias lo hizo recién en 1964, el primer hombre «de color» lo había logrado apenas una década antes. La Universidad de Göttingen, cuyo lema es «para el bienestar de todos» —y que, sin embargo, negó el puesto a Kovalévskaya y, en un inicio, a Noether—, incorporó a mujeres catedráticas de manera sistemática recién después de la Segunda Guerra Mundial. Y a la Escuela Politécnica, creada tras la revolución de la «libertad, igualdad y fraternidad» —y a la que Germain debía entrar camuflada—, las mujeres pudieron acceder como alumnas solo a partir de 1972.

Hoy en día, las barreras discriminatorias son muchísimo más sutiles. Muy probablemente, una emisión televisiva en la que se esgrimiese una frase parecida a la de la respuesta de Morovic a Bailey (con una reacción similar a la de ella, quien le cortó inmediatamente la entrevista) generaría una álgida polémica. Sin embargo, pese a los avances, nunca debe escatimarse esfuerzo alguno en concientizar a las distintas generaciones de que la capacidad intelectual no está circunscrita a ningún género, raza u origen social. Durante siglos, la especie humana desperdició el talento de un porcentaje altísimo de su población. No podemos volver a cometer una injusticia y una aberración tan grandes.

## **EL TRÁGICO DESTINO DE CUATRO MATEMÁTICOS QUE CAMBIARON NUESTRA FORMA DE PENSAR (Y EL MUNDO)**



Sin duda alguna, la primera mitad del siglo pasado fue una época particularmente prolífica para la física. Aunque mucho menos conocidos, igualmente revolucionarios fueron los progresos que se hicieron casi paralelamente en la matemática y que desembocaron en la creación de una nueva disciplina en esta ciencia: la lógica matemática. Es así como, desde fines del siglo XIX y hasta la mitad del XX, se abrieron horizontes al pensamiento que, hasta ese entonces, eran inimaginables. Esto gatilló una auténtica revolución científico-filosófica como no se veía desde los tiempos de Aristóteles, la cual, sin embargo, no ha tenido la repercusión mediática de otros logros. El hilo conductor de los orígenes de esta increíble saga (que, por cierto, aún no concluye) puede ser seguido a través de la vida de cuatro matemáticos notables que participaron de ella, los cuales tienen otro denominador en común: el trágico final de sus vidas.

### **Georg Cantor (1845-1918): la edificación de un paraíso**

Hasta la aparición de su trabajo, el concepto de «infinito» era considerado un tema filosófico, e incluso teológico; en matemática, solo se osaba emplear dicha palabra para nombrar «algo que no era finito», por ejemplo, el resultado de sumar  $1/2$  una cantidad arbitrariamente grande de veces (capítulo 28). Pero Cantor penetró en la esencia del infinito y nos reveló su increíble tipología. Su teoría es tan fundamental y, a la luz del entendimiento de hoy, tan simple, que es materia de estudio en cursos habituales de primer año de universidad, y perfectamente podría ser enseñada en el liceo. Constituye, por lo demás, un ejemplo muy ilustrativo de cómo la ciencia va ampliando su campo de acción y se va apoderando de otros espacios de estudio mediante la creación y la adopción de nuevas ideas y conceptos.

El problema fundamental que se planteó Cantor es el siguiente: el conjunto de todos los números enteros positivos es infinito, al igual que el de puntos en una recta. ¿Existe, sin embargo, una forma de comparar ambos conjuntos y concluir que el segundo es «más grande» o «más infinito» que el primero? Ciertamente, en general, un conjunto es más grande que otro si lo contiene, pero esta idea es demasiado ingenua: la mayoría de los conjuntos son de naturaleza totalmente diferente, por lo que sería imposible compararlos. Además, si un conjunto contiene a otro debe ser declarado como «no más pequeño», pero no necesariamente como más grande. La genialidad de Cantor para resolver este dilema radica en su forma de comparar conjuntos infinitos: estos son «igual de grandes» si se puede establecer una regla de emparejamiento que asocie cada elemento de uno con un elemento del otro. Por ejemplo, el conjunto de los enteros positivos y el de los números pares son igualmente grandes, pues pese a que el primero contiene al segundo, podemos emparejar el 1 con el 2, luego el 2 con el 4, después el 3 con el 6, etcétera, cubriendo todos los enteros positivos por un lado, y todos los pares por el otro. De hecho, según Cantor, todos los conjuntos de números enteros que constan de infinitos números son igual de grandes.

$1 \longleftrightarrow 2,$	$1 \longleftrightarrow 0,$
$2 \longleftrightarrow 4,$	$2 \longleftrightarrow 1,$
$3 \longleftrightarrow 6,$	$3 \longleftrightarrow -1,$
$4 \longleftrightarrow 8,$	$4 \longleftrightarrow 2,$
$5 \longleftrightarrow 10,$	$5 \longleftrightarrow -2,$
$6 \longleftrightarrow 12,$	$6 \longleftrightarrow 3,$
$7 \longleftrightarrow 14,$	$7 \longleftrightarrow -3,$
$8 \longleftrightarrow 16,$	$8 \longleftrightarrow 4,$
$9 \longleftrightarrow 18, \text{ etc.}$	$9 \longleftrightarrow -4, \text{ etc.}$

A la izquierda: una correspondencia entre los enteros positivos y los pares. A la derecha: una correspondencia entre los enteros positivos y todos los enteros.

Y he aquí el más brillante de los resultados de Cantor: el conjunto de los números reales (es decir, de los puntos de la recta numérica) no es igual de grande que el de los números enteros, sino que ¡tiene un «grado de infinitud» mayor! El argumento de la prueba —conocido universalmente como «de la diagonal de Cantor»—, explicado más adelante, es uno de los más extraordinarios de toda la historia de la matemática: su sencillez y profundidad quizás solo sean comparables con aquellas de la prueba del teorema de Pitágoras (capítulo 6) o del teorema fundamental del cálculo de Leibniz y Newton.

Supongamos que se pudiese establecer un emparejamiento entre el conjunto de los números reales y el de los enteros positivos. Los reales podrían, entonces, ser listados, sin excluir ninguno: el primero de la lista es el emparejado con el 1, el segundo con el 2, etcétera. Para simplificar, seleccionemos ordenadamente de esta lista solo aquellos que son mayores que 0 y menores que 1, y escribámoslos hacia abajo en notación decimal. Recordemos que algunos números pueden ser escritos de dos maneras diferentes, debido a que (capítulo 28)  $0,999999999\dots = 1,000000000\dots$  Sin embargo, esto es irrelevante: para ellos, usamos la notación que termina en 000...

Para concretizar, supongamos que la lista de todos los números reales entre 0 y 1 comienza de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} R_1 &= 0,30000000927270040\dots, \\ R_2 &= 0,36498989881864901\dots, \\ R_3 &= 0,73873817917927142\dots, \\ R_4 &= 0,97129862847678686\dots, \\ R_5 &= 0,98370085399300038\dots, \\ R_6 &= 0,95097900912496370\dots, \\ R_7 &= 0,57087020096483866\dots, \text{ etcétera.} \end{aligned}$$

Vamos a crear un número entre 0 y 1 que no está en ella, demostrando por reducción al absurdo que dicha lista no existe. Para esto, consideremos los dígitos que están pintados de amarillo a lo largo de la diagonal anterior. Cambiemos cada uno de estos dígitos, digamos cada 1 por un 2, cada 2 por un 3, ..., cada 8 por un 9, y cada 9 por un 0. Este cambio se realiza, sin embargo, no en la casilla en que aparece, sino de manera ordenada en la expresión decimal de un número  $R$  que creamos con tales cambios. Así, el primer dígito decimal de  $R$  es 4, pues el dígito en amarillo de  $R_1$  es 3 y el 3 cambia en 4; el segundo dígito decimal de  $R$  es 7, pues el dígito en amarillo de  $R_2$  es 6 y el 6 cambia en 7, etcétera. Resumiendo:

$$R = 0,4793103\dots$$

Obviamente, este número  $R$  difiere de  $R_1$  al menos en su primera cifra decimal, de  $R_2$  en la segunda, de  $R_3$  en la tercera... En general, difiere del  $k$ -ésimo número en la  $k$ -ésima cifra decimal. Por lo tanto, ¡no puede ser igual a ninguno de los números de la lista!

Pero Cantor no se quedó en este descubrimiento de un nuevo infinito, sino que fue más allá. Descubrió que, así como el conjunto de los números enteros es más pequeño que el de los reales, este a su vez es menor que otro conjunto (para ser concretos, es más pequeño que el conjunto de todos los subconjuntos de puntos de la recta). Por su parte, este último es más pequeño que otro conjunto, y así sucesivamente... ¡infinitas veces! Y desde aquí, Cantor fue a parar directo a un pozo sin fondo (reminiscente del que había encontrado Pitágoras al descubrir la irracionalidad de  $\sqrt{2}$ ; capítulo 8): ya que hay infinitos niveles de infinito, cabe preguntarse: ¿cuál es el nivel de infinito de este conjunto de infinitos? Planteado en otros términos: ¿existe un infinito supremo? Este tipo de disquisiciones lo llevó no solo a él, sino también a otros eminentes matemáticos (como Bertrand Russell), a estrellarse contra una serie de paradojas lógicas, las cuales la comunidad científica tardó un par de décadas en superar.

La otra interrogante que surge naturalmente del argumento de Cantor, y que él tampoco pudo resolver, es la siguiente: ya que el conjunto de los números reales es más infinito que el de los enteros, ¿existirá un conjunto cuyo orden de grandeza se ubique justo en medio? Conocida como la «hipótesis del

continuo», esta pregunta fue incluida por David Hilbert como el primero de su lista de veintitrés problemas del siglo XX (capítulo 6). Tiempo después, Kurt Gödel dio las primeras luces para su solución, trabajo que fue concluido años más tarde por el estadounidense Paul Cohen, quien, en 1966, recibió una Medalla Fields por su sorprendente respuesta. En un lenguaje coloquial, esta podría ser enunciada de la manera siguiente: «¡Depende!». Así es: todo está supeditado al universo lógico en que nos movemos: en uno de ellos no hay tal conjunto, y en el otro sí lo hay. Ninguno de los caminos que se escoja llevará a contradicción, así que se es libre de decidir por uno u otro.

Pese a su genialidad, la obra de Cantor fue en un principio muy mal recibida. De hecho, si escarbamos en la historia de la matemática, no existe otro episodio de igual nivel de ostracismo de ideas en el que no haya incidido algún tipo de fanatismo religioso; tal vez, este solo sea emparentable con el castigo (y presunto asesinato) sufrido por Hípaso de Metaponto por comunicar la existencia de los números irracionales (capítulo 8). Lo concreto es que célebres matemáticos de la época, como Henri Poincaré y Luitzen Brouwer, así como respetados filósofos, como Ludwig Wittgenstein, denostaron públicamente la teoría de Cantor. Por ejemplo, el primero se refirió a ella simplemente como «una enfermedad de la cual la matemática debiera rápidamente recuperarse». Pero sin duda, el más virulento fue Leopold Kronecker. Este caudillo de la matemática alemana, de quien se suele resaltar además su atlética estampa, era algo obtuso en sus puntos de vista. Entró en abierto conflicto con Cantor debido a su visión «finitista» de la matemática, según la cual todo objeto matemático debiese ser construido a partir de estos números en una cantidad finita de pasos. Su célebre frase «Dios creó los números enteros, el resto es obra del hombre» refleja muy claramente esta postura. Lo concreto es que a pesar de haber sido profesor de Cantor en Berlín, lo tildó abiertamente de «charlatán científico» y «corrompedor de jóvenes», e hizo todo lo posible para que no progresara en su carrera académica.

Todo lo anterior dañó seriamente la salud de Cantor: la falta de reconocimiento científico sumado, a sus trastornos psiquiátricos (bipolaridad y delirios de persecución), gatillaron en él frecuentes períodos de aguda depresión. A ello se sumaba el hecho de que su intelecto no era en lo absoluto predecible, y a veces tomaba rumbos extraños. Por ejemplo, dedicó grandes esfuerzos a probar que William Shakespeare no había existido, y que sus creaciones eran obra del poeta Francis Bacon, quien habría utilizado dicho seudónimo. Además, como luterano convencido, veía en la posible existencia de un infinito absoluto una manifestación de la divinidad. De hecho, solía decir que su teoría le había sido comunicada por Dios, tanto que llegó a incluir reflexiones filosóficas y teológicas en sus artículos de matemática, razón por la cual algunos fueron rechazados por las revistas especializadas a las que los envió, a pesar de que contenían importantes resultados.

El reconocimiento mundial a la obra de Cantor se fue imponiendo poco a poco, al punto de que Hilbert llegó a afirmar que «nadie podrá expulsarnos del paraíso que él ha creado para nosotros». Lamentablemente, esto no sirvió para aliviar su sufrimiento. Aunque había alcanzado la gloria universal, en sus últimos años de vida —y muy especialmente durante la Primera Guerra Mundial—, Cantor vivió sumido en la pobreza y el hambre.

Su muerte sobrevino en total soledad tras haber pasado varios meses en un sanatorio.

## Felix Hausdorff (1868-1942): la armonía del paraíso

Las ideas acaban imponiéndose no solo por ser correctas, sino también porque su profundidad las hace trascender al ámbito en el cual habían sido concebidas originalmente. En matemática, así ha sucedido desde los inicios del siglo XX con teorías como los sistemas dinámicos (capítulo 17) y las probabilidades (capítulo 27), y así sucedió también con la concepción del infinito de Cantor y, más generalmente, con su teoría de conjuntos. Estas fueron poco a poco invadiendo otros espacios, dejando atónitos a sus censores de los primeros años. Las nuevas perspectivas planteadas por el alemán demostraron finalmente no ser el simple fruto de la paranoia de un enfermo, como se había llegado a sugerir al principio, sino que acabaron conquistando a todo el mundo. Uno de los grandes responsables de este triunfo fue el holandés Hausdorff, quien incorporó la «visión cantoriana» a una amplia gama de líneas de la matemática, como el análisis, la topología y la geometría.

La aportación de Hausdorff es multifacética: incluye no solo trabajos matemáticos muy variados (algunos de los cuales se enmarcan en líneas más bien clásicas), sino también una interesante producción literaria y filosófica (la que firmaba con el seudónimo Paul Mongré). Sus máximos réditos, sin embargo, llevan todos el sello de Cantor. Por ejemplo, fue pionero en la sistematización formal de la topología, la cual finalmente se edificó a partir de la teoría de conjuntos. Así, en esta disciplina se concibió una noción amplia de «cercanía», que otorgó sentido matemático, entre otras, a una situación en la que un punto  $A$  está cercano a  $B$  sin que  $B$  esté cercano a  $A$ . Esta visión ha posibilitado que conceptos topológicos inunden no solo la física, sino también áreas ajenas a las ciencias exactas. Basta señalar que, en 2016, el filósofo coreano Byung-Chul Han (el mismo de *La sociedad del cansancio*) publicó una obra muy interesante titulada *La topología de la violencia*. Ciertamente, también se podría agregar que, a mediados del siglo XX, el célebre psiquiatra Jacques Lacan haya impulsado una corriente psicoanalista-topológica, aunque esta ha sido fuertemente criticada por su falta de rigor (capítulo 25).

Hausdorff también escarbó en los cimientos mismos de la matemática. Redactó un texto monumental, *Principios de la teoría de conjuntos*, que sistematiza las ideas de Cantor en esta materia y agrega otras, como la de los conjuntos ordenados. Cabe consignar, sin embargo, que el desarrollo de estas ideas llevó también a algunos excesos, de los que, por cierto, debe eximirse de toda culpa a Cantor y Hausdorff. Un ejemplo cercano lo constituye la inclusión excesiva de la teoría de conjuntos en el currículum escolar básico hace un par de décadas, con pésimos resultados. Por lo demás, quienes tengan vagos recuerdos de esta aventura pedagógica quizás puedan testimoniar la enseñanza en nuestras aulas de un «conjunto universo» (usualmente denotado U), que supuestamente era el conjunto que lo contiene todo. Pues bien, este conjunto era una de las pesadillas de Cantor y, sencillamente, no existe. En efecto, si existiese, entonces debiera contener todos sus subconjuntos (pues lo es «todo»), pero el propio Cantor había probado que el conjunto de los subconjuntos de un conjunto tiene un orden de grandeza mayor que el conjunto original.

Hausdorff hizo dos de sus mayores contribuciones mezclando topología y análisis. La primera tiene relación con la «paradoja de Banach-Tarski» (capítulo 7), cuyo crédito se lo llevaron mayormente los autores polacos, aun cuando se apoyaron fuertemente en un trabajo previo del holandés (quien ya había logrado descomponer la esfera en dos pedazos que, al reensamblarse, originan una sola esfera). Sin embargo, el aporte más celebrado de Hausdorff es ciertamente su concepto de dimensión, el cual extiende la noción clásica y puede asumir cualquier valor no negativo. Los conjuntos fractales, que invadieron la geometría a lo largo del siglo XX, fueron el campo natural de aplicación de este concepto. Por ejemplo, para el conjunto de Cantor ternario (capítulo 18), la dimensión es igual a 0,63092... (valor que corresponde a  $\log[2]/\log[3]$ ), lo cual encaja con la intuición: se trata de un conjunto muchísimo más grande que una colección finita de puntos (por lo que su dimensión debe ser mayor que 0), pero ciertamente mucho más pequeño que un intervalo (por lo que su dimensión debe ser menor que 1). Cabe señalar que el cálculo de la dimensión de fractales complejos no es en lo absoluto tarea sencilla; de hecho, se trata de un tema de ferviente actividad hoy en día. Por ejemplo, el conjunto de Mandelbrot es tan complicado que, tal como probó el japonés Mitsuhiro Shishikura en 1998, su borde tiene dimensión igual a 2. En otras palabras, su frontera es tan sinuosa que casi llena regiones enteras del plano, pero no consigue llenar completamente ninguna. Solo observe el video de YouTube «Mandelbrot Zoom 10^227 [1080x1920]».

El portento de la obra de Hausdorff hacía de él uno de los líderes de la matemática mundial de la primera mitad del siglo XX. Su situación, sin embargo, se degradó enormemente a partir del ascenso del partido nazi al poder en Alemania en 1933. Sus esfuerzos por radicarse en Estados Unidos, como lo hizo la mayoría de sus colegas que, como él, tenían ascendencia judía, sencillamente fracasaron.

En 1942, ante la inminencia de que iba a ser trasladado con su familia a un campo de concentración, se suicidó junto a su esposa y su cuñada en Bonn.

## Kurt Gödel (1906-1978): el paraíso no lo es todo

Cuenta la historia que, hacia el siglo VI a.C., el filósofo Epiménides pasó una buena parte de su vida meditando en una cueva de la isla de Creta y que, en diversas ocasiones en que se le preguntó en qué estaba pensando, se limitó a responder algo así como: «Yo estoy mintiendo».


¿Decía Epinérides la verdad? Si lo hacía, debemos concordar con él y, por lo tanto, corroborar el hecho de que mentía. Si no decía la verdad, entonces debemos admitir que estaba mintiendo sobre el hecho de que mentía y que, en consecuencia, decía la verdad. En ambas situaciones llegamos a una contradicción. Al parecer, Epiménides nunca pudo salir de este embrollo lógico.

La «paradoja del mentiroso» atrajo la atención de los filósofos durante siglos. Y si bien su aparente contradicción fue desestimada de muchas maneras, los matemáticos de principios del siglo XX se hallaron frente a diversas paradojas análogas. Era como si en cada teoría hubiesen detectado una cueva con un Epiménides en su interior burlándose de ellos. Por un momento, todo el edificio matemático estuvo a punto de caer. La salvación provino entonces de un trabajo sistemático de reformulación de los fundamentos de la lógica deductiva, en el que, por primera vez, se tomó conciencia de cuán «contaminada» está ella con nuestro lenguaje.

Para acometer esta tarea, el filósofo alemán Gottlob Frege comenzó creando lo que hoy es conocido como el cálculo proposicional. Este corresponde a una manera algebraica de plantear nuestra lógica deductiva: primeramente, se delimita el lenguaje que se va a emplear; luego, a partir de premisas básicas (denominadas axiomas), se intenta determinar la validez de cualquier otra afirmación que pueda ser formulada en el mismo lenguaje inicial. En este contexto se clarifica por qué el problema que atormentó a Epiménides no es una paradoja, pues establecer el valor de verdad de la afirmación del sabio cretense no es un asunto que le competa al lenguaje con el cual se enuncia dicha frase. Lo mismo ocurre, más generalmente, con muchas otras instancias de la matemática en que una entidad o una afirmación hacen referencia a sí mismas ya sea para ser creada o para que se pueda establecer su veracidad.

Una obra fundamental y particularmente clarificadora de estos aspectos es *Principia Mathematica*, de Bertrand Russell y Alfred Whitehead, en la cual se intenta replantear la matemática desde su base. En este libro, la «demostración» de la igualdad  $1+1=2$  aparece recién después de un centenar de páginas, la

mayoría de ellas dedicadas a la «construcción» de los números naturales a partir de un número finito de axiomas fundamentales.



Una página de *Principia*: el intento de reducir toda la matemática a la manipulación lógica de símbolos formales.

Con esta nueva gama de herramientas matemáticas, Gödel entró en escena a inicios de la década de los treinta, dejando estupefacto al mundo entero. Dos de sus resultados, los famosos «teoremas de incompletitud» (que, en general, son presentados como las dos caras de uno solo teorema), son considerados por mucha gente el avance (¿o retroceso?) más importante de toda la matemática del siglo XX.

En aquella época, en que poco a poco se lograba reconstruir la matemática desde sus cimientos, se planteó la quimérica posibilidad de edificarla completamente a partir de tan solo un número finito de axiomas, utilizando como hilo conductor el cálculo proposicional. Se trataba, ciertamente, de un positivismo científico llevado al extremo, al cual Gödel respondió negativamente y de manera contundente con su «primer teorema de incompletitud». A grandes rasgos, este asevera que, en todo sistema lógico aceptable que se asiente en un número finito de axiomas que no lleven a contradicción, ¡hay una afirmación que no puede ser validada ni refutada por los métodos de la lógica tradicional! En otras palabras, hay una aseveración cuya condición de «verdad» no puede ser establecida lógicamente. Ciertamente, dicha aseveración puede ser añadida a nuestro «dogma inicial» como un axioma más, pero también podemos agregar la negación de esta afirmación: ninguna de estas dos elecciones llevará a contradicción. Pero además, el mismo primer teorema de incompletitud nos dirá que, para cualquier elección que hagamos, habrá nuevas aseveraciones que no podrán ser validadas o refutadas a partir del nuevo conjunto de dogmas. Y así por siempre... ¡Ningún paraíso lógico puede abarcarlo todo!

Gödel no se quedó solo en esto. Atendiendo al tercer problema planteado por Hilbert en su selecta lista, investigó científicamente la pesadilla más temida: ¿será que llegaremos a una contradicción lógica en la matemática?, ¿o será que podremos un día tener la certeza de que dicha contradicción no existe? Ciertamente, evitar las contradicciones es un proceso para el cual los seres humanos podemos moderar nuestra axiomática inicial simplemente evitando los «dogmas» que se contradicen el uno con el otro. Pero el gran problema es que, una vez más, ¡es imposible probar que una axiomática no se contradice a sí misma al interior del mismo lenguaje en que dicha axiomática está formulada! Tal es el contenido del «segundo teorema de incompletitud» de Gödel, sobre el cual André Weil solía bromear diciendo: «Dios existe porque la matemática no se contradice a sí misma, pero el Diablo también existe porque no se puede demostrar que no se contradice».

Resulta sumamente importante señalar que los resultados de Gödel son totalmente rigurosos y que su validez no puede ser objetada en sentido alguno, pues nada en ellos resulta de disquisiciones ambiguas con las cuales uno pueda concordar o no (quizás esta sea la razón de su gran impacto en filosofía). Lamentablemente, es imposible describirlos con total precisión sin entrar en sus aspectos más técnicos. Esto ha motivado el que, muchas veces, hayan sido desvirtuados desde su concepción original. Sin ir más lejos, mientras la comunidad matemática los recibió en un inicio como un duro golpe, Gödel los celebraba de manera muy entusiasta diciendo que «hay muchas matemáticas lógicamente coherentes coexistiendo: ¡la matemática es infinita y siempre lo será!».

Gödel nació en lo que actualmente es la República Checa, pero sus más grandes resultados los produjo trabajando en Viena. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, debió emigrar hacia Estados Unidos. Se cuenta que, para recibir la nacionalidad de ese país, analizó por completo su Constitución. Así, el día de su entrevista, le demostró al juez que dicho texto incurría en contradicciones lógicas que hacían posible la instauración de una dictadura perfectamente compatible con la legalidad (un aspecto de enorme actualidad hoy en día). El juez dudó entonces en otorgar la ciudadanía a tan extraño personaje. Afortunadamente, junto a Gödel se encontraba su gran amigo, Albert Einstein, quien logró persuadir a la autoridad.

Influenciado por el alemán, Gödel incursionó también en física, proponiendo modelos en los cuales los viajes en el tiempo no generan contradicciones lógicas. Ambos solían pasar tardes enteras charlando sobre diversos temas. Según Einstein, este era precisamente el máximo privilegio de trabajar en Princeton. Allí, Gödel compartía una apacible vida junto a su esposa, Adele Nimbursky, con quien sostuvo una curiosa relación sentimental que no puede sino evocarnos la historia de la novela *El Ángel Azul*, de Heinrich Mann (llevada al cine con una sobresaliente actuación de Marlene Dietrich). En efecto, en su juventud, Adele había sido bailarina de cabaret, y esto le había granjeado la enemistad de toda la familia del matemático.

Gödel no era de fácil trato, y su inestabilidad tanto física como psicológica era difícil de manejar. Hacia sus últimos años, vivía completamente convencido de que intentarían envenenarlo, razón por la cual le pedía a Adele que probara cualquier tipo de alimento que él fuese a comer. Cuando ella enfermó y tuvo que ser hospitalizada por casi seis meses debido a una operación, él dejó de alimentarse y pereció de inanición (al momento de su muerte pesaba apenas 32,5 kg).

El lógico más extraordinario desde los tiempos de Aristóteles murió de la manera más absurda que se hubiese podido imaginar.

## Alan Turing (1912-1954): más allá del paraíso, la manzana

En los años inmediatamente posteriores a los de los primeros trabajos de Gödel irrumpió en escena este personaje notable. La tesis de doctorado de Alan Turing es quizás la obra matemática de mayor influencia del siglo XX, pues es el fundamento teórico de la computación moderna: allí se fijan los límites de aquello que es «procesable por una máquina» o «computable». Constituye, además, un ejemplo excepcional de cómo el avance teórico puede a veces adelantarse décadas a la tecnología (los primeros computadores datan recién de fines de los años cuarenta).

Como en todo orden de cosas, hubo precursores y contemporáneos que rozaron las ideas de Turing. Entre los primeros se cuenta nada menos que a Gottfried Leibniz, quien ya en el siglo XVII planteaba la posibilidad de que llegase a existir una máquina capaz de corroborar de manera sistemática la validez o falsedad de todas las afirmaciones matemáticas. Este problema fue reformulado en términos más concretos por Wilhelm Ackermann y Hilbert en 1928. Turing probó que, incluso para un ámbito de afirmaciones relativamente sencillas, dicha máquina no puede existir, pues hay restricciones teóricas importantes para el campo de aquello que puede ser programado (es decir, restricciones que no tienen relación con la tecnología de esta eventual máquina, sino con lo que, desde el punto de vista lógico, es capaz de procesar).

Uno de los primeros pasos en el trabajo de Turing consistió en la formalización del concepto de «algoritmo», una noción que había sido vislumbrada a mediados del siglo XIX por la matemática y escritora inglesa Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron, considerada la primera programadora de la historia. Cabe señalar, además, que los resultados de Turing fueron obtenidos simultáneamente, aunque por una vía totalmente diferente, por el estadounidense Alonzo Church. El punto de vista de Turing, aunque equivalente al de Church, acabó imponiéndose debido a la extraordinaria sencillez de su formulación. Aun así, ambas visiones estuvieron fuertemente influenciadas por el trabajo anterior de Gödel.

Sin embargo, Turing no se quedó en esto. Su ambición era mucho más amplia, pues en su afán de establecer los límites de lo procesable por una máquina, imaginó una de gran poder lógico, una que fuera capaz de trabajar con absolutamente todo lo susceptible de ser descrito mediante algoritmos. Logró probar la existencia teórica de este objeto, algo que, en ese entonces, no era en absoluto evidente, pero que hoy en día nos parece totalmente natural. A grandes rasgos, los computadores modernos no son sino implementaciones físicas de lo que Turing imaginó de manera puramente conceptual y que, en este contexto, es llamado una «máquina de Turing universal». Varios años más tarde, Turing se aventuró aun más lejos, estableciendo los rudimentos de lo que hoy es el estudio de la inteligencia artificial.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing fue requerido por el gobierno inglés para colaborar en la tarea de descifrar los mensajes secretos del ejército nazi. Junto a un enorme equipo de colaboración, y aprovechando el trabajo previo del equipo polaco —encabezado por el matemático Marian Rejewsky—, que le había precedido en esta tarea (y que había logrado recuperar una de las máquinas de encriptación), en 1942 logró romper el cerrojo de la encriptación del *Código enigma*, un suceso muy bien descrito en la famosa película homónima que pasó por cartelera en nuestros cines en 2014 (y cuyo nombre original en inglés era *The Imitation Game*). Si bien se afirma que esto logró adelantar el fin de la



Segunda Guerra Mundial en al menos un par de años, esta aseveración puede resultar un poco aventureada, pues quizás parte algo del sesgo de la visión occidentalizada del conflicto bélico. Lo concreto es que la acción de Turing y su equipo logró salvar incontables vidas. Los archivos de este trabajo de decriptación no se hicieron públicos sino hasta 1996, año en que se tomó real conciencia de la relevancia histórica de este episodio.

Tras la guerra, Turing volcó su estudio hacia la biología. Intrigado por la formación de patrones geométricos en plantas y animales, sentó las bases de una nueva rama de estudio: la morfogénesis. Fue pionero en utilizar las ecuaciones diferenciales para entender, por ejemplo, la forma de las manchas de muchos animales, las que, según su teoría, resultan de procesos de reacción y difusión intercelulares. Pero sus aportes fueron todavía más lejos: logró predecir patrones de diferenciación celular mediante sus modelos matemáticos, hecho que ha sido constatado y corroborado numerosas veces en décadas posteriores.

La carrera de Turing tuvo un final abrupto en 1954. En un extraño proceso judicial, un par de años antes había sido condenado por homosexualidad, la cual era considerada un delito por la legislación de tipo victoriana aún imperante en la Inglaterra de la época. Le dieron entonces a elegir entre ser encarcelado o someterse a una castración química. Como Turing estaba demasiado ocupado en sus investigaciones y tampoco quería renunciar a otra de sus pasiones —correr el maratón—, prefirió la segunda alternativa. Esto provocó serios cambios en su apariencia física, así como dificultades intelectuales y emocionales. Lo concreto es que, a dos semanas de su cumpleaños número cuarenta y dos, fue hallado muerto en su departamento, muy probablemente como consecuencia de un suicidio materializado al comer una manzana envenenada con cianuro, en una escena que evoca inevitablemente a la que era su película favorita: *Blancanieves y los siete enanitos*.

Se dice que el logo de Apple (la manzana sin un trozo) es una suerte de homenaje al padre de la computación moderna. Aun así, no fue sino hasta 2013 cuando, tras mucha insistencia y presión internacional, el gobierno británico accedió a retirar póstumamente y de manera simbólica la sentencia que había pesado sobre Turing.

Nada podrá borrar, sin embargo, el destino terrible que debió sufrir este gran científico, condenado por la misma sociedad a la cual se empeñó en salvar y orientar hacia la verdad.



De izquierda a derecha: Cantor, Hausdorff, Gödel y Turing.

## Apéndice: el otro matemático héroe de la Segunda Guerra Mundial

La historia del conflicto bélico más grande del siglo XX suele llegar mutilada a nuestras latitudes, pues se relevan los sucesos del lado occidental por sobre los del llamado «frente este». De ese lado, el pueblo ruso debió a la vez sufrir la tiranía brutal y desquiciada de Stalin y sostener durante un par de años casi todo el peso de la guerra. Gran parte del aparato de producción soviético fue retirado hacia el oriente, inclusive más allá de los montes Urales, desde donde los productos debían ser enviados hacia las ciudades del frente (en especial, Leningrado y Stalingrado, hoy llamadas San Petersburgo y Volgogrado, respectivamente). Allí, un matemático fue fundamental en la tarea de establecer la forma en que los envíos debían hacerse para minimizar el uso de los escasos recursos con que se contaba: Leonid Kantorovich. Para ello, reformuló una vieja teoría de fines del siglo XVIII del francés Gaspar Monge: mientras las ideas de este último preveían el envío de productos directamente desde puntos de origen a puntos de destino, Kantorovich planteó la posibilidad de repartir esos productos, de modo que desde el mismo punto de origen pudiesen salir hacia diferentes puntos de destino en porcentajes variados.

Pero Kantorovich no se quedó en la teoría: sabía que sus instrucciones eran complicadas, por lo que se encargó de supervisar personalmente algunos de los envíos. Poniendo en riesgo su propia vida, realizó este ejercicio en varias ocasiones sobre la famosa «ruta de la vida» hacia Leningrado. Así, durante los meses de invierno entre 1941 y 1944, cada mañana circulaban camiones con comida, armas y combustible sobre las aguas congeladas del lago Ládoga hacia la hermosa ciudad del norte de Rusia a la

única hora en que el espesor de los hielos lo permitía, siguiendo para ello los caminos que Kantoróvich determinaba a través de los cálculos que se ceñían a la teoría que acababa de desarrollar para esos fines.

En 1975, Kantoróvich fue galardonado con el «Premio Nobel de Economía» (capítulo 19) por su «teoría de la colocación óptima de recursos». En matemática, esta es conocida simplemente como la teoría del transporte óptimo o del transporte de Monge-Kantoróvich. Con este último nombre, si bien no se resta crédito al científico francés, se reconoce implícitamente que la idea de Kantoróvich es más eficaz. Insospechadamente, esta ha encontrado aplicaciones en campos muy diversos, como el tratamiento de imágenes digitales, la dinámica de fluidos y la cosmología.


Pero no debemos engañarnos: durante la guerra, entre los científicos de renombre también hubo villanos, y de los peores. El caso más icónico en la matemática es, sin duda alguna, el de Oswald Teichmüller. Brillante geómetra y analista, durante su corta vida revolucionó varios campos relacionados con estas áreas, y su obra es admirada en el mundo entero. Pero eso es respecto a su obra, pues de su vida nadie puede admirar nada. Como académico, participó activamente —junto a Ludwig Bieberbach— del boicot de numerosos colegas de origen judío, entre los cuales destacan Edmund Landau y Richard Courant. La razón: era un nacionalsocialista convencido, al punto de formar parte del Ala paramilitar del partido nazi. En 1939, gracias a una autorización personal de Hitler, se unió al Ejército alemán. Sus días concluyeron en 1943 combatiendo en el frente este, el mismo que Kantoróvich se encargó de salvaguardar usando su teoría del transporte óptimo.

## EL CONGRESO DE MATEMÁTICA DE CATAPILCO



La brutal interrupción de la vida democrática en Chile ocurrida el 11 de septiembre de 1973 tuvo un fuerte impacto sobre la comunidad científica —en particular, matemática—, que comenzaba a consolidarse. Hasta antes de esa fecha, varios reputados académicos de distintas partes del mundo se habían instalado en nuestras universidades para colaborar en la formación de las primeras generaciones de matemáticos. Por solo nombrar un par, podemos destacar al estadounidense Herbert Clemens (distinguido en 2013 con el premio del Consejo Matemático de las Américas) en la Universidad Técnica del Estado (actual Universidad de Santiago de Chile) y al francés André Avez (quien posteriormente dirigiría la tesis de doctorado de Servet Martínez, galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1993) en la Universidad de Chile. Evidentemente, tras el golpe de Estado, todos ellos debieron abandonar el país, dejando inconclusos varios programas internacionales de colaboración académica.

Sobrevinieron entonces años difíciles, en que las restricciones a la libertad estancaron el desarrollo cultural y el despegue científico. La terrible imagen de la quema de libros es un ícono de esta época de letargo intelectual: todo material que fuese «peligroso», según el parecer de funcionarios no precisamente muy comprensivos de la actividad académica, debía ir a parar a una hoguera. A esta no escaparon los libros MIR, pues si el nombre de la editorial los hacía ya demasiado sospechosos, su procedencia, la Unión Soviética, los condenaba definitivamente. La situación se agravaba aun más debido a los acápitones: *Ciencia popular* y *Lecciones populares de ciencia*. Era mejor deshacerse de ellos ante la amenaza de un allanamiento, y por ningún motivo intentar explicar al interventor armado que se trataba de una simple coincidencia de nombres, que la palabra rusa *mir* (мир) significa, a la vez, «paz» y «mundo», y que los libros de MIR constituyen quizás la serie de divulgación científica más hermosa y de mayor impacto que se ha producido en toda la historia de la humanidad: [www.librosmir.com](http://www.librosmir.com).



Centenas de profesores, académicos universitarios y científicos sufrieron los avatares de la persecución política. Historias al respecto hay muchísimas, pero una de las más singulares es la que desencadenó que, el 29 de diciembre de 1984, la Sociedad de Matemática de Chile (Somachi) realizara una reunión extraordinaria en una localidad casi desconocida de la V Región: Catapilco.

Hasta el día de hoy este pueblo no alcanza los mil quinientos habitantes, pero arrastra algo de celebridad porque, en 1958, el regidor de la zona y exsacerdote Antonio Zamorano (más conocido como «el cura de Catapilco») se presentó como candidato a las elecciones presidenciales con la única intención de restar votos a Salvador Allende. Hasta ese mismo sitio, el matemático Douglas Fuenteseca, de la Universidad de Antofagasta, fue destinado en calidad de relegado político en 1984. La razón de esta determinación es inverosímil: junto con un par de colegas, Fuenteseca había coordinado la recolección de tres mil ochocientos pesos de la época para seguir ofreciendo almuerzo a treinta y ocho estudiantes becados en el mercado municipal, una vez que las autoridades habían cerrado el casino de la universidad (tirando a la basura lo que quedaba de comida) en represalia por una extensa jornada de paralizaciones en demanda de medidas de democratización.

Así de arbitrarias eran las resoluciones durante la dictadura. Generalmente, la pena de relegación estaba reservada a personas —en general muy ilustradas— consideradas «revoltosas» por sus ideas y capacidad de convocatoria, aun cuando se tuviese plena certeza de su inocencia respecto de cualquier delito. Los lugares de destino eran pueblos y campamentos de regiones extremas (Fuenteseca había sido destinado a Melinka, una localidad casi inaccesible en medio de los canales patagónicos; sin embargo, terminó recalando en Catapilco porque no había recursos para trasladarlo tan al sur). En estos lugares, los relegados eran duramente interrogados y permanecían estrechamente vigilados sin poder salir de sus límites, que devenían así los barrotes de una prisión al aire libre. Separados de sus familias y con sus vidas truncadas, debían, además, sobreponerse al escarnio público.

En 1984, la Somachi estaba presidida por Rolando Rebolledo, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile que tres años antes había regresado al país dejando su cargo de profesor de excelencia en la Universidad de París 11 (Orsay), reputada por tener uno de los mejores departamentos de matemática del mundo (quizás el mejor). Allí había colaborado con la asociación de ayuda humanitaria Sciences Chili, trabajando —entre otros— con Laurent Schwartz, ganador de una Medalla Fields en 1950, reconocimiento que le había sido otorgado por su famosa «teoría de distribuciones» (que generaliza la teoría de funciones y es vital para la resolución de ecuaciones diferenciales). Además de eminente científico, Schwartz era un líder de la comunidad matemática francesa y mantuvo un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos a lo largo de toda su carrera. Para fines de diciembre de 1984, ya había advertido a todas las sociedades matemáticas de Europa de lo que ocurriría en Catapilco.

A la sazón, el vicepresidente de la Somachi era Ricardo Baeza, quien más tarde, en 2009, sería galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Exactas. De la tensa organización del congreso se encargó todo el directorio, el cual incluía, además, a Ramón Correa Soto, por entonces en la Universidad Católica de Talcahuano; Jorge González, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Jorge Soto Andrade, de la Universidad de Chile; Rubí Rodríguez, entonces en la Universidad de Santiago de Chile (Usach), y Jaime Figueroa, quien trabajaba en la misma universidad. Para obtener la autorización especial (necesaria en la época para cualquier reunión oficial de más de dos personas), uno de los requisitos consistía en la entrega previa del programa detallado del encuentro nada menos que en la Gobernación Marítima de Valparaíso. Así, un documento dejó constancia allí de los títulos y resúmenes de cada una de las charlas: ciclos límites, campos de vectores, acciones de grupos, geometría hiperbólica, formas cuadráticas, procesos estocásticos, martingalas, etcétera. La sede escogida para el encuentro fue la Escuela Básica F48 de Catapilco, hoy llamada Escuela Mercedes Maturana Gallardo.

El día del encuentro, un grupo de participantes de Santiago viajó en bus desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Como era de esperar, durante todo el trayecto, este fue seguido de cerca por un automóvil. En la escuela los esperaba, además, un grupo de funcionarios de civil que había, por su parte, desalojado el retén de Carabineros. Cada uno de ellos portaba sus tradicionales gafas oscuras y varios exhibían sus armas de fuego. Se trataba, evidentemente, de agentes de la CNI.

En una primera instancia, el jefe del grupo se negó terminantemente a permitir la realización del encuentro, y cuando se le presentó el documento de la Gobernación Marítima que autorizaba la reunión, argumentó que de todos modos no se podía realizar, pues el local que se había asignado estaba cerrado con candado. Fue necesario que Rebolledo y Figueroa hicieran un viaje relámpago en automóvil hasta La Ligua para obtener una copia de la llave. Al regresar, y tras otra nerviosa discusión, pesó el argumento de la cobertura internacional del evento esgrimido por Rebolledo. Se accedió, entonces, a su realización y a que Fuenteseca participara con la condición de que, durante todo el día, él acudiera cada media hora al retén de Carabineros para firmar el libro oficial y constatar así su presencia. Además, el cabo de Carabineros a cargo de la circunscripción debía asistir a todas las charlas y reportear su contenido.

La conferencia inaugural fue dictada (con cerca de dos horas de retraso) por Gonzalo Riera, quien por esos años era académico de la Universidad de Santiago de Chile. El tema tratado fue la «teoría de grupos fuchsianos», que no es otra cosa que el estudio de las simetrías que dan lugar a embaldosados en geometría no euclidianas (capítulo 2). Tras esta charla, el cabo de Carabineros consideró innecesario presentarse nuevamente en la sala, y se retiró junto a varios colegas que también habían asistido. Aun así, Fuenteseca debió permanentemente seguir saliendo de la sala para atestiguar su presencia. El clima

se distendió aún más cuando llegaron los niños de la escuela, que si bien no tenían clases ese día sábado, iban ansiosos por su almuerzo. Se sorprendieron con las curiosas figuras y fórmulas en su pizarra de clases, y comenzaron a jugar a resolver problemas de matemática mientras comían. El presidente del Centro de Padres de la escuela, Carlos Silva, tenía preparado otro relajo para la noche, un asado de camaradería en una taberna de peculiar nombre: «Nunca se supo». Fuenteseca ocupó el puesto de cabecera en la mesa que compartieron los académicos con los carabineros del sector y varios lugareños (los funcionarios de gafas oscuras no aparecieron).

Gracias a este evento, al que se sumaron decenas de muestras de apoyo que vinieron, inclusive, desde la Unión Matemática Internacional, el trato a Fuenteseca en Catapilco se hizo mucho más cordial. Él recuerda que, semanas después, fue invitado a jugar un partido de fútbol: por un lado, el equipo de Carabineros, bautizado obviamente «Santiago Wanderers»; por el otro, su equipo, al que la autocensura varió el nombre de «Los relegados» a «Los regalones». Aunque nadie se acuerda del resultado del partido, todos recuerdan el terremoto ocurrido días después, el 3 de marzo de 1985. Una semana más tarde, previa presentación —entre otros documentos— de la carta reproducida a continuación, Fuenteseca fue liberado.




A pesar de este final «feliz», el evento no pasó inadvertido a los inquisidores políticos anclados en las universidades en la época. Los organizadores sabían que no les saldría del todo gratis, y así fue. En enero de 1985, tres doctores en matemática fueron arbitrariamente cesados de sus funciones en la Universidad de Santiago de Chile: Jorge Billeke, Jaime Figueroa y Rubí Rodríguez. Honrando la memoria de Billeke (doctor de la Universidad de Niza Sophia-Antipolis fallecido en 1997), cada año se premia al mejor estudiante de una carrera de matemática del país. Por su parte, Figueroa (doctor de la Universidad París-Sorbonne), quien había asumido un rol muy activo en la organización del encuentro y visitaba constantemente a Fuenteseca en Catapilco para informarse de sus condiciones de salud, trabaja hoy en la Universidad Técnica Federico Santa María. Finalmente, Rodríguez, quien había completado su doctorado en la prestigiosa Universidad de Columbia, siguió un peregrinar similar al de otras académicas exoneradas en esos años lúgubres (como la física Hilda Cid, la primera mujer chilena doctora en Ciencias Exactas, exonerada inmediatamente tras el golpe de Estado en la Universidad Austral). En la década de los noventa, Rodríguez fue condecorada con una Cátedra Presidencial por el impacto de su investigación en álgebra y geometría de números complejos, y actualmente dirige un centro de excelencia de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt). Se trata del proyecto Anillo «Geometría en La Frontera», anclado en la Araucanía, en el que se estudian —entre muchos otros temas— los grupos fuchsianos, los mismos sobre los cuales había versado la conferencia de apertura del congreso de Catapilco.



Niños jugando en los actuales recintos de la escuela de Catapilco. Obviamente, nadie osó tomar fotografías en el encuentro de 1984. Diez años después, la Somachi se reunió una vez más allí: apadrinó oficialmente la institución, hizo una donación de libros e inauguró un mural alusivo al relegamiento político. Lamentablemente, el muro fue derribado en una remodelación posterior y «nunca se supo» de esta noble y valiente acción de defensa de la dignidad científica y académica.

## BORIS WEISFEILER: LA OBRA IMPERECEDERA DEL MATEMÁTICO DESAPARECIDO EN CHILE EN 1985



A comienzos del año 2016 volvió a hacer noticia un viejo caso que, por estar aún en trámites judiciales, resulta incómodo de catalogar, pero en el que todo apunta a que se trataría de una de esas tragedias absurdas y abominables que solo pueden ocurrir en las épocas más oscuras de la historia: la desaparición del matemático Boris Weisfeiler en la cordillera de la VIII Región, no muy lejos de Colonia Dignidad.

Boris nació el 19 de abril de 1941 en la Unión Soviética. Pese a su talento temprano, sufrió las injusticias de varias generaciones de científicos de la URSS, a quienes, dada su ascendencia judía, se les castraba su carrera académica mediante diversas trabas. Aunque se las arregló para estudiar en la sede de Leningrado del prestigioso Instituto Steklov, sus problemas se agravaron cuando fue acusado de «antisoviético» por negarse a firmar una carta en contra de un colega. Abandonó la URSS en 1975, y se nacionalizó estadounidense en 1981. Por esos años, realizó una pasantía en el célebre Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, invitado por el suizo Armand Borel, uno de los algebristas más influyentes del siglo XX.

Tras la estadía, Boris se incorporó a la Universidad Estatal de Pensilvania. En ese entonces estaba ya en el cenit de su carrera, al punto de que en 1984 publicó un célebre artículo titulado «Strong approximation for Zariski-dense subgroups of semi-simple algebraic groups» en *Annals of Mathematics*. A juicio de los entendidos, esta es la revista más prestigiosa en matemática, o por lo menos comparte el honor con *Acta Mathematica*, *Inventiones Mathematicae*, *Journal of the American Mathematical Society* y *Publications Mathématiques de l'IHÉS* (aunque cualquier catalogación de este tipo es siempre discutible). Resulta ilustrativo señalar que solo tres matemáticos chilenos que trabajan en nuestro país han publicado en esta revista, y son nada menos que Rafael Benguria en 1992 (Premio Nacional de Ciencias Exactas 2005), Manuel del Pino en 2011 (Premio Nacional de Ciencias Exactas 2013) y el joven académico Giancarlo Urzúa en 2015.

El trabajo de investigación científica de Boris se centraba en una línea árida de la matemática: la teoría de grupos algebraicos. Recordemos que el vocablo «grupo» es utilizado para designar al conjunto de simetrías de un objeto y la manera en que estas interactúan (capítulo 2). Obviamente, el grupo dependerá de la geometría del objeto en cuestión. Ahora bien, la abstracción matemática permite definir la noción de grupo sin un objeto subyacente, y a partir de su estructura interna reconstruir dicho objeto. La relevancia de este proceso radica en que ha permitido descubrir de manera abstracta nuevas e insospechadas geometrías.

Al lidiar directamente con grupos se utilizan métodos algebraicos de gran formalidad. De alguna manera, se trabaja solo con variables e incógnitas pensando siempre en que hay un objeto por detrás, pero sin aferrarse nunca a él. Si mediante estos métodos se logra establecer un resultado, entonces este tendrá consecuencias —a veces inesperadas— sobre estos objetos «nebulosos» y su geometría.

Un bello recuento del trabajo de Boris lo constituye el artículo (en inglés) de Alexander Lubotzky, disponible en [www.ma.huji.ac.il](http://www.ma.huji.ac.il) «The Mathematics of Boris Weisfeiler». Allí luce destacado su teorema más espectacular, el que puede leerse de la siguiente manera: «Todo subgrupo del grupo de matrices de entradas enteras y determinante 1 que es denso en la topología Zariski es casi denso en la topología de congruencias». Aunque parece un trabalenguas, lo cierto es que este resultado de 1984 es una verdadera

joya de la matemática, y tardó años en ser completamente comprendido y asimilado por la comunidad académica.

En ese año de consagración, Boris decidió viajar a Chile. Él era un amante de las travesías por lugares apartados, con una vasta experiencia alrededor del mundo. Así, a pesar de lo inestable de la situación política de nuestro país, se embarcó desde Estados Unidos el día previo a la Navidad. Al llegar partió inmediatamente rumbo al sur: desde la ciudad de Los Ángeles subió a la Laguna del Laja, en la cordillera, y desde allí emprendió rumbo al norte caminando por las montañas. El 4 de enero de 1985 se perdió su rastro.

**¿Ha visto a este hombre?**



**La familia del estadounidense Boris Weisfeiler, desaparecido desde enero de 1985, solicita información sobre su suerte y paradero.**

**Boris Weisfeiler, profesor universitario de 43 años, llegó a Chile el 25 de diciembre de 1984 para excursionar en la precordillera de la Octava Región. Hablaba muy poco español. Fue visto por lugareños en los primeros días de enero 1985, en la confluencia de los Ríos Ñuble y Los Sauces, cerca de San Fabián de Alico. Desde entonces, está desaparecido.**

**Quien tenga información sobre lo ocurrido con Boris Weisfeiler, rogamos contactar a:**

**Casilla 2009, Correo 21, Santiago, Chile**  
**Email: borischile85@hotmail.com**

**O al Encargado de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos en Santiago: Av. Andrés Bello 2800. Fono: 330-3334.**

**La información entregada a la familia Weisfeiler será tratada con confidencialidad.**

Copia del aviso que circuló para dar con el paradero de Boris tras su desaparición.

Se cuenta que Boris era capaz de atravesar ríos mediante una técnica hindú que consiste en fabricar una balsa de madera, recostarse boca abajo sobre ella y dejarse llevar por la corriente. Por eso, en una primera instancia, la versión oficial sobre su desaparición, según la cual se habría ahogado en la confluencia de los ríos Los Sauces y Ñuble al tratar de cruzar el primero, era bastante plausible. Aun más, esta había sido parcialmente corroborada por la Sociedad de Matemática de Chile, que había instaurado una comisión investigadora independiente para el caso, a pesar de las dificultades y el peligro que conllevaba una acción de este tipo en la época.

Sin embargo, poco a poco fueron apareciendo antecedentes que hacían de este un caso escabroso. Lamentablemente, muchos salieron a la luz pública varios años después, pues estaban clasificados como secretos por los servicios de inteligencia estadounidenses. En ellos se menciona a un testigo clave, de nombre de chapa «Daniel», que hasta ahora permanece no identificado. Él habría afirmado que una patrulla de Carabineros, en compañía de militares, secuestró y entregó a Boris en Colonia Dignidad, distante unos pocos kilómetros del lugar. Allí habría sido interrogado, torturado y finalmente ultimado de un balazo en la cabeza. Lo concreto es que hasta el día de hoy no se ha podido establecer qué ocurrió realmente, y los testimonios son, a veces, contradictorios. Esto ha hecho circular una serie de mitos al respecto, varios de los cuales fueron recopilados (y algunos desmentidos) en el agudo libro de investigación periodística *El último secreto de Colonia Dignidad*, de Carlos Basso, al cual se suma un programa especial de la serie *Enigma*, de TVN que, lamentablemente, dejó de estar disponible en internet.

Se dijo, por ejemplo, que a Boris se le detuvo pues se creyó que había cruzado la frontera desde Argentina de manera ilegal; que en un inicio se pensó que era un infiltrado del MIR, que por esos años trataba de ejecutar su «Operación Retorno»; que en Colonia Dignidad se pensó que Boris era un agente del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, y que también era un cazador de nazis cuya presencia en el sector se debía a que por esos días se esperaba una visita «ilustre» en la Colonia: el «Doctor Muerte» Josef Mengele (esto último es bastante poco verosímil pues, como se constató más tarde, Mengele había fallecido en 1979 en Brasil); que para establecer rápidamente qué había sucedido con este ciudadano estadounidense, la CIA envió como agente encubierto a un antiguo huésped de la Colonia: Michael Townley (aquel que, entre varios otros crímenes, en 1976 cometió uno de los primeros atentados terroristas en Estados Unidos al colocar una bomba en el automóvil que trasladaba a Orlando Letelier —otro raro embajador chileno en ese país— y su secretaria, la norteamericana Ronnie Moffitt, y hacerla

explotar cuando pasaban a solo metros de la Casa Blanca); que Weisfeiler había sido visto varios años después realizando trabajos forzados en la Colonia, al igual que otro joven desaparecido en 1985, el holandés Maarten Melle Ville, y que podría aún estar vivo.


Sobre la base de antecedentes muy fundamentados, y tras largos años de insistencia y presión, en 2012 el juez Jorge Zepeda decretó procesar, por secuestro calificado y complicidad, a cuatro excarabineros y cuatro exmilitares (ver en YouTube «Por secuestro calificado procesan a uniformados en desaparición de Boris Weisfeiler»). Una luz de esperanza se abría entonces para los colegas y amigos de Boris, su familia, y muy especialmente su hermana Olga, quien desde el inicio tomó las riendas de esta lucha.

Lamentablemente, en marzo de 2016 llegó una sentencia final lapidaria: si bien quedó establecido que Boris fue secuestrado y hecho desaparecer, la pista de Colonia Dignidad fue descartada, su crimen no fue catalogado como de lesa humanidad y, en concordancia con nuestra ley, se aplicó su prescripción.

Este fallo, por lo menos cuestionable a la luz de los antecedentes, causó consternación no solo entre quienes seguían de cerca el proceso, sino también en la comunidad científica tanto nacional como internacional. Tras estudiarlo en detalle, la Sociedad Matemática de Chile hizo una declaración pública al respecto, y paralelamente lanzó una campaña de adhesión dentro de la comunidad académica mundial ([www.somachi-weisfeiler.com](http://www.somachi-weisfeiler.com)) a la que se sumó —entre otros— el presidente de la American Mathematical Society, institución que preparó su propia declaración pública. Olga Weisfeiler viajó nuevamente a Chile, esta vez para presentar una apelación a la sentencia.

Es de esperar que esta historia continúe por la senda del esclarecimiento total de la verdad. Por lo pronto, de Boris nos seguirá quedando el tributo a su memoria (<http://weisfeiler.com/boris>), un manuscrito póstumo rescatado desde su oficina de trabajo y recientemente reescrito por iniciativa de su hermana (<http://arxiv.org> «On the size and structure of finite linear groups»), y el grueso de toda una obra científica que seguirá encantando a nuevas generaciones de matemáticos de todo el planeta por su belleza y profundidad.

## FELICIDAD FRAUDULENTA



Es bien sabido que el sistema de publicaciones científicas no es infalible. En efecto, existen numerosos casos de alteración de datos, ya sea estadísticos o de laboratorio, con los que se pudo justificar falsos resultados de cierta espectacularidad, los cuales llegaron a ser publicados en las revistas de más alto nivel. Sin embargo, una vez que el origen fraudulento fue puesto en evidencia, los autores debieron disculparse públicamente, y las revistas retiraron los artículos de sus sitios de internet.

Como toda actividad humana, la supuestamente impoluta ciencia ha estado desde siempre sujeta a las vicisitudes del ser humano. A esto debe añadirse un fenómeno relativamente reciente: el exacerbado interés por aumentar la productividad de los investigadores y el impacto cuantitativo de su trabajo. Todo lo anterior ha generado un incentivo perverso, que no solo ha ido en desmedro de la calidad de la producción, sino que, muchas veces, también ha contrariado reglas deontológicas básicas. Paralelamente, y en parte derivado de lo anterior, ha surgido un sinnúmero de agencias comerciales que han distorsionado el proceso de la publicación científica, transformándolo en una actividad netamente comercial en la cual los controles editoriales son mínimos y en la que, en ocasiones, se llega incluso al descaro de cobrar a los propios autores por publicar (sumado al cobro habitual que se hace a las instituciones por el derecho a tener acceso a los documentos ya publicados). Aun más, estas agencias también han incursionado en la organización de conferencias, ideando encuentros de dudosa reputación académica que, a veces, tienen lugar en destinos turísticos paradisíacos y cuyos precios por la participación son escandalosos.

Para poner en evidencia estos problemas, un equipo de estudiantes del Laboratorio de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) realizó un experimento muy ingenioso: ideó un programa computacional —al que denominó SCIGen— que selecciona aleatoriamente frases, gráficos, imágenes e incluso parte de la bibliografía de miles de trabajos que navegan en la red, los articula de manera aparentemente coherente y genera un supuesto artículo de investigación que, a simple vista, da la impresión de ser serio. Sin embargo, con la lectura de unas pocas líneas, cualquier académico podría constatar que su contenido carece absolutamente de sentido. Este programa está libremente disponible al público en el sitio <https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen>. De este modo, haciendo un simple clic, usted puede generar su propio artículo científico en el área de la computación teórica, para después someterlo a revisión a una revista internacional. Así lo hicieron Daniel Aguayo, Maxwell Krohn y Jeremy Stribling con «Rooter: A methodology for the Typical Unification of Access Points and Redundancy», trabajo que, increíblemente, fue aceptado para publicación en las *Actas de la Conferencia Mundial en Sistémica, Cibernética e Informática* del año 2005. Hasta el día de hoy, se calcula que unos ciento cincuenta artículos generados por este programa han sido publicados en revistas especializadas y actas de conferencias.

# Rooter: A Methodology for the Typical Unification of Access Points and Redundancy

Jeremy Stribling, Daniel Aguayo and Maxwell Krohn

## ABSTRACT

Many physicists would agree that, had it not been for congestion control, the evaluation of web browsers might never have occurred. In fact, few hackers worldwide would disagree with the essential unification of voice-over-IP and public-private key pair. In order to solve this riddle, we confirm that SMPs can be made stochastic, cacheable, and interposable.

## I. INTRODUCTION

Many scholars would agree that, had it not been for active networks, the simulation of Lamport clocks might never have occurred. The notion that end-users synchronize with the investigation of Markov models is rarely outdated. A theoretical grand challenge in theory is the important unification of virtual machines and real-time theory. To what extent can web browsers be constructed to achieve this purpose?

The rest of this paper is organized as follows. For starters, we motivate the need for fiber-optic cables. We place our work in context with the prior work in this area. To address this obstacle, we disprove that even though the much-touted autonomous algorithm for the construction of digital-to-analog converters by Jones [10] is NP-complete, object-oriented languages can be made signed, decentralized, and signed. Along these same lines, to accomplish this mission, we concentrate our efforts on showing that the famous ubiquitous algorithm for the exploration of robots by Sato et al. runs in  $\Omega(n + \log n)$  time [22]. In the end, we conclude.


## II. ARCHITECTURE

Our research is principled. Consider the early methodology by Martin and Smith; our model is similar, but will actually overcome this grand challenge. Despite the fact that such a claim at first glance seems unexpected, it is buffeted by

Inicio del «artículo» de Aguayo, Krohn y Stribling, de contenido totalmente incoherente. Ahora bien, este no es, en absoluto, el caso más emblemático de ausencia de control editorial. En efecto, el mismo año 2005, David Mazières y Eddie Kohler consiguieron la aceptación, por parte del *International Journal of Advanced Computer Technology*, de un artículo de varias páginas cuyo texto es una repetición de una única frase que puede ser suavemente traducida como: «Sáquenme de su lista de correos de mierda». Y si bien el artículo finalmente no fue publicado, fue simplemente porque los autores se negaron a pagar el costo económico de la impresión.


Así, en pleno siglo XXI, tienen lugar de manera reiterada versiones modernas de la historia del señor Goodwin, quien a fines del siglo XIX pretendió percibir dividendos económicos de su falso descubrimiento de que  $\pi$  es igual a 3.2 (capítulo 8). Para constatar aquello, basta observar el gráfico ilustrado abajo, el cual evidencia el crecimiento en las últimas décadas de la cantidad de artículos científicos fraudulentos, plagiados, erróneos o duplicados que los respectivos comités editoriales han decidido retirar de los sitios electrónicos de las revistas (una publicación es considerada «duplicada» cuando el mismo autor la hace publicar en al menos dos revistas diferentes, con diferente título, con un ligero trabajo de edición y sin el consentimiento de las editoriales involucradas; todo lo cual, lógicamente, está expresamente prohibido por las revistas especializadas).

## CAUSAS DE RETIRO DE ARTÍCULOS



Existe, sin embargo, un fenómeno muchísimo más sutil; un mundo donde el engaño se vuelve incómodo de enrostrar, pues se deambula por el resbaladizo sendero de la interdisciplina. En esta ruta, a menudo se seduce a un público incauto a través de la matemática, la cual es esgrimida como «prueba irrefutable» de alguna afirmación cuestionable, argumento que resulta difícil de contraatacar dado el sitial a la vez sacrosanto e inaccesible en el que la sociedad y el mundo académico tienden a colocar a esta ciencia.

Un episodio histórico de este tipo lo constituye la famosa «teoría» topológica del psicoanalista francés Jacques Lacan. Según él, diversas características psicológicas se configurarían de acuerdo con reglas matemáticas. Por ejemplo, todo sujeto sería algo así como aquello que resulta de disponer lo real, lo imaginario y lo simbólico en una configuración anudada como la exhibida más abajo, muy estudiada en topología (capítulo 13). De esta forma, los estados «psicóticos» serían la consecuencia del «desenganche» de uno de los anillos.



Los denominados anillos «borromeos» constituyen un ejemplo básico de la «teoría de nudos», una de las ramas de la topología. En esta configuración, si bien los tres anillos están «enlazados» unos con otros, al retirar cualquiera de ellos, los otros dos se desenlanzan automáticamente.

Me resulta especialmente difícil extenderme en torno a estas afirmaciones. Por una parte, no podría hacerlo de manera muy entusiasta, pues coincido con la gran mayoría en que aquí no hay más que simple especulación y una llamativa analogía visual. Por otra parte, sin importar la descripción que haga, seguramente los «lacanianos» más acérrimos dirán que esta es incorrecta y que, en realidad, la teoría es muchísimo más profunda, aunque ciertamente impenetrable. A fin de cuentas, tal como señalara certeramente el exlacaniano Dylan Evans, estos discípulos «asumen como verdad cualquier frase que “el maestro” diga... Jamás está en cuestión si él estaba o no en lo correcto. Sus textos son como escritura santa».


El célebre lingüista Noam Chomsky fue también muy ácido en comentar estas ideas. Para él, Lacan «era un charlatán deliberado que solo trataba de jugar con la comunidad intelectual parisina para ver cuántos disparates podía decir sin que dejaran de tomarle en serio». Pero quienes hicieron la crítica más rigurosa y sistemática de la obra de Lacan fueron los físicos Alan Sokal y Jean Bricmont, en su famoso libro *La impostura intelectual*, de lectura indispensable en el estudio de la filosofía de las ciencias. Allí, atacan duramente al francés —entre varios otros— por usar lenguaje matemático de forma incorrecta y totalmente fuera de contexto para aparentar rigor científico, y se dan el trabajo de describir uno a uno los graves errores conceptuales en los que incurre al respecto (el más notable es aquel en el que simplemente confunde los números irracionales con los imaginarios, también llamados complejos).

Con anterioridad a la publicación de dicho libro, Sokal ya gozaba de gran notoriedad por haber logrado que la revista de estudios culturales *Social Text* aceptara su artículo titulado «La transgresión de las fronteras: hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica», texto intencionadamente seudocientífico en el que postula nada menos que la gravedad cuántica es un constructo social. Lo cierto es que todo se trataba de una humorada muy seria a través de la cual Sokal intentaba probar que muchas revistas de humanidades están llenas a publicar sinsentidos mientras estos «suenen bien y apoyen los prejuicios ideológicos de los editores». A lo anterior yo agregaría otro punto relevante: el soporte institucional del autor. En efecto, muy probablemente, ese texto nunca habría sido aceptado si hubiese

sido firmado por un investigador africano, latinoamericano o de una universidad desconocida del primer mundo.

Si bien el libro de Sokal y Bricmont fue posteriormente contraatacado por Jurdant Baudouin en su libro casi homónimo *La impostura científica*, lo cierto es que cumplió la refrescante misión de denunciar una práctica malsana en este pantanoso punto de encuentro entre humanidades y ciencias exactas. La lucha de Sokal no se detuvo allí: una de las últimas víctimas a las que dirigió sus críticas se trata nada menos que de un investigador chileno, Marcial Losada, y su «teoría» del *Meta Learning* (la «ciencia» de los equipos de trabajo de alto desempeño).

Poco antes, en 2011, me correspondió dar una señal de alerta sobre este asunto. Ciento día, me enteré de una persona que, se decía, había revolucionado el mundo de la organización empresarial importando ideas desde la matemática. Me enteré también de que dictaba una charla magistral (a la que solo se podía asistir previo pago) en un concurrido hotel capitalino, la cual era promocionada por el club de lectores de *La Tercera* con el curioso afiche reproducido abajo.



Intrigado, comencé a investigar sobre dicha teoría hasta llegar a la referencia de origen, un artículo titulado «The complex dynamics of high performance teams», publicado en la revista especializada *Mathematical and Computing Modelling* en 1999 (en <http://citeseerx.ist.psu.edu>). Los primeros párrafos de este texto son muy interesantes. En ellos, el autor describe un experimento en el cual habrían participado los equipos de trabajo de diversas empresas. Estos eran citados a un «laboratorio» para sostener allí sus reuniones habituales, y las interacciones entre sus miembros eran escrutadas y tipificadas en lo relativo a tres aspectos: indagación o abogación, orientación hacia sí mismo o hacia el otro, realimentación positiva o negativa. El punto de quiebre en el artículo ocurre cuando los tres parámetros así obtenidos son relacionados sin mayor explicación hasta originar, por medio de un simple artificio retórico, exactamente las mismas ecuaciones que, unas décadas antes, Edward Lorenz había hallado para un modelo meteorológico simplificado, las cuales constituyen una de las ecuaciones más importantes de la matemática moderna por estar en los orígenes de la teoría del caos (capítulo 17). A partir de este punto, en el artículo se deja de mencionar el experimento original, y todas las conclusiones se basan única y exclusivamente en el modelo matemático dudosamente obtenido. Los datos empíricos que debían fundamentar estas ecuaciones no son presentados en el escrito y, hasta el día de hoy, nunca se han hecho públicos. Es así como la precisión intimidante de la ciencia matemática pasaba entonces a ser la prueba incuestionable de frases tan obvias como «en los equipos de bajo desempeño nadie escucha a nadie y todos esperan el turno para decir lo que piensan», o «en los equipos que “florecen”, las personas no solo se vuelcan hacia los otros, sino que no se olvidan de sí mismas».

Contrariado, ese mismo año publiqué mi artículo crítico titulado «Un caso de inconciencia (¿?)» en *Images des Mathématiques*, del Centre Nationale la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia. Con toda la cortesía que amerita la discusión en francés, allí se hace claramente alusión al carácter seudocientífico de la publicación de Losada. Pero de manera más relevante, se hace hincapié en la cuota de responsabilidad que les compete a los comités editoriales de las revistas científicas al momento de avalar este tipo de trabajos. A final de cuentas, con una validación de este tipo, la teoría de Losada era (y, según entiendo, sigue siendo) enseñada como una verdad plena y transparentemente establecida en varias universidades chilenas (entre ellas, la Universidad del Mar), fue instruida en jornadas de capacitación con miras a la reconstrucción posterior al terremoto de 2010, ha sido tema recurrente de columnas de opinión empresarial en diversos medios de prensa y es difundida en numerosos videos disponibles en internet.

Sin conocer mi escrito, en 2013, Sokal, en conjunto con Nicholas Brown y Harry Friedman, también lanzaron sus dardos contra el artículo de Losada. Sucede que, paralelamente, este había servido de

sustento teórico a toda una teoría en psicología conocida como la «positividad», según la cual, someramente, las relaciones interpersonales están supeditadas a un cierto umbral (al que algunos llaman «el número de la felicidad»; vea en [www.latercera.com](http://www.latercera.com) el artículo «Modelo Meta-Learning: construyendo equipos de alto desempeño. Cursos claves en equipos de alto desempeño»); por debajo de este, ellas tienden a ser destructivas, y por encima del mismo, los involucrados tienden a potenciarse mutuamente. En un trabajo sistemático, Brown, Friedman y Sokal fueron derrumbando uno a uno los postulados seudomatemáticos de todos los textos en cuestión. Como resultado, el artículo «Positive Affect of the Complex Dynamics of Human Flourishing», coescrito por Losada y la psicóloga Barbara Fredrickson, fue retirado del sitio de internet de la revista *American Psychologist*, donde originalmente había sido publicado en 2005. En cuanto al artículo de 1999 de Losada, este sigue siendo visible en el sitio de internet de la revista, si bien una petición de retiro fue formalmente extendida en 2013.

Por cierto, aún quedan defensores del *Meta Learning* y la «positividad», entre los cuales se cuenta, obviamente, al propio Losada. Sin embargo, esta defensa consiste tan solo en el uso de argumentos retóricos o de autoridad. Para la comunidad científica, en cambio, es claro que estas teorías no cuentan, al menos hasta ahora, con absolutamente ningún sustento matemático. Y si —tal como algunos sostienen todavía— sus lineamientos generales funcionan perfectamente en la práctica, esto no debiese ser entendido sino como una evidencia de algo muchísimo más sencillo: el sentido común.

## CURIOSAMENTE MATEMÁTICOS



Se cuenta que la reina Victoria de Inglaterra quedó tan maravillada al leer *Alicia en el país de las maravillas*, que dirigió una nota al autor pidiéndole que le enviara su próxima obra. Su sorpresa fue mayúscula cuando recibió una copia del *Tratado elemental sobre determinantes*. Y no se trataba de un error, pues Lewis Carroll era tan solo el seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson, quien, además de escritor, fotógrafo y reverendo de la Iglesia anglicana, era un destacado matemático (y, claramente, tenía un agudo —y muy británico— sentido del humor).



Fotografía (tomada por el propio Carroll) de Alice Liddell, una de las niñas a quienes fue dedicado el cuento. Todos los juegos de tamaños de personajes y objetos en el libro tienen un evidente contenido geométrico, y las discusiones absurdas de diversos pasajes —especialmente los de la famosa escena de la mesa del té— tienen un trasfondo lógico (Carroll era especialista en álgebra, geometría y lógica). Resulta lamentable que estos aspectos hayan sido completamente desdeñados no solo en la última adaptación al cine de la obra (realizada por Tim Burton), sino también por la mayoría de las críticas a ella.

Increíblemente, este pequeño detalle biográfico es bastante poco conocido. Es más, existe un estereotipo muy arraigado en torno a la gente de ciencia, según el cual serían personas aburridas, monótonas, incapaces de tener una vida más allá de su trabajo e incluso de entablar relaciones interpersonales. Y si se trata de matemáticos, peor aun, pues a todo lo anterior se suma el más tradicional de los calificativos: «cuadrados». Sobre esto último, muy iluminadoras son las palabras de Sofía Kovalévskaya respecto de la matemática: «Lo cierto es que esta ciencia requiere mucha imaginación». Resulta revelador señalar que numerosos matemáticos y personas ligadas a la ciencia han desarrollado en forma paralela las más variadas actividades, destacando muchas veces en distintas facetas. Por ejemplo, Paul Painlevé, gran matemático francés de fines del siglo XIX y principios de siglo XX, fue también un hombre de Estado, y ocupó el cargo de ministro de Guerra de su país en dos períodos (uno de ellos durante el fin de la Primera Guerra Mundial). Del mismo modo, Gottfried Leibniz, de quien se afirma que creó el cálculo diferencial e integral unos años antes que Newton, también era filósofo, bibliotecario y político; Pierre de Fermat era hombre de leyes, y la matemática era para él tan solo un pasatiempo; Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería moderna (y en honor a quien se celebra cada 12 de mayo el Día de la Enfermera), desarrolló sus importantes trabajos en estadística y modelamiento matemático de epidemias como fruto de las anotaciones sobre los enfermos a los que trataba; Emanuel Lasker, célebre algebrista, ostenta hasta hoy el récord de años como campeón mundial de ajedrez (1894 a 1921), y no pudo ser destronado sino hasta la aparición en el circuito del mítico cubano José Capablanca; Patrick Billingsley, destacado investigador estadounidense en probabilidades, era también actor de cine y televisión; Wiesław Szlenk, matemático polaco especialista en sistemas dinámicos, era un reconocido montañista; esta misma pasión por la montaña sedujo al ruso Boris Delaunay, quien además de especialista en geometría y teoría de números fue un gran promotor de las Olimpiadas de Matemáticas para estudiantes; y José Luis Massera, eminente investigador uruguayo en ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos, fue un político de relevancia (llegó a ser diputado de la república en dos períodos consecutivos, pero sufrió la persecución y el encierro durante la dictadura en su país).

Y si piensa que estas actividades «complementarias» no son tampoco de lo más entretenidas, a continuación le relato dos casos del siglo XX que por motivo alguno podrán dejar de parecerle apasionantes.

### **Harald Bohr (1887-1951): goleador olímpico**

En una de las semifinales de fútbol de las Olimpiadas de Londres en 1908 se enfrentaron Dinamarca y Francia. Aunque se esperaba una presentación contundente de los galos, el resultado fue de 17-1 a favor de los daneses, en la que es hasta hoy la mayor goleada en una cita olímpica. Fue tal la vergüenza de los franceses, que se retiraron del campeonato sin disputar el tercer lugar. Y si bien quienes se llevaron finalmente la presea dorada fueron los locales, esta generación de jugadores daneses (que repetiría el segundo lugar en 1912) sería la más exitosa de su país hasta que, en 1992, otra generación dorada conquistara un gran triunfo: la Eurocopa. La máxima estrella en aquella cita olímpica fue Sophus Nielsen, quien marcó diez goles en aquel mítico partido. Junto a él militaba un joven delantero que, paralelamente, cursaba un Doctorado en Matemática en la Universidad de Copenhague: Harald Bohr. Dos años más tarde tuvo lugar su defensa de tesis, a la cual asistió la selección de fútbol en masa y que acabó no solo con las felicitaciones de la comisión académica, sino también con vítores y cánticos de barra.

Esta doble pasión por el deporte y la ciencia le había sido inculcada por su padre, Christian, quien era físico, fisiólogo y futbolista, fundador (en 1889) del Akademisk Boldklub, equipo que hoy milita en la primera división danesa. El hermano de Harald, Niels, llegó a jugar como arquero en equipos de cierta categoría. Sin embargo, cuentan que una vez lo sorprendieron con un gol de media cancha mientras él estaba distraído resolviendo un cálculo mental. Así, su carrera en el fútbol no llegó tan lejos como la de su hermano, pero se convirtió en un célebre físico que aportó significativamente en la confirmación de la mecánica cuántica a través de su modelo atómico. En virtud de ello, le fue adjudicado el Premio Nobel de Física en 1922. Uno de los hijos de Niels, Aage, obtuvo el mismo premio en 1975. Otro de sus hijos, Ernest, llegó —al igual que su tío— a unas Olimpiadas en Londres, esta vez en 1948 y como miembro del equipo de hockey.

Harald hizo importantes aportes al estudio de la relación entre el cálculo diferencial e integral y el comportamiento de los números enteros. Aunque se trata de asuntos altamente técnicos, sus resultados (como el famoso teorema de Bohr-Mollerup) son tema obligado en estas materias. Además, colaboró con el estudio analítico de las así llamadas funciones cuasiperiódicas. Si bien su interés provenía de su uso para la resolución de ciertas ecuaciones diferenciales, hoy en día son muy utilizadas en el tratamiento matemático de los embaldosados cuasiperiódicos (capítulo 4).

Harald era de ascendencia judía y, como tal, debió lidiar con el antisemitismo creciente derivado del ascenso del nazismo en Europa. Criticó duramente a sus colegas alemanes que adhirieron a esta ideología y/o participaron del hostigamiento a sus colegas de origen judío (entre estas víctimas se cuenta a Edmund Landau, quien había sido su director de tesis) y colaboró con el periódico de resistencia *El danés libre*. Pero ciertamente, su doble militancia matemático-deportiva es lo que lo pone en el Partenón. Allí, comparte un sitial de honor con el sabio helénico Eratóstenes, quien además de medir la circunferencia de la Tierra (capítulo 14) y heredarnos su método para buscar números primos (capítulo 31), llegó a ganar un pentatlón olímpico.



La selección de fútbol de Dinamarca, vicecampeona olímpica del año 1908, con Harald Bohr «etiquetado».

### Hedy Lamarr (1914-2000): estrella de Hollywood

En 1933, la película *Éxtasis* causó revuelo mundial pues, en ella, la protagonista, interpretada por la actriz de apenas dieciocho años Hedwig Eva Maria Kiesler, incurrió abiertamente en actos de infidelidad y protagoniza no solo una larga secuencia en desnudo completo, sino también la primera escena de un orgasmo femenino en el cine. El papa Pío XI condenó públicamente la cinta, que fue prohibida en Alemania por orden expresa de Hitler. Paradójicamente, en Italia participó del Festival de Cine de Venecia a petición de Mussolini. Aun así, debió enfrentar la censura en la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, donde, sin embargo, fue nominada a un premio Óscar.

Los padres de Eva intentaron salvar su honor casándola a la fuerza con el multimillonario fabricante de armas austriaco Fritz Mandl, quien, durante los años de convivencia, ejerció un tiránico control sobre todas las actividades de ella. En esa época de martirio, Eva ocupó una buena parte de su tiempo en sus estudios de ingeniería, pues desde niña había manifestado un talento excepcional para las ciencias, llegando a ser catalogada incluso como superdotada. Además, dadas las actividades de su esposo, y a pesar de su origen en parte judío, logró entablar relaciones con altos dirigentes tanto del gobierno nazi en Alemania como del fascista en Italia, de quienes obtenía información sobre la tecnología de la época. En 1937, en una cena social con su marido, escapó por la ventana del restaurante portando todas sus joyas. Huyó primero a París y luego a Londres, donde conoció al productor de cine estadounidense Louis Mayer. Acabó entonces recalando en Estados Unidos, y desde ese momento pasó a llamarse Hedy Lamarr.

Lamarr es considerada una de las actrices más hermosas de toda la historia del cine. Y aunque en su carrera no ocupó roles considerados muy sobresalientes, aparte de su papel en *Éxtasis* se recuerda especialmente el que tuvo en *Sansón y Dalila* en 1949. De esa época data también una de sus frases satíricas más memorables: «Cualquier chica puede ser glamorosa; lo único que tiene que hacer es quedarse quieta y parecer estúpida»<sup>[2]</sup>.

Pero Lamarr tenía un sinnúmero de otros dones. Al llegar a Estados Unidos, entregó toda la información que había recopilado sobre la tecnología bélica nazi. Además, nunca descuidó su veta creadora. De hecho, si bien era una notable matemática y física, fue en este campo donde más se destacó, tanto así que, honrando su natalicio, cada 9 de noviembre se celebra el Día Internacional del Inventor. Su invento más celebrado, en colaboración con el compositor musical, pianista y también inventor

estadounidense George Antheil, consistió en el desarrollo de un sistema de telecomunicaciones secreto con miras a que los misiles teledirigidos no pudiesen ser detectados por el enemigo. Dicho sistema, conocido como de «espectro expandido», ha evolucionado con el tiempo, saliendo del mero campo de aplicación militar y llegando hoy en día a casi todo el mundo, pues es precursor de la tecnología wifi. Así, gracias a la propia Lamarr, ahora usted puede ver tranquilamente la escena que escandalizó al mundo en 1933 (YouTube, «Hedy Lamarr in Ekstase»).




Hedy Lamarr en una fotografía publicitaria de 1940.

Lamentablemente, la televisión y el mismo cine de Hollywood se han encargado de profundizar aun más el estereotipo de la gente de ciencia. Y si bien es cierto que personajes como los de la serie *The Big Bang Theory* existen en la realidad, es sano mencionar que ellos aparecen también en toda actividad humana. Además, insistir una y otra vez en estos estereotipos opaca a otros personajes muchísimo más interesantes, como lo son, sin duda alguna, los siguientes matemáticos aún activos: el prestidigitador estadounidense Persi Diaconis (capítulo 27), la saltadora de garrocha y escaladora italiana Anna Giordano, el triatleta estadounidense Ken Ono, la escultora mexicana Alba Cama Rojo, el cantante y pianista estadounidense Tom Lehrer, el escritor israelí Aner Shalev, la poetisa y guía de zen estadounidense Judith Roitman, el compositor y músico canadiense Dan Snaith, la defensora de derechos humanos rusa (y candidata al Premio Nobel de la Paz) Svetlana Gannushkina, la pintora estadounidense Maria Klawe, el pianista sueco Per Enflo, la escritora india Mangala Narlikar, el automovilista y conductor de ambulancias francés Gerard Duminy, la actriz estadounidense Danica McKellar, el malabarista francés Stéphane Lamy, el actor sueco Mårten Andersson el político israelí Alex Lubotzky, el triatleta brasileño Krerley Olivera, el escritor y músico argentino Pablo Amster, el artista chileno Rodrigo Bamón (capítulo 16), y muchos, muchos otros.

Y saliendo un poco del estricto ámbito de la matemática, no puedo dejar de mencionar al que seguramente es el más famoso de todos: el astrofísico Brian May, histórico guitarrista (y, para los entendidos, el «verdadero cerebro») de la banda Queen. Así que no lo olvide nunca: la canción «I want to break free» («quiero liberarme»), aquella del mítico comercial televisivo del automóvil, no es solo el canto de liberación de Freddy Mercury (apropiado como cántico por el Congreso Nacional Africano en su lucha por la libertad en Sudáfrica), sino que es también un pequeño himno a la ciencia, pues no se puede ser científico si no se es —o, al menos, no se intenta ser— libre.



A la izquierda: Brian May en su visita al observatorio de cerro Paranal (al sur de Antofagasta) en septiembre de 2015. A la derecha: Pablo Amster durante su presentación «Tango y Matemáticas: un concierto para números y guitarra», acto de cierre del Primer Festival de Matemáticas del país, realizado en Valparaíso en diciembre de 2016. Abajo: Danica McKellar, muy recordada por su rol de Winnie Cooper en la serie televisiva *Los años maravillosos*.



## LA BLANCA FLOR DE LA MATEMÁTICA




Debemos nuestro sistema de numeración actual en gran parte a los árabes, quienes lo tomaron desde la India y lo introdujeron en España y, desde allí, a toda Europa. Esta no es sino una de las muchas notaciones y palabras utilizadas hoy en matemática que nos han llegado desde esas lejanas tierras. Por ejemplo, *álgebra* es una palabra árabe que significa *recomposición*, y la teoría subyacente es considerada una creación del sabio persa Al-Juarismi (780-850 d. C. aprox.) introducida en Europa por Fibonacci (capítulo 29). La palabra *algoritmo* también es de origen árabe, aunque se le disputa cierta etimología griega y latina. También hay otros términos más bien ligados a la astronomía que son frecuentemente usados hoy en día, como *cenit* (punto más alto que alcanza un astro sobre un observador en la superficie), *nadir* (el opuesto al cenit en la recta que pasa por este y el centro de la Tierra) y *acimut* (ángulo entre la dirección del norte y aquella de la proyección de un cuerpo sobre la superficie terrestre).

Pero, sin duda alguna, la más bella de todas estas palabras con contenido matemático es otra: en árabe, *al-zahar* significa «la flor», y *azahar* pasó al castellano para designar a toda una gama de flores blancas que incluye las del naranjo, el limonero y el cidro.



¿Y la relación con la matemática? Sigue que los dados con los que se acostumbraba a jugar en torno al siglo XIII d. C. tenían pintada una de estas flores en la cara que corresponde al 1. De allí nació el vocablo *azar*. Así, en un principio, la expresión «juego de azar» se restringía solo al juego de los dados, pero pronto se extendió a todo tipo de juegos en los que la suerte, y no una estrategia, es la que determina el resultado. No obstante, *azar* compite con otros dos términos: *aleatorio*, del latín *alea* —suerte— (término que proviene del nombre de los huesos de muñecas y rodillas y con los cuales eran fabricados los dados), y *estocástico*, del griego *stokhos* —dardo— (de *dado* a *dardo* hay una *r* de diferencia, pero también algo más profundo, pues el juego de los dardos no es totalmente azaroso). El estudio de «las leyes del azar» conforma la teoría de las probabilidades, una de las ramas más fecundas y vistosas de la matemática del siglo XX.

Los orígenes de las probabilidades pueden ser situados en Italia, donde Luca Paccioli (en 1494) y Gerolamo Cardano (en 1550) escribieron tratados sobre el tema. Un par de siglos después, en Francia, Blaise Pascal inició una nutrida correspondencia con Pierre de Fermat sobre el asunto, motivado por una pregunta que le había formulado su amigo, el barón de Mére, quien era aficionado a los juegos de azar. Obviamente, para hacer muchos de los que pueden ser considerados los primeros cálculos de probabilidades, Pascal se valió de su hermoso triángulo numérico. En él, los números en los extremos son todos 1, y los otros se obtienen cada uno como la suma de los dos que le son contiguos hacia arriba. Este arreglo numérico, el más famoso de toda la matemática, tiene muchísimas apariciones en aritmética, álgebra, combinatoria y probabilidades, pues permite realizar muchos conteos en situaciones sencillas.



Una aplicación del triángulo de Pascal: si en una bolsa colocamos 4 naranjas y 4 manzanas, y luego retiramos 4 frutas al azar, la probabilidad de sacar exactamente una manzana es  $\frac{3}{8}$ , pues en la segunda posición de la cuarta fila del triángulo figura un 3, y la suma de los números en esa fila es 8.

Dicho sea de paso, y como suele suceder a lo largo de la historia de la matemática, este triángulo era conocido con anterioridad por diversas culturas. Es así como, hasta el día de hoy, en Italia, se le llama «triángulo de Tartaglia», en honor al matemático del siglo XIV Niccolò Fontana (apodado «tartaglia» por su tartamudez); en China, se le llama «triángulo de Yang Hui», en honor al matemático del siglo XIII que lo popularizó tras haberlo heredado de Zhu Shijie; y en Irán se le llama «triángulo de Jayam», en honor al poeta, filósofo, astrónomo y matemático persa Omar Jayam, el más grande sabio sobre la faz de la Tierra durante el siglo XI (y de quien se cree que incluso conocía la fórmula de la potencia del binomio, estrechamente relacionada con el triángulo, descubierta por Isaac Newton varios siglos más tarde).



A la izquierda: la belleza de la geometría del mausoleo de Omar Jayam en Nishapur (Irán), obra del arquitecto Houshang Seyhoun. A la derecha: ilustración del triángulo de Yang Hui.

Desde los tiempos de Pascal y Fermat, fueron muchísimos quienes colaboraron en el desarrollo de la teoría. Por solo nombrar algunos, podemos citar a George Boole, Daniel y Jacob Bernouilli, Karl Gauss y

Abraham de Moivre. Sin embargo, muchas de las ideas probabilísticas fueron juzgadas como «poco serias» e incluso rechazadas por un porcentaje considerable de científicos debido a la corriente determinista que dominó la ciencia durante varios siglos. Según esta, «todo suceso está correlacionado con una causa», lo cual niega de plano el azar. El propio Pierre-Simon Laplace se refería despectivamente a las probabilidades como «el sentido común a través de los números». Al constatar este caso, así como la recepción de las ideas de Cantor en un inicio (capítulo 22) y muchas otras situaciones similares (como el trato a Henri Lebesgue, creador de la teoría moderna del cálculo integral), no podemos dejar de citar una sabia frase de Armand Borel, aquel que invitó a Boris Weisfeiler a Princeton (capítulo 24): «Lo que menos necesitan las matemáticas son esos eruditos que dictaminan recetas y directrices para las mentes supuestamente menos iluminadas».

El azar debió imponerse, entonces, por otras vías. Primeramente, el austriaco Ludwig Boltzmann, férreo defensor de la teoría atómica, usó sus métodos para cimentar la termodinámica. Pese a esto, la mala recepción de sus ideas agudizó su depresión, que lo llevó al suicidio en 1906. Justo un año antes, Albert Einstein maravillaba al mundo al proponer un primer modelo físico para el movimiento browniano, es decir, el movimiento de partículas microscópicas que se desplazan de manera aparentemente desordenada en un fluido (un comportamiento tal había sido descrito para los granos de polen por el botánico escocés Robert Brown en 1827). Este modelo confirmaba la teoría atómica y, de paso, daba origen a una nueva disciplina: la física estadística. Un par de décadas más tarde, Norbert Wiener daba un modelo matemático del mismo fenómeno anclado en las probabilidades, que poco a poco habían ido saliendo de su estancamiento. Pero no sería sino el triunfo de la mecánica cuántica el que haría de las probabilidades una herramienta indispensable para la física teórica.


La formalización y entrada definitiva de las probabilidades en la matemática es obra de la escuela rusa. A fines del siglo XIX, Pafnuty Chebyshov colaboró en hacer rigurosos algunos aspectos empíricos de la teoría, como la «ley de los grandes números», la cual establece, por ejemplo, que la probabilidad de que al lanzar una moneda al aire caiga en cara es igual a  $1/2$  porque, al lanzar la moneda una cantidad muy grande de veces, muy probablemente se obtendrá una cara un número de ocasiones cada vez más cercano a la mitad del total de lanzamientos. Posteriormente, su estudiante, Andréi Márkov, creó una teoría de procesos en los cuales el futuro depende aleatoriamente del presente, pero es independiente del pasado. Estos «procesos de Márkov» son hoy en día utilizados casi universalmente en ciencia e ingeniería, y sus aplicaciones van desde el modelamiento de los movimientos bursátiles al método de ranking que usa Google para los sitios de internet. Más tarde, en 1933, Andréi Kolmogórov publicó *Los fundamentos de la teoría de la probabilidad*, donde establece las bases modernas de la teoría axiomática de la probabilidad a partir de la teoría de conjuntos de Cantor (capítulo 22). Y esta fue solo una de las muchas obras que nos dejó este hombre, que ejerció como patriarca de varias generaciones de brillantes matemáticos soviéticos, muchos de ellos formados en escuelas concebidas especialmente para jóvenes talentosos.

Con estos trabajos y otros posteriores, la tarea se ha ido completando poco a poco: las probabilidades han revelado la estructura del azar, de la misma forma que los sistemas dinámicos lo han hecho con el caos (capítulo 17). Así, hoy en día, las probabilidades no solo tienen vida propia, sino que están incrustadas en toda la matemática. Por ejemplo, en muchas situaciones se recurre a modelos que mezclan comportamientos determinísticos y estocásticos. Esto ocurre generalmente en escenarios de alta complejidad en los que se cuenta con información limitada, como aquellos relacionados con el movimiento de personas en una gran ciudad, la navegación en internet, las conexiones neuronales del cerebro, etcétera. Naturalmente, determinar el «grado de aleatoriedad» de un «sistema complejo» se ha vuelto un aspecto fundamental. Y si bien se trata de un concepto muy elaborado, puede ser ilustrado con un ejemplo literalmente mágico.


¿Cuántas veces se debe barajar un juego de cartas para que queden bien revueltas? Sin necesidad de explicar detalladamente los términos utilizados, es claro que lo que deseamos es que el grado de incertezza de la distribución final sea muy alto; de manera más sencilla, queremos que sea muy difícil hacer adivinaciones sobre la posición final de un grupo de cartas específicas. Hacer cálculos explícitos en torno a este problema con barajas de número elevado de cartas es sumamente difícil. De hecho, para una baraja de cincuenta y dos cartas (como las de un juego de naipes inglés retirando los jokers), llevar el registro de todas las posibilidades haría colapsar cualquier computador. Sin embargo, David Bayer y Persi Diaconis abordaron el problema de forma conceptual, y a principios de la década de los noventa sorprendieron al mundo con sus inesperados resultados. En lenguaje coloquial, para un juego de cincuenta y dos cartas, se necesita barajar siete veces para asegurar un grado de aleatoriedad cercano al 30%. Este resultado es particularmente extraordinario por dos razones. Por un lado, la teoría subyacente tiene increíbles aplicaciones en otras áreas, como la física de partículas o el álgebra. Por otro lado, uno de sus autores, Diaconis, llegó a él a través de la magia. Así es: antes de dedicarse a la matemática, Diaconis había sido aprendiz del célebre mago canadiense Dai Vernon, y trabajaba como prestidigitador profesional. Sin embargo, sus propios trucos resultaron tan complejos y novedosos que, irremediablemente, lo llevaron por el camino de la ciencia. En sus conferencias, suele matizar la presentación de sus resultados con trucos de magia que dejan perplejo al público asistente.

Y nada de esto es por azar. A fin de cuentas, ciencia y magia tienen mucho en común.

Para ilustrar el proceso de revolver cartas, considere la baraja más simple de todas las que generan alguna información relevante: una de 3 cartas, las cuales numeramos 1, 2 y 3 y suponemos dispuestas en el buen orden (1,2,3) en un comienzo. Tras barajar una vez, podemos llegar a todas las combinaciones, excepto (3,2,1).



Determinar las probabilidades para llegar a las otras combinaciones no es tarea sencilla. Sin embargo, tras un largo cálculo se comprueba que, con probabilidad 0,5, la combinación de llegada es la misma combinación original, es decir, (1,2,3). Por su parte, con probabilidad 0,125, la combinación de llegada puede ser (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1) o (3,1,2).



Al barajar una vez más, llegamos a cualquier combinación, pero con distintas probabilidades. Más abajo aparece un cuadro que hace corresponder el número de barajadas con la probabilidad de que la combinación correspondiente aparezca. Tal como se observa, todas las combinaciones tienden a aparecer rápidamente con casi la misma probabilidad. El resultado de Bayer y Diaconis dice entonces que, con una baraja de 52 cartas (instancia en la cual la realización de cálculos explícitos se vuelve impracticable), se debe repetir el proceso siete veces para observar un fenómeno similar.

	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$
(1,2,3)	0,500...	0,312...	0,234...	0,199...
(1,3,2)	0,125...	0,156...	0,164...	0,166...
(2,1,3)	0,125...	0,156...	0,164...	0,166...
(2,3,1)	0,125...	0,156...	0,164...	0,166...

(3,1,2)  
(3,2,1)


0,125...  
0,000

0,156...  
0,062...

0,164...  
0,109...

0,166...  
0,136...


## FORMAS DE MULTIPLICAR EN CASA



No es difícil enredarse con números, pues hacer cuentas no siempre es sencillo. Además, nuestro desempeño se ve muchas veces entorpecido por las secuelas de un proceso educativo que tiende a la mecanización en lugar de la comprensión. Para corroborar esto, basta con recurrir al ejemplo más básico imaginable: pregunte a una persona cercana por qué  $3 \times 5$  es igual a  $5 \times 3$ . Muy probablemente, obtendrá la clásica respuesta: «porque el orden de los factores no altera el producto», o —peor aún— la misma respuesta expresada en un lenguaje más sofisticado: «porque la multiplicación es conmutativa».

Es de esta forma como se plantea a menudo la enseñanza: un proceso en que la mecánica oscurece el razonamiento, y la memoria hace lo propio con el pensamiento. Como consecuencia, tendemos a funcionar sobre la base de reglas de operatoria impuestas casi autoritariamente y cuyo origen muy pocos se atreven a cuestionar. Hemos sido programados para ejecutar, no necesariamente para entender.

Volviendo a lo concreto, la razón de la igualdad  $3 \times 5 = 5 \times 3$  es sencillísima: la expresión  $3 \times 5$  representa la cantidad de objetos —digamos, bolitas— que resultan al formar 3 filas horizontales con 5 cada una. Al girar la configuración en  $90^\circ$ , obtendremos 5 filas horizontales con 3 bolitas cada una: obviamente, son las mismas  $5 \times 3$  bolitas.




¿Y por qué  $4 + 2 = 2 + 4$ ? Coloque ahora 4 bolitas verdes seguidas de 2 azules y luego póngalas en el orden inverso: verá entonces 2 bolitas azules seguidas de 4 verdes; en total, son las mismas 6 bolitas.




Si bien el anterior parece un simple juego de niños, no deja de revelarnos la esencia del pensamiento matemático: los argumentos dados no dependen de los números específicos con los que se trabaja, sino que se aplican a todos los números posibles. El razonamiento esgrimiido constituye, ni más ni menos, una «demostración» de la propiedad que oscuramente —casi por afán de martirio a nuestros estudiantes— llamamos conmutatividad (o abelianidad).

¿Y la asociatividad? ¿Por qué, por ejemplo,  $5 \times (3 \times 4) = (5 \times 3) \times 4$ ? Pues bien, esto resulta nuevamente de un simple conteo de bolitas apiladas en un cubo, con 4 de largo, 3 de ancho y 5 de altura. Si contamos los cinco planos de distinta altura, cada uno con  $3 \times 4$  bolitas, lo que obtenemos es  $5 \times (3 \times 4)$ .

Por otro lado, si contamos los 4 planos de distinta profundidad, cada uno con  $5 \times 3$  bolitas, obtenemos  $(5 \times 3) \times 4$ . Evidentemente, ambos corresponden a las mismas 60 bolitas.



¿Le viene ahora a su memoria la distributividad, esa oscura propiedad que dice, por ejemplo, que  $5 \times 2 + 5 \times 4 = 5 \times (2 + 4) = 5 \times 6$ ? Solo observe:



El divulgador científico argentino Adrián Paenza sostiene acertadamente que uno de los problemas del gran rechazo que provoca entre los estudiantes la matemática (al punto que casi todo el mundo aspire a olvidarla rápidamente tras terminar la etapa escolar) es que nos es presentada de manera incorrecta. Simplemente, «entramos a la matemática por la puerta equivocada», obligando a los alumnos a sufrir con largas listas de ejercicios similares unos a otros, y evaluándolos por su capacidad de resolver varios de ellos en un tiempo acotado. Es como si a los niños que aman el deporte los martirizáramos cada día con

charlas técnicas sobre movimientos tácticos, impidiéndoles patear un balón o meterlo en una canasta. O bien, como si a aquellos estudiantes amantes de los libros los obligásemos a leer un diccionario en lugar de permitirles deleitarse con novelas gráficas, como *Al sur de la Alameda* o *Mocha Dick*. ¡Qué brutalidad!, dirá usted. Pues bien, en muchas situaciones, es esto lo que sucede con la matemática a nivel escolar.

Lo peor es que el martirio que implica el cultivo excesivo de la técnica no se restringe a edades tempranas, sino que subsiste en niveles más elevados de instrucción, incluidos los universitarios. A continuación le doy dos ejemplos con los cuales tal vez usted o algún cercano se sienta en parte identificado.

**Sumatorias.** Famosa es la historia de un profesor de matemática que, agobiado con la capacidad de un alumno, le pidió sumar todos los números del 1 hasta el 100 para así desentenderse de él por un momento. Lo triste para el maestro es que el niño volvió rápidamente con la respuesta: en lugar de sumar 1 con 2, luego con 3, y así sucesivamente, sumó  $1 + 100 = 101$ , luego  $2 + 99 = 101$ , después  $3 + 98 = 10$ , etcétera. A partir de eso, dedujo rápidamente que la suma debía ser 50 veces 101, es decir, 5050.

Es bastante probable que este cuento sea tan solo un mito. Sin embargo, muchos sostienen que es verdadero y que, además, ese niño era nada menos que Karl Gauss, a quien, en consecuencia, se le atribuye la autoría de la más bella fórmula de «sumatorias»:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$


Sin embargo, esta igualdad será macabramente escrita en clases de una forma más oscura:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Peor aun, muy probablemente, será «demostrada» mediante la mecanización de un proceso llamado «inducción matemática», el cual, a esas alturas, muy pocos entenderán.

Pero tal como usted ha comprobado, todo esto puede perfectamente entenderlo un niño. De hecho, la igualdad anterior era conocida mucho antes de la época de Gauss, a partir de una argumentación aun más lúdica. En efecto, tanto los antiguos griegos como el sabio Aryabhata de la India nos enseñaron que sumar  $1 + 2 + 3 + \dots + n$  es lo mismo que contar el número de bolitas dispuestas en filas de 1, 2, 3, ...,  $n$ , y este ejercicio lo resolvieron con singular maestría.


Para ilustrar el proceso, hemos pintado de rojo estas bolitas a continuación. Pues bien, si giramos la configuración y la «encajamos» contra ella misma, y además coloreamos las nuevas bolitas de azul para no confundirlas con las anteriores, obtenemos un arreglo rectangular de  $n$  bolitas horizontales y  $n+1$ ; verticales. En total, son  $n(n+1)$  bolitas. Pero como queríamos contar solo las rojas, debemos considerar apenas la mitad del total, pues las azules aparecen en igual cantidad. Por lo tanto, el valor de  $1 + 2 + 3 + \dots + n$  es la mitad de  $n(n+1)$ .



Un ejemplo de aplicación de lo anterior es la perturbadora igualdad:

$$1 + 2 + 3 + \dots + 36 = \frac{36 \times 37}{2} = 666.$$

Hace un par de décadas, se rumoreó que los creadores del Loto, un popular juego de azar, debían tener algo demoniaco debido a esta extraña coincidencia numérica. Lo cierto es que la ignorancia y la superstición no tienen límites y dan espacio para que florezcan esta y otras aberraciones semejantes (como la numerología).




Existe una igualdad aun más hermosa que la de los griegos, Aryabhata y Gauss, descubierta independientemente por Nicómaco en Jordania, el mismo Aryabhata y Al-Karají en Persia:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = [1 + 2 + 3 + \dots + n]^2 = \left[ \frac{n(n+1)}{2} \right]^2.$$

¿La razón? Solo observe la figura de arriba y medite un poco.

**Convergencia y divergencia.** A menudo se trunca la curiosidad de los estudiantes señalándoles que la suma de series infinitas es materia reservada para un duro curso de cálculo diferencial e integral. Sin embargo, muchas de las fórmulas fundamentales de esta materia son accesibles con un mínimo de conocimientos. Por ejemplo, para justificar la conocida igualdad  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots = 1$ , basta considerar la siguiente situación geométrica: tome un cuadrado de área 1 y retire su mitad (de área 1/2), luego la mitad de lo que queda (de área 1/4), después la mitad de lo que resta (de área 1/8), etcétera. En infinitas operaciones, habrá retirado toda el área del cuadrado.



Una «demonstración sin palabras». En el sitio electrónico [www.artofproblemsolving.com/articles/proof-without-words](http://www.artofproblemsolving.com/articles/proof-without-words) (lamentablemente, no traducido aún) usted puede hallar muchos de estos argumentos gráficos que lo dejarán estupefacto por su sencillez.

Si en lugar de dividir cada parte sucesivamente por su mitad lo hacemos en 10 partes iguales, escogemos una de ellas, la dividimos en 10 partes iguales, y continuamos el proceso de manera repetitiva *ad infinitum*, obtenemos una comprobación geométrica de la igualdad

$$\frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \frac{9}{10\,000} + \frac{9}{100\,000} + \dots = 1,$$

que no es otra cosa que la muchas veces incomprendida equivalencia

$$0,99999\dots = 1.$$

Durante la Edad Media, la matemática tuvo un desarrollo vertiginoso en el mundo árabe y en Persia, donde, por ejemplo, Al-Juarismi escribió sus famosos tratados de álgebra. En Europa, en cambio, hubo muy pocos progresos en esta época. Uno de ellos fue obra del sacerdote, matemático y astrónomo Nicolás Oresme (uno de los primeros y más férreos opositores a la astrología que consigna la historia), y corresponde a la igualdad:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \dots = \infty$$

(en matemática, suele usarse el símbolo  $\infty$  para denotar una «cantidad» infinita, esto es, una «cantidad» que sea más grande que cualquier número que se escoja). Para cerciorarse de ella, basta observar que

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} > \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} > \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} \dots$$

Agrupando más términos de manera análoga, vemos que la suma total es mayor que otra suma que involucra a  $1/2$  tantas veces como se quiera. Su valor, por lo tanto, puede hacerse tan grande como se desee, por lo que debe ser igual a infinito.



A la izquierda: Nicolás Oresme (retrato tomado de su obra titulada *Tratado de las esferas*). A la derecha: Al-Juarismi, el mítico rostro que aparecía en el libro de Baldor (texto que, dicho sea de paso, ha sido en parte tristemente responsable de la mecanización de la enseñanza del álgebra en Latinoamérica).

Una de las maravillas de la matemática es que, como en todo ámbito de cosas, los problemas pueden ser encarados y resueltos de muchísimas maneras diferentes. Es más, incluso en la investigación de vanguardia, es posible llegar a percibir la personalidad de los científicos observando la forma como se enfrentan a los problemas. Por otra parte, numerosos avances importantes han nacido de trabajos en los que se ha reinvestigado algo ya conocido, pero desde una nueva perspectiva. Y he aquí algo de máxima importancia: todos los caminos correctos que lleven a una solución correcta de un problema son válidos. Tal como declarara Georg Cantor (capítulo 22), «la esencia de la matemática es su libertad». Lamentablemente, muchas veces los estudiantes se ven obligados a valerse de una regla única, y son sancionados si no son capaces de seguirla, en circunstancias en que lo que debiésemos hacer es abrirles el campo a la exploración de otras que, eventualmente, se ajusten mejor a su cultura, punto de vista y personalidad. Voy a concretizar esta idea con apenas dos ejemplos relacionados con la multiplicación. Se trata de dos métodos alternativos para realizar esta operación que no son enseñados en nuestras escuelas y que tienen la misma validez que aquel que tradicionalmente aprendemos. Con ellos, los niños podrán entretenerte «multiplicando en casa», aunque muy probablemente no recibirán una buena calificación si los utilizan en sus trabajos escolares, simplemente porque «no se ajustan al método que se espera que usen».

**La multiplicación ruso-etíope y egipcia.** Con este método no es necesario conocer las tablas de multiplicación, sino tan solo saber sumar, además de multiplicar y dividir por 2. El proceso ruso-etíope es muy sencillo. Para hallar el producto de dos números, el primero de ellos se divide por 2 si es par, o bien se le resta 1 y luego se divide por 2 si es impar; el otro número, por su parte, se multiplica por 2. Se prosigue de esta manera hasta que el primer número llegue a 1. Cuando esto ocurre, se suman los resultados de la duplicación sucesiva del segundo número, que corresponden a resultados impares en el proceso de división del primero. Por ejemplo, el cálculo  $225 \times 17 = 3825$ ; resulta como sigue:


225	17
112	34
56	68
28	136
14	272
7	544
3	1088
1	2176

$3825 = 17 + 544 + 1088 + 2176$


Observe que en el proceso anterior los valores 34, 68, 136 y 272 no son considerados, pues están en correspondencia con números pares a su izquierda.

Este sencillo método era usado en algunas regiones del campo ruso hasta hace unas décadas, y es empleado aún en Etiopía. Increíblemente, con una ligera variación, era ya conocido en el antiguo Egipto.

**La multiplicación japonesa y china.** El precioso método descrito a continuación era conocido en la India y el mundo árabe hace ya más de un milenio. Actualmente, es enseñado en las escuelas de Japón y, con una ligera variación, en China. El punto de partida es el siguiente hecho evidente: si tenemos un grupo de  $m$  rectas paralelas y las intersectamos con otro grupo de  $n$  rectas paralelas pero que apuntan en una dirección diferente, entonces el número de puntos de corte entre todas ellas es igual a  $m \times n$ .




A partir de esta observación, el método de multiplicación surge naturalmente. Para comenzar, tomemos dos números de dos cifras. Representemos cada uno de ellos por medio de rectas paralelas, colocando primero tantas rectas como decenas tenga el número y, tras un espacio de separación, tantas rectas como unidades tenga. La dirección escogida para cada uno de los números debe, además, ser diferente. Ahora, simplemente contemos los puntos de intersección entre todas las rectas, agrupándolos en tres conjuntos. En el primer grupo, contemos las intersecciones de las rectas que corresponden a las decenas de ambos números; en el segundo grupo, las intersecciones de las rectas de las decenas de uno de los números con las de las unidades del otro; finalmente, en el tercer grupo, contemos las intersecciones de las rectas de las unidades de ambos números. Obtenemos así tres valores  $c$ ,  $d$  y  $u$ , respectivamente. Si estos tres valores son menores que 10, entonces el resultado de la multiplicación es el número que se escribe de la forma  $cd\bar{u}$ , es decir, aquel que tiene  $c$  centenas,  $d$  decenas y  $u$  unidades.



Un ejemplo: en la multiplicación de 23 por 13, el primer grupo consta de 2 puntos, el segundo de 9 y el tercero también de 9. El resultado de la multiplicación es entonces 299.

En el caso de que alguno de los grupos contenga más de 9 puntos, este debe cederle unidades al siguiente a su izquierda, al igual como hacemos en nuestro sistema de multiplicación habitual.


$$16 \times 24 = 384$$



Al multiplicar 16 por 24, el primer grupo consta de 2 puntos de intersección, el segundo de 16 y el tercero de 24. El tercero le cede 2 unidades (que representan 20 puntos) al segundo, quedando en 4. El segundo, que ahora escribimos como 18, debe cederle una unidad al primero, quedando en 8. El primero sube entonces de 2 a 3, por lo que el resultado final de la multiplicación es 384.

Este método no se restringe a multiplicaciones de números de dos cifras, sino que se puede aplicar a cualquier par de números. A modo de ejemplo, abajo se ilustra la multiplicación  $123 \times 213 = 26199$ .

$$123 \times 213 = 26199$$



Si quiere manipular aún mejor este lúdico método, puede consultar cientos de sitios de la web en los que aparece desarrollado. Personalmente, le recomiendo el siguiente video de YouTube: «Método japonés de multiplicación cruzada».

¿Por qué estos métodos mágicos funcionan? A decir verdad, estos procedimientos son igual de mágicos que aquel que utilizamos normalmente. Tanto este como los exhibidos más arriba se fundamentan en la propiedad distributiva de la adición respecto de la multiplicación. Por lo demás, el método chino-japonés no es sino una forma geométrica de ver un procedimiento muy similar al que empleamos habitualmente. Estos dos métodos están, además, ligados en su esencia al carácter decimal de nuestra notación de los números (es decir, al hecho de que contamos de 10 en 10). Por ejemplo, al multiplicar 23 por 31, el proceso que realmente ejecutamos al operar «a la chino-japonesa» es:

$$\begin{aligned}
 23 \times 13 &= (2 \times 10 + 3) \times (1 \times 10 + 3) \\
 &= 2 \times 1 \times 100 + 2 \times 3 \times 10 + 3 \times 1 \times 10 + 3 \times 3 \\
 &= 2 \times 100 + 6 \times 10 + 3 \times 10 + 3 \times 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 200 + 90 + 9 \\
 &= 299.
 \end{aligned}$$

Si bien el método ruso-etiópe-egipcio también se fundamenta en la distributividad, es esencialmente diferente, pues su naturaleza es binaria. Así, cuando multiplicamos 225 por 17, como en el ejemplo desarrollado más arriba, lo que estamos haciendo es, en estricto rigor, lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 225 \times 17 &= (1 + 32 + 64 + 128) \times 17 \\
 &= 1 \times 17 + 32 \times 17 + 64 \times 17 + 128 \times 17 \\
 &= 17 + 544 + 1088 + 2176 \\
 &= 3825.
 \end{aligned}$$

Sorprendentemente, este método es muy parecido al que ejecuta internamente una computadora, pues esta trabaja con códigos binarios. Así es: hace miles de años, los egipcios desarrollaron un sistema de multiplicación muchísimo más adelantado que el que hoy solemos utilizar y enseñar en la escuela.



Fragmento del «papiro de Rhind» (también conocido como «papiro de Ahmes», en honor a su escriba). Este texto, que data del siglo XVI a. C., es considerado el primer libro de matemática de la historia, y contiene el grueso del conocimiento matemático del antiguo Egipto hasta esa época. Sorprenden los cálculos trigonométricos de las alturas de las pirámides contenidos en él.

Con todos los ejemplos anteriores, debiese ser evidente para el lector que los números no son entes rígidos, sino que tienen una cierta «corporeidad» en la cual se mezclan una naturaleza aditiva con otra multiplicativa, conformando objetos geométricos que inspiran a soñar. Hace unos años tuve la oportunidad de ver una entrevista a una persona capaz de realizar cálculos mentales muy elaborados de manera extraordinariamente rápida. Cuando se le preguntó su técnica, dijo que, «simplemente, los números son como nubes que en su cabeza se mezclan y generan el resultado de la operación requerida». Es muy probable que él haya desarrollado habilidades cognitivas a las cuales no hayamos accedido aún, pero a las que las neurociencias nos puedan llevar en un futuro no muy lejano.

Y si nos referimos a cosas más concretas, no puedo dejar de mencionar un trabajo que tiene en ascuas a toda la comunidad matemática internacional por estos días. Este versa sobre la famosa «conjetura ABC», la cual fue propuesta a mediados de la década de los ochenta por el francés Joseph Oesterlé y el inglés David Masser. Dicha conjetura, uno de los problemas más importantes de la matemática actual, tiene relación con la duplicidad de la estructura aditiva y multiplicativa de los números, tal como señala lúcidamente en el video de YouTube, «An introduction to the ABC conjecture», el matemático chileno Héctor Pastén (actualmente profesor en la Universidad de Harvard y recientemente galardonado con el Premio del Consejo Matemático de las Américas MCA). De acuerdo con ella, si  $A$ ,  $B$  y  $C$  son números enteros positivos sin divisores en común tales que  $A + B = C$ , entonces el producto de todos los números primos distintos que dividen al producto  $ABC$  debiese ser casi tan grande como  $C$  (para ser precisos, para cada número positivo  $\epsilon$ , debiera ser mayor que  $C^{1/(1+\epsilon)}$ , salvo eventualmente por un número finito de excepciones). Por ejemplo, si  $A = 128 = 2^7$  y  $B = 81 = 3^4$ , entonces  $A$  y  $B$  aportan pocos factores primos (tan solo el 2 y el 3). Según la conjetura, esto forzaría a que su suma debiera aportar nuevos factores primos con escasa repetición. Y tal es el caso, pues en  $A + B = C = 209 = 11 \times 19$  no hay repetición de factores primos.

En 2013, el japonés Shinichi Mochizuki propuso una demostración ininteligible para la conjetura ABC; en ella, utiliza métodos en los que los números aparecen dotados de esta corporeidad geométrica que hace que las reglas de la aritmética cobren un nuevo sentido. «Es como estar frente a un trabajo venido del futuro», han dicho algunos. Y si bien hoy en día los especialistas del tema concuerdan en que la prueba de Mochizuki es, por lo menos, incompleta, también coinciden en que su trabajo contiene muchas ideas novedosas y útiles. Lo cierto es que no puedo decir más al respecto, pues ni siquiera los más

versados en el tema han podido entender completamente lo que está escrito en esta portentosa obra de más de quinientas páginas. Será quizás tarea para las generaciones venideras de matemáticos terminar de descifrar este trabajo monumental.

## LAS INFINITAS MANERAS DE SEGUIR ADELANTE

2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, ¿?

Completar secuencias numéricas puede ser un pasatiempo divertido. Es por ello que problemas de este tipo suelen hallarse no solo en textos escolares, sino también en secciones de entretenimiento de diarios y revistas, así como en muchos sitios de internet (para confirmar esto, basta realizar una búsqueda con la frase «qué número sigue»). Mi favorito, ilustrado más abajo, fue incluido hace algunos años en el examen de admisión a un colegio de Hong Kong. Sorprendentemente, los adultos que quisieron resolverlo tuvieron —en promedio— un desempeño menos satisfactorio. La razón apuntaría a que, como los niños no tienen un conocimiento tan estructurado, se dieron una mayor libertad intelectual para lidiar con él, lo que les permitió resolverlo de la manera más sencilla que pueda imaginarse. De hecho, son precisamente los niños quienes suelen disfrutar más con este tipo de desafíos intelectuales. Para ellos, se trata de simples juegos, y difícilmente sospechan que en el intento de encontrar su solución se adentran tímidamente en las profundidades de la aritmética.

**¿Qué número está escrito  
bajo el automóvil estacionado?**



Si volteá el dibujo en  $180^\circ$ , la solución le será evidente. Por cierto, la sucesión 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19,... ilustrada más arriba también tiene una regla curiosa: los números listados son aquellos que comienzan con la letra «d», por lo que el siguiente es el 200.

Siendo matemáticamente quisquillosos, debemos señalar que, en estricto rigor, la gran mayoría de estos acertijos están mal formulados. Es imposible, a partir de unos pocos datos, extrapolar una regla lógica sin tener un fundamento conceptual para ella. De hecho, las reglas que se adecúan a los elementos de una secuencia nunca son únicas. Más aun, si usted completa una secuencia de la manera que se le antoje, siempre es posible elucubrar una regla que se ajuste a su elección. Para clarificar un poco esto, consideraremos la secuencia 1, 2, 4, 8, 16,... ¿cuál número sigue? La tentación es obvia: 32. Sin embargo, podría perfectamente seguir el 31, el 2016, el 666 o el 24 500-03. En efecto, para cada una de las secuencias así formadas existe una regla traducible en una fórmula polinomial de grado menor que la cantidad de datos (en este caso, menor que 5). Así nos lo indica una receta ideada por el matemático franco-italiano de origen noble del siglo XVIII Joseph-Louis Lagrange, comúnmente conocida como la «interpolación de Lagrange». Por ejemplo, si usted completa la secuencia con un 31, esta receta nos entrega el polinomio

$$\frac{n^4 - 6n^3 + 23n^2 - 18n + 24}{24}.$$

La comprobación es una mera cuestión de cálculo:

$$\frac{1^4 - 6 \times 1^3 + 23 \times 1^2 - 18 \times 1 + 24}{24} = \frac{1 - 6 + 23 - 18 + 24}{24} = \frac{24}{24} = 1.$$

$$\frac{2^4 - 6 \times 2^3 + 23 \times 2^2 - 18 \times 2 + 24}{24} = \frac{16 - 48 + 92 - 36 + 24}{24} = \frac{48}{24} = 2.$$

$$\frac{3^4 - 6 \times 3^3 + 23 \times 3^2 - 18 \times 3 + 24}{24} = \frac{81 - 162 + 217 - 54 + 24}{24} = \frac{96}{24} = 4.$$

$$\frac{4^4 - 6 \times 4^3 + 23 \times 4^2 - 18 \times 4 + 24}{24} = \frac{256 - 384 + 368 - 72 + 24}{24} = \frac{192}{24} = 8.$$

$$\frac{5^4 - 6 \times 5^3 + 23 \times 5^2 - 18 \times 5 + 24}{24} = \frac{625 - 750 + 575 - 90 + 24}{24} = \frac{384}{24} = 16.$$


$$\frac{6^4 - 6 \times 6^3 + 23 \times 6^2 - 18 \times 6 + 24}{24} = \frac{1296 - 1296 + 828 - 108 + 24}{24} = \frac{744}{24} = 31.$$

La receta de Lagrange: en nuestro caso, permite «cocinar» el polinomio

$$1 \times \frac{(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)}{(1-2)(1-3)(1-4)(1-5)} + 2 \times \frac{(n-1)(n-3)(n-4)(n-5)}{(2-1)(2-3)(2-4)(2-5)} + 4 \times \frac{(n-1)(n-2)(n-4)(n-5)}{(3-1)(3-2)(3-4)(3-5)} + 8 \times \frac{(n-1)(n-2)(n-3)(n-5)}{(4-1)(4-2)(4-3)(4-5)} + 16 \times \frac{(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{(5-1)(5-2)(5-3)(5-4)}.$$


Un largo cálculo algebraico transforma esta expresión en la dada anteriormente, mostrando así que esta no tiene nada de misteriosa. El procedimiento en un caso general debiese ser evidente a partir del que aquí se exhibe.

Si bien todo esto puede parecer un poco artificial, hay ocasiones en que estas secuencias inesperadas surgen naturalmente. Consideremos la siguiente situación: si se escoge una cantidad de vértices sobre una circunferencia y se dibujan todos los trazos que unan pares de estos vértices, ¿en cuántas regiones puede, a lo máximo, quedar dividido el círculo? Ciertamente, el número máximo se obtendrá cuando la posición de los vértices sea tal que no haya tres trazos que pasen por el mismo punto.



Para una cantidad de vértices igual a 1, 2, 3, 4 y 5, el número de regiones es, respectivamente, 1, 2, 4, 8 y 16. Sin embargo, al escoger 6 vértices, la cantidad máxima de regiones es... ¡31! De hecho, la complicada fórmula polinomial dada anteriormente corresponde exactamente al número máximo de regiones que

aparecen al escoger una cantidad  $n$  de vértices y dibujar los trazos correspondientes (aunque esto está lejos de ser evidente; es más, su prueba es bastante elaborada).




Más allá de juegos y curiosidades, la ciencia matemática está repleta de secuencias numéricas de enorme interés (y perfectamente definidas por medio de reglas claras). De hecho, hay tantas secuencias interesantes que, después de haber escrito dos libros de recopilación, el matemático británico Neil Sloane decidió crear un repositorio virtual, el *Online Encyclopedia of Integer Sequences* (OEIS). En agosto de 2015, este contenía nada menos que doscientas sesenta mil secuencias, cada una con el nombre de su descubridor y una breve reseña de sus propiedades y la justificación de su relevancia. Algunas son aún fuente de intenso estudio, y están lejos de ser completamente entendidas. A modo ilustrativo, me referiré brevemente solo a la más famosa, indexada como la OEIS A000045. Esta empieza con los números

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \dots,$$


y su regla de formación es muy sencilla: comenzando con dos cifras iguales a 1, a partir del tercer término, cada elemento es igual a la suma de los dos anteriores. Por ejemplo:

$$2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3, 13 = 8 + 5, \dots$$


Aunque esta secuencia aparece en textos de la India que datan del siglo II a. C., su descubrimiento es generalmente datado en el siglo XI y atribuido al italiano Leonardo de Pisa, más conocido por su apodo: Fibonacci. El interés de este matemático por esta secuencia se originó de un modelo sencillo que buscaba entender el crecimiento de una población de conejos, aunque se aplica de manera más nítida al estudio de los árboles genealógicos de las abejas. En efecto, como los machos (zánganos) no tienen padre y las hembras tienen padre y madre (más precisamente, el zángano proviene de un óvulo no fecundado y la abeja de uno que sí lo es), dicho árbol es bastante peculiar: si observa con atención, notará que el número de ascendientes en cada generación corresponde a un término entre 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...



La secuencia de Fibonacci está relacionada con muchísimos procesos naturales. Solo por mencionar uno, busque una flor cercana y cuente su número de pétalos: se sorprenderá al constatar que, muy probablemente, dicho número aparece en la secuencia.



De hecho, casi con total certeza, este será el caso si, al igual que yo, usted escogió una margarita. Así, con este dato en mente, puede conocer el resultado del tierno y desesperante «me quiere/no me quiere» jugado con esta flor sin necesidad de arrancarle los pétalos. Por cierto, dado que en la secuencia se suceden dos números impares por cada par, es más probable que sus sentimientos sean correspondidos. «El amor es más fuerte», diría Fibonacci.



Otro aspecto interesante de la secuencia es su relación con la división áurea (la misma que aparece en nuestra bandera de la Independencia; capítulo 1). En efecto, los cocientes entre los términos sucesivos se aproximan más y más al número de oro  $\varphi = (\sqrt{5} + 1)/2 \sim 1,618\dots$ , tal como se observa a continuación:


$$\frac{3}{2} = 1,5, \quad \frac{5}{3} = 1,66\dots, \quad \frac{8}{5} = 1,6, \quad \frac{13}{8} = 1,65, \quad \frac{21}{13} = 1,615\dots$$

Esto queda corroborado por la sorprendente fórmula descubierta (recién en el siglo XIX) por el francés Édouard Lucas para el término que aparece en la posición  $n$ -ésima:

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \right)^n - \frac{(-1)^n}{\sqrt{5}} \left( \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right)^n$$


En fin, dadas todas sus propiedades, no resulta extraño que hasta el día de hoy esta secuencia siga maravillando a matemáticos de todo el mundo. De hecho, es tal el nivel de fascinación que una revista especializada, *The Fibonacci Quarterly*, solo publica artículos de investigación que tienen alguna relación con ella. Es más, dicha revista surgió al alero de una organización mundial, la Fibonacci Association, que en 2016 celebró en Caen (Francia) nada menos que el Décimo-Séptimo Congreso Internacional sobre Números de Fibonacci y sus Aplicaciones.

Si quiere seguir disfrutando de las maravillas de esta cadena de números, le recomiendo el bello documental «Fibonacci Sequence -Documentary» en YouTube, o, si dispone de un poco menos de tiempo, esta breve charla TED de Arthur Benjamin: «The magic of Fibonacci numbers». Ahora bien, si todo esto le resulta indiferente y piensa que nunca más en su vida verá esta secuencia, lamento informarle que es muy probable que la tenga frente a usted cotidianamente. Incluso, puede que en este mismo instante sus proporciones estén secretamente desplegadas en la pantalla de su computador o teléfono celular. Solo observe con atención los siguientes distintivos:



Si bien las especificidades métricas de estos logotipos son materia de debate en internet, claramente están inspiradas en la secuencia de Fibonacci y su relación con la división áurea. De hecho, estas son frecuentemente utilizadas en trabajos de diseño.

## RAMANUJAN: EL HINDÚ AL QUE LOS NÚMEROS LE SOPLABAN SUS SECRETOS



Desde los tiempos de Pitágoras, la historia de la matemática está plagada de mujeres y hombres ilustres de fuerte carácter. Pero hay uno difícil de describir con una sola palabra; uno que escapa a todos los cánones establecidos y que, quizás, sea el más querido de todos. Un hombre que murió cuando apenas tenía treinta y dos años, pero que dejó un legado que aún no ha sido completamente descifrado. Un joven que parecía tener un acuerdo con los dioses para que los números le revelasen cada uno de sus misterios.

Srinivasa Ramanujan nació en Erode, India, el 22 de diciembre de 1887. De familia pobre y devota de la diosa Mahalakshmi de Namakkal, no cursó una escolaridad regular. Sin embargo, se cuenta que, siendo aún un niño, cayó en sus manos un libro de matemática que solo contenía fórmulas y teoremas sin mayor explicación. Intrigado, Ramanujan comenzó a descifrarlas una a una. Sentado, de piernas cruzadas y en actitud meditativa, se pasaba el día garabateando trazos en la tierra intentando entenderlas, descubriendo, maravillándose. Y esto es lo extraordinario: Ramanujan nunca aprendió ni concibió la matemática como un profesional. Su mente funcionaba de otra manera. Para él, lo importante no era la estructura, sino la revelación. Nunca una demostración, nunca una explicación, solo centenas de fórmulas disparatadas que, con el correr de los años, han resultado casi todas ciertas, y que poco a poco hemos podido ir colocando dentro del edificio matemático occidental. Por lo menos aquellas que llegaron a nosotros, pues muchas se perdieron en la tierra: el papel era demasiado caro para los escasos recursos de los que disponía.

Tres fórmulas de Ramanujan:

$$3 = \sqrt{1 + 2\sqrt{1 + 3\sqrt{1 + 4\sqrt{1 + 5\sqrt{1 + \dots}}}}}$$
$$\frac{2}{\pi} = 1 - 5 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 9 \left(\frac{1 \times 3}{2 \times 4}\right)^3 - 13 \left(\frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6}\right)^3 + \dots \frac{1}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)!(1103 + 26390k)}{(k!)^4 396^{4k}}$$

La primera de ellas, presente en su primer artículo, anunciaba ya de algún modo la originalidad de la obra que vendría. Puede ser obtenida con apenas los conocimientos de la escuela (y una cuota de astucia extraordinaria). La segunda figuraba, en medio de muchas otras, en una carta que envió a Hardy, y pese a que no iban acompañadas de ninguna explicación, este y su colega Littlewood estimaban que todas debían ser correctas simplemente porque eran tan bellas y originales que nadie podría ser capaz ni siquiera de formularlas sin una motivación profunda. En cuanto a la tercera, permitanme exhibirla sin mayor explicación; solo diré que se trata de una joya delirante que permite calcular con gran exactitud los dígitos del esquivo número  $\pi$ .

Ramanujan reprobó dos veces sus exámenes para entrar a la universidad: no tenía tiempo para prepararlos, pues estaba demasiado ocupado haciendo matemática. Sobrevivió trabajando en la oficina de contabilidad de Madrás, donde día a día convivía con centenas de números. Se cuenta que, años después, estando ya enfermo, un amigo fue a visitarlo en taxi.

—¿Qué número de patente tenía? —preguntó Ramanujan.  
—Uno sin importancia: 1729 —recibió como respuesta.

—¡No, 1729 es un número muy interesante! Es el menor número que puede ser escrito como suma de dos cubos de dos maneras diferentes:

$$1^3 + 12^3 = 1729 = 9^3 + 10^3.$$

Ese amigo, que quedó pasmado ante su respuesta, era nada menos que el célebre matemático inglés Godfrey Hardy. Fue él quien lo acogió en Cambridge tras haber sostenido una intensa correspondencia, después de que el talento de Ramanujan había sido por fin detectado por Ramachandra Rao, uno de los fundadores de la Sociedad de Matemática de la India. Hardy decía que Ramanujan hallaba las soluciones a los problemas mediante un proceso que mezclaba intuición e inducción, y del cual era incapaz de dar un relato coherente. Por eso, tuvo que acometer una singular tarea: para tratar de entender lo que él pensaba y de dónde nacían sus ecuaciones, primeramente debía «enseñarle matemática» o, al menos, debía transmitirle un lenguaje común en que ambos pudieran entenderse. Tenía que instruir al maestro, en quien veía a un nuevo Euler, con el talento suficiente para escalar hasta las alturas de Newton. Y esta extraña relación profesional debía obrar pese a las distancias siderales que separaban a este gentleman inglés, amante del cricket, homosexual y profundamente ateo, del genio pobre hindú, quien solía señalar que los teoremas le venían a la mente por simple inspiración divina.

2	2*	144	—	110880
3	4	160	—	166320
4	6	168	—	221760
6	18	180	—	277200
8	24	192	—	332640
9	36	200	—	498960
10	48	216	—	554400
12	60	224	—	665280
16	120	240	—	720720
18	180	256	—	1081080
24	288	—	—	1441440

Handwritten notes from Ramanujan's notebook:

$$(i) \frac{1+53x+9x^2}{1-px-x^2-x^3} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

$$\text{or } \frac{a_0}{x} + \frac{a_1}{x^2} + \frac{a_2}{x^3} + \dots$$

$$(ii) \frac{2+26x+12x^2}{1-px-x^2-x^3} = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \dots$$

$$\text{or } \frac{b_0}{x} + \frac{b_1}{x^2} + \frac{b_2}{x^3} + \dots$$

$$(iii) \frac{2+7x+10x^2}{1-px-x^2-x^3} = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots$$

$$\text{or } \frac{c_0}{x} + \frac{c_1}{x^2} + \frac{c_2}{x^3} + \dots$$

Bottom right:

$$a_n^3 + b_n^3 = c_n^3 + (-1)^n \quad \left\{ \begin{array}{l} \\ \end{array} \right.$$

and

$$a_n^3 + b_n^3 = d_n^3 + (-1)^n \quad \left\{ \begin{array}{l} \\ \end{array} \right.$$

Examples:

$$135^3 + 138^3 = 179^3 - 1$$

$$11161^3 + 11468^3 = 14258^3 + 1 \quad 7^3 + 10^3 = 12^3 + 1$$

$$79^3 + 818^3 = 1016^3 - 1 \quad 6^3 + 8^3 = 7^3 - 1$$

A la izquierda: una serie de números en los cuadernos de Ramanujan. A la derecha: otra hoja de cálculos (observe las igualdades abajo a la derecha).

Ramanujan era un apasionado de las secuencias y las series infinitas, las que aparecen desparramadas en todas sus notas. Con la ayuda de Hardy, emprendió el estudio de una secuencia de extrema importancia:

1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 56, 77, 101, 135, 176, 231, 297, 385, 490, 627, 792, 1002, 1255, 1575, 1958, 2436, 3010, 3718,

...

En ella, el término que aparece en la posición  $n$  corresponde al número de maneras de escribir  $n$  como suma de enteros positivos. En otras palabras, es la cantidad de maneras distintas de «partir» el número  $n$  en piezas aditivas, sin distinguir particiones en las que aparecen los mismos sumandos pero dispuestos en distinto orden. Así, en la tercera posición aparece un tres, pues 3 admite tres particiones:  $3 = 2 + 1 = 1 + 1 + 1$ . De igual forma, en la cuarta posición aparece un cinco, pues 4 admite cinco particiones:

$$4 = 3 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1.$$

Por su parte, las siete particiones de 5 son:

$$5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1 = 2 + 2 + 1 = 2 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1.$$

Junto con Hardy, Ramanujan estableció la siguiente fórmula de aproximación para el término  $n$ -ésimo (la letra «e» se usa para denotar un número muy especial: la constante de Euler 2,71728...):

$$\frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi} \sqrt{\frac{2n}{3}}.$$

Por ejemplo, 1000 admite 24 061 467 864 032 624 306 850 057 158 656 particiones diferentes, y la expresión anterior para  $n = 1000$  nos predice una cantidad (muy cercana) de 24 061 467 864 032 723 386 041 859 309 568. Más allá de la matemática misma, este «teorema de aproximación de

Hardy-Ramanujan» halló importantes aplicaciones en física estadística, comenzando con un modelo propuesto por Niels Bohr (capítulo 26) para funciones de partición cuánticas de núcleos atómicos.

Sería imposible describir en unas pocas líneas todo el portento de la obra de Ramanujan. En apenas cinco años en Cambridge, produjo más de una treintena de artículos seminales trabajando por su cuenta, además de varios otros en colaboración con Hardy. Sus descubrimientos siguen influenciando la matemática hasta el día de hoy. Solo por dar un ejemplo, formuló una conjectura que fue corroborada décadas más tarde por el belga Pierre Deligne, trabajo por el cual este fue galardonado con la Medalla Fields en 1978. En fin, no podría hablarse hoy en día de matemática sin mencionar su nombre ni referirse a algunos de sus legados: los grafos de Ramanujan, las sumas de Ramanujan, la constante de Ramanujan, la forma cuadrática ternaria de Ramanujan, el teorema maestro de Ramanujan, etcétera.



La casa de niñez de Ramanujan es lugar de visita turística en Kumbakonam.

Desde su temprana juventud, Ramanujan se vio aquejado por varias enfermedades. Tenía permanentes cuadros de tuberculosis que hoy se cree que derivaban de una enfermedad parasitaria (la amebiasis hepática, perfectamente curable si se diagnostica correctamente) y que se agravaban con el clima de Inglaterra. Esto, sumado a sus problemas para subsistir en este país envuelto en la Primera Guerra Mundial, la nostalgia de su tierra y el trato vejatorio al que se vio a veces expuesto por ser oriundo de una colonia británica, lo motivaron a volver a la India en 1919. Pero su salud no mejoró. En 1920, su genio y su espíritu (que en él se fundían en uno solo) se apagaron para siempre. ¡Quién sabe cuántas otras cosas nos hubiese podido legar con tan solo haber vivido un par de años más!

En 1991, Robert Kanigel publicó *El hombre que conocía el infinito: la vida del genio Ramanujan*, obra de carácter biográfico que inspiró la película casi homónima estrenada en 2016. En ella, Dev Patel juega el papel de Ramanujan y Jeremy Irons el de Hardy. Lamentablemente, esta producción nunca llegó a las carteleras de cine de nuestro país. Si puede verla desde internet se la recomiendo plenamente, no como el fino catador de cine que ciertamente no soy, sino simplemente porque, sin ser un documental, es de las producciones cinematográficas sobre la vida de un científico más ajustada a la realidad que se ha hecho. En cuanto a la matemática presente en la película, no hay absolutamente nada que corregir: uno de los asistentes fue nada menos que el matemático (de ascendencia india) Manjul Bhargava, uno de los ganadores de la Medalla Fields en 2014 y gran conocedor de la obra de Ramanujan, su inspirador.

22	12	18	87
88	17	9	25
10	24	89	16
19	86	23	11

El tablero mágico de Ramanujan: en este arreglo, los números de cada fila suman 139, al igual que los de cada columna, los de ambas diagonales, los de las esquinas, los del cuadrado central, los de las casillas coloreadas en azul y los de las pintadas de rosado. ¿Reconoce los números de la primera fila? Veintidós de diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, día del nacimiento de Ramanujan. En 2011, en el aniversario 125 de su natalicio, el gobierno indio proclamó el 22 de diciembre como el Día Nacional de la Matemática.

## LA SOLEDAD DE UN NUEVO NÚMERO PRIMO



*La soledad de los números primos* es el título de la primera novela del joven autor italiano Paolo Giordano, quien además de escritor es doctor en Física de la Universidad de Turín. Este certero y punzante relato sobre la soledad humana toma su nombre de un fenómeno que, desde tiempos remotos, ha sido fuente de investigación en matemática y es (y será por siempre) uno de los principales problemas de esta ciencia: la extraña y sorprendente distribución de los números primos.

Recordemos primeramente que un número (entero y positivo) es «primo» si no puede ser expresado como producto de enteros mayores que 1. Así, 13 es primo, pero 15 no lo es, pues  $15 = 3 \times 5$ . La lista de los primeros primos empieza entonces con 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... Estos números son los «átomos» de la aritmética, pues a partir de ellos se puede obtener cualquier otro número por medio de multiplicaciones (recuerde la «factorización en números primos» aprendida en la escuela). De hecho, el nombre «primo» deriva de esto, pues se trata de los «números primarios».

¿Cómo listar los números primos? El sabio helénico Eratóstenes ideó un proceso muy sencillo para descubrir sistemáticamente todos los primos: «Escriba todos los números (más bien, los que pueda) de manera ascendente a partir del 2 (que es el menor primo). A continuación, borre todos los números mayores que son múltiplos de 2, es decir, pares. El primer número que sobrevive en la lista es 3: este número es necesariamente primo. Ahora borre todos los múltiplos de 3 mayores que 3. Sobrevive entonces el próximo primo, el 5. Borre todos los múltiplos de 5 mayores que 5 y obtenga el 7... Con paciencia, irá descubriendo lentamente todos los primos». Para una bonita animación explicativa de este proceso, vea en Wikipedia «File: sieve of Eratosthenes animation.gif».

¿Cuántos números primos hay? El proceso de Eratóstenes no responde a esta pregunta, pues se trata más bien de un método para detectar primos a medida que estos aparecen. Hubo que esperar un tiempo hasta que otro sabio helénico, Euclides, diera con un argumento tan contundente como elegante para demostrar que la cantidad de primos es infinita: «Si se multiplican todos los números primos hallados hasta cierto momento y al resultado se le añade 1, entonces el número obtenido no puede ser dividido por ninguno de estos primos, por lo que debe existir al menos un primo más».

Así, los números primos «son pocos, pero son». De hecho, debiésemos esperar que los primos menores que  $10^n$  (el número formado por un dígito 1 seguido de  $n$  dígitos 0) sea algo así como  $10n/n$ . Este hecho es una consecuencia del teorema de los números primos, una de las piezas más importantes de la «teoría de números», la rama de la matemática que se ocupa de estos temas y que se conecta con otras líneas de estudio de mucha aplicación.

Una conclusión más potente que el teorema de los números primos es, probablemente, el problema abierto más importante de la matemática: la conjetura de Riemann. Formulada por el alemán Bernhard Riemann en el siglo XIX, admite diversas versiones, de las cuales quizás la más concreta es la siguiente: si denotamos por  $\vartheta(n)$  la cantidad de números primos menores que  $n$ , entonces existe una constante  $C$  tal que

$$\left| \vartheta(n) - \int_2^n \frac{dx}{\log(x)} \right| \leq C\sqrt{n} \log(n).$$

Sería imposible explicar en unas cuantas líneas la relevancia y dificultad de esta afirmación. Riemann pronosticó que pasarían más de trescientos años antes de que fuese corroborada, y ya se ha cumplido más de la mitad de este plazo. De hecho, una vez preguntaron al célebre matemático David Hilbert qué haría si se durmiera y despertara quinientos años más tarde, y su respuesta fue que inmediatamente correría a preguntar si alguien ya había resuelto la conjetura de Riemann.

Entre las aplicaciones de la teoría de números destaca especialmente la criptografía, que es utilizada cotidianamente, pues otorga el sustento teórico que permite la encriptación de datos, la cual nos da seguridad, por ejemplo, para realizar operaciones bancarias en internet. Aunque parezca sorprendente, la dificultad para decodificar información de esta naturaleza de manera fraudulenta se debe al simple hecho de que es extremadamente lento para un computador escribir números grandes como productos de primos. Así, una información codificada corresponde a uno de estos números inmensos; y si bien esta información puede eventualmente ser «robada» desde internet, su decodificación solo es posible conociendo *a priori* los factores primos de este, información con la que solamente cuenta la institución involucrada (por ejemplo, su banco).

Por diversas razones (vea, por ejemplo, el capítulo 33), una familia de primos particularmente interesante y fácil de trabajar es la de los «números de Mersenne», llamados así en honor al teólogo, musicólogo y matemático francés del siglo XVII Marin Mersenne. Esta está constituida por los primos iguales a una potencia de 2 menos 1. La lista de los siete primeros primos de este tipo es:

$$2^2 - 1 = 3$$

$$2^3 - 1 = 7$$

$$2^5 - 1 = 31$$

$$2^7 - 1 = 127$$

$$2^{13} - 1 = 8191$$

$$2^{17} - 1 = 131071$$

$$2^{19} - 1 = 524287$$

Hasta ahora, el número primo más grande conocido (descubierto en 2013) pertenecía a esta familia:  $2^{57\,885\,161} - 1$ . Su detección la logró un equipo de investigación en línea formado por voluntarios, el Great Prime Internet Research (fundado por George Woltman). Sin embargo, a inicios de 2016, este mismo grupo anunció el descubrimiento de un nuevo primo del mismo tipo:

$$2^{74\,207\,281} - 1.$$

Este número, mayor que el anterior, consta nada menos que de 22 338 618 dígitos, tal como se aprecia en YouTube, «New World's Biggest Prime Number (PRINTED FULLY ON PAPER) - Numberphile». Pero esto no permite en lo absoluto apreciar su grandeza. Para realzar su inmensidad, es mejor señalar que la cantidad de partículas elementales de todo el universo observable es un número que puede ser escrito en apenas un par de líneas, mientras que el nuevo número primo necesita de cuatro gruesos tomos para ser impreso.

Si bien este hallazgo fue celebrado en el mundo entero —y ciertamente merece ser aplaudido—, es sano señalar que no se trata de un avance especialmente «importante» para la teoría. Contrariamente a lo que se suele pensar, la matemática no es una ciencia de cálculo, sino de comprensión. En este sentido, mucho más relevante que el descubrimiento de nuevos números primos es el estudio de las relaciones

entre ellos: ¿qué tan regularmente aparecen estos números?, ¿por qué a veces tienden a desaparecer, para luego reaparecer en pares?, ¿cómo se combinan bajo operaciones distintas a la multiplicación?

Cada una de las preguntas anteriores se puede ejemplificar con descubrimientos relativamente recientes. Por ejemplo, hasta el día de hoy se desconoce si existen infinitos primos para los cuales el número impar inmediatamente siguiente también es primo (los llamados «primos hermanos»). Sin embargo, hace un par de años, el hasta entonces desconocido matemático chino Yitang Zhang sorprendió al mundo académico al demostrar que, al menos, ¡hay infinitos primos que distan a lo más setenta millones de unidades del primo que les sigue! Rebajar ahora la distancia desde 70 000 000 a 2 parece una tarea abordable. De hecho, el proyecto en colaboración Polymath ya logró bajar la distancia inicial a 4680. Sabemos entonces que hay infinitos primos que «ya no están tan solos».

Otro problema de larga data (planteado por el húngaro Paul Erdős) fue resuelto la década pasada por Ben Green y Terence Tao, y constituyó el resultado clave para que a este último (muy probablemente, el matemático más brillante de la actualidad) le fuese otorgada la prestigiosa Medalla Fields el año 2006. Este se trata de la existencia de cadenas ascendentes de números primos arbitrariamente largas en las que la distancia entre uno y el que le sigue es siempre la misma. Si bien es un resultado puramente teórico (de hecho, estas cadenas de números debiesen en general comenzar con primos extraordinariamente grandes), su valor radica en lo profundo de su revelación: la secuencia de los números primos alterna largos momentos de gran caoticidad con lagunas en las que algún grado de estructura muy regular emerge. De cierta manera, esto concuerda con el hecho de que no existe ninguna fórmula matemática suficientemente «útil» que entregue todos los números primos.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse la solución a un problema planteado hace casi trescientos años por Christian Goldbach: tras avances preliminares a principios del siglo xx del ruso Ivan Vinogradov y más recientemente de Terence Tao, Harald Helfgott logró probar que todo número impar puede ser escrito como la suma de no más de tres números primos (vea en [www.elmostrador.cl](http://www.elmostrador.cl) el artículo «Matemático peruano resolvió un problema de 271 años de antigüedad»). Este avance notable es especialmente destacable por el hecho de que Helfgott es de nacionalidad peruana y frecuente colaborador con matemáticos de nuestro país, al punto de que una de las primeras presentaciones de su resultado la hizo en Valparaíso: <http://ima.ucv.cl> «Finaliza minicurso dictado por Harald Helfgott». Cabe señalar, sin embargo, que se desconoce todavía si todo número par mayor que 2 puede ser escrito como la suma de dos primos. Esta «conjetura de Goldbach fuerte» parece estar lejos de ser resuelta.

Al margen de estos progresos, existen muchas preguntas relacionadas aparentemente muy sencillas. Por ejemplo, no se sabe si hay infinitos primos cuyo producto por 2 más 1 sea nuevamente un primo. Estos números, estudiados por primera vez por la matemática francesa Sophie Germain (capítulo 21) hace más de doscientos años (y llamados «primos de Germain» en su honor), tienen hoy mucha importancia en criptografía.

#### Tres récords sobre números primos:

- La mayor pareja de primos hermanos conocida hasta septiembre de 2016 es la de los números  $2\ 996\ 863\ 034\ 895 \times 2^{1\ 290\ 000} - 1$  y  $2\ 996\ 863\ 034\ 895 \times 2^{1\ 290\ 000} + 1$ , los cuales constan de 388 342 dígitos cada uno.
- Hasta enero del 2017, no se conoce ninguna cadena explícita de veintisiete números primos en que la diferencia entre cada uno y el siguiente sea la misma, a pesar de que el teorema de Green y Tao afirma su existencia. El descubrimiento de la primera cadena de este tipo, pero con veintiséis números primos, data de 2010.
- El mayor número primo de Germain conocido al mes de septiembre de 2016 es igual a  $2\ 618\ 163\ 402\ 417 \times 2^{1\ 290\ 000} - 1$ .

Al igual que el firmamento, el universo de los números es un cosmos de gran belleza y complejidad, en el cual los primos «titilan» (¿azules?) «como astros a lo lejos». Sin duda alguna, mientras nuestra especie subsista, habrá quienes apunten sus telescopios imaginarios para seguir descubriendo uno a uno estos preciosos cuerpos y revelarnos sus secretos. A fin de cuentas, los números no dejan de ser una de las invenciones humanas más notables, y como tales nos acompañarán hasta nuestro último día.

## BIENVENIDO EL COMPUTADOR



Abstraerse del uso de los computadores no solo es imposible, sino que también carece de todo sentido. La computación es, quizás, el avance tecnológico más importante en toda la historia de la humanidad, al punto de que, hoy en día, gran parte de nuestra vida se estructura en torno a máquinas automatizadas. Obviamente, a este fenómeno no escapan los científicos. Por cierto, la computación también es una ciencia, con notables precursores en aspectos ligados tanto a la física como a la matemática (Ada Lovelace, Alain Turing, Hedy Lamarr, etcétera). Además, ella ha colaborado con todas las otras disciplinas científicas. Por ejemplo, en lo que respecta a la matemática, hubiera sido impensable estudiar en profundidad los fractales si no se hubiese dispuesto de imágenes de alta resolución que solo un computador moderno puede elaborar. Para constatar esto, solo basta con observar y comparar las ilustraciones del conjunto de Mandelbrot del capítulo 18.

Pero la computación ha ido incluso más allá, llegando a reemplazar al propio ser humano en el campo intelectual. Es así como, desde la década de los setenta a la fecha, una nueva ola, la de las «demostraciones (asistidas) por computador», ha comenzado a inundar todas las ramas de la matemática y ha generado una álgida discusión sobre nuestro rol en ella.


Históricamente, se considera que la primera prueba matemática asistida por un computador es la del famoso teorema de los cuatro colores, el cual había sido planteado como problema hacia fines del siglo XIX en Inglaterra. Según este, si se tiene un mapa cualquiera en que cada una de las regiones es conexa (es decir, no está formada de varios pedazos), entonces se necesitan apenas cuatro colores para pintar cada una de las regiones sin que existan dos contiguas del mismo color (para mapas «reales» no se debe contar el mar como región).



A la izquierda: un mapamundi simplificado pintado con solo cuatro colores en el cual ningún par de países limítrofes tiene el mismo color. Señalemos que, en estricto rigor, el hecho de que este mapa pueda ser pintado de esta manera no resulta del teorema, pues existen países «no conexos» en un mismo continente (como Rusia, que posee un territorio —Kalingrado— del lado oeste de Lituania). A la derecha: un «mapa» que es imposible pintar con solo cuatro colores de modo que las dos regiones marcadas con A (que simulan pertenecer a un mismo país) tengan el mismo color y ningún par de regiones limítrofes tenga el mismo color.

Si bien este problema carece de aplicación práctica alguna en cartografía, tiene un alto interés matemático, donde es tema de estudio de la topología (capítulos 12 y 13). Para percibir algo de este aire

topológico, basta señalar que si se plantea la misma situación sobre un «toro» o una banda de Möbius, entonces el número mínimo de colores necesarios es, respectivamente, siete y seis.



A la izquierda: la construcción de un toro y de un mapa sobre él que no puede ser pintado con 6 colores sin coincidencia entre vecinos. A la derecha: la construcción de un mapa sobre una banda de Möbius que no puede ser pintado con 5 colores sin coincidencia entre vecinos.

En 1879, Alfred Kempe anunció la solución, pero un error fue hallado en 1890 por Percy Heawood, quien de paso logró establecer una solución correcta, pero usando cinco colores en lugar de cuatro. Sin embargo, las ideas de Kempe resultaron fundamentales para el trabajo posterior. En particular, en la década de los sesenta e inicios de la de los setenta, el alemán Heinrich Hess logró reducir el problema al tratamiento de una lista finita de mapas «posiblemente patológicos». Él fue también el primero en usar computadores para abordar estos casos, pero no contó con la suficiente tecnología para ello. Hubo que esperar hasta 1976, cuando Kenneth Appel y Wolfgang Haken redujeron la lista de mapas a tan solo 1939, y corroboraron la posibilidad de pintar adecuadamente cada uno de ellos.

La inquietud que surgió no fue la reducción del problema general a estos 1939 mapas; de hecho, esta tiene una argumentación totalmente rigurosa y perfectamente entendible (aunque por escrito abarca más de cuatrocientas páginas). El gran problema que se suscitó es que, para colorear cada uno de los 1939 mapas «especiales», se debió programar una computadora, que demoró más de un centenar de horas en realizar la tarea. Y esta tarea es imposible que sea corroborada por un ser humano en el lapso de tiempo que dura una vida...


Una serie de cuestionamientos fueron entonces esgrimidos: ¿se puede confiar en que la computadora no cometió un error?, ¿puede el producto final ser considerado una prueba? El primero es más inmediato de abordar. De hecho, tanto en este caso como en posteriores, se ha propiciado la creación de otro programa que sirva de test para dar validez al primero (si bien esto deja aún un margen de incertezza, esta se ve enormemente reducida con este mecanismo). Respecto al segundo, no deja de recordarnos algunos casos de demostraciones extremadamente elaboradas y perfectamente hechas por humanos pero que nadie, aparte del autor, ha podido descifrar (por ejemplo, la de Karl Reinhardt; capítulo 3). Esto no hace sino llamarnos a reivindicar la esencia misma de la actividad matemática, en la cual lo que se pretende no es hacer un catastro de todas las posibles afirmaciones ni determinar cuál es correcta y cuál no, sino que más bien se quiere estructurar el pensamiento de acuerdo con patrones comunes. Tal como decía Henri Poincaré: «La ciencia se construye a partir de hechos al igual que una casa de ladrillos, pero un conjunto de ladrillos no forma una casa». Por lo demás, no debemos subvalorar jamás la importancia de plantear nuevas situaciones, en concordancia con lo que decía Georg Cantor: «En matemática, el arte de hacer preguntas debiese ser puesto en mayor consideración que el de resolverlas». Por último, tampoco debemos sobrevalorar el rol de las demostraciones, tal como William Thurston sentenciaba: «La matemática no se trata de probar, sino de entender». Ciertamente, para resultar airoso en esta misión, la imaginación y la creatividad humanas son imprescindibles. Pero justamente, esto último es quizás lo que nos interpela a plantearnos una disyuntiva aún más intimidante: ¿llegarán algún día las máquinas a reemplazar al ser humano en toda forma de actividad intelectual (o, al menos, matemática)? Se trata, evidentemente, de una pregunta que nos reenvía a otros contextos, y para la cual no podemos ofrecer una respuesta satisfactoria hoy.



Algunas demostraciones matemáticas recientes utilizan supercomputadoras de alto procesamiento dado su elevado nivel de complejidad. En la fotografía se muestra el segundo computador de mayor capacidad de Latinoamérica: Leftraru, original del nombre «Lautaro» y cuyo significado en mapudungún es «halcón veloz». Aunque la máquina se encuentra físicamente en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, trabaja en red con diversas instituciones del país.


Mientras tanto, las computadoras siguen ganando terreno en matemática, al punto de que una revista especializada, *Experimental Mathematics*, solo publica artículos en los que el uso del computador sea fundamental, sin importar si todos los argumentos o solo una parte de ellos han podido ser establecidos con todo rigor y/o son verificables por un ser humano. La matemática ha adquirido así cierto carácter empírico gracias a estos «experimentos» ejecutados por máquinas. Ciertamente, este punto de vista ha dado y seguirá dando muchos frutos. A continuación me referiré solo a otros tres problemas tratados por esta vía dentro de una larga lista que no cesa de crecer.

**La conjectura de Kepler.** La pregunta es muy sencilla y natural: ¿cuál es la mejor manera de colocar en el espacio un conjunto muy grande de esferas del mismo diámetro, es decir, la manera en que queda menos espacio entre ellas? Esta interrogante intrigó a Johannes Kepler, quien conjeturó que había dos formas óptimas de disponer las esferas: con sus centros formando o bien cuadrados o bien hexágonos en cada nivel, tal como se apilan las naranjas en cualquier almacén y como aparece ilustrado abajo. En ambas disposiciones, la proporción del espacio dentro de las esferas es igual a  $\frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0,748\dots$ , es decir, ligeramente inferior a  $3/4$ .



La demostración de esta conjetura es obra de la misma dupla de la prueba de la afirmación de Pappus sobre la forma de los panales de las abejas (capítulo 3): László Fejes Tóth y Thomas Hales. El primero constató en 1953 que el problema geométrico puede ser transformado en un cálculo explícito. Décadas más tarde, el segundo emprendió estos cálculos, lo cual lo llevó a considerar el valor de una cierta cantidad que depende nada menos que de 150 variables y buscar su mínimo posible. Para acometer esta colosal tarea utilizó un computador, el que le arrojó los valores esperados en 1999. La conjetura de Kepler quedaba así establecida, aunque dejando un pequeño espacio para la duda. Solo en enero de 2015, una prueba completamente formal fue propuesta por el mismo Hales y su equipo de colaboradores, pero hacia fines de 2016 esta no había sido totalmente validada por los especialistas.

Una de las razones que hacía sospechar sobre la validez del resultado de Hales es que un problema muy similar, propuesto por lord Kelvin, resultó tener una respuesta contraria a la intuición. Se trata de hallar la estructura poliédrica que logre cubrir todo el espacio ensamblándose consigo misma de manera repetitiva, de modo que la superficie de contacto entre una y otra sea la mínima posible en relación con el volumen de la estructura. Por más de un siglo se pensó que dicha estructura debía ser un octaedro truncado, el cual llena el espacio de la forma ilustrada más abajo.



El octaedro truncado y su llenado del espacio.

Sin embargo, en 1993, el joven estudiante Robert Phelan y su orientador, Denis Weaire, hallaron (usando un programa computacional) una estructura que mejora la proporción entre superficie y volumen del octaedro truncado en alrededor de 0,3%. Hasta el día de hoy, no se sabe si hay algo mejor que la «estructura de Weaire-Phelan».




A la izquierda: la estructura de Weaire-Phelan. A la derecha: el Centro Acuático Nacional de Beijing, construido para las Olimpiadas del 2008, cuyo armazón utiliza esta estructura.

**Jugando con el cubo Rubik.** Si bien pareciera ser una tontería que puede interesar solo a los amantes del juguete inventado por el húngaro Ernö Rubik en 1974, lo cierto es que tiene conexiones con áreas profundas de la matemática. En efecto, el conjunto de todas las configuraciones del cubo mágico tiene la estructura matemática de un grupo (capítulo 2), y la descripción de todas las posibilidades subyacentes se enmarca dentro del problema de entender las configuraciones de grupos con finitos elementos y el número mínimo de «pasos» para acceder a ellos. De manera más geométrica, imagine un grafo (capítulo 15) cuyos nodos corresponden a configuraciones distintas del cubo, de modo que dos de ellos están

unidos por una arista si las configuraciones respectivas pueden ser obtenidas una de la otra por un movimiento simple (cuarto de giro de una cara). ¿Qué tan grande es este objeto?

En el caso del cubo mágico, el número de configuraciones es igual a la friolera de 43 252 003 274 489 560 000, cifra superior a, por ejemplo, la cantidad de millonésimas de segundo que han transcurrido desde que existe la especie humana hasta la fecha. Pero lo que queremos medir acá es el largo de los «caminos» del grafo asociado, no la cantidad de nodos. En términos concretos, el problema se trata de determinar el menor número  $N$ , de modo que, a partir de cualquier configuración del cubo mágico, se pueda llegar a la configuración correcta (con cada cara de un solo color) en un número de movimientos menor o igual que  $N$ . Pues bien, después de grandes esfuerzos de mucha gente, y con la asistencia de un computador en la fase final del proceso, Tomas Rokicki y Morley Davidson lograron probar, en 2014, que dicho número es igual a 26. Es por ello que los fanáticos de este juego suelen llamar al veintiséis el «número de Dios». Además, muchos de ellos visitan periódicamente el sitio [www.worldcubeassociation.org](http://www.worldcubeassociation.org), de la Asociación Mundial del Cubo, que regula todos los campeonatos y récords oficiales al respecto.


Así, cada vez que usted vea un cubo Rubik, tenga la certeza de que puede resolverlo en no más de veintiséis movimientos. ¿Cuáles? Bueno, eso es más difícil de responder: si bien existen algoritmos concretos, ninguno otorga sistemáticamente una solución en un número mínimo de pasos. El cubo mágico no ha relevado, aún, todos sus misterios.



Un «movimiento» del cubo Rubik corresponde a un cuarto de rotación de una de sus caras (en un giro completo se vuelve a la configuración original).

**Pintando ternas pitagóricas.** El tratamiento computacional ha permitido desestimar fenómenos que, sobre la base de los datos conocidos, se creía que formaban parte de una estructura. El computador, al permitir el manejo de una mayor cantidad de datos, ha mostrado que tal estructura era en realidad ilusoria.

El ejemplo reciente más espectacular en torno a esto tiene relación con las ternas pitagóricas (capítulo 19), es decir, los números enteros positivos  $x, y, z$  que satisfacen la igualdad  $x^2 + y^2 = z^2$ . Pues bien, durante más de dos décadas se planteaba la posibilidad de dividir los números enteros en dos grupos, digamos el de los números «rojos» y el de los «azules», de modo que en cualquier terna pitagórica deba aparecer al menos un número rojo y uno azul. Se tenía antecedentes de que esto era posible para números pequeños. Sin embargo, una computadora permitió constatar que, si bien esto es posible hasta el 7824, ya no lo es para 7825.



Arriba, cada número hasta el 7824 aparece pintado de uno de tres colores. Se puede pintar cada uno que aparece en blanco ya sea de rojo o de azul; con cualquier elección que se haga, en ninguna terna pitagórica los números tendrán todos el mismo color. Por ejemplo, el 3 aparece en azul y el 5 en rojo, por lo que cualquier color que se escoja para el 4 (que aparece en blanco) hace que la terna 3, 4, 5 sea bicolorada. La terna 5, 12, 13 aparece en azul, rojo y rojo. Con mucha paciencia, usted podría chequear el bicoloramiento de todas las ternas listadas en el capítulo 19.

Para comprobar que las ternas pitagóricas hasta el 7825 no son bicolorables con la propiedad deseada, se debe analizar algo así como  $10^{2300}$  posibilidades, un número realmente estratosférico (igual a un 1 con 2300 ceros a su derecha). Marijn Heule, Oliver Kullmann y Victor Marek lograron, sin embargo, reducir el número a considerar a algo así como  $10^{12}$ , una cantidad que, aunque es considerablemente inferior, es aún mayor que cien veces la cantidad de milímetros que hay entre Arica y el Cabo de Hornos. Sorprendentemente, en 2016, ejecutando programas computacionales en paralelo, testearon que la bicoloración deseada del 1 al 7825 no existe.

Debido a la cantidad de memoria empleada, esta es considerada hasta la fecha la mayor demostración computacionalmente asistida que ha sido ejecutada. Sin embargo, no debiera sorprendernos que este récord sea batido sistemáticamente en los próximos años. Los computadores llegaron para quedarse, independientemente de que esto pueda o no gustarnos.

## SIETE PROBLEMAS INOCENTES QUE NADIE HA PODIDO RESOLVER AÚN



La mayoría de los grandes problemas de la matemática de hoy son extraordinariamente elaborados. Por ello, aun cuando tienen formulaciones precisas, para entenderlas es necesario disponer de todo un arsenal de conocimientos previos que muchas veces escapan incluso a matemáticos profesionales no especializados. También hay problemas menos concretos, pero igualmente importantes, en los que se propone una veta explorable en un determinado tema, o bien toda una nueva teoría por desarrollar. Por ejemplo, la tecnología del *Big Data* ha llegado en un momento en que la matemática no está lista para afrontar, de manera conceptual, la avalancha de datos de los que disponemos por primera vez en nuestra historia. Confiamos, sin embargo, en que no tardaremos mucho tiempo en ponernos al día.

Junto con lo anterior, sobreviven sin solución problemas aparentemente muy sencillos pero que han sido un gran dolor de cabeza para generaciones de matemáticos. En general, estos tienen conexiones profundas con líneas de investigación de vanguardia, aunque sus enunciados son tan simples que los hacen accesibles con tan solo unos pocos conocimientos básicos (incluso a veces no se precisa saber absolutamente nada para entenderlos). Para cerrar este libro, a continuación le presento una lista de siete de estos problemas con un mínimo de explicación, de modo que el campo quede abierto para que usted se anime a resolvérlas. Nada pierde con intentarlo, aunque por experiencia, le recomiendo no hacerlo mientras baja alguna escalera, pasea en bicicleta o conduce un automóvil.

De más está decir que, si resuelve alguno (o varios) de ellos, me complacería enormemente conocer su solución.

### Los números perfectos y los primos de Mersenne

Un número (entero y positivo) es «perfecto» si es igual a la suma de sus divisores que son menores que él. Por ejemplo, 6 es perfecto, pues sus divisores son 1, 2, 3 y 6, y se cumple

$$1 + 2 + 3 = 6.$$

Igualmente, 28 es perfecto, ya que sus divisores son 1, 2, 4, 7, 14 y 28, y

$$1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28.$$

Con «un poco» de paciencia, usted podría chequear que los próximos números perfectos son 496 y 8128.

Dos preguntas sobre estos números siguen sin respuesta desde los tiempos de la antigua Grecia. De hecho, podría decirse que estos son los problemas más longevos de la matemática que continúan sin solución:

- ¿Existe algún número perfecto impar?
- ¿Existen infinitos números perfectos pares?

Hay cierto consenso en que no debieran existir números perfectos impares. Sobre los perfectos pares, se sabe que deben ser del tipo  $2^{n-1}(2^n - 1)$ , siempre y cuando  $(2^n - 1)$  sea un número primo. El problema es que se desconoce si existen infinitos primos de la forma  $(2^n - 1)$  (a la fecha, solo se sabe de 49

números de este tipo). Recuerde que estos son llamados «primos de Mersenne», y el más grande que se conoce es, de hecho, el mayor número primo conocido a la fecha (capítulo 34):  $2^{74\,207\,281} - 1$ .

## Los primos de Fermat

Otra familia interesante de números es aquella formada por los primos que son de la forma

$$2^{2^n} + 1,$$

conocidos como «primos de Fermat». Con  $n$  igual a 0, 1, 2, 3 y 4 obtenemos respectivamente los primos 3, 5, 17, 257 y 65 537. ¿Existe algún otro primo de Fermat? ¿Existen infinitos? Contrariamente a lo que sucedió con su «conjetura» (capítulo 22), Pierre de Fermat no aventuró respuesta alguna. De hecho, cometió un error: aseguró que para  $n = 5$ , la expresión dada más arriba origina un número primo. Sin embargo, años después, Leonhard Euler observó que

$$2^{2^5} + 1 = 4\,294\,967\,297 = 641 \times 6\,700\,417.$$

A la fecha, lo mejor que se sabe es que para todo entero  $n$  entre 5 y 32, la expresión no origina un número primo. Como es de esperar, esto ha podido ser establecido gracias a la ayuda computacional (capítulo 36), pues se trata de números extraordinariamente grandes.

## El problema $3n + 1$

Comencemos con un número entero positivo cualquiera. Si es par, dividámolo por 2; si es impar, multipliquémoslo por 3, y añadamos 1 al resultado. Obtenemos así un nuevo número, al que podemos aplicar otra vez la operación. Por ejemplo, comenzando con 4, obtenemos el ciclo infinito

$$4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow \dots$$

Si empezamos con 5 obtenemos

$$5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow \dots$$

y a partir de 7 surge

$$7 \rightarrow 22 \rightarrow 11 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 52 \rightarrow 26 \rightarrow 13 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow \dots$$

En los tres casos descritos, hemos caído en el ciclo  $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow \dots$ . La pregunta es: ¿sucede lo mismo si empezamos con cualquier otro número? Ciertamente, puede que tardemos muchísimo en caer en el ciclo, incluso comenzando con números relativamente pequeños. Por ejemplo, si empezamos con 27, se debe ejecutar la operación 108 veces antes de llegar al ciclo. Sin embargo, se cree que, inexorablemente, todo número será «atraído» en algún momento por la combinación  $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow \dots$

Este problema fue propuesto por primera vez por el alemán Lothar Collatz en 1937. Hay quienes creen que su solución caerá (¿de un árbol?) muy pronto.



## Los dígitos de $\pi$

Recuerde que un número irracional tiene una expresión decimal que nunca se torna periódica (capítulo 8). Tal es el caso del más famoso de todos:  $\pi$ . La expresión decimal de este número comienza con

3,14159265358979323846264338327950...

Hasta aquí, todos los dígitos 0, 1, ..., 9 han aparecido. ¿Aparecen infinitos dígitos 0 en la expresión decimal infinita de  $\pi$ ? ¿Aparecen infinitos dígitos 1, 2, 3, etcétera? Hasta el día de hoy, se desconoce la respuesta.

Se cree que no solo cada dígito tiene que estar incluido infinitas veces, sino que, además, cada dígito tiene que aparecer en la misma proporción. Por ejemplo, entre las primeras diez millones de cifras decimales de  $\pi$ , debiese haber alrededor de un millón de 0, 1, 2, etcétera. Y este es el caso, pues hasta este nivel de desarrollo hay:

999 440	dígitos 0,
999 333	dígitos 1,
1 000 306	dígitos 2,
999 965	dígitos 3,
1 001 093	dígitos 4,
1 000 466	dígitos 5,
999 337	dígitos 6,
1 000 206	dígitos 7,
999 814	dígitos 8,
1 000 040	dígitos 9.

El problema de la distribución de dígitos no solo contempla el que todos aparezcan, sino también el que cualquier combinación de ellos lo haga. Cuando esto ocurre y, además, las combinaciones de igual largo van apareciendo en la misma proporción, se dice que el número en cuestión es «normal». Por ejemplo, el número

0,1121113111141111151111116111111117111111118...


no es normal, pues a pesar de que utiliza infinitas veces todas las combinaciones posibles, el dígito 1 aparece en mucho mayor proporción que todos los demás. En cambio, en un número normal, la combinación 123 456 789 debe aparecer con una proporción cada vez más cercana a 1 sobre mil millones (1 sobre  $10^9$ ). Y cosas muchísimo más sorprendentes son válidas. Imagine que cada letra del alfabeto sea codificada con un número del 1 al 29 diferente de 10 y 20, que se usa otros números (28, 29, ..., evitando el 30, 40, etcétera) para codificar los signos de puntuación y todo otro símbolo necesario para la escritura en castellano, y se reserva el 0 para indicar el paso de un carácter a otro. Una vez establecidas estas reglas, todo texto puede ser codificado en un gran número; por ejemplo, la palabra «boca» se codifica en el 20 170 301 (el 2 inicial corresponde a la letra «b», el 0 indica que viene otra letra, el 17 es la «o», el 0 indica que viene una nueva letra, el 3 es la «c», el 0 da paso a otra letra más, y el 1 final es la «a»). Pues bien, en un número normal, aparecerá infinitas veces la codificación numérica de cada obra literaria que ha sido escrita a lo largo de la historia, y estará codificada además cada una de las que serán escritas en el futuro. La poesía de Gabriela Mistral, el teatro de Shakespeare, las novelas de Dostoyevski y los chistes de Condorito, todos están codificados en los dígitos de cualquier número normal. Y si agregamos nuevos números a nuestra simbología, también habrán versiones de todas ellas en todos los idiomas (tanto existentes como futuros). Sin duda alguna, Borges hubiese adorado los números normales.

Es posible probar con total rigor matemático el asombroso hecho de que «casi todo número» es normal, en el sentido de que si escogemos un número «al azar», muy probablemente el elegido lo será. Sin embargo, todos los esfuerzos para probar la normalidad de  $\pi$  han resultado infructuosos.


Más allá de la interrogante planteada de manera particular para  $\pi$ , entender la distribución de los dígitos de números irracionales específicos es un problema mayor en matemática. Por ejemplo, hasta el día de hoy, también se desconoce si todos los dígitos aparecen infinitas veces en la expresión decimal de  $\sqrt{2}$ . Se conjectura, sin embargo, que se trata de un número normal.

## Coloreando el plano

¿Cuántos colores son necesarios para pintar el plano de modo que no haya dos puntos del mismo color que estén a distancia exactamente igual a 1? Tal como se observa en la figura, esto es posible con apenas siete colores: basta embaldosar el plano con hexágonos cuya diagonal mayor sea ligeramente menor que 1 y, luego, pintarlos apropiadamente (observe que cada hexágono está circundado por otros seis hexágonos, todos los cuales están pintados de colores diferentes; además, para ir de un hexágono de un color a otro del mismo color se debe atravesar al menos otros dos hexágonos).



¿Existe alguna configuración colorida de otros polígonos o figuras no muy complicadas que asegure la misma propiedad, pero usando solo seis colores?, o bien, ¿usando menos colores mediante configuraciones más sofisticadas, en las cuales los puntos pintados con un mismo color puedan formar, por ejemplo, un fractal? Muy poco se sabe de este problema, salvo que con tres colores es imposible pintar el plano con la propiedad pedida. Esto se debe a que existe un arreglo de tan solo diez puntos que no pueden ser pintados con solo tres colores de modo de respetar la regla.




Grafo de los hermanos Leo y William Moser: en él, los vértices aparecen engrosados de modo de poder visualizarlos. Todas las aristas dibujadas tienen longitud 1. Como se observa, estos vértices se pueden colorear con cuatro colores de manera que no haya arista que una dos del mismo color. Sin embargo, con algo de paciencia, podrá constatar que esto es imposible usando tan solo tres colores.

## El cuadrado inscrito

Sin levantar el lápiz sobre una hoja de papel, haga un trazo que comience y termine en el mismo punto, y asegúrese de que no pase dos veces por ningún otro punto. Curiosamente, a la figura resultante los matemáticos solemos llamarla «curva» (pese a que puede perfectamente contener trozos de rectas) y le añadimos los epítetos «continua» (por trazarse sin saltar de una posición a la otra levantando el lápiz), «cerrada» (por comenzar y terminar en la misma posición) y «simple» (por no tener autointersecciones).

En 1911, el alemán de origen judío Otto Toeplitz planteó la siguiente interrogante: dada una curva continua, cerrada y simple cualquiera del plano, ¿existe al menos un cuadrado cuyos vértices sean todos puntos de la curva?




Un par de cuadrados con vértices en la curva.

Se sabe que la respuesta es afirmativa para curvas «suaves», por ejemplo para aquellas formadas por trozos de rectas, círculos, parábolas, etcétera. Lo mismo sucede para curvas que encierran una región convexa. No obstante, la respuesta, en general, sigue siendo un misterio.

## La cajita feliz

Euler pasó una parte de su vida buscando un paralelepípedo de ángulos diedros rectos en el cual todos los lados tienen longitudes enteras, al igual que las diagonales de las caras y la diagonal espacial. En otras palabras, persiguió una caja recta como la ilustrada más abajo, para la cual los valores de las longitudes  $a, b, c, d, e, f, g$  son todos enteros positivos.



La dificultad de este problema radica en que los valores de  $d, e, f$  y  $g$  quedan evidentemente determinados por aquellos de  $a, b$  y  $c$ . Es más, se puede describir explícitamente esta dependencia, pues en virtud del teorema de Pitágoras (capítulo 6) deben cumplirse las igualdades:

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 &= d^2, \\
a^2 + c^2 &= e^2, \\
b^2 + c^2 &= f^2, \\
a^2 + b^2 + c^2 &= g^2.
\end{aligned}$$

En 1719, Paul Halcke casi dio con una caja perfecta: si  $a = 44$ ,  $b = 117$  y  $c = 240$ , entonces se debe tener  $d = 125$ ,  $e = 244$ ,  $f = 267$  y

$$g = \sqrt{73\,225} = 5\sqrt{29} \times 101 = 270,60118\dots$$

Lamentablemente, este último no es un número entero (de hecho, es un número irracional; capítulo 8).

Hasta el día de hoy se ignora si alguna «cajita feliz de Euler» existe. Se sabe sin embargo que, en caso de existir, la longitud de al menos un lado debe ser mayor que tres billones. Y no se sabe mucho más.

## EPÍLOGO: LA CIENCIA DE LA ESENCIA

«La matemática consiste en sacar conceptos desde la oscuridad»

*Esquicios de un programa*  
**Alexander Grothendieck**

«Porque de la palabra que se ajusta al abismo  
surge un poco de oscura inteligencia»

*«Porque escribí»,*  
*La musiquilla de las pobres esferas*  
**Enrique Lihn**

Los albores de la matemática se remontan a las comunidades más antiguas. En ellas, actividades fundamentales para la supervivencia fueron estimulando habilidades cognitivas que, con el correr de los milenios, configuraron dicha ciencia. Habitualmente, se tiende a indicar como hito fundador el surgimiento de los números. Sin embargo, diversos procesos anteriores fueron igualmente relevantes. Sin ir más lejos, el surgimiento del lenguaje, la posterior invención de la protoescritura y, finalmente, de la escritura, suponen el desarrollo de procesos de abstracción formidables, gracias a los cuales hoy podemos comunicarnos gráficamente utilizando apenas unos cuantos signos (veintisiete letras en la lengua castellana, dos *bits* en el computador). Y si bien no pretendemos entrar aquí en este tema tan apasionante como controversial y difícil —la relación entre los procesos matemáticos y lingüísticos—, no deja de ser revelador el hecho de que uno de los lingüistas más revolucionarios del siglo XX, Noam Chomsky, haya realizado estudios de matemática en su juventud.

La capacidad de abstracción fue la habilidad necesaria para edificar los cimientos de la matemática a partir de dos problemas básicos: contar y orientarse.

Muy probablemente, la idea de cuantificar surgió a partir de una necesidad elemental: comparar cantidades de objetos. Difícilmente sabremos algún día exactamente cómo y dónde surgieron, en este proceso, los números. Lo concreto es que, en varias comunidades del mundo actual, se dispone de vocablos solo para designar cantidades pequeñas, y a todo lo que está por sobre cierto límite se le llama, simplemente, «mucho». Y aunque esto pueda parecer «primitivo», no deja de revelarnos el valor del poder de la abstracción, ya que es solo en el mundo abstracto donde tiene sentido, por ejemplo, una cifra como  $2^{74} 207 281 - 1$  (el número primo más grande descubierto hasta la fecha; capítulo 31), pues, muy probablemente, esta sea mayor que la cantidad de partículas elementales de todo el universo observable. Por esta misma razón, el proceso de construcción de los números no fue en lo absoluto sencillo. No es de extrañar, entonces, que el surgimiento del cero haya sido un suceso relativamente reciente, posterior a la cultura helénica (los griegos nunca pudieron conferir mayor sentido a «algo» que representa la «nada») y obra de —entre otras— la civilización maya.

La necesidad de orientarse fue importantísima en los procesos migratorios. La observación de los astros en el cielo y la medición de las distancias sobre la base del tiempo necesario para recorrerlas deben haber conferido algunos de los elementos para constituir nociones geométricas elementales. Una vez sedentarizadas, las comunidades debieron seguir estudiando el firmamento para desarrollar una de las actividades más importantes de la civilización: la agricultura. Ciertamente, la observación en paralelo de pequeños fenómenos como el simple rodar de una piedra (y la posterior invención de la rueda), además de la necesidad de construir moradas, deben haber gatillado también parte de este pensamiento geométrico. Lo concreto es que los primeros vestigios de figuras geométricas abstractas, hallados en unas rocas de Sudáfrica, datan de setenta mil años de antigüedad.

Contar, orientarse y entender, sobre la base de la abstracción. Según el matemático francés Étienne Ghys, son estas tres necesidades mínimas las que, hasta el día de hoy, no solo configuran la matemática, sino que también la hacen imprescindible. En torno a ellas se han ido articulando las distintas disciplinas de esta ciencia, comenzando con las más básicas y antiguas —aritmética, geometría y lógica—, pasando por las intermedias —álgebra, cálculo y probabilidades— y llegando a las modernas —teoría de conjuntos, topología, sistemas dinámicos, entre otras—. Aun así, el entrelazamiento de todas estas ramas es intrincado, pues en cada una de ellas se mezclan diversos procesos. Además, definir los orígenes de cada teoría es un ejercicio peligroso. Por ejemplo, si bien el análisis armónico —esto es, el estudio mediante el cálculo diferencial de los procesos que tienen cierta «circularidad»— no se institucionalizó sino hasta fines del siglo XVIII e inicios del XIX con los trabajos de Fourier sobre la propagación del calor, sus

rudimentos eran dominados por las antiguas civilizaciones en su afán de predecir el movimiento de los cuerpos celestes.

Ante este mapa difuso cabe entonces preguntarse: ¿qué es, exactamente, la matemática? Para Aristóteles, era la «ciencia de las cantidades: la aritmética se ocupa de las cantidades discretas y la geometría de las continuas». Concordando con esto, pero en directa relación con lo anteriormente mencionado, René Descartes decía que «la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles». Más recientemente, en 1941 —durante su autoexilio de la Europa nazi—, el alemán Richard Courant escribió, junto a Herbert Robbins, un libro titulado justamente *¿Qué es la matemática? Una exposición elemental a las ideas y métodos*. La introducción de este clásico y apasionante texto concluye con una frase contundente: «Solo la experiencia activa en matemáticas puede responder a esta pregunta». De hecho, el propio Courant consideraba que su título era «un poco deshonesto», pues la razón fundamental de este fue aumentar el impacto de su obra (el nombre estaba inspirado en *¿Qué es el arte?*, de León Tolstoi, y fue decidido tras conversaciones con el escritor Thomas Mann).

Muy probablemente, cada persona que ha cultivado la ciencia ha tenido su propia respuesta a la pregunta de Courant. Un síntoma es el hecho de que, en la versión en inglés de Wikipedia, hay una entrada especial para «definiciones de la matemática». Y habiendo ya tantas acepciones, nada se pierde con arriesgar una más.


Los antiguos griegos tuvieron una perspicacia notable en casi todas las actividades nobles del ser humano. Sin ir más lejos, fueron ellos quienes dieron origen a la palabra «matemática». Y a partir de esta es que, aún hoy, pueden enseñarnos algo nuevo. En efecto, etimológicamente, esta palabra proviene del vocablo *máthema*, que se refiere a «lo que se enseña, aprende y comprende». Increíble revelación de la perspicacia del pueblo helénico: la matemática podría ser entendida como el conocimiento estable, aquel que no se modifica en el tiempo por el devenir de los procesos naturales. Cobra mayor sentido entonces lo que afirmaba Godfrey Hardy en su celebrado libro *La apología de un matemático*: «La matemática griega es permanente, incluso más que la literatura griega; cuando Esquilo ya haya sido olvidado, Arquímedes será aún recordado». Así, sencillamente, «Las matemáticas son para siempre», tal como señala el título de una de las conferencias de divulgación más difundidas hoy en día, en la cual Eduardo Sáenz de Cabezón exhibe una brillante mezcla de humor y sagacidad que merecen ser disfrutados (disponible en YouTube).

Pero, ¿de dónde proviene esa estabilidad única de la matemática?, ¿por qué la obra de Pitágoras, Arquímedes y Euclides sigue siendo, a más de dos milenios de su creación, igual de relevante y trascendental para nosotros, y la defendemos como si se tratase de materia sagrada?, ¿por qué nuestros patrones son los mismos que los de los sabios helénicos de la antigüedad e insistimos, por ejemplo, en dictar clases armados solo de un trozo de tiza frente a un pizarrón?, ¿por qué, cuando —en pleno siglo XX— Alexander Grothendieck tuvo en su mente una idea revolucionaria, la plasmó en una colección de monografías titulada *Los elementos de la geometría algebraica*, emulando el título del famoso libro de Euclides?

La comunidad matemática es increíblemente cohesionada. Por ejemplo, la matemática es la única ciencia que realiza un encuentro periódico (su «Congreso Internacional»; capítulo 19) en el cual participa absolutamente toda la comunidad mundial, ya sea de modo presencial o a distancia. La lista de todos los expositores desde la primera versión de este evento (realizada en 1897) hasta la fecha está celosamente custodiada en [www.mathunion.org](http://www.mathunion.org). En torno al contenido de estas charlas ha girado todo el desarrollo de la matemática de los últimos ciento veinte años. Pero, lamentablemente, su historia ha sido tradicionalmente escrita sobre la base de criterios que priorizan logros individuales de personajes señeros, contraviniendo de este modo el proceso simbiótico que da real sustento al progreso del conocimiento. Tal como señalaba William Thurston, así como en el fútbol tendemos a recordar solo a quienes marcan goles, en la matemática tendemos a reconocer solo a quienes logran el puntapié final de una demostración, despreciando con ello el rol de todo el equipo que impulsó las ideas y orientó los objetivos. Algo similar ocurre en todas las ciencias. Por lo mismo, urgen más relatos historiográficos que expongan a estas como un flujo permanente, un viaje de ideas e información de época en época, de comunidad en comunidad, de persona a persona. Al mismo tiempo, urge un análisis exhaustivo que ponga de relevancia el rol de la educación desde las edades más tempranas en el desarrollo científico de las naciones. Imagine por un momento que, desde 1818 a la fecha, en las escuelas de Chile se hubiese enseñado sistemáticamente la composición geométrica de la bandera de la Independencia, con todos los triángulos y gnómones áureos de su campo azul (capítulo 1). ¿No es razonable pensar que, de haber sido así, el embaldosado de Penrose, basado en los mismos triángulos (capítulo 5), habría sido descubierto décadas antes en nuestro país, tal vez por niños jugando con esas piezas triangulares a modo de rompecabezas en un aula?

Al igual que los músicos, los matemáticos somos particularmente agradecidos con nuestros maestros, así como con los maestros de generaciones pasadas. Es tal esta tradición que el sitio de internet de la American Mathematical Society maneja un repertorio genealógico de más de doscientos mil registros, el cual comienza en los tiempos modernos (<https://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/>). En este, la condición de ancestro directo se concede por haber dirigido una tesis de doctorado. Al apreciar este gigantesco árbol de nombres podemos dimensionar en parte el carácter colectivo del trabajo matemático,

que forma parte de la labor más grande que ha emprendido la especie humana desde sus orígenes en su incansable búsqueda de la verdad: el desarrollo de la ciencia. Como diría nuestro poeta Gonzalo Rojas, en esta gran familia, cada persona no es sino «uno más en el coro infinito». Un coro al que, sin duda alguna, se contempla con cierta admiración, y al que no dejamos de experimentar un pequeño y humilde orgullo de pertenecer.



Un árbol genealógico matemático puede ser adquirido en formato de póster por una modesta suma. Con esta conseguí el mío para disfrutar contemplando los nombres de algunos de mis ancestros, entre los que figuran nada menos que Nicolás Copérnico, Gottfried Leibniz, Jean Le Rond D'Alembert, Jacob y Johann Bernouilli, Leonhard Euler, Pierre-Simon Laplace, Joseph-Louis Lagrange, Élie Cartan y Étienne Ghys (un extracto se muestra arriba). En esta genealogía, todas las personas ligadas a la matemática llegamos a ancestros comunes.

Pero, según la concepción helénica, no basta con que algo sea cierto para que trascienda: también se requiere que sea hermoso. Tal como decía Bertrand Russell, «las matemáticas poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema, una belleza fría y austera, como la de una escultura», mientras que para Albert Einstein, la matemática no era sino «la poesía de las ideas lógicas». Y esto no solo lo testimonian los científicos, sino también los artistas. Sin ir más lejos, el célebre poeta portugués Fernando Pessoa afirmaba: «El binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo; lo que hay es poca gente que se dé cuenta de ello».

La persecución de esta belleza es un elemento ineludible para entender la actividad matemática. Muchas veces, en el curso de una investigación, la intuición nos guía por un camino en lugar de otro simplemente porque su derrotero es «más hermoso». No resulta extraño entonces que, al enterarnos de un nuevo gran resultado, nuestra primera expresión ante este no sea un «¡qué impresionante!» de asombro, sino simplemente un «¡qué lindo!», o un «¡qué elegante!», envuelto en emoción. Como decía Henri Poincaré, «no se estudian las matemáticas puras porque sean útiles» (y por cierto que lo son); «se estudian porque, en ese proceso, se experimenta placer, y ese placer proviene del hecho de que son hermosas». En este sentido, no debemos olvidar nunca que, en cierta época, dos ramas de la matemática (la aritmética y la geometría) no solo eran consideradas ciencias, sino que también formaban parte de las siete artes liberales.

Verdad y belleza se han ido confabulando en el saber matemático que, a lo largo de los siglos, se ha revelado como el lenguaje de la naturaleza. Y aunque podamos discurrir eternamente en torno a este último punto, nadie osaría poner en cuestionamiento el conocimiento que, en el curso de apenas algunos milenios, ha permitido sacar al ser humano de las cavernas para llevarlo a explorar los misterios del universo, todo siguiendo el sabio precepto de Galileo Galilei.

Pero la matemática no ha alcanzado, sus máximos límites (y de hecho, nunca lo hará). El siglo XXI será, muy probablemente, el de la consagración de los métodos matemáticos en sociología y, quizás, también en biología. De allí en adelante, resulta muy arriesgado aventurar algo. ¿Cómo serán las matemáticas dentro de cinco mil años? ¿Denotaremos los números tal cual lo hacemos hoy en día, de diez en diez, supeditados a los diez dedos de nuestras manos dada nuestra condición humana? ¿O habremos descubierto un nuevo sistema, mucho más astuto, basado —por ejemplo— en la distribución de los números primos, el cual revele por sí mismo algunos aspectos de la aritmética que, hasta el día de hoy,

son un total misterio? ¿Habremos desarrollado habilidades cognitivas que nos permitan ver en más de tres dimensiones o percibir naturalmente la hiperbolicidad de la geometría a gran escala del universo?

Con toda seguridad, dentro de un par de milenios, miraremos hacia atrás y juzgaremos como primitivos algunos de nuestros avances presentes, tal como lo hacemos actualmente con varios de los de nuestros antepasados. Por ejemplo, hoy nos causa una tierna hilaridad el hecho de que, en la mayoría de las antiguas culturas, los números no solo representaban cantidades, sino que también estaban provistos de género: los pares eran femeninos y los impares masculinos (la razón de esta distinción —claramente influenciada por la anatomía sexual— debiese ser obvia). Sin ir tan lejos, no deja de sorprendernos amargamente que el mismísimo Platón haya desviado tan equivocadamente su rumbo al postular que esos cinco objetos prístinos, los sólidos regulares, estaban asociados a los supuestos cinco elementos de la naturaleza (capítulo 9).

Pero hay una gran diferencia entre esto último y lo que sucederá en el futuro, pues el teorema de Pitágoras (capítulo 6) permanecerá inalterado por siempre, al igual que el triángulo numérico de Jayam y Pascal (capítulo 27), el infinito de Cantor (capítulo 22) y la geometrización de Poincaré, Thurston y Perelman (capítulo 14). Porque si hoy renegamos del género en el número o del éter en el dodecaedro, se debe a que trastocan la naturaleza última de los conceptos al añadir elementos ajenos a ellos, mientras que la verdad más antigua, la de Pitágoras, al igual que todas las verdades matemáticas posteriores, fue revelada tras decantar absolutamente todo lo accesorio en su camino.

Y de esto, precisamente, se trata la matemática. De desprender cada instancia de lo superfluo, de retirar la corteza para llegar a la médula y, una vez capturada en lo más profundo, vislumbrar su universalidad. No es simplemente la ciencia de las cantidades, medidas y formas. Es el producto del minimalismo racional llevado a un extremo que, por fuerza de descubrir lo sustancial, genera un saber estable e imperecedero.

La matemática es la ciencia de la esencia, y lo será eternamente.

## AGRADECIMIENTOS

Este libro no hubiese jamás existido de no haber sido por personas que impulsaron el proyecto desde un inicio y colaboraron permanentemente con él. Es entonces un deber placentero agradecer a todo el equipo de *El Mostrador*, y muy especialmente a Héctor Cossio, por el espacio abierto no solo a mí, sino a todo el mundo académico llano a debatir —una pequeña odisea en el periodismo chileno actual—; a Juan Manuel Silva, por haber volcado su sensibilidad hacia la matemática y haberme guiado hacia editorial Planeta —aunque lo primero debe ser considerado una victoria póstuma de Ramanujan (capítulo 30), en torno a quien gira uno de sus poemas—; a Pablo Véliz, por su confianza y por haberme asistido técnicamente con paciencia, diligencia y amabilidad en un principio; a Nicolás Libedinsky, por su trabajo «liresco» de recomposición (por tachadura y reescritura) de muchos de estos relatos —incluyendo sus títulos—, por el cual quizás debiese considerarme a la vez «halagado y ofendido»; a Mario Ponce —un apasionado por la promoción de la matemática en Chile—, por haberme gentilmente entregado muchas ideas y sugerido varios temas que quedaron plasmados a lo largo del texto; a Gladys Bobadilla, por su histórico artículo en la *Revista del Profesor de Matemática* sobre la dura historia de —entre otras— Hipatia, Germain, Kovalévskaya y Noether, el cual inspira en parte los capítulos 20 y 21 de este libro; a Christian Bonatti, por aquellas viejas discusiones en Lima, París y Olmué de las que brotó el concepto de «matemática y esencia»; a Hernán Aburto, por haber compartido conmigo sus elucubraciones matemáticas desde los ancestrales tiempos de liceo hasta el día de hoy y, en particular, por haberme instruido sobre el sorprendente episodio geométrico ligado a nuestra bandera; y a Víctor Navas y Yanina Piñones, por su trabajo sistemático de edición en inspiradas reuniones que usualmente devenían en conversaciones sobre la civilización griega, el valor cultural del fútbol o la importancia de la enseñanza de la gramática para la estructuración del pensamiento matemático...

Muchas de las ilustraciones que amenizan estas páginas fueron tomadas directamente (y con la debida autorización) de la web (muchas veces desde Wikipedia); otras fueron ya sea enteramente producidas o bien modificadas por Carolina Muñoz a partir de un original disponible en internet; finalmente, las imágenes de corte más netamente matemático fueron producidas por Alejandro Astudillo. Mención especial merecen ciertas ilustraciones tomadas de la obra de Alison Haltenhof, Paola González, Fernando de la Rocque, Jos Leys y Pasquale D'Silva, así como algunas fotografías realizadas por Geir Da Silva y Dante Yovane. Todos ellos accedieron gentilmente a que sus imágenes fuesen incluidas en este libro, y mis agradecimientos van también para cada uno.

Por razones de espacio, resulta imposible enumerar aquí a todos quienes, en columnas específicas, me señalaron imprecisiones, mejoras, correcciones y reelaboraciones. La lista de estas personas es extraordinariamente larga, especialmente porque en la frenética etapa final de confección del libro, cada nuevo capítulo fue subido a mi cuenta de Facebook para someterlo al más implacable escrutinio público. Y si bien no todas las sugerencias fueron implementadas, el simple ejercicio de afirmación de lo ya escrito, en contraposición a lo sugerido, fue un trabajo de singular valor. Por lo mismo, aun cuando no siempre estuve de acuerdo (y corro el riesgo de haber cometido numerosos errores por ello), les estoy profundamente agradecido a todos.

No puedo, sin embargo, dejar de agradecer explícitamente y de manera especial a Rafael Benguria, Cecilia Biott, Mariela Carvacho, Miguel Castillo Didier, Paulina Cecchi, Víctor Cortés, Alicia Dickenstein, Antonieta Emparán, Jessica Fuentealba Quilodrán, Jessenia Fuentes, Sandra Garrido, Étienne Ghys, Harald Helfgott, Laura Iñón, Rafael Labarca, Daniel Navas, Rodrigo Navas, Valentina Norambuena, Héctor Pastén, Scarlett Plaza, Gonzalo Robledo, Anita Rojas, Mariel Sáez, Andrés Susaeta, Ferrán Valdez, Jaime Vergara y Julio de Villegas, así como a mis antiguos compañeros de aulas del liceo, por todos sus permanentes comentarios sobre varios pasajes del libro. Adicionalmente, agradezco nuevamente a Juan Manuel Silva por su paciente trabajo de reelaboración y edición final, así como a Ian Campbell por su diseño de portada.

En nuestra vida científica, los matemáticos debemos sobrellevar permanentemente el terror a dejar por escrito una afirmación falsa. Añádase a esto, en el contexto de la divulgación, el malestar de haber ocultado por ignorancia una forma de verdad. Por todo ello, agradezco a Mahdi Teymuri Garakani por indicarme (a propósito de «El triunfo de los hexágonos», capítulo 3) que, contrariamente a lo que figura en gran parte de la literatura (incluida mi columna original en *El Mostrador*), Reinhardt no fue alumno de David Hilbert, sino de Ludwig Bieberbach. Mis agradecimientos van también para Jash Lodha, por hacerme notar la relevancia del trabajo matemático de Aryabhata de la India, perfectamente comparable (y a veces superior, aunque unos siglos posterior) al de los antiguos griegos (capítulo 7). De la misma forma, agradezco a Mahsa Allahbakhshi por hacer lo propio en torno al impresionante trabajo de Omar Jayam, matemático y poeta persa, cumbre de la época dorada de la cultura musulmana en tiempos en los

que el oscurantismo religioso ensombrecía a Europa. Agradezco igualmente a Cristóbal Rivas, por informarme que, en estricto rigor, el Premio Nobel de Economía no existe, y que el galardón que suele ser presentado con este nombre en realidad lo otorga el Banco de Suecia (capítulo 22). Mención especial merece Carlos Basso por señalarme, a propósito del caso de Boris Weisfeiler (capítulo 26), que su obra de periodismo de investigación ya permitía descartar un par de pistas falsas, a la vez de corroborar algunas hipótesis lúgubres. Finalmente, quisiera agradecer a Fanny Espinoza, del Museo Histórico Nacional, por su interés y amabilidad en mi investigación sobre la geometría de la bandera de la Independencia de Chile (capítulo 1), así como a Nelda Jaque, María José Moreno y —nuevamente— a Rafael Labarca, por haberme impulsado a continuar este estudio más allá de mi columna original. Sin duda alguna, este episodio desconocido y casi secreto de nuestra historia no solo merece ser ampliamente difundido, sino que requiere además de mayor investigación y análisis por parte de historiadores profesionales. Es una feliz coincidencia que mi escrito al respecto salga a la luz pública en formato impreso y de manera masiva el mismo año del bicentenario de nuestra bandera.

Las columnas de divulgación que dieron origen a este libro fueron parcialmente financiadas por los proyectos Fondecyt 1 120 131 y 1 160 541, así como por los proyectos Anillo 1103 (Centro de Sistemas Dinámicos y Temas Relacionados) y 1415 (Geometría en La Frontera). Agradezco a Conicyt no solo por este apoyo, sino también por haber abierto un espacio a la divulgación científica en muchos proyectos de investigación.

En consideración a que las sociedades científicas de nuestro país no reciben aportes permanentes del Estado, la mitad de las entradas percibidas por este libro serán donadas a la Sociedad de Matemática de Chile para actividades de difusión a la comunidad.

El Ingenio (Cajón del Maipo),  
enero de 2017



ANDRÉS NAVAS, doctor en Matemáticas de la Escuela Normal Superior (Lyon), post-doctorado del Instituto de Altos Estudios Científicos (París), académico de la U. de Santiago y Presidente de la Sociedad de Matemática de Chile. Su trabajo de investigación trata sobre aspectos algebraicos de la teoría del caos. En 2013 recibió el Premio del Consejo Matemático de las Américas, y en 2016 la medalla UMALCA. Su libro de divulgación *Un Viaje a las Ideas* fue uno de los best-sellers científicos del año 2017 en Chile.

## **NOTAS**

<sup>[1]</sup> El cuadro original de Balmes desapareció desde las dependencias del diario *El Mercurio* el mismo año 1995, y hasta la fecha se encuentra «extraviado». <<

[2] Más tarde, en otro de sus aforismos famosos, se refirió a su larga lista de matrimonios (seis en total) de la siguiente manera: «Tengo que dejar de casarme con hombres que se sientan inferiores a mí (...) Necesito un hombre inferior superior». <<