

Oppgaver MAT2500

Fredrik Meyer

6. november 2014

Oppgave 1. Det geometriske stedet for midtpunktet til parallelle korder i en parabel er ei linje som er parallell med symmetriaksen. Vis dette.

MERK: Her må det menes “det geometriske stedet for midtpunkter til alle korder parallell til en gitt korde”. ■

Løsning 1. Her kan vi med en gang gjøre en forenkling. En generell parabel gjennom origo er gitt ved $y = cx^2$. Men vi kan gjøre enda en forenkling: siden vi har lyst til å finne ligningen for en linje, og linjer forblir linjer under skalering av koordinataksene, kan vi sette $x = \frac{x'}{\sqrt{c}}$. Dermed blir den nye ligningen $y = x'^2$, som er den enkleste parabelen av alle.

En generell korde er gitt ved linjen $y = ax + b$. Ved å sette inn i ligningen $y = x^2$, får vi at midtpunktet har koordinater $(\frac{a}{2}, \frac{a^2}{2} + b)$.

Lar vi b variere (og holder a fast, siden vi ser på parallelle korder), ser vi at midtpunktet beveger seg langs linjen $x = \frac{a}{2}$, som er parallell med symmetriaksen $x = 0$.

MEN! Legg merke til at om b er for liten, så får vi ingen korde. Dermed får vi at det geometriske stedet faktisk er **linjestykket** fra $(a/2, a^2/4)$ parallell med symmetriaksen. ♡

Oppgave 2. Stigningstallet til en rekke parallelle korder til parabelen $y^2 = 2px$ er k . Finn ligningen til diameteren gjennom midtpunktet av disse kordene. ■

Løsning 2. Dette er bare en kopi av forrige oppgave. En diameter i en parabel er en linje gjennom sentrum av parabelen. En parabel har sentrum “i det uendelige”, og et linjestykke er derfor en diameter i parabelen om det er parallelt med symmetriaksen.

Svaret er derfor det samme som i forrige oppgave, bortsett fra at nå er ligningen $y^2 = 2px$ i stedet for $y = x^2$. Vi kan regne på akkurat samme måte å få at ligningen for linjestykket er gitt ved $y = p/k$. ♡

Oppgave 3. La være gitt parabellen $y = 4x$ med brennpunkt F og et punkt $Q = (-2, 4)$ utenfor parabellen. La l_Q være ei linje gjennom Q som skjærer parabellen i to punkter A og B og la l_d være parabellen gjennom midtpunktet til korden AB . Diameteren l_d og styrelinja til parabellen skjærer hverandre i punktet C . La P være skjæringspunktet mellom linjene CF og QA . Finn det geometriske stedet for P når l_Q varierer, og vis at både F og Q ligger på dette geometriske stedet. ■

Løsning 3. Linja l_Q kan vi skrive som

$$y = a(x - 2) + 4.$$

Fra forrige oppgave har l_d ligning $y = 2/a$. Styrelinja er $x = -1$, så $C = (-1, 2/a)$. Linja CF er gitt ved ligningen

$$y = -\frac{1}{a}x - \frac{1}{a} + \frac{2}{a} = -\frac{1}{a}x + \frac{1}{a}.$$

Linjen QA er samme som l_Q . Vi kan regne ut skjæringspunktet mellom disse to linjene til å være

$$P = \left(\frac{1 - 2a^2 - 4a}{a^2 + 1}, \frac{3a + 4}{a^2 + 1} \right).$$

Vi kan plote dette i Geogebra med kommandoen

`Curve((1-2a^2-4a)/(1+a^2), (3a+4)/(1+a^2), a, -10, 10)`

Og vi ser at vi får noe som minner svært meget om en sirkel. Problemet er å finne hvilken sirkel dette er. Men vi kan gjette oss til hva det er ved å studere sirkelen i Geogebra. Ved inspeksjon ser det ut til at sirkelen har sentrum $x = -\frac{1}{2}$ og $y = 2$. Dermed burde ligningen være $(x + \frac{1}{2})^2 + (y - 2)^2 = r^2$, hvor r er radiusen.

Vi kan regne ut at

$$x^2 + x = \frac{2a^4 + 12a^3 + 11a^2 - 12a + 2}{(1 + a^2)^2}$$

og at

$$y^2 - 4y = \frac{-12a^3 - 7a^2 + 12a}{(1 + a^2)^2}.$$

Dermed blir

$$x^2 + x + y^2 - 4y = \frac{2a^4 + 4a^2 + 2}{(1 + a^2)^2} = 2.$$

Fullfører vi kvadratene får vi dermed at radiusen er $r = 5/2$.

Dermed er det geometriske stedet en sirkel, og vi kan sjekke at både F og Q ligger på sirkelen ved å regne at du har avstand $5/2$ fra $(-\frac{1}{2}, 2)$. ♡

Oppgave 4. Finn ligningen til en generell sirkel i planet. Hvor mange punkter trengs for å beskrive en sirkel? ■

Løsning 4. En sirkel trenger et sentrum og en radius. Radiusen er ett tall og sentrum er to ekstra tall.

I symboler ser derfor en generell sirkel ut som

$$(x - a)^2 + (x - b)^2 = r^2$$

Det trengs derfor *to* punkter, eller på et vis “ett og et halvt” punkt, siden om vi har oppgitt sentrum (ett punkt), trenger vi bare vite lengden til punktet på randa, og ikke selve punktet. ♡

Oppgave 5. Finn ligningen til en hyperbel med gitte asymptoter symmetrisk om aksene. Hvor mange punkter trengs for å bestemme en hyperbel med disse asymptotene? ■

Løsning 5. Spørsmålet er litt vanskelig å tolke. Med “aksene”, menes det standard koordinataksene, eller mens det symmetriaksene til en hyperbel?

Altså, om det menes at vi er gitt asymptotene, så vet vi automatisk sentrum (det er der asymptotene skjærer). Dermed holder det å gi ett ekstra punkt for å finne brennpunktene [.....??] ♡

Oppgave 6. Dersom alle sidene i en trekant tangerer en parabel, så går den omskrevne sirkelen til trekanten gjennom brennpunktet til parabelen. Vis dette. ■

Løsning 6. ♡