PERITONEO



DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ JUÁREZ
CC MORFOLOGICAS II

CARACTERISTICAS GENERALES

- ES UNA MEMBRANA SEROSA, LISA, DESLIZANTE, QUE TAPIZA LAS PAREDES DE LA CAVIDAD ABDOMINAL Y PÉLVICA.

- LA PORCIÓN QUE CUBRE LA CARA INTERNA DE LA PARED ABDOMINAL SE LE LLAMA: PERITONEO PARIETAL, Y DONDE SE REPLIEGA POR LOS ÓRGANOS INTERNOS SE LE LLAMA: PERITONEO VISCERAL.

- EL PERITONEO SE SEPARA DE LA PARED MUSCULAR POR UN TEJIDO EXTRA PERITONEAL: EL PREPERITONEO.

DIFERENCIAS ENTRE CAVIDAD PERITONEAL Y ABDOMINAL

- LA CAVIDAD ABDOMINAL ES TODO EL ESPACIO DESDE EL DIAFRAGMA A LA PELVIS E INCLUYE EN SU INTERIOR TODOS LOS ÓRGANOS ABDOMINALES, INCLUYENDO EL PERITONEO QUE CUBRE SUS PAREDES.

- LA CAVIDAD PERITONEAL PROPIAMENTE DICHA ES EL ESPACIO VIRTUAL ENTRE LAS DOS PAREDES DE PERITONEO PARIETAL Y VISCERAL. NO CONTIENE NINGÚN ÓRGANO EN SU INTERIOR, A EXCEPCIÓN DE LOS OVARIOS. CONTIENE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE LIQUIDO EXTRACELULAR PARA DISMINUIR EL ROCE ENTRE LOS ÓRGANOS ABDOMINALES, LUBRICACIÓN, ESE RECIBE EL NOMBRE DE LIQUIDO PERITONEAL

FUNCIONES DEL PERITONEO

- PROTECCIÓN DE LOS ÓRGANOS ABDOMINOPÉLVICOS
- CONECTAR ÓRGANOS ENTRE SÍ
- MANTENER LA POSICIÓN DE LOS ÓRGANOS
- SUSPENDIÉNDOLOS CON LIGAMENTOS.
- EVITAR LA FRICCIÓN MIENTRAS LOS ÓRGANOS SE MUEVEN

DIFERENCIAS ENTRE CAVIDAD PERITONEAL Y ABDOMINAL

- LA CAVIDAD ABDOMINAL ES TODO EL ESPACIO DESDE EL DIAFRAGMA A LA PELVIS E INCLUYE EN SU INTERIOR TODOS LOS ÓRGANOS ABDOMINALES, INCLUYENDO EL PERITONEO QUE CUBRE SUS PAREDES.


- LA CAVIDAD PERITONEAL PROPIAMENTE DICHA ES EL ESPACIO VIRTUAL ENTRE LAS DOS PAREDES DE PERITONEO PARIETAL Y VISCERAL. NO CONTIENE NINGÚN ÓRGANO EN SU INTERIOR, A EXCEPCIÓN DE LOS OVARIOS. CONTIENE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE LIQUIDO PARA DISMINUIR EL ROCE ENTRE LOS ÓRGANOS ABDOMINALES

DIFERENCIAS SEXUALES

- EN EL HOMBRE LA CAVIDAD PERITONEAL CONSTITUYE UN SACO TOTALMENTE CERRADO.

- EN LA MUJER LAS TROMPAS UTERINAS SE ABREN EN LA MISMA, Y LA CAVIDAD PERITONEAL SE HALLA EN COMUNICACIÓN INDIRECTA CON EL EXTERIOR


Sección media (sagital)



CAVIDAD PERITONEAL MAYOR Y MENOR

- LA GRAN CAVIDAD PERITONEAL O SACO MAYOR SE EXTIENDE DESDE EL DIAFRAGMA HASTA EL SUELO PÉLVICO. CONTIENE LA MAYORÍA DE FORMACIONES PERITONEALES (PLIEGUES), EN SUS PAREDES.

- SACO MENOR O BOLSA OMENTAL (TRANSCAVIDAD DE LOS EPIPLONES): ES UN ESPACIO AMPLIO, IRREGULAR, SITUADO EN SU MAYOR PARTE POR DETRÁS DEL ESTOMAGO Y EL EPIPLÓN MENOR.



Esternón
Diafragma (centro tendinoso)
Fascia diafragmática inferior y
Peritoneo parietal
Hígado
Omento (epiplón) menor
Vena porta hepática y arteria hepática propia en el borde derecho del omento (epiplón) menor
Bolsa omental (transcavidad de los epiplones)
Estómago
Arteria cólica media
Mesocolon transverso
Peritoneo parietal (de la pared anterior del abdomen)
Colon transverso
Omento (epiplón) mayor
Intestino delgado
Músculo recto del abdomen
Vaina del recto
Línea arqueada
Fascia transversal
Fascia umbilical prevesical
Ligamento umbilical medio (uraco)
Lámina adiposa del tejido subcutáneo (fascia de Camper)
Lámina membranosa del tejido subcutáneo (fascia de Scarpa)
Vejiga urinaria
Ligamento fundiforme del pene
T10
T11
T12
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
Ligamento coronario rodeando el área desnuda del hígado
Esófago
Receso superior de la bolsa omental (transcavidad de los epiplones)
Diafragma (pilar derecho)
Arteria gástrica izquierda
Orificio omental (epiploico) (de Winslow)
Tronco celíaco
Vasos esplénicos
Vasos renales
Páncreas
Arteria mesentérica superior
Porción inferior (horizontal o 3.ª) del duodeno
Arteria mesentérica inferior
Aorta abdominal
Peritoneo parietal (de la pared posterior del abdomen)
Mesenterio del intestino delgado
Ligamento longitudinal anterior
Fascia vesical
Fascia rectal
Fascia presacra
Receso rectovesical
Recto
Fascia rectoprostática (de Denonvilliers)
Músculo elevador del ano
Próstata

FORAMEN OMENTAL (FORAMEN EPIPLÓICO)

- ES UN CORTO CONDUCTO QUE COMUNICA LA CAVIDAD PERITONEAL MENOR CON LA MAYOR.

- CONTENIDO: CONDUCTO COLÉDOCO, ARTERIA HEPÁTICA Y VENA PORTA.

- LÍMITES: LAS PAREDES ANTERIORES Y POSTERIORES SE ENCUENTRAN EN CONTACTO.
- ANTERIOR: EL BORDE LIBRE DEL OMENTO MENOR.
- SUPERIOR: EL HÍGADO (LÓBULO CAUDADO).
- INFERIOR: LA PRIMERA PORCIÓN DEL DUODENO.
- POSTERIOR: EL PERITONEO DE LA PARED ABDOMINAL POSTERIOR Y LA VENA CAVA INFERIOR.



Vena cava inferior (retroperitoneal)
Arteria hepática común (en pliegue peritoneal)
Ligamento hepatoduodenal (borde derecho del omento [epiplón] menor)
Sonda en el orificio omental (epiploico)
Vesícula biliar
Diafragma
Hígado
Anastomosis arterial gastroomental (gastroepiploica) (incluída en el omento [epiplón] mayor)
Estómago (cara posterior)
Lóbulo caudado del hígado
Sonda en el receso superior de la bolsa omental
Arteria gástrica izquierda (en el pliegue gastropancreático)
Arteria frénica inferior izquierda (retroperitoneal)
Ligamento gastrofrénico
Glándula suprarrenal izquierda y polo superior del riñón izquierdo (retroperitoneales)
Ligamento gastro-esplénico
Bazo
Flexura cólica derecha (hepática)
Riñón (retroperitoneal)
Porción descendente (2.ª) del duodeno
Arteria gastroomental (gastroepiploica) derecha (cubierta por peritoneo)
Arteria pancreaticoduodenal superior anterior (retroperitoneal)
Cabeza del páncreas (retroperitoneal)
Cuerpo del páncreas (retroperitoneal)
Mesocolon transverso
Láminas posteriores
Láminas anteriores (cortadas)
del omento (epiplón) mayor
Cola del páncreas (retroperitoneal)
Ligamento esplenorrenal
Ligamento frenocólico
Flexura cólica izquierda (esplénica)


REPLIEGUES PERITONEALES

- LOS REPLIEGUES TIENEN DIVERSOS NOMBRES, ARBITRARIOS, QUE SE DENOMINAN DE ACUERDO AL ÓRGANO O SECCIÓN CON LA QUE SE RELACIONAN.

- PLIEGUES DE LA PARED ANTERIOR SON SEIS, CUATRO QUE CONFLUYEN EN EL OMBLIGO Y DOS MÁS LATERALES.

- EL PLIEGUE SUPERIOR: LIGAMENTO FALCIFORME, QUE CONTIENE AL LIGAMENTO REDONDO DEL HÍGADO (VENA UMBILICAL OBLITERADA). EL PLIEGUE UMBILICAL MEDIO (URACO); LOS DOS PLIEGUES UMBILICALES INTERNOS (ARTERIA UMBILICAL OBLITERADA) Y LOS DOS PLIEGUES UMBILICALES EXTERNOS (PLIEGUES DE LAS ARTERIAS EPIGÁSTRICAS).



Fascia diafragmática
Ligamento falciforme
Peritoneo (bordes de corte)
Fascia transversal y su borde de corte
Línea arqueada
Músculo recto del abdomen
Vasos epigástricos inferiores
Triángulo inguinal (de Hesselbach)
Fascia transversal (cortada)
Ligamento interfoveolar
Vasos circunflejos ilíacos profundos
Anillo inguinal profundo
Ramas cremastérica y púbica de la arteria epigástrica inferior
Vasos ilíacos externos
Cordón espermático
Anillo femoral
Vaina femoral
Ligamento lagunar (de Gimbernat)
Ligamento pectíneo (de Cooper)
Hoz inguinal (tendón conjunto)
Arteria umbilical (obliterada distalmente a este punto)
Ligamento redondo del hígado y venas paraumbilicales
Ombligo
Peritoneo
Fascia transversal
Músculos oblicuo externo e interno del abdomen
Músculo transverso del abdomen
Ligamento umbilical medial izquierdo (arteria umbilical izquierda obliterada)
Pliegue umbilical medial derecho
Ligamento umbilical medio (uraco obliterado) y venas paraumbilicales en el pliegue umbilical medio
Fascia umbilical prevesical
Pliegue umbilical lateral (contiene los vasos epigástricos inferiores)
Nervio femoral
Fascia del iliopsoas
Músculo iliopsoas
Vasos ilíacos externos
Fosa supravesical
Pliegue vesical transverso
Músculo obturador interno



Fascia diafragmática
Ligamento falciforme
Peritoneo (bordes de corte)
Fascia transversal y su borde de corte
Línea arqueada
Músculo recto del abdomen
Vasos epigástricos inferiores
Triángulo inguinal (de Hesselbach)
Fascia transversal (cortada)
Ligamento interfoveolar
Vasos circunflejos ilíacos profundos
Anillo inguinal profundo
Ramas cremastérica y púbica de la arteria epigástrica inferior
Vasos ilíacos externos
Cordón espermático
Anillo femoral
Vaina femoral
Ligamento lagunar (de Gimbernat)
Ligamento pectíneo (de Cooper)
Hoz inguinal (tendón conjunto)
Arteria umbilical (obliterada distalmente a este punto)
Ligamento redondo del hígado y venas paraumbilicales
Ombligo
Peritoneo
Fascia transversal
Músculos oblicuo externo e interno del abdomen
Músculo transverso del abdomen
Ligamento umbilical medial izquierdo (arteria umbilical izquierda obliterada)
Pliegue umbilical medial derecho
Ligamento umbilical medio (uraco obliterado) y venas paraumbilicales en el pliegue umbilical medio
Fascia umbilical prevesical
Pliegue umbilical lateral (contiene los vasos epigástricos inferiores)
Nervio femoral
Fascia del iliopsoas
Músculo iliopsoas
Vasos ilíacos externos
Fosa supravesical
Pliegue vesical transverso
Músculo obturador interno

FORMACIONES DE PERITONEO

- OMENTOS
- OMENTO (EPIPLON) MAYOR: ES UN PLIEGUE PERITONEAL QUE CUELGA DESDE EL ESTOMAGO POR DELANTE DEL COLON TRANSVERSO, AL QUE SE ADHIERE.


- OMENTO (EPIPLON) MENOR: ES UN PLIEGUE QUE SE EXTIENDE ENTRE EL HÍGADO Y EL ESTOMAGO Y DUODENO, SU UNIÓN A ESTOS ÓRGANOS LE DAN EL NOMBRE PROPIO DE LIGAMENTO HEPATOGÁSTRICO Y HEPATODUODENAL, RESPECTIVAMENTE.


Ligamento falciforme
Lóbulo izquierdo del hígado
Lóbulo derecho del hígado
Estómago
Vesícula biliar
Omento (epiplón) mayor que cubre el colon transverso y el intestino delgado (yeyuno e íleon)


Lóbulo izquierdo del hígado
Ligamento hepatoduodenal
Ligamento hepatogástrico
Omento (epiplón) menor
Ligamento falciforme
Esófago abdominal
Escotadura cardíaca
Fundus del estóm
Diafra
Ligamento redondo del hígado (vena umbilical obliterada)
Borde inferior del hígado
Lóbulo cuadrado del hígado
Lóbulo derecho del hígado
Vesícula biliar
Orificio omental (epiploico) (de Winslow)
Píloro
Duodeno
Riñón derecho (retroperi-toneal)
Flexura cólica derecha (hepática)
Porción cardíaca del estómago
Cuerpo del estómago
Escotadura incisiva angular
Curvatura menor
Conducto pilórico
Porción pilórica del estómago
Antro pilórico
Curvatura mayor


FORMACIONES DE PERITONEO

- MESOS:
- EL MESENTERIO ES UN PLIEGUE DE PERITONEO QUE ENVUELVE LAS ASAS DE INTESTINO DELGADO DÁNDOLES CIERTA MOVILIDAD, SE INSERTA EN LA CARA POSTERIOR Y VA DESDE ARRIBA Y LA IZQUIERDA HASTA ÁNGULO DUODENOYEYUNAL, HACIA ABAJO Y DERECHA A LA UNIÓN ILIOCECAL.
- MESOCOLON TRANSVERSO, MESOCOLON SIGMOIDES Y MESOAPÉNDICE.


Colon transverso (elevado)
Omento (epiplón) mayor (levantado)
Mesocolon transverso (elevado sobre el páncrea
Yeyuno (cortado)
Tenia libre
Mesenterio (cortado y el intestino delgado extirpad
Apéndices omentales (epiploicos)
Flexura cólica izquierda (esplénica)
Flexura cólica derecha (hepática)
Colon descendente
Surco paracólico derecho
Surco paracólico izquierd
Colon ascendente
Mesocolon sigmoide
Porción terminal del íleon (cortada)
Colon sigmoide
Ciego
Recto
Receso retrocecal
Apéndice (vermiforme)
Colon sigmoide (reflejado)
Mesocolon sigmoide
Receso intersigmoideo
Uréter
Peritoneo parietal
Vasos ilíacos comunes y externos

CLASIFICACION DE LOS ORGANOS ABDOMINALES

- LOS ÓRGANOS QUE POSEEN UN MESO O QUE ESTÁN CASI RODEADOS POR PERITONEO, SE LES CONOCE COMO ÓRGANOS INTRAPERITONEALES.
- EJEMPLO: ESTOMAGO, INTESTINO DELGADO, COLON TRANSVERSO, ETC.
- AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN POSTERIOR O QUE SOLO ESTÁN CUBIERTO EN UNA DE SUS CARAS SE CONSIDERAN COMO RETROPERITONEALES O EXTRAPERITONEALES.
- EJEMPLO: RIÑONES, PÁNCREAS, COLON ASCENDENTE, ETC.


Aorta abdominal y tronco celíaco
Vena cava inferior
Ligamento falciforme
Conducto colédoco y arteria hepática propia
Receso superior de la bolsa omental (transcavidad de los epiplones)
Venas hepáticas
Ligamento coronario del hígado
Glándula suprarrenal derecha
Inserción del omento (epiplón) menor y arteria gástrica izquierda
Orificio omental (epiploico) detrás del borde libre derecho del omento (epiplón) menor
Esófago
Ligamento triangular izquierdo del hígado
Ligamento triangular derecho
Ligamento gastrofrénico y arteria frénica inferior izquierda
Inserción del omento (epiplón) mayor y vasos gastroomentales (gastroepiploicos) derechos
Vasos gástricos cortos
Ligamento esplenorrenal y vasos esplénicos
Duodeno
Riñón derecho
Ligamento frenocólico
Peritoneo parietal
Páncreas y arteria esplénica (retroperitoneales)
Fascia transversal
Inserción del mesocolon transverso
Raíz del mesenterio
Vasos mesentéricos superiores
Zona del colon ascendente
Zona del colon descendente
Arteria ilíaca común (retroperitoneal)
Inserción del mesocolon sigmoide y vasos sigmoideos
Arteria ilíaca externa (retroperitoneal)
Vasos testiculares (retroperitoneales)
Vasos rectales superiores
Uréteres (retroperitoneales)
Pliegue (ligamento) sacrogenital
Zona del anillo inguinal profundo
Recto
Pliegue umbilical lateral (contiene vasos epigástricos inferiores)
Pliegue umbilical medio (contiene el uraco)
Vejiga urinaria
Pliegue umbilical medial (contiene la porción obliterada de la arteria umbilical)

COMPARTIMIENTOS SUPRA E INFRAMESOCOLICOS

- LA GRAN CAVIDAD PERITONEAL ES SUBDIVIDIDA POR EL EPIPLÓN MAYOR, COLON TRANSVERSO Y MESOCOLON TRANSVERSO.

- LA PARTE SUPERIOR Y ANTERIOR LLAMADA: COMPARTIMIENTO SUPRAMESOCOLICO, LA PARTE INFERIOR Y POSTERIOR: COMPARTIMIENTO INFRAMESOCOLICO.


CONDICIONES CLINICAS

- ASCITIS:


ACUMULACIÓN ANORMAL Y EXCESIVA DE LÍQUIDO EN LA CAVIDAD PERITONEAL (ENTRE LOS TEJIDOS QUE CUBREN LOS ÓRGANOS ABDOMINALES), LO QUE PROVOCA HINCHAZÓN, AUMENTO DE PESO RÁPIDO Y MALESTAR. GENERALMENTE ES CAUSADA POR ENFERMEDADES HEPÁTICAS GRAVES COMO LA CIRROSIS (80% DE LOS CASOS), HIPERTENSIÓN PORTAL, INSUFICIENCIA CARDÍACA O CIERTOS TIPOS DE CÁNCER

CONDICIONES CLINICAS

- PERITONITIS
- ES LA INFLAMACIÓN GRAVE DEL PERITONEO, LA MEMBRANA DELGADA QUE REVISTE LA PARED INTERNA DEL ABDOMEN Y CUBRE LOS ÓRGANOS ABDOMINALES. GENERALMENTE ES CAUSADA POR UNA INFECCIÓN BACTERIANA O FÚNGICA, A MENUDO DEBIDO A LA ROTURA DE UN ÓRGANO (COMO APÉNDICE O ÚLCERA) O COMPLICACIONES DE DIÁLISIS. SE CARACTERIZA POR DOLOR ABDOMINAL INTENSO, FIEBRE Y NÁUSEAS, Y ES UNA EMERGENCIA MÉDICA POTENCIALMENTE MORTAL QUE REQUIERE TRATAMIENTO INMEDIATO CON ANTIBIÓTICOS O CIRUGÍA.


Hígado
Vesícula biliar
Ligamento hepatoduodenal
Bazo
Riñón derecho
Flexura cólica izquierda
Colon descendente
Flexura cólica derecha
Colon ascendente

GRACIAS


KEN HUB