HISTOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

1.Durante el estudio histológico del ovario, se identifica una capa de tejido conectivo denso localizada inmediatamente por debajo del epitelio superficial. Esta estructura constituye:

A) El estroma cortical.

B) La médula ovárica.

C) La túnica albugínea.

D) El hilio ovárico.

2. La diferenciación de las células germinales primordiales en ovogonias ocurre después de que dichas células alcanzan la gónada embrionaria femenina. ¿Cuál de las siguientes moléculas participa en la inducción inicial de este proceso?

A) Hormona luteinizante (LH).

B) Hormona foliculoestimulante (FSH).

C) Proteína morfogénica ósea 4 (BMP-4).

D) Estradiol.

3. Durante el desarrollo prenatal, las ovogonias experimentan numerosas divisiones mitóticas. ¿En qué momento se alcanza el número máximo de células germinales en el ovario fetal?

A) Al tercer mes de gestación.

B) Al cuarto mes de gestación.

C) Al quinto mes de gestación.

D) Al séptimo mes de gestación.

4. Al nacimiento, los ovocitos primarios se encuentran detenidos en una etapa específica de la primera división meiótica. ¿Cuál es dicha etapa?

A) Leptoteno.

B) Cigoteno.

C) Diploteno.

D) Diacinesis.

5. El mantenimiento del arresto meiótico de los ovocitos primarios antes de la pubertad depende de una sustancia secretada por las células foliculares. Esta sustancia es:

A) Hormona antimülleriana.

B) Inhibidor de la maduración del ovocito.

C) Hormona liberadora de gonadotropinas.

D) Inhibina.

6. En una preparación histológica se observa un ovocito rodeado por una única capa de células foliculares planas simples. Esta descripción corresponde a:

A) Folículo primario unilaminar.

B) Folículo secundario.

C) Folículo primordial.

D) Folículo de Graaf.

7. ¿Cuál de las siguientes estructuras forma parte del contenido característico de la médula ovárica?

A) Folículos primordiales.

B) Cuerpos lúteos.

C) Glándulas intersticiales.

D) Vasos sanguíneos y tejido conectivo laxo.

8. La primera división meiótica del ovocito primario produce dos células hijas con distribución desigual del citoplasma. El resultado inmediato de esta división es la formación de:

A) Dos ovocitos secundarios funcionales.

B) Un ovocito secundario y un cuerpo polar.

C) Un óvulo maduro y un cuerpo polar.

D) Cuatro células haploides equivalentes.

9. Desde el punto de vista histológico, el folículo primario unilaminar se distingue del folículo primordial porque presenta:

A) Formación de antro folicular.

B) Presencia de múltiples capas celulares.

C) Una capa de células cúbicas alrededor del ovocito y el inicio de la formación de la zona pelúcida.

D) Un ovocito secundario en metafase II.

10.Con relación a la reserva ovárica humana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Después del nacimiento continúan formándose nuevos ovocitos primarios.

B) Todos los ovocitos primarios presentes al nacer alcanzarán la ovulación.

C) La mayoría de los folículos primordiales sufren atresia durante la vida.

D) Los ovocitos primarios completan la meiosis I antes de la pubertad.

11. ¿Que hormona sexuales esteroideas produce principalmente el ovario?

A) testosterona y Estrógeno

B) Insulina y Glucagón

C) Estrógeno y Progesterona

D) Ninguna de las anteriores

12 ¿Cuantos cromosomas tiene un ovocito primario?

A) 10 cromosomas

B) 20 cromosomas

C) 46 cromosomas

D) 3 cromosomas

13. ¿A cuántas horas previas a la ovulación corresponde aproximadamente el periodo de folículo vesicular maduro?

A) 2 horas

B) 12 horas

C) 37 horas

D) 72 horas

14 ¿Qué sucede con el primer cuerpo polar formado en la ovogénesis?

A) Se convierte en el óvulo definitivo

B) Forma la placenta

C) Sufre degeneración (atresia)

D) Se transforma en una ovogonia

15. ¿Cuál es la capa más externa de la pared del útero?

A) Endometrio

B) Miometrio

C) Perimetrio

D) Mesovario

16. Al analizar las capas de la pared uterina, el miometrio destaca por ser la más gruesa. ¿Cuál es la disposición de los haces de músculo liso en su capa o estrato medio?

A) Tejido conectivo laxo con células epiteliales modificadas.

B) Haces musculares paralelos al eje longitudinal del útero.

C) Haces musculares con orientación circular, formando el estrato vascular.

D) Fibras dispuestas formando una red elástica longitudinal.

17. ¿Cuál es la función asignada a las células secretoras bajo el influjo de la progesterona?

A) Secretar estrógenos locales para regular el espesor de la capa muscular.

B) Producir elementos nutritivos destinados al óvulo o al cigoto durante su trayecto.

C) Sintetizar grandes cantidades de ácido láctico protector contra patógenos.

D) Ejecutar la ciliogenesis masiva para desplazar al cigoto hacia la cavidad endometrial

18.Histológicamente, el epitelio de la vagina es plano estratificado y carece de glándulas. Al evaluarlo en la fase folicular, ¿Cuál es la descripción microscópica correcta de su zona intermedia?

A) Células aplanadas o naviculares con núcleos redondos y a menudo retraídos

B) Células muy aplanadas con pequeños núcleos picnóticos y citoplasma marcadamente eosinófilo

C) Células cilíndricas altas con presencia de pliegues ramificados y cilios móviles

D) Células cúbicas a cilíndricas con grandes núcleos redondos y marcado citoplasma basófilo

19.La glándula mamaria madura es una estructura altamente dinámica. ¿A qué se debe principalmente el notable incremento del tamaño de la mama en las mujeres durante la pubertad?

A) A la ramificación masiva y exclusiva de los conductos colectores intralobulillares en el primer trimestre

B) Al vaciamiento merocrino del componente proteico de la leche en el estroma intralobulillar

C) Al desarrollo del tejido adiposo y al aumento del tejido conectivo en el estroma

D) A la proliferación masiva de verdaderos alvéolos secretores funcionales llenos de calostro

20.Durante la fase de lactación activa en la glándula mamaria, ¿cómo se lleva a cabo la liberación celular del componente lipídico o graso de la leche hacia la luz alveolar?

A) Secreción apocrina

B) Secreción merocrina

C) Secreción holocrina

D) Difusión simple a través de la membrana basal

21. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el orden correcto de las cuatro partes de la trompa uterina, desde su extremo más cercano al ovario hasta el útero?

A) Infundíbulo → Ampolla → Istmo → Porción uterina (intramural)

B) Ampolla → Infundíbulo → Porción uterina → Istmo
C) Istmo → Ampolla → Infundíbulo → Porción uterina
D) Porción uterina → Istmo → Infundíbulo → Ampolla

22. ¿Cuál es la capa muscular más gruesa de la pared uterina?

A) Miometrio
B) Endometrio
C) Perimetrio
D) Adventicia

23. ¿Qué característica presenta el endocérvix?

A) Epitelio cilíndrico alto y secreción viscosa que se licúa durante la ovulación.
B) Epitelio plano estratificado queratinizado.
C) Abundantes glándulas sudoríparas.
D) Ausencia total de secreción.

24.¿Qué tipo de epitelio reviste el endometrio uterino?

A) Epitelio cilíndrico simple.
B) Epitelio cúbico simple.
C) Epitelio plano estratificado.
D) Epitelio de transición.

25. ¿Cuál de las siguientes estructuras del folículo primario avanzado es la responsable principal de la producción de estrógenos?

A) Teca interna
B) Teca externa
C) Zona pelúcida
D) Corona radiada