

问题 (1): 本系列问题是为了期中考试复习而设置的.

问题 (1.1): 请你求出 二面体群 D_{2n} 中每个元素的阶数.

问题 (1.2): 请证明 关于群的可解性我们有如下事实成立:

- (1) 若 G 是可解群, 则 G 的子群和商群都是可解的.
- (2) 反之, 对群 G 及正规子群 N , 若 N 和 G/N 都是可解的, 则 G 也是可解的.
- (3) 群 G 是可解群当且仅当 G 的 Jordan-Hölder 因子都是交换群.

问题 (1.3): 对正整数 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 考虑环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 请证明: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是整环当且仅当 n 是素数.

问题 (2): 本系列问题中, 我们考虑集合 X 的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 构成的环.

问题 (2.1): 对于集合 X , 我们记 $\mathcal{P}(X)$ 是 X 的所有子集构成的集合, 请证明: 若在 $\mathcal{P}(X)$ 中定义加法 $E + F = (E - F) \cup (F - E)$ 以及乘法 $E \times F = E \cap F$, 则 $\mathcal{P}(X)$ 构成一个含么环.

提示: 事实上, 我们可以将 $\mathcal{P}(X)$ 看作所有从 X 到 $\{0, 1\}$ 的映射的集合. 对于 $E \in \mathcal{P}(X)$,

我们将其映射为 E 的特征函数 χ_E , 这里: $\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \in E \\ 0 & \text{若 } x \notin E \end{cases}$. 如果我们将 $\{0, 1\}$ 看

作 \mathbb{F}_2 的话, 则从 X 到 \mathbb{F}_2 的映射存在自然的加法和乘法: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$. 由 \mathbb{F}_2 是域, 则这里的加法和乘法赋予了 $\mathcal{P}(X)$ 含么环结构 (么元是 X , 零元是 \emptyset). 因此只需验证 $\chi_E + \chi_F = \chi_{E+F}$, $\chi_E \chi_F = \chi_{E \times F}$ 即可.

问题 (2.2): 对于 $\mathcal{P}(X)$ 的子集 A , 请证明: A 构成 $\mathcal{P}(X)$ 的含么子环当且仅当 A 满足如下的性质:

- (1) $\emptyset \in A$.
- (2) 若 $E, F \in A$, 则 $E \cup F \in A$.
- (3) 若 $E \in A$, 则 $X - E \in A$.

说明: 在测度论中, 我们称满足上述 (1), (2), (3) 的子集族为一个环. 该问题说明, 测度论中定义的环境确实构成一个环.

问题 (2.3): 对于集合间的映射 $f: X \rightarrow Y$, 请证明: $\mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(Y), E \mapsto f(E)$ 不一定是环同态.

问题 (2.4): 在 (2.3) 的条件下, 请证明: $\mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X), F \mapsto f^{-1}(F)$ 是环同态.

问题 (2.5): 对环 R , 若 $f^2 = f$ 对所有 $f \in R$ 都成立, 则称 R 是一个 Boolean 环. 请证明如下事实:

- (1) 对集合 X , $\mathcal{P}(X)$ 是 Boolean 环.
- (2) 若 R 是 Boolean 环, 则任取 $f \in R$, 都有 $f + f = 0$.

(3) 若 R 是 Boolean 环, 则 R 是交换的.

补充说明: 可以证明, 若 R 是 Boolean 环, 则 R 同构于某个 $\mathcal{P}(X)$ 的子代数. 如果你熟悉交换代数的话, 上述嵌入是这样构造的: 令 $X = \text{Spec}(R)$, 考虑 $R \rightarrow \mathcal{P}(X), f \mapsto D(f)$.

问题 (3): 本系列问题中, 我们研究交换环 R 上的形式幂级数环 $R[[X]]$. 在本系列问题中, 我们固定 R 是一个 (含么) 交换环.

问题 (3.1): 我们记 $R[[X]]$ 是全体映射 $\mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$ 的映射, 当 $a_n = f(n)$, 则我们用符号 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ 表示 f . 在 $R[[X]]$ 上, 我们定义加法 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n X^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) X^n$ 和乘法 $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n X^n) = \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}) X^n$. 请证明: $R[[X]]$ 构成一个含么交换环.

补充说明: 事实上, 多项式环的严格定义就是通过类似 (3.1) 的方式构造的. 即对于交换环 R , 我们定义:

$$R[X] = \{f \text{ 是映射 } \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R : \text{只有有限多个 } f(n) \text{ 非零}\},$$

此时, 当 $a_i = f(i)$, 且 n 是使得 $f(n) \neq 0$ 的最大正整数, 则我们用符号 $f(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ 表示 f , 并记 $\deg(f)$ 为 n . 通过这种方式定义的多项式环满足多项式环的泛性质: 对任意交换环 S 和环同态 $\phi: R \rightarrow S$, 任取 $s \in S$, 存在唯一环同态 $\tilde{\phi}: R[X] \rightarrow S$, 满足 $\tilde{\phi}(X) = s$ 且 $\tilde{\phi}|_R = \phi$ (即多项式环是 R -代数范畴中的自由对象) ——因此这种对多项式环的定义是合理的.

问题 (3.2): 请证明: 多项式环 $R[X]$ 在自然的意义下构成 $R[[X]]$ 的子环.

问题 (3.3): 我们记 $I_k = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n : \text{当 } n < k \text{ 时 } a_n = 0 \right\}$, 请证明: 对所有 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 都有 I_k 是 $R[[X]]$ 的理想.

问题 (3.4): 对 $f(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n \in R[[X]]$, 请证明: $f(X)$ 在 $R[[X]]$ 中可逆当且仅当 a_0 在 R 中可逆.

提示: 一个最简单的例子是 $(1-X)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} X^n$. 当 a_0 可逆, 则可以归纳地构造 b_0, b_1, \dots, b_n ,

使得 $f(X)(\sum_{k=0}^n b_k X^k) = 1 + X^{n+1}h(X)$, 进而 $f(X)(\sum_{k=0}^{\infty} b_k X^k) = 1$.

问题 (3.5): 若 K 是域, 请证明: 若 I 是 $K[[X]]$ 的非平凡理想, 则存在 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 使得 $I = I_k$.

提示: 对 $f(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$, 记 N 是使得 $a_N \neq 0$ 的最小正整数, 则 $f(X) = X^N f_0(X)$, 其中 $f_0(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+N} X^n$. 由 (3.4), 则 $f_0(X)$ 可逆.

问题 (4): 本系列问题中, 我们将研究 $M_n(R)$ 的理想. 为了避免不必要的麻烦, 在本系列问题中, 我们规定 R 是一个 (含么) 交换环, 且 R 中有足够数量的元素.

问题 (4.1):请证明: $M_n(R)$ 对于矩阵的加法和乘法构成一个 (含么) 环, 且在 $n \geq 2$ 时, $M_n(R)$ 是非交换的.

问题 (4.2): 若 I 是 R 的理想,请证明: $M_n(R) \rightarrow M_n(R/I), (a_{ij}) \mapsto (a_{ij} \bmod I)$ 是良定的环同态, 进而其核 $M_n(I)$ 构成 $M_n(R)$ 的理想.

问题 (4.3): 若 J 是 $M_n(R)$ 的 (双边) 理想,请证明:

$$I = \{a \in R : \text{存在}(a_{ij}) \in J \text{ 以及 } 1 \leq i, j \leq n \text{ 使得 } a = a_{ij}\}$$

构成 R 的理想.

提示: 对 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$, 记 E_{ij} 是只有 (i, j) -元为 1, 其余元为 0 的矩阵. 则 $a_{ij}E_{ij} = E_{ii}AE_{jj}, b_{kl}E_{kl} = E_{kk}BE_{ll}$, 进而 $(a_{ij} + b_{kl})E_{ij} = a_{ij}E_{ij} + E_{ik}(b_{kl}E_{kl})E_{lj}$, 因此 I 对加法封闭.

问题 (4.4): 在 (2.3) 的条件下,请证明: $J = M_n(I)$.

提示: 对 $A = (a_{ij}) \in M_n(I)$, 则存在 $A_{ij} \in J$, 使得 A_{ij} 的 (k_{ij}, l_{ij}) -元是 a_{ij} , 进而 $A = \sum_{i,j} E_{i,k_{ij}} A_{ij} E_{l_{ij},j}$.

问题 (4.5): 对含么交换环 R ,请证明: 若 I 是 R 的极大的非平凡理想, 则 R/I 是域.

问题 (4.6):请证明: 当 $n \geq 2$, 若 J 是 $M_n(R)$ 的极大的非平凡 (双边) 理想, 则 $M_n(R)/J$ 不是除环, 即 $M_n(R)/J$ 中并非所有非零元都可逆.

问题 (5): 本系列问题中, 我们将研究多项式环在置换群作用下的不变量.

问题 (5.1): 对于群 G 和环 R , 若群 G 在集合 R 上有作用, 使得对任意的 $g \in G$, 都有 $r \mapsto gr$ 是 R 的环自同态, 则我们称这个作用是群 G 在环 R 上的一个作用. 我们记:

$$R^G = \{r \in R : r = gr \text{ 对所有 } g \in G \text{ 成立}\},$$

请证明: 若群 G 在环 R 上有作用, 则 R^G 是 R 的子环.

问题 (5.2): 对交换环 A , 记 $R = A[X_1, \dots, X_n]$ 是 R 上的 n -元多项式环.请证明: 存在唯一置换群 S_n 在环 R 上的作用, 满足: $\sigma(X_i) = X_{\sigma(i)}$. 我们称 $f(X) \in R^{S_n}$ 为 R 中的对称多项式.

问题 (5.3): 我们定义:

$$\begin{aligned} e_1(X_1, \dots, X_n) &= \sum_{1 \leq i \leq n} X_i \\ e_2(X_1, \dots, X_n) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j \\ e_3(X_1, \dots, X_n) &= \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} X_i X_j X_k \\ &\dots\dots\dots \\ e_n(X_1, \dots, X_n) &= X_1 X_2 \dots X_n \end{aligned}$$

请证明: $e_1, e_2, \dots, e_n \in R^{S_n}$, 我们称 e_1, \dots, e_n 为 R 中的初等对称多项式..

问题 (5.4): 对 $f(X) \in R$, 记 $f_l(X)$ 是 $f(X)$ 所有只包含 X_1, \dots, X_{n-1} 的项构成的多项式, 请证明 下列事实:

(1) 若 $f(X) \in A[X_1, \dots, X_n]^{S_n}$, 则 $f_l(X) \in A[X_1, \dots, X_{n-1}]^{S_{n-1}}$.

(2) 对 $f(X), g(X) \in R^{S_n}$, 当 $f(X), g(X)$ 不包含被 $X_1 X_2 \dots X_n$ 整除的项, 则 $f_l(X) = g_l(X)$ 当且仅当 $f(X) = g(X)$.

提示: 对于 (2), 只需证明若 $f_l = 0$, 则 $f = 0$. 若 $f \neq 0$, 则 $f(X)$ 中含有非零项 $X_1^{m_1} \dots X_n^{m_n}$. 由 $f(X)$ 没有被 $X_1 \dots X_n$ 整除的项, 则 m_i 至少有一个为 0, 进而存在 $\sigma \in S_n$, 使得 $\sigma(X_1^{m_1} \dots X_n^{m_n})$ 中只含 X_1, \dots, X_{n-1} , 此时它是 f_l 的项, 故 $f_l \neq 0$.

问题 (5.5): 利用归纳法, 请证明: $R^{S_n} = A[e_1, \dots, e_n]$, 即若 $f(X)$ 是对称多项式, 则存在 $g(X) \in A[X_1, \dots, X_n]$, 使得 $f(X) = g(e_1(X), \dots, e_n(X))$.

提示: 这里我认为要同时对变元的个数和 $f(X)$ 的次数进行归纳. 用 $X_1 \dots X_n$ 进行带余除法, 则 $f(X) = g(X) + X_1 \dots X_n r(X)$, 其中 $g(X)$ 满足 (5.4) 的 (2), 而 $r(X)$ 的次数严格小于 $f(X)$ 的次数. 对前者, 考虑 g_l , 使用关于变元个数的归纳. 对于后者, 使用关于多项式次数的归纳.

关于问题 (5) 的补充说明: 记 $K(X_1, \dots, X_n)$ 是域 K 上有理函数构成的域, (5.5) 说明 $K(X_1, \dots, X_n)^{S_n} = K(e_1, \dots, e_n)$. 注意到 $\prod_{i=1}^n (T - X_i) = T^n - e_1 T^{n-1} + \dots + (-1)^n e_n$. 因此一般 n 次方程 $X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0$ 可以被根式解当且仅当 X_1, \dots, X_n 可以被表达为关于 e_1, \dots, e_n 的根式. 利用 Galois 理论, 这当且仅当域扩张 $K(X_1, \dots, X_n)/K(e_1, \dots, e_n)$ 的 Galois 群是可解的. 而 (5.5) 说明 $K(X_1, \dots, X_n)/K(e_1, \dots, e_n)$ 的 Galois 群恰好是 S_n , 进而 $n \geq 5$ 时一般 n 次方程没有根式解. 事实上, 当 A 是域, 则 (5.5) 可以通过 Galois 理论和一些简单的交换环论得到证明, 你可以在学期结束时回来读一读下面的证明: 记 $L = K(e_1, \dots, e_n)$, $M = K(X_1, \dots, X_n)$, 则 M 是 $\prod_{i=1}^n (T - X_i) = X^n - e_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n e_n$ 在 L 上的分裂域, 进而 M/L 是 Galois 扩张, 且 $\text{Gal}(M/L)$ 在 X_1, \dots, X_n 上的作用给出嵌入 $\text{Gal}(M/L) \rightarrow S_n$. 注意到 S_n 在 M 上有自然的作用, 且 $L \subset M^{S_n}$, 故 $S_n \subset \text{Gal}(M/L)$, 则 $\text{Gal}(M/L) = S_n$, 进而 $M^{S_n} = L$. 记 $R = K[X_1, \dots, X_n]$, $S = K[e_1, \dots, e_n]$, 则 $M^{S_n} = \text{Frac}(R^{S_n})$, $L = \text{Frac}(S)$, 则 S, R^{S_n} 具有相同的分式域. 注意到 R^{S_n}/S 是整扩张, 而 S 是 UFD, 进而是整闭, 故 $R^{S_n} = S$.

问题 (6): 本系列问题是为熟悉分析学的人准备的, 如果你认为自己对分析学的熟练度不足, 你可以忽略本系列问题.

问题 (6.1): 若 W 是 \mathbb{R}^n 中的闭集, 请证明: $C_0(W)$ 对函数的逐点加法和逐点乘法构成一个交换环, 且 $C_0(W)$ 中存在么元当且仅当 W 是紧集. 这里 $C_0(W)$ 是所有满足如下条件的函数 $f: W \rightarrow \mathbb{C}$ 的集合:

(1) f 是连续的, 即若 W 中的序列 w_n 收敛到 w , 则 $f(w_n)$ 收敛到 $f(w)$.

(2) 对所有 $\varepsilon > 0$, $\{w \in W : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ 是紧集合.

问题 (6.2): 对 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中的理想 I , 若对于 I 中的函数列 f_n , 当 f_n 一致收敛到 f , 便有 $f \in I$, 则我们称 I 是 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 的一个闭理想. 请证明: 对 \mathbb{R}^n 的子集 S , 则 $I(S) = \{f \in C_0(\mathbb{R}^n) : f(s) = 0 \text{ 对所有 } s \in S \text{ 成立}\}$ 是 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 的闭理想.

问题 (6.3): 对 \mathbb{R}^n 的闭集 W , 请证明: $C_0(\mathbb{R}^n) \rightarrow C_0(W), f \mapsto f|_W$ 诱导了环同构 $C_0(\mathbb{R}^n)/I(W) \cong C_0(W)$.

提示: 你可以直接使用 Tietz 扩张定理的推论: 对局部紧拓扑空间 X (特别地, 当 $X = \mathbb{R}^n$), 若 Y 是 X 的闭集, 则 $C_0(X) \rightarrow C_0(Y), f \mapsto f|_Y$ 是满射.

问题 (6.4): 对 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 的理想 I , 请证明: $V(I) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in I \text{ 成立}\}$ 是 \mathbb{R}^n 中的闭集.

问题 (6.5): 对 \mathbb{R}^n 的子集 S , 请证明: $V(I(S)) = \bar{S}$, 这里 \bar{S} 是 S 的闭包.

提示: 利用所谓“鼓包函数”. 即对于 \mathbb{R}^n 中的开集 U , 以及 $x \in U$, 你可以找到 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 满足 $0 \leq f \leq 1$, $f(x) = 1$, 且 $\text{Supp}(f) \subset U$.

问题 (6.6): 对于 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 的理想 I , 请证明: $I(V(I))$ 是包含 I 的最小的闭理想 (即 I 在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中的闭包)

提示: 你可以首先证明 I 包含 $X - V(I)$ 中足够多的“鼓包函数”.

问题 (6.7): 请证明: $I \mapsto V(I)$ 和 $S \mapsto I(S)$ 给出了 \mathbb{R}^n 中的闭集与 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中闭理想的 1-1 对应. 特别地, 对 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 的闭理想 I , 则 I 是极大的非平凡闭理想当且仅当 $V(I)$ 是单点集.

问题 (6.8): 利用上述结果, 请证明: 对 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则 f 可以被 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 中的函数逼近.

说明: 事实上, 对一般的局部紧拓扑空间 X , 本系列问题的结论依旧对 $C_0(X)$ 成立. 进一步地, 对交换 C^* 代数 \mathcal{A} , 通过 Gelfand 表示, 则局部紧拓扑空间 X , 使得我们有等距同构 $\mathcal{A} \cong C_0(X)$. 因此, 本命题事实上说明, 对任意 C^* 代数 \mathcal{A} 的理想 I , 都有 $\bar{I} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{m} \text{ 是极大理想} \\ \mathfrak{m} \supset I}} \mathfrak{m}$

——换言之, 本系列问题给出了 Hilbert 零点定理的交换 C^* 代数版本.