

痛风患者简单咨询案例：有无 RAG 对比与 DeepSeek 问答质量评估

DeepSeek 答案参考：[对话链接](#)

问题组 1：饮食管理（Q1-Q2）

Q1：尿酸高的人要怎么饮食？有什么建议

Q2：能不能具体解释为什么尿酸高的人要减少油炸食品的摄入

无 RAG 版本

- Q1 回答要点：

尿酸过高的人应采取以下饮食建议以控制代谢负担：

1. **适量摄入高嘌呤化合物**：减少鸡、牛、猪肉和其他高嘌呤食物的摄入，如豆类。
2. **增加纤维素来源**：多吃蔬菜和全谷物，改善肠道功能，减轻便秘。
3. **适量饮水**：补充水分，但避免过多，以免进一步升高尿酸。
4. **均衡优质蛋白质摄入**：多摄入鱼、豆制品等高蛋白来源，增强肌肉质量。
5. **减少含氮物质**：避免红肉和鱼类的摄入，降低血液总嘌呤化合物水平。
6. **定期监测肾功能**：及时调整饮食，必要时考虑药物或手术干预。

- Q2 回答要点：

高尿酸血症的常见原因是摄入油炸食品等碳水化合物-rich 食物的大量能量，这些食物代谢过程中产生的多肽、脂肪和脂类物质通过体液（如尿素氮、尿酸）被排出。减少油炸食品摄入可以重新利用脂肪和蛋白质的能量来源，从而降低尿酸水平。

有 RAG 版本（参考《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024）》.pdf）

- Q1 回答要点：

尿酸高的人可以通过以下饮食和建议来维持健康：

1. **食物多样化**：选择均衡营养的食物，避免过高的嘌呤摄入（如谷物类、蔬菜和乳酸（如牛奶等奶源产品））。
2. **适量饮水**：每日饮用足够的水以保持健康体重，并控制酒精和咖啡因的摄入量。
3. **合理运动**：根据自身情况调整饮食，增加运动有助于维持肌肉量和代谢率。
4. **营养搭配**：在 meal prepping 中加入蛋白质（如豆制品）以支持肌肉力量。
5. **个性化饮食**：根据个体体质选择适合他们的食谱，避免过量或过少的营养成分。

6. ****健康生活方式****: 减少糖分摄入，同时控制热量摄入以维持体重和代谢率。
通过以上原则，尿酸高的人可以改善其身体对尿酸的吸收，帮助缓解症状。

- Q2 回答要点:

在高尿酸血症人群，油炸食品的摄入通常与较高的脂肪和盐分含量密切相关。由于这些食物中的嘌呤和盐分较高，它们会显著增加体内对尿酸的积累。此外，油炸处理使肉类如鸡胸肉、牛肉等失去了油脂成分，进一步增加了能量来源和代谢负担。因此，高尿酸血症患者应减少食用油炸食品，注重饮食结构的选择，并通过规律的运动来维持体重指数，从而降低尿酸水平。

DeepSeek 评价

维度	无 RAG 版本	有 RAG 版本
准确性	✗ 多饮水建议错误，食物分类混淆	✓ 符合最新指南，机制解释正确
逻辑性	✗ 蛋白质建议前后矛盾	✓ 饮食+运动建议协同
风险性	! 错误建议可能加重病情	⚠ 食物举例需优化
实用性	✗ 患者无法执行矛盾建议	✓ 可操作性强（控油/控盐具体建议）

问题 3：药物风险（Q3）

Q3：用于控制高血压的利尿剂会增加患痛风的风险吗？

无 RAG 版本

利尿剂不会直接导致患痛风，但长期使用可能导致肾脏负担增加，这可能间接降低痛风患者的风险。

有 RAG 版本（参考《利尿剂和痛风：有何关联？-Mayo Clinic》.md）

利尿剂可能增加患痛风的风险，因为其可能导致排尿增多和液体浓缩，增加尿酸盐结晶的可能性。此外，某些类型的利尿剂会影响肾脏排出尿酸的能力。建议在控制高血压时使用合适的利尿剂，并遵循食物和运动的推荐，以减少高尿酸血症的风险。

DeepSeek 评价

维度	无 RAG 版本	有 RAG 版本
准确性	✗ 核心机制错误	✓ 机制清晰完整
临床价值	✗ 误导性结论	✓ 指导个体化用药
风险等级	高危（可能延误治疗）	低危（提供解决方案）